



ENCUESTA SOBRE ADICCIONES EN EUSKADI 2017

Monográfico sobre el consumo de tabaco

Versión resumida

1. Justificación del estudio

Actualmente el tabaquismo es un problema de salud pública a nivel mundial, con importantes efectos sobre la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad, en el que están implicados diferentes agentes: desde las personas fumadoras hasta el sistema sanitario, las administraciones públicas o la industria tabaquera.

A pesar de que el consumo de tabaco está presente en todos los grupos sociales, su consumo está relacionado con las características socioeconómicas de las personas y, como se ha podido comprobar a lo largo del tiempo, algunos grupos sociales están más expuestos que otros a su consumo. En ese sentido, los estudios realizados han identificado cuatro fases en la epidemia de tabaquismo de los países desarrollados.

En cuanto a su difusión, se puede afirmar que en los países desarrollados la epidemia de tabaquismo ha seguido cuatro fases.

- En la primera fase la prevalencia del consumo de tabaco es baja y afecta, principalmente a los hombres de grupos socioeconómicos altos.
- Durante la segunda etapa, la prevalencia en el consumo de tabaco aumenta rápidamente entre los hombres siendo similar la distribución por grupos socioeconómicos. Entre las mujeres la prevalencia sigue siendo baja en esta fase, aunque aumenta levemente entre las mujeres de grupos más aventajados.
- En la tercera fase, el consumo desciende de forma importante entre los hombres, y especialmente entre los de mejor posición socioeconómica, por lo que las desigualdades sociales entre los hombres crecen. Entre las mujeres, la prevalencia del consumo sigue aumentando.
- Por último, en la etapa final el consumo de tabaco desciende lentamente, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, concentrándose mayoritariamente entre los grupos socioeconómicos más bajos.

A pesar de que no todos los países han seguido este proceso de la misma manera, la mayoría de los países del Norte de Europa se encuentran actualmente en la última de las fases, donde el tabaquismo se concentra entre los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, y por tanto, las desigualdades están aumentando. Los países del Sur, en cambio, han seguido estas etapas de una forma más tardía.

El monográfico analiza, de forma específica, el consumo de tabaco entre la población vasca de 15 a 74 años, proporcionando una panorámica general sobre la prevalencia del consumo, su frecuencia y su intensidad. Asimismo, el estudio permite conocer las actitudes y la percepción de la ciudadanía en relación al consumo de tabaco y su opinión sobre determinadas políticas de interés en esta materia. Una de las principales fortalezas del monográfico es la de ofrecer la evolución de los consumos de esta sustancia en los últimos 25 años.

2. Objetivos y metodología

El objetivo principal del monográfico es describir y analizar los principales resultados que en relación al consumo de tabaco ofrece la Encuesta sobre Adicciones en Euskadi 2017, en lo referente a las prevalencias y pautas de consumo, principales tendencias y evolución, distribución por grupos sociales, percepción social y valoración.

La Encuesta sobre Adicciones en Euskadi es una operación estadística promovida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco –anteriormente denominada Encuesta Euskadi y Drogas– e incluida en el Plan Vasco de Estadística 2014-2017. Esta operación estadística consiste en una encuesta domiciliaria dirigida a conocer la prevalencia de diversas adicciones, con y sin sustancia, entre la población vasca de 15 a 74 años, así como la percepción y valoración sobre diversas cuestiones relacionadas con el consumo de drogas y las adicciones. La primera edición de la encuesta se realizó en 1992 y, en términos generales, cubre un periodo de 25 años, cuenta ya con doce ediciones y es una de las operaciones estadísticas en materia de adicciones más antigua y consolidada de nuestro entorno.

Para alcanzar los objetivos propuestos se han utilizado dos métodos de análisis complementarios.


- En primer lugar, se ha realizado un análisis descriptivo de las variables relacionadas con el consumo de tabaco, así como de las variables que recogen la percepción de la ciudadanía sobre el consumo de esta sustancia, y su opinión sobre determinadas políticas. Para las variables dependientes cualitativas se han calculado prevalencias estandarizadas por edad, tanto para mujeres como para hombres y por nivel de estudios. La estandarización por edad ha sido realizada mediante el método directo, tomando como referencia la población de la CAPV correspondiente al Censo demográfico a 1 de enero de 2017 de INE. Los análisis se han realizado desagregados por sexo, y en el caso de las prevalencias generales, por nivel de estudios.
- En segundo lugar, el análisis descriptivo se ha complementado con un análisis explicativo sobre el impacto que tienen las principales variables sociodemográficas en el consumo de tabaco. Para realizar este análisis se ha utilizado, en primer lugar, la prueba de Chi-cuadrado con un nivel de significación de 95% ($\alpha \geq 0,05$). En segundo lugar, se han calculado las Odds Ratio (OR), mediante modelos de regresión logística, estratificando por sexo, nivel de estudios y grupos de edad. En el caso del sexo y del nivel de estudios, los modelos de regresión se han ajustado por edad, para poder controlar esta variable como factor de confusión.

3. Principales resultados

a) Prevalencias generales de consumo de tabaco por edad y nivel socioeconómico desagregado por sexo

En 2017 algo más de la mitad de la población vasca de 15 a 74 declaraba haber probado el tabaco alguna vez en la vida (51,2%), el 25,9% lo había hecho en los últimos 12 meses, algo menos del 25% en los últimos 30 días (24,6%) y el 22,1% de la población consumía tabaco diariamente. El consumo de tabaco no era homogéneo entre la población y en la CAPV existían notables desigualdades en función del sexo, la edad y el nivel de estudios.

Cuadro 1. Prevalencias generales de consumo de tabaco por grupos de edad, 2017 (%). Resultados desagregados por sexo



Total	15-19	20-24	25-29	30-34	35-44	45-54	55-64	65-74
Alguna vez en la vida	16,1	33,2	42,9	48,8	55,3	55,8	65,4	44,0
Últimos 12 meses*	15,2	24,2	33,8	28,4	29,5	29,7	29,4	11,1
Últimos 30 días*	15,2	21,7	31,5	27,0	28,1	28,2	28,8	10,1
Diario	12,1	16,1	27,5	22,8	23,4	26,9	27,4	10,1
Mujeres	15-19	20-24	25-29	30-34	35-44	45-54	55-64	65-74
Alguna vez en la vida	14,7	31,3	40,9	48,9	58,3	49,3	55,3	26,5
Últimos 12 meses*	14,7	22,9	30,5	23,7	30,2	22,5	23,6	9,4
Últimos 30 días*	14,7	20,6	29,1	23,0	28,3	21,6	23,1	7,5
Diario	11,0	16,4	27,6	16,5	23,9	20,0	21,7	7,5
Hombres	15-19	20-24	25-29	30-34	35-44	45-54	55-64	65-74
Alguna vez en la vida	17,5	35,1	44,8	48,7	52,2	61,9	76,0	64,1
Últimos 12 meses*	15,6	25,6	36,8	32,9	28,7	36,3	35,4	13,1
Últimos 30 días*	15,6	22,8	33,7	31,0	27,8	34,4	34,8	13,1
Diario	13,3	15,7	27,4	28,9	22,9	33,3	33,4	13,1


*Estimación.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en Euskadi, 2017.

Las prevalencias generales de consumo de tabaco están muy relacionadas con los procesos vitales de mujeres y hombres y varían dependiendo de la etapa de la vida en la que se encuentren. En 2017 se observaban dos puntos importantes en la trayectoria vital de la población, que incidían en el descenso del consumo de tabaco, tanto en mujeres como en hombres: la llegada de los/las hijos/as (algo más tardía entre los hombres) y la edad de jubilación.

En el caso del nivel educativo, a medida que disminuía el nivel de estudios, aumentaba la prevalencia de consumo de tabaco, tanto de mujeres como de hombres, a excepción del consumo alguna vez en la vida en mujeres, que seguía un patrón opuesto al del resto de categorías. Este hecho era debido, principalmente, al cambio de patrón de consumo entre generaciones.

Cuadro 2. Prevalencias generales de consumo de tabaco por nivel de estudios, 2017 (%). Resultados desagregados por sexo. Datos estandarizados por edad



		Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses**	Últimos 30 días**	Diario
Total	Sin estudios o primarios	48,1	30,4	29,0	27,3
	Estudios secundarios	52,8	26,1	25,1	22,9
	Estudios universitarios	51,7	21,1	19,6	15,6
Mujeres*	Sin estudios o primarios	44,1	28,7	27,1	25,4
	Estudios secundarios	48,7	22,6	21,4	18,4
	Estudios universitarios	52,1	21,9	21	17,8
Hombres*	Sin estudios o primarios	62,0	41,1	39,7	37,1
	Estudios secundarios	57,1	28,5	27,7	26,5
	Estudios universitarios	52,6	19,5	17,1	12,1

*Datos estandarizados por edad.


**Estimación.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en Euskadi, 2017 y Censo demográfico a 1 de enero de 2017 de INE.

b) Evolución temporal de la prevalencia de los principales indicadores de consumo de tabaco por edad y nivel socioeconómico desagregado por sexo

Los datos evolutivos mostraban resultados muy positivos, puesto que se mantenía la tendencia iniciada en 2008 de disminución de las prevalencias generales de consumo de tabaco. De hecho, en 2017 se registraban las prevalencias más bajas de toda la serie de encuestas en lo referente al consumo en los últimos 12 meses, últimos 30 días y consumo diario de tabaco, tanto en mujeres como en hombres.

Cuadro 3. Evolución de las prevalencias generales de tabaco (%). Resultados desagregados por sexo. Datos estandarizados por edad



		1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Total	Alguna vez	59,2	56,4	55,4	47,6	49,0	61,0	53,7	59,6	60,2	59,3	54,4	51,2
	Últ. 12 meses	-	-	-	-	-	-	-	-	38,2	36,1	31,2	25,9
	Últ. 30 días	38,8	38,9	35,2	34,4	35,0	36,9	35,0	35,6	35,2	33,5	29,3	24,6
	A diario	-	-	-	-	28,6	-	30,3	30,9	32,6	31,3	25,5	22,1
Mujeres	Alguna vez	43,9	34,0	35,4	34,9	38,4	51,9	46,4	49,2	49,5	52,3	48,5	45,6
	Últ. 12 meses	-	-	-	-	-	-	-	-	32,9	31,5	28,5	22,5
	Últ. 30 días	28,0	24,7	22,0	25,7	26,7	31,2	30,5	29,5	29,8	28,5	26,2	21,3
	A diario	-	-	-	-	23,2	-	26,2	25,7	28,7	26,8	22,8	18,7
Hombres	Alguna vez	73,1	75,8	70,7	61,9	58,1	69,2	60,9	70,2	70,7	66,6	60,0	57,0
	Últ. 12 meses	-	-	-	-	-	-	-	-	40,9	39,4	32,3	29,3
	Últ. 30 días	43,3	47,8	40,8	40,7	38,7	39,2	36,8	38,5	38,0	37,1	31,1	28,1
	A diario	-	-	-	-	30,2	-	31,9	33,7	33,7	34,5	27,1	25,6

*Estimación.

Datos estandarizados por edad.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en Euskadi y Censo demográfico a 1 de enero de 2017 de INE.


Sin embargo, la evolución del consumo diario de tabaco por nivel de estudios no era la misma para la población de diferentes generaciones, lo que se relacionaba con las diferentes fases de la epidemia del tabaquismo.

Entre los hombres de 45-74 años, en el año 2004 se observaba una mayor prevalencia de consumo entre los que tenían un nivel de estudios superior. Sin embargo, a partir de 2006 las prevalencias de consumo se igualaban entre los hombres de los dos niveles de estudios, para posteriormente aumentar entre los hombres con estudios inferiores y aumentar también la distancia entre los dos grupos.

En el caso de las mujeres de 45-74 años, se observaba un cambio de patrón en la última edición, debido, principalmente, a que la prevalencia de consumo diario entre las mujeres con un nivel de estudios superior había descendido.


Entre la población joven, eran destacables, tanto el descenso continuado que se había producido desde el año 2008-2010 en los dos sexos, como la reducción en la distancia entre la población de cada uno de los dos niveles de estudios.

Cuadro 4. Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco, por nivel de estudios y grupos de edad (%). Resultados para el total de la población y desagregados por sexo.



[Continuación]

Cuadro 5. Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco, por nivel de estudios y grupos de edad (%). Resultados para el total de la población y desagregados por sexo




Total		2004	2006	2008	2010	2012	2017
15-44	E. inferiores	45,6	44,7	46,3	41,3	34,4	26,7
	E. superiores	32,6	34,3	37,1	34,8	26,6	20,3
45-74	E. inferiores	16,2	19,6	20,7	23,1	21,8	27,6
	E. superiores	33,6	29,1	30,0	26,9	23,4	19,8
Mujeres		2004	2006	2008	2010	2012	2017
15-44	E. inferiores	45,3	41,9	46,9	33,1	27,0	23,8
	E. superiores	37,1	33,3	35,8	35,5	23,9	20,0
45-74	E. inferiores	10,0	12,3	15,8	14,3	17,6	17,9
	E. superiores	27,6	29,6	30,1	25,7	27,2	16,4
Hombres		2004	2006	2008	2010	2012	2017
15-44	E. inferiores	45,9	47,2	45,8	48,2	39,5	28,5
	E. superiores	28,2	35,2	38,4	34,1	29,3	20,6
45-74	E. inferiores	24,6	30,2	28,0	34,2	27,9	40,3
	E. superiores	37,2	28,8	29,9	27,9	20,5	22,8

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en Euskadi.

c) Tipología del consumo de tabaco por sexo, edad y nivel socioeconómico

En el año 2017 el grupo poblacional más numeroso era el que conforman las personas que nunca habían consumido tabaco (48,8% de la población). El resto de la población se repartía entre quienes habían abandonado el consumo (26,5%), los/las consumidores/as ocasionales (2,65) y las personas que consumían tabaco de forma habitual (22,1%). La distribución de la población en relación al consumo de tabaco mostraba una mayor relación con esta sustancia por parte de los hombres. Uno de cada cuatro hombres consumía habitualmente tabaco (25,6%) frente al 18% de las mujeres; y el 28,8% habían abandonado el consumo frente al 24,3% de las mujeres que también lo habían hecho. Por el contrario, la proporción de la población que nunca había consumido tabaco era mayor entre las mujeres (54,4%) que entre los hombres (43%).

Cuadro 6. Distribución de la población en relación al consumo de tabaco, 2017 (%). Resultados desagregados por sexo. Datos estandarizados por edad



	Total	Mujeres*	Hombres*	Ratio h/m
Nunca ha probado	22,1	54,4	43,0	0,8
Ha abandonado el consumo**	26,5	24,3	28,9	1,2
Consumo ocasional	2,6	2,6	2,6	1,0
Consumo habitual	48,8	18,7	25,6	1,4

*Datos estandarizados por edad.


**La categoría "ha abandonado el consumo" hace referencia a las personas que han fumado a lo largo de su vida pero que en la actualidad no fuman, independientemente de si en el pasado fumaban en ocasiones o lo hacían todos los días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en Euskadi y Censo demográfico a 1 de enero de 2017 de INE.

La distribución de la tipología de consumo de tabaco por edad mostraba que, en el caso de las mujeres, la población que había tenido algún contacto con el tabaco (ya sea porque en aquel momento consumía de forma habitual, ocasional o porque había abandonado el consumo) se concentraba entre la población con edad intermedia. Según este patrón, la proporción de mujeres que no había tenido nunca contacto con el tabaco era mayor entre las mujeres de menos (15-24 años) y más edad (65-74 años). Más del 70% de las mujeres pertenecientes a estos dos grupos de edad no habían probado nunca el tabaco.

Sin embargo, las principales diferencias entre mujeres y hombres se producían entre la población de edad más avanzada. La proporción de quienes consumían de forma habitual o habían abandonado el consumo era mayor entre los hombres y, sin embargo, entre las mujeres destacaba la proporción de quienes nunca lo habían probado. Este hecho, sin duda, estaba muy ligado a la influencia de los roles y el proceso de socialización que mujeres y hombres han tenido a lo largo del tiempo.

Cuadro 7. Distribución de la población en relación al consumo de tabaco por grupos de edad, 2017 (%). Resultados desagregados por sexo




Total	15-24	25-29	30-34	35-44	45-54	55-64	65-74
Fumador/a habitual	14,3	27,5	22,8	23,4	26,9	27,4	10,1
Fumador/a ocasional	4,5	4,0	4,3	4,7	1,3	1,4	0,0
Ha abandonado el tabaco	6,7	11,4	21,8	27,2	27,6	36,5	33,9
Nunca ha probado	74,5	57,1	51,2	44,7	44,2	34,6	56,0
Mujeres	15-24	25-29	30-34	35-44	45-54	55-64	65-74
Fumadora habitual	13,9	27,6	16,5	23,9	20,0	21,7	7,5
Fumadora ocasional	4,0	1,5	6,5	4,4	1,7	1,4	0,0
Ha abandonado el tabaco	5,9	11,8	26,0	30,0	27,7	32,2	19,0
Nunca ha probado	76,2	59,1	51,1	41,7	50,7	44,7	73,5
Hombres	15-24	25-29	30-34	35-44	45-54	55-64	65-74
Fumador habitual	14,6	27,4	28,9	22,9	33,3	33,4	13,1
Fumador ocasional	4,9	6,3	2,1	4,9	1,0	1,4	0,0
Ha abandonado el tabaco	7,6	11,1	17,7	24,3	27,5	41,1	51,0
Nunca ha probado	72,9	55,2	51,3	47,8	38,1	24,0	35,9

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en Euskadi, 2017.

En la CAPV también se observaba un gradiente social en el consumo de tabaco por nivel de estudios, principalmente en hombres. El consumo habitual aumentaba a medida que disminuía el nivel de estudios. Sin embargo, la proporción de abandono del tabaco y de hombres que nunca lo habían probado crecía gradualmente con el nivel de estudios. En el caso de las mujeres el gradiente social se observaba en la proporción de fumadoras y de las que nunca habían probado el tabaco, pero se invertía en el abandono del mismo, al predominar entre las de estudios universitarios.

Cuadro 8. Distribución de la población en relación al consumo de tabaco por nivel de estudios, 2017 (%). Resultados desagregados por sexo. Datos estandarizados por edad



Total	Fumador/a habitual	Fumador/a ocasional	Ha abandonado el tabaco	Nunca ha probado
Sin estudios o primarios	27,3	1,7	19,1	51,9
Estudios secundarios	22,9	2,2	27,8	47,2
Estudios universitarios	15,6	4,0	32,1	48,3
Mujeres*	Fumadora habitual	Fumadora ocasional	Ha abandonado el tabaco	Nunca ha probado
Sin estudios o primarios	25,4	1,8	16,9	55,9
Estudios secundarios	18,4	3,0	27,3	51,3
Estudios universitarios	17,8	3,3	31,1	47,9
Hombres*	Fumador habitual	Fumador ocasional	Ha abandonado el tabaco	Nunca ha probado
Sin estudios o primarios	37,1	2,5	22,3	38,0
Estudios secundarios	26,5	1,2	29,4	42,9
Estudios universitarios	12,1	5,1	35,5	47,4

*Datos estandarizados por edad.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en Euskadi y Censo demográfico a 1 de enero de 2017 de INE.

d) Percepciones del consumo de tabaco desagregadas por sexo

En 2017 el 22,3% de la población vasca consideraba que la situación del consumo de tabaco era actualmente muy grave y el 44,9% bastante grave. El porcentaje de quienes atribuían bastante o mucha gravedad a su consumo había aumentado respecto a la anterior edición de 2012, rompiendo el descenso en la gravedad atribuida comenzada en 2008.

Desde el año 2004 hasta 2012 había ido perdiendo peso gradualmente la proporción de quienes consideraban que el consumo de tabaco estaba aumentando en la CAPV. En la última edición parecía estabilizarse y las diferencias entre mujeres y hombres se habían reducido.

En la última edición de 2017 aumentaba aún más la gravedad atribuida al consumo diario de un paquete de tabaco. Prácticamente toda la población consideraba que el consumo de más de un paquete diario acarrea bastantes o muchos problemas, concretamente el 98,2% de las mujeres y el 97,3% de los hombres.

A pesar de que en los últimos años las diferencias en las percepciones entre mujeres y hombres se están reduciendo, en 2017 las mujeres hacían una valoración más negativa de la situación del consumo en la CAPV y atribuían una mayor gravedad al consumo de tabaco. Los hombres, por su parte, restaban importancia al problema, siendo más permisivos a la hora de valorar dicho consumo.

Tabla 1. Evolución de diversas percepciones relacionadas con el consumo de tabaco (%). Resultados para el total de la población y desagregados por sexo. Datos estandarizados por edad

Total	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
El consumo de tabaco en Euskadi es bastante o muy grave	59,5	51,8	68,7	63,0	66,5	63,4	57,8	67,2
El consumo de tabaco ha aumentado en los últimos años	-	-	52,7	46,5	35,0	28,1	23,4	21,9
Fumar un paquete diario de tabaco acarrea bastantes o muchos problemas	-	-	-	87,8	86,7	91,8	88,5	97,8
Mujeres*	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
El consumo de tabaco en Euskadi es bastante o muy grave	62,1	56,4	76,0	68,0	71,8	67,7	61,4	71,8
El consumo de tabaco ha aumentado en los últimos años	-	-	60,1	52,1	38,3	31,5	25,7	23,5
Fumar un paquete diario de tabaco acarrea bastantes o muchos problemas	-	-	-	88,9	89,5	93,7	90,2	98,2
Hombres*	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
El consumo de tabaco en Euskadi es bastante o muy grave	57,0	47,3	61,2	58,0	61,1	59,0	54,3	62,5
El consumo de tabaco ha aumentado en los últimos años	-	-	45,2	40,9	31,7	24,7	21,1	20,4
Fumar un paquete diario de tabaco acarrea bastantes o muchos problemas	-	-	-	86,7	83,9	90,0	86,8	97,3

Nota: Las proporciones recogidas en este gráfico están calculadas sobre la población total.

*Datos estandarizados por edad.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en Euskadi y Censo demográfico a 1 de enero de 2017 de INE.

4. Conclusiones

En 2017 el tabaco era la segunda sustancia psicoactiva más consumida entre la población de la CAPV tras el alcohol. Sin embargo, su consumo no era homogéneo y existían notables desigualdades en el consumo de tabaco en función del sexo, la edad y el nivel de estudios.

Las prevalencias generales de consumo de tabaco estaban muy relacionadas con los procesos vitales de mujeres y hombres, y variaban dependiendo de la etapa de la vida en la que se encontraban, donde la llegada de los/las hijos/as y la edad de jubilación incidían en el descenso del consumo de tabaco, tanto en mujeres como en hombres.

En la línea de otros estudios en nuestro entorno, se observaba un gradiente por nivel de estudios en el consumo de tabaco: a medida que disminuía el nivel de estudios, aumentaba la prevalencia de consumo, tanto de mujeres como de hombres (a excepción del consumo a lo largo de la vida en mujeres, que seguía un patrón opuesto al del resto de categorías).

Los datos evolutivos mostraban resultados muy positivos, puesto que se mantenía la tendencia iniciada en 2008 de disminución de las prevalencias generales de consumo de tabaco. De hecho, en 2017 se registraban las prevalencias más bajas de toda la serie de encuestas en lo referente al consumo en los últimos 12 meses, últimos 30 días y consumo diario de tabaco, tanto en mujeres como en hombres. Sin embargo, la evolución del consumo diario de tabaco por nivel de estudios no era la misma para la población de diferentes generaciones, lo que se relaciona con las diferentes fases de la epidemia del tabaquismo.

La distribución de la población en relación al consumo de tabaco mostraba una mayor relación con esta sustancia por parte de los hombres. La proporción de la población consumidora habitual era mayor entre los hombres que entre las mujeres. Por el contrario, era mayor la proporción de mujeres que nunca habían consumido. Estas diferencias por sexo en el contacto de la población con el tabaco eran especialmente marcadas entre la población de más edad. Asimismo, los datos mostraban un gradiente social en el consumo de tabaco por nivel de estudios: un menor nivel de estudios incrementaba el consumo habitual de tabaco. Este patrón se invertía en el caso de las mujeres que nunca habían probado el tabaco: a menor nivel de estudios mayor proporción de mujeres que nunca habían fumado. En los dos sexos, los estudios universitarios favorecían el abandono del consumo.

Se observaba un aumento en la gravedad atribuida al consumo de tabaco por parte de la población general. En primer lugar, el porcentaje de población que atribuía bastante o mucha gravedad al consumo de tabaco había aumentado y en segundo lugar, desde el año 2004 hasta 2012 había ido perdiendo peso gradualmente la proporción de quienes consideraban que el consumo de tabaco estaba aumentando en la CAPV. Por último, en 2017 prácticamente toda la población opinaba que el consumo de más de un paquete diario acarrea bastantes o muchos problemas. En general, las mujeres hacían una valoración más negativa de la situación de la CAPV y atribuían una mayor gravedad al consumo de tabaco.