

ENCUESTA SOBRE ADICCIONES EN EUSKADI 2017

AVANCE DE DATOS



Septiembre 2018



EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

SiiS Centro de Documentación y Estudios
Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa
Fundación Eguía-Careaga Fundazioa

INDICE

PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA	4
1. EL CONSUMO DE ALCOHOL	5
1.1. Prevalencias generales de consumo de alcohol	5
1.2. Edad de inicio de consumo de alcohol	5
1.3. Frecuencia de consumo de alcohol durante los últimos 12 meses	6
1.4. Frecuencia de consumo de alcohol durante los últimos 30 días.....	7
1.5. Tipología de consumo de alcohol en días laborables y fines de semana	8
1.6. Frecuencia de borracheras durante los últimos 12 meses	9
1.7. Episodios de consumo intensivo	10
1.8. Consumo bebidas energéticas mezcladas con bebidas alcohólicas	11
1.9. Riesgo de adicción al alcohol.....	12
1.10. Problemas asociados al consumo de alcohol u otras drogas	14
1.11. Causas de la disminución del consumo de alcohol.....	15
1.12. Hábitos de consumo de alcohol entre la población de 15 a 34 años	16
2. EL CONSUMO DE TABACO	18
2.1. Prevalencias generales de consumo de tabaco.....	18
2.2. Distribución de la población en relación con el tabaco.....	18
2.3. Edad de inicio en el consumo de tabaco	19
2.4. Intensidad del consumo de tabaco.....	20
2.5. Tipo de tabaco consumido	21
2.6. Disposición e intención de abandono del consumo de tabaco	22
2.7. Causas del abandono o disminución del consumo de tabaco.....	22
2.8. Consumo de cigarrillos electrónicos.....	23
2.9. Exposición al humo del tabaco	24
3. EL CONSUMO DE CANNABIS	25
3.1. Prevalencias generales de consumo de cannabis.....	25
3.2. Edad de inicio en el consumo de cannabis	25
3.3. Frecuencia de consumo de cannabis.....	26
3.4. Vía de obtención del cannabis.....	27
4. CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS ILEGALES	28
4.1. Prevalencias generales de consumo de otras sustancias ilegales	28
4.2. Edad de inicio en el consumo de otras sustancias ilegales	31
4.3. Consumo de sustancias vía inyectada	32

5. CONSUMO DE PSICOFÁRMACOS.....	33
5.1. Prevalencias generales de consumo de psicofármacos.....	33
5.2. Edad del primer consumo de psicofármacos	35
6. CONSUMO DE SUSTANCIAS DOPANTES.....	36
6.1. Prevalencias generales de consumo de sustancias dopantes	36
6.2. Edad de inicio del primer consumo de sustancias dopantes.....	36
7. JUEGO	37
7.1. Frecuencia de la práctica de distintos tipos de juego.....	37
7.2. Utilización de diferentes vías de acceso al juego	38
7.3. Gasto en el último año y cantidad máxima gastada en prácticas de juego	39
7.4. Prácticas de juego de riesgo y adicción	40
8. USO DE INTERNET	42
8.1. Frecuencia de uso de internet	42
8.2. Uso de riesgo o problemático de internet.....	42
9. PERCEPCIÓN SOCIAL RESPECTO AL CONSUMO DE DROGAS Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS	44
9.1. Valoración de la gravedad atribuida al consumo de sustancias y a la adicción al juego	44
9.2. Percepción sobre la evolución del consumo de diversas sustancias en los últimos años.....	45
9.3. Opinión sobre los problemas que acarrearán diversas pautas de consumo de sustancias y diversas prácticas	46
9.4. Accesibilidad de diversas sustancias.....	48
9.5. Cercanía a personas consumidoras y/o con problemas con las drogas	49
9.6. Conocimiento y valoración de la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias de 2016.....	50
9.7. Valoración de ciertas medidas y actuaciones en materia de drogodependencias	51

PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA

La Encuesta sobre Adicciones en la CAPV es una operación promovida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco e incluida en el Plan Vasco de Estadística 2014-2017. Esta operación estadística consiste en una encuesta domiciliaria dirigida a conocer la incidencia de diversas adicciones, con y sin sustancia, entre la población vasca de 15 a 74 años, así como la percepción y valoración sobre diversas cuestiones relacionadas con el consumo de drogas y las adicciones.

La primera edición de esta encuesta se realizó en el año 1992 y se ha venido efectuando con una periodicidad bianual hasta el año 2012. Actualmente, su periodicidad es quinquenal, con lo que los resultados de esta edición suponen una actualización de los resultados que se obtuvieron hace cinco años. En términos generales, la encuesta cubre un periodo de 25 años, cuenta ya con doce ediciones y es una de las operaciones en materia de drogas más antigua y consolidada de nuestro entorno.

La muestra utilizada en la presente edición de la Encuesta sobre Adicciones en la CAPV ha sido diseñada por Eustat, a petición de la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. El marco de la muestra está compuesto por la población de 15 a 74 años residente en viviendas familiares de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la encuesta ha sido realizada a una muestra de 2.013 personas. El trabajo de campo ha sido desarrollado por la empresa QUOR entre los meses de noviembre de 2017 y febrero de 2018.

En este documento presenta un avance de los principales resultados de la Encuesta sobre Adicciones en la CAPV del año 2017. Los resultados de cada una de las variables recogidas en este documento se presentan desagregados por sexo y grandes grupos de edad. Asimismo, también se ofrecen resultados desde el punto de vista evolutivo, siempre que las variables lo permiten.

Este avance se estructura en nueve capítulos en función de las principales sustancias o adicciones objeto de análisis. En los primeros seis capítulos se analizan, de forma separada, las cuestiones relacionadas con el consumo de alcohol, tabaco, cannabis, resto de sustancias ilegales, psicofármacos y sustancias dopantes. Asimismo, en los capítulos séptimo y octavo, se analizan diversas prácticas de riesgo relacionadas con el juego y el uso de internet. Por último, el noveno capítulo, planteado de forma transversal al conjunto de las sustancias consideradas, ofrece los resultados obtenidos en la encuesta en relación a la percepción social del consumo de drogas en la CAPV y la valoración que la ciudadanía hace de las políticas desarrolladas al respecto.

En cada uno de los capítulos se hace referencia, principalmente, a las prevalencias de consumos generales (es decir, número o proporción de personas que declaran consumir o haber consumido cada sustancia), ya sea a lo largo de la vida, en los últimos 12 meses, últimos 30 días o de forma diaria; la distribución de la población en relación al consumo; la edad de inicio en el consumo; las frecuencias de consumo y, en su caso, las cantidades de consumo. Tal y como se ha mencionado previamente, cada una de las variables ofrecidas se ha analizado en función de las características sociodemográficas básicas de la persona encuestada, concretamente, el sexo (hombres y mujeres) y la edad. Para esta última variable se ha optado por diferenciar dos grandes grupos de edad 15-34 y 35-74 años.

Se ha prestado especial atención al análisis evolutivo, mostrando, en la medida de lo posible, los datos desde el inicio de la serie Euskadi y Drogas. A pesar de las dificultades que suponen los cambios que se aplican sucesivamente en la estructura del cuestionario, una de las principales fortalezas de la serie Euskadi y Drogas reside en la posibilidad de analizar el fenómeno a largo plazo. Para ello, se ha recurrido a las bases de datos correspondientes a las diferentes ediciones de la encuesta. En los casos en los que no aparecen determinados años se debe a que no se encuentra disponible la información en esa edición.

1. EL CONSUMO DE ALCOHOL

1.1. Prevalencias generales de consumo de alcohol

Tabla 1. Prevalencias generales de consumo de alcohol por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Alguna vez en la vida	95,3	91,2	90,9	94,0	93,2
En los últimos 12 meses	86,0	76,4	82,7	80,7	81,2
En los últimos 30 días	78,0	65,1	70,8	71,7	71,5
A diario*	18,9	7,3	2,0	16,6	13,1

*Se considera consumo diario el consumo de alcohol realizado a diario durante los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 2. Evolución de las prevalencias generales de consumo de alcohol (%)

	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Alguna vez en la vida	--	95,6	94,2	88,8	94,8	91,7	90,8	86,9	93,2
En los últimos 12 meses	--	82,7	80,5	76,2	83,4	78,6	77,1	73,5	81,2
En los últimos 30 días	70,6	--		69,1	73,8	68,3	65,3	64,9	71,5
A diario	19,6	20,9	16,4	17,9	18,5	15,6	15,4	12,2	13,1

*Se considera consumo diario el consumo de alcohol realizado a diario durante los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

1.2. Edad de inicio de consumo de alcohol

Tabla 3. Distribución de la edad de inicio en el consumo de alcohol. 2017 (%)

	Número	Distribución sobre la población total	Distribución sobre la población ha probado el alcohol
Nunca ha probado el alcohol	112.694	6,8	--
Ha consumido alguna vez:	1.549.530	93,2	100,0
-15 años o menos	527.430	31,7	34,0
-Entre 16 y 17 años	530.192	31,9	34,2
-18 años o más	491.907	29,6	31,7
Total	1.662.224	100,0	--

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 4. Distribución de la edad de inicio en el consumo de alcohol entre la población que ha consumido alcohol a lo largo de su vida por sexo y edad. 2017 (% verticales)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
15 años o menos	39,1	28,8	50,7	28,9	34,0
Entre 16 y 17 años	35,4	33,0	38,1	33,0	34,2
18 años o más	25,5	38,2	11,1	38,1	31,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nota: las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 93,2% de la muestra, que se corresponde con la proporción de la población que ha consumido alcohol alguna vez.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 5. Edad media de inicio en el consumo de alcohol por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Media	16,2	17,5	15,5	17,2	16,8
Mediana	16	17	15	16	16
Desviación típica	2,48	4,19	1,77	3,77	3,49

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 6. Evolución de la distribución de la edad de inicio en el alcohol entre la población que ha consumido alcohol a lo largo de su vida. (%)

Grupos	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
15 años o menos	34,7	41,6	38,6	36,2	31,3	33,3	34,9	34,0
Entre 16 y 17 años	23,4	23,6	27,5	28,7	26,6	29,4	32,1	34,2
18 años o más	36,5	30,1	31,7	34,0	40,6	35,2	29,8	31,7
NS/NC	5,4	4,7	2,2	1,0	1,5	2,1	3,3	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Media								
Edad media de inicio	17,1	16,6	16,7	16,9	17,3	17,1	16,4	16,8

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

1.3. Frecuencia de consumo de alcohol durante los últimos 12 meses

Tabla 7. Distribución entre la población total de la frecuencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses. 2017

	Número	Distribución sobre la población total	Distribución sobre la población que ha consumido alcohol últimos 12 meses
No ha probado el alcohol	112.694	6,8	--
No ha consumido alcohol en los últimos 12 meses	200.314	12,1	--
Ha consumido alcohol en los últimos 12 meses:	1.349.216	81,2	100,0
- <i>Todos los días</i>	230.328	13,9	17,1
- <i>De 5 a 6 días a la semana</i>	21.406	1,3	1,6
- <i>4 días a la semana</i>	58.755	3,5	4,4
- <i>3 días a la semana</i>	108.023	6,5	8,0
- <i>De 1 a 2 días a la semana</i>	449.645	27,1	33,3
- <i>Una vez cada 15 días</i>	160.242	9,6	11,9
- <i>Una vez al mes</i>	128.924	7,8	9,6
- <i>Menos de una vez al mes</i>	191.893	11,5	14,2
Total	1.662.224	100,0	--

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 8. Distribución entre la población de la frecuencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses por sexo y grupos de edad. 2017

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
No ha probado el alcohol o no ha consumido en los últimos 12 meses	14,0	23,6	17,3	19,3	18,8
Ha consumido en los últimos 12 meses:	86,0	76,4	82,7	80,7	81,2
- <i>Todos los días</i>	20,3	7,5	1,8	17,7	13,9
- <i>De 5 a 6 días a la semana</i>	1,6	1,0	0,7	1,5	1,3
- <i>4 días a la semana</i>	4,4	2,7	2,4	3,9	3,5
- <i>3 días a la semana</i>	8,6	4,4	8,8	5,8	6,5
- <i>De 1 a 2 días a la semana</i>	28,0	26,1	30,6	25,9	27,1
- <i>Una vez cada 15 días</i>	8,5	10,7	14,3	8,2	9,6
- <i>Una vez al mes</i>	7,0	8,5	10,3	6,9	7,8
- <i>Menos de una vez al mes</i>	7,6	15,4	13,9	10,8	11,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

1.4. Frecuencia de consumo de alcohol durante los últimos 30 días**Tabla 9. Distribución entre la población total de la frecuencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días. 2017**

	Número	Distribución de la población total
Frecuencia de consumo días laborables (lunes a jueves)		
Todos los días	228.093	13,7
3 días por semana	44.185	2,7
2 días por semana	76.015	4,6
1 día por semana	150.463	9,1
Menos de 1 día por semana	101.656	6,1
Ningún día	1.061.812	63,9
Total	1.662.224	100,0
Frecuencia de consumo fines de semana (viernes a domingo)		
Todos los fines de semana	570.558	34,3
3 fines de semana	108.015	6,5
2 fines de semana	243.610	14,7
1 fin de semana	238.722	14,4
Ningún fin de semana	501.319	30,2
Total	1.662.224	100,0

Nota: las proporciones recogidas en esta tabla están calculadas sobre el total de la población. Dentro de ningún día o de ningún fin de semana, están incluidas también aquellas personas que no han probado el alcohol o no han consumido nada de alcohol en los últimos 12 meses.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 10. Distribución entre la población total de la frecuencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días por sexo y grupos de edad. 2017

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Frecuencia de consumo días laborables (lunes a jueves)					
Todos los días	20,2	7,4	1,9	17,5	13,7
3 días por semana	3,7	1,7	1,4	3,1	2,7
2 días por semana	5,8	3,4	4,4	4,6	4,6
1 día por semana	10,3	7,8	13,8	7,6	9,1
Menos de 1 día por semana	29,3	39,9	36,7	34,0	34,6
Ningún día	30,8	39,9	41,9	33,3	35,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Frecuencia de consumo fines de semana (viernes a domingo)					
Todos los fines de semana	42,6	26,1	23,0	37,9	34,3
3 fines de semana	6,2	6,8	9,7	5,5	6,5
2 fines de semana	14,8	14,5	18,8	13,4	14,7
1 fin de semana	12,3	16,4	17,9	13,2	14,4
Ningún fin de semana	24,0	36,2	30,6	30,0	30,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nota: las proporciones recogidas en esta tabla están calculadas sobre el total de la población.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

1.5. Tipología de consumo de alcohol en días laborables y fines de semana

Tabla 11. Distribución de la población total en función de la tipología de consumo de alcohol en días laborables y fines de semana. 2017

	Número	Distribución de la población total
Tipología de consumo en días laborables		
Abstemio	1.105.453	66,5
Casi abstemio	464.115	27,9
Poco bebedor	86.188	5,2
Bebedor excesivo	6.468	0,4
Bebedor de riesgo	0	0,0
Total	1.662.224	100,0
Tipología de consumo en fines de semana		
Abstemio	559.384	33,7
Casi abstemio	575.502	34,6
Poco bebedor	392.776	23,6
Bebedor excesivo	108.234	6,5
Bebedor de riesgo	26.328	1,6
Total	1.662.224	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 12. Distribución de la población total en función de la tipología de consumo de alcohol en días laborables y fines de semana por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Tipología de consumo en días laborables					
Abstemio	55,9	76,9	75,1	63,8	66,5
Casi abstemio	34,5	21,4	19,7	30,5	27,9
Poco bebedor	9,0	1,4	4,9	5,3	5,2
Bebedor excesivo	0,6	0,2	0,4	0,4	0,4
Bebedor de riesgo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tipología de consumo en fines de semana					
Abstemio	27,0	40,2	33,7	33,6	33,7
Casi abstemio	30,5	38,7	21,4	38,8	34,6
Poco bebedor	31,4	16,0	27,4	22,4	23,6
Bebedor excesivo	8,8	4,3	11,8	4,8	6,5
Bebedor de riesgo	2,4	0,8	5,7	0,3	1,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 13. Evolución de la distribución de la población total en función de la tipología de consumo de alcohol en días laborables y fines de semana (%)

	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Tipología de consumo en días laborables												
Abstemio	71,3	69,2	72,7	74,6	69,8	70,1	71,0	68,1	67,2	74,1	69,1	66,5
Casi abstemio	18,5	19,2	19,6	20,3	22,0	21,6	18,7	24,2	22,2	19,2	20,8	27,9
Poco bebedor	7,2	10,6	6,6	4,6	6,7	6,7	8,4	6,8	8,7	5,2	7,7	5,2
Bebedor excesivo	2,2	0,9	0,9	0,5	1,2	1,4	1,6	1,0	1,6	1,3	2,0	0,4
Bebedor de riesgo	0,8	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,0	0,4	0,2	0,5	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tipología de consumo en fines de semana												
Abstemio	56,9	53,4	54,0	59,0	53,5	52,4	43,2	35,0	32,6	37,4	35,8	33,7
Casi abstemio	15,2	18,4	18,2	19,5	27,5	25,6	18,7	23,0	30,0	31,4	30,9	34,6
Poco bebedor	14,2	18,5	16,9	16,1	15,3	16,1	20,7	28,1	23,6	21,5	21,9	23,6
Bebedor excesivo	9,2	6,4	7,9	4,0	3,1	4,6	11,9	10,2	9,6	7,1	8,1	6,5
Bebedor de riesgo	4,5	3,3	3,1	1,3	0,5	1,3	5,5	3,7	4,2	2,5	3,2	1,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

1.6. Frecuencia de borracheras durante los últimos 12 meses

Tabla 14. Distribución de la población total en función de la frecuencia de borracheras. 2017 (%)

	Número	Distribución sobre la población total	Distribución sobre la población que ha consumido últimos 12 meses
Nunca ha probado el alcohol	112.694	6,8	--
Ha probado pero no ha consumido en los últimos 12 meses	200.314	12,1	--
Ha consumido en los últimos 12 meses:	1.349.216	81,2	100,0
-No se ha emborrachado	951.478	57,2	70,5
-Se ha emborrachado entre 1 y 6 veces al año	288.231	17,3	21,4
-Se ha emborrachado entre 7 y 12 veces al año	50.654	3,0	3,8
-Se ha emborrachado más de 12 veces al año	58.853	3,5	4,4
Total	1.662.224	100,0	--

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 15. Frecuencia de borracheras entre la población que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
No se ha emborrachado	63,6	78,2	36,4	81,6	70,5
Se ha emborrachado entre 1 y 6 veces al año	25,2	17,1	40,7	15,1	21,4
Se ha emborrachado entre 7 y 12 veces al año	5,5	1,9	9,8	1,8	3,8
Se ha emborrachado más de 12 veces al año	5,7	2,8	13,1	1,5	4,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nota: los porcentajes recogidos en esta tabla están calculados sobre el 81,2% de la muestra, que se corresponde con las personas que han consumido alcohol en los últimos 12 meses.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 16. Evolución de la distribución de la población total en función de la frecuencia de borracheras en los últimos 12 meses (%)

	2004	2006	2008	2010	2012	2017
No se ha emborrachado	70,1	72,7	76,8	81,3	81,3	76,1
Entre 1 y 12 veces	19,7	19,2	19,0	13,2	15,0	20,4
Más de 12 veces	9,9	7,1	3,8	2,5	2,2	3,5
NS/NC	0,4	1,0	0,5	2,9	1,5	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nota: las proporciones están calculadas sobre el conjunto de la población. En la categoría 'no se ha emborrachado' se incluyen, por tanto, las personas que no han probado el alcohol, las que no han consumido nada en los últimos 12 meses y las que han consumido alcohol en los últimos 12 meses pero no se han emborrachado.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

1.7. Episodios de consumo intensivo

Tabla 17. Distribución de la población en función de la frecuencia de consumo intensivo* de alcohol a lo largo de los últimos 30 días. 2017 (%)

	Número	Distribución sobre la población total	Distribución sobre la población que ha consumido últimos 30 días
Nunca ha probado el alcohol	112.694	6,8	--
No ha consumido en los últimos 30 días	361.010	21,8	
Ha consumido en los últimos 30 días:	1.188.520	71,5	100,0
-No ha tenido episodios de consumo intensivo	1.005.395	60,5	84,6
-Entre 1 y 2 veces al mes	130.497	7,9	11,0
-Entre 3 y 4 veces al mes	28.696	1,7	2,4
-5 o más veces al mes	23.933	1,4	2,0
Total	1.662.224	100,0	--

Nota: se consideran episodios de consumo intensivo, en el caso de los hombres, el número de días en los que se han consumido 5 o más bebidas alcohólicas en la misma ocasión y, en el caso de las mujeres, el número de días en los que se han consumido 4 o más bebidas alcohólicas en la misma ocasión.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 18. Distribución de la población que ha consumido alcohol en los últimos 30 días por la frecuencia de consumo intensivo por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
No ha tenido episodios de consumo intensivo	83,4	86,0	71,2	88,8	84,6
Entre 1 y 2 veces al mes	11,0	11,0	23,3	7,1	11,0
Entre 3 y 4 veces al mes	2,8	1,9	3,8	2,0	2,4
5 o más veces al mes	2,8	1,1	1,6	2,1	2,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nota: las proporciones recogidas en esta tabla están calculadas sobre el 71,5% de la muestra, que se corresponde con la población que ha consumido alcohol en los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

1.8. Consumo bebidas energéticas mezcladas con bebidas alcohólicas

Tabla 19. Distribución de la población en función del consumo de bebidas energéticas mezcladas con bebidas alcohólicas* en los últimos 30 días. 2017 (%)

	Número	Distribución sobre la población total	Distribución sobre la población que ha consumido últimos 30 días
Nunca ha probado el alcohol	112.694	6,8	-
No ha consumido en los últimos 30 días	361.010	21,8	-
Ha consumido en los últimos 30 días:	1.188.520	71,5	100,0
-Sí	28.020	1,7	2,4
-No	1.160.500	69,8	97,6
Total	1.662.224	100,0	-

*¿Ha tomado en los últimos 30 días bebidas energéticas (Red Bull, Burn, Monster...) mezcladas con bebidas alcohólicas? Conteste "No" si lo único que hizo fue dar un sorbo o probar de la bebida de otra persona.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 20. Prevalencia de consumo de bebidas energéticas mezcladas con bebidas alcohólicas en los últimos 30 días por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol	2,3	1,1	5,7	0,4	1,7

Nota: las proporciones recogidas en esta tabla están calculadas sobre el total de la población.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

1.9. Riesgo de adicción al alcohol

Tabla 21. Distribución de la población total en función de los ítems del test CAGE*. 2017 (%)

	No ha probado o no ha consumido alcohol en los últimos 12 meses	Ha consumido alcohol en los últimos 12 meses		Total
		Sí	No	
Alguna vez ha pensado que debería beber menos	18,8	15,2	66,0	100,0
Le ha molestado que la gente le haya criticado su forma de beber	18,8	1,9	79,3	100,0
Se ha sentido mal o culpable por su forma de beber	18,8	4,2	77,0	100,0
Ha bebido alguna vez a primera hora de la mañana para calmar los nervios o evitar la resaca	18,8	1,4	79,7	100,0

*Este instrumento sirve para identificar las personas con dependencia del alcohol. Las preguntas se aplican únicamente a aquellas personas que han consumido alcohol en los últimos 12 meses.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 22. Prevalencia entre la población total de los ítems del test CAGE* por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Alguna vez ha pensado que debería beber menos	19,9	10,5	21,3	13,2	15,2
Le ha molestado que la gente le haya criticado su forma de beber	2,0	1,7	2,8	1,6	1,9
Se ha sentido mal o culpable por su forma de beber	5,8	2,6	7,4	3,2	4,2
Ha bebido alguna vez a primera hora de la mañana para calmar los nervios o evitar la resaca	2,3	0,6	1,7	1,3	1,4

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 23. Distribución de la población total en función del riesgo de adicción al alcohol a partir del test CAGE*. 2017 (%)

	Número	Distribución sobre la población total	Distribución sobre la población que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses
Nunca ha probado el alcohol	112.694	6,8	-
Ha probado pero no ha consumido en los últimos 12 meses	200.314	12,1	-
Ha consumido en los últimos 12 meses:	1.349.216	81,2	100
- <i>Bebedor social</i>	1.273.030	76,6	94,4
- <i>Consumo de riesgo</i>	54.377	3,3	4,0
- <i>Consumo perjudicial</i>	19.230	1,2	1,4
- <i>Dependencia alcohólica</i>	2.579	0,2	0,2
Total	1.662.224	100,0	-

*Las categorías expuestas en esta tabla son el resultado de aplicar el Test CAGE. Se considera que cuanto mayor es la puntuación obtenida, mayor es la dependencia, de forma que se aplica el siguiente baremo: ninguna o una respuesta positiva: bebedor social; dos respuestas positivas: consumo de riesgo; tres respuestas positivas: consumo perjudicial; cuatro respuestas positivas: dependencia alcohólica.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 24. Distribución de la población total en función del riesgo de adicción al alcohol a partir del test CAGE por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
No ha probado o no ha consumido en los últimos 12 meses	14,0	23,6	17,3	19,3	18,8
Bebedor social	79,1	74,1	75,9	76,8	76,6
Consumo de riesgo	5,0	1,6	4,8	2,8	3,3
Consumo perjudicial	1,5	0,8	1,9	0,9	1,2
Dependencia alcohólica	0,3	0,0	0,1	0,2	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 25. Evolución de la distribución de la población en función del riesgo de adicción al alcohol a partir del test CAGE (%)

	2012	2017
No ha probado o no ha consumido en los últimos 12 meses	26,5	18,8
Bebedor social	68,7	76,6
Consumo de riesgo	2,3	3,3
Consumo perjudicial	2,1	1,2
Dependencia alcohólica	0,4	0,2
Total	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

1.10. Problemas asociados al consumo de alcohol u otras drogas

Tabla 26. Distribución de la población en función de si alguna vez ha sufrido diversos problemas bajo la influencia del consumo de alcohol u otras drogas. 2017 (%)

	No ha probado el alcohol	Ha probado el alcohol			Total
		Sí	No	NS/NC	
Discusiones o peleas con desconocidos	6,8	5,2	87,8	0,2	100,0
Discusiones o peleas con familiares	6,8	2,8	90,3	0,2	100,0
Discusiones o peleas con amistades	6,8	6,0	87,1	0,1	100,0
Caídas, golpes involuntarios	6,8	6,3	86,8	0,1	100,0
Accidentes de tráfico	6,8	0,2	92,9	0,1	100,0
Accidentes laborales	6,8	0,0	93,1	0,1	100,0
Relaciones sexuales sin protección	6,8	3,0	90,0	0,3	100,0
Relaciones sexuales no deseadas	6,8	0,5	92,5	0,2	100,0
Algún episodio de etilismo agudo por el que ha tenido que ser atendido/a médicamente	6,8	0,2	92,9	0,1	100,0
Problemas con la policía o con la ley	6,8	1,5	91,6	0,1	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 27. Prevalencias entre la población total de diversos problemas bajo la influencia del consumo de alcohol u otras drogas por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Discusiones o peleas con desconocidos	7,2	3,3	14,2	2,3	5,2
Discusiones o peleas con familiares	3,4	2,1	4,5	2,2	2,8
Discusiones o peleas con amistades	8,0	4,0	16,9	2,5	6,0
Caídas, golpes involuntarios	7,6	4,9	17,7	2,6	6,3
Accidentes de tráfico	0,4	0,0	0,4	0,2	0,2
Accidentes laborales	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Relaciones sexuales sin protección	4,4	1,6	6,2	1,9	3,0
Relaciones sexuales no deseadas	1,0	0,0	1,4	0,2	0,5
Algún episodio de etilismo agudo por el que ha tenido que ser atendido/a médicamente	0,4	0,1	0,8	0,1	0,2
Problemas con la policía o con la ley	2,6	0,4	3,4	0,9	1,5

Nota: las prevalencias generales recogidas en esta tabla están calculadas sobre el total de la población.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

1.11. Causas de la disminución del consumo de alcohol

Tabla 28. Distribución de la población en función de las variaciones en el consumo de alcohol en los últimos 12 meses. 2017

	Número	Distribución sobre la población total
Nunca ha probado el alcohol	112.694	6,8
Ha probado pero no ha consumido en los últimos 12 meses	200.314	12,1
Ha probado y ha consumido en los últimos 12 meses:	1.349.216	81,2
-Bebe más que hace 1 año	54.074	3,3
-Bebe menos que hace 1 año	366.603	22,1
-Bebe lo mismo que hace un año	928.539	55,9
Total	1.662.224	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 29. Grado de influencia de diversas causas entre la población que en el momento actual declara beber menos que hace un año. 2017 (%)

	Nada	Poco	Bastante	Mucho	Total
Recomendación médica	79,2	5,9	9,5	5,4	100,0
Presiones o problemas en la familia	87,5	4,7	4,4	3,4	100,0
Presiones o problemas con los amigos	91,3	1,5	5,1	2,1	100,0
Noviazgo, matrimonio o convivencia en pareja	85,8	5,1	5,4	3,7	100,0
Embarazo	87,3	0,7	2,5	9,5	100,0
Crianza de los hijos e hijas	83,8	1,7	5,7	8,8	100,0
Comenzar a trabajar o cambiar de trabajo	86,4	4,4	5,5	3,8	100,0
Problemas de salud	76,4	8,2	8,9	6,6	100,0
Cambio de residencia	91,4	4,0	2,4	2,1	100,0
Problemas en el trabajo	90,3	3,9	1,9	3,9	100,0
Cambio de cuadrilla	91,0	3,2	3,6	2,2	100,0

*Las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 22,1% de la muestra. Recogen las declaraciones de aquellas personas que declaran beber menos que hace un año sobre el grado de influencia de diversas causas en esta reducción.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 30. Grado de influencia de diversas causas entre la población que en el momento actual declara beber menos que hace un año por sexo y grupos de edad. 2017 (% de las personas que declaran que esas causas han influido mucho o bastante)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Recomendación médica	16,8	12,4	9,3	17,5	14,9
Presiones o problemas en la familia	8,2	7,2	5,9	8,7	7,8
Presiones o problemas con los amigos	7,2	7,2	5,4	8,1	7,2
Noviazgo, matrimonio o convivencia en pareja	9,6	8,6	7,7	9,8	9,2
Embarazo	6,6	19,1	11,1	12,5	12,0
Crianza de los hijos e hijas	11,9	17,9	10,1	16,6	14,5
Comenzar a trabajar o cambiar de trabajo	9,6	8,8	11,1	8,4	9,2
Problemas de salud	16,7	13,8	9,1	18,5	15,5
Cambio de residencia	5,1	3,8	1,8	5,9	4,6
Problemas en el trabajo	6,9	4,4	1,0	8,0	5,8
Cambio de cuadrilla	5,5	6,1	4,5	6,4	5,8

*Las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 22,1% de la muestra. Recogen las declaraciones de aquellas personas que declaran beber menos que hace un año sobre el grado de influencia de diversas causas en esta reducción.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

1.12. Hábitos de consumo de alcohol entre la población de 15 a 34 años

Tabla 31. Distribución de la población de 15 a 34 años en función de los lugares de compra de bebidas alcohólicas. 2017 (%)

	No ha probado el alcohol	Ha probado el alcohol y suele comprar en este lugar	Ha probado el alcohol y no suele comprar en este lugar	NS/NC	Total
Bares	9,1	66,4	24,4	0,1	100,0
Discotecas	9,1	31,8	59,1	0,1	100,0
Supermercados	9,1	59,7	31,1	0,1	100,0
Otros comercios	9,1	18,4	72,4	0,1	100,0
De casa	9,1	9,0	81,9	0,1	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 32. Distribución de la población de 15 a 34 años en función de los lugares de compra de bebidas alcohólicas por sexo y grupos de edad. 2017 (% de personas que responden que compran en esos lugares)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-24	25-34	
Bares	67,6	65,2	58,0	73,5	66,4
Discotecas	35,0	28,5	37,0	27,4	31,8
Supermercados	60,8	58,6	61,5	58,2	59,7
Otros comercios	21,5	15,4	25,9	12,1	18,4
De casa	9,2	8,7	9,8	8,3	9,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 33. Distribución de la población de 15 a 34 años en función de los lugares de consumo de bebidas alcohólicas. 2017 (%)

	No ha probado el alcohol	Ha probado el alcohol y suele consumir en este lugar	Ha probado el alcohol y no suele consumir en este lugar	NS/NC	Total
Bares	9,1	76,9	14,0	0,1	100,0
Discotecas	9,1	36,7	54,2	0,1	100,0
Lonjas	9,1	19,8	71,0	0,1	100,0
Calle	9,1	33,0	57,9	0,0	100,0
Casa	9,1	35,2	55,7	0,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 34. Distribución de la población de 15 a 34 años en función de los lugares de consumo de bebidas alcohólicas por sexo y grupos de edad. 2017 (% de personas que responden que consumen en esos lugares)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-24	25-34	
Bares	79,1	74,5	68,9	83,5	76,9
Discotecas	41,4	31,9	43,5	30,9	36,7
Lonjas	23,7	15,9	29,0	12,0	19,8
Calle	34,7	31,3	50,4	18,3	33,0
Casa	37,0	33,4	22,6	45,8	35,2

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 35. Distribución de la población de 15 a 34 años en función de la frecuencia de botellón en la calle en los últimos 12 meses. 2017

	Número	Distribución sobre la población 15-34 años	Distribución sobre la población 15-34 años que ha probado el alcohol
Nunca ha probado el alcohol	36.425	9,1	--
Ha probado el alcohol:	364.649	90,9	100,0
-No ha hecho botellón	220.373	54,9	60,4
-Ha hecho entre 1 y 2 veces al año	86.367	21,5	23,7
-Ha hecho entre 1 y 2 veces al mes	50.732	12,6	13,9
-Ha hecho todas o casi todas las semanas	4.488	1,1	1,2
-NS/NC	2.689	0,7	0,7
Total	401.074	100,0	--

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 36. Distribución de la población de 15 a 34 años en función de la frecuencia de botellón en la calle en los últimos 12 meses por sexo y grupos de edad (%). 2017

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-24	25-34	
Nunca ha probado el alcohol	7,4	10,8	11,6	6,9	9,1
Ha probado el alcohol:	92,6	89,2	88,4	93,1	90,9
-No ha hecho botellón	53,2	56,7	31,7	74,5	54,9
-Ha hecho entre 1 y 2 veces al año	23,8	19,2	30,2	14,2	21,5
-Ha hecho entre 1 y 2 veces al mes	13,7	11,6	23,6	3,4	12,6
-Ha hecho todas o casi todas las semanas	1,5	0,7	2,2	0,2	1,1
-NS/NC	0,4	1,0	0,7	0,7	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nota: las proporciones recogidas en esta tabla están calculadas sobre la población total de 15 a 34 años.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 37. Evolución de la distribución de la población de 15 a 34 años en función de la frecuencia de botellón en la calle en los últimos 12 meses (%)

	2006	2008	2010	2012	2017
Nunca ha probado el alcohol	3,8	7,6	13,0	12,8	9,1
Ha probado el alcohol:	96,2	92,4	87,0	87,2	90,9
-No ha hecho botellón	57,6	52,7	50,3	47,2	54,9
-Ha hecho entre 1 y 2 veces al año	21,0	21,0	19,3	21,1	21,5
-Ha hecho entre 1 y 2 veces al mes	11,4	8,1	10,4	12,3	12,6
-Ha hecho todas o casi todas las semanas	5,0	5,1	3,7	5,1	1,1
-NS/NC	1,2	5,5	3,3	1,4	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

2. EL CONSUMO DE TABACO

2.1. Prevalencias generales de consumo de tabaco

Tabla 38. Prevalencias generales de consumo de tabaco por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Alguna vez en la vida	57,0	45,5	36,9	55,7	51,2
En los últimos 12 meses	--	--	--	--	--
En los últimos 30 días	28,2	21,1	24,2	24,8	24,6
A diario	25,6	18,6	19,9	22,8	22,1

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 39. Evolución de las prevalencias generales de consumo de tabaco (%)

	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Alguna vez en la vida	59,2	56,4	55,4	47,6	49,0	61,0	53,7	59,6	60,2	59,3	54,4	51,2
En los últimos 12 meses	--	--	--	--	--	--	--	--	38,2	36,1	31,2	--
En los últimos 30 días	38,8	38,9	35,2	34,4	35,0	36,9	35,0	35,6	35,2	33,5	29,3	24,6
A diario	--	--	--	--	28,6	--	30,3	30,9	32,6	31,3	25,5	22,1

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

2.2. Distribución de la población en relación con el tabaco

Tabla 40. Distribución de la población en relación al consumo de tabaco. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Consumo habitual	25,6	18,6	19,9	22,8	22,1
Consumo ocasional	2,6	2,6	4,3	2,0	2,6
Ha abandonado el consumo	28,8	24,3	12,6	31,0	26,5
Nunca ha probado	43,0	54,5	63,1	44,3	48,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 41. Evolución de la distribución de la población en relación al consumo de tabaco (%)

	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Consumo habitual					29,3	30,0	30,3	30,9	30,5	28,9	25,7	22,1
Consumo ocasional	38,8	38,9	35,2	34,4	5,7	6,9	4,7	4,6	5,3	5,2	5,5	2,6
Abandono	20,3	17,4	20,2	13,3	14,0	24,2	18,7	24,0	24,4	25,2	23,2	26,5
Nunca ha probado	40,8	43,6	44,6	52,4	51,0	39,0	46,3	40,4	39,8	40,7	45,6	48,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

2.3. Edad de inicio en el consumo de tabaco

Tabla 42. Distribución de la edad de inicio en el consumo de tabaco. 2017 (%)

	Número	Distribución sobre la población total	Distribución sobre la población que ha consumido alguna vez
Nunca ha probado el tabaco	811.405	48,8	--
Ha consumido alguna vez:	850.819	51,2	100,0
- Menos de 15 años	188.310	11,3	22,1
- Entre 15 y 16 años	311.102	18,7	36,6
- Entre 17 y 18 años	186.706	11,2	21,9
- Entre 19 y 20 años	83.378	5,0	9,8
- Entre 21 y 22 años	28.791	1,7	3,4
- 23 o más años	52.532	3,2	6,2
Total	1.662.224	100,0	--

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 43. Distribución de la edad de inicio en el consumo de tabaco entre la población que ha consumido tabaco alguna vez por sexo y edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Menos de 15 años	25,0	18,6	22,6	22,0	22,1
Entre 15 y 16 años	34,3	39,3	45,1	34,8	36,6
Entre 17 y 18 años	20,2	24,2	24,6	21,4	21,9
Entre 19 y 20 años	9,4	10,3	4,4	10,9	9,8
Entre 21 y 22 años	3,5	3,3	1,8	3,7	3,4
23 o más años	7,7	4,3	1,5	7,2	6,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nota: las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 51,2% de la muestra, que se corresponde con la proporción de la población que ha consumido tabaco alguna vez.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 44. Edad media de inicio en el consumo de tabaco por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Media	16,9	16,8	15,9	17,0	16,9
Mediana	16	16	16	16	16
Desviación típica	4,39	3,27	2,10	4,19	3,93

Nota: la edad de inicio se corresponde con la edad en la que se ha probado el tabaco por primera vez. Responden a esta pregunta el 51,2% de la muestra, que se corresponde con la proporción de la población que ha consumido tabaco alguna vez.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 45. Evolución de la distribución de la edad media de inicio en el consumo de tabaco entre la población que ha consumido tabaco alguna vez (%)

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Grupos										
Menos de 15 años	30,5	28,6	25,0	24,1	27,2	26,1	24,6	23,8	19,2	22,1
Entre 15 y 17 años	35,6	38,8	41,2	38,6	37,4	39,1	39,4	43,8	46,0	48,0
Entre 18 y 20 años	22,4	22,4	24,1	23,2	23,4	24,6	24,7	22,6	25,1	20,3
Con 21 o más años	10,2	10,2	9,7	14,0	12,0	10,1	11,4	9,8	9,7	9,6
NS/NC	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Media										
Edad media	16,8	16,7	16,9	17,5	16,9	16,9	17,0	16,8	17,0	16,9

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

2.4. Intensidad del consumo de tabaco

Tabla 46. Distribución del número de unidades* de tabaco consumidas por término medio al día entre la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días. 2017 (%)

	Número	Distribución sobre la población total	Distribución sobre la población que consume tabaco actualmente
Nunca ha probado el tabaco	811.405	48,8	--
Ha abandonado el consumo de tabaco	441.249	26,5	--
Consume tabaco actualmente:	409.569	24,6	100,0
-Hasta 5 unidades	137.323	8,3	33,5
-Entre 6 y 10 unidades	116.280	7,0	28,4
-Entre 11 y 15 unidades	59.139	3,6	14,4
-Entre 16 y 20 unidades	75.696	4,6	18,5
-Más de 20 unidades	21.132	1,3	5,2
Total	1.662.224	100,0	--

*En unidades se incluyen diversas modalidades de tabaco: el cigarrillo de cajetilla, el cigarrillo elaborado con tabaco de liar y el puro.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 47. Distribución del número de unidades* de tabaco consumidas por término medio al día entre la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días por sexo y edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Hasta 5 unidades	34,5	32,2	44,7	30,1	33,5
Entre 6 y 10 unidades	25,6	32,1	30,6	27,7	28,4
Entre 11 y 15 unidades	13,8	15,3	11,7	15,3	14,4
Entre 16 y 20 unidades	18,4	18,6	11,5	20,6	18,5
Más de 20 unidades	7,8	1,7	1,5	6,3	5,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nota: las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 24,6% de la muestra, que se corresponde con la proporción de la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 48. Evolución de la distribución del número de unidades* de tabaco consumidas por término medio al día entre la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días (%)

	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Hasta 10 unidades	36,7	39,6	39,4	44,7	48,5	52,3	50,7	52,0	51,1	56,8	57,4	61,9
Entre 11 y 20 unidades	40,6	36,5	40,4	37,1	34,1	36,1	36,8	38,5	38,3	36,0	37,5	32,9
Más de 20 unidades	19,6	23,9	20,1	18,2	17,4	11,6	12,5	9,5	9,1	7,2	5,1	5,2
NS/NC	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

2.5. Tipo de tabaco consumido

Tabla 49. Distribución del tipo de tabaco consumido entre la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días. 2017 (%)

	Fumador/a con consumo diario	Fumador/a con consumo ocasional	Total
Solo cigarrillos de paquete	71,6	75,5	72,0
Solo tabaco de liar	13,9	16,5	14,2
Solo puros	6,6	4,5	6,4
Cigarrillos de paquete y tabaco de liar	6,1	2,8	5,8
Otras combinaciones	1,8	0,6	1,7
Total	100,0	100,0	100,0

Nota: las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 24,6% de la muestra, que se corresponde con la proporción de la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 50. Distribución del tipo de tabaco consumido entre la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Solo cigarrillos de paquete	64,4	81,9	64,7	74,3	72,0
Solo tabaco de liar	13,7	14,7	25,1	10,8	14,2
Solo puros	10,8	0,6	0,7	8,2	6,4
Cigarrillos de paquete y tabaco de liar	8,1	2,7	7,8	5,1	5,8
Otras combinaciones	3,0	0,0	1,8	1,6	1,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nota: las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 24,6% de la muestra, que se corresponde con la proporción de la población que ha consumido tabaco en los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

2.6. Disposición e intención de abandono del consumo de tabaco

Tabla 51. Distribución de la población que consume tabaco a diario en función de su disposición e intento de abandono en los últimos 12 meses (%)

	Número	Distribución entre la población total	Distribución entre la población que consume tabaco a diario
Nunca ha probado el tabaco	811.405	48,8	--
Ha abandonado el consumo de tabaco	441.249	26,5	--
Consume tabaco ocasionalmente	42.518	2,6	--
Consume tabaco a diario:	367.051	22,1	100,0
– <i>Le gustaría dejar de fumar y lo ha intentado</i>	98.906	6,0	26,9
– <i>Le gustaría dejar de fumar pero no lo ha intentado</i>	186.883	11,2	50,9
– <i>No le gustaría dejar de fumar pero lo ha intentado</i>	3.945	0,2	1,1
– <i>No le gustaría dejar de fumar y no lo ha intentado</i>	77.316	4,7	21,1
Total	1.662.224	100,0	--

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

Tabla 52. Distribución de la población que consume tabaco a diario en función de su disposición e intento de abandono en los últimos 12 meses por sexo y grupos de edad (% verticales)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Le gustaría dejar de fumar y lo ha intentado	25,3	29,2	22,1	28,3	26,9
Le gustaría dejar de fumar pero no lo ha intentado	54,7	45,8	52,5	50,5	50,9
No le gustaría dejar de fumar pero lo ha intentado	0,4	1,9	1,9	0,8	1,1
No le gustaría dejar de fumar y no lo ha intentado	19,6	23,1	23,5	20,4	21,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*Las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 22,1% de la muestra, que se corresponde con la proporción de la población que consume tabaco a diario.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

2.7. Causas del abandono o disminución del consumo de tabaco

Tabla 53. Grado de influencia de diversas causas en el abandono del hábito tabáquico diario*. 2017 (%)

	Nada	Poco	Bastante	Mucho	Total
Recomendación del médico	66,0	6,9	14,5	12,6	100,0
Presión de la familia o de la pareja	71,9	12,6	10,8	4,6	100,0
Por miedo al cáncer u otras enfermedades	54,1	11,6	20,3	14,0	100,0
Embarazo	83,7	2,6	2,5	11,2	100,0
Crianza de los hijos e hijas	77,5	4,3	8,9	9,3	100,0
Tuve un problema de salud concreto	68,3	5,2	11,9	14,6	100,0
Por la imposibilidad de fumar en el trabajo	88,3	7,3	3,7	0,7	100,0
Porque me impedía hacer deporte	79,7	9,0	8,3	3,0	100,0
Por cambios en la normativa de tabaco	85,9	6,5	5,2	2,4	100,0
Por motivos económicos	80,6	8,4	8,3	2,7	100,0

*Las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 26,9% de la muestra. Recogen las declaraciones de aquellas personas que se encuentran en alguna de las siguientes tres situaciones: consumo diario de tabaco e intento de abandono en los últimos 12 meses (6,2%); sin consumo actual de tabaco pero con consumo diario en el pasado (19,1%); y consumo ocasional de tabaco y consumo diario en el pasado (1,6%).

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 54. Grado de influencia de diversas causas en el abandono del hábito tabáquico diario* por sexo y grupos de edad. 2017
(% de quienes responden que dichas causas han tenido bastante o mucho que ver)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Recomendación del médico	32,3	20,8	17,6	28,3	27,1
Presión de la familia o de la pareja	15,8	15,1	15,7	15,4	15,5
Por miedo al cáncer u otras enfermedades	35,9	32,4	44,4	32,9	34,3
Embarazo	4,7	24,3	12,3	13,8	13,7
Crianza de los hijos e hijas	15,4	21,6	13,2	18,9	18,2
Tuve un problema de salud concreto	28,7	24,0	24,4	26,8	26,5
Por la imposibilidad de fumar en el trabajo	2,0	7,2	4,4	4,4	4,4
Porque me impedía hacer deporte	13,3	9,0	16,0	10,7	11,3
Por cambios en la normativa de tabaco	5,7	9,8	6,8	7,7	7,6
Por motivos económicos	9,4	13,0	20,9	9,7	11,0

*Las respuestas expuestas en esta tabla están calculadas sobre el 26,9% de la muestra. Recogen las declaraciones de aquellas personas que se encuentran en alguna de las siguientes tres situaciones: consumo diario de tabaco e intento de abandono en los últimos 12 meses (6,2%); sin consumo actual de tabaco pero con consumo diario en el pasado (19,1%); y consumo ocasional de tabaco y consumo diario en el pasado (1,6%).

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 55. Evolución del grado de influencia de diversas causas en el abandono del hábito tabáquico
(% de quienes responden que dichas causas han tenido bastante o mucho que ver)

	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Recomendación del médico	17,5	19,1	18,1	21,5	26,1	27,1
Presión de la familia o de la pareja	9,7	14,4	11,2	19,2	26,1	15,5
Por miedo al cáncer u otras enfermedades	21,2	24,0	29,1	33,6	32,9	34,3
Embarazo	13,9	11,9	13,3	10,6	13,7	13,7
Tuve un problema de salud concreto	18,4	17,1	19,3	16,9	18,5	26,5
Por la imposibilidad de fumar en el trabajo	1,9	2,7	2,0	3,4	3,0	4,4
Porque me impedía hacer deporte	8,2	6,8	7,8	5,0	5,5	11,3
Por cambios en la normativa de tabaco	--	2,6	1,6	1,5	3,3	7,6

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

2.8. Consumo de cigarrillos electrónicos

Tabla 56. Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de cigarrillos electrónicos*. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Sí	6,9	5,1	9,3	5,0	6,0
No	93,1	94,9	90,7	95,0	94,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*¿Alguna vez en su vida ha fumado cigarrillos electrónicos (vapear)? No considere que lo ha hecho si lo único que hizo fue dar unas caladas al cigarrillo electrónico de otra persona.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

2.9. Exposición al humo del tabaco

Tabla 57. Exposición al humo del tabaco entre la población en función del consumo actual de tabaco. 2017 (%)

	Personas que han consumido en los últimos 30 días	Personas que no han consumido en los últimos 30 días	Población total
En su casa			
Todos los días	15,1	3,1	6,1
Con mucha frecuencia	4,2	2,6	3,0
De vez en cuando	7,9	4,6	5,4
Raras veces	6,5	6,2	6,3
Nunca	66,2	83,5	79,3
Total	100,0	100,0	100,0
En su lugar de trabajo o estudio			
Todos los días	5,5	1,9	2,8
Con mucha frecuencia	3,7	2,7	2,9
De vez en cuando	3,9	3,8	3,8
Raras veces	4,1	3,4	3,6
Nunca	82,9	88,2	86,9
Total	100,0	100,0	100,0
En el coche			
Todos los días	4,0	0,4	1,3
Con mucha frecuencia	4,1	2,0	2,5
De vez en cuando	9,1	2,7	4,2
Raras veces	6,9	4,7	5,3
Nunca	75,9	90,2	86,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

Tabla 58. Prevalencia de la exposición al humo de tabaco entre la población en función del consumo actual de tabaco, por sexo y grupos de edad. 2017 (% de personas expuestas con mucha frecuencia o todos los días)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Personas con consumo actual de tabaco					
En su casa	16,9	22,5	25,7	17,3	19,3
En su lugar de trabajo	9,4	9,0	17,1	6,8	9,2
En el coche	8,8	7,2	12,3	6,8	8,1
Personas sin consumo actual de tabaco					
En su casa	3,9	7,3	9,4	4,5	5,7
En su lugar de trabajo	4,9	4,2	6,9	3,8	4,5
En el coche	2,2	2,5	3,4	2,0	2,4
Población total					
En su casa	7,6	10,5	13,3	7,7	9,0
En su lugar de trabajo	6,2	5,2	9,4	4,5	5,7
En el coche	4,1	3,5	5,6	3,2	3,8

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

3. EL CONSUMO DE CANNABIS

3.1. Prevalencias generales de consumo de cannabis

Tabla 59. Prevalencias generales de consumo de cannabis por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Alguna vez en la vida	47,6	30,6	53,9	34,3	39,0
En los últimos 12 meses	11,7	5,4	21,1	4,6	8,6
En los últimos 30 días	7,4	2,4	11,9	2,6	4,9
A diario	3,3	0,7	3,7	1,4	2,0

Nota: se considera consumo diario el consumo realizado con una frecuencia de al menos cuatro días a la semana en los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 60. Evolución de las prevalencias generales de consumo de cannabis (%)

	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Alguna vez en la vida	22,9	22,6	28,6	24,4	26,8	27,6	31,7	36,2	33,8	34,2	28,3	39,0
En los últimos 12 meses	6,5	5,5	4,9	--	8,4	12,2	12,0	14,0	12,0	10,4	6,3	8,6
En los últimos 30 días	3,2	3,4	3,8	4,4	5,5	8,9	9,0	11,0	8,7	7,2	4,3	4,9
A diario	0,5	0,9	1,9	1,3	1,5	1,9	4,1	3,8	3,9	2,5	1,7	2,0

Nota: se considera consumo diario el consumo realizado con una frecuencia de al menos cuatro días a la semana en los últimos 30 días.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

3.2. Edad de inicio en el consumo de cannabis

Tabla 61. Edad de inicio en el consumo de cannabis por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Media	18,4	18,9	17,1	19,4	18,6
Mediana	18,0	18,0	17,0	18,0	18,0
Desviación típica	3,64	4,83	2,43	4,61	4,15

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 62. Evolución de la edad media de inicio en el consumo de cannabis

	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Edad media de inicio	--	18,8	--	--	19,1	18,8	18,0	18,4	19,2	18,8	18,6	18,6

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

3.3. Frecuencia de consumo de cannabis

Tabla 63. Frecuencia de consumo de cannabis entre la población total. 2017 (%)

	Distribución entre la población total	Distribución de la población que ha consumido en cada periodo
Consumo durante los últimos 12 meses		
Nunca ha probado el cannabis	61,0	--
Ha probado pero no ha consumido en el último año	30,5	--
Ha consumido en el último año	8,6	100,0
-1-5 días al año	3,4	39,9
-6-11 días al año	0,8	9,1
-1-3 días al mes	1,2	13,8
-1-3 días a la semana	1,1	12,3
-4-6 días a la semana	0,5	6,3
-A diario	1,6	18,5
Total	100,0	
Consumo durante los últimos 30 días		
Nunca ha probado el cannabis	61,0	--
Ha probado pero no ha consumido en el último año	30,5	--
Ha consumido en el último año pero no en el último mes	3,7	--
Ha consumido en el último mes	4,9	100,0
-1-3 días al mes	1,9	38,3
-1-3 días a la semana	1,0	21,5
-4-6 días a la semana	0,5	10,4
-A diario	1,4	29,8
Total	100,0	

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

Tabla 64. Frecuencia de consumo de cannabis entre la población total por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Consumo durante los últimos 12 meses					
No ha probado o no ha consumido en los últimos 12 meses	88,3	94,6	78,9	95,4	91,4
Ha consumido en el último año:	11,7	5,4	21,1	4,6	8,6
-Entre 1 y 11 días al año	5,1	3,3	11,3	2,0	4,2
-Entre 1 y 3 días al mes	1,6	0,8	3,3	0,5	1,2
-Entre 1 y 3 días a la semana	1,8	0,3	2,3	0,7	1,1
-Entre 4 y 7 días a la semana	3,3	1,0	4,3	1,4	2,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Consumo durante los últimos 30 días					
No ha probado o no ha consumido en el último mes	92,6	97,6	88,1	97,4	95,1
Ha consumido en el último mes:	7,4	2,4	11,9	2,6	4,9
-Entre 1 y 3 días al mes	2,4	1,3	5,4	0,7	1,9
-Entre 1 y 3 días a la semana	1,7	0,4	2,7	0,5	1,0
-Entre 4 y 7 días a la semana	3,3	0,7	3,7	1,4	2,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

3.4. Vía de obtención del cannabis

Tabla 65. Vías de obtención del cannabis entre las personas que lo han consumido en los últimos 12 meses. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Me la ofreció un amigo/a o conocido/a	4,5	2,3	4,2	2,6	6,8
Fui a una tienda especializada y la compré	0,4	0,0	0,3	0,1	0,4
La compré a través de un/a vendedor/a	1,6	0,4	1,1	0,9	2,0
La compré a través de internet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lo conseguí a través de una plantación propia	0,6	0,1	0,5	0,3	0,8
Lo conseguí a través de un club de cannabis	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
Otras vías de acceso	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
No contesta	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1

Nota: los porcentajes están calculados sobre el 8,6% de la muestra que afirma haber consumido cannabis en los últimos 12 meses. Se trata de una pregunta multirespuesta.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

4. CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS ILEGALES

4.1. Prevalencias generales de consumo de otras sustancias ilegales

Tabla 66. Prevalencias generales de consumo de otras sustancias ilegales. 2017 (%)

	Alguna vez en la vida	En los últimos 12 meses	En los últimos 30 días
Speed, anfetaminas	8,5	1,0	0,4
MDMA y similares, éxtasis	3,6	0,4	0,1
Ácido, LSD	3,2	0,1	0,0
Cocaína en polvo	9,0	1,4	0,4
Base, crack	0,4	0,0	0,0
Heroína	0,6	0,0	0,0
Otros opiáceos	0,5	0,1	0,1
Inhalables	0,4	0,0	0,0
Setas alucinógenas	3,5	0,1	0,0
Ketamina	0,6	0,0	0,0
Otras	0,0	0,0	0,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 67. Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de otras sustancias ilegales por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Speed, anfetaminas	12,4	4,6	9,4	8,2	8,5
MDMA y similares, éxtasis	5,9	1,4	5,1	3,2	3,6
Ácido, LSD	4,9	1,6	1,8	3,7	3,2
Cocaína en polvo	13,3	4,8	9,6	8,9	9,0
Base, crack	0,6	0,2	0,3	0,5	0,4
Heroína	0,8	0,5	0,1	0,8	0,6
Otros opiáceos	0,5	0,4	0,0	0,6	0,5
Inhalables	0,6	0,2	0,2	0,5	0,4
Setas alucinógenas	4,9	2,1	5,2	2,9	3,5
Ketamina	1,0	0,2	1,9	0,2	0,6
Otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 68. Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses de otras sustancias ilegales por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Speed, anfetaminas	1,4	0,6	1,6	0,8	1,0
MDMA y similares, éxtasis	0,6	0,3	0,9	0,3	0,4
Ácido, LSD	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1
Cocaína en polvo	2,4	0,3	2,7	0,9	1,4
Base, crack	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Heroína	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros opiáceos	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1
Inhalables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Setas alucinógenas	0,1	0,0	0,3	0,0	0,1
Ketamina	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0
Otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 69. Prevalencia de consumo en los últimos 30 días de otras sustancias ilegales por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Speed, anfetaminas	0,4	0,4	0,9	0,2	0,4
MDMA y similares, éxtasis	0,3	0,0	0,5	0,0	0,1
Ácido, LSD	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Cocaína en polvo	0,8	0,1	1,2	0,2	0,4
Base, crack	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Heroína	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros opiáceos	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1
Inhalables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Setas alucinógenas	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0
Ketamina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 70. Evolución de las prevalencias de consumo alguna vez en la vida de otras sustancias ilegales (%)

	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Speed, anfetaminas	3,5	4,1	4,4	5,1	5,8	7,9	11,1	8,8	8,6	6,8	6,5	8,5
MDMA y similares, éxtasis	--	1,0	2,0	2,4	2,4	3,5	4,5	2,6	3,3	2,3	2,2	3,6
Ácido, LSD	2,3	3,2	2,6	3,1	2,4	3,9	6,6	4,3	4,4	3,6	2,7	3,2
Cocaína en polvo	3,3	3,8	4,0	4,4	4,8	7,0	9,9	8,1	8,7	6,8	5,5	9,0
Base, crack	--	--	0,6	0,3	--	--	0,6	0,3	0,7	0,3	0,2	0,4
Heroína	0,7	1,0	0,8	0,9	0,5	1,1	0,9	1,0	1,0	0,5	0,7	0,6
Otros opiáceos	--	--	--	--	--	--	0,3	0,1	0,5	0,3	0,4	0,5
Inhalables	0,5	0,2	0,4	1,2	0,4	1,0	1,3	0,4	1,3	0,4	0,5	0,4
Setas alucinógenas	--	--	--	--	--	2,4	4,9	3,7	4,2	2,3	1,7	3,5
Ketamina	--	--	--	--	--	0,6	0,7	0,8	1,1	0,7	0,6	0,6

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

Tabla 71. Evolución de las prevalencias de consumo en los últimos 12 meses de otras sustancias ilegales (%)

	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Speed, anfetaminas	1,1	1,2	1,1	--	1,9	2,3	2,8	2,4	2,3	1,1	1,0	1,0
MDMA y similares, éxtasis	--	0,2	0,5	--	0,9	1,2	1,3	0,6	0,8	0,4	0,2	0,4
Ácido, LSD	0,6	0,5	0,4	--	0,3	0,4	1,0	0,9	0,4	0,5	0,1	0,1
Cocaína en polvo	0,9	0,8	0,6	--	2,0	1,9	3,4	2,6	2,6	1,6	0,6	1,4
Base, crack	--	--	0,0	--	--	--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Heroína	0,1	0,0	0,0	--	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Otros opiáceos	--	--	--	--	--	--	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Inhalables	0,2	0,0	0,0	--	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
Setas alucinógenas	--	--	--	--	--	--	1,1	0,5	0,4	0,3	0,1	0,1
Ketamina	--	--	--	--	--	--	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

Tabla 72. Evolución de las prevalencias de consumo en los últimos 30 días de otras sustancias ilegales (%)

	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Speed, anfetaminas	0,3	0,4	0,3	0,8	0,9	1,2	1,6	1,1	1,0	0,5	0,5	0,4
MDMA y similares, éxtasis	--	0,1	0,3	0,2	0,4	0,9	0,7	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Ácido, LSD	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,7	0,0	0,3	0,0	0,0
Cocaína en polvo	0,3	0,1	0,1	0,4	1,0	1,0	1,5	1,4	1,1	1,1	0,3	0,4
Base, crack	--	--	0,0	0,1	--	--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Heroína	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros opiáceos	--	--	--	--	--	--	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Inhalables	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Setas alucinógenas	--	--	--	--	--	--	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Ketamina	--	--	--	--	--	--	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

4.2. Edad de inicio en el consumo de otras sustancias ilegales

Tabla 73. Edad media del primer consumo de otras sustancias ilegales por sexo y grupos de edad. 2017

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Speed, anfetaminas					
Porcentaje que ha consumido alguna vez	12,4	4,6	9,4	8,2	8,5
Edad media	21,2	19,1	19,1	21,2	20,6
Edad mediana	20,0	18,0	19,0	20,0	20,0
MDMA y similares, éxtasis					
Porcentaje que ha consumido alguna vez	5,9	1,4	5,1	3,2	3,6
Edad media	21,1	22,1	20,2	21,9	21,3
Edad mediana	20,0	23,0	20,0	20,0	20,0
Ácido, LSD					
Porcentaje que ha consumido alguna vez	4,9	1,6	1,8	3,7	3,2
Edad media	20,3	18,5	18,9	20,0	19,9
Edad mediana	20,0	18,0	19,0	19,0	19,0
Cocaína en polvo					
Porcentaje que ha consumido alguna vez	13,3	4,8	9,6	8,9	9,0
Edad media	22,8	20,9	19,7	23,2	22,3
Edad mediana	21,0	20,0	19,0	22,0	20,0
Base, crack					
Porcentaje que ha consumido alguna vez	0,6	0,2	0,3	0,5	0,4
Edad media	25,1	28,5	23,0	26,6	26,0
Edad mediana	23,0	30,0	23,0	28,0	27,0
Heroína					
Porcentaje que ha consumido alguna vez	0,8	0,5	0,1	0,8	0,6
Edad media	26,2	20,0	26,0	24,0	24,0
Edad mediana	27,0	18,0	26,0	27,0	26,0
Otros opiáceos					
Porcentaje que ha consumido alguna vez	0,5	0,4	0,0	0,6	0,5
Edad media	29,0	39,0		33,3	33,3
Edad mediana	24,0	35,0		28,0	28,0
Inhalables					
Porcentaje que ha consumido alguna vez	0,6	0,2	0,2	0,5	0,4
Edad media	19,1	23,7	15,0	20,9	20,4
Edad mediana	20,0	16,0	15,0	20,0	20,0
Setas alucinógenas					
Porcentaje que ha consumido alguna vez	4,9	2,1	5,2	2,9	3,5
Edad media	21,7	22,2	20,3	22,7	21,8
Edad mediana	20,0	20,0	19,0	22,0	20,0
Ketamina	21,7	22,2	20,3	22,7	21,8
Porcentaje que ha consumido alguna vez	1,0	0,2	1,9	0,2	0,6
Edad media	22,4	23,3	20,0	31,4	22,6
Edad mediana	20,0	23,0	19,0	36,0	20,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

4.3. Consumo de sustancias vía inyectada

Tabla 74. Consumo de sustancias ilegales vía inyectada por sexo y grupos de edad. 2017

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Alguna vez en la vida	1,0	0,4	0,3	0,9	0,7
Últimos 12 meses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

5. CONSUMO DE PSICOFÁRMACOS

5.1. Prevalencias generales de consumo de psicofármacos

Tabla 75. Prevalencias generales de consumo de psicofármacos con y sin receta médica. 2017 (%)

	Alguna vez en la vida	En los últimos 12 meses	En los últimos 30 días
Tranquilizantes, sedantes o somníferos			
Con receta médica	26,0	13,7	9,4
Sin receta médica	2,3	0,9	0,4
Con o sin receta	27,2	14,3	9,7
Antidepresivos			
Con receta médica	9,7	5,2	3,9
Sin receta médica	0,2	0,1	0,0
Con o sin receta	9,8	5,3	3,9
Algún psicofármaco (tranquilizantes, sedantes, somníferos o antidepresivos)			
Con receta médica	27,6	14,7	10,1
Sin receta médica	2,4	1,0	0,4
Con o sin receta	28,7	15,4	10,4

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 76. Prevalencias generales de consumo de psicofármacos con y sin receta médica por sexo y grupos de edad. 2017

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Tranquilizantes, sedantes o somníferos con receta médica					
Alguna vez en la vida	19,6	32,3	11,5	30,6	26,0
En los últimos 12 meses	10,6	16,7	5,1	16,4	13,7
En los últimos 30 días	7,8	10,9	2,1	11,7	9,4
Tranquilizantes, sedantes o somníferos sin receta médica					
Alguna vez en la vida	1,3	3,2	2,6	2,2	2,3
En los últimos 12 meses	0,4	1,5	0,9	1,0	0,9
En los últimos 30 días	0,0	0,7	0,3	0,4	0,4
Tranquilizantes, sedantes o somníferos con o sin receta médica					
Alguna vez en la vida	20,1	34,1	12,6	31,8	27,2
En los últimos 12 meses	10,8	17,8	5,4	17,2	14,3
En los últimos 30 días	7,8	11,5	2,2	12,1	9,7
Antidepresivos con receta médica					
Alguna vez en la vida	5,7	13,7	4,2	11,5	9,7
En los últimos 12 meses	3,2	7,2	1,4	6,4	5,2
En los últimos 30 días	2,4	5,4	0,6	5,0	3,9
Antidepresivos sin receta médica					
Alguna vez en la vida	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
En los últimos 12 meses	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
En los últimos 30 días	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antidepresivos con o sin receta médica					
Alguna vez en la vida	5,7	13,9	4,3	11,6	9,8
En los últimos 12 meses	3,2	7,3	1,5	6,5	5,3
En los últimos 30 días	2,4	5,4	0,6	5,0	3,9
Algún psicofármaco con receta médica					
Alguna vez en la vida	20,4	34,7	13,1	32,2	27,6
En los últimos 12 meses	10,7	18,6	5,7	17,6	14,7
En los últimos 30 días	7,9	12,2	2,3	12,6	10,1
Algún psicofármaco sin receta médica					
Alguna vez en la vida	1,5	3,2	2,6	2,3	2,4
En los últimos 12 meses	0,4	1,5	1,0	1,0	1,0
En los últimos 30 días	0,0	0,7	0,3	0,4	0,4
Algún psicofármaco con o sin receta médica					
Alguna vez en la vida	20,8	36,5	14,2	33,4	28,7
En los últimos 12 meses	11,0	19,7	6,0	18,3	15,4
En los últimos 30 días	8,0	12,9	2,5	13,0	10,4

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

5.2. Edad del primer consumo de psicofármacos

Tabla 77. Edad media del primer consumo de psicofármacos por sexo y grupos de edad. 2017

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Tranquilizantes, sedantes o somníferos con receta médica					
Porcentaje que ha consumido alguna vez	19,6	32,3	11,5	30,6	26,0
Edad media	38,9	41,2	21,9	42,5	40,3
Edad mediana	40,0	40,0	22,0	41,0	40,0
Desviación típica	13,6	14,3	5,4	13,2	14,1
Tranquilizantes, sedantes o somníferos sin receta médica					
Porcentaje que ha consumido alguna vez	1,3	3,2	2,6	2,2	2,3
Edad media	39,8	40,5	22,2	42,4	40,3
Edad mediana	41,0	40,0	23,0	42,0	40,0
Desviación típica	12,3	13,4	5,1	12,1	13,1
Antidepresivos con receta médica					
Porcentaje que ha consumido alguna vez	5,7	13,7	4,2	11,5	9,7
Edad media	31,4	35,6	23,7	38,4	34,4
Edad mediana	29,0	33,0	23,0	39,0	31,0
Desviación típica	12,6	12,7	5,3	12,5	12,8
Antidepresivos sin receta médica	31,4	35,6	23,7	38,4	34,4
Porcentaje que ha consumido alguna vez	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Edad media	37,0	42,6	19,0	42,1	39,5
Edad mediana	37,0	37,0	19,0	37,0	37,0
Desviación típica	0,0	16,8	0,0	9,5	11,6

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

6. CONSUMO DE SUSTANCIAS DOPANTES

6.1. Prevalencias generales de consumo de sustancias dopantes

Tabla 78. Prevalencias generales de consumo de sustancias dopantes por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Alguna vez en la vida	4,1	1,5	3,5	2,6	2,8
En los últimos 12 meses	1,2	0,4	1,5	0,6	0,8
En los últimos 30 días	0,8	0,4	1,1	0,4	0,6

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 79. Evolución de las prevalencias generales de consumo de sustancias dopantes. 2017 (%)

	2012	2017
Alguna vez en la vida	0,79	2,8
En los últimos 12 meses	0,18	0,8
En los últimos 30 días	0,14	0,6

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

6.2. Edad de inicio del primer consumo de sustancias dopantes

Tabla 80. Edad media del primer consumo de sustancias dopantes por sexo y grupos de edad. 2017

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Porcentaje que ha consumido alguna vez	4,1	1,5	3,5	2,6	2,8
Edad media	20,1	18,8	18,2	20,4	19,7

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

7. JUEGO

7.1. Frecuencia de la práctica de distintos tipos de juego

Tabla 81. Frecuencia de la práctica de distintos tipos de juego en los últimos 12 meses. 2017 (%)

	Ninguna vez	Menos de una vez por semana	Una vez por semana o más	NS/NC	Total
Lotería, quinielas, primitiva, bono-loto	31,1	44,4	24,3	0,2	100,0
Juegos de cartas	97,0	1,9	1,1	0,1	100,0
Apuestas deportivas (no incluye quiniela)	92,6	5,6	1,7	0,1	100,0
Máquinas tragaperras	97,2	2,1	0,6	0,1	100,0
Juegos de casino (ruleta, Black Jack...)	98,8	1,1	0,1	0,1	100,0
Bingo	98,7	1,1	0,1	0,2	100,0
Otros	99,8	0,1	0,1	0,1	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 82. Frecuencia de la práctica de distintos tipos de juego en los últimos 12 meses por sexo y edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Han jugado en los últimos 12 meses					
Lotería, quinielas, primitiva, bono-loto	68,1	69,3	41,2	77,5	68,7
Juegos de cartas	4,1	1,7	4,1	2,5	2,9
Apuestas deportivas (no incluye quiniela)	13,8	0,9	16,4	4,4	7,3
Máquinas tragaperras	4,8	0,7	4,9	2,0	2,7
Juegos de casino (ruleta, Black Jack...)	2,0	0,3	4,3	0,2	1,2
Bingo	1,0	1,3	2,6	0,7	1,1
Otros	0,3	0,0	0,4	0,1	0,2
Han jugado en los últimos 12 meses con una frecuencia al menos semanal					
Lotería, quinielas, primitiva, bono-loto	28,8	19,9	8,9	29,2	24,3
Juegos de cartas	1,5	0,7	0,6	1,2	1,1
Apuestas deportivas (no incluye quiniela)	3,3	0,2	3,6	1,1	1,7
Máquinas tragaperras	1,2	0,0	1,1	0,4	0,6
Juegos de casino (ruleta, Black Jack...)	0,2	0,0	0,5	0,0	0,1
Bingo	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Otros	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 83. Evolución de la frecuencia de la práctica de distintos tipos de juego en los últimos 12 meses. 2017 (%)

	2012	2017
Han jugado en los últimos 12 meses		
Lotería, quinielas, primitiva, bono-loto	53,3	68,7
Juegos de cartas	3,2	2,9
Apuestas deportivas (no incluye quiniela)	1,6	7,3
Máquinas tragaperras	2,6	2,7
Juegos de casino (ruleta, Black Jack...)	1,7	1,2
Bingo	1,8	1,1
Otros	1,5	0,2
Han jugado en los últimos 12 meses con una frecuencia al menos semanal		
Lotería, quinielas, primitiva, bono-loto	21,7	24,3
Juegos de cartas	0,6	1,1
Apuestas deportivas (no incluye quiniela)	0,2	1,7
Máquinas tragaperras	0,5	0,6
Juegos de casino (ruleta, Black Jack...)	0,1	0,1
Bingo	0,1	0,1
Otros	0,3	0,1

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

7.2. Utilización de diferentes vías de acceso al juego

Tabla 84. Utilización de diferentes vías de acceso al juego entre la población total. 2017 (%)

	Ha acudido físicamente a establecimientos especializados en juegos de azar o apuestas o utilizar terminales de apuestas en bares u otros establecimientos hosteleros	Ha accedido mediante un dispositivo personal (móvil, ordenador, tablet, etc.) a páginas web o aplicaciones de juegos de azar o apuestas
Sí, ha utilizado en el último año	25,5	2,0
No, pero ha jugado en el último año a través de otras vías	46,1	69,6
No ha jugado en el último año	28,4	28,4
Total	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

7.3. Gasto en el último año y cantidad máxima gastada en prácticas de juego

Tabla 85. Gasto en el último año y cantidad máxima gastada en prácticas de juego. 2017 (%)

	Distribución de la población	Distribución de la población que ha jugado con dinero en los últimos 12 meses
Gasto en el último año		
No ha jugado con dinero en los últimos 12 meses	28,4	--
Menos de 100 euros	41,5	58,0
Entre 100 y 299 euros	20,2	28,1
Entre 300 y 499 euros	5,2	7,3
Entre 500 y 999 euros	3,4	4,7
1.000 o más euros	0,5	0,7
NS/NC	0,8	1,1
Total	100,0	100,0
Cantidad máxima gastada en un solo día		
No ha jugado con dinero en los últimos 12 meses	28,4	--
Menos de 6 euros	26,0	36,3
Entre 6 y 29 euros	32,1	44,9
Entre 30 y 59 euros	7,7	10,8
Entre 60 y 299 euros	4,7	6,6
300 o más euros	0,6	0,8
NS/NC	0,5	0,7
Total	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

Tabla 86. Gasto en el último año y cantidad máxima gastada en prácticas de juego por sexo y grupos de edad. 2017 (% sobre la población total)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Gasto en el último año					
No ha jugado en el último año	26,8	29,9	49,0	21,8	28,4
Ha gastado menos de 300 euros	58,9	64,5	46,6	66,5	61,7
Ha gastado entre 300 y 999 euros	12,6	4,6	3,5	10,2	8,6
Ha gastado 1.000 o más euros	0,8	0,3	0,3	0,6	0,5
NS/NC	0,9	0,8	0,6	0,9	0,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Cantidad máxima gastada en un solo día					
No ha jugado en el último año	54,8	61,4	43,7	62,7	58,1
Ha gastado menos de 30 euros	16,7	8,3	6,8	14,2	12,4
Ha gastado entre 30 y 299 euros	1,1	0,0	0,3	0,6	0,6
Ha gastado 300 o más euros	0,6	0,4	0,2	0,6	0,5
NS/NC	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Total	26,8	29,9	49,0	21,8	28,4

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

7.4. Prácticas de juego de riesgo y adicción

Tabla 87. Frecuencia de la práctica de distintos tipos de juego en los últimos 12 meses. 2017 (%)

	Sin juego activo	Con juego activo*					Total
		Nunca	A veces	La mayoría del tiempo	Casi siempre o siempre	NS/NC	
Ha apostado más dinero del que se podía permitir perder	73,7	25,4	0,7	0,1	0,0	0,1	100,0
Ha necesitado apostar cada vez más dinero para conseguir el mismo grado de excitación	73,7	25,8	0,3	0,1	0,0	0,1	100,0
Ha vuelto a jugar para recuperar el dinero que había perdido jugando	73,7	24,5	1,5	0,1	0,0	0,1	100,0
Ha vendido alguna cosa o ha tenido que pedir dinero prestado para poder jugar	73,7	25,9	0,2	0,0	0,0	0,1	100,0
Ha sentido alguna vez que quizá tiene un problema con el juego	73,7	25,7	0,5	0,0	0,0	0,1	100,0
Alguna vez el juego le ha causado problemas de salud, como estrés o angustia	73,7	25,8	0,3	0,0	0,0	0,1	100,0
La gente le ha criticado por apostar dinero o le han dicho que tiene un problema de juego	73,7	25,5	0,6	0,0	0,0	0,1	100,0
Sus hábitos de juego le han causado problemas económicos a usted o a alguien de su entorno	73,7	25,7	0,4	0,0	0,0	0,1	100,0
Se ha sentido culpable por sus hábitos de juego o por lo que le ocurre cuando juega	73,7	25,4	0,6	0,1	0,1	0,1	100,0

*Se considera práctica de juego activa si en el último año se ha apostado o jugado a algún juego al menos una vez por semana o si se ha gastado en el último año 500 o más euros en juego.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 88. Distribución de la población en función del nivel de riesgo en relación al juego. 2017 (%)

	Número	Distribución entre la población total	Distribución entre la población que es jugadora activa
Sin juego activo	1.225.318	73,7	
Con juego activo	436.906	26,3	100,0
-Sin riesgo	394.576	23,7	90,3
-Bajo riesgo	31.758	1,9	7,3
-Riesgo moderado	7.229	0,4	1,7
-Jugador/a excesivo/a	3.344	0,2	0,8
Total	1.662.224	100,0	

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

Tabla 89. Distribución de la población en función del nivel de riesgo en relación al juego por sexo y grupos de edad. 2017 (% sobre el conjunto de la población)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Sin juego activo	67,5	79,9	87,1	69,5	73,7
Con juego activo	32,5	20,1	12,9	30,5	26,3
-Sin riesgo	28,6	18,9	10,1	28,1	23,7
-Bajo riesgo	2,7	1,1	1,7	2,0	1,9
-Riesgo moderado	0,9	0,0	0,7	0,4	0,4
-Jugador/a excesivo/a	0,3	0,1	0,5	0,1	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 90. Evolución de la distribución de la población en función del nivel de riesgo en relación al juego. 2017 (%)

	2012	2017
Sin juego activo	77,4	73,7
Con juego activo	22,6	26,3
-Sin riesgo	19,8	23,7
-Bajo riesgo	2,4	1,9
-Riesgo moderado	0,1	0,4
-Jugador/a excesivo/a	0,3	0,2
Total	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

8. USO DE INTERNET

8.1. Frecuencia de uso de internet

Tabla 91. Frecuencia de uso de internet en los últimos 30 días por sexo y grupos de edad. 2017 (% sobre el conjunto de la población)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Día medio laborable (lunes a jueves)					
Nunca ha utilizado internet	13,9	15,9	3,2	18,6	14,9
No lo ha utilizado en los últimos 30 días	2,3	1,9	0,7	2,6	2,1
Media hora o menos	32,5	33,1	13,4	39,0	32,8
Alrededor de 1 hora	27,4	25,5	30,1	25,3	26,4
Alrededor de 2 a 3 horas	18,1	16,9	35,5	11,8	17,5
Alrededor de 4 a 5 horas	3,8	4,5	11,6	1,8	4,2
6 o más horas	2,1	2,1	5,6	1,0	2,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Día medio fin de semana (viernes a domingo)					
Nunca ha utilizado internet	13,9	15,9	3,2	18,6	14,9
No lo ha utilizado en los últimos 30 días	4,7	4,2	2,2	5,2	4,4
Media hora o menos	29,2	29,2	12,4	34,6	29,2
Alrededor de 1 hora	20,7	21,0	19,2	21,4	20,8
Alrededor de 2 a 3 horas	23,1	21,3	37,4	17,4	22,2
Alrededor de 4 a 5 horas	6,2	6,1	17,7	2,5	6,2
6 o más horas	2,2	2,2	8,0	0,4	2,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

8.2. Uso de riesgo o problemático de internet

Tabla 92. Distribución de distintos usos de riesgo de internet. 2017 (%)

	No ha utilizado internet en los últimos 12 meses	Ha utilizado internet en los últimos 12 meses			Total
		Sí	No	NS/NC	
Dedica más tiempo del que cree que debería a estar conectado a Internet con objetivos distintos a los de su trabajo o estudios	14,9	17,1	67,6	0,4	100,0
Piensa que se sentiría mal si redujera el tiempo que pasa en Internet	14,9	3,7	81,1	0,3	100,0
Se han quejado sus familiares de las horas que dedica a Internet	14,9	8,9	76,2	0,1	100,0
Le resulta duro permanecer alejado de Internet varios días seguidos	14,9	9,2	75,7	0,3	100,0
Se resienten sus relaciones por estar conectado a la Red	14,9	1,8	83,2	0,1	100,0
Existen contenidos o servicios de la Red a los que encuentra difícil resistirse	14,9	8,2	76,7	0,2	100,0
Tiene problemas para controlar el impulso de conectarse a la Red	14,9	2,9	82,1	0,2	100,0
Ha intentado, sin éxito, reducir su uso	14,9	3,1	81,9	0,1	100,0
Obtiene gran parte de su bienestar del hecho de estar conectado a la Red	14,9	6,0	78,6	0,5	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

Tabla 93. Prevalencia entre la población total de distintos usos de riesgo de internet por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Dedica más tiempo del que cree que debería a estar conectado a Internet con objetivos distintos a los de su trabajo o estudios	19,2	21,0	44,8	10,8	20,1
Piensa que se sentiría mal si redujera el tiempo que pasa en Internet	4,1	4,7	9,4	2,5	4,4
Se han quejado sus familiares de las horas que dedica a Internet	10,6	10,3	25,4	4,8	10,5
Le resulta duro permanecer alejado de Internet varios días seguidos	9,9	11,6	21,3	6,8	10,8
Se resienten sus relaciones por estar conectado a la Red	2,1	2,1	4,7	1,1	2,1
Existen contenidos o servicios de la Red a los que encuentra difícil resistirse	8,6	10,6	21,2	5,2	9,6
Tiene problemas para controlar el impulso de conectarse a la Red	2,7	4,0	8,5	1,4	3,4
Ha intentado, sin éxito, reducir su uso	2,7	4,6	9,9	1,3	3,7
Obtiene gran parte de su bienestar del hecho de estar conectado a la Red	7,0	7,2	15,0	4,1	7,1

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 94. Distribución de la población en función del nivel de riesgo en el uso de internet de acuerdo al test de Orman. 2017 (%)

	Número	Distribución entre la población total	Distribución entre la población que ha utilizado internet en los últimos 12 meses
No es usuaria de internet	247564	14,9	-
Sin problemas (0-3)	1330797	80,1	95,0
Con riesgo (4-6)	72020	4,3	4,3
Uso problemático (7-9)	11843	0,7	0,7
Total	1662224	100,0	100,0

Nota: El test de adicción a internet utilizado, diseñado por Orman en 1996, consiste en un instrumento compuesto por 9 ítems (los que se recogen en la tabla anterior) que permite diferenciar tres grupos de personas usuarias según la puntuación alcanzada.

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

Tabla 95. Evolución de la distribución de la población en función del nivel de riesgo en el uso de internet de acuerdo al test de Orman. (%)

	2012	2017
No es usuaria de internet	27,1	14,9
Sin problemas (0-3)	69,9	80,1
Con riesgo (4-6)	1,8	4,3
Uso problemático (7-9)	1,2	0,7
Total	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

9. PERCEPCIÓN SOCIAL RESPECTO AL CONSUMO DE DROGAS Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS

9.1. Valoración de la gravedad atribuida al consumo de sustancias y a la adicción al juego

Tabla 96. Valoración de la gravedad atribuida al consumo de diversas sustancias. 2017 (%)

	Nada grave	Algo grave	Bastante grave	Muy grave	NS/NC	Total
Alcohol	5,9	29,5	45,7	17,7	1,2	100,0
Tabaco	4,8	26,9	44,9	22,3	1,1	100,0
Cannabis	4,9	19,5	36,6	25,5	13,4	100,0
Otras drogas ilegales	4,8	16,8	25,0	34,6	18,8	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 97. Valoración de la gravedad atribuida a la adicción al juego. 2017 (%)

	Nada grave	Algo grave	Bastante grave	Muy grave	NS/NC	Total
Juego	7,2	29,4	33,3	20,5	9,6	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 98. Valoración de la gravedad atribuida al consumo de diversas sustancias y al problema de la adicción al juego por sexo y grupos de edad. 2017 (% de quienes responden bastante o muy grave)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Alcohol	55,9	70,7	55,9	65,7	63,3
Tabaco	62,5	71,8	67,8	67,0	67,2
Cannabis	58,1	66,1	60,0	62,8	62,1
Otras drogas ilegales	59,0	60,4	53,1	61,7	59,7
Juego	52,2	55,4	49,3	55,2	53,8

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 99. Evolución de la valoración de la gravedad atribuida al consumo de diversas sustancias (% de quienes responden bastante o muy grave)

	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Alcohol	93,0	93,4	88,9	76,9	70,8	61,8	58,3	58,8	64,8	56,5	53,2	63,3
Tabaco	--	--	--	69,2	59,5	51,8	68,7	63,0	66,5	63,4	57,8	67,2
Cannabis	--	--	--	--	--	--	63,6	62,7	71,9	67,9	61,0	62,1
Otras drogas ilegales	95,0	96,0	90,3	84,5	80,9	72,4	77,0	72,9	80,0	74,5	68,5	59,7
Juego	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,6	53,8

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

9.2. Percepción sobre la evolución del consumo de diversas sustancias en los últimos años

Tabla 100. Percepción sobre la evolución del consumo de diversas sustancias en los últimos años. 2017 (%)

	Ha aumentado	Sigue igual	Ha disminuido	NS/NC	Total
Alcohol	48,7	38,2	8,5	4,7	100,0
Tabaco	21,9	24,7	50,6	2,8	100,0
Cannabis	43,6	30,4	4,5	21,5	100,0
Cocaína	34,8	23,4	6,6	35,2	100,0
Heroína	13,9	14,7	31,7	39,6	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 101. Percepción sobre la evolución del consumo de diversas sustancias en los últimos años por sexo y grupos de edad. 2017 (% de quienes responden que ha aumentado)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Alcohol	40,9	56,4	55,6	46,5	48,7
Tabaco	20,4	23,5	34,0	18,1	21,9
Cannabis	40,9	46,2	46,3	42,7	43,6
Cocaína	32,3	37,2	37,1	34,0	34,8
Heroína	12,7	15,1	13,1	14,2	13,9

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 102. Evolución de la percepción sobre la evolución del consumo de diversas sustancias en los últimos años (% de quienes responden que ha aumentado)

	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Alcohol	62,2	58,1	55,2	47,4	43,9	48,7
Tabaco	52,7	46,5	35,0	28,1	23,4	21,9
Cannabis	63,1	60,4	61,0	48,0	33,3	43,6
Cocaína	60,0	55,4	60,0	37,6	27,5	34,8
Heroína	18,1	12,5	21,2	25,9	21,7	13,9

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

9.3. Opinión sobre los problemas que acarrear diversas pautas de consumo de sustancias y diversas prácticas

Tabla 103. Opinión sobre los problemas que acarrear diversas pautas de consumo de sustancias y diversas prácticas. 2017 (%)

	Ninguno	Pocos	Bastantes	Muchos	NS/NC	Total
Fumar 5 cigarrillos al día	7,8	41,5	37,3	13,0	0,5	100,0
Fumar un paquete diario de tabaco	0,2	1,9	30,1	67,6	0,1	100,0
Tomarse 5 o 6 cañas o copas el fin de semana	13,2	51,4	25,0	9,5	0,8	100,0
Tomarse 5 o 6 cañas o copas cada día	0,5	4,9	35,2	58,9	0,4	100,0
Tomarse 1 o 2 cañas o copas cada día	10,4	46,5	30,7	11,8	0,7	100,0
Fumar cannabis una vez o menos al mes	14,9	40,7	21,2	14,5	8,7	100,0
Fumar cannabis una vez por semana o más	6,0	20,9	32,3	32,5	8,3	100,0
Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos una vez o menos al mes	15,7	41,8	21,1	12,2	9,2	100,0
Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos de una a tres veces por semana	5,5	21,1	40,2	25,0	8,2	100,0
Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos a diario o casi a diario	3,7	6,8	20,1	62,2	7,3	100,0
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	1,3	9,2	24,9	56,8	7,7	100,0
Consumir cocaína una vez o menos al mes	1,5	8,6	25,5	58,5	5,8	100,0
Consumir heroína una vez o menos al mes	0,7	4,3	22,2	67,1	5,7	100,0
Consumir alucinógenos (ácidos, tripis, LSD) una vez o menos al mes	0,9	5,4	21,9	65,5	6,4	100,0
Jugar a juegos de azar o apuestas con una frecuencia al menos semanal o gastar más de 700 euros al año en esta actividad	5,2	18,7	35,9	38,6	1,7	100,0
Emplear más de 3 horas diarias a actividades que requieran el uso de internet sin considerar el tiempo empleado en tareas escolares o laborales	5,1	21,3	44,7	27,0	2,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 104. Opinión sobre los problemas que acarrear diversas pautas de consumo de sustancias y diversas prácticas por sexo y edad. 2017 (% de quienes responden pocos o ningún problema)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Fumar 5 cigarrillos al día	54,3	44,3	40,2	52,2	49,3
Fumar un paquete diario de tabaco	2,6	1,8	2,5	2,1	2,2
Tomarse 5 o 6 cañas o copas el fin de semana	70,7	58,6	68,4	63,4	64,6
Tomarse 5 o 6 cañas o copas cada día	7,7	3,3	4,5	5,8	5,5
Tomarse 1 o 2 cañas o copas cada día	65,9	48,0	54,8	57,5	56,9
Fumar cannabis una vez o menos al mes	62,3	49,0	71,3	50,6	55,6
Fumar cannabis una vez por semana o más	33,1	20,8	35,3	24,2	26,9
Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos una vez o menos al mes	56,2	58,7	53,1	58,8	57,4
Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos de una a tres veces por semana	25,8	27,5	18,5	29,3	26,7
Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos a diario o casi a diario	9,0	11,8	4,7	12,3	10,4
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	13,5	7,5	14,9	9,1	10,5
Consumir cocaína una vez o menos al mes	13,7	6,5	14,8	8,6	10,1
Consumir heroína una vez o menos al mes	7,1	2,9	8,4	3,9	5,0
Consumir alucinógenos (ácidos, tripis, LSD) una vez o menos al mes	8,7	3,7	10,4	4,9	6,2
Jugar a juegos de azar o apuestas con una frecuencia al menos semanal o gastar más de 700 euros al año en esta actividad	28,3	19,5	17,5	25,9	23,9
Emplear más de 3 horas diarias a actividades que requieran el uso de internet sin considerar el tiempo empleado en tareas escolares o laborales	32,4	20,5	39,0	22,4	26,4

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 105. Evolución de la opinión sobre los problemas que acarrear diversas pautas de consumo de sustancias (% de quienes responden pocos o ningún problema)

	2006	2008	2010	2012	2017
Fumar un paquete diario de tabaco	11,2	12,6	7,7	10,7	2,2
Tomarse 5 o 6 cañas o copas el fin de semana	65,5	66,9	60,3	59,5	64,6
Tomarse 5 o 6 cañas o copas cada día	12,6	15,7	10,1	8,4	5,5
Fumar cannabis una vez o menos al mes	58,5	60,1	52,3	52,7	55,6
Fumar cannabis una vez por semana o más	36,1	35,9	27,4	25,7	26,9
Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos una vez o menos al mes	58,1	58,1	55,5	57,5	57,4
Tomar tranquilizantes, sedantes o somníferos de una a tres veces por semana	31,1	30,8	30,6	25,5	26,7
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	12,5	16,9	13,5	15,2	10,5
Consumir cocaína una vez o menos al mes	3,1	3,3	4,4	2,5	10,5
Consumir heroína una vez o menos al mes	10,3	13,8	10,1	13,2	5,0
Consumir alucinógenos (ácidos, tripis, LSD) una vez o menos al mes	2,3	2,6	4,0	1,8	6,2

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

9.4. Accesibilidad de diversas sustancias

Tabla 106. Grado de dificultad percibido para obtener en un plazo de 24 horas diversas sustancias. 2017 (%)

	Prácticamente imposible	Difícil	Relativamente fácil	Muy fácil	NS/NC	Total
Cannabis	29,9	13,8	22,8	28,8	4,7	100,0
Heroína	54,5	23,2	8,5	4,8	9,0	100,0
Cocaína	45,1	17,4	19,2	11,3	6,9	100,0
Alucinógenos (LSD, ácido, tripis)	49,1	22,5	13,5	6,8	8,1	100,0
Anfetaminas o speed	45,3	17,4	19,0	10,5	7,8	100,0
MDMA y similares, éxtasis, pastillas	47,1	20,3	15,9	8,2	8,5	100,0
Psicofármacos sin receta médica	42,3	24,2	14,3	10,1	9,2	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 107. Grado de dificultad percibido para obtener en un plazo de 24 horas diversas sustancias por sexo y grupos de edad. 2017 (% de quienes responden relativamente fácil o muy fácil)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Cannabis	56,2	47,0	73,7	44,5	51,6
Heroína	12,5	14,2	14,4	13,0	13,4
Cocaína	31,5	29,6	42,7	26,7	30,5
Alucinógenos (LSD, ácido, tripis)	21,0	19,6	24,6	18,9	20,3
Anfetaminas o speed	30,8	28,2	39,7	26,3	29,5
MDMA y similares, éxtasis, pastillas	25,2	23,0	33,3	21,2	24,1
Psicofármacos sin receta médica	23,5	25,3	25,7	24,0	24,4

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 108. Evolución del grado de dificultad percibido para obtener en un plazo de 24 horas diversas sustancias (% de quienes responden relativamente fácil o muy fácil)

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Cannabis	72,0	51,4	57,3	68,8	60,1	67,4	73,1	72,6	68,9	51,6
Heroína	56,9	29,6	28,1	38,7	29,5	34,6	39,2	37,2	34,5	13,4
Cocaína	58,9	33,0	34,6	47,0	44,3	43,8	52,9	49,0	45,8	30,5
Alucinógenos (LSD, ácido, tripis)	--	--	--	--	40,2	39,2	46,1	42,3	39,7	20,3
Anfetaminas o speed	--	--	--	--	49,0	44,7	53,1	47,2	44,5	29,5
MDMA y similares, éxtasis, pastillas	--	38,8	43,0	56,8	48,0	43,1	51,0	45,5	41,4	24,1

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

9.5. Cercanía a personas consumidoras y/o con problemas con las drogas

Tabla 109. Cercanía a personas consumidoras y/o con problemas con las drogas. 2017 (%)

	No conoce a nadie	Conoce a una persona	Conoce a más de una persona	Conoce a bastantes personas	NS/NC	Total
Alguien que consuma drogas ilegales	36,9	6,1	30,9	25,9	0,2	100,0
Alguien que tenga problemas con el alcohol	46,4	12,5	31,1	9,9	0,1	100,0
Alguien que tenga problemas con la cocaína	73,5	5,0	15,3	4,4	1,7	100,0
Alguien que tenga problemas con la heroína	90,7	2,4	3,8	1,4	1,7	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 110. Cercanía a personas consumidoras y/o con problemas con las drogas por sexo y grupos de edad. 2017 (% de quienes responden a más de una o a bastantes personas)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Alguien que consuma drogas ilegales	61,4	52,4	56,8	79,2	49,8
Alguien que tenga problemas con el alcohol	42,5	39,3	40,9	36,4	42,3
Alguien que tenga problemas con la cocaína	21,1	18,5	19,8	24,1	18,4
Alguien que tenga problemas con la heroína	5,4	5,0	5,2	2,9	5,9

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 111. Evolución de la cercanía a personas consumidoras y/o con problemas con las drogas (% de quienes responden a más de una o a bastantes personas)

	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Alguien que consuma drogas ilegales	54,9	49,4	45,7	44,6	38,9	49,8
Alguien que tenga problemas con el alcohol	--	--	44,6	42,7	36,3	42,3
Alguien que tenga problemas con la cocaína	--	--	21,1	20,0	14,9	18,4
Alguien que tenga problemas con la heroína	--	--	10,5	9,5	6,1	5,9

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.

9.6. Conocimiento y valoración de la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias de 2016

Tabla 112. Distribución de la población total en función del conocimiento y valoración de la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. 2017 (%)

	Número	% sobre la población total	% sobre la población que conoce la Ley
No conoce o no ha oído hablar de la Ley	1.352.674	81,4	
Conoce o ha oído hablar de la Ley	309.550	18,6	100,0
-Muy buena	28.325	1,7	9,2
-Buena	106.953	6,4	34,6
-Regular	33.162	2,0	10,7
-Mala	12.639	0,8	4,1
-Muy mala	531	0,0	0,2
-No sabe	127.940	7,7	41,3
Total	1.662.224	100,0	537,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 113. Distribución de la población total en función del conocimiento y valoración de la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
No conoce o no ha oído hablar de la Ley	82,6	80,2	88,9	79,0	81,4
Conoce o ha oído hablar de la Ley	17,4	19,8	11,1	21,0	18,6
-Muy buena o buena	8,0	8,2	6,0	8,8	8,1
-Regular	1,4	2,6	0,9	2,3	2,0
-Mala o muy mala	1,2	0,4	0,8	0,8	0,8
-No sabe	6,9	8,5	3,4	9,1	7,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 114. Distribución de la valoración de la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencia entre las personas que afirman conocerla por sexo y grupos de edad. 2017 (%)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Muy buena o buena	46,2	41,6	54,1	41,9	43,7
Regular	7,9	13,2	8,2	11,1	10,7
Mala o muy mala	6,6	2,2	7,2	3,8	4,3
No sabe	39,3	43,1	30,4	43,2	41,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

9.7. Valoración de ciertas medidas y actuaciones en materia de drogodependencias

Tabla 115. Grado de acuerdo con diversas medidas en materia de drogodependencias. 2017 (%)

	Muy de acuerdo	Bastante de acuerdo	Bastante en desacuerdo	Muy en desacuerdo	NS/NC	Total
Legalizar la venta de cannabis, prohibiendo la venta a menores de edad	19,0	33,6	19,8	23,5	4,1	100,0
Legalizar la venta de todas las drogas, tal y como están ahora el alcohol o el tabaco	4,1	10,0	24,6	58,6	2,7	100,0
Prohibir totalmente la publicidad de alcohol y tabaco	43,9	30,1	16,8	6,8	2,5	100,0
Permitir el uso terapéutico del cannabis en el tratamiento del cáncer u otras enfermedades	63,3	26,1	3,3	3,2	4,1	100,0
Administrar médicamente heroína a los consumidores/as que hayan fracasado en otros tratamientos	15,8	25,4	19,1	21,7	18,0	100,0
Abrir locales donde las personas con drogodependencias puedan consumir en condiciones mínimas de higiene	21,0	34,8	17,8	20,9	5,5	100,0
Permitir el cultivo de cannabis para el autoconsumo	19,2	32,3	21,4	22,8	4,3	100,0
Informar sobre cómo consumir drogas sin que perjudique	40,1	31,2	12,7	11,7	4,3	100,0
Regular los clubes de cannabis para que aquellas personas mayores de edad que deseen consumir cannabis puedan hacerlo de forma legal	27,1	33,0	16,9	17,9	5,1	100,0
Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo en terrazas, veladores o actividades y eventos que cuenten con autorización.	33,5	30,6	17,4	15,8	2,6	100,0
Prohibir fumar dentro del coche cuando viajen menores	76,2	15,8	3,9	3,3	0,9	100,0

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 116. Grado de acuerdo con diversas medidas en materia de drogodependencias por sexo y grupos de edad. 2017 (% de quienes responden muy o bastante de acuerdo)

	Sexo		Grupos de edad		Total
	Hombre	Mujer	15-34	35-74	
Legalizar la venta de cannabis, prohibiendo la venta a menores de edad	56,1	49,0	52,6	55,2	51,7
Legalizar la venta de todas las drogas, tal y como están ahora el alcohol o el tabaco	14,7	13,5	14,1	10,8	15,2
Prohibir totalmente la publicidad de alcohol y tabaco	73,6	74,3	73,9	67,7	75,9
Permitir el uso terapéutico del cannabis en el tratamiento del cáncer u otras enfermedades	88,6	90,2	89,4	89,7	89,3
Administrar médicamente heroína a los consumidores/as que hayan fracasado en otros tratamientos	40,8	41,5	41,2	35,0	43,1
Abrir locales donde las personas con drogodependencias puedan consumir en condiciones mínimas de higiene	55,5	56,1	55,8	49,3	57,9
Permitir el cultivo de cannabis para el autoconsumo	56,2	46,9	51,5	60,8	48,6
Informar sobre cómo consumir drogas sin que perjudique	70,6	72,1	71,3	76,8	69,6
Regular los clubes de cannabis para que aquellas personas mayores de edad que deseen consumir cannabis puedan hacerlo de forma legal	66,4	53,8	60,1	65,0	58,5
Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo en terrazas, veladores o actividades y eventos que cuenten con autorización.	59,4	68,9	64,2	49,6	68,8
Prohibir fumar dentro del coche cuando viajen menores	91,4	92,5	92,0	90,5	92,4

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV 2017.

Tabla 117. Evolución del grado de acuerdo con diversas medidas en materia de drogodependencias (% de quienes responden muy o bastante de acuerdo)

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2017
Legalizar la venta de cannabis, prohibiendo la venta a menores de edad	35,9	--	58,0	52,4	51,1	48,9	47,2	51,7
Legalizar la venta de todas las drogas, tal y como están ahora el alcohol o el tabaco	24,8	--	29,9	21,1	24,9	20,0	21,0	15,2
Prohibir totalmente la publicidad de alcohol y tabaco	--	56,9	65,9	56,4	61,0	62,1	59,9	75,9
Permitir el uso terapéutico del cannabis en el tratamiento del cáncer u otras enfermedades	--	77,3	89,9	91,1	89,2	89,2	82,2	89,3
Administrar médicamente heroína a los consumidores/as que hayan fracasado en otros tratamientos	--	--	--	60,0	65,4	57,4	50,3	43,1
Abrir locales donde las personas con drogodependencias puedan consumir en condiciones mínimas de higiene	--	63,5	80,3	64,4	72,4	63,4	54,1	57,9
Permitir el cultivo de cannabis para el autoconsumo	--	38,1	54,4	46,5	54,9	54,7	52,1	48,6
Informar sobre cómo consumir drogas sin que perjudique	--	83,6	88,0	68,7	72,2	65,7	68,3	69,6

Fuente: Encuesta sobre Adicciones en la CAPV.