



EUSKADI Y DROGAS 2006



ANEXOS



ÍNDICE

Anexo I.	El consumo de alcohol en la CAPV	3
Anexo II.	El consumo de tabaco en la CAPV	33
Anexo III.	El consumo de cannabis en la CAPV	48
Anexo IV.	Consumo de psicofármacos. Tranquilizantes, somníferos y antidepresivos	52
Anexo V.	El consumo de drogas ilegales en la CAPV.....	57
Anexo VI.	Percepción social respecto al consumo de drogas y valoración de las actuaciones en materia de drogodependencias.....	77

**ANEXO I.
EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA CAPV**

A. Indicadores de consumo por características individuales

Tabla A.1. Prevalencia del uso de alcohol alguna vez en la vida por características personales (%)

		%
Género	Hombre	98,2
	Mujer	91,3
Edad	15-19 años	92,3
	20-24 años	97,3
	25-29 años	97,5
	30-34 años	96,2
	35-44 años	95,6
	45-54 años	96,3
	55-64 años	93,5
	65-74 años	88,7
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	96,9
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	96,7
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	96,9
	Clase V. Trabajadores no cualificados	93,4
	NS/NC	84,5
T.H.	Araba	95,8
	Bizkaia	93,9
	Gipuzkoa	95,8
Tamaño municipio	Menos de 10.000	96,7
	De 10.001 a 40.000 hab.	96,6
	De 40.001 a 150.000 hab.	93,3
	Capitales	92,8
Actividad	Trabaja	97,6
	En paro	97,9
	Amo o ama de casa	85,1
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	95,3
	Estudiante	94,6
Policonsumo	Fumador habitual	97,9
	Cannabis al menos semanal	99,7
	Droga ilegal último año -excluido cannabis-	99,4
Total		94,8

Tabla A.2. Prevalencia del consumo en el último año de acuerdo a las características personales (%)

		%
Edad	15-19 años	86,0
	20-24 años	92,6
	25-29 años	90,2
	30-34 años	87,1
	35-44 años	85,3
	45-54 años	84,9
	55-64 años	77,0
	65-74 años	69,7
Género	Hombre	89,3
	Mujer	77,5
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	85,8
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	87,6
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	87,4
	Clase V. Trabajadores no cualificados	80,9
	NS/NC	65,6
Edad inicio	De 6 a 14 años	90,1
	De 15 a 16 años	93,3
	De 17 a 18 años	87,6
	De 19 a 20 años	75,7
	21 ó más años	80,6
	NS/NC	64,8
T.H.	Araba	85,7
	Bizkaia	80,4
	Gipuzkoa	87,2
Tamaño del municipio	Menos de 10.000	85,3
	De 10.001 a 40.000 hab.	86,5
	De 40.001 a 150.000 hab.	79,2
	Capitales	81,7
Actividad	Trabaja	89,7
	En paro	79,3
	Amo o ama de casa	67,1
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	77,7
	Estudiante	90,3
Policonsumo	Fumador habitual	86,9
	Cannabis al menos semanal	96,5
	Droga ilegal último año -excluido cannabis-	96,0
Total		83,4

Tabla A.3. Prevalencia del consumo de alcohol en el último mes de acuerdo a las características personales (%)

		%
Edad	15-19 años	75,6
	20-24 años	84,5
	25-29 años	81,5
	30-34 años	76,3
	35-44 años	75,4
	45-54 años	75,4
	55-64 años	66,3
	65-74 años	61,3
Género	Hombre	82,9
	Mujer	64,7
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	76,4
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	78,5
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	78,9
	Clase V. Trabajadores no cualificados	70,7
	NS/NC	52,4
Edad inicio	De 6 a 14 años	83,5
	De 15 a 16 años	85,2
	De 17 a 18 años	76,3
	De 19 a 20 años	64,4
	21 ó más años	60,5
	NS/NC	45,9
T.H.	Araba	82,8
	Bizkaia	68,3
	Gipuzkoa	78,7
Tamaño del municipio	Menos de 10.000	79,7
	De 10.001 a 40.000 hab.	73,4
	De 40.001 a 150.000 hab.	71
	Capitales	72,1
Actividad	Trabaja	82,1
	En paro	65,9
	Amo o ama de casa	51,9
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	69,5
	Estudiante	79,8
Policonsumo	Fumador habitual	79,1
	Cannabis al menos semanal	93,2
	Droga ilegal último año -excluido cannabis-	92,9
Total		73,8

Tabla A.4. Proporción de personas que se iniciaron en el consumo de alcohol antes de los 14 años por características personales (% de la población)

		%
Edad	15-19 años	39,2
	20-24 años	23,7
	25-29 años	26,8
	30-34 años	19,5
	35-44 años	18,3
	45-54 años	16,4
	55-64 años	10,8
	65-74 años	8,3
Género	Hombre	23,2
	Mujer	13,2
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	23,5
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	14,2
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	21,2
	Clase V. Trabajadores no cualificados	12,6
	NS/NC	12,2
Edad inicio	De 6 a 14 años	18,3
	De 15 a 16 años	17,7
	De 17 a 18 años	19,1
	De 19 a 20 años	20,6
	21 ó más años	19,6
	NS/NC	14,5
T.H.	Araba	17,6
	Bizkaia	21,4
	Gipuzkoa	26,2
Tamaño del municipio	Menos de 10.000	6,0
	De 10.001 a 40.000 hab.	11,4
	De 40.001 a 150.000 hab.	29,8
	Capitales	21,3
Actividad	Trabaja	39,9
	En paro	44,1
	Amo o ama de casa	39,2
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	23,7
	Estudiante	26,8
Policonsumo	Fumador habitual	19,5
	Cannabis al menos semanal	18,3
	Droga ilegal último año -excluido cannabis-	16,4
Total		73,8

Tabla A.5. Edad media de inicio en el consumo de alcohol de acuerdo a las características personales (años de edad)

		Edad media
Edad	15-19 años	14,6
	20-24 años	15,7
	25-29 años	15,6
	30-34 años	16,0
	35-44 años	16,6
	45-54 años	17,0
	55-64 años	18,5
	65-74 años	18,9
Género	Hombre	16,1
	Mujer	17,7
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	16,3
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	16,9
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	16,5
	Clase V. Trabajadores no cualificados	17,2
	NS/NC	18,5
T.H.	Araba	16,8
	Bizkaia	16,9
	Gipuzkoa	16,7
Tamaño del municipio	Menos de 10.000	16,7
	De 10.001 a 40.000 hab.	16,7
	De 40.001 a 150.000 hab.	16,9
	Capitales	17,1
Actividad	Trabaja	16,3
	En paro	16,1
	Amo o ama de casa	19,3
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	17,7
	Estudiante	15,1
Policonsumo	Fumador habitual	16,5
	Cannabis al menos semanal	15,0
	Droga ilegal último año -excluido cannabis-	14,9

Tabla A.6. Prevalencia del consumo diario o casi diario de alcohol en el último año de acuerdo con las características personales (% horizontales)

		%
Edad	15-19 años	0,3
	20-24 años	3,7
	25-29 años	6
	30-34 años	9,7
	35-44 años	18,9
	45-54 años	31,9
	55-64 años	42,2
	65-74 años	41,3
Género	Hombre	29,5
	Mujer	15,5
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	16,7
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	26,4
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	24
	Clase V. Trabajadores no cualificados	20,7
	NS/NC	25,8
Edad inicio	De 6 a 14 años	21,3
	De 15 a 16 años	21,6
	De 17 a 18 años	24,7
	De 19 a 20 años	23,1
	21 ó más años	25,2
	NS/NC	20
T.H.	Araba	31,4
	Bizkaia	19,4
	Gipuzkoa	24,4
Tamaño del municipio	Menos de 10.000	25,3
	De 10.001 a 40.000 hab.	21,9
	De 40.001 a 150.000 hab.	22
	Capitales	22,4
Actividad	Trabaja	21
	En paro	18,9
	Amo o ama de casa	22,8
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	45,2
	Estudiante	1,1
Policonsumo	Fumador habitual	21,9
	Cannabis al menos semanal	10,9
	Droga ilegal último año -excluido cannabis-	18,6
Total		22,7

**Tabla A.7. Media de días de consumo de alcohol en el último mes
(% de consumidores de alcohol en el último mes)**

		%
Edad	15-19 años	3,9
	20-24 años	6,0
	25-29 años	6,7
	30-34 años	8,3
	35-44 años	10,8
	45-54 años	15,4
	55-64 años	19,5
	65-74 años	19,8
Género	Hombre	14,0
	Mujer	9,8
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	10,4
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	13,2
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	12,2
	Clase V. Trabajadores no cualificados	11,5
	NS/NC	15,3
Edad inicio	De 6 a 14 años	11,4
	De 15 a 16 años	11,2
	De 17 a 18 años	13,3
	De 19 a 20 años	13,5
	21 ó más años	14,3
	NS/NC	14,3
T.H.	Araba	13,7
	Bizkaia	11,6
	Gipuzkoa	12,3
Tamaño del municipio	Menos de 10.000	12,6
	De 10.001 a 40.000 hab.	12,0
	De 40.001 a 150.000 hab.	12,0
	Capitales	12,1
Actividad	Trabaja	11,2
	En paro	12,1
	Amo o ama de casa	13,7
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	20,6
	Estudiante	4,6
Policonsumo	Fumador habitual	11,7
	Cannabis al menos semanal	8,2
	Droga ilegal último año -excluido cannabis-	9,9
Total		12,2

Tabla A.8. Distribución de la población por cantidad de consumo de alcohol en días laborables en función de las características personales (%)

		Abstemio	Casi Abstemio	Poco bebedores	Bebedores excesivos
Edad	15-19 años	94,6	3,6	1,8	0,0
	20-24 años	81,9	15,4	2,7	0,0
	25-29 años	79,6	15,2	4,2	1,0
	30-34 años	78,4	15,6	5,0	1,0
	35-44 años	70,1	24,0	5,4	0,4
	45-54 años	59,1	31,4	7,2	2,3
	55-64 años	53,7	32,8	12,9	0,6
	65-74 años	56,2	33,0	9,5	1,3
Género	Hombre	58,0	29,6	10,5	1,9
	Mujer	78,1	18,7	3,1	0,0
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	70,2	24,1	4,8	0,9
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	62,8	30,4	6,5	0,3
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	66,3	24,4	7,9	1,4
	Clase V. Trabajadores no cualificados	72,0	20,8	6,3	0,9
	NS/NC	71,5	21,7	6,6	0,2
Edad inicio	De 6 a 14 años	65,7	24,4	8,2	1,7
	De 15 a 16 años	66,9	24,7	7,1	1,3
	De 17 a 18 años	65,4	26,8	7,2	0,7
	De 19 a 20 años	66,3	24,9	8,5	0,4
	21 ó más años	66,1	29,3	4,5	0,0
	Ns/Nc	80,0	20,0	0,0	0,0
T.H.	Araba	59,8	30,9	8,5	0,8
	Bizkaia	71,2	22,4	5,6	0,7
	Gipuzkoa	66,5	24,1	8,0	1,4
Tamaño del municipio	Menos de 10.000	69,0	21,3	8,7	1,1
	De 10.001 a 40.000 hab.	69,1	23,0	7,0	0,9
	De 40.001 a 150.000 hab.	69,4	23,2	6,1	1,3
	Capitales	65,9	27,4	6,0	0,7
Actividad	Trabaja	66,1	25,7	7,0	1,3
	En paro	72,7	21,0	6,3	0,0
	Amo o ama de casa	77,0	18,3	4,6	0,0
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	48,0	37,4	12,9	1,8
	Estudiante	89,8	8,7	1,2	0,3
Policonsumo	Fumador habitual	65,9	22,9	9,2	1,9
	Cannabis al menos semanal	69,2	24,1	5,3	1,4
	Droga ilegal último año -excluido cannabis-	64,3	27,9	7,8	0,0
Total		68,1	24,2	6,8	1,0

Tabla A.9. Distribución de la población por cantidad de consumo de alcohol en fines de semana en función de las características personales (%)

		Abstemio	Casi abstemio	Poco bebedores	Bebedores excesivos	Bebedor de riesgo
Edad	15-19 años	27,9	7,8	33,8	18,8	11,8
	20-24 años	16,8	11,1	36,0	23,8	12,3
	25-29 años	26,6	13,1	32,2	20,9	7,1
	30-34 años	32,3	12,6	35,1	15,6	4,3
	35-44 años	35,4	26,0	30,1	6,8	1,6
	45-54 años	33,6	30,6	27,6	6,2	2,0
	55-64 años	42,9	29,6	21,4	5,4	0,7
	65-74 años	50,7	30,2	16,6	1,6	0,9
Género	Hombre	23,3	22,4	33,9	14,4	5,9
	Mujer	46,7	23,6	22,3	6,0	1,5
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	30,4	20,2	34,6	11,8	3,1
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	28,9	31,6	29,0	9,8	0,7
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	30,2	21,9	30,7	11,9	5,3
	Clase V. Trabajadores no cualificados	38,8	22,6	24,9	9,6	4,0
	NS/NC	58,7	22,2	13,8	3,7	1,6
Edad inicio	De 6 a 14 años	24,9	15,7	32,0	16,6	10,7
	De 15 a 16 años	24,4	21,4	38,0	13,1	3,1
	De 17 a 18 años	31,3	30,2	27,1	8,6	2,8
	De 19 a 20 años	47,2	28,2	20,3	4,1	0,2
	21 ó más años	50,7	33,8	11,9	3,6	0,0
	Ns/Nc	71,6	20,3	4,7	3,4	0,0
T.H.	Araba	21,9	24,0	42,3	10,4	1,4
	Bizkaia	39,2	22,5	24,4	10,2	3,8
	Gipuzkoa	33,8	23,4	28,0	10,2	4,5
Tamaño del municipio	Menos de 10.000	33,4	20,0	29,7	12,8	4,1
	De 10.001 a 40.000 hab.	35,2	20,7	28,3	10,4	5,4
	De 40.001 a 150.000 hab.	37,5	24,8	25,6	8,2	4,0
	Capitales	34,5	25,7	28,3	9,7	1,8
Actividad	Trabaja	26,0	23,3	33,9	12,3	4,5
	En paro	42,0	18,2	21,5	12,7	5,6
	Amo o ama de casa	62,0	23,1	12,9	2,0	0,0
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	38,9	31,5	24,0	4,8	0,8
	Estudiante	23,6	10,5	34,8	21,5	9,7
Policonsumo	Fumador habitual	26,4	19,1	29,6	17,5	7,4
	Cannabis al menos semanal	12,4	8,2	33,8	30,1	15,4
	Droga ilegal último año - excluido cannabis-	9,0	3,7	33,6	32,7	21,0
Total		35,0	23,0	28,1	10,2	3,7

Tabla A.11. Distribución de la población bebedora por frecuencia de borracheras en el último año en función de las características personales (% horizontales)

		Dos días al mes por lo menos	Una vez al mes o menos	No se ha emborrachado
Edad	15-19 años	25,4	39,8	33,1
	20-24 años	22,9	42,4	32,7
	25-29 años	15,1	44,3	38,8
	30-34 años	10,6	36,9	52,0
	35-44 años	3,4	19,9	75,4
	45-54 años	2,8	16,7	79,1
	55-64 años	4,6	5,3	89,1
	65-74 años	4,1	1,3	94,5
Género	Hombre	11,3	27,6	59,7
	Mujer	5,3	17,7	75,9
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	7,9	31,2	59,0
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	7,2	20,0	72,5
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	10,1	23,8	64,4
	Clase V. Trabajadores no cualificados	7,1	21,2	71,6
	NS/NC	6,8	12,4	80,2
Edad inicio	De 6 a 14 años	15,2	35,4	47,3
	De 15 a 16 años	9,2	28,7	61,0
	De 17 a 18 años	6	17,0	76,0
	De 19 a 20 años	5,4	7,1	86,6
	21 ó más años	1,4	5,1	93,5
	Ns/Nc	0	0,0	100,0
T.H.	Araba	10	19,6	69,5
	Bizkaia	7,9	22,6	68,5
	Gipuzkoa	8,7	25,2	64,3
Tamaño del municipio	Menos de 10.000	8,1	26,1	63,8
	De 10.001 a 40.000 hab.	9,1	24,6	64,5
	De 40.001 a 150.000 hab.	8,9	22,4	68,7
	Capitales	8,1	20,2	71,0
Actividad	Trabaja	7,7	28,6	62,1
	En paro	17,2	25,0	57,8
	Amo o ama de casa	2,5	4,0	93,0
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	4,6	5,6	89,3
	Estudiante	22,8	40,9	34,4
Policonsumo	Fumador habitual	13	28,1	57,5
	Cannabis al menos semanal	26,9	45,7	26,0
	Droga ilegal último año -excluido cannabis-	40	38,6	21,4

Tabla A.12. Apreciación subjetiva del nivel de consumo de alcohol por tipos de consumo

		Poco o nada (%)	Mucho o bastante (%)
Prevalencia del consumo	Consumo alcohol último año	88,3	10,1
	Consumo alcohol último mes	87,2	11,2
	Se emborracha 2 o más días al mes	60,4	36,3
Tipología consumidor día Laborable	Abstemio	91,7	7,2
	Casi Abstemio	86,0	11,0
	Poco bebedores	80,4	19,6
	Bebedores excesivos	56,8	43,2
Tipología consumidor día Festivo	Abstemio	98,2	0,2
	Casi Abstemio	92,8	5,3
	Poco bebedores	89,1	9,4
	Bebedores excesivos	73,9	24,5
	Bebedores de riesgo	46,6	53,4

Tabla A.13. Proporción de personas iniciadas en el uso del alcohol que lo han consumido en el último año y en el último mes de acuerdo a las características personales (ICR e ICA)

		ICR	ICA
Edad	15-19 años	93,2	81,9
	20-24 años	95,1	87,0
	25-29 años	92,5	83,6
	30-34 años	90,7	79,4
	35-44 años	89,3	78,9
	45-54 años	88,2	78,5
	55-64 años	82,1	70,8
	65-74 años	78,7	69,3
Género	Hombre	91,0	84,4
	Mujer	84,7	70,9
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	88,7	78,7
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	90,7	81,2
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	90,1	81,5
	Clase V. Trabajadores no cualificados	86,6	75,7
	NS/NC	77,7	62,1
Edad inicio	De 6 a 14 años	90,2	83,4
	De 15 a 16 años	93,2	85,2
	De 17 a 18 años	87,6	76,4
	De 19 a 20 años	75,8	64,4
	21 ó más años	80,6	60,5
	NS/NC	64,7	45,9
T.H.	Araba	89,5	86,5
	Bizkaia	85,6	72,8
	Gipuzkoa	91,1	82,3
Tamaño del municipio	Menos de 10.000	88,3	82,4
	De 10.001 a 40.000 hab.	89,5	75,9
	De 40.001 a 150.000 hab.	84,9	76,1
	Capitales	88,1	77,9
Actividad	Trabaja	91,8	84,1
	En paro	81,0	67,2
	Amo o ama de casa	78,7	61,0
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	81,5	73,0
	Estudiante	95,5	84,3
Policonsumo	Fumador habitual	88,6	80,8
	Cannabis al menos semanal	96,8	93,4
	Droga ilegal último año -excluido cannabis-	96,6	93,3
Total		88,0	77,9

Tabla A.14. Proporción de consumidores por características personales que citan las principales razones para el consumo (%)

		1	2	3	4	5
Edad	15-19 años	41,9	26,0	1,6	43,3	28,2
	20-24 años	51,3	31,7	4,7	33,4	24,7
	25-29 años	50,9	24,5	7,5	24,8	11,2
	30-34 años	57,9	26,7	12,7	22,6	10,0
	35-44 años	50,1	23,6	18,8	12,4	7,1
	45-54 años	57,7	23,5	29,0	8,7	9,1
	55-64 años	52,1	15,3	36,5	2,8	3,4
	65-74 años	50,8	8,8	40,9	3,4	5,9
Género	Hombre	58,3	25,4	25,0	18,9	12,1
	Mujer	46,0	18,4	17,5	11,6	8,2
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	59,0	21,0	21,5	19,0	12,1
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	53,2	19,7	23,8	12,0	8,5
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	53,0	24,8	21,1	17,2	11,8
	Clase V. Trabajadores no cualificados	42,9	24,5	15,5	12,2	8,1
	NS/NC	52,5	12,1	28,5	11,0	6,4
Edad inicio	De 6 a 14 años	61,3	24,4	22,5	27,1	17,1
	De 15 a 16 años	58,3	28,0	19,5	17,3	11,2
	De 17 a 18 años	47,1	19,9	21,2	12,0	7,1
	De 19 a 20 años	42,0	14,1	28,7	7,1	6,3
	21 ó más años	36,9	8,1	19,3	1,4	3,8
	Ns/Nc	21,8	6,2	17,8	4,0	10,1
T.H.	Araba	55,5	19,2	22,4	10,8	5,5
	Bizkaia	45,5	24,0	19,5	18,9	13,2
	Gipuzkoa	62,2	20,4	24,0	11,9	7,7
Tamaño del municipio	Menos de 10.000	55,1	27,2	21,7	14,5	7,7
	De 10.001 a 40.000 hab.	48,8	22,3	21,0	17,5	11,4
	De 40.001 a 150.000 hab.	49,3	12,9	24,1	16,7	9,3
	Capitales	55,8	23,8	20,2	13,5	11,3
Actividad	Trabaja	55,1	23,6	19,9	15,4	10,0
	En paro	48,1	26,6	15,5	22,3	12,1
	Amo o ama de casa	42,3	15,4	27,4	5,0	4,0
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	55,0	17,4	37,8	6,1	6,4
	Estudiante	50,8	27,8	2,0	40,5	26,2
Policonsumo	Fumador habitual	53,6	29,2	17,5	20,6	11,7
	Cannabis al menos semanal	55,3	31,7	11,6	37,6	20,9
	Droga ilegal último año -excluido cannabis-	55,1	33,7	7,8	42,2	26,4
Consumos alcohol	Último año	53,7	22,7	22,2	16,1	10,7
	Último mes	57,5	24,4	24,5	16,8	11,4
	Borrachera 2+días/mes	55,0	32,1	17,2	48,0	28,8
Día Laborable	Abstemio	47,8	21,5	10,2	17,0	10,3
	Casi Abstemio	58,8	22,6	39,5	12,6	10,7
	Poco bebedores	67,3	23,8	46,6	14,0	9,9
	Bebedores excesivos	50,1	32,3	31,9	8,1	0,0

		1	2	3	4	5
Día Fin Semana	Abstemio	32,3	13,3	7,6	6,6	2,7
	Casi Abstemio	52,5	16,7	32,4	9,0	8,9
	Poco bebedores	63,8	27,4	26,0	17,4	10,4
	Bebedores excesivos	66,3	33,1	17,1	29,5	21,2
	Bebedores de riesgo	47,0	37,2	11,9	54,4	32,9
Total		52,4	22,1	21,4	15,4	10,3

1. Beber me resulta agradable al paladar. 2. Bebo porque algo tienes que tomar cuando sales. 3. Bebiendo como más a gusto. 4. Beber me pone a tono para disfrutar de la fiesta. 5. Beber me ayuda a ser más hablador y comunicativo

Tabla A.15. Valor medio concedido por cada grupo a cada tipo de razones para el consumo (de 1 a 4)

		Gastronómicos	Lúdicos	Presión Social	Motivos Personales
Edad	15-19 años	1,41	1,71	1,24	1,39
	20-24 años	1,52	1,65	1,22	1,33
	25-29 años	1,58	1,50	1,17	1,17
	30-34 años	1,66	1,41	1,14	1,12
	35-44 años	1,69	1,30	1,14	1,09
	45-54 años	1,87	1,28	1,21	1,13
	55-64 años	1,95	1,14	1,08	1,05
	65-74 años	1,95	1,12	1,08	1,05
Género	Hombre	1,82	1,41	1,20	1,17
	Mujer	1,66	1,27	1,10	1,10
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	1,74	1,36	1,15	1,14
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	1,76	1,29	1,14	1,12
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	1,77	1,39	1,17	1,16
	Clase V. Trabajadores no cualificados	1,61	1,33	1,16	1,11
	NS/NC	1,83	1,21	1,09	1,09
Edad inicio	De 6 a 14 años	1,83	1,53	1,19	1,25
	De 15 a 16 años	1,76	1,39	1,19	1,16
	De 17 a 18 años	1,68	1,27	1,12	1,09
	De 19 a 20 años	1,76	1,20	1,09	1,07
	21 ó más años	1,65	1,12	1,08	1,05
	Ns/Nc	1,64	1,07	1,00	1,07
T.H.	Araba	1,76	1,31	1,12	1,11
	Bizkaia	1,66	1,40	1,21	1,17
	Gipuzkoa	1,87	1,27	1,07	1,09
Tamaño del municipio	Menos de 10.000	1,79	1,32	1,09	1,09
	De 10.001 a 40.000 hab.	1,74	1,36	1,14	1,14
	De 40.001 a 150.000 hab.	1,69	1,26	1,09	1,10
	Capitales	1,75	1,39	1,24	1,18
Actividad	Trabaja	1,73	1,36	1,17	1,13
	En paro	1,61	1,45	1,14	1,17
	Amo o ama de casa	1,78	1,16	1,07	1,07
	Jubilado/a,pensionista,invalidez	1,98	1,20	1,12	1,06
	Estudiante	1,48	1,68	1,24	1,35
Policonsumo	Fumador habitual	1,69	1,44	1,17	1,17
	Cannabis al menos semanal	1,65	1,70	1,22	1,31
	Droga ilegal último año -excluido cannabis-	1,59	1,82	1,20	1,38
Consumo alcohol	Alcohol último año	1,76	1,35	1,16	1,14
	Alcohol último mes	1,82	1,37	1,17	1,15
	Borrachera 2 o más días al mes	1,72	1,78	1,23	1,38
Día Laborable	Abstemio	1,57	1,36	1,14	1,13
	Casi Abstemio	1,99	1,32	1,16	1,15
	Poco bebedores	2,19	1,33	1,21	1,15
	Bebedores excesivos	1,96	1,38	1,14	1,08

		Gastronómicos	Lúdicos	Presión Social	Motivos Personales
Día Fin Semana	Abstemio	1,47	1,17	1,06	1,04
	Casi Abstemio	1,84	1,23	1,14	1,11
	Poco bebedores	1,88	1,41	1,21	1,17
	Bebedores excesivos	1,79	1,60	1,20	1,26
	Bebedores de riesgo	1,61	1,88	1,22	1,38
Total		1,74	1,34	1,15	1,14

**Tabla A.16. Frecuencia de consumo de alcohol en la calle por características personales
(% horizontales)**

		Nunca	1 o 2 veces al año	1 o 2 veces al mes	Todas o casi todas las semanas	NS/NC
Edad	15-19	21,1	29,2	30,2	17,8	1,6
	20-24	42,1	27,4	20,9	9,2	0,4
	25-29	67,5	23,5	7,2	1,1	0,6
	20-34	84,8	12,4	0,6	0,0	2,2
Edad inicio	De 6 a 14 años	49,4	25,1	17,1	6,8	1,7
	De 15 a 16 años	60,9	21,7	10,2	5,9	1,2
	De 17 a 18 años	66,8	20,3	9,3	2,7	1,0
	De 19 a 20 años	69,1	18,8	12,0	0,0	0,0
	21 ó más años	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ns/Nc	76,1	0,0	23,9	0,0	0,0
T.H.	Araba	68,0	18,6	8,6	4,9	0,0
	Bizkaia	55,3	21,8	14,3	7,2	1,3
	Gipuzkoa	63,6	23,4	9,3	2,0	1,7
Tamaño del municipio	Menos de 10.000	70,2	13,2	11,1	4,0	1,5
	De 10.001 a 40.000 hab.	57,5	25,8	12,2	3,2	1,3
	De 40.001 a 150.000 hab.	50,9	24,3	16,6	7,1	1,1
	Capitales	60,3	22,3	9,7	6,6	1,1
Policonsumo	Fumador habitual	55,0	20,6	15,7	7,5	1,2
	Cannabis al menos semanal	42,9	25,7	21,2	9,0	1,1
	Droga ilegal último año -excluido cannabis-	43,8	17,2	24,4	13,7	0,9
Alcohol	Consumo alcohol último año	56,9	23,5	12,8	5,5	1,3
	Consumo alcohol último mes	54,8	23,6	14,2	6,0	1,4
	Se emborracha 2 o más días al mes	32,9	25,8	25,8	15,0	0,5
Día Laborable	Abstemio	61,6	20,8	11,0	5,3	1,3
	Casi Abstemio	50,4	28,3	15,7	5,6	0,0
	Poco bebedores	61,7	13,0	18,1	2,5	4,8
	Bebedores excesivos	35,4	64,6	0,0	0,0	0,0
Día Fin Semana	Abstemio	83,5	11,0	4,1	0,6	0,8
	Casi Abstemio	62,5	26,2	7,6	1,8	1,9
	Poco bebedores	57,4	24,8	12,9	3,8	1,0
	Bebedores excesivos	47,5	24,0	15,1	12,3	1,1
	Bebedores de riesgo	30,6	27,9	27,3	11,6	2,6
	Total	59,9	21,8	11,9	5,2	1,2

Tabla A.17. Evolución de la proporción de abstemios en días laborables (% horizontales)

	1992	1994	1996	2004	2006
15-20	92,1	93,3	93,7	94,1	91,1
21-25	84,2	88,3	90,7	80,9	83,4
26-30	70,2	76,8	83,6	83,0	79,5
31-40	66,0	64,7	67,8	74,3	73,0
41-50	63,6	58,7	61,5	63,7	61,5
51-60	61,2	64,6	66,4	58,6	56,3
Más de 60	70,4	59,0	66,5	60,9	57,2

Tabla A.18. Evolución de la proporción de abstemios en fin de semana (% horizontales)

	1992	1994	1996	2004	2006
15-20	53,7	45,8	49,2	30,5	25,1
21-25	47,1	41,6	38,1	22,7	16,9
26-30	52,4	56,1	49,5	40,5	27,4
31-40	57,6	55,3	58,2	43,3	36,5
41-50	57,7	53,2	52,5	44,4	30,6
51-60	60,2	61,2	62,7	47,5	41,6
Más de 60	68,6	57,9	63,7	54,7	50,1

Tabla A.19. Evolución de la proporción de bebedores excesivos y de riesgo en días laborables (% horizontales)

	1992	1994	1996	2004	2006
15-20	1,5	0,0	0,0	1,8	0,0
21-25	1,9	4,2	0,0	1,0	0,4
26-30	4,7	0,6	0,4	1,0	0,7
31-40	2,9	1,4	1,8	2,6	0,7
41-50	3,0	0,2	0,6	1,7	2,0
51-60	3,3	0,0	0,5	3,8	0,4
Más de 60	3,0	0,8	2,2	0,9	1,4

Tabla A.20. Evolución de la proporción de bebedores excesivos y de riesgo en fin de semana (% horizontales)

	1992	1994	1996	2004	2006
15-20	24,0	19,8	20,9	38,5	32,6
21-25	24,7	24,0	22,0	46,2	33,9
26-30	21,0	14,8	13,4	31,0	26,9
31-40	11,0	9,9	12,3	14,9	13,1
41-50	7,4	4,4	5,2	7,9	8,4
51-60	6,6	1,9	4,1	8,8	5,4
Más de 60	6,3	2,1	4,3	3,1	3,9

B. MEDIDAS DE ASOCIACIÓN ENTRE LOS INDICADORES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y LAS VARIABLES INDEPENDIENTES

Tabla B.1. Medidas de asociación entre el consumo de alcohol* y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Sexo	47,634	,000	p<,005	,152	,154	--	,060	,024
Edad	30,681	,000	p<,005	,123	--	,124	,006	,015
Ocupación	67,415	,000	p<,005	,180	--	,183	,010	,034
Actividad	90,066	,000	p<,005	,208	--	,212	,028	,045
Territorio Histórico	3,783	,151	--	,043	--	,043	,000	,002
Tamaño municipio	13,093	,004	p<,005	,081	--	,081	,000	,007
Fumador habitual	17,884	,000	p<,005	,094	,094	--	,000	,009
Cannabis al menos semanal	11,396	,001	p<,005	,075	,075	--	,000	,006
Droga ilegal último año –excluido el cannabis–	3,804	,051	--	,044	,044	--	,000	,002

* Consumo de alcohol: Sí / no

Tabla B.2. Medidas de asociación entre el consumo de alcohol en los últimos 12 meses* y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Sexo	51,301	,000	p<,005	,158	,160	--	,088	,026
Edad	63,288	,000	p<,005	,175	--	,178	,007	,032
Edad de inicio	67,328	,000	p<,005	,185	--	,188	,008	,035
Ocupación	72,407	,000	p<,005	,187	--	,190	,000	,036
Actividad	114,647	,000	p<,005	,233	--	,239	,006	,057
Territorio Histórico	15,087	,001	p<,005	,086	--	,087	,000	,008
Tamaño municipio	10,886	,012	p<,05	,074	--	,074	,000	,005
Fumador habitual	7,485	,006	p<,01	,061	,061	--	,000	,004
Cannabis al menos semanal	30,183	,000	p<,005	,122	,123	--	,000	,015
Droga ilegal último año –excluido el cannabis–	11,888	,000	p<,005	,077	,077	--	,000	,006

* Consumo de alcohol en los últimos 12 meses. Sí / no

Tabla B.3. Medidas de asociación entre el consumo de alcohol en el último mes* y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Sexo	84,064	,000	p<,005	,201	,205	--	,117	,042
Edad	46,553	,000	p<,005	,151	--	,152	,000	,023
Edad de inicio	90,074	,000	p<,005	,213	--	,218	,006	,047
Ocupación	75,349	,000	p<,005	,190	--	,194	,000	,038
Actividad	137,355	,000	p<,005	,254	--	,262	,000	,069
Territorio Histórico	37,021	,000	p<,005	,135	--	,136	,000	,018
Tamaño municipio	9,142	,027	p<,05	,067	--	,068	,000	,005
Fumador habitual	13,495	,000	p<,005	,082	,082	--	,000	,007
Cannabis al menos semanal	48,004	,000	p<,005	,153	,155	--	,000	,024
Droga ilegal último año –excluido el cannabis–	19,706	,000	p<,005	,099	,099	--	,000	,010

* Consumo de alcohol en el último mes: Sí / no

Tabla B.4 Medidas de asociación entre la iniciación precoz en el consumo de alcohol* y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Sexo	24,390	,000	p<,005	,113	,114	--	,020	,013
Edad	71,602	,000	p<,005	,192	--	,195	,000	,038
Ocupación	19,633	,001	p<,005	,102	--	,102	,000	,010
Actividad	61,628	,000	p<,005	,178	--	,181	,000	,033
Territorio Histórico	,187	,911	--	,010	--	,010	,000	,000
Tamaño municipio	4,743	,192	--	,050	--	,050	,000	,003
Fumador habitual	3,232	,072	--	,041	,041	--	,000	,002
Cannabis al menos semanal	68,332	,000	p<,005	,187	,191	--	,000	,036
Droga ilegal último año –excluido el cannabis–	41,895	,000	p<,005	,148	,149	--	,000	,022

* Iniciación precoz en el consumo de alcohol con 14 o menos años: Sí / No

Tabla B.5 Medidas de asociación entre la edad media de inicio en el consumo de alcohol y las variables independientes

	Significatividad	
Sexo	,000	p<,005
Edad	,000	p<,005
Ocupación	,000	p<,005
Actividad	,000	p<,005
Territorio Histórico	,458	--
Tamaño municipio	,241	--
Fumador habitual	,003	p<,005
Cannabis al menos semanal	,000	p<,005
Droga ilegal último año –excluido el cannabis–	,000	p<,005

Tabla B.6. Medidas de asociación entre el consumo diario y casi diario de alcohol en el último año y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Sexo	43,500	,000	p<,005	,159	,161	--	,026	,026
Edad	290,008	,000	p<,005	,385	--	,417	,034	,174
Edad de inicio	8,592	,126	--	,072	--	,072	,000	,005
Ocupación	13,837	,008	p<,01	,091	--	,091	,000	,008
Actividad	154,777	,000	p<,005	,291	--	,305	,020	,093
Territorio Histórico	15,679	,000	p<,005	,096	--	,097	,000	,009
Tamaño municipio	2,000	,572	--	,035	--	,035	,000	,001
Fumador habitual	,575	,448	--	,019	,019	--	,000	,000
Cannabis al menos semanal	26,749	,000	p<,005	,126	,127	--	,000	,016
Droga ilegal último año –excluido el cannabis–	2,506	,113	--	,039	,039	--	,000	,001

Tabla B.7. Medidas de asociación entre la media de días de consumo de alcohol en el último mes y las variables independientes

	Significatividad	
Sexo	,000	p<,005
Edad	,000	p<,005
Edad de inicio	,009	p<,05
Ocupación	,001	p<,005
Actividad	,000	p<,005
Territorio Histórico	,048	p<,05
Tamaño municipio	,908	--
Fumador habitual	,294	--
Cannabis al menos semanal	,000	p<,005
Droga ilegal último año –excluido el cannabis–	,051	--

Tabla B.8. Medidas de asociación entre la cantidad de días en los que se ha consumido alcohol en el último mes* y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Sexo	118,894	,000	p<,005	,258	,267	--	,105	,021
Edad	382,597	,000	p<,005	,432	--	,239	,125	,075
Edad de inicio	86,946	,000	p<,005	,222	--	,114	,000	,012
Ocupación	58,840	,000	p<,005	,184	--	,094	,001	,009
Actividad	264,225	,000	p<,005	,370	--	,199	,043	,048
Territorio Histórico	43,071	,000	p<,005	,159	--	,114	,000	,005
Tamaño municipio	24,783	,016	p<,05	,121	--	,070	,005	,003
Fumador habitual	13,266	,010	p<,05	,089	,089	--	,000	,002
Cannabis al menos semanal	87,839	,000	p<,005	,223	,229	--	,019	,016
Droga ilegal último año –excluido el cannabis–	32,356	,000	p<,005	,138	,139	--	,016	,006

* Cantidad de días de consumo de alcohol en el último mes: 1-4, 5-14, 15-24, 25-30.

Tabla B.9. Medidas de asociación entre la tipología de consumo en día laborable y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Sexo	112,901	,000	p<,005	,231	,237	--	,122	,031
Edad	146,363	,000	p<,005	,261	--	,156	,017	,049
Edad de inicio	11,541	,713	--	,078	--	,045	,000	,001
Ocupación	16,045	,189	--	,089	--	,052	,000	,004
Actividad	113,237	,000	p<,005	,232	--	,137	,000	,038
Territorio Histórico	17,799	,007	p<,01	,094	--	,067	,001	,005
Tamaño municipio	9,261	,414	--	,068	--	,039	,000	,002
Fumador habitual	18,050	,000	p<,005	,095	,095	--	,004	,001
Cannabis al menos semanal	1,180	,758	--	,024	,024	--	,000	,000
Droga ilegal último año –excluido el cannabis–	2,090	,554	--	,032	,032	--	,000	,000

Tabla B.10. Medidas de asociación entre la tipología de consumo en día de fin de semana y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Sexo	162,392	,000	p<,005	,274	,285	--	,153	,029
Edad	294,995	,000	p<,005	,358	--	,221	,028	,041
Edad de inicio	208,659	,000	p<,005	,315	--	,191	,047	,036
Ocupación	110,061	,000	p<,005	,228	--	,135	,010	,021
Actividad	276,261	,000	p<,005	,349	--	,215	,047	,049
Territorio Histórico	46,617	,000	p<,005	,151	--	,108	,026	,010
Tamaño municipio	15,554	,077	--	,088	--	,051	,005	,002
Fumador habitual	104,672	,000	p<,005	,223	,229	--	,026	,013
Cannabis al menos semanal	241,439	,000	p<,005	,328	,347	--	,048	,030
Droga ilegal último año –excluido el cannabis–	155,406	,000	p<,005	,268	,278	--	,031	,019

Tabla B.11. Medidas de asociación entre la frecuencia de borracheras* y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Sexo	52,052	,000	p<,005	,175	,178	--	,043	,021
Edad	385,323	,000	p<,005	,435	--	,342	,035	,160
Edad de inicio	158,911	,000	p<,005	,296	--	,219	,000	,070
Ocupación	31,631	,000	p<,005	,137	--	,098	,000	,013
Actividad	232,431	,000	p<,005	,352	--	,266	,009	,096
Territorio Histórico	4,590	,332	--	,053	--	,037	,000	,002
Tamaño municipio	6,695	,350	--	,064	--	,045	,007	,003
Fumador habitual	39,036	,000	p<,005	,152	,154	--	,000	,014
Cannabis al menos semanal	212,793	,000	p<,005	,338	,359	--	,057	,080
Droga ilegal último año –excluido el cannabis–	157,543	,000	p<,005	,295	,309	--	,029	,044

*Frecuencia de borracheras: 2 o más días al mes, 1 vez al mes o menos, nunca.

Tabla B.12. Medidas de asociación entre el grado de acuerdo con diferentes afirmaciones y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Me resulta agradable al paladar							
Edad	23,675	,309	--	,116	,067	,002	,005
Tipología consumo fin de semana	123,339	,000	p<,005	,257	,154	,084	,028
Algo tienes que beber cuando sales							
Edad	76,104	,000	p<,005	,205	,121	,000	,023
Tipología consumo fin de semana	84,016	,000	p<,005	,215	,127	,008	,026
Como más a gusto							
Edad	210,818	,000	p<,005	,329	,201	,026	,065
Tipología consumo fin de semana	102,720	,000	p<,005	,236	,140	,009	,031
Me pone a tono para disfrutar de la fiesta							
Edad	312,187	,000	p<,005	,391	,245	,004	,101
Tipología consumo fin de semana	206,747	,000	p<,005	,327	,200	,017	,063
Me ayuda a ser más hablador/a y comunicativo/a							
Edad	173,965	,000	p<,005	,302	,183	,007	,060
Tipología consumo fin de semana	152,603	,000	p<,005	,284	,171	,006	,053

Tabla B.13. Medidas de asociación entre diferentes motivaciones para la reducción del consumo de alcohol con el género y la edad

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Noviazgo, matrimonio o convivencia en pareja								
Sexo	2,360	,125	--	,050	,050	--	,000	,002
Edad	25,285	,001	p<,005	,161	--	,163	,000	,027
Llegada de los/as hijos/as								
Sexo	12,926	,000	p<,005	,116	,117	--	,005	,014
Edad	70,082	,000	p<,005	,262	--	,271	,000	,074
Embarazo								
Sexo	105,771	,000	p<,005	,316	,333	--	,157	,111
Edad	68,723	,000	p<,005	,260	--	,269	,000	,072
Presiones o problemas con la familia								
Sexo	10,331	,001	p<,005	,104	,104	--	,000	,011
Edad	22,021	,003	p<,005	,151	--	,152	,008	,023
Problemas de salud								
Sexo	6,102	,014	p<,05	,080	,080	--	,000	,006
Edad	94,902	,000	p<,005	,301	--	,316	,025	,100
Recomendación médica								
Sexo	9,359	,002	p<,005	,099	,099	--	,000	,010
Edad	112,686	,000	p<,005	,326	--	,344	,031	,119
Cambio de cuadrilla								
Sexo	,519	,471	--	,023	,023	--	,000	,001
Edad	9,596	,213	--	,100	--	,100	,004	,010
Comenzar a trabajar o cambio de trabajo								
Sexo	,012	,914	--	,004	,004	--	,000	,000
Edad	7,737	,356	--	,090	--	,090	,000	,008

1. Poco y nada. 2. Mucho y bastante

Tabla B.14. Medidas de asociación entre diferentes lugares de adquisición del alcohol y edad y consumo excesivo o de riesgo en fin de semana

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Bares							
Edad	9,258	,026	p<,05	,118	,119	,027	,014
Consumo excesivo o de riesgo	85,149	,000	p<,005	,340	,361	,075	,131
Discotecas							
Edad	25,191	,000	p<,005	,193	,197	,036	,039
Consumo excesivo o de riesgo	47,532	,000	p<,005	,260	,270	,016	,073
Supermercados							
Edad	5,595	,133	--	,092	,093	,025	,009
Consumo excesivo o de riesgo	20,968	,000	p<,005	,177	,179	,033	,032
Otros comercios							
Edad	10,586	,014	p<,05	,126	,127	,009	,016
Consumo excesivo o de riesgo	31,138	,000	p<,005	,214	,219	,013	,048
De casa							
Edad	4,511	,211	--	,083	,083	,013	,007
Consumo excesivo o de riesgo	3,306	,347	--	,071	,071	,005	,005

Tabla B.15. Medidas de asociación entre diferentes lugares de consumo de alcohol y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Bares								
Edad	9,964	,019	p<,05	,123	--	,124	,015	,015
Género	,201	,654	--	,018	,018	--	,000	,000
Territorio Histórico	8,898	,012	p<,05	,116	--	,117	,000	,014
Fumador habitual	3,743	,053	--	,075	,076	--	,000	,006
Cannabis al menos semanal	6,149	,013	p<,05	,097	,097	--	,000	,009
Droga ilegal último año – excluido el cannabis–	3,937	,047	p<,05	,077	,078	--	,000	,006
Tipología consumo fin de semana	114,643	,000	p<,005	,386	,419	--	,092	,176
Discotecas								
Edad	31,265	,000	p<,005	,214	--	,219	,063	,048
Género	4,067	,044	p<,05	,079	,079	--	,013	,006
Territorio Histórico	3,792	,150	--	,076	--	,076	,000	,006
Fumador habitual	12,283	,000	p<,005	,136	,137	--	,000	,019
Cannabis al menos semanal	11,389	,001	p<,005	,131	,132	--	,000	,017
Droga ilegal último año – excluido el cannabis–	15,811	,000	p<,005	,154	,156	--	,040	,024
Tipología consumo fin de semana	53,730	,000	p<,005	,276	--	,287	,018	,082
Lonjas								
Edad	63,447	,000	p<,005	,298	--	,312	,058	,097
Género	22,353	,000	p<,005	,182	,185	--	,048	,034
Territorio Histórico	1,776	,412		,052	--	,052	,000	,003
Fumador habitual	11,791	,001	p<,005	,133	,134	--	,022	,018
Cannabis al menos semanal	23,849	,000	p<,005	,188	,191	--	,000	,037
Droga ilegal último año – excluido el cannabis–	13,620	,000	p<,005	,143	,144	--	,000	,021
Tipología consumo fin de semana	45,503	,000	p<,005	,255	,265	--	,008	,070
Calle								
Edad	156,587	,000	p<,005	,440	--	,490	,137	,240
Género	8,719	,003	p<,005	,115	,116	--	,021	,013
Territorio Histórico	2,351	,309	--	,060	--	,060	,000	,004
Fumador habitual	10,552	,001	p<,005	,126	,127	--	,000	,016
Cannabis al menos semanal	49,840	,000	p<,005	,266	,276	--	,000	,076
Droga ilegal último año – excluido el cannabis–	26,033	,000	p<,005	,196	,200	--	,000	,040
Tipología consumo fin de semana	50,274	,000	p<,005	,268	--	,278	,005	,077
Casa								
Edad	89,164	,000	p<,005	,440	--	,490	,137	,240
Género	,000	,988	--	,001	,001	--	,000	,000

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Territorio Histórico	2,570	,277	--	,063	--	,063	,000	,004
Fumador habitual	,146	,702	--	,015	,015	--	,000	,000
Cannabis al menos semanal	1,227	,268	--	,043	,043	--	,000	,002
Droga ilegal último año –excluido el cannabis–	3,448	,063	--	,073	,073	--	,000	,005
Tipología consumo fin de semana	2,242	,691	--	,059	--	,059	,000	,003

Tabla B.16. Medidas de asociación entre el consumo de alcohol en la calle* y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Sexo	5,884	,015	p<,05	,095	,095	--	,021	,009
Edad	146,696	,000	p<,005	,429	--	,475	,197	,226
Territorio Histórico	7,094	,029	p<,05	,104	--	,104	,000	,011
Fumador habitual	4,139	,042	p<,05	,080	,080	--	,000	,006
Cannabis al menos semanal	29,631	,000	p<,005	,209	,214	--	,053	,046
Droga ilegal último año –excluido el cannabis–	10,023	,002	p<,005	,123	,124	--	,027	,015
Tipología consumo fin de semana	64,997	,000	p<,005	,302	--	,316	,037	,100

* Consumo en la calle último año: sí/ no

Tabla B.17. Medidas de asociación entre la cantidad de problemas asociados al consumo de alcohol y otras drogas y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Sexo	10,176	,017	p<,05	,124	,125	--	,026	,005
Edad	11,669	,233	--	,133	--	,077	,015	,007
Edad de inicio	39,862	,000	p<,005	,241	--	,143	,011	,021
Territorio Histórico	13,416	,037	p<,05	,142	--	,102	,000	,007
Fumador habitual	29,656	,000	p<,005	,210	,214	--	,038	,015
Cannabis al menos semanal	43,999	,000	p<,005	,252	,261	--	,025	,025
Droga ilegal último año –excluido el cannabis–	59,105	,000	p<,005	,289	,302	--	,061	,033

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal
Tipología consumo fin de semana	134,464	,000	p<,005	,415	--	,263	,076	,087
Frecuencia botellón	54,526	,000	p<,005	,280	--	,168	,014	,029
Consumo en bares	62,125	,000	p<,005	,296	,310	--	,000	,009
Consumo en discotecas	43,438	,000	p<,005	,251	,259	--	,029	,029
Consumo en lonjas	21,167	,000	p<,005	,178	,181	--	,019	,013
Consumo en la calle	53,380	,000	p<,005	,276	,287	--	,035	,029
Consumo en casa	9,499	,023	p<,05	,120	,121	--	,000	,006

**ANEXO II.
EL CONSUMO DE TABACO EN LA CAPV**

Tabla A.1. Distribución de la población de 15 a 74 años por tipo de consumidor de tabaco y de diferentes características personales (% horizontales)

		No fumador	Exfumador	Fumador ocasional	Fumador habitual
Género	Hombre	31,8	28,3	5,1	34,8
	Mujer	49,1	19,7	4,1	27,1
Edad	15-19 años	51,0	6,0	9,4	33,6
	20-24 años	40,0	9,9	4,3	45,8
	25-29 años	44,5	11,0	4,4	40,1
	30-34 años	37,1	22,8	7,2	32,9
	35-44 años	32,5	26,4	4,6	36,5
	45-54 años	29,0	28,6	7,1	35,3
	55-64 años	45,2	33,2	1,3	20,3
	65-74 años	59,7	30,7	1,0	8,6
T.H.	Araba	40,7	21,1	2,7	35,5
	Bizkaia	38,0	25,4	4,6	32,0
	Gipuzkoa	44,4	22,9	5,5	27,1
Actividad	Trabaja	33,3	25,3	5,2	36,2
	En paro	31,8	15,9	6,0	46,2
	Amo o ama de casa	62,2	15,8	3,4	18,7
	Jubilado/a, pensionista ,invalidez	34,8	44,3	0,8	20,0
	Estudiante	53,1	6,6	7,9	32,4
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	43,6	24,9	4,3	27,2
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	37,6	28,0	6,1	28,2
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	30,7	26,4	5,0	37,8
	Clase V. Trabajadores no cualificados	42,4	23,3	3,3	31,1
	NS/NC	69,2	11,6	3,9	15,2
TOTAL		40,4	24,0	4,6	30,9

Tabla A.2. Distribución de la población de 14 a 74 años por tipo de consumo de tabaco y diferentes características personales (% horizontales)

			No fumador	Exfumador	Fumador ocasional	Fumador habitual	
Edad y sexo	15-19 años	Hombre	44,0	8,8	8,7	38,6	
		Mujer	58,4	3,1	10,1	28,4	
	20-24 años	Hombre	35,8	5,5	5,5	53,1	
		Mujer	44,4	14,4	3,1	38,1	
	25-29 años	Hombre	46,9	6,1	5,6	41,4	
		Mujer	42,0	16,3	3,1	38,7	
	30-34 años	Hombre	43,7	20,3	6,4	29,6	
		Mujer	30,0	25,6	8,0	36,4	
	35-44 años	Hombre	29,1	28,8	4,8	37,4	
		Mujer	36,0	24,1	4,4	35,6	
	45-54 años	Hombre	24,6	27,6	8,6	39,3	
		Mujer	33,4	29,7	5,6	31,4	
	55-64 años	Hombre	21,1	48,7	1,3	29,0	
		Mujer	68,6	18,3	1,2	11,9	
	65-74 años	Hombre	27,4	56,5	1,2	14,9	
		Mujer	87,2	8,6	0,8	3,3	
	Actividad y sexo	Trabaja	Hombre	31,9	26,1	5,4	36,5
			Mujer	35,2	24,2	4,9	35,6
En paro		Hombre	29,0	4,9	8,0	58,1	
		Mujer	35,4	30,3	3,5	30,7	
Amo/a de casa		Hombre	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Mujer	62,2	15,8	3,4	18,7	
Jubilado/a, pensionista, invalidez		Hombre	25,6	51,8	1,1	21,4	
		Mujer	61,9	22,4	0,0	15,7	
Estudiante		Hombre	46,3	7,0	9,1	37,7	
		Mujer	59,4	6,2	6,8	27,6	
TOTAL			40,4	24,0	4,6	30,9	

Tabla A.3. Intensidad de consumo en función de diferentes características personales (% horizontales)

		Ninguno	> 5 cigarrillos	5-10 cigarrillos	11-20 cigarrillos	21-30 cigarrillos	> 30 cigarrillos
Género	Hombre	8,5	12,3	24,4	36,1	8,8	10,0
	Mujer	1,5	21,4	31,8	34,0	5,7	5,6
Edad	15-19 años	3,8	29,5	53,4	11,7	1,6	0,0
	20-24 años	0,9	15,6	41,6	36,7	5,1	0,0
	25-29 años	1,4	17,8	35,6	40,0	2,8	2,5
	30-34 años	4,7	18,4	29,7	38,1	6,6	2,5
	35-44 años	4,0	12,6	24,0	43,9	7,7	7,8
	45-54 años	8,0	15,3	17,1	36,4	10,9	12,4
	55-64 años	5,3	18,2	28,6	24,2	9,1	14,6
T.H.	65-74 años	14,3	13,3	23,7	28,3	7,6	12,8
	Araba	4,9	14,6	33,2	36,8	2,7	7,9
	Bizkaia	4,3	16,4	27,5	34,5	8,7	8,7
	Gipuzkoa	8,0	16,5	25,1	35,8	7,5	7,0
Actividad	Trabaja	5,3	13,2	25,5	40,2	8,6	7,1
	En paro	4,0	14,2	32,6	34,2	3,8	11,1
	Amo o ama de casa	2,0	27,0	29,4	31,7	5,5	4,4
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	10,4	14,6	24,0	24,5	9,4	17,2
	Estudiante	3,5	28,7	44,6	22,1	1,1	0,0
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	2,7	16,1	28,7	40,4	7,8	4,3
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	5,6	15,4	26,5	35,1	7,6	9,8
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	6,3	14,9	26,6	35,0	8,2	9,0
	Clase V. Trabajadores no cualificados	5,8	17,2	29,9	32,0	8,1	7,0
	NS/NC	5,0	24,7	28,8	32,1	0,0	9,5
TOTAL		5,5	16,2	27,6	35,2	7,5	8,1

Tabla A.4. Edad media de inicio en función de diferentes características personales

		Media	Desviación típica
Género	Hombre	16,6	4,21
	Mujer	17,4	4,96
Edad	15-19 años	14,6	1,60
	20-24 años	15,8	2,07
	25-29 años	16,1	2,71
	30-34 años	16,5	3,17
	35-44 años	16,5	3,07
	45-54 años	16,4	3,44
	55-64 años	18,7	6,89
	65-74 años	20,1	8,08
T.H.	Araba	17,4	4,29
	Bizkaia	16,8	4,47
	Gipuzkoa	17,0	4,85
Actividad	Trabaja	16,6	3,61
	En paro	16,5	5,64
	Amo o ama de casa	18,2	5,31
	Jubilado/a,pensionista,invalidez	18,4	6,67
	Estudiante	15,3	1,95
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	17,3	4,07
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	17,9	5,08
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	16,4	4,06
	Clase V. Trabajadores no cualificados	16,8	4,95
Total		16,9	4,57

Tabla A.5. Distribución de los fumadores en función de la edad de inicio en el consumo y de diferentes características personales (% horizontales)

		>15 años	15-16	17-18	19-20	+20
Género	Hombre	27,8	31,5	19,8	11,8	9,0
	Mujer	23,8	26,8	26,3	11,4	11,7
Edad	15-19 años	46,5	41,8	11,7	0,0	0,0
	20-24 años	29,5	33,5	27,4	9,7	0,0
	25-29 años	26,6	31,9	27,7	10,8	2,9
	30-34 años	25,2	33,4	22,3	10,9	8,3
	35-44 años	23,5	31,9	26,2	11,7	6,6
	45-54 años	29,9	29,1	22,1	10,2	8,8
	55-64 años	20,2	22,3	19,4	17,8	20,3
	65-74 años	19,8	17,7	15,1	14,9	32,4
T.H.	Araba	22,1	25,3	26,6	12,2	13,8
	Bizkaia	28,7	29,1	21,1	10,8	10,3
	Gipuzkoa	23,2	32,3	23,4	13,0	8,0
Actividad	Trabaja	26,5	31,4	22,4	11,4	8,3
	En paro	37,2	23,2	24,1	10,0	5,6
	Amo o ama de casa	15,1	27,4	30,9	10,8	15,8
	Jubilado/a,pensionista,invalidez	24,4	22,2	15,9	17,6	19,9
	Estudiante	34,6	38,0	23,4	3,9	0,0
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	20,0	26,5	28,8	12,8	11,9
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	14,4	35,6	21,4	12,2	16,5
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	29,3	31,0	22,3	9,7	7,7
	Clase V. Trabajadores no cualificados	32,0	24,5	20,2	13,8	9,5

		>15 años	15-16	17-18	19-20	+20
	NS/NC	26,7	25,6	17,6	16,9	13,1
Tipo consumo	No fumo ahora, pero antes fumaba	22,3	32,2	22,6	12,2	10,6
	Fumo esporádicamente	32,3	22,5	20,8	11,7	12,6
	Fumo habitualmente	28,1	28,4	22,8	11,2	9,4
Total		26,1	29,5	22,6	11,6	10,1

Tabla A.6. Distribución de los fumadores en función de la duración del consumo y de diferentes características personales (% horizontales)

		< 5 años	5 a 10 años	11 a 20 años	+20
Género	Hombre	9,7	15,8	20,9	53,6
	Mujer	6,8	16,6	29,4	47,2
Edad	15-19 años	81,3	18,7	0,0	0,0
	20-24 años	21,1	75,1	3,8	0,0
	25-29 años	3,0	40,5	56,5	0,0
	30-34 años	1,4	9,5	83,9	5,2
	35-44 años	0,4	0,5	27,7	71,3
	45-54 años	0,0	0,0	1,5	98,5
	55-64 años	0,0	2,5	0,0	97,5
	65-74 años	0,0	5,3	0,0	94,7
T.H.	Araba	9,0	18,8	18,5	53,6
	Bizkaia	9,7	16,1	28,2	46,0
	Gipuzkoa	5,8	14,9	21,1	58,2
Actividad	Trabaja	3,5	16,1	30,4	50,0
	En paro	5,3	23,9	27,1	43,7
	Amo o ama de casa	0,0	0,0	24,8	75,2
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	0,0	2,2	5,6	92,3
	Estudiante	57,6	40,1	2,3	0,0
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	8,8	19,0	27,9	44,3
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	6,3	9,8	19,4	64,4
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	8,6	17,7	25,7	47,9
	Clase V. Trabajadores no cualificados	9,1	17,3	21,1	52,5
	NS/NC	8,4	7,2	26,2	58,2
Total		8,4	16,2	24,6	50,8

Tabla A.7. Distribución de los fumadores en función de la percepción subjetiva sobre su propio consumo y de diferentes características personales (% horizontales)

		Nada (1)	Poco (2)	Bastante (3)	Mucho (4)	NS/NC	1+2	3+4
Género	Hombre	6,3	39,9	39,8	12,8	1,2	46,2	52,6
	Mujer	4,1	35,6	40,9	18,7	0,7	39,7	59,6
Edad	15-19 años	10,9	51,1	31,2	5,4	1,3	62,0	36,6
	20-24 años	4,3	36,2	51,5	8,0	0,0	40,5	59,5
	25-29 años	6,2	40,9	44,8	8,1	0,0	47,1	52,9
	30-34 años	4,0	42,1	41,1	12,8	0,0	46,1	53,9
	35-44 años	2,3	36,1	43,4	16,9	1,2	38,5	60,3
	45-54 años	8,1	28,9	33,7	27,1	2,2	37,0	60,8
	55-64 años	3,0	39,2	42,0	15,7	0,0	42,3	57,7
	65-74 años	9,1	60,3	17,0	9,9	3,7	69,3	27,0
T.H.	Araba	2,7	38,2	44,2	14,8	0,0	40,9	59,1
	Bizkaia	5,2	39,5	40,0	14,2	1,2	44,7	54,2
	Gipuzkoa	7,0	35,2	38,7	18,0	1,1	42,2	56,7
Actividad	Trabaja	5,3	35,3	43,0	15,5	0,9	40,6	58,5
	En paro	3,5	40,5	41,0	12,6	2,5	43,9	53,6
	Amo o ama de casa	4,5	36,5	30,0	29,0	0,0	41,0	59,0
	Jubilado/a,pensionista,invalidéz	3,4	44,1	38,3	12,6	1,5	47,6	50,9
	Estudiante	9,8	48,9	36,4	4,0	0,9	58,7	40,4
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	3,3	34,6	46,5	14,7	0,8	38,0	61,2
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	4,9	41,3	29,9	23,9	0,0	46,1	53,9
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	7,1	37,3	39,7	14,7	1,3	44,3	54,4
	Clase V. Trabajadores no cualificados	1,3	43,3	45,0	10,4	0,0	44,6	55,4
	NS/NC	7,2	33,0	38,7	18,1	3,0	40,1	56,9
Total		5,4	38,0	40,3	15,4	1,0	43,4	55,6

Tabla A.8. Distribución de los fumadores en función de la valoración de su capacidad para dejar de fumar (% horizontales)

		No es capaz	No lo sabe	Si es capaz	NC
Género	Hombre	17,7	21,4	59,6	1,3
	Mujer	18,5	23,1	56,8	1,6
Edad	15-19 años	6,1	13,8	80,1	0,0
	20-24 años	17,1	19,2	61,4	2,3
	25-29 años	14,2	22,8	63,1	0,0
	30-34 años	18,2	19,5	59,3	3,1
	35-44 años	21,2	24,2	53,5	1,2
	45-54 años	21,4	23,1	53,8	1,7
	55-64 años	17,5	24,4	58,1	0,0
	65-74 años	17,1	29,4	48,7	4,7
T.H.	Araba	13,0	22,4	64,7	0,0
	Bizkaia	20,6	20,3	57,4	1,7
	Gipuzkoa	15,8	25,6	56,9	1,7
Actividad	Trabaja	18,3	23,6	56,9	1,3
	En paro	16,7	22,3	58,5	2,5
	Amo o ama de casa	23,9	20,1	53,4	2,7
	Jubilado/a,pensionista,invalidez	24,7	20,5	54,8	0,0
	Estudiante	5,8	17,2	75,7	1,2
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	15,9	26,6	57,6	0,0
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	14,2	21,1	64,7	0,0
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	19,6	22,0	56,6	1,8
	Clase V. Trabajadores no cualificados	15,1	22,5	61,5	1,0
	NS/NC	25,0	14,8	54,9	5,4
Intensidad	Ninguno	2,6	15,8	81,6	0,0
	De 1 a 5	2,8	9,9	85,5	1,8
	De 6 a 10	12,5	23,2	63,4	0,8
	De 11 a 19	18,2	31,9	49,9	0,0
	De 20 a 30	35,4	25,6	36,1	2,9
	Más de 30	29,4	25,4	45,3	0,0
	No ha probado tabaco	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	18,0	22,2	58,4	1,4

Tabla A.9. Distribución de los fumadores en función de los intentos realizados para dejar de fumar y de distintas características personales (% horizontales)

		No,nunca	Si,una vez	Si,varias veces	NS/NC
Género	Hombre	47,3	21,7	30,3	0,7
	Mujer	46,9	23,4	28,0	1,6
Edad	15-19 años	67,8	22,7	9,5	0,0
	20-24 años	46,1	33,7	20,2	0,0
	25-29 años	50,6	22,3	26,4	0,8
	30-34 años	46,6	33,2	18,5	1,6
	35-44 años	46,4	21,4	31,6	0,6
	45-54 años	39,9	19,7	39,2	1,2
	55-64 años	47,8	6,8	42,5	2,8
	65-74 años	46,3	17,5	31,5	4,7
T.H.	Araba	47,5	16,4	36,1	0,0
	Bizkaia	48,7	24,8	25,6	0,9
	Gipuzkoa	43,9	21,4	32,6	2,1
Actividad	Trabaja	46,3	25,3	27,6	0,9
	En paro	43,5	18,1	36,6	1,8
	Amo o ama de casa	44,0	16,4	35,9	3,7
	Jubilado/a,pensionista,invalidez	44,8	13,0	42,2	0,0
	Estudiante	59,9	23,6	16,5	0,0
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	46,5	29,1	23,7	0,7
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	52,7	13,4	33,8	0,0
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	48,2	22,2	28,8	0,9
	Clase V. Trabajadores no cualificados	43,4	26,5	28,5	1,7
	NS/NC	39,1	17,2	39,1	4,5
Intensidad	Ninguno	49,9	12,2	31,9	6,1
	De 1 a 5	56,7	17,2	23,0	3,1
	De 6 a 10	48,8	20,2	31,0	0,0
	De 11 a 19	45,4	25,0	29,6	0,0
	De 20 a 30	40,3	29,0	30,4	0,3
	Más de 30	39,5	23,8	36,7	0,0
	No ha probado tabaco	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	47,1	22,5	29,3	1,1	

Tabla A.10. Distribución de los fumadores en función de su disposición a dejar de fumar y diferentes características personales (% horizontales)

		No está dispuesto	No lo sabe	Está dispuesto	NC
Género	Hombre	25,9	16,9	54,6	2,6
	Mujer	25,5	10,9	60,2	3,3
Edad	15-19 años	27,5	13,9	51,2	7,4
	20-24 años	18,0	22,6	54,7	4,7
	25-29 años	28,8	12,1	57,5	1,6
	30-34 años	22,0	10,3	64,6	3,1
	35-44 años	32,6	11,9	53,8	1,7
	45-54 años	25,8	14,5	56,7	3,1
	55-64 años	20,3	19,4	60,3	0,0
	65-74 años	14,1	13,3	64,1	8,5
	T.H.	Araba	28,7	11,9	59,4
	Bizkaia	25,9	13,5	57,6	3,0
	Gipuzkoa	23,8	17,0	54,9	4,3
Actividad	Trabaja	26,8	13,4	56,9	2,9
	En paro	28,6	22,7	47,3	1,4
	Amo o ama de casa	19,3	11,5	67,8	1,4
	Jubilado/a,pensionista,invalides	29,9	10,3	58,2	1,5
	Estudiante	20,9	18,0	53,7	7,4
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	27,8	13,1	55,4	3,7
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	24,8	14,6	59,2	1,4
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	25,7	14,2	56,7	3,5
	Clase V. Trabajadores no cualificados	25,9	13,5	59,4	1,2
	NS/NC	22,9	18,9	54,2	4,0
Intensidad	Ninguno	23,3	17,3	46,1	13,3
	De 1 a 5	27,9	16,2	53,1	2,7
	De 6 a 10	25,8	14,7	58,1	1,4
	De 11 a 19	20,4	12,1	65,3	2,2
	De 20 a 30	28,8	12,6	56,9	1,7
	Más de 30	15,4	17,4	58,6	8,5
	No ha probado tabaco	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	25,7	14,3	57,1	2,9

Tabla A.11. Duración media del consumo para los exfumadores en función de diferentes características personales

		Media	Desviación típica
Género	Hombre	22,4	12,7
	Mujer	16,0	10,1
Edad	15-19 años	1,1	1,3
	20-24 años	4,4	2,2
	25-29 años	7,5	3,6
	30-34 años	10,6	4,8
	35-44 años	17,0	6,7
	45-54 años	20,5	10,6
	55-64 años	24,1	10,9
	65-74 años	31,4	13,9
T.H.	Araba	18,8	12,4
	Bizkaia	20,7	12,0
	Gipuzkoa	18,5	12,1
Actividad	Trabaja	16,8	9,9
	En paro	15,8	5,5
	Amo o ama de casa	18,7	10,4
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	29,2	12,8
	Estudiante	2,6	2,7
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	15,9	10,4
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	20,4	11,7
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	21,3	12,0
	Clase V. Trabajadores no cualificados	18,9	13,9
	NS/NC	19,8	10,9
Intensidad	Ninguno	22,8	12,3
	De 1 a 10	16,3	12,3
	De 11 a 19	18,8	12,0
	20 y más	22,8	11,0
TOTAL		19,8	12,1

Tabla A.12. Distribución de los exfumadores en función de la edad de abandono y de diferentes características personales (% horizontales)

		< 18	19-29	30-44	45-59	60-74
Género	Hombre	4,7	23,1	35,5	30,1	6,6
	Mujer	6,2	35,4	37,6	20,3	0,6
Edad	15-19 años	88,6	11,4	0,0	0,0	0,0
	20-24 años	26,7	73,3	0,0	0,0	0,0
	25-29 años	10,5	89,5	0,0	0,0	0,0
	30-34 años	16,6	45,9	37,5	0,0	0,0
	35-44 años	0,9	27,0	72,1	0,0	0,0
	45-54 años	1,4	30,0	35,6	33,0	0,0
	55-64 años	1,6	12,2	30,8	53,7	1,7
	65-74 años	1,4	11,0	14,1	49,7	23,9
T.H.	Araba	5,6	32,7	33,5	21,8	6,4
	Bizkaia	5,3	25,9	35,7	29,0	4,1
	Gipuzkoa	5,3	30,3	38,8	22,4	3,2
Actividad	Trabaja	5,2	35,9	41,5	17,4	0,0
	En paro	0,0	32,6	67,4	0,0	0,0
	Amo o ama de casa	2,5	26,3	39,9	31,3	0,0
	Jubilado/a,pensionista,invalidez	2,2	10,1	22,2	49,3	16,1
	Estudiante	62,9	37,1	0,0	0,0	0,0
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	7,1	35,4	41,4	13,8	2,4
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	4,2	29,6	32,7	30,9	2,5
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	4,1	25,6	36,3	28,8	5,2
	Clase V. Trabajadores no cualificados	7,0	32,4	32,4	22,2	5,9
	NS/NC	7,8	11,8	41,6	38,7	0,0
Intensidad	Ninguno	0,0	37,1	4,7	38,1	20,0
	De 1 a 10	11,8	33,8	29,2	23,1	2,2
	De 11 a 19	1,8	40,4	42,1	9,7	6,0
	20 y más	0,6	20,2	44,3	30,7	4,2
	Total	5,3	28,1	36,4	26,1	4,1

Tabla A.13. Duración media y edad media de abandono del consumo de tabaco en función de diferentes características personales

		Duración del abandono		Edad media de abandono	
		Media	Desviación típica	Media	Desviación típica
Género	Hombre	12,6	10,71	39,1	12,95
	Mujer	10,1	9,73	33,6	10,97
Edad	15-19 años	1,3	1,48	15,7	1,68
	20-24 años	2,5	2,15	20,2	1,96
	25-29 años	3,6	2,90	23,8	3,36
	30-34 años	5,8	5,44	26,4	5,41
	35-44 años	6,9	6,14	33,2	6,57
	45-54 años	12,6	9,23	36,9	9,95
	55-64 años	16,6	10,15	42,6	10,59
	65-74 años	19,2	12,89	50,5	12,42
T.H.	Araba	10,5	10,54	35,8	12,96
	Bizkaia	11,6	10,03	38,0	12,56
	Gipuzkoa	12,1	10,93	35,2	11,86
Actividad	Trabaja	9,3	8,37	33,2	9,84
	En paro	6,8	6,67	32,1	5,33
	Amo o ama de casa	13,4	9,83	37,3	11,00
	Jubilado/a, pensionista, invalidez	17,5	12,48	47,3	12,59
	Estudiante	1,8	1,78	17,6	2,60
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	11,3	10,32	33,2	10,89
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	12,2	11,28	37,6	11,87
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	11,1	9,38	37,9	12,46
	Clase V. Trabajadores no cualificados	11,5	11,76	36,1	14,06
	NS/NC	14,9	11,27	39,6	11,60
Intensidad	Ninguno	15,8	12,68	43,5	14,21
	De 1 a 10	12,8	11,40	33,8	13,15
	De 11 a 19	10,1	8,72	34,7	12,26
	20 y más	10,4	9,25	39,4	10,87
	Total	11,6	10,39	36,9	12,47

Tabla A.14. Valoración del esfuerzo realizado para dejar de fumar en función de diferentes características personales (% horizontales)

		Nada (1)	Poco (2)	Bastante (3)	Mucho (4)	(1+2)	(3+4)
Género	Hombre	33,5	35,4	14,5	16,6	68,9	31,1
	Mujer	42,1	28,0	20,4	9,5	70,1	29,9
Edad	15-19 años	26,4	50,9	22,7	0,0	77,3	22,7
	20-24 años	31,2	58,7	10,1	0,0	89,9	10,1
	25-29 años	44,3	26,6	14,0	15,1	70,9	29,1
	30-34 años	32,3	38,9	19,1	9,8	71,1	28,9
	35-44 años	27,9	26,4	25,4	20,2	54,4	45,6
	45-54 años	38,5	26,7	22,8	12,0	65,2	34,8
	55-64 años	39,7	37,8	12,1	10,5	77,4	22,6
	65-74 años	47,5	32,1	3,5	16,9	79,6	20,4
T.H.	Araba	33,5	34,7	11,1	20,7	68,2	31,8
	Bizkaia	42,0	28,7	18,2	11,0	70,8	29,2
	Gipuzkoa	29,1	38,1	16,9	15,9	67,2	32,8
Actividad	Trabaja	31,2	32,4	21,5	15,0	63,5	36,5
	En paro	63,9	22,0	2,6	11,5	85,9	14,1
	Amo o ama de casa	43,3	32,2	15,6	9,0	75,4	24,6
	Jubilado/a,pensionista,invalidéz	43,3	32,8	9,3	14,7	76,0	24,0
	Estudiante	35,9	44,6	19,5	0,0	80,5	19,5
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	21,9	38,3	27,6	12,1	60,3	39,7
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	36,0	21,7	21,4	20,9	57,7	42,3
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	36,2	35,1	15,3	13,4	71,3	28,7
	Clase V. Trabajadores no cualificados	52,3	26,3	7,7	13,7	78,6	21,4
	NS/NC	49,1	35,4	11,9	3,6	84,5	15,5
	Total	37,0	32,4	16,9	13,7	69,4	30,6

Tabla A.15. Proporción de fumadores y exfumadores que valoran como mucho o bastante la importancia de cada una de las razones en función de diferentes características personales (%)

		1	2	3	4	5	6	7	8
Género	Hombre	22,0	14,7	23,8	3,3	15,6	2,7	8,9	2,8
	Mujer	15,2	14,0	24,3	23,7	19,2	2,6	3,9	2,2
Edad	15-19 años	2,6	28,5	17,6	4,0	1,3	0,0	14,3	0,0
	20-24 años	15,9	23,2	14,3	6,1	13,6	1,3	10,7	4,1
	25-29 años	9,8	8,2	19,7	18,3	10,5	2,4	8,5	2,8
	30-34 años	13,3	10,9	25,1	17,0	17,4	2,5	7,6	3,2
	35-44 años	19,2	13,5	27,2	19,4	17,3	4,6	5,6	4,1
	45-54 años	15,2	13,1	18,4	10,3	15,8	3,4	7,8	2,8
	55-64 años	28,6	15,5	31,9	6,3	19,9	0,0	4,3	0,0
	65-74 años	33,0	16,8	27,5	2,2	26,3	2,4	4,2	1,4
T.H.	Araba	32,7	23,7	34,9	13,2	15,9	3,4	4,3	4,1
	Bizkaia	15,8	12,5	20,0	10,7	19,4	3,0	4,9	2,5
	Gipuzkoa	19,0	13,6	26,4	13,5	13,4	1,7	11,4	2,1
Actividad	Trabaja	17,4	14,3	23,4	10,1	16,0	3,5	8,8	3,6
	En paro	22,7	10,1	17,7	16,6	29,7	4,0	0,0	3,8
	Amo o ama de casa	11,0	11,6	21,6	31,9	6,4	0,0	0,0	0,0
	Jubilado/a,pensionista,invalidez	30,6	15,2	31,1	4,4	25,9	1,4	6,3	0,8
	Estudiante	12,2	24,9	19,4	7,9	7,4	1,9	8,0	1,9
Ocupación	Clase I. Directivos y profesionales liberales	11,2	12,1	22,6	12,2	12,7	1,8	7,5	1,6
	Clase III. Cuadros y mandos intermedios	21,1	10,4	25,3	12,3	19,0	1,8	9,2	4,1
	Clase IV. Trabajadores manuales cualificados	20,6	15,2	26,6	11,7	16,6	3,4	7,2	3,3
	Clase V. Trabajadores no cualificados	22,3	18,7	16,3	13,6	23,1	3,1	5,0	0,5
	NS/NC	16,4	11,6	25,5	7,9	13,4	0,0	1,1	1,8
TOTAL		19,1	14,4	24,0	11,9	17,1	2,7	6,8	2,6

- | |
|---|
| 1 Recomendación del médico
2 Presión de la familia
3 Por miedo al cáncer u otras enfermedades pulmonares
4 Embarazo (también marido)
5 Tuve un problema de salud concreto
6 Por la imposibilidad de fumar en el trabajo
7 Me impedía hacer deporte
8 Porque en enero de 2006 no se va a poder fumar en el trabajo y otros lugares públicos |
|---|

**ANEXO III.
EL CONSUMO DE CANNABIS EN LA CAPV**

Tabla A.1. Medidas de asociación entre el consumo experimental (una vez en la vida) y las variables independientes

	χ^2	Significación	Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal	Asociación
Sexo	46,498	,000	,151	,152	--	,085	,023	Baja
Edad	418,426	,000	,416	--	,457	,142	,209	Moderada
Territorio Histórico	0,866	,649	,021	--	,021	,000	,000	Ninguna
Tamaño municipio	9,002	,061	,067	--	,067	,000	,004	Ninguna
Grupo socio-profesional	79,858	,000	,196	--	,200	,000	,040	Baja
Nivel estudios	140,527	,000	,256	--	,265	,017	,070	Baja
Fumador habitual	153,905	,000	,267	,277	--	,105	,077	Baja
Bebedor excesivo o riesgo	169,062	,000	,279	,290	--	,161	,084	Baja
Consumidor otra droga ilegal último mes	41,150	,000	,142	,143	--	,043	,021	Baja
Consumidor otra droga ilegal último año	93,695	,000	,211	216	--	,087	,047	Baja

Tabla A.2. Medidas de asociación entre el consumo de cannabis en el último año y las variables independientes

	χ^2	Significación	Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal	Asociación
Sexo	1,266	,261	,042	,042	--	,000	,002	Ninguna
Edad	135,814	,000	,397	--	,433	,211	,187	Moderada
Territorio Histórico	11,766	,003	,126	--	,127	,000	,016	Baja
Tamaño municipio	2,562	,634	,059	--	,059	,000	,004	Ninguna
Grupo socio-profesional	11,766	,003	,126	--	,127	,000	,016	Baja
Nivel estudios	14,144	,007	,138	--	,140	,000	,019	Baja
Edad inicio cannabis	72,921	,000	,302	,317	--	,136	,101	Moderada
Fumador habitual	42,641	,000	,236	,242	--	,021	,059	Baja
Bebedor excesivo o riesgo	67,671	,000	,292	,305	--	,179	,093	Baja
Consumidor otra droga ilegal último mes	56,460	,000	,269	,279	--	,136	,078	Baja
Consumidor otra droga ilegal último año	92,720	,000	,337	,357	--	,218	,128	Moderada

Tabla A.3. Medidas de asociación entre el consumo de cannabis diario y casi diario en el último año y las variables independientes

	χ^2	Significación	Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal	Asociación
Sexo	4,280	,039	,077	,077	--	,000	,006	Despreciable
Edad	27,492	,000	,191	--	,194	,000	,038	Baja
Territorio Histórico	2,066	,356	,053	--	,053	,000	,003	Ninguna
Tamaño municipio	24,411	,000	,180	--	,183	,000	,034	Baja
Grupo socio-profesional*	24,411	,000	,180	--	,183	,000	,034	Baja
Nivel estudios	14,530	,001	,140	--	,141	,000	,020	Baja
Edad inicio cannabis	50,466	,000	,255	--	,264	,000	,070	Baja
Fumador habitual	35,549	,000	,216	,221	--	,000	,049	Baja
Bebedor excesivo o riesgo	16,667	,000	,150	,152	--	,000	,023	Baja
Consumidor otra droga ilegal último mes	60,744	,000	,278	,289	--	,000	,084	Baja
Consumidor otra droga ilegal último año	82,023	,000	,319	,336	--	,000	,113	Baja

*1 celda con frecuencias esperadas menor que 5.

Tabla A.4. Medidas de asociación entre la edad media de inicio en el consumo de cannabis y las variables independientes

	χ^2	Significación	Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal	Coefficiente de correlación r de Pearson*	Asociación
Sexo	5,750	,124	,089	,089	--	,013	,008	--	Ninguna
Edad	169,000	,000	,435	--	,279	,140	,076	,505	Importante
Territorio Histórico	6,813	,338	,096	--	,068	,035	,003	--	Ninguna
Tamaño municipio	10,090	,608	,117	--	,117	,008	,004	--	Ninguna
Grupo socio-profesional	13,600	,327	,135	--	,079	,034	,006	--	Ninguna
Nivel estudios	34,164	,000	,212	,217	--	,025	,013	--	Baja
Fumador habitual	14,285	,003	,139	,140	--	,052	,006	--	Baja
Bebedor excesivo o riesgo	36,819	,000	,220	,225	--	,044	,014	--	Baja
Consumidor otra droga ilegal último mes	21,544	,000	,170	,172	--	,027	,010	--	Baja
Consumidor otra droga ilegal último año	41,979	,000	,234	,240	--	,046	,018	--	Baja

*Para la aplicación del coeficiente de correlación R de Pearson tanto la variable edad del encuestado como la edad de inicio en el cannabis han sido tratadas como numéricas.

Tabla A.5. Variables objeto de análisis

Variables independientes	Categorías
Sexo	[hombres, mujeres]
Edad	[15-24, 25-34, 35-44, más de 44]
Territorio Histórico	[Araba, Bizkaia, Gipuzkoa]
Tamaño de municipio	[menos de 2.500 hab., 2.500-10.000 hab., 10.001-40.000 hab., 40.001 a 150.000 hab., capitales]
Grupo socio-profesional	[clase I: directivos y profesionales liberales, clase III: cuadros y mandos intermedios, clase IV: trabajadores manuales cualificados, clase V: trabajadores no cualificados, no sabe o no contesta]
Nivel de estudios	[Sin estudios y primarios, secundarios, universitarios]
Edad de inicio	[15 y menos, de 16 a 17, de 18 a 19, 19 y más]
Bebedor excesivo y de riesgo	[sí, no]
Consumo de otra sustancia ilegal (excepto cannabis) en el último mes	[sí, no]
Consumo de otra sustancia ilegal (excepto cannabis) en el último año	[sí, no]
Variables dependientes	Categorías
Consumo de cannabis una vez en la vida	[sí, no]
Consumo de cannabis en el último año	[sí, no]
Consumo de cannabis diario o casi diario	[sí, no]
Edad de inicio en el consumo de cannabis	[15 y menos, de 16 a 17, de 18 a 19, 19 y más]

Tabla A.6. Nivel de significación y coeficientes de asociación

	Para tablas de contingencia	Variables	Interpretación
Nivel de significación	--	--	Para cada par de variables se asume un nivel de significación no superior a 0,05, es decir, siempre que no se sobrepase el 5% de probabilidades de error al rechazar la hipótesis nula (h_0), que es aquella que permite descartar diferencias significativas entre las variables.
χ^2	Cualquier tamaño	Nominal	Evalúa la hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas.
Coefficiente de contingencia	Cualquier tamaño	Nominal	Si su valor mínimo es 0 indica ausencia de correlación. Su valor máximo, sin embargo, depende del tamaño de la tabla de contingencia.
Phi	2 x 2	Nominal	Varía de 0 a +1, implicando 0 una ausencia de correlación y, +1, una correlación perfecta.
V de Cramer	Mayores de 2 x 2	Nominal	Es un ajuste de Phi en cuadros mayores de 2 x 2. Tiene un mínimo de 0 (ninguna asociación) y un máximo que depende del número de filas y columnas.
λ de Goodman	Cualquier tamaño	Nominal	Varía de 0 a +1, donde +1 significa que puede predecirse sin error a la variable dependiente definida en la tabla, sobre la base de la independiente.
τ de Goodman y Kruskal	Cualquier tamaño	Nominal	Al igual que la λ de Goodman, varía de 0 a +1
Coefficiente de correlación r de Pearson	--	Numérica	Prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Puede ir de -1 a +1.

**ANEXO IV.
CONSUMO DE PSICOFÁRMACOS**

Tabla 1.1. Medidas de asociación entre el consumo de tranquilizantes a lo largo de la vida y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal	Asociación
Edad	61,497	,000	p<,005	,172	--	,175	,015	,031	
Género	43,420	,000	p<,005	,146	,147	--	,081	,022	
Territorio Histórico	6,890	,032	p<,05	,059	--	,059	,000	,003	
Tamaño Municipio	6,553	,088	--	,057	--	,057	,000	,003	
Actividad	102,384	,000	p<,005	,221	--	,226	,000	,051	
Nivel de estudios	15,299	,000	p<,005	,087	--	,087	,000	,008	
Estado civil	37,986	,000	p<,005	,137	--	,138	,000	,019	
Fumador habitual	1,694	,193	--	,029	--	,029	,000	,001	
Bebedor excesivo o riesgo	,170	,680	--	,009	,009	--	,000	,000	
Consumo de cannabis en el último año	12,625	,000	p<,005	,079	,079	--	,000	,006	
Consumo de alguna droga ilegal – excepto cannabis– en el último año	6,378	,012	p<,05	,056	,056	--	,000	,003	

Tabla 1.2. Medidas de asociación entre el consumo de somníferos a lo largo de la vida y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal	Asociación
Edad	86,218	,000	p<,005	,203	--	,208	,018	,043	
Género	23,241	,000	p<,005	,107	,108	--	,053	,012	
Territorio Histórico	,292	,864	--	,012	--	,012	,000	,000	
Tamaño Municipio	2,391	,495	--	,035	--	,035	,000	,001	
Actividad	62,529	,000	p<,005	,174	--	,177	,000	,031	
Nivel de estudios	12,025	,002	p<,005	,077	--	,078	,000	,006	
Estado civil	38,363	,000	p<,005	,137	--	,139	,000	,019	
Fumador habitual	2,239	,135	--	,033	,033	--	,000	,001	
Bebedor excesivo o riesgo	5,020	,025	p<,05	,050	,050	--	,000	,003	
Consumo de cannabis en el último año	11,169	,001	p<,005	,074	,075	--	,000	,006	
Consumo de alguna droga ilegal – excepto cannabis– en el último año	,259	,611	--	,011	,011	--	,000	,000	

Tabla 1.3. Medidas de asociación entre el consumo de antidepresivos a lo largo de la vida y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal	Asociación
Edad	54,020	,000	p<,005	,162	--	,164	,016	,027	
Género	25,114	,000	p<,005	,111	,112	--	,053	,013	
Territorio Histórico	,476	,788	--	,015	--	,015	,000	,000	
Tamaño Municipio	3,941	,268	--	,044	--	,044	,000	,002	
Actividad	57,997	,000	p<,005	,168	--	,170	,000	,029	
Nivel de estudios	12,836	,002	p<,005	,080	--	,080	,000	,006	
Estado civil	82,844	,000	p<,005	,200	--	,204	,000	,041	
Fumador habitual	,676	,411	--	,018	,018	--	,000	,000	
Bebedor excesivo o riesgo	1,150	,284	--	,024	,024	--	,000	,001	
Consumo de cannabis en el último año	12,683	,000	p<,005	,079	,080	--	,000	,006	
Consumo de alguna droga ilegal – excepto cannabis– en el último año	4,973	,026	p<,05	,050	,050	--	,000	,002	

Tabla 1.4. Medidas de asociación entre el consumo de tranquilizantes en el último año y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal	Asociación
Edad	61,497	,000	p<,005	,178	--	,181	,017	,033	
Género	20,127	,000	p<,005	,100	,100	--	,050	,010	
Territorio Histórico	8,858	,012	p<,05	,066	--	,066	,000	,004	
Tamaño Municipio	1,047	,790	--	,023	--	,023	,000	,001	
Actividad	67,154	,000	p<,005	,180	--	,183	,000	,034	
Nivel de estudios	10,469	,005	p<,005	,072	--	,072	,000	,005	
Estado civil	24,763	,000	p<,005	,111	--	,111	,000	,012	
Fumador habitual	,477	,490	--	,015	,015	--	,000	,000	
Bebedor excesivo o riesgo	,814	,367	--	,020	,020	--	,000	,000	
Consumo de cannabis en el último año	11,576	,001	p<,005	,076	,076	--	,000	,000	
Consumo de alguna droga ilegal – excepto cannabis– en el último año	4,261	,039	p<,05	,046	,046	--	,000	,002	

Tabla 1.5. Medidas de asociación entre el consumo de somníferos en el último año y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal	Asociación
Edad	67,774	,000	p<,005	,181	--	,184	,017	,034	
Género	16,441	,000	p<,005	,090	,091	--	,040	,008	
Territorio Histórico	,060	,970	--	,005	--	,005	,000	,000	
Tamaño Municipio	2,886	,409	--	,038	--	,038	,000	,001	
Actividad	44,343	,000	p<,005	,147	--	,149	,000	,022	
Nivel de estudios	3,976	,137	--	,045	--	,045	,000	,002	
Estado civil	31,485	,000	p<,005	,125	--	,125	,000	,016	
Fumador habitual	,094	,759	--	,007	,007	--	,000	,000	
Bebedor excesivo o riesgo	3,072	,080	--	,039	,039	--	,000	,002	
Consumo de cannabis en el último año	9,214	,002	p<,005	,068	,068	--	,000	,005	
Consumo de alguna droga ilegal – excepto cannabis– en el último año	1,621	,203	--	,028	,028	--	,000	,001	

Cuadro 1.6. Medidas de asociación entre el consumo de antidepresivos en el último año y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal	Asociación
Edad	43,173	,000	p<,005	,145	--	,147	,014	,022	
Género	9,473	,002	p<,005	,069	,069	--	,027	,005	
Territorio Histórico	,611	,737	--	,017	--	,017	,000	,000	
Tamaño Municipio	4,108	,250	--	,045	--	,045	,000	,002	
Actividad	40,536	,000	p<,005	,141	--	,142	,000	,020	
Nivel de estudios	6,992	,030	p<,05	,059	--	,059	,000	,003	
Estado civil	44,880	,000	p<,005	,148	--	,150	,000	,022	
Fumador habitual	1,422	,233	--	,027	,027	--	,000	,001	
Bebedor excesivo o riesgo	2,934	,087	--	,038	,038	--	,000	,001	
Consumo de cannabis en el último año	12,019	,001	p<,005	,077	,077	--	,000	,006	
Consumo de alguna droga ilegal – excepto cannabis– en el último año	2,300	,129	--	,034	,034	--	,000	,001	

Tabla 1.7. Medidas de asociación entre el consumo de psicofármacos a lo largo de la vida y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal	Asociación
Edad	113,892	,000	p<,005	,232	--	,238	,019	,057	
Género	67,784	,000	p<,005	,181	,184	--	,105	,034	
Territorio Histórico	1,822	,402		,030	--	,030	,000	,001	
Tamaño Municipio	9,859	,020	p<,05	,070	--	,070	,000	,005	
Actividad	146,839	,000	p<,005	,262	--	,271	,000	,073	
Nivel de estudios	23,463	,000	p<,005	,108	--	,108	,000	,012	
Estado civil	84,377	,000	p<,005	,201	--	,206	,000	,042	
Fumador habitual	,996	,318		,022	,022	--	,000	,000	
Bebedor excesivo o riesgo	,523	,470	--	,016	,016	--	,000	,000	
Consumo de cannabis en el último año	15,668	,000	p<,005	,088	,088	--	,000	,008	
Consumo de alguna droga ilegal – excepto cannabis– en el último año	6,406	,011	p<,05	,057	,057	--	,000	,003	

Tabla 1.8. Medidas de asociación entre el consumo de psicofármacos en el último año y las variables independientes

	χ^2	Significación		Coefficiente de contingencia	Phi	V de Cramer	λ de Goodman	τ de Goodman y Kruskal	Asociación
Edad	100,888	,000	p<,005	,219	--	,224	,022	,050	
Género	36,570	,000	p<,005	,134	,135	--	,073	,018	
Territorio Histórico	1,073	,585	--	,023	--	,023	,000	,001	
Tamaño Municipio	8,758	,033	p<,05	,066	--	,066	,000	,004	
Actividad	92,829	,000	p<,005	,211	--	,215	,000	,046	
Nivel de estudios	12,184	,002	p<,005	,078	--	,078	,000	,006	
Estado civil	47,866	,000	p<,005	,153	,155	--	,000	,024	
Fumador habitual	,106	,744	--	,007	,007	--	,000	,000	
Bebedor excesivo o riesgo	1,299	,254	--	,025	,025	--	,000	,001	
Consumo de cannabis en el último año	12,693	,000	p<,005	,079	,080	--	,000	,006	
Consumo de alguna droga ilegal – excepto cannabis– en el último año	3,090	,079	--	,039	,039	--	,000	,002	

**ANEXO V.
CONSUMO DE DROGAS ILEGALES EN LA CAPV**

Tabla A.1. Prevalencias de consumo experimental, reciente y actual de anfetaminas por sexo y tramos de edad (%)

		Consumo en la vida	Consumo último año	Consumo último mes
Hombre	15-19 años	11,2	6,5	3,7
	20-24 años	21,5	11,3	2,8
	25-29 años	20,9	5,0	4,1
	30-34 años	21,3	9,1	4,5
	35-44 años	20,6	2,4	1,0
	45-54 años	4,7	1,1	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,9	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	12,1	3,5	1,6
	TOTAL 15-34	19,6	7,9	3,9
Mujer	15-19 años	7,8	3,8	1,4
	20-24 años	7,9	2,5	1,1
	25-29 años	12,5	4,9	3,0
	30-34 años	12,9	3,8	2,2
	35-44 años	6,7	0,0	0,0
	45-54 años	2,9	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	5,5	1,3	0,7
	TOTAL 15-34	10,8	3,9	2,0

Tabla A.2. Frecuencia de consumo de anfetaminas en el último año y en el último mes por sexo y edad (%)

	Género		Edad								TOTAL 15-74	TOTAL 15-34
	Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	30-34	35-44	45-54	55-64	65-74		
<i>ULTIMO AÑO</i>												
A diario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 a 6 días a la semana	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
1 a 3 días a la semana	0,3	0,1	0,0	0,0	0,8	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4
1 a 3 días al mes	0,6	0,2	1,6	2,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0
6 a 11 días al año	0,8	0,1	0,8	2,0	0,4	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0
1 a 5 días al año	1,8	0,8	2,8	2,7	3,5	4,3	0,0	0,5	0,0	0,0	1,3	3,4
No consume	96,5	98,7	94,8	93,0	95,0	93,5	98,8	99,5	100,0	100,0	97,6	94,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>ULTIMO MES</i>												
A diario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
De 4 a 6 días a la semana	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
De 1 a 3 días a la semana	0,4	0,0	0,3	0,0	1,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4
De 1 a 3 días al mes	1,2	0,6	2,3	2,0	2,5	3,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,9	2,5

No consume	98,4	99,3	97,4	98,0	96,4	96,6	99,5	100,0	100,0	100,0	98,9	97,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabla A.3. Prevalencias de consumo experimental, reciente y actual de cocaína y base por sexo y tramos de edad (%)

		Consumo en la vida	Consumo último año	Consumo último mes
Hombre	15-19 años	7,7	4,0	2,1
	20-24 años	22,9	13,0	5,4
	25-29 años	24,9	11,6	8,5
	30-34 años	21,4	6,8	4,5
	35-44 años	14,4	2,6	0,8
	45-54 años	5,5	1,1	0,0
	55-64 años	1,3	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	11,4	4,0	2,1
	TOTAL 15-34	20,6	9,2	5,5
Mujer	15-19 años	7,8	3,8	2,2
	20-24 años	6,9	4,4	1,8
	25-29 años	10,9	3,4	2,2
	30-34 años	13,0	3,0	1,4
	35-44 años	6,1	0,5	0,5
	45-54 años	1,0	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	4,8	1,3	0,7
	TOTAL 15-34	10,2	3,5	1,8

Tabla A.4. Frecuencia de consumo de cocaína/base en el último año y en el último mes por sexo y edad (%)

	Género		Edad								TO-TAL 15-74	TO-TAL 15-34
	Hom-bre	Mu-jer	15-19	20-24	25-29	30-34	35-44	45-54	55-64	65-74		
<i>ULTIMO AÑO</i>												
A diario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 a 6 días a la semana	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
1 a 3 días a la semana	0,1	0,1	0,0	0,0	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
1 a 3 días al mes	0,8	0,5	2,8	2,8	1,8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	1,6
6 a 11 días al año	0,6	0,1	0,0	1,5	1,3	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9
1 a 5 días al año	2,3	0,5	1,0	4,5	3,6	3,7	0,7	0,5	0,0	0,0	1,4	3,4
No consume	96,0	98,7	96,1	91,2	92,4	95,0	98,4	99,5	100,0	100,0	97,4	93,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>ULTIMO MES</i>												
A diario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
De 4 a 6 días a la semana	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
De 1 a 3 días a la semana	0,2	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3

na													
De 1 a 3 días al mes	1,8	0,7	1,6	3,6	4,2	3,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,3	3,3	
No consume	97,9	99,3	97,8	96,4	94,6	97,0	99,4	100,0	100,0	100,0	98,6	96,3	
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Tabla A.5. Prevalencias de consumo experimental, reciente y actual de éxtasis por sexo y tramos de edad (%)

		Consumo en la vida	Consumo último año	Consumo último mes
Hombre	15-19 años	0,5	0,5	0,0
	20-24 años	8,8	2,3	1,1
	25-29 años	10,0	1,5	0,9
	30-34 años	8,2	1,1	0,0
	35-44 años	4,4	0,5	0,5
	45-54 años	1,1	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	3,8	0,6	0,3
	TOTAL 15-34	7,6	1,4	0,5
Mujer	15-19 años	2,2	1,4	1,4
	20-24 años	4,3	2,5	1,0
	25-29 años	4,9	1,8	1,1
	30-34 años	4,4	0,8	0,0
	35-44 años	0,0	0,0	0,0
	45-54 años	0,0	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	1,4	0,5	0,3
	TOTAL 15-34	4,2	1,6	0,8

Tabla A.6. Frecuencia de consumo éxtasis en el último año y en el último mes por sexo y edad (%)

	Género		Edad								TOTAL 15-74	TOTAL 15-34
	Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	30-34	35-44	45-54	55-64	65-74		
ULTIMO AÑO												
A diario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 a 6 días a la semana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 a 3 días a la semana	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
1 a 3 días al mes	0,1	0,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
6 a 11 días al año	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
1 a 5 días al año	0,4	0,3	0,0	0,9	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0
No consume	99,4	99,5	99,0	97,6	98,4	99,0	99,7	100,0	100,0	100,0	99,4	98,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ULTIMO MES												
A diario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
De 4 a 6 días a la semana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

De 1 a 3 días a la semana	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
De 1 a 3 días al mes	0,2	0,3	0,7	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7
No consume	99,7	99,7	99,3	98,9	99,0	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	99,7	99,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabla A.7. Prevalencias de consumo experimental, reciente y actual de LSD por sexo y tramos de edad (%)

		Consumo en la vida	Consumo último año	Consumo último mes
Hombre	15-19 años	10,9	9,7	9,2
	20-24 años	8,2	3,7	2,8
	25-29 años	13,7	1,5	0,0
	30-34 años	7,1	0,0	0,0
	35-44 años	9,9	0,5	0,5
	45-54 años	2,8	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	6,1	1,1	0,9
	TOTAL 15-34	9,9	2,8	2,1
Mujer	15-19 años	8,4	6,2	6,2
	20-24 años	5,9	2,1	1,0
	25-29 años	9,3	2,6	1,1
	30-34 años	3,7	0,0	0,0
	35-44 años	2,1	0,0	0,0
	45-54 años	0,0	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	2,6	0,7	0,5
	TOTAL 15-34	6,7	2,3	1,6

Tabla A.8. Prevalencias de consumo experimental, reciente y actual de setas alucinógenas por sexo y tramos de edad (%)

		Consumo en la vida	Consumo último año	Consumo último mes
Hombre	15-19 años	8,0	1,6	1,8
	20-24 años	15,2	5,0	0,0
	25-29 años	13,0	0,6	0,0
	30-34 años	9,3	0,6	0,0
	35-44 años	2,7	0,9	0,0
	45-54 años	2,8	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	5,1	0,8	0,1
	TOTAL 15-34	11,5	1,7	0,3
Mujer	15-19 años	5,2	0,0	0,0
	20-24 años	2,8	1,1	0,0
	25-29 años	9,7	1,1	0,0
	30-34 años	5,7	0,0	0,0
	35-44 años	1,0	0,0	0,0

	45-54 años	0,0	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	2,2	0,2	0,0
	TOTAL 15-34	6,2	0,6	0,0

Tabla A.9. Prevalencias de consumo experimental, reciente y actual de sustancias inhalables por sexo y tramos de edad (%)

		Consumo en la vida	Consumo último año	Consumo último mes
Género	Hombre	0,6	0,0	0,0
	Mujer	0,2	0,0	0,0
Edad	15-19 años	0,7	0,0	0,0
	20-24 años	0,8	0,0	0,0
	25-29 años	0,0	0,0	0,0
	30-34 años	0,7	0,0	0,0
	35-44 años	1,0	0,0	0,0
	45-54 años	0,0	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
TOTAL 15-74		0,4	0,0	0,0
TOTAL 15-34		0,5	0,0	0,0

Tabla A.10. Prevalencias de consumo experimental, reciente y actual de ketamina por sexo y tramos de edad (%)

		Consumo en la vida	Consumo último año	Consumo último mes
Género	Hombre	1,2	0,0	0,0
	Mujer	0,4	0,1	0,1
Edad	15-19 años	1,0	1,0	1,0
	20-24 años	2,2	0,0	0,0
	25-29 años	2,8	0,0	0,0
	30-34 años	2,2	0,0	0,0
	35-44 años	0,2	0,0	0,0
	45-54 años	0,0	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
TOTAL 15-74		0,8	0,1	0,1
TOTAL 15-34		2,2	0,2	0,2

Tabla A.11. Frecuencia de consumo de LSD en el último año y en el último mes por sexo y edad (%)

	Género		Edad								TO-TAL 15-74	TO-TAL 15-34
	Hom-bre	Mu- jer	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74		
<i>ULTIMO AÑO</i>												
A diario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 a 6 días a la semana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 a 3 días a la semana	0,4	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4
1 a 3 días al mes	0,4	0,4	4,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1
6 a 11 días al año	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
1 a 5 días al año	0,3	0,4	0,6	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9
No consume	98,9	99,3	92,0	97,1	98,0	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	99,1	97,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>ULTIMO MES</i>												
A diario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
De 4 a 6 días a la semana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
De 1 a 3 días a la semana	0,4	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4
De 1 a 3 días al mes	0,5	0,5	5,5	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5
No consume	99,1	99,5	92,2	98,1	99,5	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	99,3	98,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabla A.12. Frecuencia de consumo de setas alucinógenas en el último año y en el último mes por sexo y edad (%)

	Género		Edad								TOTAL 15-74	TOTAL 15-34
	Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	30-34	35-44	45-54	55-64	65-74		
<i>ULTIMO AÑO</i>												
A diario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 a 6 días a la semana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 a 3 días a la semana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 a 3 días al mes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 a 11 días al año	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
1 a 5 días al año	0,7	0,2	0,8	2,7	0,8	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1
No consume	99,2	99,8	99,2	96,9	99,2	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	99,5	98,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>ULTIMO MES</i>												
A diario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
De 4 a 6 días a la semana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
De 1 a 3 días a la semana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
De 1 a 3 días al mes	0,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
No consume	99,9	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,8

Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tabla A. 13. Prevalencia del consumo experimental de drogas ilegales en Europa (%)

	Año de realización de la encuesta	Franja de edad	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	LSD
CAPV	2006	15-74	8,1	8,8	2,6	4,3
Bélgica	2001	15-64	--	2,1	--	--
República checa	2002	18-64	--	2,3	4,0	2,2
Dinamarca	2000	16-64	2,5	5,9	1,0	1,4
Alemania	2003	18-59	3,2	3,4	2,4	2,5
Estonia	2003	--	--	--	--	--
Grecia	2004	15-64	0,7	0,1	0,4	0,3
España	2003	15-64	5,9	3,2	4,6	3,0
Francia	2005	15-64	2,8	1,5	2,0	1,6
Irlanda	2002-03	15-64	3,1	3,0	3,8	3,0
Italia	2003	15-54	4,6	1,9	1,8	2,1
Chipre	2003	15-65	1,1	1,4	4,3	0,2
Letonia	2003	15-64	1,2	2,6	2,4	1,1
Luxemburgo	1998	15-64	0,2	--	1,2	1,4
Hungría	2003	18-54	1,0	2,5	3,1	1,7
Holanda	2001	15-64	3,6	3,1	3,6	1,3
Malta	2001	18-64	0,4	0,4	0,7	0,5
Polonia	2002	16-64	0,8	1,9	0,7	1,2
Portugal	2001	15-64	0,9	0,5	0,7	0,4
Eslovaquia	2002	18-64	1,0	0,8	1,8	--
Finlandia	2002	15-64	0,7	2,2	1,4	0,8
Suecia	2004	18-64	--	--	--	--
Reino Unido	2002-03	15-64	1,7	3,9	5,9	4,5
Reino Unido	2003-04	16-59	6,8	12,2	6,9	6,1
Noruega	1999	15-64	2,2	3,8	1,3	--

Fuente: Informe OEDT, 2005. Para Francia, datos del Barómetro de Salud, 2005 y 2000. En Bélgica, la prevalencia de consumo de anfetaminas aúna anfetaminas y éxtasis. En España, los datos referentes al LSD incluyen todas las sustancias alucinógenas.

Tabla A.14. Prevalencia del consumo reciente de drogas ilegales en Europa, EE.UU. y Australia (%)

	Año de realización de la encuesta	Franja de edad	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	LSD
CAPV	2006	15-74	2,6	2,4	0,6	0,9
República checa	2002	18-64	--	1,1	2,5	1,0
Dinamarca	2000	16-64	0,8	1,3	0,5	0,2
Alemania	2003	18-59	1,0	0,9	0,8	0,3
Estonia	2003	--	0,6	1,3	1,7	0,3
Grecia	2004	15-64	0,1	0,0	0,2	0,1
España	2003	15-64	2,7	0,8	1,4	0,6
Francia	2005	18-74	0,6	0,2	0,5	0,1
Irlanda	2002-03	15-64	1,1	0,4	1,1	0,1
Italia	2003	15-54	1,2	0,2	0,4	0,2
Chipre	2003	15-65	0,7	0,2	2,5	--
Letonia	2003	15-64	0,2	1,1	0,8	0,5

	Año de realización de la encuesta	Franja de edad	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	LSD
Luxemburgo	1998	15-64	0,2	–	0,0	–
Hungría	2003	18-54	0,4	1,0	1,4	0,5
Holanda	2001	15-64	1,1	0,6	1,5	0,0
Malta	2001	18-64	0,3	0,0	0,2	0,1
Polonia	2002	16-64	0,5	0,7	0,2	0,4
Portugal	2001	15-64	0,3	0,1	0,4	0,1
Eslovaquia	2002	18-64	0,6	0,2	0,8	–
Finlandia	2002	15-64	0,3	0,5	0,5	0,1
Reino Unido	2002-03	15-64	0,4	0,8	1,7	0,0
Reino Unido	2003-04	16-59	2,5	1,5	2,0	0,2
Noruega	1999	15-64	0,6	1,2	0,7	–
Estados Unidos	2004	15-64	2,8	1,5	1,0	–
Australia	2004	15-64	1,2	3,8	4,0	–

Fuente: Informe OEDT, 2005. Para Francia, datos del Barómetro de Salud, 2005 y 2000. En Bélgica, la prevalencia de consumo de anfetaminas aúna anfetaminas y éxtasis. En España, los datos referentes al LSD incluyen todas las sustancias alucinógenas. Para datos respecto a Estados Unidos y Australia, Informe Mundial sobre Drogas, 2006.

Tabla A.15. Prevalencia del consumo actual de drogas ilegales en Europa (%)

	Año de realización de la encuesta	Franja de edad	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	LSD
CAPV	2006	15-74	1,4	1,1	0,3	0,7
Bélgica	2001	15-64	–	0,3	–	–
Dinamarca	2000	16-64	0,3	0,3	0,2	0,1
Alemania	2003	18-59	0,4	0,4	0,2	0,1
Estonia	2003		0,0	0,3	0,4	0,0
Grecia	2004	15-64	0,0	0,0	0,0	0,0
España	2003	15-64	1,1	0,2	0,4	0,2
Francia	2002	15-64	--	--	--	--
Irlanda	2002-03	15-64	0,3	0,2	0,3	0,0
Italia	2003	15-54	0,6	0,1	0,1	0,1
Chipre	2003	15-65	0,7	–	1,6	–
Letonia	2003	15-64	0,1	0,5	0,3	0,3
Luxemburgo	1998	15-64	0,2	–	0,0	0,0
Hungría	2003	18-54	0,2	0,4	0,4	0,2
Holanda	2001	15-64	0,5	0,3	0,6	0,0
Malta	2001	18-64	0,1	0,0	0,2	0,0
Polonia	2002	16-64	0,1	0,2	0,2	0,0
Portugal	2001	15-64	0,1	0,1	0,2	0,0
Eslovaquia	2002	18-64	0,0	0,1	0,1	–
Finlandia	2002	15-64	0,0	0,2	0,1	0,0
Reino Unido	2002-03	15-64	0,1	0,2	0,5	0,0
Reino Unido	2003-04	16-59	1,1	0,6	0,9	0,1
Noruega	1999	15-64	0,0	0,4	0,2	–

Fuente: Informe OEDT, 2005. Para Francia, datos del Barómetro de Salud, 2005 y 2000. En Bélgica, la prevalencia de consumo de anfetaminas aúna anfetaminas y éxtasis. En España, los datos referentes al LSD incluyen todas las sustancias alucinógenas.

Tabla A.16. Prevalencia del consumo experimental de drogas ilegales entre la población juvenil en Europa (%)

País	Año de realización de la encuesta	Franja de edad	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	LSD
CAPV	2006	15-34	15,5	15,3	5,9	8,4
Bélgica	2001	15-34	--	4,0	--	--
República checa	2002	18-34	--	4,3	8,8	4,7
Dinamarca	2000	16-34	4,5	9,6	2,6	1,3
Alemania	2003	18-34	5,0	5,4	5,3	3,4
Estonia	2003	15-34	8,9	4,7	8,3	4,7
Grecia	2004	15-34	1,0	0,2	0,6	0,4
España	2003	15-34	7,7	4,8	7,9	
Francia	2002	15-34	3,0	0,1	1,9	1,5
Irlanda	2002-03	15-34	4,8	4,9	7,1	4,6
Italia	2003	15-34	6,2	2,0	3,3	3,0
Chipre	2003	15-34	1,4	0,3	5,9	0,3
Letonia	2003	15-34	1,9	5,3	5,0	2,2
Luxemburgo	1998	15-34	0,3		1,9	1,3
Hungría	2003	18-34	1,5	4,5	5,6	3,1
Holanda	2001	15-34	5,1	5,1	7,4	1,6
Malta	2001	--	--	--	--	--
Polonia	2002	16-34	1,3	4,1	1,5	2,5
Portugal	2001	15-34	1,3	0,6	1,4	0,6
Eslovaquia	2002	18-34	2,2	1,7	3,9	
Finlandia	2002	15-34	1,5	4,1	3,4	1,7
Suecia	2004	18-34	--	--	--	--
Reino Unido	2002-03	15-34	2,9	7,0	11,5	7,7
Reino Unido	2003-04	16-34	11,6	18,4	13,6	9,2
Noruega	1999	15-34	3,3	5,4	2,5	--

Fuente: Informe OEDT, 2005. Para Francia, datos del Barómetro de Salud, 2005 y 2000. En Bélgica, la prevalencia de consumo de anfetaminas aúna anfetaminas y éxtasis. En España, los datos referentes al LSD incluyen todas las sustancias alucinógenas.

Tabla A.17. Prevalencia del consumo reciente de drogas ilegales entre la población juvenil en Europa (% horizontales respecto al conjunto de la población)

País	Año de realización de la encuesta	Franja de edad	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	LSD
CAPV	2006	15-34	6,4	5,9	1,5	2,6
República checa	2002	18-34	--	2,3	5,9	2,5
Dinamarca	2000	16-34	2,0	3,1	1,2	0,3
Alemania	2003	18-34	1,7	2,2	1,9	0,5
Estonia	2003	15-34	1,2	2,9	3,7	0,8
Grecia	2004	15-34	0,2	0,1	0,4	0,2
España	2003	15-34	0,9	0,2	0,1	0,2
Francia	2002	15-34	0,7	0,0	0,8	0,3
Irlanda	2002-03	15-34	2,0	0,8	2,2	0,2
Italia	2003	15-34	2,3	0,4	0,7	0,6
Chipre	2003	15-34	1,0	0,3	3,1	--
Letonia	2003	15-34	0,4	2,4	1,9	1,0

País	Año de realización de la encuesta	Franja de edad	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	LSD
Hungría	2003	18-34	0,7	1,9	2,6	0,8
Holanda	2001	15-34	2,1	1,2	3,2	0,1
Polonia	2002	16-34	1,3	1,6	0,5	1,0
Portugal	2001	15-34	0,6	0,1	0,8	0,2
Eslovaquia	2002	18-34	1,4	0,4	1,9	
Finlandia	2002	15-34	0,7	1,3	1,3	0,2
Reino Unido	2002-03	15-34	0,9	1,5	3,3	0,1
Reino Unido	2003-04	16-34	4,9	3,0	4,1	0,5
Noruega	1999	15-34	1,0	1,5	1,2	–

Fuente: Informe OEDT, 2005. Para Francia, datos del Barómetro de Salud, 2005 y 2000. En Bélgica, la prevalencia de consumo de anfetaminas aúna anfetaminas y éxtasis. En España, los datos referentes al LSD incluyen todas las sustancias alucinógenas.

Tabla A.18. Prevalencia del consumo actual de drogas ilegales entre la población juvenil en Europa (%)

	Año de realización de la encuesta	Franja de edad	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	LSD
CAPV	2006	15-34	3,7	3,0	0,7	1,9
Bélgica	2001	–	–	0,6		–
Dinamarca	2000	15-34	0,6	0,9	0,4	0,1
Alemania	2003	18-34	0,7	1,1	0,7	0,2
Estonia	2003	16-34	0,0	0,8	0,9	0,0
Grecia	2004	18-34	0,1	0,1	0,0	0,0
España	2003	18-34	0,4	0,1	0,0	0,0
Irlanda	2002-03	15-34	0,7	0,3	0,6	0,0
Italia	2003	15-34	1,2	0,2	0,2	0,3
Chipre	2003	15-34	1,0	–	2,4	–
Letonia	2003	15-34	0,1	1,1	0,6	0,6
Luxemburgo	1998	15-34	0,3	–	0,0	0,0
Hungría	2003	15-34	0,4	0,8	0,8	0,3
Holanda	2001	15-34	0,9	0,5	1,3	0,0
Polonia	2002	15-34	0,1	0,5	0,4	0,1
Portugal	2001		0,3	0,1	0,4	0,1
Eslovaquia	2002	16-34	0,0	0,2	0,2	–
Finlandia	2002	15-34	0,1	0,5	0,2	0,0
Reino Unido	2002-03	15-34	0,2	0,4	1,1	0,0
Reino Unido	2003-04	18-34	2,4	1,1	1,9	0,2
Noruega	1999	15-34	0,1	0,4	0,6	–

Fuente: Informe OEDT, 2005. Para Francia, datos del Barómetro de Salud, 2005 y 2000. En Bélgica, la prevalencia de consumo de anfetaminas aúna anfetaminas y éxtasis. En España, los datos referentes al LSD incluyen todas las sustancias alucinógenas.

Tabla A.19. Consumo experimental, reciente y actual de alguna droga ilegal por sexo y tramos de edad (%)

		VIDA	AÑO	MES
Hombre	15-19 años	25,5	18,5	16,4
	20-24 años	36,7	23,1	11,3
	25-29 años	33,7	12,7	10,2
	30-34 años	29,1	9,7	6,8
	35-44 años	24,3	3,6	1,3
	45-54 años	9,3	1,1	0,0
	55-64 años	1,3	0,0	0,0
	65-74 años	0,9	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	18,1	6,2	3,9
	TOTAL 15-34	31,6	15,0	10,4
Mujer	15-19 años	19,4	13,3	8,4
	20-24 años	15,2	8,5	4,9
	25-29 años	23,1	7,4	3,8
	30-34 años	19,9	3,8	2,2
	35-44 años	9,9	0,5	0,5
	45-54 años	3,9	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	9,2	2,6	1,5
	TOTAL 15-34	19,7	7,5	4,3
Total	15-19 años	22,5	15,9	12,5
	20-24 años	26,2	16,0	8,2
	25-29 años	28,6	10,1	7,1
	30-34 años	24,6	6,8	4,6
	35-44 años	17,2	2,1	0,9
	45-54 años	6,6	0,5	0,0
	55-64 años	0,7	0,0	0,0
	65-74 años	0,4	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	13,7	4,4	2,7
	TOTAL 15-34	25,8	11,4	7,4

Tabla A.20. Consumo experimental, reciente y actual de una sola droga ilegal por sexo y tramos de edad (%)

		VIDA	AÑO	MES
Hombre	15-19 años	16,1	15,6	15,3
	20-24 años	15,2	13,0	10,5
	25-29 años	13,3	8,8	7,9
	30-34 años	12,1	3,4	4,6
	35-44 años	9,0	1,7	0,3
	45-54 años	5,1	0,0	0,0
	55-64 años	1,3	0,0	0,0
	65-74 años	0,9	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	7,9	3,6	3,1
	TOTAL 15-34	13,8	9,2	8,7
Mujer	15-19 años	14,0	11,1	6,9
	20-24 años	9,4	5,2	4,9
	25-29 años	11,8	4,8	1,6
	30-34 años	9,0	0,8	0,8
	35-44 años	5,0	0,5	0,5
	45-54 años	2,9	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	5,1	1,6	1,1
	TOTAL 15-34	10,8	4,7	3,0
Total	15-19 años	15,1	13,4	11,2
	20-24 años	12,3	9,2	7,8
	25-29 años	12,6	6,8	4,8
	30-34 años	10,6	2,2	2,8
	35-44 años	7,0	1,1	0,4
	45-54 años	4,0	0,0	0,0
	55-64 años	0,7	0,0	0,0
	65-74 años	0,4	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	6,5	2,6	2,1
	TOTAL 15-34	12,3	7,0	5,9

Tabla A.20. Consumo experimental, reciente y actual de dos drogas ilegales por sexo y tramos de edad (%)

		VIDA	AÑO	MES
Hombre	15-19 años	6,4	2,3	1,0
	20-24 años	10,5	8,2	0,8
	25-29 años	6,5	2,4	1,5
	30-34 años	6,5	4,5	2,2
	35-44 años	6,2	0,5	0,5
	45-54 años	1,4	1,1	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	4,1	1,8	0,6
	TOTAL 15-34	7,4	4,3	1,5
Mujer	15-19 años	1,6	0,7	0,0
	20-24 años	1,5	2,5	0,0
	25-29 años	2,8	0,8	1,5
	30-34 años	3,5	2,2	1,4
	35-44 años	3,2	0,0	0,0
	45-54 años	1,0	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	1,7	0,5	0,3
	TOTAL 15-34	2,5	1,6	0,9
Total	15-19 años	4,1	1,6	0,5
	20-24 años	6,1	5,4	0,4
	25-29 años	4,7	1,6	1,5
	30-34 años	5,1	3,4	1,8
	35-44 años	4,7	0,2	0,2
	45-54 años	1,2	0,5	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	2,9	1,2	0,5
	TOTAL 15-34	5,0	3,0	1,2

Tabla A.21. Consumo experimental, reciente y actual de tres drogas ilegales por sexo y tramos de edad (%)

		VIDA	AÑO	MES
Hombre	15-19 años	1,1	0,0	0,0
	20-24 años	3,4	2,0	0,0
	25-29 años	3,8	0,0	0,9
	30-34 años	3,1	1,7	0,0
	35-44 años	3,8	1,4	0,5
	45-54 años	0,6	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	2,0	0,6	0,2
	TOTAL 15-34	3,1	1,0	0,3
Mujer	15-19 años	1,6	0,0	0,0
	20-24 años	1,8	0,7	0,0
	25-29 años	4,7	0,4	0,0
	30-34 años	4,4	0,8	0,0
	35-44 años	1,0	0,0	0,0
	45-54 años	0,0	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	1,3	0,2	0,0
	TOTAL 15-34	3,4	0,5	0,0
Total	15-19 años	1,4	0,0	0,0
	20-24 años	2,6	1,4	0,0
	25-29 años	4,3	0,2	0,5
	30-34 años	3,7	1,3	0,0
	35-44 años	2,4	0,7	0,3
	45-54 años	0,3	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	1,7	0,4	0,1
	TOTAL 15-34	3,3	0,8	0,1

Tabla A.22. Consumo experimental, reciente y actual de más de tres drogas ilegales por sexo y tramos de edad (%)

		VIDA	AÑO	MES
Hombre	15-19 años	1,8	0,5	0,0
	20-24 años	7,6	0,0	0,0
	25-29 años	10,1	1,5	0,0
	30-34 años	7,3	0,0	0,0
	35-44 años	5,3	0,0	0,0
	45-54 años	2,2	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	4,1	0,2	0,0
	TOTAL 15-34	7,3	0,5	0,0
Mujer	15-19 años	2,2	1,4	1,4
	20-24 años	2,5	0,0	0,0
	25-29 años	3,8	1,4	0,7
	30-34 años	3,0	0,0	0,0
	35-44 años	0,7	0,0	0,0
	45-54 años	0,0	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	1,1	0,2	0,1
	TOTAL 15-34	3,0	0,7	0,4
Total	15-19 años	2,0	1,0	0,7
	20-24 años	5,1	0,0	0,0
	25-29 años	7,0	1,4	0,3
	30-34 años	5,2	0,0	0,0
	35-44 años	3,0	0,0	0,0
	45-54 años	1,1	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-74	2,6	0,2	0,1
	TOTAL 15-34	5,2	0,6	0,2

Tabla A.23. Policonsumo reciente y policonsumo total de sustancias ilegales por diversas características personales (%)

		POLICONSUMO RECIENTE	POLICONSUMO TOTAL
Alcohol fin semana	Abstemio	0,4	5,8
	Casi Abstemio	0,0	4,6
	Poco bebedores	2,4	5,9
	Bebedores excesivos	11,6	18,6
	Bebedores riesgo	14,3	27,0
	Bebedor excesivo y riesgo	12,4	21,1
Botellón	Nunca	3,5	8,2
	1 o 2 veces al año	4,9	12,6
	1 o 2 veces al mes	8,2	16,5
	Todas o casi todas las semanas	4,8	11,9
	NS/NC	8,5	8,5
Consumo al menos semanal cannabis	Sí	16,7	34,8
	No	2,0	5,2
Consumo + 1vez / mes en el último año de cualquier sustancia ilegal	Sí	29,9	35,3
	No	3,1	8,7
Tipología fumador	No fuma	1,3	3,3
	Ex fumador	4,3	10,3
	Fuma	7,3	16,2
Género	Hombre	5,8	12,8
	Mujer	2,8	6,8
Edad	15-19 años	2,5	4,6
	20-24 años	6,8	10,6
	25-29 años	3,3	12,1
	30-34 años	4,7	10,2
T.H.	Araba	7,6	12,1
	Bizkaia	4,0	10,4
	Gipuzkoa	3,5	8,1
Edad de inicio en el consumo de cannabis	Con 15 o menos años	13,8	29,2
	De los 16 a 18 años	5,9	13,5
	De los 19 a 20 años	3,6	10,8
	De los 21 a 25 años	0,0	3,6
	Con más de 25 años	0,0	0,0
	Edad media	15,7 años	15,9 años
Edad de inicio en el consumo de cualquier otra droga ilegal (no cannabis)	Con 15 o menos años	24,9	74,3
	De los 16 a 18 años	16,8	41,2
	De los 19 a 20 años	18,4	39,5
	De los 21 a 25 años	10,3	14,8
	Con más de 25 años	29,6	29,6
	Edad media	18,4 años	18,0 años
TOTAL		4,4	9,9

Tabla A.24. Evolución del consumo de anfetaminas por sexo y tramos de edad 1992-2006 (%)

		Consumo experimental								Consumo reciente							
		1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006
Género	Hombre	5,4	7,0	7,1	3,3	7,2	9,5	14,5	12,1	1,9	2,3	1,8	--	2,4	2,8	4,2	3,5
	Mujer	1,5	0,9	1,4	6,5	4,1	5,4	7,8	5,5	0,4	0,1	0,3	--	1,4	1,5	1,4	1,3
Edad	15-19 años	4,7	3,7	5,6	6,1	7,4	6,1	12,2	9,5	2,7	1,3	1,3	--	6,4	2,9	6,5	5,2
	20-24 años	9,7	15,7	11,4	13,8	15,8	24,6	24,9	14,9	3,6	5,0	3,8	--	6,6	11,5	9,8	7,0
	25-29 años	11,8	9,9	12,2	9,4	13,4	21,9	17,6	16,8	1,2	1,5	2,9	--	5,5	6,1	5,0	5,0
	30-34 años	5,1	7,0	11,7	13,2	8,2	12,9	21,8	17,2	2,8	2,0	1,7	--	1,2	2,4	4,9	6,5
	35-44 años	0,7	1,4	1,0	4,4	7,7	8,7	16,1	13,7	0,0	1,2	0,2	--	1,1	1,3	1,9	1,2
	45-54 años	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,7	3,1	3,8	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,5
	55-64 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 15-74		3,4	3,9	4,3	4,9	5,6	7,5	11,1	8,8	1,1	1,2	1,0	--	1,9	2,2	2,8	2,4
TOTAL 15-34		7,9	9,5	10,4	11,0	11,4	17,2	19,6	15,3	2,6	2,6	2,5	--	4,7	5,8	6,5	5,9

Tabla A.25. Evolución del consumo de cocaína por sexo y tramos de edad 1992-2006 (%)

		Consumo experimental								Consumo reciente							
		1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006
Género	Hombre	5,2	5,4	6,1	2,1	6,3	8,5	14,0	11,4	1,6	1,6	0,9	--	2,9	2,6	5,1	4,0
	Mujer	1,3	1,8	1,7	6,5	3,1	4,9	5,9	4,8	0,2	0,0	0,1	--	0,9	1,1	1,7	1,3
Edad	15-19 años	3,9	0,9	1,3	1,7	3,6	3,1	8,7	7,8	2,0	0,9	0,0	--	3,6	0,0	5,5	3,9
	20-24 años	6,8	9,9	7,9	7,8	12,5	16,8	22,0	15,1	2,5	1,1	2,2	--	4,1	6,2	12,4	8,8
	25-29 años	8,9	11,2	8,3	6,8	8,0	19,1	14,5	18,1	0,4	3,3	0,8	--	4,5	7,2	6,2	7,6
	30-34 años	8,5	8,6	14,5	12,1	7,6	15,3	20,8	17,4	2,8	1,4	1,7	--	2,4	5,2	6,6	5,0
	35-44 años	1,8	2,8	3,6	8,0	9,4	7,9	15,0	10,3	0,3	0,8	0,2	--	3,1	0,5	2,3	1,6
	45-54 años	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	1,4	2,7	3,2	0,0	0,0	0,0	--	0,4	0,0	0,5	0,5
	55-64 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 15-74		3,2	3,6	3,9	4,2	4,7	6,7	9,9	8,1	0,9	0,8	0,5	--	1,9	1,8	3,4	2,6
TOTAL 15-34		6,9	8,1	8,4	7,5	8,3	14,6	17,1	15,5	1,9	1,7	1,3	--	3,6	5,1	7,8	6,4

Tabla A.26. Evolución del consumo de éxtasis por sexo y tramos de edad 1992-2006 (%)

		Consumo experimental								Consumo reciente							
		1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006
Género	Hombre	--	1,9	3,0	1,0	2,4	4,3	6,5	3,8	--	0,4	0,7	--	1,1	1,2	2,0	0,6
	Mujer	--	0,1	0,8	3,7	2,3	2,4	2,5	1,4	--	0,0	0,3	--	0,6	1,0	0,6	0,5
Edad	15-19 años	--	1,3	3,3	4,4	3,6	4,1	3,6	1,3	--	1,3	0,0	--	3,6	1,0	2,9	1,0
	20-24 años	--	4,7	8,3	3,3	7,3	12,1	14,2	6,6	--	0,0	3,2	--	2,2	7,2	4,9	2,4
	25-29 años	--	2,8	2,9	3,2	7,0	12,0	7,5	7,5	--	1,2	0,8	--	2,9	3,8	2,1	1,6
	30-34 años	--	0,0	3,4	8,5	3,1	3,8	9,5	6,3	--	0,0	0,0	--	0,0	0,0	1,7	1,0
	35-44 años	--	0,6	0,2	2,9	2,0	2,7	4,8	2,2	--	0,0	0,2	--	0,6	0,5	1,2	0,3
	45-54 años	--	0,0	0,0	0,4	0,4	0,3	0,9	0,5	--	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-64 años	--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0
65-74 años	--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL 15-74		--	1,0	1,9	2,3	2,3	3,3	4,5	2,6	--	0,2	0,5	--	0,8	1,1	1,3	0,6
TOTAL 15-34		--	2,3	4,7	4,8	5,3	8,3	9,1	5,9	--	0,5	1,1	--	2,0	3,0	2,9	1,5

Tabla A.27. Evolución del consumo de alucinógenos por sexo y tramos de edad 1992-2006 (%)

		Consumo experimental								Consumo reciente							
		1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006
Género	Hombre	3,5	5,5	4,2	1,3	3,3	4,6	9,2	6,1	1,0	0,9	0,8	--	0,4	0,6	1,6	1,1
	Mujer	0,9	0,7	0,8	4,7	1,4	2,9	4,1	2,6	0,1	0,0	0,0	--	0,1	0,1	0,5	0,7
Edad	15-19 años	2,3	3,3	1,3	3,5	0,0	3,1	3,4	9,7	2,3	0,9	0,0	--	0,0	1,0	1,7	8,0
	20-24 años	3,8	8,8	7,3	6,1	6,5	9,7	14,9	7,1	1,5	1,1	2,2	--	0,5	1,7	4,9	2,9
	25-29 años	7,3	8,2	4,3	3,3	6,0	12,0	9,6	11,6	0,4	2,3	0,0	--	1,9	1,2	1,8	2,0
	30-34 años	6,2	6,9	9,2	10,2	3,0	5,9	12,8	5,4	1,2	0,3	0,9	--	0,4	0,0	1,0	0,0
	35-44 años	1,0	2,2	1,1	4,3	4,2	5,1	10,1	6,0	0,0	0,0	0,2	--	0,0	0,3	0,7	0,3
	45-54 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	3,5	1,4	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0
65-74 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL 15-74		2,2	3,1	2,5	2,9	2,3	3,8	6,6	4,3	0,6	0,4	0,4	--	0,3	0,4	1,0	0,9
TOTAL 15-34		4,8	7,0	5,9	6,0	4,2	8,2	10,7	8,4	1,4	1,1	0,9	--	0,8	0,9	2,4	2,6

Tabla A.28. Evolución del consumo de heroína por sexo y tramos de edad 1992-2006 (%)

		Consumo experimental								Consumo reciente							
		1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006
Género	Hombre	1,2	1,4	1,5	0,2	0,7	1,6	1,1	1,4	0,2	0,0	0,0	--	0,1	0,4	0,0	0,0
	Mujer	0,2	0,4	0,0	1,5	0,2	0,5	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,1
Edad	15-19 años	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,8
	20-24 años	0,9	3,8	1,6	1,7	0,0	0,8	1,1	0,0	0,4	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0
	25-29 años	3,3	2,7	4,5	0,7	1,1	0,6	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	--	0,6	0,0	0,0	0,0
	30-34 años	2,2	2,0	1,7	3,8	1,2	3,1	1,0	1,8	0,5	0,0	0,0	--	0,0	1,8	0,0	0,0
	35-44 años	0,0	0,2	0,0	1,4	0,8	2,7	2,4	2,7	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,3	0,0	0,0
	45-54 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-74 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 15-74		0,7	0,9	0,8	0,8	0,4	1,0	0,9	1,0	0,1	0,0	0,0	--	0,1	0,2	0,0	0,0
TOTAL 15-34		1,6	2,3	1,9	1,7	0,7	1,2	0,6	0,9	0,2	0,0	0,0	--	0,1	0,5	0,0	0,1

Tabla A.29. Prevalencia de consumo de distintas drogas psicoactivas en el último año entre consumidores de otras sustancias (%)

	Total *	Tabaco	Alcohol **	Alcohol ***	Cannab.	Anfet.	Éxtasis	LSD	Cocaína	Heroína	Setas	Ketam.
Total*	–	30,9	14,0	66,1	13,8	2,4	0,6	0,9	2,6	0,1	0,5	0,8
Tabaco	30,9	–	55,6	34,9	63,1	59,6	69,3	69,6	63,2	100,0	60,2	100,0
Alcohol**	14,0	25,2	–	–	44,1	62,9	74,9	52,3	69,1	0,0	56,8	72,8
Alcohol***	66,1	74,5	–	–	89,0	90,2	93,8	96,3	96,7	100,0	89,8	100,0
Cannabis	13,8	28,5	44,0	18,8	–	77,4	85,3	74,7	89,3	100,0	90,7	100,0
Anfetaminas	2,4	4,6	10,7	3,2	13,2	–	76,7	30,1	59,0	0,0	52,8	100,0
Éxtasis	0,6	1,2	3,0	0,8	3,4	18,0	–	23,1	14,8	0,0	15,9	100,0
LSD	0,9	2,1	3,5	1,4	5,0	11,8	38,4	–	7,3	0,0	22,5	27,2
Cocaína	2,6	5,3	12,9	3,8	16,7	65,0	69,5	20,6	–	0,0	51,2	72,8
Heroína	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	–	0,0	0,0
Setas	0,5	1,0	2,0	0,7	3,2	11,0	14,2	12,1	9,7	0,0	–	27,2
Ketamina	0,8	0,2	0,3	0,1	0,4	2,3	9,7	1,6	1,5	0,0	2,9	–

* Conjunto de población. ** Bebedor excesivo o de riesgo en día laborable o en fin de semana. ***No abstemio.

Lectura de la tabla: Los porcentajes que aparecen en esta tabla se leen a partir de la sustancia de la columna. Por ejemplo, de los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses, el 13,2% ha consumido también anfetaminas en el mismo período. La primera fila y la primera columna expresan la prevalencia del consumo de cada sustancia en el último año respecto a la población total de 15 a 74 años de edad.

**ANEXO VI.
PERCEPCIÓN SOCIAL RESPECTO AL CONSUMO DE DROGAS Y
VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS**

Tabla. A.1. Atribución de bastantes o muchos problemas a diversos consumos en función de los tramos de edad (%)

	Fumar 1 paquete diario de tabaco	Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	Fumar cannabis una vez o menos al mes	Fumar cannabis una vez por semana o más	Tomar tranquilizantes/somníferos una vez o menos al mes	Tomar tranquilizantes/somníferos una vez por semana o más	Consumir éxtasis una vez o menos al mes	Consumir éxtasis una vez por semana o más	Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	Consumir alucinógenos una vez por semana o más	Cocaína una vez o menos al mes	Cocaína una vez por semana o más	Heroína una vez o menos al mes	Heroína una vez por semana o más
15-19 años	85,5	26,5	85,0	22,7	51,9	33,0	63,8	73,8	89,3	84,3	92,5	79,5	92,8	85,3	94,2
20-24 años	84,4	18,1	85,7	20,2	49,2	30,7	62,9	75,7	92,7	85,2	94,6	79,4	93,5	87,0	93,4
25-29 años	90,9	20,7	84,1	21,2	48,1	33,2	67,7	76,6	93,4	86,9	95,6	84,3	95,0	89,4	95,8
30-34 años	88,4	26,7	87,1	23,1	44,1	31,7	59,4	76,1	88,8	83,3	91,7	81,7	91,7	85,5	94,0
35-44 años	88,8	31,5	85,9	25,6	46,0	30,0	56,4	79,0	87,1	87,0	91,6	82,3	89,1	86,4	91,9
45-54 años	88,9	39,5	86,1	34,6	57,8	31,5	57,7	79,2	86,3	85,2	89,8	83,1	90,3	86,6	90,7
55-64 años	84,5	36,3	87,5	45,0	67,6	29,7	50,9	78,7	85,6	85,4	88,3	83,0	88,2	84,8	88,8
65-74 años	88,8	49,4	89,0	63,6	78,5	40,0	62,9	80,8	87,5	85,8	88,2	85,9	89,9	86,7	89,4
Total	87,8	32,9	86,5	33,5	56,0	32,2	59,0	78,1	88,2	85,6	91,1	82,8	90,7	86,4	91,8

Tabla. A.2. Atribución de alguna, bastantes o muchas ventajas al consumo de diversas sustancias en función de los tramos de edad (%)

	Fumar cigarrillos	Beber alcohol	Fumar cannabis	Tranquilizantes o somníferos	Consumir éxtasis	Tomar cocaína	Tomar heroína	Consumir LSD	Anfetaminas
15-19 años	4,9	24,4	31,7	27,0	1,7	3,3	1,0	2,4	3,0
20-24 años	7,4	29,3	31,2	35,7	4,7	4,7	2,6	5,0	5,5
25-29 años	10,0	29,2	27,7	31,2	4,6	4,6	2,7	4,0	6,0
30-34 años	9,9	23,7	26,8	29,4	7,1	7,1	5,4	5,4	5,9
35-44 años	10,6	21,1	25,1	33,1	3,1	3,4	1,9	2,1	2,4
45-54 años	12,5	21,2	17,1	36,2	1,3	0,7	0,7	1,1	0,7
55-64 años	8,8	19,3	9,0	32,5	0,6	1,3	0,6	0,6	1,1
65-74 años	4,0	15,9	5,3	28,3	1,0	0,7	0,3	0,7	0,7
Total	9,1	22,1	20,1	32,2	2,8	2,9	1,8	2,3	2,7

Tabla. A.3. Atribución de bastantes o muchos problemas a diversos consumos en función del sexo (%)

	Fumar 1 paquete diario de tabaco	Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	Fumar cannabis una vez o menos al mes	Fumar cannabis una vez por semana o más	Tomar tranquilizantes/somníferos una vez o menos al mes	Tomar tranquilizantes/somníferos una vez por semana o más	Consumir éxtasis una vez o menos al mes	Consumir éxtasis una vez por semana o más	Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	Consumir alucinógenos una vez por semana o más	Cocaína una vez o menos al mes	Cocaína una vez por semana o más	Heroína una vez o menos al mes	Heroína una vez por semana o más
Hombre	86,7	29,6	83,0	28,2	50,9	32,1	59,7	76,0	87,1	84,8	90,6	81,7	90,0	85,7	91,8
Mujer	88,9	36,3	89,9	38,8	61,0	32,3	58,3	80,3	89,2	86,4	91,5	83,9	91,5	87,1	91,8
Total	87,8	32,9	86,5	33,5	56,0	32,2	59,0	78,1	88,2	85,6	91,1	82,8	90,7	86,4	91,8

Tabla. A.4. Atribución de alguna, bastantes o muchas ventajas al consumo de diversas sustancias en función del sexo (%)

	Fumar cigarrillos	Beber alcohol	Fumar cannabis	Tranquilizantes o somníferos	Consumir éxtasis	Tomar cocaína	Tomar heroína	Consumir LSD	Consumir anfetaminas
Hombre	10,0	26,2	23,5	29,7	3,9	4,0	2,3	3,1	3,8
Mujer	8,3	18,1	16,7	34,8	1,7	1,8	1,2	1,6	1,7
Total	9,1	22,1	20,1	32,2	2,8	2,9	1,8	2,3	2,7

Tabla. A.5. Atribución de bastantes o muchos problemas a diversos consumos en función del Territorio de residencia (%)

	Fumar 1 paquete diario de tabaco	Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	Fumar cannabis una vez o menos al mes	Fumar cannabis una vez por semana o más	Tomar tranquilizantes/somníferos una vez o menos al mes	Tomar tranquilizantes/somníferos una vez por semana o más	Consumir éxtasis una vez o menos al mes	Consumir éxtasis una vez por semana o más	Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	Consumir alucinógenos una vez por semana o más	Cocaína una vez o menos al mes	Cocaína una vez por semana o más	Heroína una vez o menos al mes	Heroína una vez por semana o más
Araba	85,4	36,0	87,0	34,8	60,1	43,8	71,7	78,5	88,3	84,5	91,1	82,9	91,1	85,0	92,4
Gipuzkoa	86,7	32,9	86,0	31,9	52,8	29,4	52,0	74,1	84,5	82,4	87,9	79,7	87,8	83,3	88,4
Bizkaia	90,7	31,6	87,0	35,6	59,4	31,7	65,0	84,7	94,2	91,4	96,3	87,9	95,3	92,4	97,2
Total	87,8	32,9	86,5	33,5	56,0	32,2	59,0	78,1	88,2	85,6	91,1	82,8	90,7	86,4	91,8

Tabla. A.6. Atribución de alguna, bastantes o muchas ventajas al consumo de diversas sustancias en función del territorio de residencia (%)

	Fumar cigarrillos	Beber alcohol	Fumar cannabis	Tranquilizantes o somníferos	Consumir éxtasis	Tomar cocaína	Tomar heroína	Consumir LSD	Consumir anfetaminas
Araba	10,7	26,1	27,1	30,3	2,8	3,2	2,3	3,6	3,5
Gipuzkoa	8,8	19,8	18,2	31,8	2,2	2,0	1,1	1,2	1,7
Bizkaia	9,1	24,3	20,0	33,8	3,8	4,1	2,5	3,6	4,0
Total	9,1	22,1	20,1	32,2	2,8	2,9	1,8	2,3	2,7

Tabla. A.7. Atribución de bastantes o muchos problemas a diversos consumos en función de la clase social (%)

	Fumar 1 paquete diario de tabaco	Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	Fumar cannabis una vez o menos al mes	Fumar cannabis una vez por semana o más	Tomar tranquilizantes/somníferos una vez o menos al mes	Tomar tranquilizantes/somníferos una vez por semana o más	Consumir éxtasis una vez o menos al mes	Consumir éxtasis una vez por semana o más	Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	Consumir alucinógenos una vez por semana o más	Cocaína una vez o menos al mes	Cocaína una vez por semana o más	Heroína una vez o menos al mes	Heroína una vez por semana o más
Clase I.	90,4	6,5	89,2	21,5	49,1	30,1	62,3	77,4	89,5	87,8	93,5	82,6	92,8	87,9	94,2
Clase III.	88,5	0,7	92,2	30,4	60,8	30,2	58,4	76,0	88,9	86,9	93,2	82,0	92,8	86,9	93,5
Clase IV.	86,3	2,5	84,0	33,3	53,6	31,1	58,5	79,6	88,7	85,9	91,5	83,5	90,4	87,5	92,1
Clase V.	86,6	1,9	85,2	39,0	58,4	39,1	59,4	78,4	88,6	83,9	90,1	82,3	90,9	84,2	90,9
Total	87,8	32,9	86,5	33,5	56,0	32,2	59,0	78,1	88,2	85,6	91,1	82,8	90,7	86,4	91,8

Tabla. A.8. Atribución de alguna, bastantes o muchas ventajas al consumo de diversas sustancias en función del territorio de residencia (%)

	Fumar cigarrillos	Beber alcohol	Fumar cannabis	Tranquilizantes o somníferos	Consumir éxtasis	Tomar cocaína	Tomar heroína	Consumir LSD	Consumir anfetaminas
Clase I.	12,9	28,9	28,7	38,1	6,2	7,1	4,3	5,2	6,5
Clase III.	8,1	20,5	16,0	34,9	1,5	1,5	0,7	0,7	0,7
Clase IV.	8,9	23,3	20,8	33,1	2,6	2,8	1,7	2,5	2,5
Clase V.	8,5	17,6	17,9	23,9	1,4	1,2	0,9	1,1	1,9
Total	9,1	22,1	20,1	32,2	2,8	2,9	1,8	2,3	2,7

Tabla. A.9. Atribución de bastantes o muchos problemas a diversos consumos en función del consumo de tabaco (%)

	Fumar 1 paquete diario de tabaco	Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	Fumar cannabis una vez o menos al mes	Fumar cannabis una vez por semana o más	Tomar tranquilizantes/somníferos una vez o menos al mes	Tomar tranquilizantes/somníferos una vez por semana o más	Consumir éxtasis una vez o menos al mes	Consumir éxtasis una vez por semana o más	Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	Consumir alucinógenos una vez por semana o más	Cocaína una vez o menos al mes	Cocaína una vez por semana o más	Heroína una vez o menos al mes	Heroína una vez por semana o más
No fuma	91,5	40,4	90,5	43,7	67,1	34,8	62,8	82,8	90,2	89,1	92,6	87,5	92,3	89,7	93,2
Ex fumador	88,8	31,1	86,4	31,4	53,0	28,1	54,7	76,5	86,9	83,8	90,8	80,1	88,9	83,6	89,9
Fuma	83,0	25,6	81,8	23,4	45,3	32,0	57,6	73,9	86,7	82,8	89,6	79,2	90,1	84,7	91,4
Total	87,8	32,9	86,5	33,5	56,0	32,2	59,0	78,1	88,2	85,6	91,1	82,8	90,7	86,4	91,8

Tabla. A.10. Atribución de alguna, bastantes o muchas ventajas al consumo de diversas sustancias en función del consumo de tabaco (%)

	Fumar cigarrillos	Beber alcohol	Fumar cannabis	Tranquilizantes o somníferos	Consumir éxtasis	Tomar cocaína	Tomar heroína	Consumir LSD	Consumir anfetaminas
No fuma	4,4	17,8	13,5	29,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,8
Ex fumador	6,3	22,0	17,6	37,0	2,1	2,5	1,5	1,6	2,3
Fuma	16,4	27,2	29,2	32,3	4,4	4,5	2,3	3,5	4,0
Total	9,1	22,1	20,1	32,2	2,8	2,9	1,8	2,3	2,7

Tabla. A.11. Atribución de bastantes o muchos problemas a diversos consumos en función de los consumos de alcohol (%)

		Fumar 1 paquete diario de tabaco	Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	Fumar cannabis una vez o menos al mes	Fumar cannabis una vez por semana o más	Tomar tranquilizantes/somníferos una vez o menos al mes	Tomar tranquilizantes/somníferos una vez por semana o más	Consumir éxtasis una vez o menos al mes	Consumir éxtasis una vez por semana o más	Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	Consumir alucinógenos una vez por semana o más	Cocaína una vez o menos al mes	Cocaína una vez por semana o más	Heroína una vez o menos al mes	Heroína una vez por semana o más
Consumo de alcohol en días laborables	Abstemio	88,8	33,4	87,9	33,4	56,9	33,0	59,5	79,4	88,9	86,0	91,4	83,3	91,3	87,1	92,2
	Casi abstemio	86,5	29,3	84,6	33,8	54,0	28,0	56,2	75,6	87,5	84,8	91,1	82,0	90,2	85,1	91,4
	Poco bebedores	82,9	41,7	82,6	35,5	55,1	38,5	60,3	74,4	84,5	84,8	88,0	80,4	87,3	85,4	90,1
	Bebedores excesivos	83,7	30,2	57,6	16,4	39,8	37,8	81,1	76,9	81,4	81,4	86,2	81,4	86,2	81,4	86,2
Consumo de alcohol en fines semana	Abstemio	89,7	42,4	90,2	43,9	68,0	34,0	59,0	82,7	88,8	88,1	90,9	85,6	90,7	87,9	91,6
	Casi abstemio	89,6	34,6	88,6	37,6	54,8	29,9	56,5	77,8	87,0	84,0	88,8	83,1	89,3	84,5	89,4
	Poco bebedores	87,0	26,8	84,6	26,0	51,9	31,9	58,9	76,5	87,5	86,1	92,3	83,2	90,9	86,6	92,5
	Bebedores excesivos	81,5	22,3	80,3	18,3	40,4	31,2	63,6	74,3	90,1	80,7	92,7	78,7	93,5	84,3	94,7
	Bebedores de riesgo	83,4	8,4	68,4	8,7	22,4	34,1	62,2	60,5	89,0	81,7	93,1	61,4	90,2	88,8	94,7
Total		87,8	32,9	86,5	33,5	56,0	32,2	59,0	78,1	88,2	85,6	91,1	82,8	90,7	86,4	91,8

Tabla. A.12. Atribución de bastantes o muchos problemas a diversos consumos en función del consumo de cannabis (%)

	Fumar 1 paquete diario de tabaco	Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	Fumar cannabis una vez o menos al mes	Fumar cannabis una vez por semana o más	Tomar tranquilizantes/somníferos una vez o menos al mes	Tomar tranquilizantes/somníferos una vez por semana o más	Consumir éxtasis una vez o menos al mes	Consumir éxtasis una vez por semana o más	Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	Consumir alucinógenos una vez por semana o más	Cocaína una vez o menos al mes	Cocaína una vez por semana o más	Heroína una vez o menos al mes	Heroína una vez por semana o más
No ha probado	87,9	40,1	88,5	44,5	67,8	34,9	58,9	80,3	88,0	86,4	90,1	85,0	90,2	86,7	90,8
Experimental	90,2	24,5	85,6	19,6	48,4	31,3	61,8	83,2	92,6	89,0	95,0	86,2	93,5	88,8	95,0
Experimentado	89,6	19,6	82,3	7,5	15,9	15,3	53,0	67,5	82,2	83,0	91,1	74,2	89,2	85,2	91,8
Ocasional	87,0	13,9	84,0	13,8	34,1	27,5	57,7	74,3	89,6	83,4	93,6	76,5	92,9	85,4	94,6
Habitual	80,8	17,6	75,3	7,9	21,2	29,1	60,2	59,3	82,4	74,2	87,5	67,6	88,3	80,8	90,1
Total	87,8	32,9	86,5	33,5	56,0	32,2	59,0	78,1	88,2	85,6	91,1	82,8	90,7	86,4	91,8

Tabla. A.13. Atribución de alguna, bastantes o muchas ventajas al consumo de diversas sustancias en función del consumo de cannabis (%)

	Fumar cigarrillos	Beber alcohol	Fumar cannabis	Tranquilizantes o somníferos	Consumir éxtasis	Tomar cocaína	Tomar heroína	Consumir LSD	Consumir anfetaminas
No ha probado	6,8	16,6	10,5	30,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,8
Experimental	11,3	21,8	23,0	31,7	2,9	2,7	2,3	2,3	2,5
Experimentado	14,9	39,5	48,3	40,4	8,6	11,7	6,2	8,7	8,4
Ocasional	14,0	41,5	42,4	40,1	6,7	7,9	4,4	5,4	7,1
Habitual	15,7	39,0	54,3	32,5	11,9	11,0	5,0	9,4	11,6
Total	9,1	22,1	20,1	32,2	2,8	2,9	1,8	2,3	2,7

Tabla. A.14. Atribución de bastantes o muchos problemas a diversos consumos en función del consumo de alguna droga ilegal (%)

	Fumar 1 paquete diario de tabaco	Tomarse 5 ó 6 ca- ñas/copas el fin de semana	Tomarse 5 ó 6 ca- ñas/copas cada día	Fumar cannabis una vez o menos al mes	Fumar cannabis una vez por semana o más	Tomar tranquili- zan- tes/somní- feros una vez o menos al mes	Tomar tranquili- zan- tes/somní- feros una vez por semana o más	Consumir éxtasis una vez o menos al mes	Consumir éxtasis una vez por semana o más	Consumir alucinóge- nos una vez o menos al mes	Consumir alucinóge- nos una vez por semana o más	Cocaína una vez o menos al mes	Cocaína una vez por semana o más	Heroína una vez o menos al mes	Heroína una vez por semana o más
Ninguna	88,0	40,5	88,7	45,1	68,3	35,0	58,9	80,5	88,0	86,5	90,1	85,1	90,2	86,7	90,8
Sólo cannabis	88,9	23,2	84,8	17,1	43,0	28,3	59,4	79,6	89,5	85,7	92,5	84,5	92,3	87,2	92,9
Consumo pero no último año	85,9	14,9	77,4	7,9	19,1	22,2	55,3	70,3	85,6	87,1	95,0	75,5	90,7	87,7	94,1
Consumo último año	82,8	15,0	82,7	11,6	27,5	33,5	66,0	52,5	88,3	68,2	88,2	56,1	89,9	75,1	94,7
Total	87,8	32,9	86,5	33,5	56,0	32,2	59,0	78,1	88,2	85,6	91,1	82,8	90,7	86,4	91,8

Tabla. A.15. Evolución de la percepción del riesgo atribuido a diversos patrones de consumo (%)

Sustancia	Patrón de consumo	Nada	Algo	Bastante	Mucho	Ns/nc	Nada/ Algo	Bastante/ Mucho
Tabaco	Fumar un paquete de tabaco al día (2002)	0,8	10,6	44,1	41,9	2,6	11,5	86,0
	Fumar cigarrillos es arriesgado (2004)	5,3	30,8	40,7	22,7	0,5	36,1	63,4
	Fumar un paquete diario de tabaco (2006)	2,4	8,8	43,7	44,1	1,0	11,2	87,8
Cannabis	Fumar porros ocasionalmente (2002)	17,8	26,6	25,1	23,6	6,9	44,4	48,7
	Fumar hachís es arriesgado (2004)	5,9	27,1	34,9	30,4	1,7	33,1	65,3
	Fumar cannabis una vez o menos al mes (2006)	27,6	30,9	15,1	18,4	8,0	58,5	33,5
	Fumar porros habitualmente (2002)	2,7	13,1	28,4	50,0	5,8	15,8	78,4
	Fumar cannabis una vez por semana o más (2006)	14,2	21,9	27,7	28,2	8,0	36,1	55,9
Alcohol	Beber a diario una botella de vino o equivalente (2002)	4,4	13,6	35,4	44,3	2,2	18,0	79,8
	Beber alcohol es arriesgado (2004)	4,0	31,8	38,0	25,8	0,4	35,8	63,8
	Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana (2006)	26,7	38,8	20,8	12,2	1,6	65,5	33
	Tomarse 5 ó 6 cañas cada día (2006)	2,0	10,5	45,2	41,2	1,0	12,5	86,4
Anfetaminas / LSD	Probar alguna vez speed, anfetaminas o derivados (2002)	9,1	15,9	23,5	43,3	8,2	24,9	66,8
	Tomar speed o anfetaminas una vezla semana (2002)	1,7	5,6	22,8	61,9	8,0	7,2	84,8
	Tomar speed o anfetaminas varias vecesla semana (2002)	0,8	1,3	9,3	80,9	7,8	2,0	90,2
	Consumir anfetaminas o speed es arriesgado (2004)	1,1	4,9	26,9	65,3	1,8	6,0	92,2
	Consumir alucinógenos (ácidos, tripis, LSD) una vez o menos al mes (2006)	1,5	5,3	22,5	63,2	7,5	6,8	85,7
	Consumir alucinógenos (ácidos, tripis, LSD) una vez por semana o más (2006)	0,4	0,9	16,0	75,1	7,5	1,3	91,1
Éxtasis	Probar alguna vez pastis, pilulas o extasis (2002)	6,8	13,9	20,1	51,2	8,0	20,7	71,3
	Tomar una pastilla de extasis cada noche de juerga (2002)	1,2	4,2	15,0	71,7	7,8	5,4	86,8
	Tomar varias pastillas de extasis la misma noche (2002)	0,7	1,1	7,2	83,6	7,4	1,8	90,8
	consumir Éxtasis (ó similares) es arriesgado (2004)	1,0	3,9	25,6	67,6	1,8	5,0	93,2
	Consumir éxtasis una vez o menos al mes (2006)	3,1	9,3	27,1	51,0	9,4	12,4	78,1
	Consumir éxtasis una vez por semana o más (2006)	0,6	2,6	19,8	68,4	8,7	3,2	88,2

Sustancia	Patrón de consumo	Nada	Algo	Bastante	Mucho	Ns/nc	Nada/ Algo	Bastante/ Mucho
Cocaína	Tomar cocaína ocasionalmente (2002)	2,1	7,6	17,9	66,7	5,6	9,8	84,6
	Tomar cocaína es arriesgado (2004)	1,2	4,1	25,7	67,2	1,8	5,3	92,9
	Consumir cocaína una vez o menos al mes (2006)	2,9	7,4	25,9	56,8	6,9	10,3	82,7
	Consumir cocaína una vez por semana o más (2006)	0,6	1,7	18,1	72,6	7,0	2,3	90,7
Heroína	Tomar heroína habitualmente (2002)	1,4	3,4	14,2	75,4	5,5	4,9	89,6
	Consumir heroína una vez o menos al mes (2006)	1,4	4,9	22,9	63,6	7,2	6,3	86,5
	Consumir heroína una vez por semana o más (2006)	0,3	0,9	15,5	76,3	7,0	1,2	91,8

Tabla. A.16. Distribución de la población en función de las dificultades atribuidas a la obtención de alcohol en función de las características personales (%)

		Prácticamente imposible	Difícil	Relativamente fácil	Muy fácil.	N.S./NC
Edad	15-19 años	0,8	2,5	1,7	95,0	0,0
	20-24 años	0,6	0,4	2,7	96,4	0,0
	25-29 años	0,0	0,8	2,4	96,9	0,0
	30-34 años	0,0	0,0	3,7	95,7	0,6
	35-44 años	0,0	0,2	1,0	98,5	0,2
	45-54 años	0,0	0,0	2,3	97,7	0,0
	55-64 años	0,0	0,0	2,9	96,6	0,5
	65-74 años	0,5	0,0	4,2	95,0	0,4
	15-34	0,3	0,7	2,8	96,1	0,2
Género	Hombre	0,1	0,2	2,4	97,1	0,2
	Mujer	0,2	0,4	2,6	96,6	0,3
T.H.	Araba	0,0	0,0	5,2	94,8	0,0
	Bizkaia	0,2	0,3	2,2	96,9	0,4
	Gipuzkoa	0,1	0,5	1,9	97,5	0,0
Ocupación	Clase I	0,0	0,0	2,0	98,0	0,0
	Clase III	0,0	0,0	4,1	95,9	0,0
	Clase IV	0,2	0,2	2,6	96,7	0,3
	Clase V	0,0	0,4	2,5	97,1	0,0
	NS/NC	0,4	1,0	1,6	96,0	1,0
Total		0,1	0,3	2,5	96,8	0,2

Tabla. A.17. Distribución de la población en función de las dificultades atribuidas a la obtención de cannabis en función de las características personales (%)

		Prácticamente imposible	Difícil	Relativamente fácil	Muy fácil.	N.S./NC
Edad	15-19 años	1,4	7,7	31,0	56,5	3,5
	20-24 años	2,5	8,8	30,8	56,8	1,1
	25-29 años	3,1	13,3	25,7	53,7	4,3
	30-34 años	5,8	10,1	27,9	48,7	7,6
	35-44 años	6,8	15,0	27,8	40,3	10,1
	45-54 años	15,2	19,4	22,6	29,0	13,8
	55-64 años	22,3	18,2	19,7	17,0	22,8
	65-74 años	34,8	21,4	7,6	10,5	25,6
	15-34	3,5	10,4	28,4	53,3	4,5
Género	Hombre	10,1	15,2	24,5	38,2	12,0
	Mujer	15,9	15,8	22,2	32,8	13,4
T.H.	Araba	10,9	18,1	26,6	36,9	7,5
	Bizkaia	15,6	14,4	20,9	33,0	16,1
	Gipuzkoa	9,5	16,2	26,0	39,1	9,2
Ocupación	Clase I	7,2	13,4	31,9	39,4	8,1
	Clase III	13,5	18,4	25,2	32,4	10,5

		Prácticamen- te imposible	Difícil	Relativamen- te fácil	Muy fácil.	N.S./NC
	Clase IV	10,2	14,2	23,0	39,5	13,2
	Clase V	14,1	17,1	22,2	33,3	13,4
	NS/NC	28,0	17,5	13,0	23,2	18,3
Total		13,0	15,5	23,4	35,5	12,7

Tabla. A.18. Distribución de la población en función de las dificultades atribuidas a la obtención de heroína en función de las características personales (%)

		Prácticamen- te imposible	Difícil	Relativamen- te fácil	Muy fácil.	N.S./NC
Edad	15-19 años	18,6	39,6	19,1	8,7	13,9
	20-24 años	17,2	37,8	25,4	10,8	8,8
	25-29 años	14,1	32,8	20,3	19,0	13,9
	30-34 años	16,8	35,6	16,4	15,6	15,6
	35-44 años	20,2	29,2	19,7	13,9	16,9
	45-54 años	25,2	31,9	12,6	13,2	17,1
	55-64 años	26,3	23,6	15,1	8,0	27,0
	65-74 años	40,1	21,9	5,8	5,7	26,6
	15-34	16,4	35,9	20,0	14,4	13,3
Género	Hombre	20,9	31,6	16,8	11,8	18,9
	Mujer	25,4	28,8	15,5	12,3	18,0
T.H.	Araba	20,7	36,8	17,2	10,7	14,6
	Bizkaia	23,4	26,4	15,4	12,7	22,1
	Gipuzkoa	23,8	33,6	16,9	11,6	14,1
Ocupación	Clase I	20,0	36,0	17,5	11,9	14,6
	Clase III	23,9	34,2	13,8	10,8	17,3
	Clase IV	20,1	29,5	16,9	14,1	19,4
	Clase V	23,9	28,1	19,2	9,5	19,2
	NS/NC	36,1	23,5	10,1	9,9	20,4
Total		23,1	30,2	16,1	12,1	18,4

Tabla. A.19. Distribución de la población en función de las dificultades atribuidas a la obtención de cocaína en función de las características personales (%)

		Prácticamente imposible	Difícil	Relativamente fácil	Muy fácil	N.S./NC
Edad	15-19 años	11,5	33,2	25,5	18,3	11,5
	20-24 años	8,3	29,7	32,8	23,4	6,0
	25-29 años	9,0	26,0	30,0	26,1	8,9
	30-34 años	11,7	29,4	22,8	25,1	11,0
	35-44 años	16,5	25,8	24,0	19,7	14,0
	45-54 años	23,7	30,6	14,3	15,6	15,7
	55-64 años	26,8	24,4	14,4	8,1	26,2
	65-74 años	40,1	21,9	5,8	5,7	26,6
	15-34	10,1	29,1	27,6	23,9	9,3
Género	Hombre	17,0	27,4	21,2	18,1	16,3
	Mujer	23,1	26,7	18,4	15,8	15,9
T.H.	Araba	19,7	32,2	20,7	15,2	12,2
	Bizkaia	20,9	23,3	19,5	16,8	19,5
	Gipuzkoa	18,8	31,2	19,9	18,0	12,1
Ocupación	Clase I	15,8	32,3	21,0	17,5	13,4
	Clase III	21,0	33,1	18,0	14,5	13,4
	Clase IV	16,6	25,1	21,4	20,2	16,7
	Clase V	21,1	26,4	21,9	13,5	17,2
	NS/NC	35,2	21,6	12,2	12,0	19,0
Total		20,1	27,1	19,8	16,9	16,1

Tabla. A.20. Distribución de la población en función de las dificultades atribuidas a la obtención de alucinógenos en función de las características personales (%)

		Prácticamente imposible	Difícil	Relativamente fácil	Muy fácil	N.S./NC
Edad	15-19 años	14,4	35,6	24,4	11,4	14,1
	20-24 años	10,1	30,7	31,3	18,9	9,0
	25-29 años	9,6	29,7	25,6	23,1	11,9
	30-34 años	13,1	30,0	22,7	19,8	14,4
	35-44 años	18,0	30,6	18,3	16,4	16,7
	45-54 años	25,0	31,4	12,9	13,0	17,7
	55-64 años	27,4	22,6	15,7	7,9	26,4
	65-74 años	40,4	21,5	6,1	5,7	26,3
	15-34	11,6	31,0	25,8	19,2	12,4
Género	Hombre	18,9	29,7	18,5	14,2	18,7
	Mujer	23,6	27,5	17,5	14,1	17,4
T.H.	Araba	20,5	34,0	17,7	13,4	14,4
	Bizkaia	21,7	23,8	17,5	14,8	22,2
	Gipuzkoa	20,8	34,0	19,1	13,4	12,7
Ocupación	Clase I	18,6	33,7	19,6	13,9	14,1
	Clase III	22,3	34,3	15,4	12,4	15,7
	Clase IV	17,0	27,3	19,7	16,5	19,5
	Clase V	22,6	27,5	19,5	11,8	18,6
	NS/NC	36,1	21,6	11,1	11,3	20,0
Total		21,2	28,6	18,0	14,1	18,0

Tabla. A21. Distribución de la población en función de las dificultades atribuidas a la obtención de anfetaminas en función de las características personales (%)

		Prácticamente imposible	Difícil	Relativamente fácil	Muy fácil	N.S./NC
Edad	15-19 años	12,5	28,7	28,2	18,8	11,8
	20-24 años	9,0	25,9	34,9	23,2	7,0
	25-29 años	8,7	25,0	28,2	26,6	11,5
	30-34 años	10,6	27,1	28,3	22,2	11,8
	35-44 años	17,6	26,4	21,2	20,0	14,9
	45-54 años	23,4	30,1	15,6	15,6	15,3
	55-64 años	27,4	22,2	15,0	9,3	26,1
	65-74 años	40,4	21,5	6,1	5,7	26,3
	15-34	10,0	26,5	29,7	23,2	10,6
Género	Hombre	17,4	27,0	21,7	17,1	16,9
	Mujer	23,2	24,7	18,9	16,8	16,3
T.H.	Araba	19,5	31,5	21,0	14,7	13,2
	Bizkaia	21,0	21,6	19,7	17,1	20,6
	Gipuzkoa	19,5	30,4	21,0	17,6	11,5
Ocupación	Clase I	17,6	29,7	22,8	16,4	13,4
	Clase III	21,6	30,5	18,7	15,9	13,3
	Clase IV	16,6	23,8	22,0	20,1	17,6
	Clase V	20,7	27,1	20,1	14,0	18,2
	NS/NC	34,6	21,2	13,3	11,8	19,0
Total		20,3	25,8	20,3	16,9	16,6

Tabla. A22. Distribución de la población en función de las dificultades atribuidas a la obtención de éxtasis o drogas de diseño en función de las características personales (%)

		Prácticamen- te imposible	Difícil	Relativamen- te fácil	Muy fácil.	N.S./NC
Edad	15-19 años	16,0	32,8	21,0	17,3	12,8
	20-24 años	9,4	27,6	34,7	20,2	8,0
	25-29 años	9,0	25,9	27,6	25,6	11,9
	30-34 años	11,2	26,2	27,9	21,4	13,3
	35-44 años	17,7	27,2	22,2	17,8	15,1
	45-54 años	24,0	30,2	14,0	15,0	16,8
	55-64 años	27,4	21,0	14,4	9,9	27,3
	65-74 años	40,1	21,5	6,1	5,7	26,6
	15-34	10,9	27,5	28,2	21,7	11,6
Género	Hombre	17,8	27,6	20,8	15,9	18,0
	Mujer	23,6	24,8	18,5	16,0	17,0
T.H.	Araba	19,7	32,2	20,9	13,5	13,8
	Bizkaia	21,5	21,9	18,7	16,4	21,5
	Gipuzkoa	19,8	30,8	20,7	16,4	12,4
Ocupación	Clase I	17,7	29,3	22,8	15,8	14,4
	Clase III	21,5	31,6	18,0	14,8	14,1
	Clase IV	17,1	24,5	21,3	18,7	18,4
	Clase V	22,0	26,5	19,1	13,5	18,8
	NS/NC	34,5	22,4	11,9	11,2	20,1
Total		20,7	26,2	19,6	16,0	17,5

Tabla. A23. Distribución de los consumidores de cada sustancia en función de las dificultades atribuidas a la obtención de esa misma sustancia (%)

CANNABIS	Prácticamente imposible	Difícil	Relativamente fácil	Muy fácil	NS/NC
Alguna vez	2,6	8,5	27,6	59,0	2,4
Último año	1,1	6,9	23,3	67,6	1,1
Último mes	0,7	7,0	21,7	69,1	1,5
Último año habitual	0,9	6,2	21,0	70,6	1,2
TOTAL	13,0	15,5	23,4	35,5	12,7
COCAÍNA	Prácticamente imposible	Difícil	Relativamente fácil	Muy fácil	NS/NC
Alguna vez	1,4	12,6	35,2	45,6	5,2
Último año	3,0	3,6	37,0	48,4	7,9
Último mes	5,6	5,3	26,6	58,1	4,3
Último año habitual	9,3	6,4	23,3	61,0	0,0
TOTAL	20,1	27,1	19,8	16,9	16,1
ALUCINÓGENOS	Prácticamente imposible	Difícil	Relativamente fácil	Muy fácil	NS/NC
Alguna vez	3,4	25,7	27,7	36,3	7,0
Último año	1,6	15,9	55,0	27,6	0,0
Último mes	2,1	12,2	68,3	17,3	0,0
Último año habitual	2,5	11,0	71,8	14,6	0,0
TOTAL	21,2	28,6	18,0	14,1	18,0
ANFETAMINAS	Prácticamente imposible	Difícil	Relativamente fácil	Muy fácil	NS/NC
Alguna vez	2,2	17,3	33,0	41,7	5,8
Último año	0,0	10,1	34,8	46,4	8,7
Último mes	0,0	14,1	29,5	52,1	4,2
Último año habitual	0,0	0,0	36,3	63,7	0,0
TOTAL	20,3	25,8	20,3	16,9	16,6
ÉXTASIS	Prácticamente imposible	Difícil	Relativamente fácil	Muy fácil	NS/NC
Alguna vez	3,8	12,9	31,1	47,1	5,1
Último año	0,0	12,1	22,3	65,5	0,0
Último mes	0,0	13,6	35,1	51,3	0,0
Último año habitual	0,0	23,3	59,9	16,9	0,0
TOTAL	20,7	26,2	19,6	16,0	17,5

Tabla A.24. Distribución de la población en función de la cercanía a las drogas ilegales por características personales (%)

		Ajenos	Cercanos	Implicados	Otros
Edad	15-19 años	12,9	26,9	55	5,3
	20-24 años	9,9	22	61,6	6,5
	25-29 años	18	20,2	55,9	5,8
	30-34 años	24	18,1	49,3	8,6
	35-44 años	29,5	17,4	39,6	13,4
	45-54 años	50,7	20,8	19,6	8,8
	55-64 años	79,4	15,2	2,7	2,6
	65-74 años	83,7	14,4	0,4	1,6
	15-34	17,2	21	55	6,8
Género	Hombre	35,9	18,3	36,3	9,5
	Mujer	50,6	18,7	25,6	5
T.H.	Araba	40,2	16,4	33,7	9,7
	Bizkaia	42,6	19,9	30,6	6,9
	Gipuzkoa	45,9	17,2	30	6,8
Actividad	Trabaja	30	19	41,7	9,3
	En paro	29,9	13,8	40,7	15,5
	Amo o ama de casa	77,6	14,5	5,8	2
	Jubilado	76,3	17,3	2,8	3,6
	Estudiante	11	28,7	54,5	5,9
Ocupación	Clase I	30,4	20,5	41,3	7,8
	Clase III	45,4	16,6	31,5	6,5
	Clase IV	38,2	20,4	33,7	7,7
	Clase V	49,3	15,7	27,3	7,7
	NS/NC	68,2	15,4	11,2	5,4
Total		43,3	18,6	30,9	7,2

Tabla. A.25. Evolución de la accesibilidad al consumo de diversas sustancias

Hachis	Mucha dificultad	Bastante dificultad	Poca dificultad	Ninguna dificultad	Ns/nc	Total
2002	16,2	6,9	19,2	27,9	29,8	100
2004	25,2	12,2	27,0	29,3	6,4	100,0
2006	13,0	15,5	23,4	35,5	12,7	100,0
Extasis	Mucha dificultad	Bastante dificultad	Poca dificultad	Ninguna dificultad	Ns/nc	Total
2002	19,3	10,4	17,7	19,2	33,4	100
2004	31,3	16,5	27,0	17,1	8,1	100,0
2006	20,7	26,2	19,6	16,0	17,5	100,0
Cocaína	Mucha dificultad	Bastante dificultad	Poca dificultad	Ninguna dificultad	Ns/nc	Total
2002	19,3	10,4	14,5	14,6	36,9	100
2004	31,2	20,2	25,4	15,4	7,7	100,0
2006	20,1	27,1	19,8	16,9	16,1	100,0
Heroína	Mucha dificultad	Bastante dificultad	Poca dificultad	Ninguna dificultad	Ns/nc	Total
2002	24,8	13,8	11,7	11,8	37,9	100
2004	37,9	26,7	16,7	10,2	8,5	100,0
2006	23,1	30,2	16,1	12,1	18,4	100,0

Tabla A.26. Distribución de la población en función de la opinión respecto a la legalización del cannabis por características personales (%)

		Muy de acuerdo	Bastante de acuerdo	Bastante en desacuerdo	Muy en desacuerdo	NC	AC	DESAC
Edad	15-19 años	33,5	25,7	13,1	23,3	4,4	59,2	36,4
	20-24 años	38,2	27,5	12,1	14,0	8,2	65,7	26,1
	25-29 años	35,8	32,4	10,3	15,7	5,8	68,2	26,0
	30-34 años	34,6	36,9	8,1	16,7	3,7	71,5	24,8
	35-44 años	32,2	27,1	18,6	17,5	4,6	59,3	36,1
	45-54 años	23,5	26,3	17,3	24,0	8,9	49,8	41,3
	55-64 años	12,5	23,4	19,2	37,0	8,0	35,9	56,1
	65-74 años	8,8	14,7	11,7	51,0	13,8	23,5	62,7
	TOTAL 15-34	35,6	31,6	10,5	16,9	5,5	67,2	27,4
Género	Hombre	30,6	25,7	14,0	22,6	7,1	56,3	36,6
	Mujer	21,3	27,1	15,7	28,4	7,5	48,4	44,1
T.H.	Araba	29,0	27,8	14,1	23,1	5,9	56,8	37,2
	Bizkaia	22,8	25,7	16,0	27,1	8,4	48,5	43,1
	Gipuzkoa	29,8	27,0	13,2	23,9	6,1	56,9	37,0
Consumo de cannabis	No ha probado el cannabis	16,3	23,0	18,1	33,8	8,7	39,3	52,0
	Consumidor experimental	32,2	34,3	14,0	14,7	4,7	66,6	28,7
	Consumidor experimentado	43,1	37,8	3,3	10,4	5,4	80,8	13,7
	Consumidor ocasional	43,9	35,8	7,9	8,7	3,7	79,7	16,6
	Consumidor habitual	67,4	19,7	3,7	3,8	5,4	87,1	7,5
Consumo de drogas ilegales	No ha consumido ninguna	16,0	22,9	18,2	34,3	8,6	38,9	52,5
	Sólo ha consumido cannabis	37,8	34,9	10,7	11,7	5,0	72,6	22,4
	Ha consumido pero no en el último año	49,3	31,2	6,2	9,9	3,4	80,5	16,1
	Alguna sustancia ilegal en último año	54,9	21,4	7,1	7,3	9,3	76,3	14,3
Cercanía a las drogas	Ajenos	15,1	22,5	17,4	36,3	8,6	37,6	53,7

		Muy de acuerdo	Bastante de acuerdo	Bastante en desacuerdo	Muy en desacuerdo	NC	AC	DESAC
	Cercanos	31,1	30,9	14,3	17,5	6,3	62,0	31,8
	Implicados	53,8	27,9	6,4	8,2	3,7	81,7	14,5
	Otros	17,9	30,4	16,4	19,1	16,2	48,3	35,5
TOTAL		25,9	26,4	14,8	25,5	7,3	52,4	40,3

Tabla A.27. Distribución de la población en función de la opinión respecto a la legalización de todas las drogas por características personales (%)

		Muy de acuerdo	Bastante de acuerdo	Bastante en desacuerdo	Muy en desacuerdo	NC	AC	DESAC
Edad	15-19 años	10,5	9,3	25,5	52,0	2,7	19,8	77,5
	20-24 años	10,1	9,8	33,0	42,7	4,4	19,9	75,7
	25-29 años	11,7	13,3	26,8	42,5	5,7	25,0	69,3
	30-34 años	14,6	14,9	27,2	39,9	3,4	29,4	67,1
	35-44 años	10,5	13,8	27,2	45,4	3,0	24,4	72,6
	45-54 años	10,0	9,1	21,0	52,7	7,1	19,1	73,7
	55-64 años	7,8	12,8	17,9	55,0	6,5	20,6	72,9
	65-74 años	3,0	7,1	15,2	66,9	7,8	10,1	82,0
	TOTAL 15-34	12,1	12,4	28,1	43,3	4,2	24,4	71,4
Género	Hombre	11,1	12,0	24,5	47,4	4,9	23,1	72,0
	Mujer	8,1	11,0	22,5	52,7	5,6	19,1	75,2
T.H.	Araba	11,1	15,6	24,7	45,0	3,5	26,8	69,7
	Bizkaia	7,5	10,9	24,8	51,6	5,3	18,4	76,3
	Gipuzkoa	12,6	10,7	20,9	49,9	5,9	23,2	70,8
Consumo de cannabis	No ha probado el cannabis	6,5	10,3	21,2	56,0	6,0	16,8	77,2
	Consumidor experimental	11,7	13,1	29,4	41,6	4,2	24,9	71,0

		Muy de acuerdo	Bastante de acuerdo	Bastante en desacuerdo	Muy en desacuerdo	NC	AC	DESAC
	Consumidor experimentado	18,5	14,5	23,7	38,8	4,5	33,0	62,5
	Consumidor ocasional	14,0	15,6	28,1	38,9	3,4	29,6	67,1
	Consumidor habitual	21,6	11,8	26,2	36,7	3,7	33,4	62,9
Consumo de drogas ilegales	No ha consumido ninguna	6,6	10,4	20,9	56,1	6,0	17,0	77,0
	Sólo ha consumido cannabis	12,5	12,8	28,3	42,5	3,8	25,3	70,8
	Ha consumido pero no en el último año	18,2	14,4	26,8	37,3	3,3	32,6	64,1
	Alguna sustancia ilegal en último año	19,8	13,6	26,9	32,4	7,2	33,5	59,3
Cercanía a las drogas	Ajenos	6,5	9,1	20,4	57,5	6,5	15,6	77,9
	Cercanos	10,5	13,4	26,0	46,0	4,0	23,9	72,0
	Implicados	19,5	14,6	26,9	34,1	4,9	34,0	61,0
	Otros	8,0	14,2	30,9	46,9	0,0	22,2	77,8
TOTAL		9,6	11,5	23,5	50,1	5,3	21,1	73,6

Tabla A.28. Distribución de la población en función de su opinión respecto a la prohibición de la publicidad del tabaco y el alcohol por características personales (%)

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER.	ACUERDO
Edad	15-19 años	21,5	27,0	28,8	18,1	4,6	48,5	46,9
	20-24 años	21,0	22,7	26,0	23,7	6,7	43,7	49,7
	25-29 años	22,0	29,7	21,9	21,2	5,1	51,7	43,2
	30-34 años	16,8	27,3	25,2	27,0	3,7	44,1	52,2
	35-44 años	18,2	19,5	24,1	32,7	5,4	37,7	56,8
	45-54 años	14,9	26,2	20,2	33,5	5,2	41,0	53,7
	55-64 años	10,9	14,5	30,8	38,0	5,9	25,4	68,8
	65-74 años	7,0	20,9	23,9	43,6	4,6	27,9	67,5
	TOTAL 15-34	20,1	27,0	25,0	23,0	4,9	47,0	48,0
Género	Hombre	17,5	23,8	22,4	30,7	5,6	41,3	53,1
	Mujer	14,1	21,5	27,0	32,7	4,8	35,6	59,6
T.H.	Araba	17,2	25,7	18,1	35,2	3,8	42,9	53,3
	Bizkaia	16,9	22,8	25,1	30,8	4,3	39,7	56,0
	Gipuzkoa	13,2	21,1	26,9	31,5	7,3	34,3	58,4
Consumo de cannabis	No ha probado el cannabis	11,2	22,9	26,3	34,9	4,8	34,0	61,1
	Consumidor experimental	24,1	20,2	21,1	27,9	6,8	44,3	49,0
	Consumidor experimentado	22,8	20,2	20,8	31,3	4,9	43,0	52,1
	Consumidor ocasional	19,4	25,9	27,3	23,3	4,2	45,2	50,6
	Consumidor habitual	29,6	25,3	19,3	19,6	6,2	54,9	38,9
Consumo de drogas ilegales	No ha consumido ninguna	11,1	22,9	26,3	35,0	4,8	34,0	61,3
	Sólo ha consumido cannabis	24,7	21,3	21,6	25,5	6,9	46,0	47,1
	Ha consumido pero no en el último año	21,6	21,4	20,6	32,6	3,8	43,0	53,2
	Alguna sustancia ilegal en último año	22,6	29,1	27,3	16,4	4,6	51,7	43,7
Cercanía a las drogas	Ajenos	13,0	21,3	25,3	35,3	5,2	34,3	60,5

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER.	ACUERDO
	Cercanos	17,4	23,7	24,8	28,6	5,6	41,1	53,4
	Implicados	23,3	24,6	21,8	27,2	3,1	47,9	49,0
	Otros	7,0	24,0	28,5	28,4	12,2	30,9	56,9
TOTAL		15,8	22,7	24,7	31,7	5,2	38,4	56,4

Tabla A.29. Distribución de la población en función de su opinión respecto a la sustitución de las penas de prisión por programas de tratamiento por características personales (%)

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER.	ACUERDO
Edad	15-19 años	9,3	9,3	41,6	35,1	4,8	18,6	76,6
	20-24 años	7,2	14,3	37,6	37,5	3,4	21,4	75,2
	25-29 años	7,3	9,8	46,5	29,1	7,2	17,2	75,6
	30-34 años	7,4	12,2	42,1	30,9	7,5	19,5	72,9
	35-44 años	4,1	11,6	45,1	32,8	6,4	15,7	77,9
	45-54 años	6,5	11,9	41,8	36,0	3,9	18,3	77,8
	55-64 años	6,8	15,1	34,9	34,4	8,9	21,9	69,2
	65-74 años	7,6	12,2	42,5	29,9	7,9	19,8	72,3
	TOTAL 15-34	7,6	11,5	42,3	32,5	6,1	19,1	74,9
Género	Hombre	7,2	13,5	41,3	31,5	6,5	20,7	72,8
	Mujer	5,9	10,9	42,1	34,7	6,3	16,8	76,9
T.H.	Araba	4,9	10,8	40,9	40,0	3,4	15,7	80,9
	Bizkaia	7,6	11,9	43,1	30,1	7,3	19,5	73,2
	Gipuzkoa	5,6	13,3	39,8	35,1	6,1	18,9	74,9

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER.	ACUERDO
Consumo de cannabis	No ha probado el cannabis	6,0	13,4	42,3	31,9	6,4	19,4	74,2
	Consumidor experimental	7,4	13,3	42,8	29,9	6,6	20,6	72,8
	Consumidor experimentado	9,4	4,1	41,9	36,5	8,0	13,6	78,4
	Consumidor ocasional	4,1	11,2	40,2	40,6	3,9	15,3	80,8
	Consumidor habitual	10,2	6,1	34,7	42,0	7,1	16,3	76,6
Consumo de drogas ilegales	No ha consumido ninguna	6,1	13,3	42,4	31,7	6,5	19,4	74,1
	Sólo ha consumido cannabis	7,2	11,8	41,0	33,5	6,6	18,9	74,4
	Ha consumido pero no en el último año	7,7	6,9	40,4	39,4	5,7	14,5	79,8
	Alguna sustancia ilegal en último año	8,0	10,1	37,8	39,2	4,9	18,1	77,0
Cercanía a las drogas	Ajenos	5,4	15,0	40,7	31,9	6,9	20,4	72,6
	Cercanos	7,4	9,8	43,8	33,0	6,0	17,2	76,8
	Implicados	7,8	6,9	38,9	42,0	4,4	14,7	80,9
	Otros	13,1	19,9	44,8	10,0	12,1	33,0	54,9
TOTAL		6,6	12,2	41,7	33,1	6,4	18,8	74,8

Tabla A.30. Distribución de la población en función de su opinión respecto al uso terapéutico del cannabis por características personales (%)

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER.	ACUERDO.
Edad	15-19 años	2,8	2,1	32,8	58,1	4,2	4,9	90,9
	20-24 años	1,4	2,1	31,7	62,1	2,8	3,5	93,7
	25-29 años	2,2	1,9	25,0	67,6	3,2	4,2	92,7
	30-34 años	1,3	2,9	28,3	65,4	2,1	4,2	93,7
	35-44 años	1,7	1,2	26,6	68,9	1,7	2,9	95,5

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
	45-54 años	2,0	1,2	29,6	65,6	1,5	3,2	95,3
	55-64 años	1,0	3,3	34,3	54,3	7,0	4,4	88,6
	65-74 años	5,3	6,0	35,1	40,6	13,0	11,3	75,7
	TOTAL 15-34	1,9	2,3	28,8	64,1	2,9	4,2	92,9
Género	Hombre	1,7	2,0	30,2	63,2	3,0	3,7	93,4
	Mujer	2,6	3,0	30,0	58,9	5,5	5,6	88,9
T.H.	Araba	2,0	4,3	31,3	59,1	3,3	6,3	90,4
	Bizkaia	2,4	2,1	29,9	60,2	5,4	4,5	90,1
	Gipuzkoa	1,7	2,4	29,8	63,3	2,8	4,1	93,1
Consumo de cannabis	No ha probado el cannabis	2,9	3,5	34,1	53,7	5,9	6,3	87,8
	Consumidor experimental	0,4	0,4	27,1	70,3	1,8	0,8	97,4
	Consumidor experimentado	2,6	0,0	19,0	77,7	0,8	2,6	96,7
	Consumidor ocasional	0,7	2,0	24,7	71,4	1,1	2,7	96,1
	Consumidor habitual	0,7	0,8	15,4	82,0	1,1	1,5	97,3
Consumo de drogas ilegales	No ha consumido ninguna	2,9	3,5	33,9	53,7	5,9	6,4	87,6
	Sólo ha consumido cannabis	0,7	0,7	27,4	69,8	1,4	1,4	97,2
	Ha consumido pero no en el último año	1,7	0,7	14,0	83,0	0,5	2,4	97,1
	Alguna sustancia ilegal en último año	0,0	0,7	23,4	72,3	3,5	0,7	95,7
Cercanía a las drogas	Ajenos	3,1	3,5	33,5	53,2	6,7	6,5	86,7
	Cercanos	1,2	1,7	30,0	65,2	1,9	2,9	95,2
	Implicados	0,6	0,8	15,8	81,2	1,6	1,4	97,0
	Otros	7,0	3,7	39,8	44,6	5,0	10,7	84,4
TOTAL		2,1	2,5	30,1	61,0	4,3	4,6	91,1

Tabla A.31. Distribución de la población en función de su opinión respecto a la administración médica de heroína por características personales (%)

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
Edad	15-19 años	13,7	19,8	33,0	23,5	9,9	33,5	56,5
	20-24 años	12,3	18,9	31,9	19,6	17,3	31,2	51,4
	25-29 años	8,4	14,5	36,9	27,2	12,9	22,9	64,2
	30-34 años	10,3	10,5	35,7	28,9	14,6	20,8	64,6
	35-44 años	8,6	11,4	34,3	29,4	16,3	20,0	63,7
	45-54 años	8,7	9,6	36,6	28,6	16,5	18,3	65,2
	55-64 años	5,7	12,2	35,1	26,1	21,0	17,8	61,2
	65-74 años	11,6	11,8	28,1	15,6	32,9	23,4	43,7
	TOTAL 15-34	10,7	15,1	34,8	25,4	13,9	25,8	60,2
Género	Hombre	8,4	14,6	34,9	25,6	16,5	23,0	60,5
	Mujer	10,1	10,5	33,6	25,9	20,0	20,6	59,4
T.H.	Araba	11,0	13,3	36,1	25,1	14,6	24,3	61,2
	Bizkaia	9,9	11,8	32,7	25,8	19,7	21,7	58,5
	Gipuzkoa	7,4	13,4	35,9	25,9	17,5	20,8	61,8
Consumo de cannabis	No ha probado el cannabis	9,3	12,8	35,1	21,4	21,4	22,1	56,5
	Consumidor experimental	10,1	14,1	36,8	28,3	10,7	24,2	65,1
	Consumidor experimentado	7,6	10,2	31,6	35,9	14,6	17,9	67,6
	Consumidor ocasional	4,8	10,3	32,1	37,5	15,2	15,1	69,6
	Consumidor habitual	13,3	10,3	24,7	38,7	13,1	23,6	63,4
Consumo de drogas ilegales	No ha consumido ninguna	9,1	12,6	35,3	21,3	21,7	21,7	56,7
	Sólo ha consumido cannabis	9,0	12,1	34,8	30,1	14,0	21,2	64,9
	Ha consumido pero no en el último año	7,2	12,8	29,0	41,3	9,7	20,0	70,3
	Alguna sustancia ilegal en último año	17,2	13,0	26,4	32,3	11,2	30,2	58,7
Cercanía a las drogas	Ajenos	9,9	12,9	33,3	21,3	22,6	22,8	54,6

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
	Cercanos	8,2	11,5	38,2	27,0	15,1	19,7	65,2
	Implicados	10,2	10,8	28,3	40,2	10,5	21,0	68,5
	Otros	6,7	33,6	21,2	18,0	20,5	40,3	39,2
TOTAL		9,3	12,5	34,2	25,7	18,3	21,8	60,0

Tabla A.32. Distribución de la población en función de su opinión respecto a la apertura de salas de consumo higiénico por características personales (%)

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER.	ACUERDO
Edad	15-19 años	19,9	14,3	35,4	25,1	5,3	34,2	60,5
	20-24 años	17,0	10,7	36,8	30,0	5,6	27,7	66,7
	25-29 años	10,2	9,8	40,7	35,8	3,6	20,0	76,5
	30-34 años	13,5	9,4	39,6	31,9	5,6	22,9	71,5
	35-44 años	9,7	12,4	36,5	34,8	6,6	22,0	71,3
	45-54 años	11,5	17,2	34,4	31,8	5,0	28,7	66,3
	55-64 años	16,7	15,9	31,4	24,6	11,4	32,6	56,0
	65-74 años	23,4	18,1	27,2	17,3	14,1	41,5	44,5
	TOTAL 15-34	14,3	10,6	38,6	31,5	4,9	24,9	70,1
Género	Hombre	13,4	14,2	34,0	32,0	6,4	27,6	66,0
	Mujer	15,2	13,6	35,9	26,9	8,3	28,8	62,9
T.H.	Araba	17,8	13,9	37,2	27,8	3,2	31,8	65,0
	Bizkaia	16,1	13,2	34,6	29,4	6,8	29,3	64,0
	Gipuzkoa	9,8	15,0	34,5	30,4	10,3	24,9	64,9
Consumo de cannabis	No ha probado el cannabis	16,9	16,1	34,4	23,9	8,6	33,0	58,4

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER.	ACUERDO
	Consumidor experimental	11,9	12,1	39,9	30,4	5,7	24,0	70,3
	Consumidor experimentado	5,8	7,3	30,8	50,3	5,8	13,1	81,1
	Consumidor ocasional	5,9	10,5	36,9	42,5	4,2	16,4	79,4
	Consumidor habitual	12,3	6,7	29,5	47,0	4,4	19,1	76,5
Consumo de drogas ilegales	No ha consumido ninguna	17,0	15,9	34,7	23,8	8,7	32,8	58,4
	Sólo ha consumido cannabis	10,7	13,1	36,4	33,9	6,0	23,7	70,3
	Ha consumido pero no en el último año	7,8	6,5	30,2	53,0	2,4	14,4	83,2
	Alguna sustancia ilegal en último año	10,0	5,5	41,0	37,4	6,0	15,5	78,5
Cercanía a las drogas	Ajenos	17,1	16,3	32,9	23,7	10,0	33,4	56,6
	Cercanos	13,0	13,4	38,0	30,5	5,1	26,4	68,5
	Implicados	8,3	5,2	32,5	50,3	3,7	13,5	82,8
	Otros	8,1	19,0	44,8	18,5	9,7	27,0	63,3
TOTAL		14,3	13,9	34,9	29,5	7,4	28,2	64,4

Tabla A.33. Distribución de la población en función de su opinión respecto al cultivo de cannabis para el autoconsumo por características personales (%)

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER.	ACUERDO
Edad	15-19 años	16,7	16,9	25,9	38,2	2,4	33,6	64,1
	20-24 años	13,3	12,5	31,8	36,8	5,5	25,8	68,7
	25-29 años	12,7	14,9	27,1	42,4	2,9	27,6	69,5
	30-34 años	18,4	15,6	28,0	32,4	5,6	33,9	60,4
	35-44 años	18,7	18,6	28,2	27,6	6,8	37,3	55,8
	45-54 años	25,4	29,6	20,2	18,5	6,4	55,0	38,6
	55-64 años	38,1	25,8	12,6	11,8	11,8	63,9	24,3
	65-74 años	44,3	27,0	9,8	6,5	12,4	71,4	16,3

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER.	ACUERDO
	TOTAL 15-34	15,3	14,9	28,2	37,4	4,2	30,2	65,6
Género	Hombre	23,1	18,9	23,3	29,3	5,4	42,0	52,6
	Mujer	26,5	24,0	21,0	19,3	9,1	50,5	40,3
T.H.	Araba	25,7	18,4	22,2	31,4	2,2	44,1	53,6
	Bizkaia	29,5	23,7	19,4	19,2	8,1	53,2	38,7
	Gipuzkoa	16,5	19,0	26,7	29,6	8,2	35,5	56,3
Consumo de cannabis	No ha probado el cannabis	33,3	27,2	17,8	12,2	9,5	60,5	30,0
	Consumidor experimental	12,7	15,2	35,0	32,4	4,7	27,9	67,4
	Consumidor experimentado	8,8	6,1	27,8	53,3	4,0	14,9	81,1
	Consumidor ocasional	8,0	12,8	29,4	47,8	2,0	20,8	77,1
	Consumidor habitual	5,9	5,0	19,6	68,2	1,3	10,9	87,8
Consumo de drogas ilegales	No ha consumido ninguna	33,5	27,5	17,8	11,7	9,5	61,0	29,5
	Sólo ha consumido cannabis	10,7	13,0	34,2	38,4	3,8	23,6	72,6
	Ha consumido pero no en el último año	10,1	8,5	20,2	58,0	3,2	18,6	78,1
	Alguna sustancia ilegal en último año	7,6	8,5	23,8	57,3	2,7	16,2	81,1
Cercanía a las drogas	Ajenos	34,6	26,7	17,3	11,3	10,0	61,3	28,7
	Cercanos	17,6	19,4	28,6	29,4	4,9	37,0	58,1
	Implicados	7,4	8,2	21,2	60,1	3,0	15,7	81,3
	Otros	27,1	16,5	25,9	17,8	12,6	43,6	43,7
TOTAL		24,8	21,5	22,2	24,3	7,3	46,2	46,5

Tabla A.34. Distribución de la población en función de su opinión respecto a la difusión de pautas de consumo seguro por características personales (%)

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
Edad	15-19 años	9,5	8,1	32,9	45,9	3,7	17,6	78,7
	20-24 años	8,5	9,4	25,5	52,6	3,9	17,9	78,2
	25-29 años	10,6	7,7	29,4	46,8	5,5	18,3	76,2
	30-34 años	15,1	5,7	33,6	40,4	5,2	20,8	74,1
	35-44 años	12,2	9,6	28,1	42,7	7,4	21,8	70,7
	45-54 años	12,3	15,7	24,3	41,0	6,7	28,0	65,2
	55-64 años	17,5	11,9	28,9	36,3	5,4	29,4	65,2
	65-74 años	14,6	14,4	24,0	29,6	17,5	29,0	53,5
	TOTAL 15-34	11,3	7,5	30,4	45,9	4,7	18,9	76,4
Género	Hombre	11,9	10,6	29,0	41,8	6,6	22,6	70,8
	Mujer	14,1	11,2	26,6	40,0	8,0	25,3	66,7
T.H.	Araba	11,8	10,5	31,8	41,3	4,6	22,3	73,1
	Bizkaia	14,2	11,2	30,8	38,0	5,7	25,5	68,8
	Gipuzkoa	11,5	10,6	21,0	45,6	11,2	22,1	66,7
Consumo de cannabis	No ha probado el cannabis	15,2	12,7	27,9	35,5	8,7	27,8	63,4
	Consumidor experimental	11,9	9,8	26,5	46,4	5,4	21,7	72,9
	Consumidor experimentado	9,1	5,8	30,4	49,1	5,6	14,9	79,5
	Consumidor ocasional	6,6	8,2	32,9	47,9	4,4	14,8	80,9
	Consumidor habitual	6,1	4,5	22,3	64,0	3,2	10,6	86,2
Consumo de drogas ilegales	No ha consumido ninguna	15,3	12,5	28,1	35,3	8,8	27,8	63,3
	Sólo ha consumido cannabis	10,7	8,7	29,6	45,9	5,1	19,4	75,5
	Ha consumido pero no en el último año	6,5	9,0	23,2	56,7	4,7	15,4	79,9
	Alguna sustancia ilegal en último año	6,6	4,4	24,3	61,2	3,5	11,0	85,5
Cercanía a las drogas	Ajenos	15,9	12,4	27,9	34,3	9,5	28,3	62,2

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
	Cercanos	11,5	10,2	29,4	43,9	5,0	21,6	73,3
	Implicados	5,8	6,5	23,3	59,9	4,6	12,2	83,2
	Otros	16,5	17,3	25,3	26,4	14,5	33,8	51,6
TOTAL		13,0	10,9	27,8	40,9	7,3	23,9	68,7

Tabla A.35. Distribución de la población en función de su opinión respecto a la imposición de multas a quines fuman en lugares públicos por características personales (%)

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
Edad	15-19 años	26,0	15,5	31,0	26,7	0,7	41,6	57,8
	20-24 años	32,2	17,6	24,2	24,1	2,0	49,7	48,3
	25-29 años	25,9	19,6	25,9	26,4	2,1	45,6	52,3
	30-34 años	24,6	16,4	26,3	29,6	3,1	41,0	55,9
	35-44 años	30,4	20,1	22,8	23,5	3,2	50,5	46,3
	45-54 años	30,9	20,2	23,8	23,4	1,8	51,1	47,1
	55-64 años	21,7	23,3	26,4	24,6	4,0	45,0	51,0
	65-74 años	16,2	18,3	24,3	35,3	6,0	34,4	59,6
	TOTAL 15-34	26,9	17,5	26,5	26,9	2,2	44,4	53,4
Género	Hombre	28,4	18,7	23,5	26,7	2,7	47,1	50,2
	Mujer	24,1	20,2	26,4	25,9	3,4	44,3	52,3
T.H.	Araba	25,2	19,9	15,8	36,8	2,3	45,1	52,6
	Bizkaia	27,0	18,8	27,4	23,3	3,4	45,8	50,8
	Gipuzkoa	25,5	20,4	24,8	26,5	2,8	45,9	51,3
Consumo tabaco	Fumador	42,1	18,1	20,4	17,5	1,8	60,3	38,0
	Exfumador	27,7	22,6	21,6	23,7	4,4	50,4	45,3
	No fumador	13,7	17,9	30,6	34,5	3,4	31,6	65,0

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
Gravedad atribuida al consumo de tabaco	Nada grave	54,6	15,4	15,8	13,8	0,5	70,0	29,6
	Ago grave	28,4	22,6	23,5	23,1	2,4	51,0	46,6
	Bastante grave	24,1	20,5	26,1	26,0	3,3	44,6	52,1
	Muy grave	19,8	13,7	27,9	35,7	2,9	33,5	63,6
	Ns/nc	19,0	28,7	21,3	19,0	12,0	47,7	40,3
Riesgo atribuido consumo diario de tabaco	Ningún problema	47,9	9,4	19,4	21,9	1,3	57,4	41,3
	Pocos problemas	35,6	21,2	17,2	23,5	2,5	56,9	40,7
	Bastantes problemas	27,0	20,5	29,0	20,2	3,3	47,5	49,2
	Muchos problemas	22,7	18,6	22,9	33,0	2,8	41,3	56,0
	Ns/nc	15,6	22,7	19,2	27,5	15,0	38,3	46,7
Intentos de dejar de fumar	No, nunca	37,3	20,0	21,9	19,8	1,0	57,3	41,6
	Sí, una vez	48,8	15,3	15,4	17,1	3,3	64,1	32,6
	Sí, varias evces	37,0	19,4	22,9	18,9	1,9	56,3	41,8
	Ns/nc	14,2	54,8	31,0	0,0	0,0	69,0	31,0
Disposición a dejar de fumar	No	44,1	18,7	19,9	15,4	1,8	62,9	35,3
	No lo sé	32,2	22,8	25,8	19,2	0,0	55,0	45,0
	Sí	39,2	18,6	19,6	20,3	2,3	57,8	39,8
	Nc	42,6	14,3	29,0	14,1	0,0	56,9	43,1
Total		26,2	19,5	24,9	26,3	3,1	45,7	51,2

Tabla A.36. Distribución de la población en función de su opinión respecto a eliminar los espacios para fumadores en los lugares de trabajo por características personales (%)

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
Edad	15-19 años	34,4	33,1	19,8	11,9	0,9	67,4	31,6
	20-24 años	48,0	22,3	13,0	12,0	4,7	70,3	25,0
	25-29 años	40,3	27,8	13,1	17,1	1,7	68,1	30,2
	30-34 años	37,7	31,8	12,6	14,2	3,8	69,4	26,8
	35-44 años	42,9	28,3	13,0	13,2	2,6	71,2	26,2
	45-54 años	45,0	26,8	10,8	13,1	4,3	71,8	23,9
	55-64 años	27,6	34,4	15,2	16,9	6,0	62,0	32,0
	65-74 años	18,3	32,0	17,8	25,2	6,7	50,3	42,9
	TOTAL 15-34	40,2	28,7	14,0	14,2	2,9	68,9	28,2
Género	Hombre	39,8	27,6	13,3	15,1	4,2	67,4	28,4
	Mujer	34,3	31,4	14,4	16,0	3,9	65,7	30,4
T.H.	Araba	39,2	29,8	10,1	18,8	2,0	69,0	29,0
	Bizkaia	39,3	29,0	12,8	14,0	4,9	68,3	26,8
	Gipuzkoa	32,3	30,2	17,3	16,7	3,5	62,6	33,9
Consumo tabaco	Fumador	55,4	24,6	9,8	7,8	2,4	80,0	17,6
	Exfumador	36,6	29,7	11,8	15,9	6,0	66,3	27,7
	No fumador	22,7	32,6	18,7	21,6	4,5	55,2	40,3
Gravedad atribuida al consumo de tabaco	Nada grave	60,9	22,5	9,3	5,9	1,5	83,3	15,2
	Ago grave	41,0	31,4	13,3	12,0	2,2	72,4	25,3
	Bastante grave	35,1	31,8	14,3	15,0	3,8	66,9	29,3
	Muy grave	28,5	25,4	15,0	24,9	6,2	53,9	39,9
	Ns/nc	36,3	25,2	14,2	9,4	14,9	61,5	23,6
Riesgo atribuido consumo diario de tabaco	Ningún problema	62,9	15,3	8,4	9,5	3,9	78,2	17,9
	Pocos problemas	46,8	32,2	9,3	8,2	3,5	79,0	17,5

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
	Bastantes problemas	38,7	29,0	16,9	11,7	3,7	67,7	28,6
	Muchos problemas	32,4	30,3	12,0	21,0	4,3	62,7	33,0
	Ns/nc	20,7	27,4	18,4	21,6	11,9	48,1	40,0
Intentos de dejar de fumar	No, nunca	53,8	27,2	9,0	8,3	1,6	81,0	17,3
	Sí, una vez	57,0	19,3	10,6	9,0	4,1	76,3	19,6
	Sí, varias evces	52,7	26,5	10,5	8,6	1,6	79,2	19,1
	Ns/nc	8,7	91,3	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Disposición a dejar de fumar	No	58,6	25,0	9,5	5,0	2,0	83,6	14,4
	No lo sé	48,8	32,8	5,4	11,0	1,9	81,7	16,5
	Sí	53,3	24,0	11,2	9,3	2,2	77,2	20,5
	Nc	43,7	39,0	3,6	9,6	4,0	82,7	13,3
Total		37,0	29,5	13,9	15,5	4,0	66,6	29,4

Tabla A.37. Distribución de la población en función de su opinión respecto a prohibir la presencia de menores en los lugares en los que se puede fumar por características personales (%)

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
Edad	15-19 años	23,2	23,9	23,9	25,6	3,4	47,1	49,5
	20-24 años	14,6	14,3	33,3	29,5	8,2	29,0	62,8
	25-29 años	14,6	15,5	32,4	34,1	3,3	30,2	66,5
	30-34 años	11,9	14,9	32,7	33,0	7,5	26,8	65,7
	35-44 años	12,8	14,3	29,3	39,0	4,6	27,1	68,3
	45-54 años	9,7	14,4	32,8	37,4	5,8	24,1	70,2
	55-64 años	10,5	11,3	26,1	42,8	9,3	21,9	68,9

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
	65-74 años	1,7	10,5	27,4	55,7	4,7	12,2	83,1
	TOTAL 15-34	15,2	16,4	31,3	31,3	5,7	31,6	62,6
Género	Hombre	11,8	13,5	29,6	39,5	5,6	25,3	69,1
	Mujer	10,9	14,8	30,2	37,9	6,3	25,7	68,1
T.H.	Araba	14,6	18,8	26,1	38,0	2,6	33,4	64,0
	Bizkaia	9,8	11,2	30,7	40,1	8,2	21,0	70,8
	Gipuzkoa	12,5	16,9	30,3	36,7	3,6	29,4	67,0
Consumo tabaco	Fumador	16,5	16,1	30,3	32,0	5,1	32,6	62,3
	Exfumador	11,6	13,2	29,2	38,3	7,7	24,8	67,5
	No fumador	7,1	12,3	30,1	45,0	5,6	19,3	75,1
Gravedad atribuida al consumo de tabaco	Nada grave	26,8	17,8	27,2	24,0	4,2	44,6	51,2
	Ago grave	9,8	18,9	31,6	32,4	7,3	28,6	64,0
	Bastante grave	10,8	13,3	31,3	40,2	4,5	24,0	71,4
	Muy grave	9,6	7,6	26,9	49,8	6,1	17,2	76,7
	Ns/nc	11,8	22,3	21,6	29,4	14,9	34,1	51,0
Riesgo atribuido consumo diario de tabaco	Ningún problema	25,3	10,9	25,0	32,7	6,2	36,2	57,6
	Pocos problemas	11,9	20,8	29,3	27,6	10,4	32,7	56,8
	Bastantes problemas	10,6	15,6	35,5	33,2	5,1	26,2	68,7
	Muchos problemas	11,3	11,6	24,9	47,0	5,3	22,9	71,9
	Ns/nc	7,6	11,7	22,3	28,9	29,3	19,4	51,3
Intentos de dejar de fumar	No, nunca	13,4	18,1	32,7	31,2	4,6	31,5	63,9
	Sí, una vez	21,9	11,6	28,6	32,1	5,7	33,6	60,7
	Sí, varias evces	16,5	19,1	26,7	33,1	4,5	35,7	59,8
	Ns/nc	0,0	13,3	40,5	22,7	23,4	13,3	63,2
Disposición a dejar de	No	19,4	22,4	31,1	22,6	4,7	41,7	53,6

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
fumar	No lo sé	11,5	15,3	33,8	30,6	8,8	26,8	64,4
	Sí	16,2	14,3	29,3	35,8	4,5	30,5	65,0
	Nc	7,5	27,6	20,5	44,3	0,0	35,1	64,9
Total		11,4	14,1	29,9	38,7	5,9	25,5	68,6

Tabla A.38. Distribución de la población en función de su opinión respecto a multar a propietarios de locales o responsables de empresas si permiten fumar en zonas prohibida por características personales (%)

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
Edad	15-19 años	21,4	21,3	32,9	22,0	2,3	42,8	54,9
	20-24 años	22,7	22,0	28,1	23,5	3,7	44,7	51,6
	25-29 años	22,8	24,0	26,9	25,1	1,2	46,8	52,0
	30-34 años	17,2	18,7	34,8	23,3	6,1	35,9	58,0
	35-44 años	27,1	24,0	22,7	22,9	3,4	51,1	45,5
	45-54 años	25,6	25,1	20,3	25,4	3,7	50,6	45,6
	55-64 años	23,2	17,9	26,6	28,4	3,8	41,1	55,1
	65-74 años	11,9	19,7	27,3	36,8	4,3	31,6	64,1
	TOTAL 15-34	20,8	21,5	30,6	23,7	3,5	42,3	54,3
Género	Hombre	22,4	22,4	25,5	25,9	3,9	44,8	51,3
	Mujer	22,1	21,4	26,8	26,4	3,4	43,5	53,2
T.H.	Araba	23,3	19,6	22,0	31,7	3,4	42,9	53,7
	Bizkaia	21,4	20,8	28,7	25,2	3,8	42,2	53,9
	Gipuzkoa	23,1	24,7	23,5	25,3	3,4	47,8	48,8
Consumo tabaco	Fumador	34,3	24,9	21,5	16,2	3,1	59,2	37,7

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
	Exfumador	24,5	20,1	26,4	24,7	4,3	44,6	51,1
	No fumador	11,6	19,7	30,2	34,7	3,7	31,3	64,9
Gravedad atribuida al consumo de tabaco	Nada grave	42,8	21,8	17,9	15,7	1,7	64,6	33,6
	Ago grave	23,9	28,3	22,5	22,2	3,1	52,2	44,7
	Bastante grave	20,0	20,4	29,9	26,1	3,6	40,4	56,0
	Muy grave	18,1	15,4	27,1	35,6	3,9	33,4	62,7
	Ns/nc	21,3	31,2	17,8	17,1	12,7	52,5	34,8
Riesgo atribuido consumo diario de tabaco	Ningún problema	39,9	20,6	16,7	16,9	5,8	60,5	33,7
	Pocos problemas	25,7	29,6	18,0	24,2	2,6	55,2	42,2
	Bastantes problemas	22,5	22,8	29,8	21,0	3,9	45,3	50,8
	Muchos problemas	20,3	19,5	24,6	32,4	3,2	39,8	57,0
	Ns/nc	21,5	24,2	24,9	14,4	15,0	45,7	39,3
Intentos de dejar de fumar	No, nunca	30,1	24,1	24,7	17,8	3,3	54,2	42,4
	Sí, una vez	41,0	21,2	18,8	16,0	3,0	62,2	34,8
	Sí, varias evces	32,0	29,0	17,7	18,5	2,8	61,0	36,2
	Ns/nc	0,0	82,3	17,7	0,0	0,0	82,3	17,7
Disposición a dejar de fumar	No	39,0	26,3	18,4	13,0	3,4	65,3	31,4
	No lo sé	31,6	26,9	20,4	17,6	3,4	58,6	38,0
	Sí	30,3	24,8	22,4	19,6	3,0	55,0	42,0
	Nc	32,4	27,5	27,8	12,2	0,0	59,9	40,1
Total		22,2	21,9	26,1	26,1	3,6	44,1	52,2

Tabla A.39. Distribución de la población en función de su opinión respecto a limitar el número de bares y restaurantes en los que se permite fumar por características personales (%)

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
Edad	15-19 años	33,3	22,0	28,4	12,8	3,5	55,3	41,2
	20-24 años	36,4	27,5	14,8	14,1	7,2	63,9	28,9
	25-29 años	35,0	23,5	20,5	18,1	2,8	58,5	38,6
	30-34 años	24,8	26,3	22,2	20,3	6,4	51,0	42,5
	35-44 años	34,6	23,7	21,6	14,4	5,7	58,3	36,0
	45-54 años	36,8	26,3	17,5	14,1	5,3	63,1	31,6
	55-64 años	25,4	22,8	22,5	19,4	10,0	48,2	41,8
	65-74 años	14,2	29,0	20,0	26,5	10,2	43,2	46,6
	TOTAL 15-34	31,8	25,0	21,1	17,0	5,0	56,9	38,1
Género	Hombre	31,9	23,4	19,9	18,1	6,6	55,4	38,0
	Mujer	28,4	26,8	21,4	16,8	6,6	55,2	38,2
T.H.	Araba	36,7	28,0	12,1	18,5	4,7	64,7	30,6
	Bizkaia	28,9	23,1	23,5	16,7	7,9	51,9	40,2
	Gipuzkoa	29,4	27,3	19,7	18,3	5,3	56,7	38,0
Consumo tabaco	Fumador	46,9	24,9	14,9	8,9	4,4	71,8	23,8
	Exfumador	27,8	26,3	19,6	19,9	6,5	54,1	39,4
	No fumador	17,5	24,7	26,1	23,6	8,1	42,2	49,7
Gravedad atribuida al consumo de tabaco	Nada grave	51,7	21,1	13,7	9,8	3,6	72,8	23,5
	Ago grave	35,7	28,4	16,9	12,8	6,3	64,1	29,7
	Bastante grave	25,5	25,1	24,2	18,8	6,3	50,6	43,0
	Muy grave	26,0	21,9	21,1	24,1	6,8	47,9	45,2
	Ns/nc	24,7	28,5	16,5	10,7	19,6	53,2	27,2
Riesgo atribuido consu-	Ningún problema	56,5	16,2	7,9	12,5	6,9	72,7	20,4

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
mo diario de tabaco	Pocos problemas	31,2	31,8	15,7	10,1	11,3	63,0	25,7
	Bastantes problemas	30,1	26,0	22,4	15,4	6,1	56,1	37,8
	Muchos problemas	28,6	23,6	20,8	21,2	5,8	52,1	42,0
	Ns/nc	29,9	19,1	9,9	17,7	23,5	49,0	27,6
Intentos de dejar de fumar	No, nunca	43,5	28,4	13,0	10,8	4,3	71,9	23,8
	Sí, una vez	58,3	15,5	11,8	7,1	7,4	73,7	18,9
	Sí, varias evces	42,8	24,8	20,4	7,4	4,5	67,6	27,9
	Ns/nc	0,0	68,2	31,8	0,0	0,0	68,2	31,8
Disposición a dejar de fumar	No	55,8	21,8	13,7	5,7	3,0	77,6	19,4
	No lo sé	39,8	33,5	9,8	9,7	7,2	73,3	19,5
	Sí	43,7	23,3	17,0	10,5	5,6	66,9	27,5
	Nc	40,5	41,6	18,0	0,0	0,0	82,0	18,0
Total		30,2	25,1	20,6	17,5	6,6	55,3	38,1

Tabla A.40. Distribución de la población en función de su opinión respecto a prohibir la venta de tabaco a menores por características personales (%)

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
Edad	15-19 años	8,7	9,0	25,7	52,0	4,5	17,8	77,8
	20-24 años	2,3	2,7	21,5	72,4	1,0	5,0	93,9
	25-29 años	3,5	1,5	17,6	76,3	1,2	5,0	93,9
	30-34 años	4,1	1,5	23,1	69,2	2,1	5,6	92,3
	35-44 años	2,9	1,4	13,2	81,8	0,7	4,3	95,0

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
	45-54 años	3,5	2,1	12,1	81,9	0,3	5,7	94,0
	55-64 años	3,7	0,9	13,9	80,8	0,7	4,6	94,7
	65-74 años	1,5	1,3	12,2	84,1	1,0	2,8	96,3
	TOTAL 15-34	4,3	3,0	21,5	69,2	2,0	7,3	90,7
Género	Hombre	3,8	1,8	15,5	77,9	1,0	5,6	93,4
	Mujer	3,1	2,2	16,1	77,4	1,2	5,2	93,6
T.H.	Araba	3,1	3,7	21,8	70,1	1,3	6,8	91,9
	Bizkaia	2,5	1,3	15,9	79,1	1,2	3,7	95,0
	Gipuzkoa	5,2	2,4	12,9	78,7	0,8	7,6	91,6
Consumo tabaco	Fumador	5,0	2,8	19,2	72,2	0,8	7,8	91,4
	Exfumador	2,7	0,9	13,7	81,3	1,3	3,7	95,0
	No fumador	1,8	1,9	14,8	80,3	1,2	3,7	95,1
Gravedad atribuida al consumo de tabaco	Nada grave	8,0	6,6	21,5	62,6	1,3	14,6	84,1
	Ago grave	3,9	2,5	17,4	75,1	1,1	6,4	92,5
	Bastante grave	2,8	1,2	17,4	77,5	1,2	4,0	94,9
	Muy grave	3,1	0,9	9,1	86,5	0,4	3,9	95,6
	Ns/nc	0,0	6,8	15,2	73,2	4,7	6,8	88,4
Riesgo atribuido consumo diario de tabaco	Ningún problema	11,0	1,6	17,6	65,5	4,3	12,7	83,1
	Pocos problemas	2,3	3,0	17,5	75,2	2,0	5,3	92,7
	Bastantes problemas	3,6	1,9	20,1	73,6	0,8	5,5	93,7
	Muchos problemas	3,1	1,9	11,2	83,1	0,8	5,0	94,3
	Ns/nc	0,0	3,3	14,6	67,1	15,0	3,3	81,7
Intentos de dejar de fumar	No, nunca	6,4	2,9	21,4	69,0	0,3	9,3	90,4
	Sí, una vez	4,9	1,8	16,0	74,3	2,9	6,8	90,3
	Sí, varias veces	5,3	3,5	15,6	75,3	0,3	8,9	90,9

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	NC	DESACUER	ACUERDO.
	Ns/nc	0,0	0,0	8,7	91,3	0,0	0,0	100,0
Disposición a dejar de fumar	No	3,8	3,8	22,6	69,1	0,8	7,6	91,7
	No lo sé	5,9	1,8	11,3	81,0	0,0	7,7	92,3
	Sí	6,7	2,8	18,4	71,2	1,0	9,4	89,6
	Nc	3,3	0,0	15,7	77,9	3,1	3,3	93,6
Total		3,4	2,0	15,8	77,7	1,1	5,4	93,5