

3. ariketa

Osatu taula falta diren datuen bidez (unitate estandarren kopurua, kontsumizio-kopurua eta -motak eta arriskuak) (Emakumea: 60 kg eta gizona: 70 kg.)

Alkoholemia g/l	Faseak	EUEak	Kontsumizioak (kop. eta mota)	Ondorioak	
0.3-0.5	mozkorraldia arina	GIZONEZKOAK UBES EMAKUMEZKOAK UBES	konbinatu edo	kaña	errendimendu psikomotorrean kalte arina argien pertzepzioaren murrizketa distantzien pertzepzioaren aldaketa ikusmen-eremuaren gutxitzea (tunel efektua)
			konbinatu edo	kaña	deshinibitzea euforia arina ahalmenen neurritz kanpoko balorazioa
0.5-1	mozkorraldia ertaina	GIZONEZKOAK UBES EMAKUMEZKOAK UBES	konbinatu edo	kaña	errendimendu psikomotorraren narriadura ertaina eskuen koordinazioaren asaldura Argi gorriaren pertzepzioaren narriadura Erreakzionatzeko denbora areagotzea Oldarkortasuna eta agresibitatea gidatzean
			konbinatu edo	kaña	Hitz egiteko eta mugimenduak koordinatzeko zailtasunak
1-2	mozkorraldi handia	GIZONEZKOAK UBES EMAKUMEZKOAK UBES	konbinatu edo	kaña	Errendimendu psikomotorraren narriadura larria Ausarkeriazko gidatzea, arriskua ez antzemateagatik
			konbinatu edo	kaña	Ikusmen-zolitasunaren murrizketa Periferiako ikusmenaren murrizketa eta itsualdiगतिको berreskurapenaren murrizketa Ikusmen lausoa Mugimenduen koordinazio falta Agresibitatea, Gehiegizko euforia Sedazioa Goi-ahalmenen kontrola galtzea.
0.3-0.5	mozkorraldia osoa	GIZONEZKOAK UBES EMAKUMEZKOAK UBES	konbinatu edo	kaña	Errendimendu psikomotorraren narriadura oso larria Ikusmen oso lausoa Deskoordinazio larria Nahasmena Apatia- eta logura-egoera
3-5	KOMA				Koma Gidatzeko ezintasuna
>5	HERIOTZA				