



- Significativamente peor que el valor de la CAPV
- No significativamente diferente al valor de la CAPV
- Significativamente mejor que el valor de la CAPV



	Barrualde Galdakao	CAPV	Peor		Mejor
Mala salud	22,2	19,6	26,5		10,9
Calidad de vida (EAV-EQ)	70,8	72,0	69,4		74,7
Síntomas de ansiedad-depresión	22,2	23,9	32,5		15,3
Mala salud dental	23,0	26,5	40,0		19,9
Limitación temporal actividad	9,9	10,1	13,7		5,5
Limitación crónica actividad	9,0	9,8	15,4		7,1
Dependencia moderada-grave	18,1	15,8	18,3		12,1
Problemas crónicos	48,7	46,9	53,0		36,7
Hipertensión	16,2	14,7	16,4		10,3
Colesterol elevado	13,6	10,7	13,6		6,1
Artrosis	12,0	10,0	14,1		4,2
Dolor dorsal	10,4	8,0	13,4		2,0
Diabetes	4,1	4,1	6,9		2,2
Lesión no intencionada	7,0	7,9	12,3		5,7

La figura muestra la situación relativa de la población de la OSI respecto a la de la CAPV. Los círculos muestran para cada indicador los resultados correspondientes a la OSI. La línea verde indica el valor promedio de la CAPV. Las barras grises representan el rango de los valores para todas las OSI. Un círculo rojo indica que el valor de la OSI es significativamente peor que el de la CAPV; uno verde señala un valor significativamente mejor, aun cuando el problema de salud puede ser muy relevante.

- Significativamente peor que el valor de la CAPV
- No significativamente diferente al valor de la CAPV
- Significativamente mejor que el valor de la CAPV




	Barrualde Galdakao	CAPV	Peor		Mejor
Mala salud	16,2	16,7	20,8		12,0
Calidad de vida (EAV-EQ)	74,8	75,1	72,4		77,0
Síntomas de ansiedad-depresión	12,5	15,9	22,9		10,3
Mala salud dental	23,1	25,2	40,8		13,9
Limitación temporal actividad	8,7	8,2	11,4		5,8
Limitación crónica actividad	7,7	9,2	14,6		4,2
Dependencia moderada-grave	9,6	8,6	16,6		4,9
Problemas crónicos	47,3	46,4	52,6		38,3
Hipertensión	18,5	16,9	20,4		12,8
Colesterol elevado	16,6	13,3	17,2		9,2
Artrosis	6,1	5,3	7,3		2,5
Dolor dorsal	7,0	6,1	8,5		2,3
Diabetes	6,4	6,1	8,2		3,1
Lesión no intencionada	6,9	8,3	11,2		3,9

La figura muestra la situación relativa de la población de la OSI respecto a la de la CAPV. Los círculos muestran para cada indicador los resultados correspondientes a la OSI. La línea verde indica el valor promedio de la CAPV. Las barras grises representan el rango de los valores para todas las OSI. Un círculo rojo indica que el valor de la OSI es significativamente peor que el de la CAPV; uno verde señala un valor significativamente mejor, aun cuando el problema de salud puede ser muy relevante.

Para más información, ver: <http://bit.ly/1k85JRH>

- Significativamente peor que el valor de la CAPV
- No significativamente diferente al valor de la CAPV
- Significativamente mejor que el valor de la CAPV




	Barrualde Galdakao	CAPV	Peor		Mejor
Desempleo ESCAV	17,8	19,8	27,5		10,1
Dificultad llegar a fin de mes	41,1	46,1	60,4		28,3
Autopercepción de pobreza	50,1	57,3	67,7		34,2
Horas trabajo doméstico-cuidados	24,1	24,2	29,8		22,1
Entorno con animales molestos	7,3	8,3	12,2		4,3
Entorno con pocas zonas verdes	3,0	5,6	11,7		1,3
Entorno ruidoso	4,9	5,0	6,9		1,6
Apoyo social afectivo bajo	23,2	24,0	33,8		14,4
Apoyo social confidencial bajo	3,3	5,1	9,6		0,6
Tabaquismo	15,5	18,7	21,8		13,8
Exposición pasiva al tabaco	11,2	15,6	22,1		11,2
Bebedores/as habituales	36,2	37,6	48,8		25,9
Consumo de alcohol de riesgo	14,9	14,7	20,2		10,1
Consumo intensivo de alcohol	4,6	5,5	9,7		1,3
Sobrepeso	42,5	39,9	53,2		35,0
Obesidad	14,3	12,3	18,7		8,3
Población físicamente activa	59,4	66,0	55,8		72,5
Consumo diario frutas-verduras	75,0	73,0	56,0		81,4

La figura muestra la situación relativa de la población de la OSI respecto a la de la CAPV. Los círculos muestran para cada indicador los resultados correspondientes a la OSI. La línea verde indica el valor promedio de la CAPV. Las barras grises representan el rango de los valores para todas las OSI. Un círculo rojo indica que el valor de la OSI es significativamente peor que el de la CAPV; uno verde señala un valor significativamente mejor, aun cuando el problema de salud puede ser muy relevante.

Para más información, ver: <http://bit.ly/1k85JRH>

- Significativamente peor que el valor de la CAPV
- No significativamente diferente al valor de la CAPV
- Significativamente mejor que el valor de la CAPV




	Barrualde Galdakao	CAPV	Peor		Mejor
Desempleo ESCAV	19,6	24,3	33,6		15,5
Dificultad llegar a fin de mes	41,6	42,2	53,1		33,0
Autopercepción de pobreza	51,1	50,9	65,0		39,0
Horas trabajo doméstico-cuidados	10,9	12,0	17,9		9,0
Entorno con animales molestos	5,6	7,9	15,9		2,7
Entorno con pocas zonas verdes	1,5	4,6	8,8		0,5
Entorno ruidoso	3,0	4,6	8,2		2,9
Apoyo social afectivo bajo	24,6	25,2	43,4		11,8
Apoyo social confidencial bajo	5,4	4,9	9,4		1,6
Tabaquismo	24,4	24,1	29,4		18,6
Exposición pasiva al tabaco	12,7	17,1	29,6		12,7
Bebedores/as habituales	64,1	63,3	73,5		54,3
Consumo de alcohol de riesgo	25,9	25,1	35,5		15,5
Consumo intensivo de alcohol	11,5	11,9	16,5		4,1
Sobrepeso	60,7	57,5	64,5		54,1
Obesidad	16,7	14,1	17,2		11,7
Población físicamente activa	72,2	73,4	61,0		81,5
Consumo diario frutas-verduras	67,4	64,5	53,7		76,5

La figura muestra la situación relativa de la población de la OSI respecto a la de la CAPV. Los círculos muestran para cada indicador los resultados correspondientes a la OSI. La línea verde indica el valor promedio de la CAPV. Las barras grises representan el rango de los valores para todas las OSI. Un círculo rojo indica que el valor de la OSI es significativamente peor que el de la CAPV; uno verde señala un valor significativamente mejor, aun cuando el problema de salud puede ser muy relevante.

Para más información, ver: <http://bit.ly/1k85JRH>


- Significativamente peor que el valor de la CAPV
- No significativamente diferente al valor de la CAPV
- Significativamente mejor que el valor de la CAPV



	Barrualde Galdakao	CAPV	Peor		Mejor
Satisfacción sistema sanitario	88,2	89,4	86,7		92,4
Necesidades no cubiertas	6,6	5,2	8,5		1,9
Continuidad: información	51,2	53,2	42,7		65,7
Continuidad: coherencia	75,7	74,4	66,2		86,2
Continuidad: profesionales	89,0	87,0	72,9		98,5
Cribado cáncer de mama	94,1	94,0	88,6		100
Cribado cáncer colorrectal	87,4	81,7	75,1		88,9
Cribado cáncer de cervix	70,5	72,0	65,4		82,9
Vacunación contra la gripe	65,5	67,7	54,7		79,6
Consulta medicina general	78,5	80,3	83,8		74,2
Consulta enfermería	43,9	48,4	61,3		30,2
Consulta medicina especializada	52,8	57,3	67,1		49,6
Consulta dentista	53,1	52,5	46,4		56,9
Urgencias	12,0	13,9	19,5		10,8
Hospitalización	7,5	7,3	10,0		4,9
Hospital de día	2,8	5,7	2,8		10,2
Uso servicios socio-sanitarios	21,0	14,6	3,2		21,0
Conoce cita automatizada	80,7	84,3	74,8		92,1
Usa cita automatizada	61,3	62,9	52,6		71,5
Valoración cita automatizada	4,6	4,5	2,7		5,5
Conoce cita web medicina	52,3	52,6	30,4		62,1
Usa cita web medicina	27,4	23,4	12,9		29,5
Valoración cita web medicina	6,6	6,7	5,5		7,5
Conoce cita web enfermería	35,9	39,3	19,5		51,6
Usa cita web enfermería	9,8	9,3	1,7		12,7
Valoración cita web enfermería	6,5	6,6	5,3		7,9

La figura muestra la situación relativa de la población de la OSI respecto a la de la CAPV. Los círculos muestran para cada indicador los resultados correspondientes a la OSI. La línea verde indica el valor promedio de la CAPV. Las barras grises representan el rango de los valores para todas las OSI. Un círculo rojo indica que el valor de la OSI es significativamente peor que el de la CAPV; uno verde señala un valor significativamente mejor.

- Significativamente peor que el valor de la CAPV
- No significativamente diferente al valor de la CAPV
- Significativamente mejor que el valor de la CAPV



	Barrualde Galdakao	CAPV	Peor		Mejor
Satisfacción sistema sanitario	88,7	90,9	85,3		94,3
Necesidades no cubiertas	5,5	3,9	6,0	●	0,8
Continuidad: información	58,8	58,4	45,7		74,6
Continuidad: coherencia	71,2	75,1	56,9	●	83,4
Continuidad: profesionales	77,9	85,7	66,7	●	90,5
Cribado cáncer colorrectal	91,1	81,5	56,7		91,1
Vacunación contra la gripe	78,8	72,6	52,8	●	81,1
Consulta medicina general	72,4	74,1	83,3	●	65,9
Consulta enfermería	36,6	43,6	56,0	●	27,2
Consulta medicina especializada	43,3	45,1	52,0	●	32,0
Consulta dentista	50,3	47,4	42,2	●	50,7
Urgencias	12,8	13,2	20,3	●	9,5
Hospitalización	7,7	7,6	9,1	●	5,5
Hospital de día	2,9	5,7	2,1	●	12,3
Uso servicios socio-sanitarios	14,9	12,2	2,0	●	17,7
Conoce cita automatizada	77,0	76,8	57,6	●	90,1
Usa cita automatizada	53,3	52,6	37,6	●	64,6
Valoración cita automatizada	4,7	4,9	3,5	●	5,9
Conoce cita web medicina	46,2	49,0	26,7	●	65,5
Usa cita web medicina	20,7	19,5	6,2	●	24,2
Valoración cita web medicina	6,8	7,0	5,9	●	8,5
Conoce cita web enfermería	25,2	33,1	20,2	●	54,1
Usa cita web enfermería	6,4	6,6	2,8	●	9,8
Valoración cita web enfermería	7,1	6,8	4,3	●	8,6

La figura muestra la situación relativa de la población de la OSI respecto a la de la CAPV. Los círculos muestran para cada indicador los resultados correspondientes a la OSI. La línea verde indica el valor promedio de la CAPV. Las barras grises representan el rango de los valores para todas las OSI. Un círculo rojo indica que el valor de la OSI es significativamente peor que el de la CAPV; uno verde señala un valor significativamente mejor.

Artrosis.	Proporción de personas que padecen de artrosis.
Calidad de vida (EAV-EQ).	Valor promedio de la escala analógica visual del instrumento Euroqol-5d-5l-EAV. Cada persona ha puntuado su estado de salud en una escala que va de 0 (peor estado de salud imaginable) a 100 (mejor estado de salud imaginable).
Colesterol elevado.	Proporción de personas que declaran tener el nivel de colesterol elevado.
Dependencia moderada-grave.	Proporción de personas de 65 y más años que padecen una dependencia moderada o grave para las actividades básicas de la vida diaria.
Diabetes.	Proporción de personas que padecen de diabetes.
Dolor dorsal.	Proporción de personas que padecen un problema crónico de dolor de espalda dorsal, lumbar o ciática.
Hipertensión.	Proporción de personas que padecen de tensión arterial elevada.
Lesión no intencionada.	Proporción de personas que han sufrido algún tipo de lesión accidental no intencionada en los 12 meses previos a la realización de la encuesta.
Limitación crónica actividad.	Proporción de personas que padecen una disminución de larga duración de la capacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana debida a problemas de salud.
Limitación temporal actividad.	Proporción de personas que padecen una disminución de carácter transitoria de la capacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana debida a problemas de salud.
Mala salud.	Proporción de personas que definen su salud como 'regular' o 'mala'.
Mala salud dental.	Proporción de personas que definen su salud dental como 'regular' o 'mala'.
Problemas crónicos.	Proporción de personas que padecen enfermedades o problemas de salud crónicos, continuos o de larga duración o que se repiten con cierta frecuencia.
Síntomas ansiedad-depresión.	Proporción de personas que presentan síntomas de ansiedad y depresión.

Apoyo social afectivo bajo.	Proporción de personas que consideran que tienen falta de apoyo social afectivo (demostraciones de amor, cariño y empatía).
Apoyo social confidencial bajo.	Proporción de personas que consideran que tienen falta de apoyo social confidencial (posibilidad de contar con personas para comunicarse).
Autopercepción de pobreza.	Proporción de hogares que, según la persona de referencia, tienen una situación económica pobre, muy pobre o por debajo de la media.
Bebedores/as habituales.	Proporción de personas que han consumido bebidas alcohólicas, al menos una vez por semana, durante el año previo a la encuesta.
Consumo de alcohol de riesgo.	Proporción de personas que consumen alcohol de manera habitual (al menos una vez por semana) con una media de consumo diario que se asocia a un alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud.
Consumo diario frutas-verduras.	Proporción de personas que consumen fruta y verdura diariamente.
Consumo intensivo de alcohol.	Proporción de personas que ingieren, mensual o más frecuente, gran cantidad de alcohol en cortos periodos de tiempo.
Desempleo ESCAV.	Proporción de personas que han señalado estar en paro durante la semana anterior a la realización de la encuesta.
Dificultad llegar a fin de mes.	Proporción de hogares que, según la persona de referencia, llegan a fin de mes con ' <i>con mucha dificultad</i> ', ' <i>con dificultad</i> ' o ' <i>con cierta/alguna dificultad</i> '.

Conoce cita automatizada.	Proporción de personas que conocen la solicitud de cita previa telefónica automatizada de Osakidetza.
Conoce cita web enfermería.	Proporción de personas que conocen la solicitud de cita previa para enfermería o matrona a través de la Web de Osakidetza.
Conoce cita web medicina.	Proporción de personas que conocen la solicitud de cita previa para el/la médico/a de familia o pediatra a través de la Web de Osakidetza.
Consulta dentista.	Proporción de personas que han utilizado los servicios de un/a dentista por motivos de salud en los 12 meses previos a la encuesta.
Consulta enfermería.	Proporción de personas que han utilizado los servicios enfermería o matrona por motivos de salud en los 12 meses previos a la encuesta.
Consulta medicina especializada.	Proporción de personas que han utilizado los servicios de un/a médico/a especialista por motivos de salud en los 12 meses previos a la encuesta.
Consulta medicina general.	Proporción de personas que han utilizado los servicios de un/a médico/a general o pediatra por motivos de salud en los 12 meses previos a la encuesta.
Continuidad: coherencia.	Proporción de pacientes que opinan que existe una coherencia en los objetivos y tratamientos realizados por diferentes profesionales de los distintos niveles de atención.
Continuidad: información.	Proporción de pacientes que opinan que el/la profesional tuvo acceso y utilizó la información sobre la atención prestada con anterioridad, independientemente del nivel de atención en que se realizó.

Continuidad: profesionales.	Proporción de pacientes que opinan que ve al mismo/a proveedor/a sistemáticamente (mismo médico/a de familia, al o a la mismo/a especialista), y acude al mismo lugar para recibir asistencia.
Cribado cáncer colorrectal.	Proporción de personas de 50–69 años que han participado en el programa de diagnóstico de cáncer colorrectal.
Cribado cáncer de cérvix.	Proporción de mujeres de 25–64 años que se han hecho una citología en los tres años previos a la encuesta.
Cribado cáncer de mama.	Proporción de mujeres de 50–64 años que se han hecho una mamografía en los tres años previos a la encuesta.
Hospital de día.	Proporción de personas atendidas en un hospital de día para realizar algún tipo de procedimiento diagnóstico, terapéutico o rehabilitación, de cualquier especialidad, sin pasar la noche.
Hospitalización.	Proporción de personas que han recibido asistencia en un hospital generando al menos una estancia hospitalaria con la consiguiente ocupación de una cama, durante al menos una noche.
Necesidades no cubiertas.	Proporción de personas que opinan que el sistema sanitario público vasco no cubre sus necesidades en materia de salud.
Satisfacción sistema sanitario.	Proporción de personas que están satisfechas con los servicios de salud que han utilizado durante los doce meses previos a la encuesta.
Urgencias.	Proporción de personas que han solicitado asistencia con carácter urgente, en un centro distinto del habitual o en el centro habitual, pero fuera de horas de consulta en los 6 meses previos a la encuesta.

Usa cita automatizada.	Proporción de personas que usan la solicitud de cita previa telefónica automatizada de Osakidetza.
Usa cita web enfermería.	Proporción de personas que usan la solicitud de cita previa para enfermería o matrona a través de la Web de Osakidetza.
Usa cita web medicina.	Proporción de personas que usan la solicitud de cita previa para el/la médico/a de familia o pediatra a través de la Web de Osakidetza.
Uso servicios socio-sanitarios.	Proporción de personas de 25 y más años con alguna discapacidad que han usado servicios asistenciales (centro de día, ayuda domiciliaria, ayudas técnicas y adaptación del domicilio, teleasistencia, servicios de transporte adaptado, etc.).
Vacunado contra la gripe.	Proporción de personas de 65 y más años que suelen vacunarse contra la gripe cada año.
Valoración cita automatizada.	Nivel de satisfacción de las personas que usan la solicitud de cita previa telefónica automatizada de Osakidetza (valoración de 0 (nada satisfecho/a) al 10 (muy satisfecho/a)).
Valoración cita web enfermería.	Nivel de satisfacción de las personas que usan la solicitud de cita previa para enfermería o matrona de Osakidetza (valoración de 0 (nada satisfecho/a) al 10 (muy satisfecho/a)).
Valoración cita web medicina.	Nivel de satisfacción de las personas que usan la solicitud de cita previa para el/la médico/a de familia o pediatría de Osakidetza (valoración de 0 (nada satisfecho/a) al 10 (muy satisfecho/a)).
TIC	Las últimas nueve variables del semáforo hacen referencia a servicios relacionados con las nuevas Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC), como Internet para facilitar el acceso de la ciudadanía al sistema sanitario