

**TABLAS DE RESULTADOS:
DETERMINANTES DE LA SALUD**
Encuesta de Salud del País Vasco
2013

13ko EAEOI ESCAV₁₃



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

TABLAS GENERALES

ÍNDICE

DETERMINANTES DE LA SALUD

Condiciones de vida y de trabajo

1. Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 1. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y territorio histórico	1
Tabla 2. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y clase social	6
Tabla 3. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y nivel de estudios	12
Tabla 4. Proporción (%) de personas expuestas con mucha frecuencia a sufrir riesgos ergonómicos por sexo y edad	18
Tabla 5. Proporción (%) de personas expuestas con mucha frecuencia a riesgos ergonómicos por sexo, edad y territorio histórico	19
Hombres.....	19
Mujeres.....	20
Tabla 6. Proporción (%) de personas expuestas con mucha frecuencia a riesgos ergonómicos por sexo, edad y clase social	21
Hombres.....	21
Mujeres.....	22
Tabla 7. Proporción (%) de personas expuestas con mucha frecuencia a riesgos ergonómicos por sexo, edad y nivel de estudios	23
Hombres.....	23
Mujeres.....	26
Tabla 8. Proporción (%) de personas expuestas con mucha frecuencia a riesgos físicos por sexo y edad	29
Tabla 9. Proporción (%) de personas expuestas con mucha frecuencia a riesgos físicos por sexo, edad y territorio histórico	30
Hombres.....	30
Mujeres.....	31
Tabla 10. Proporción (%) de personas expuestas con mucha frecuencia a riesgos físicos por sexo, edad y clase social	32
Hombres.....	32
Mujeres.....	33
Tabla 11. Proporción (%) de personas expuestas con mucha frecuencia a riesgos físicos por sexo, edad y nivel de estudios	34
Hombres.....	34
Mujeres.....	37

2. Ingresos y situación económica

Tabla 12. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico	40
Tabla 13. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo, edad y clase social de la persona de referencia	45

Tabla 14. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo, edad y nivel de estudios de la persona de referencia	52
Tabla 15. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico	58
Tabla 16. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia	63
Tabla 17. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios de la persona de referencia	70

3. Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 18. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico	76
Tabla 19. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social	81
Tabla 20. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios	89
Tabla 21. Proporción (%) de personas que realizan labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico	95
Tabla 22. Proporción (%) de personas que realizan labores del hogar por sexo, edad y clase social	96
Tabla 23. Proporción (%) de personas que realizan labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios	97
Tabla 24. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico	98
Tabla 25. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y clase social	101
Tabla 26. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios	105
Tabla 27. Proporción (%) de personas que cuidan dentro del hogar a personas que necesitan ayuda para realizar alguna de las actividades de la vida cotidiana por sexo, edad y territorio histórico	108
Tabla 28. Proporción (%) de personas que cuidan dentro del hogar a personas que necesitan ayuda para realizar alguna de las actividades de la vida cotidiana por sexo, edad y clase social	109
Tabla 29. Proporción (%) de personas que cuidan dentro del hogar a personas que necesitan ayuda para realizar alguna de las actividades de la vida cotidiana por sexo, edad y nivel de estudios	110
Tabla 30. Distribución de la media de horas dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y territorio histórico	111
Tabla 31. Distribución de la media de horas dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y clase social	114
Tabla 32. Distribución de la media de horas dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y nivel de estudios	118
Tabla 33. Proporción (%) de familias que cuentan con alguna persona remunerada para realizar las labores del hogar por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico	121
Tabla 34. Proporción (%) de familias que cuentan con alguna persona remunerada para realizar las labores del hogar por sexo, edad y clase social de la persona de referencia	122
Tabla 35. Proporción (%) de familias que cuentan con alguna persona remunerada para realizar las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios de la persona de referencia	123
Tabla 36. Proporción (%) de personas que organizan sólo las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico	124

Tabla 37. Proporción (%) de personas que organizan sólo las labores del hogar por sexo, edad y clase social	125
Tabla 38. Proporción (%) de personas que organizan sólo las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios	126
Tabla 39. Proporción (%) de familias en las que una sola persona organiza las labores del hogar por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico	127
Tabla 40. Proporción (%) de familias en las que una sola persona organiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social de la persona de referencia	128
Tabla 41. Proporción (%) de familias en las que una sola persona organiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios de la persona de referencia	129

4. Entorno de la vivienda

Tabla 42. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y territorio histórico	130
Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social	134
Tabla 44. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y nivel de estudios	140
Tabla 45. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y territorio histórico	145
Tabla 46. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social	149
Tabla 47. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y nivel de estudios	155
Tabla 48. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y territorio histórico	160
Tabla 49. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social	164
Tabla 50. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y nivel de estudios	170
Tabla 51. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y territorio histórico	175
Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social	179
Tabla 53. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y nivel de estudios	185
Tabla 54. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y territorio histórico	190
Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social	194

Tabla 56. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y nivel de estudios	200
Tabla 57. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y territorio histórico	205
Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social	209
Tabla 59. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y nivel de estudios	215
Tabla 60. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y territorio histórico	220
Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social	224
Tabla 62. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y nivel de estudios	230
Tabla 63. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y territorio histórico	235
Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social	239
Tabla 65. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y nivel de estudios	245
Tabla 66. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y territorio histórico	250
Tabla 67. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social	254
Tabla 68. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y nivel de estudios	260
Tabla 69. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y territorio histórico	265
Tabla 70. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social	270
Tabla 71. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios	277
Tabla 72. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y territorio histórico	283
Tabla 73. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social	288
Tabla 74. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios	295
Tabla 75. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico	301

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social	306
Tabla 77. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios	313
Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico	319
Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social	324
Tabla 80. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios	331

5. Discriminación

Tabla 81. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas (por su edad, sexo, lugar de nacimiento, ...) por sexo, edad y territorio histórico	337
Tabla 82. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas (por su edad, sexo, lugar de nacimiento, ...) por sexo, edad y clase social	338
Tabla 83. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas (por su edad, sexo, lugar de nacimiento, ...) por sexo, edad y nivel de estudios	339
Tabla 84. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el ámbito en el que se produce la discriminación por sexo y edad	340
Tabla 85. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el ámbito en el que se produce la discriminación por sexo y territorio histórico	341
Tabla 86. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el ámbito en el que se produce la discriminación por sexo y clase social	342
Tabla 87. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el ámbito en el que se produce la discriminación por sexo y estudios	343
Tabla 88. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el motivo de la discriminación por sexo y edad	344
Tabla 89. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el motivo de la discriminación por sexo y territorio histórico	345
Tabla 90. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el motivo de la discriminación por sexo y clase social	346
Tabla 91. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el motivo de la discriminación por sexo y estudios	347

Factores psicosociales

1. Apoyo social

Tabla 92. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=18) por sexo, edad y territorio histórico	348
Tabla 93. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=18) por sexo, edad y clase social	350
Tabla 94. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=18) por sexo, edad y nivel de estudios	353
Tabla 95. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=15) por sexo, edad y territorio histórico	356

Tabla 96. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=15) por sexo, edad y clase social	358
Tabla 97. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=15) por sexo, edad y nivel de estudios	361
Tabla 98. Proporción (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo, edad y territorio histórico	364
Tabla 99. Proporción (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo, edad y clase social	365
Tabla 100. Proporción (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo, edad y nivel de estudios	366
Tabla 101. Proporción (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo, edad y territorio histórico	367
Tabla 102. Proporción (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo, edad y clase social	368
Tabla 103. Proporción (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo, edad y nivel de estudios	369

Conductas relacionadas con la salud

1. Consumo de tabaco

Tabla 104. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y territorio histórico	370
Tabla 105. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social	375
Tabla 106. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios	382
Tabla 107. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y territorio histórico	388
Tabla 108. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social	392
Tabla 109. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y nivel de estudios	398
Tabla 110. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y territorio histórico	403
Tabla 111. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social	407
Tabla 112. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y nivel de estudios	413
Tabla 113. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico	418
Tabla 114. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social	423
Tabla 115. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios	430
Tabla 116. Proporción (%) de personas fumadoras habituales que han intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y territorio histórico	436
Tabla 117. Proporción (%) de personas fumadoras habituales que han intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y clase social	437
Tabla 118. Proporción (%) de personas fumadoras habituales que han intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y nivel de estudios	438
Tabla 119. Proporción (%) de personas fumadoras habituales a las que les hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y territorio histórico	439

Tabla 120. Proporción (%) de personas fumadoras habituales a las que les hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y clase social	440
Tabla 121. Proporción (%) de personas fumadoras habituales a las que les hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y nivel de estudios	441
Tabla 122. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico	442
Tabla 123. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social	447
Tabla 124. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios	454
Tabla 125. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico	460
Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social	465
Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios	472
Tabla 128. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y territorio histórico	478
Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social	483
Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios	490
Tabla 131. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y territorio histórico	496
Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social	501
Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios	508

2. Consumo de alcohol

Tabla 134. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico	514
Tabla 135. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social	519
Tabla 136. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios	526
Tabla 137. Proporción (%) de personas con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico	532
Tabla 138. Proporción (%) de personas con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social	533
Tabla 139. Proporción (%) de personas con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios	534
Tabla 140. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico	535

Tabla 141. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social	542
Tabla 142. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios	552
Tabla 143. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y territorio histórico	561
Tabla 144. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y clase social	565
Tabla 145. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y nivel de estudios	571
Tabla 146. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y territorio histórico	576
Tabla 147. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y clase social	578
Tabla 148. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios	581
Tabla 149. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico	584
Tabla 150. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social	589
Tabla 151. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios	597
Tabla 152. Proporción (%) de personas sospechosas de alcoholismo (test de CAGE>=2) por sexo, edad y territorio histórico	603
Tabla 153. Proporción (%) de personas sospechosas de alcoholismo (test de CAGE>=2) por sexo, edad y clase social	604
Tabla 154. Proporción (%) de personas sospechosas de alcoholismo (test de CAGE>=2) por sexo, edad y nivel de estudios	605
Tabla 155. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico	606
Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social	612
Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios	621
Tabla 158. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo, edad y territorio histórico	629
Tabla 159. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo, edad y clase social	630
Tabla 160. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo, edad y nivel de estudios	631

3. Peso corporal

Tabla 161. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico	632
Tabla 162. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y clase social	634
Tabla 163. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios	637
Tabla 164. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico	640
Tabla 165. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y clase social	644
Tabla 166. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios	650
Tabla 167. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y territorio histórico	655

Tabla 168. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y clase social	659
Tabla 169. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y nivel de estudios	665
Tabla 170. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y territorio histórico	670
Tabla 171. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y clase social	675
Tabla 172. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y nivel de estudios	682

4. Actividad física

Tabla 173. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y territorio histórico	688
Tabla 174. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y clase social	693
Tabla 175. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y nivel de estudios	700
Tabla 176. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y territorio histórico	706
Tabla 177. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y clase social	710
Tabla 178. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y nivel de estudios	716
Tabla 179. Proporción (%) de personas que realizan actividad física saludable por sexo, edad y territorio histórico	721
Tabla 180. Proporción (%) de personas que realizan actividad física saludable por sexo, edad y clase social	722
Tabla 181. Proporción (%) de personas que realizan actividad física saludable por sexo, edad y nivel de estudios	723
Tabla 182. Proporción (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo, edad y territorio histórico	724
Tabla 183. Proporción (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo, edad y clase social	725
Tabla 184. Proporción (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo, edad y nivel de estudios	726
Tabla 185. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico	727
Tabla 186. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social	735
Tabla 187. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios	746
Tabla 188. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y territorio histórico	755
Tabla 189. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y clase social	760
Tabla 190. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y nivel de estudios	767
Tabla 191. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico	773
Tabla 192. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social	780

Tabla 193. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios	791
--	-----

5. Sueño

Tabla 194. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico	800
Tabla 195. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y clase social	802
Tabla 196. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios	805
Tabla 197. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico	808
Tabla 198. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y clase social	812
Tabla 199. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios	818

6. Hábitos alimentarios

Tabla 200. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y territorio histórico	823
Tabla 201. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social	828
Tabla 202. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y nivel de estudios	835
Tabla 203. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y territorio histórico	841
Tabla 204. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social	846
Tabla 205. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y nivel de estudios	853
Tabla 206. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y territorio histórico	859
Tabla 207. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social	864
Tabla 208. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y nivel de estudios	871
Tabla 209. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y territorio histórico	877
Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social	882
Tabla 211. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y nivel de estudios	889
Tabla 212. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y territorio histórico	895
Tabla 213. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social	900
Tabla 214. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y nivel de estudios	907
Tabla 215. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y territorio histórico	913
Tabla 216. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social	918
Tabla 217. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y nivel de estudios	925
Tabla 218. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y territorio histórico	931

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social	936
Tabla 220. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y nivel de estudios	943
Tabla 221. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y territorio histórico	949
Tabla 222. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social	954
Tabla 223. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y nivel de estudios	961
Tabla 224. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y territorio histórico	967
Tabla 225. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social	972
Tabla 226. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y nivel de estudios	979
Tabla 227. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y territorio histórico	985
Tabla 228. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social	990
Tabla 229. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y nivel de estudios	997
Tabla 230. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y territorio histórico	1003
Tabla 231. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social	1008
Tabla 232. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y nivel de estudios	1015
Tabla 233. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y territorio histórico	1021
Tabla 234. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social	1026
Tabla 235. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y nivel de estudios	1033
Tabla 236. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y territorio histórico	1039
Tabla 237. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social	1044
Tabla 238. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios	1051
Tabla 239. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y territorio histórico	1057
Tabla 240. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social	1062
Tabla 241. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y nivel de estudios	1069
Tabla 242. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y territorio histórico	1075
Tabla 243. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social	1080
Tabla 244. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y nivel de estudios	1087
Tabla 245. Proporción (%) de familias que usan sal yodada para cocinar por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico	1093
Tabla 246. Proporción (%) de familias que usan sal yodada para cocinar por sexo, edad y clase social de la persona de referencia	1094
Tabla 247. Proporción (%) de familias que usan sal yodada para cocinar por sexo, edad y nivel de estudios de la persona de referencia	1095

7. Prácticas preventivas no sanitarias

Tabla 248. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando viajan en motocicleta por ciudad por sexo, edad y territorio histórico	1096
Tabla 249. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando viajan en motocicleta por ciudad por sexo, edad y clase social	1097
Tabla 250. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando viajan en motocicleta por ciudad por sexo, edad y nivel de estudios	1098
Tabla 251. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando viajan en motocicleta por carretera por sexo, edad y territorio histórico	1099
Tabla 252. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando viajan en motocicleta por carretera por sexo, edad y clase social	1100
Tabla 253. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando viajan en motocicleta por carretera por sexo, edad y nivel de estudios	1101
Tabla 254. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando se desplazan en bicicleta por ciudad por sexo, edad y territorio histórico	1102
Tabla 255. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando se desplazan en bicicleta por ciudad por sexo, edad y clase social	1103
Tabla 256. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando se desplazan en bicicleta por ciudad por sexo, edad y nivel de estudios	1104
Tabla 257. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando se desplazan en bicicleta por carretera por sexo, edad y territorio histórico	1105
Tabla 258. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando se desplazan en bicicleta por carretera por sexo, edad y clase social	1106
Tabla 259. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando se desplazan en bicicleta por carretera por sexo, edad y nivel de estudio	1107
Tabla 260. Proporción (%) de personas que cuando van en automóvil por ciudad siempre o casi siempre llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por sexo, edad y territorio histórico	1108
Tabla 261. Proporción (%) de personas que cuando van en automóvil por ciudad siempre o casi siempre llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por sexo, edad y clase social	1109
Tabla 262. Proporción (%) de personas que cuando van en automóvil por ciudad siempre o casi siempre llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por sexo, edad y nivel de estudios	1110
Tabla 263. Proporción (%) de personas que cuando van en automóvil por carretera siempre o casi siempre llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por sexo, edad y territorio histórico	1111
Tabla 264. Proporción (%) de personas que cuando van en automóvil por carretera siempre o casi siempre llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por sexo, edad y clase social	1112
Tabla 265. Proporción (%) de personas que cuando van en automóvil por carretera siempre o casi siempre llevan a sus hijos menores de 14 años	

sujetos con algún sistema de seguridad por sexo, edad y nivel de estudios.....1113

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Condiciones de empleo y de trabajo

1

Tabla 1. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y territorio histórico

		Muy satisfecho/a			Muy insatisfecho/a			Total
Hombres	Total	CAPV	N	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	insatisfecho/a		
			N	173.543	557.492	77.262	13.565	821.861
			%	21,1	67,8	9,4	1,7	100,0
		Araba	N	22.277	82.743	10.928	946	116.895
			%	19,1	70,8	9,3	0,8	100,0
		Gipuzkoa	N	61.219	178.387	24.368	4.303	268.278
			%	22,8	66,5	9,1	1,6	100,0
		Bizkaia	N	90.047	296.361	41.965	8.315	436.688
			%	20,6	67,9	9,6	1,9	100,0
	15-24	CAPV	N	4.763	17.350	3.545	.	25.659
			%	18,6	67,6	13,8	.	100,0
		Araba	N	146	970	1.138	.	2.254
			%	6,5	43,0	50,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	3.043	6.981	1.400	.	11.423
			%	26,6	61,1	12,3	.	100,0
		Bizkaia	N	1.575	9.400	1.007	.	11.982
			%	13,1	78,4	8,4	.	100,0
	25-44	CAPV	N	59.109	218.100	37.316	7.541	322.066
			%	18,4	67,7	11,6	2,3	100,0
		Araba	N	7.294	35.069	5.491	425	48.279
			%	15,1	72,6	11,4	0,9	100,0
		Gipuzkoa	N	22.540	68.626	10.596	2.371	104.132
			%	21,6	65,9	10,2	2,3	100,0
		Bizkaia	N	29.275	114.405	21.230	4.745	169.656
			%	17,3	67,4	12,5	2,8	100,0
	45-64	CAPV	N	56.072	208.944	27.693	5.511	298.220
			%	18,8	70,1	9,3	1,8	100,0
		Araba	N	7.656	30.828	3.710	445	42.640
			%	18,0	72,3	8,7	1,0	100,0
		Gipuzkoa	N	17.926	67.325	8.952	1.672	95.875
			%	18,7	70,2	9,3	1,7	100,0
		Bizkaia	N	30.490	110.790	15.031	3.394	159.706
			%	19,1	69,4	9,4	2,1	100,0
	65-74	CAPV	N	26.260	60.740	5.817	261	93.077
			%	28,2	65,3	6,2	0,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Condiciones de empleo y de trabajo

2

Tabla 1. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y territorio histórico

			Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total		
Hombres	65-74	Araba	N	3.103	9.732	108	.	12.943	
			%	24,0	75,2	0,8	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	9.764	18.702	2.470	261	31.197	
			%	31,3	59,9	7,9	0,8	100,0	
		Bizkaia	N	13.393	32.305	3.238	.	48.937	
			%	27,4	66,0	6,6	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	27.339	52.358	2.890	252	82.839	
			%	33,0	63,2	3,5	0,3	100,0	
			Araba	N	4.079	6.143	481	76	10.779
				%	37,8	57,0	4,5	0,7	100,0
			Gipuzkoa	N	7.946	16.755	951	.	25.652
				%	31,0	65,3	3,7	.	100,0
		Bizkaia	N	15.314	29.460	1.458	176	46.408	
			%	33,0	63,5	3,1	0,4	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	153.334	462.373	55.442	6.671	677.820
				%	22,6	68,2	8,2	1,0	100,0
			Araba	N	21.213	71.803	9.633	579	103.228
				%	20,5	69,6	9,3	0,6	100,0
		Gipuzkoa	N	53.661	153.711	17.295	2.319	226.987	
			%	23,6	67,7	7,6	1,0	100,0	
		Bizkaia	N	78.460	236.858	28.514	3.773	347.605	
			%	22,6	68,1	8,2	1,1	100,0	
	15-24	CAPV	N	4.289	16.598	1.526	.	22.414	
			%	19,1	74,1	6,8	.	100,0	
			Araba	N	704	2.724	543	.	3.971
				%	17,7	68,6	13,7	.	100,0
			Gipuzkoa	N	814	6.393	290	.	7.496
				%	10,9	85,3	3,9	.	100,0
		Bizkaia	N	2.772	7.481	693	.	10.947	
			%	25,3	68,3	6,3	.	100,0	
	25-44	CAPV	N	66.260	191.297	25.682	3.272	286.512	
			%	23,1	66,8	9,0	1,1	100,0	
		Araba	N	8.745	30.199	4.603	419	43.967	
			%	19,9	68,7	10,5	1,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 1. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y territorio histórico

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total		
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	23.062	58.400	8.097	1.343	90.902		
			%	25,4	64,2	8,9	1,5	100,0		
		Bizkaia	N	34.454	102.698	12.982	1.510	151.644		
			%	22,7	67,7	8,6	1,0	100,0		
	45-64	CAPV	N	49.206	176.980	22.395	1.701	250.282		
			%	19,7	70,7	8,9	0,7	100,0		
		Araba	N	6.821	25.772	3.406	160	36.159		
			%	18,9	71,3	9,4	0,4	100,0		
		Gipuzkoa	N	16.140	57.594	7.530	835	82.099		
			%	19,7	70,2	9,2	1,0	100,0		
		Bizkaia	N	26.244	93.614	11.460	707	132.025		
			%	19,9	70,9	8,7	0,5	100,0		
	65-74	CAPV	N	14.603	38.970	3.844	772	58.188		
			%	25,1	67,0	6,6	1,3	100,0		
		Araba	N	2.868	7.370	544	.	10.782		
			%	26,6	68,4	5,0	.	100,0		
		Gipuzkoa	N	5.523	14.426	1.100	.	21.050		
			%	26,2	68,5	5,2	.	100,0		
		Bizkaia	N	6.211	17.173	2.200	772	26.356		
			%	23,6	65,2	8,3	2,9	100,0		
	>=75	CAPV	N	18.976	38.528	1.995	925	60.424		
			%	31,4	63,8	3,3	1,5	100,0		
		Araba	N	2.075	5.737	537	.	8.349		
			%	24,9	68,7	6,4	.	100,0		
		Gipuzkoa	N	8.122	16.898	279	141	25.440		
			%	31,9	66,4	1,1	0,6	100,0		
		Bizkaia	N	8.779	15.892	1.179	784	26.635		
			%	33,0	59,7	4,4	2,9	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	326.877	1.019.865	132.704	20.236	1.499.681		
			%	21,8	68,0	8,8	1,3	100,0		
				Araba	N	43.490	154.547	20.561	1.525	220.123
			%		19,8	70,2	9,3	0,7	100,0	
				Gipuzkoa	N	114.880	332.099	41.664	6.622	495.265
			%		23,2	67,1	8,4	1,3	100,0	
				Bizkaia	N	168.507	533.219	70.479	12.088	784.293

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Condiciones de empleo y de trabajo

4

Tabla 1. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y territorio histórico

		Muy satisfecho/a			Muy insatisfecho/a			Total
Ambos			%	Satisfecho/a	Insatisfecho/a			
	Total	Bizkaia		21,5	68,0	9,0	1,5	100,0
	15-24	CAPV	N	9.053	33.948	5.071	.	48.072
			%	18,8	70,6	10,5	.	100,0
		Araba	N	849	3.694	1.682	.	6.225
			%	13,6	59,3	27,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	3.856	13.373	1.689	.	18.919
			%	20,4	70,7	8,9	.	100,0
		Bizkaia	N	4.347	16.881	1.700	.	22.928
			%	19,0	73,6	7,4	.	100,0
	25-44	CAPV	N	125.369	409.397	62.998	10.813	608.579
			%	20,6	67,3	10,4	1,8	100,0
		Araba	N	16.039	65.268	10.094	844	92.246
			%	17,4	70,8	10,9	0,9	100,0
		Gipuzkoa	N	45.601	127.026	18.693	3.714	195.034
			%	23,4	65,1	9,6	1,9	100,0
		Bizkaia	N	63.729	217.103	34.212	6.255	321.299
			%	19,8	67,6	10,6	1,9	100,0
	45-64	CAPV	N	105.278	385.923	50.088	7.212	548.502
			%	19,2	70,4	9,1	1,3	100,0
		Araba	N	14.477	56.600	7.116	605	78.798
			%	18,4	71,8	9,0	0,8	100,0
		Gipuzkoa	N	34.066	124.919	16.481	2.507	177.974
			%	19,1	70,2	9,3	1,4	100,0
		Bizkaia	N	56.734	204.404	26.491	4.100	291.730
			%	19,4	70,1	9,1	1,4	100,0
	65-74	CAPV	N	40.862	99.710	9.661	1.033	151.265
			%	27,0	65,9	6,4	0,7	100,0
		Araba	N	5.971	17.103	652	.	23.726
			%	25,2	72,1	2,7	.	100,0
		Gipuzkoa	N	15.287	33.128	3.571	261	52.247
			%	29,3	63,4	6,8	0,5	100,0
		Bizkaia	N	19.604	49.479	5.438	772	75.292
			%	26,0	65,7	7,2	1,0	100,0
	>=75	CAPV	N	46.315	90.886	4.885	1.177	143.263
			%	32,3	63,4	3,4	0,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 1. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y territorio histórico

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Ambos	>=75	Araba	N	6.154	11.881	1.018	76	19.128
			%	32,2	62,1	5,3	0,4	100,0
	Gipuzkoa	N	16.068	33.653	1.230	141	51.092	
		%	31,5	65,9	2,4	0,3	100,0	
	Bizkaia	N	24.093	45.352	2.638	960	73.043	
		%	33,0	62,1	3,6	1,3	100,0	

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 2. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y clase social

		Muy satisfecho/a		Satisfecho/a		Insatisfecho/a		Muy insatisfecho/a		Total
Hombres	Total	Total	N	173.543	557.393	77.073	13.565	821.574		
			%	21,1	67,8	9,4	1,7	100,0		
	I	N	31.577	61.094	5.480	556	98.708			
		%	32,0	61,9	5,6	0,6	100,0			
	II	N	19.837	43.887	3.039	382	67.146			
		%	29,5	65,4	4,5	0,6	100,0			
	III	N	39.647	114.617	13.587	975	168.826			
		%	23,5	67,9	8,0	0,6	100,0			
	IV	N	73.536	283.521	43.142	10.077	410.277			
		%	17,9	69,1	10,5	2,5	100,0			
	V	N	8.945	54.273	11.824	1.574	76.616			
		%	11,7	70,8	15,4	2,1	100,0			
	15-24	Total	N	4.763	17.350	3.545	.	25.659		
			%	18,6	67,6	13,8	.	100,0		
	I	N	245	1.221	.	.	1.466			
		%	16,7	83,3	.	.	100,0			
	II	N	963	1.983	.	.	2.946			
		%	32,7	67,3	.	.	100,0			
	III	N	1.674	957	.	.	2.632			
		%	63,6	36,4	.	.	100,0			
	IV	N	1.632	9.269	2.639	.	13.540			
		%	12,1	68,5	19,5	.	100,0			
	V	N	249	3.920	906	.	5.075			
		%	4,9	77,2	17,9	.	100,0			
	25-44	Total	N	59.109	218.100	37.316	7.541	322.066		
			%	18,4	67,7	11,6	2,3	100,0		
	I	N	11.871	27.644	2.778	.	42.292			
		%	28,1	65,4	6,6	.	100,0			
	II	N	9.635	18.955	1.249	289	30.128			
		%	32,0	62,9	4,1	1,0	100,0			
	III	N	12.386	40.401	6.546	.	59.332			
		%	20,9	68,1	11,0	.	100,0			
	IV	N	22.020	107.381	20.305	6.059	155.765			
		%	14,1	68,9	13,0	3,9	100,0			
	V	N	3.198	23.720	6.437	1.194	34.549			
		%	9,3	68,7	18,6	3,5	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Condiciones de empleo y de trabajo

7

Tabla 2. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y clase social

		Muy satisfecho/a		Satisfecho/a		Insatisfecho/a		Muy insatisfecho/a		Total
Hombres 45-64	Total	N	56.072	208.845	27.504	5.511	297.932			
		%	18,8	70,1	9,2	1,8	100,0			
	I	N	11.741	23.936	1.675	556	37.907			
		%	31,0	63,1	4,4	1,5	100,0			
	II	N	4.460	17.150	1.559	.	23.170			
		%	19,2	74,0	6,7	.	100,0			
	III	N	11.959	46.143	6.001	975	65.078			
		%	18,4	70,9	9,2	1,5	100,0			
	IV	N	25.096	104.278	14.698	3.600	147.671			
		%	17,0	70,6	10,0	2,4	100,0			
	V	N	2.816	17.338	3.572	380	24.106			
		%	11,7	71,9	14,8	1,6	100,0			
	65-74	Total	N	26.260	60.740	5.817	261	93.077		
			%	28,2	65,3	6,2	0,3	100,0		
	I	N	5.917	6.882	581	.	13.380			
		%	44,2	51,4	4,3	.	100,0			
	II	N	3.572	2.975	.	94	6.640			
		%	53,8	44,8	.	1,4	100,0			
	III	N	5.685	14.448	1.040	.	21.173			
		%	26,9	68,2	4,9	.	100,0			
	IV	N	10.735	32.037	3.357	167	46.295			
		%	23,2	69,2	7,3	0,4	100,0			
	V	N	351	4.398	839	.	5.588			
		%	6,3	78,7	15,0	.	100,0			
	>=75	Total	N	27.339	52.358	2.890	252	82.839		
			%	33,0	63,2	3,5	0,3	100,0		
	I	N	1.804	1.412	447	.	3.663			
		%	49,3	38,5	12,2	.	100,0			
	II	N	1.208	2.824	231	.	4.262			
		%	28,3	66,3	5,4	.	100,0			
	III	N	7.943	12.668	.	.	20.611			
		%	38,5	61,5	.	.	100,0			
	IV	N	14.053	30.557	2.143	252	47.005			
		%	29,9	65,0	4,6	0,5	100,0			
	V	N	2.331	4.897	70	.	7.298			
		%	31,9	67,1	1,0	.	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Condiciones de empleo y de trabajo

8

Tabla 2. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y clase social

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Mujeres	Total	Total	N	153.334	462.104	55.442	6.671	677.551
			%	22,6	68,2	8,2	1,0	100,0
		I	N	27.322	45.118	5.190	728	78.358
			%	34,9	57,6	6,6	0,9	100,0
		II	N	29.535	36.152	3.430	572	69.690
			%	42,4	51,9	4,9	0,8	100,0
		III	N	39.457	124.030	14.804	1.703	179.994
			%	21,9	68,9	8,2	0,9	100,0
		IV	N	39.991	162.137	18.892	2.107	223.127
			%	17,9	72,7	8,5	0,9	100,0
		V	N	17.029	94.666	13.127	1.561	126.382
			%	13,5	74,9	10,4	1,2	100,0
	15-24	Total	N	4.289	16.598	1.526	.	22.414
			%	19,1	74,1	6,8	.	100,0
		I	N	1.066	1.523	.	.	2.589
			%	41,2	58,8	.	.	100,0
		II	N	263	1.692	.	.	1.955
			%	13,5	86,5	.	.	100,0
		III	N	335	3.325	215	.	3.875
			%	8,7	85,8	5,5	.	100,0
		IV	N	2.059	7.279	833	.	10.171
			%	20,2	71,6	8,2	.	100,0
		V	N	566	2.778	478	.	3.823
			%	14,8	72,7	12,5	.	100,0
	25-44	Total	N	66.260	191.028	25.682	3.272	286.243
			%	23,1	66,7	9,0	1,1	100,0
		I	N	15.658	23.064	2.975	429	42.126
			%	37,2	54,8	7,1	1,0	100,0
		II	N	17.971	14.339	1.814	314	34.438
			%	52,2	41,6	5,3	0,9	100,0
		III	N	10.990	54.241	7.939	809	73.978
			%	14,9	73,3	10,7	1,1	100,0
		IV	N	14.552	71.748	9.217	1.359	96.877
			%	15,0	74,1	9,5	1,4	100,0
		V	N	7.089	27.636	3.738	361	38.823
			%	18,3	71,2	9,6	0,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 2. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y clase social

			Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total	
Mujeres	45-64	Total	N	49.206	176.980	22.395	1.701	250.282
			%	19,7	70,7	8,9	0,7	100,0
		I	N	8.675	17.136	2.215	299	28.325
			%	30,6	60,5	7,8	1,1	100,0
		II	N	6.898	15.527	1.502	76	24.003
			%	28,7	64,7	6,3	0,3	100,0
		III	N	18.220	49.017	5.982	894	74.113
			%	24,6	66,1	8,1	1,2	100,0
		IV	N	10.115	55.024	6.584	359	72.082
			%	14,0	76,3	9,1	0,5	100,0
		V	N	5.298	40.275	6.113	74	51.760
			%	10,2	77,8	11,8	0,1	100,0
	65-74	Total	N	14.603	38.970	3.844	772	58.188
			%	25,1	67,0	6,6	1,3	100,0
		I	N	1.153	2.023	.	.	3.176
			%	36,3	63,7	.	.	100,0
		II	N	1.322	2.056	114	182	3.675
			%	36,0	55,9	3,1	5,0	100,0
		III	N	4.631	9.223	669	.	14.523
			%	31,9	63,5	4,6	.	100,0
		IV	N	5.690	14.156	1.646	105	21.596
			%	26,3	65,5	7,6	0,5	100,0
		V	N	1.806	11.512	1.415	485	15.217
			%	11,9	75,6	9,3	3,2	100,0
	>=75	Total	N	18.976	38.528	1.995	925	60.424
			%	31,4	63,8	3,3	1,5	100,0
		I	N	770	1.372	.	.	2.142
			%	36,0	64,0	.	.	100,0
		II	N	3.080	2.538	.	.	5.618
			%	54,8	45,2	.	.	100,0
		III	N	5.281	8.224	.	.	13.504
			%	39,1	60,9	.	.	100,0
		IV	N	7.574	13.929	612	285	22.400
			%	33,8	62,2	2,7	1,3	100,0
		V	N	2.271	12.465	1.383	640	16.759
			%	13,5	74,4	8,3	3,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 2. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y clase social

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Ambos	Total	Total	N	326.877	1.019.496	132.515	20.236	1.499.124
			%	21,8	68,0	8,8	1,3	100,0
		I	N	58.899	106.213	10.670	1.284	177.066
			%	33,3	60,0	6,0	0,7	100,0
		II	N	49.373	80.039	6.469	955	136.836
			%	36,1	58,5	4,7	0,7	100,0
		III	N	79.104	238.647	28.392	2.678	348.820
			%	22,7	68,4	8,1	0,8	100,0
		IV	N	113.527	445.658	62.034	12.184	633.403
			%	17,9	70,4	9,8	1,9	100,0
		V	N	25.974	148.939	24.951	3.135	202.998
			%	12,8	73,4	12,3	1,5	100,0
	15-24	Total	N	9.053	33.948	5.071	.	48.072
			%	18,8	70,6	10,5	.	100,0
		I	N	1.310	2.744	.	.	4.055
			%	32,3	67,7	.	.	100,0
		II	N	1.226	3.676	.	.	4.902
			%	25,0	75,0	.	.	100,0
		III	N	2.010	4.282	215	.	6.507
			%	30,9	65,8	3,3	.	100,0
		IV	N	3.691	16.548	3.472	.	23.712
			%	15,6	69,8	14,6	.	100,0
		V	N	815	6.698	1.384	.	8.898
			%	9,2	75,3	15,6	.	100,0
	25-44	Total	N	125.369	409.128	62.998	10.813	608.309
			%	20,6	67,3	10,4	1,8	100,0
		I	N	27.529	50.708	5.752	429	84.418
			%	32,6	60,1	6,8	0,5	100,0
		II	N	27.606	33.294	3.063	603	64.566
			%	42,8	51,6	4,7	0,9	100,0
		III	N	23.376	94.642	14.485	809	133.311
			%	17,5	71,0	10,9	0,6	100,0
		IV	N	36.573	179.129	29.523	7.418	252.642
			%	14,5	70,9	11,7	2,9	100,0
		V	N	10.286	51.356	10.175	1.555	73.372
			%	14,0	70,0	13,9	2,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

11

Condiciones de vida y de trabajo Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 2. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y clase social

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Ambos	45-64	Total	N	105.278	385.824	49.900	7.212	548.215
			%	19,2	70,4	9,1	1,3	100,0
		I	N	20.415	41.072	3.890	855	66.232
			%	30,8	62,0	5,9	1,3	100,0
		II	N	11.358	32.677	3.061	76	47.172
			%	24,1	69,3	6,5	0,2	100,0
		III	N	30.179	95.160	11.983	1.869	139.191
			%	21,7	68,4	8,6	1,3	100,0
		IV	N	35.211	159.302	21.281	3.958	219.753
			%	16,0	72,5	9,7	1,8	100,0
		V	N	8.114	57.613	9.685	454	75.866
			%	10,7	75,9	12,8	0,6	100,0
	65-74	Total	N	40.862	99.710	9.661	1.033	151.265
			%	27,0	65,9	6,4	0,7	100,0
		I	N	7.070	8.905	581	.	16.556
			%	42,7	53,8	3,5	.	100,0
		II	N	4.894	5.031	114	276	10.315
			%	47,4	48,8	1,1	2,7	100,0
		III	N	10.316	23.671	1.709	.	35.696
			%	28,9	66,3	4,8	.	100,0
		IV	N	16.425	46.192	5.002	272	67.892
			%	24,2	68,0	7,4	0,4	100,0
		V	N	2.157	15.910	2.254	485	20.806
			%	10,4	76,5	10,8	2,3	100,0
	>=75	Total	N	46.315	90.886	4.885	1.177	143.263
			%	32,3	63,4	3,4	0,8	100,0
		I	N	2.575	2.784	447	.	5.805
			%	44,4	48,0	7,7	.	100,0
		II	N	4.288	5.362	231	.	9.881
			%	43,4	54,3	2,3	.	100,0
		III	N	13.223	20.892	.	.	34.115
			%	38,8	61,2	.	.	100,0
		IV	N	21.626	44.486	2.755	537	69.405
			%	31,2	64,1	4,0	0,8	100,0
		V	N	4.602	17.362	1.453	640	24.057
			%	19,1	72,2	6,0	2,7	100,0

Tabla 3. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Hombres	Total	Total	N	173.543	557.492	77.262	13.565	821.861
			%	21,1	67,8	9,4	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	38.858	140.171	13.418	2.489	194.936
			%	19,9	71,9	6,9	1,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	24.700	95.433	15.778	1.753	137.663
			%	17,9	69,3	11,5	1,3	100,0
		Secundaria, superior	N	65.207	215.129	36.495	8.181	325.012
			%	20,1	66,2	11,2	2,5	100,0
		Terciaria	N	44.778	106.759	11.571	1.142	164.250
			%	27,3	65,0	7,0	0,7	100,0
	15-24	Total	N	4.763	17.350	3.545	.	25.659
			%	18,6	67,6	13,8	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	488	1.104	.	.	1.592
			%	30,7	69,3	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	699	3.143	1.496	.	5.338
			%	13,1	58,9	28,0	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.077	10.804	2.049	.	14.930
			%	13,9	72,4	13,7	.	100,0
		Terciaria	N	1.499	2.300	.	.	3.799
			%	39,5	60,5	.	.	100,0
	25-44	Total	N	59.109	218.100	37.316	7.541	322.066
			%	18,4	67,7	11,6	2,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.355	26.630	4.724	894	34.603
			%	6,8	77,0	13,7	2,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.012	36.547	5.580	1.659	50.798
			%	13,8	71,9	11,0	3,3	100,0
		Secundaria, superior	N	31.420	102.606	21.093	4.401	159.519
			%	19,7	64,3	13,2	2,8	100,0
		Terciaria	N	18.322	52.318	5.919	586	77.146
			%	23,8	67,8	7,7	0,8	100,0
	45-64	Total	N	56.072	208.944	27.693	5.511	298.220
			%	18,8	70,1	9,3	1,8	100,0

(continuación)

Tabla 3. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total			
Hombres	45-64	Sin estudios, primaria	N	11.477	51.531	5.127	1.175	69.309		
			%	16,6	74,3	7,4	1,7	100,0		
		Secundaria, inferior	N	9.743	36.223	6.237	.	52.204		
			%	18,7	69,4	11,9	.	100,0		
		Secundaria, superior	N	19.072	80.892	11.792	3.780	115.536		
			%	16,5	70,0	10,2	3,3	100,0		
	Terciaria	N	15.780	40.297	4.537	556	61.170			
		%	25,8	65,9	7,4	0,9	100,0			
	65-74	Total	N	26.260	60.740	5.817	261	93.077		
			%	28,2	65,3	6,2	0,3	100,0		
	Mujeres	45-64	Sin estudios, primaria	N	8.130	26.044	2.318	167	36.659	
				%	22,2	71,0	6,3	0,5	100,0	
			Secundaria, inferior	N	3.215	10.998	1.985	94	16.291	
				%	19,7	67,5	12,2	0,6	100,0	
			Secundaria, superior	N	8.995	15.196	820	.	25.012	
				%	36,0	60,8	3,3	.	100,0	
		Terciaria	N	5.919	8.502	694	.	15.115		
			%	39,2	56,2	4,6	.	100,0		
		65-74	Total	N	27.339	52.358	2.890	252	82.839	
				%	33,0	63,2	3,5	0,3	100,0	
		Mujeres	45-64	Sin estudios, primaria	N	16.408	34.863	1.250	252	52.773
					%	31,1	66,1	2,4	0,5	100,0
				Secundaria, inferior	N	4.031	8.522	478	.	13.031
					%	30,9	65,4	3,7	.	100,0
Secundaria, superior				N	3.643	5.631	742	.	10.016	
				%	36,4	56,2	7,4	.	100,0	
Terciaria			N	3.258	3.342	420	.	7.020		
			%	46,4	47,6	6,0	.	100,0		
65-74			Total	N	153.334	462.373	55.442	6.671	677.820	
				%	22,6	68,2	8,2	1,0	100,0	
Mujeres			45-64	Sin estudios, primaria	N	29.572	100.949	11.950	2.086	144.557
					%	20,5	69,8	8,3	1,4	100,0

(continuación)

Tabla 3. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Mujeres	Total	Secundaria, inferior	N	16.072	82.011	7.605	980	106.667
			%	15,1	76,9	7,1	0,9	100,0
		Secundaria, superior	N	47.499	163.179	20.643	1.758	233.079
			%	20,4	70,0	8,9	0,8	100,0
		Terciaria	N	60.191	116.235	15.245	1.847	193.517
			%	31,1	60,1	7,9	1,0	100,0
	15-24	Total	N	4.289	16.598	1.526	.	22.414
			%	19,1	74,1	6,8	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	163	1.711	.	.	1.874
			%	8,7	91,3	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	163	2.774	.	.	2.937
			%	5,6	94,4	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.076	6.815	563	.	9.455
			%	22,0	72,1	6,0	.	100,0
		Terciaria	N	1.887	5.298	963	.	8.148
			%	23,2	65,0	11,8	.	100,0
	25-44	Total	N	66.260	191.297	25.682	3.272	286.512
			%	23,1	66,8	9,0	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.801	13.646	2.726	1.086	20.260
			%	13,8	67,4	13,5	5,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.015	25.598	3.484	.	33.097
			%	12,1	77,3	10,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N	22.297	84.036	11.091	824	118.247
			%	18,9	71,1	9,4	0,7	100,0
		Terciaria	N	37.147	68.017	8.382	1.363	114.908
			%	32,3	59,2	7,3	1,2	100,0
	45-64	Total	N	49.206	176.980	22.395	1.701	250.282
			%	19,7	70,7	8,9	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.414	39.343	4.721	86	51.564
			%	14,4	76,3	9,2	0,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.010	34.132	3.083	301	44.526
			%	15,7	76,7	6,9	0,7	100,0

(continuación)

Tabla 3. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Mujeres	45-64	Secundaria, superior	N	18.262	66.180	8.691	830	93.964
			%	19,4	70,4	9,2	0,9	100,0
		Terciaria	N	16.519	37.325	5.900	484	60.228
			%	27,4	62,0	9,8	0,8	100,0
	65-74	Total	N	14.603	38.970	3.844	772	58.188
			%	25,1	67,0	6,6	1,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.199	21.975	2.760	485	32.419
			%	22,2	67,8	8,5	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.305	9.967	878	182	13.333
			%	17,3	74,8	6,6	1,4	100,0
		Secundaria, superior	N	2.631	3.880	205	105	6.822
			%	38,6	56,9	3,0	1,5	100,0
		Terciaria	N	2.467	3.147	.	.	5.614
			%	43,9	56,1	.	.	100,0
	>=75	Total	N	18.976	38.528	1.995	925	60.424
			%	31,4	63,8	3,3	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	11.995	24.274	1.742	429	38.440
			%	31,2	63,1	4,5	1,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.578	9.540	160	497	12.774
			%	20,2	74,7	1,2	3,9	100,0
		Secundaria, superior	N	2.232	2.267	93	.	4.592
			%	48,6	49,4	2,0	.	100,0
		Terciaria	N	2.171	2.447	.	.	4.618
			%	47,0	53,0	.	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	326.877	1.019.865	132.704	20.236	1.499.681
			%	21,8	68,0	8,8	1,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	68.431	241.120	25.368	4.574	339.493
			%	20,2	71,0	7,5	1,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	40.771	177.443	23.382	2.733	244.330
			%	16,7	72,6	9,6	1,1	100,0
		Secundaria, superior	N	112.707	378.308	57.138	9.939	558.092
			%	20,2	67,8	10,2	1,8	100,0
		Terciaria	N	104.969	222.994	26.815	2.989	357.767

(continuación)

Tabla 3. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

		Muy satisfecho/a			Muy insatisfecho/a			Total
		%	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	%	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	
Ambos	Total	%	29,3	62,3	7,5	0,8	100,0	
	15-24 Total	N	9.053	33.948	5.071	.	48.072	
		%	18,8	70,6	10,5	.	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	651	2.814	.	.	3.466	
		%	18,8	81,2	.	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	862	5.917	1.496	.	8.275	
		%	10,4	71,5	18,1	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	4.153	17.619	2.612	.	24.384	
		%	17,0	72,3	10,7	.	100,0	
	Terciaria	N	3.386	7.598	963	.	11.947	
		%	28,3	63,6	8,1	.	100,0	
	25-44 Total	N	125.369	409.397	62.998	10.813	608.579	
		%	20,6	67,3	10,4	1,8	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	5.156	40.276	7.450	1.981	54.863	
		%	9,4	73,4	13,6	3,6	100,0	
	Secundaria, inferior	N	11.027	62.145	9.064	1.659	83.895	
		%	13,1	74,1	10,8	2,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	53.717	186.641	32.183	5.225	277.767	
		%	19,3	67,2	11,6	1,9	100,0	
	Terciaria	N	55.469	120.335	14.301	1.949	192.054	
		%	28,9	62,7	7,4	1,0	100,0	
	45-64 Total	N	105.278	385.923	50.088	7.212	548.502	
		%	19,2	70,4	9,1	1,3	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	18.891	90.874	9.848	1.261	120.873	
		%	15,6	75,2	8,1	1,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	16.753	70.355	9.320	301	96.730	
		%	17,3	72,7	9,6	0,3	100,0	
	Secundaria, superior	N	37.334	147.073	20.483	4.610	209.500	
		%	17,8	70,2	9,8	2,2	100,0	
	Terciaria	N	32.299	77.622	10.437	1.040	121.399	
		%	26,6	63,9	8,6	0,9	100,0	
	65-74 Total	N	40.862	99.710	9.661	1.033	151.265	
		%	27,0	65,9	6,4	0,7	100,0	

(continuación)

Tabla 3. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Ambos	65-74	Sin estudios, primaria	N	15.329	48.019	5.078	652	69.078
			%	22,2	69,5	7,4	0,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.520	20.965	2.863	276	29.624
			%	18,6	70,8	9,7	0,9	100,0
		Secundaria, superior	N	11.627	19.077	1.025	105	31.833
			%	36,5	59,9	3,2	0,3	100,0
		Terciaria	N	8.386	11.649	694	.	20.729
			%	40,5	56,2	3,3	.	100,0
	>=75	Total	N	46.315	90.886	4.885	1.177	143.263
			%	32,3	63,4	3,4	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	28.403	59.137	2.992	680	91.213
			%	31,1	64,8	3,3	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.609	18.062	638	497	25.805
			%	25,6	70,0	2,5	1,9	100,0
		Secundaria, superior	N	5.875	7.898	835	.	14.608
			%	40,2	54,1	5,7	.	100,0
		Terciaria	N	5.428	5.790	420	.	11.638
			%	46,6	49,7	3,6	.	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 4. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos ergonómicos por sexo y edad

	Hombres						Mujeres					
	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
permanecer mucho tiempo de pie	63,9	75,2	65,5	60,7	61,7	67,8	63,8	66,0	61,0	64,1	70,6	68,6
en postura difícil, incómoda o cansada largo tiempo	36,3	36,3	36,2	35,1	34,4	43,0	30,9	38,6	30,6	29,6	30,9	34,2
desplazamientos a pie largos y frecuentes	24,6	23,5	25,4	25,0	21,3	24,4	20,2	18,6	21,0	20,1	17,4	19,9
llevar o desplazar cargas pesadas	22,3	18,0	24,9	20,4	18,6	24,8	13,3	9,0	12,6	13,8	15,4	13,8
vibraciones o sacudidas	11,0	7,5	11,9	10,8	11,0	9,1	2,6	4,5	3,3	2,0	3,2	0,6
trabajar mirando pantalla de ordenador	28,6	22,5	33,0	31,9	24,9	5,5	31,7	27,5	40,7	34,0	7,5	4,1
prestar concentración/atención continua	75,5	64,1	78,0	77,1	73,2	65,8	65,3	71,5	69,5	65,4	58,8	49,4
movimientos repetitivos	65,2	65,5	69,3	64,0	58,7	60,6	66,8	74,7	66,9	67,3	65,4	62,7

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 5. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos ergonómicos por sexo, edad y territorio histórico

Hombres						
	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
permanecer mucho tiempo de pie	63,9	75,2	65,5	60,7	61,7	67,8
en postura difícil, incómoda o cansada largo tiempo	36,3	36,3	36,2	35,1	34,4	43,0
desplazamientos a pie largos y frecuentes	24,6	23,5	25,4	25,0	21,3	24,4
llevar o desplazar cargas pesadas	22,3	18,0	24,9	20,4	18,6	24,8
vibraciones o sacudidas	11,0	7,5	11,9	10,8	11,0	9,1
trabajar mirando pantalla de ordenador	28,6	22,5	33,0	31,9	24,9	5,5
prestar concentración/atención continua	75,5	64,1	78,0	77,1	73,2	65,8
movimientos repetitivos	65,2	65,5	69,3	64,0	58,7	60,6

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 5. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos ergonómicos por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
permanecer mucho tiempo de pie	63,8	66,0	61,0	64,1	70,6	68,6
en postura difícil, incómoda o cansada largo tiempo	30,9	38,6	30,6	29,6	30,9	34,2
desplazamientos a pie largos y frecuentes	20,2	18,6	21,0	20,1	17,4	19,9
llevar o desplazar cargas pesadas	13,3	9,0	12,6	13,8	15,4	13,8
vibraciones o sacudidas	2,6	4,5	3,3	2,0	3,2	0,6
trabajar mirando pantalla de ordenador	31,7	27,5	40,7	34,0	7,5	4,1
prestar concentración/atención continua	65,3	71,5	69,5	65,4	58,8	49,4
movimientos repetitivos	66,8	74,7	66,9	67,3	65,4	62,7

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 6. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos ergonómicos por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
permanecer mucho tiempo de pie	29,4	47,0	52,6	75,7	84,1	40,6	58,5	39,0	86,2	84,3	27,3	41,6	51,8	80,4	89,8
en postura difícil, incómoda o cansada largo tiempo	11,1	19,4	28,8	46,1	47,6	0,0	0,0	30,8	43,5	51,3	11,6	20,4	28,7	46,0	49,2
desplazamientos a pie largos y frecuentes	13,2	12,8	23,8	28,0	33,1	0,0	7,2	30,8	20,9	42,7	10,9	13,6	23,0	30,9	32,5
llevar o desplazar cargas pesadas	2,7	10,0	17,7	28,8	34,2	0,0	0,0	30,8	12,6	41,2	2,2	7,7	20,2	33,8	35,5
vibraciones o sacudidas	1,7	5,5	5,9	15,9	12,5	0,0	0,0	0,0	7,9	16,7	1,9	4,4	8,0	18,3	9,1
trabajar mirando pantalla de ordenador	73,1	57,5	42,9	11,5	5,9	100,0	48,8	61,2	5,0	11,7	80,6	66,8	49,9	13,6	3,7
prestar concentración/atención continua	88,6	80,6	72,4	75,0	63,2	83,3	48,3	86,3	61,4	63,6	91,5	84,6	74,6	76,3	69,4
movimientos repetitivos	51,0	54,1	60,0	70,9	74,0	36,8	58,1	72,2	62,8	82,1	55,0	57,3	63,5	75,6	78,7

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
permanecer mucho tiempo de pie	31,6	43,3	51,2	71,5	81,7	26,5	63,5	57,6	71,8	75,7	36,8	71,4	55,9	74,6	71,5
en postura difícil, incómoda o cansada largo tiempo	11,9	18,2	27,0	45,4	46,8	10,4	21,2	29,5	44,8	40,0	4,0	29,3	33,9	50,8	46,3
desplazamientos a pie largos y frecuentes	15,9	12,5	27,2	26,8	34,4	16,1	11,6	17,7	24,5	32,8	7,6	14,4	21,0	27,9	25,1
llevar o desplazar cargas pesadas	3,1	10,9	14,0	26,7	36,4	3,1	5,6	17,4	24,8	24,6	4,0	34,4	20,8	27,5	23,6
vibraciones o sacudidas	1,1	6,7	4,8	15,6	16,6	2,4	4,3	9,0	15,1	13,9	3,3	13,6	1,3	12,2	10,8
trabajar mirando pantalla de ordenador	73,6	59,5	47,4	13,9	9,1	60,9	44,0	36,8	8,4	7,5	16,4	8,5	12,8	2,1	0,0
prestar concentración/atención continua	87,8	81,1	75,0	77,2	61,1	86,0	77,9	68,9	73,5	51,0	73,6	76,4	59,8	69,3	49,7
movimientos repetitivos	48,6	53,7	58,9	70,0	74,6	48,8	51,2	57,9	62,9	59,1	42,6	35,2	53,9	68,0	55,5

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 6. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos ergonómicos por sexo, edad y clase social

Mujeres

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
permanecer mucho tiempo de pie	38,2	63,4	35,3	81,9	88,5	38,1	82,7	35,6	84,7	57,5	36,0	58,4	31,4	85,2	85,9
en postura difícil, incómoda o cansada largo tiempo	18,4	21,3	21,1	40,9	40,2	24,9	13,5	23,9	48,7	48,7	22,1	26,3	19,3	41,8	37,6
desplazamientos a pie largos y frecuentes	11,0	21,8	12,2	26,2	25,8	8,6	15,5	18,3	20,7	21,3	10,8	23,6	8,5	30,4	30,2
llevar o desplazar cargas pesadas	5,7	9,0	6,4	20,3	17,6	0,0	10,0	0,0	10,2	20,2	6,4	9,7	3,1	21,2	18,3
vibraciones o sacudidas	2,2	2,6	2,3	3,0	2,5	0,0	15,5	0,0	3,7	8,8	1,9	2,8	2,4	4,4	4,2
trabajar mirando pantalla de ordenador	67,4	39,6	59,0	11,2	2,4	52,8	32,9	79,7	6,3	11,0	75,4	41,6	70,2	17,7	3,5
prestar concentración/atención continua	82,2	73,5	74,9	61,3	43,8	61,4	90,0	81,6	69,1	64,9	82,8	73,9	79,8	62,8	47,9
movimientos repetitivos	46,6	52,8	68,8	72,8	73,6	56,0	60,3	66,9	77,1	96,2	48,7	49,4	70,5	75,4	73,8

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
permanecer mucho tiempo de pie	38,8	63,0	32,9	84,1	95,2	58,6	79,1	51,3	73,5	85,5	41,8	78,9	52,3	67,2	83,6
en postura difícil, incómoda o cansada largo tiempo	13,5	16,6	21,0	41,9	39,8	20,3	11,5	18,9	39,0	37,8	0,0	20,7	32,8	31,6	47,7
desplazamientos a pie largos y frecuentes	11,5	21,1	11,8	25,2	28,9	14,8	10,7	14,5	23,2	13,9	5,7	22,8	29,8	16,3	17,5
llevar o desplazar cargas pesadas	6,2	7,6	6,3	23,3	18,4	0,0	10,4	14,7	17,6	17,5	0,0	9,5	17,5	14,3	13,2
vibraciones o sacudidas	3,2	2,3	2,2	1,7	1,1	0,0	0,0	5,0	3,8	2,1	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7
trabajar mirando pantalla de ordenador	67,3	49,7	63,3	8,4	2,2	19,2	3,1	21,8	1,7	0,7	0,0	10,4	8,8	3,1	0,0
prestar concentración/atención continua	85,0	75,8	76,5	58,9	43,1	89,3	64,5	67,2	62,8	37,3	46,6	61,4	45,9	57,7	37,6
movimientos repetitivos	45,5	53,4	69,3	69,9	79,2	40,0	52,7	63,5	75,2	61,8	18,4	68,2	63,0	66,6	61,2

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 7. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos ergonómicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
permanecer mucho tiempo de pie	75,7	73,8	68,1	33,1	100,0	86,0	75,4	48,6
en postura difícil, incómoda o cansada largo tiempo	49,5	46,0	36,7	11,8	68,2	45,5	36,5	8,7
desplazamientos a pie largos y frecuentes	26,1	31,7	26,6	12,9	42,7	39,1	18,5	12,9
llevar o desplazar cargas pesadas	33,0	31,6	21,0	4,6	47,5	16,7	19,8	0,0
vibraciones o sacudidas	13,4	16,2	11,9	1,9	15,7	0,0	11,2	0,0
trabajar mirando pantalla de ordenador	6,6	9,2	29,0	70,1	0,0	0,0	25,6	51,4
prestar concentración/atención continua	67,1	72,9	76,0	86,6	100,0	46,0	65,2	70,4
movimientos repetitivos	68,9	72,9	66,5	51,5	84,6	59,2	65,7	65,7

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 7. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos ergonómicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
permanecer mucho tiempo de pie	85,1	76,0	74,6	31,1	75,7	70,4	60,9	34,8
en postura difícil, incómoda o cansada largo tiempo	52,9	45,4	41,9	11,0	48,6	48,4	32,8	13,0
desplazamientos a pie largos y frecuentes	25,7	37,3	28,2	11,4	26,5	27,1	28,1	15,5
llevar o desplazar cargas pesadas	38,1	38,2	27,4	5,0	35,2	29,8	15,7	4,7
vibraciones o sacudidas	12,0	20,4	13,8	2,6	15,4	15,9	10,7	1,2
trabajar mirando pantalla de ordenador	6,9	10,2	25,6	75,0	9,3	12,2	33,1	72,2
prestar concentración/atención continua	66,4	71,9	76,8	89,8	72,6	74,1	76,7	85,5
movimientos repetitivos	73,0	81,3	71,8	54,5	71,4	70,4	64,1	49,8

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 7. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos ergonómicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
permanecer mucho tiempo de pie	68,8	74,3	61,8	30,8	73,5	73,6	51,4	37,7
en postura difícil, incómoda o cansada largo tiempo	45,6	44,1	26,0	10,9	50,6	41,5	25,3	13,7
desplazamientos a pie largos y frecuentes	26,1	25,7	17,0	12,1	25,4	32,4	20,5	7,2
llevar o desplazar cargas pesadas	28,3	28,0	8,3	2,3	29,7	23,6	13,4	7,2
vibraciones o sacudidas	14,6	13,8	9,5	2,2	10,9	11,3	2,9	0,0
trabajar mirando pantalla de ordenador	7,1	5,2	38,2	67,0	2,8	1,8	17,9	15,5
prestar concentración/atención continua	63,7	79,0	74,3	88,0	61,6	74,9	74,9	67,2
movimientos repetitivos	65,3	68,8	51,1	44,2	64,8	60,7	50,8	42,4

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 7. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos ergonómicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
permanecer mucho tiempo de pie	80,3	78,0	63,6	43,9	33,9	82,6	72,4	60,1
en postura difícil, incómoda o cansada largo tiempo	35,5	38,4	32,9	20,8	0,0	61,9	43,0	33,9
desplazamientos a pie largos y frecuentes	21,7	24,1	21,9	14,8	0,0	11,4	24,9	18,0
llevar o desplazar cargas pesadas	19,7	14,8	14,3	6,3	0,0	26,3	9,6	4,0
vibraciones o sacudidas	2,5	2,0	3,2	2,2	0,0	11,4	4,0	3,7
trabajar mirando pantalla de ordenador	5,6	8,8	34,5	60,3	17,8	0,0	18,0	50,7
prestar concentración/atención continua	48,5	57,3	67,8	79,5	26,5	71,6	66,1	88,0
movimientos repetitivos	67,9	74,4	71,1	56,6	64,3	100,0	75,2	67,3

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 7. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos ergonómicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
permanecer mucho tiempo de pie	76,3	82,0	69,9	43,0	85,4	81,5	57,3	43,5
en postura difícil, incómoda o cansada largo tiempo	31,0	43,5	33,9	23,5	36,2	36,5	31,7	15,6
desplazamientos a pie largos y frecuentes	24,1	28,0	24,1	15,3	22,6	24,2	20,6	14,1
llevar o desplazar cargas pesadas	19,8	17,0	14,7	7,8	20,8	14,7	15,3	4,9
vibraciones o sacudidas	3,7	2,1	4,1	2,7	2,8	1,0	2,3	1,4
trabajar mirando pantalla de ordenador	5,5	7,4	33,4	63,9	10,4	12,8	39,3	61,6
prestar concentración/atención continua	47,0	52,9	68,6	79,1	54,7	54,6	66,4	81,1
movimientos repetitivos	79,1	74,5	70,9	58,5	69,7	75,7	71,8	52,1

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 7. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos ergonómicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
permanecer mucho tiempo de pie	78,3	70,2	54,4	47,2	79,6	62,3	23,5	38,8
en postura difícil, incómoda o cansada largo tiempo	34,5	31,2	27,1	14,5	39,6	33,7	20,4	4,3
desplazamientos a pie largos y frecuentes	18,9	20,0	10,6	10,4	22,6	20,6	4,2	10,7
llevar o desplazar cargas pesadas	20,6	14,0	6,3	0,0	18,3	7,9	5,7	0,0
vibraciones o sacudidas	3,6	4,6	1,3	0,0	0,7	0,9	0,0	0,0
trabajar mirando pantalla de ordenador	2,9	8,5	15,0	22,4	1,0	1,1	25,9	16,5
prestar concentración/atención continua	49,6	65,1	73,9	77,9	41,0	66,4	67,5	55,3
movimientos repetitivos	66,2	71,2	64,3	48,4	61,3	67,4	62,9	61,1

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 8. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos físico-químicos por sexo y edad

	Hombres						Mujeres					
	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
respirar humo, polvo o productos tóxicos	26,5	18,1	26,8	24,3	30,3	31,0	12,6	11,2	12,0	13,9	14,7	9,1
manipular/contacto con productos tóxicos y nocivos	14,5	13,0	16,6	11,4	15,9	16,8	8,1	4,7	8,1	9,0	8,0	5,4
contagio por agentes biológicos	5,4	8,0	6,7	5,4	2,6	2,6	10,9	14,3	13,4	11,4	4,7	1,8
ruido elevado	26,7	19,5	25,1	25,4	30,2	35,6	9,7	7,9	9,6	10,5	9,8	7,8
lesiones por lanzamiento/caída de objetos	12,6	11,6	13,7	11,2	11,3	15,7	3,5	2,3	4,6	2,8	2,7	2,2
sufrir caída de altura	9,6	7,4	10,9	9,2	6,9	10,2	1,0	0,0	1,2	1,0	0,7	0,5
descarga eléctrica, quemaduras o heridas por las máquinas o materiales	10,4	7,1	12,6	8,6	9,2	10,6	3,0	0,0	4,0	2,4	3,2	1,7
sufrir accidente de circulación	18,2	7,2	21,6	19,3	14,4	8,4	6,2	3,4	8,5	6,1	1,4	1,7
radiaciones ionizantes	1,1	0,0	1,6	0,8	0,9	0,9	1,4	2,5	1,8	1,5	0,3	0,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 9. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos físico-químicos por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
respirar humo, polvo o productos tóxicos	26,5	18,1	26,8	24,3	30,3	31,0
manipular/contacto con productos tóxicos y nocivos	14,5	13,0	16,6	11,4	15,9	16,8
contagio por agentes biológicos	5,4	8,0	6,7	5,4	2,6	2,6
ruido elevado	26,7	19,5	25,1	25,4	30,2	35,6
lesiones por lanzamiento/caída de objetos	12,6	11,6	13,7	11,2	11,3	15,7
sufrir caída de altura	9,6	7,4	10,9	9,2	6,9	10,2
descarga eléctrica, quemaduras o heridas por las máquinas o materiales	10,4	7,1	12,6	8,6	9,2	10,6
sufrir accidente de circulación	18,2	7,2	21,6	19,3	14,4	8,4
radiaciones ionizantes	1,1	0,0	1,6	0,8	0,9	0,9

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 9. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos físico-químicos por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
respirar humo, polvo o productos tóxicos	12,6	11,2	12,0	13,9	14,7	9,1
manipular/contacto con productos tóxicos y nocivos	8,1	4,7	8,1	9,0	8,0	5,4
contagio por agentes biológicos	10,9	14,3	13,4	11,4	4,7	1,8
ruido elevado	9,7	7,9	9,6	10,5	9,8	7,8
lesiones por lanzamiento/caída de objetos	3,5	2,3	4,6	2,8	2,7	2,2
sufrir caída de altura	1,0	0,0	1,2	1,0	0,7	0,5
descarga eléctrica, quemaduras o heridas por las máquinas o materiales	3,0	0,0	4,0	2,4	3,2	1,7
sufrir accidente de circulación	6,2	3,4	8,5	6,1	1,4	1,7
radiaciones ionizantes	1,4	2,5	1,8	1,5	0,3	0,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 10. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos físico-químicos por sexo, edad y clase social

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Hombres															
respirar humo, polvo o productos tóxicos	8,4	9,5	16,8	36,7	30,5	22,6	0,0	0,0	25,9	15,9	7,3	10,1	17,5	37,6	33,1
manipular/contacto con productos tóxicos y nocivos	3,8	7,3	7,6	20,8	16,7	0,0	0,0	0,0	18,6	15,9	3,0	9,2	10,0	23,6	19,6
contagio por agentes biológicos	7,0	4,9	3,6	5,8	5,6	0,0	0,0	29,8	9,4	0,0	4,9	4,4	4,5	8,2	8,3
ruido elevado	8,2	14,2	12,0	37,8	33,5	0,0	7,2	0,0	19,9	41,4	9,5	14,4	11,5	35,1	32,0
lesiones por lanzamiento/caída de objetos	3,8	5,1	5,8	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	9,2	33,9	4,3	5,5	6,8	19,7	17,2
sufrir caída de altura	1,8	3,9	6,0	12,9	15,3	0,0	0,0	0,0	4,0	27,0	2,5	5,3	6,6	14,5	16,9
descarga eléctrica, quemaduras o heridas por las máquinas o materiales	3,6	3,5	6,2	15,2	8,8	0,0	0,0	0,0	10,3	8,6	6,3	3,3	6,7	19,0	10,2
sufrir accidente de circulación	13,7	15,4	15,5	21,4	14,9	0,0	0,0	0,0	11,7	5,2	11,6	20,4	18,9	25,8	20,6
radiaciones ionizantes	0,8	2,4	0,7	1,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,4	0,6	2,0	1,2
	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
respirar humo, polvo o productos tóxicos	7,8	5,9	17,4	33,2	31,6	11,6	17,4	18,9	42,2	34,5	9,3	20,0	13,4	42,8	22,3
manipular/contacto con productos tóxicos y nocivos	3,0	3,9	6,3	16,4	14,9	8,9	10,0	7,9	22,2	19,0	4,0	13,6	5,9	24,4	7,5
contagio por agentes biológicos	12,6	7,5	2,1	5,0	3,9	0,8	4,0	2,8	2,6	4,9	0,0	0,0	3,2	2,6	3,6
ruido elevado	6,4	13,3	13,8	35,7	33,8	9,2	13,9	13,4	46,3	30,4	11,6	23,6	8,1	50,3	37,0
lesiones por lanzamiento/caída de objetos	4,0	6,5	4,5	15,5	18,5	3,3	1,4	4,7	18,0	11,0	0,0	3,1	8,9	21,5	13,0
sufrir caída de altura	1,2	3,7	5,5	12,8	15,0	1,9	2,5	5,7	10,0	2,4	0,0	0,0	6,9	13,5	9,8
descarga eléctrica, quemaduras o heridas por las máquinas o materiales	1,2	4,9	6,2	12,3	7,1	1,9	3,3	6,2	13,2	12,4	4,0	0,0	5,5	15,2	5,4
sufrir accidente de circulación	14,7	17,2	19,4	21,7	13,4	17,3	3,3	8,2	18,5	10,0	19,5	0,0	3,0	11,4	3,6
radiaciones ionizantes	1,0	2,6	0,4	0,7	0,8	1,4	0,0	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	1,3	0,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 10. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos físico-químicos por sexo, edad y clase social

Mujeres

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
respirar humo, polvo o productos tóxicos	5,6	7,2	9,1	15,1	20,9	0,0	14,0	8,3	15,6	8,7	6,3	6,3	9,3	15,7	19,2
manipular/contacto con productos tóxicos y nocivos	3,8	6,2	4,4	7,3	18,5	0,0	14,0	0,0	7,6	0,0	5,2	6,6	5,2	9,0	15,8
contagio por agentes biológicos	15,7	29,8	4,4	10,6	7,2	18,7	43,2	5,4	16,3	0,0	18,2	35,7	4,3	12,9	6,8
ruido elevado	8,3	10,4	5,6	14,3	7,9	0,0	10,0	4,3	13,9	0,0	9,2	10,3	4,5	14,2	7,4
lesiones por lanzamiento/caída de objetos	0,3	3,0	2,8	5,5	3,3	0,0	19,4	0,0	1,4	0,0	0,6	2,7	3,0	8,4	4,4
sufrir caída de altura	0,0	1,0	0,8	1,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,6	1,8	1,4
descarga eléctrica, quemaduras o heridas por las máquinas o materiales	0,2	1,2	1,6	6,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	2,4	8,1	3,8
sufrir accidente de circulación	11,4	5,1	5,9	7,1	2,5	9,7	0,0	0,0	5,0	0,0	12,7	4,8	6,5	11,0	4,9
radiaciones ionizantes	1,9	4,4	1,0	1,3	0,3	0,0	10,3	0,0	3,5	0,0	2,8	2,3	2,0	1,6	0,6

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
respirar humo, polvo o productos tóxicos	4,3	8,4	9,2	13,7	28,6	11,8	3,8	10,2	19,3	15,7	5,7	7,3	6,1	12,2	8,5
manipular/contacto con productos tóxicos y nocivos	1,9	7,0	4,1	5,8	25,5	3,3	0,0	3,2	7,1	16,8	5,7	1,7	4,2	4,6	8,8
contagio por agentes biológicos	13,6	30,3	5,3	10,7	11,0	8,3	3,1	1,5	8,3	2,3	0,0	5,0	3,1	0,0	2,4
ruido elevado	8,6	12,9	6,6	14,2	10,6	6,0	0,0	5,9	18,5	4,4	0,0	7,7	5,1	11,8	5,6
lesiones por lanzamiento/caída de objetos	0,0	3,4	2,8	3,4	3,4	0,0	0,0	4,3	3,6	1,1	0,0	0,0	0,9	3,1	3,0
sufrir caída de altura	0,0	0,0	1,0	0,9	2,2	0,0	0,0	1,5	0,0	1,2	0,0	0,0	0,9	0,4	0,5
descarga eléctrica, quemaduras o heridas por las máquinas o materiales	0,0	1,5	1,0	4,9	2,7	0,0	0,0	1,9	7,3	0,0	0,0	3,3	0,9	2,5	1,1
sufrir accidente de circulación	9,1	7,8	7,6	5,7	2,2	6,9	0,0	1,8	1,1	0,7	27,5	0,0	0,0	1,9	0,0
radiaciones ionizantes	1,1	8,2	0,4	1,4	0,2	0,0	3,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 11. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos físico-químicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
respirar humo, polvo o productos tóxicos	36,0	36,8	25,2	9,0	51,5	7,2	20,8	8,7
manipular/contacto con productos tóxicos y nocivos	18,7	21,2	14,1	4,9	51,5	8,8	13,7	0,0
contagio por agentes biológicos	3,5	5,5	5,2	7,9	0,0	0,0	13,8	0,0
ruido elevado	37,6	30,5	27,1	9,4	31,1	24,0	21,6	0,0
lesiones por lanzamiento/caída de objetos	18,2	16,0	12,4	3,7	51,5	12,9	9,8	0,0
sufrir caída de altura	13,5	14,1	9,2	2,3	15,7	9,1	7,8	0,0
descarga eléctrica, quemaduras o heridas por las máquinas o materiales	12,5	13,1	11,9	2,7	51,5	2,7	5,8	0,0
sufrir accidente de circulación	14,7	20,8	20,5	15,4	16,7	2,7	9,6	0,0
radiaciones ionizantes	0,4	1,0	1,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 11. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos físico-químicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
respirar humo, polvo o productos tóxicos	34,1	40,9	29,2	9,4	35,0	36,3	21,8	6,8
manipular/contacto con productos tóxicos y nocivos	17,2	27,8	17,7	6,6	16,2	17,4	10,3	2,8
contagio por agentes biológicos	3,6	10,2	5,7	7,8	3,5	3,4	4,6	10,8
ruido elevado	34,7	26,0	30,1	9,8	37,8	32,5	23,0	9,8
lesiones por lanzamiento/caída de objetos	16,8	18,6	16,1	4,2	16,6	16,4	9,9	3,0
sufrir caída de altura	20,0	14,7	11,7	2,6	12,2	16,9	8,2	1,3
descarga eléctrica, quemaduras o heridas por las máquinas o materiales	14,8	15,4	15,6	3,6	10,5	11,8	9,2	2,6
sufrir accidente de circulación	17,7	24,9	24,0	16,3	19,7	20,7	19,4	17,2
radiaciones ionizantes	0,8	2,4	1,6	1,3	0,0	0,0	1,2	1,7

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 11. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos físico-químicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
respirar humo, polvo o productos tóxicos	38,3	38,6	23,1	13,5	36,3	31,8	14,9	12,8
manipular/contacto con productos tóxicos y nocivos	18,9	22,7	12,6	7,2	21,8	14,0	4,6	2,1
contagio por agentes biológicos	3,3	2,4	1,9	2,3	3,6	1,9	0,0	0,0
ruido elevado	36,9	36,3	29,6	8,3	40,1	35,4	30,0	9,8
lesiones por lanzamiento/caída de objetos	18,3	12,6	4,1	4,4	20,1	10,1	7,2	5,1
sufrir caída de altura	10,2	9,6	1,8	4,3	13,1	7,7	2,1	5,1
descarga eléctrica, quemaduras o heridas por las máquinas o materiales	11,8	15,1	7,2	0,0	12,8	11,1	4,6	2,1
sufrir accidente de circulación	14,1	18,3	13,2	13,0	6,3	16,1	13,1	2,6
radiaciones ionizantes	0,4	0,0	0,8	3,2	0,9	1,2	1,4	0,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 11. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos físico-químicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
respirar humo, polvo o productos tóxicos	15,1	18,3	13,8	6,3	0,0	14,7	17,4	5,4
manipular/contacto con productos tóxicos y nocivos	9,2	11,0	8,3	5,3	0,0	5,5	6,5	3,4
contagio por agentes biológicos	4,4	5,2	10,8	18,9	0,0	26,6	11,6	16,1
ruido elevado	9,6	11,0	10,8	7,8	0,0	5,5	10,2	7,9
lesiones por lanzamiento/caída de objetos	3,6	4,1	4,5	1,8	0,0	0,0	1,5	4,7
sufrir caída de altura	1,1	0,5	1,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
descarga eléctrica, quemaduras o heridas por las máquinas o materiales	3,9	2,9	4,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
sufrir accidente de circulación	2,6	4,1	7,3	8,8	0,0	17,4	2,6	0,0
radiaciones ionizantes	0,2	0,2	1,2	3,3	0,0	0,0	2,4	4,1

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 11. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos físico-químicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
respirar humo, polvo o productos tóxicos	18,0	22,3	14,2	5,7	17,1	19,9	13,6	7,2
manipular/contacto con productos tóxicos y nocivos	8,2	14,5	8,2	6,1	11,6	11,9	9,1	4,8
contagio por agentes biológicos	2,8	7,1	10,5	20,0	7,8	4,9	11,4	19,2
ruido elevado	2,6	11,8	12,4	7,3	12,7	11,9	9,3	9,2
lesiones por lanzamiento/caída de objetos	5,1	7,1	5,8	2,6	3,4	3,9	3,6	0,4
sufrir caída de altura	0,0	1,2	1,4	1,2	1,8	0,4	1,2	0,5
descarga eléctrica, quemaduras o heridas por las máquinas o materiales	3,1	5,7	6,1	1,6	5,7	1,1	2,6	0,3
sufrir accidente de circulación	5,6	5,9	8,7	9,6	3,2	3,0	7,0	9,5
radiaciones ionizantes	0,0	0,0	1,6	2,9	0,5	0,5	0,7	4,3

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 11. Prevalencia (%) de población que está o ha estado expuesta con mucha frecuencia a riesgos físico-químicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
respirar humo, polvo o productos tóxicos	17,0	12,5	12,4	9,2	9,9	8,9	5,7	6,2
manipular/contacto con productos tóxicos y nocivos	9,5	6,8	8,2	1,9	6,6	5,0	0,0	2,6
contagio por agentes biológicos	3,1	1,2	15,3	9,5	1,8	0,9	0,0	6,1
ruido elevado	11,4	8,5	10,2	3,4	8,3	9,5	0,0	6,1
lesiones por lanzamiento/caída de objetos	3,6	2,5	1,3	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
sufrir caída de altura	1,2	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
descarga eléctrica, quemaduras o heridas por las máquinas o materiales	4,0	4,2	0,0	0,0	2,2	1,4	0,0	0,0
sufrir accidente de circulación	1,1	1,9	0,0	3,9	1,7	2,8	0,0	0,0
radiaciones ionizantes	0,0	0,0	1,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 12. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

				Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total
Hombres	Total	CAPV	N	38.196	233.183	250.572	30.167	552.117
			%	6,9	42,2	45,4	5,5	100,0
		Araba	N	4.132	33.833	45.061	5.769	88.796
			%	4,7	38,1	50,7	6,5	100,0
		Gipuzkoa	N	10.659	76.248	84.486	9.030	180.423
			%	5,9	42,3	46,8	5,0	100,0
		Bizkaia	N	23.405	123.102	121.024	15.368	282.898
			%	8,3	43,5	42,8	5,4	100,0
	0-14	CAPV	N	2.400	11.875	12.570	1.896	28.741
			%	8,4	41,3	43,7	6,6	100,0
		Araba	N	198	1.934	3.158	368	5.658
			%	3,5	34,2	55,8	6,5	100,0
		Gipuzkoa	N	585	4.535	4.975	468	10.564
			%	5,5	42,9	47,1	4,4	100,0
		Bizkaia	N	1.617	5.406	4.437	1.059	12.519
			%	12,9	43,2	35,4	8,5	100,0
	15-24	CAPV	N	1.124	9.628	9.784	1.011	21.547
			%	5,2	44,7	45,4	4,7	100,0
		Araba	N	260	1.596	1.746	347	3.949
			%	6,6	40,4	44,2	8,8	100,0
		Gipuzkoa	N	312	3.015	2.768	215	6.309
			%	4,9	47,8	43,9	3,4	100,0
		Bizkaia	N	553	5.017	5.270	449	11.289
			%	4,9	44,4	46,7	4,0	100,0
25-44	CAPV	N	12.797	59.515	52.613	4.936	129.861	
		%	9,9	45,8	40,5	3,8	100,0	
	Araba	N	1.470	8.812	9.734	1.315	21.331	
		%	6,9	41,3	45,6	6,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	3.520	20.229	17.267	1.450	42.466	
		%	8,3	47,6	40,7	3,4	100,0	
	Bizkaia	N	7.806	30.473	25.612	2.172	66.063	
		%	11,8	46,1	38,8	3,3	100,0	
45-64	CAPV	N	11.834	82.251	94.501	13.898	202.484	
		%	5,8	40,6	46,7	6,9	100,0	

(continuación)

Tabla 12. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

			Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total			
Hombres	45-64	Araba	N	1.219	11.670	16.541	2.243	31.672		
			%	3,8	36,8	52,2	7,1	100,0		
		Gipuzkoa	N	3.615	27.252	31.010	4.533	66.409		
			%	5,4	41,0	46,7	6,8	100,0		
		Bizkaia	N	7.000	43.329	46.951	7.123	104.403		
			%	6,7	41,5	45,0	6,8	100,0		
	65-74	CAPV	N	3.870	33.898	47.707	5.478	90.953		
			%	4,3	37,3	52,5	6,0	100,0		
			Araba	N	363	4.732	7.999	821	13.915	
				%	2,6	34,0	57,5	5,9	100,0	
			Gipuzkoa	N	1.029	10.676	16.968	1.737	30.410	
				%	3,4	35,1	55,8	5,7	100,0	
			Bizkaia	N	2.478	18.490	22.740	2.921	46.629	
				%	5,3	39,7	48,8	6,3	100,0	
		>=75	CAPV	N	6.171	36.015	33.397	2.948	78.531	
				%	7,9	45,9	42,5	3,8	100,0	
				Araba	N	622	5.089	5.883	675	12.270
					%	5,1	41,5	47,9	5,5	100,0
			Gipuzkoa	N	1.598	10.540	11.499	628	24.265	
				%	6,6	43,4	47,4	2,6	100,0	
	Bizkaia	N	3.951	20.386	16.015	1.644	41.996			
		%	9,4	48,5	38,1	3,9	100,0			
Mujeres	Total	CAPV	N	20.151	130.726	104.152	9.564	264.594		
		%	7,6	49,4	39,4	3,6	100,0			
		Araba	N	1.492	15.314	17.830	1.219	35.854		
			%	4,2	42,7	49,7	3,4	100,0		
		Gipuzkoa	N	5.232	46.939	35.281	2.409	89.862		
			%	5,8	52,2	39,3	2,7	100,0		
		Bizkaia	N	13.427	68.474	51.041	5.936	138.878		
			%	9,7	49,3	36,8	4,3	100,0		
	15-24	CAPV	N	849	2.893	1.861	239	5.842		
			%	14,5	49,5	31,9	4,1	100,0		
			Araba	N	86	490	398	.	973	
				%	8,8	50,3	40,9	.	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 12. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

				Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total
Mujeres	15-24	Gipuzkoa	N	123	1.681	815	.	2.619
			%	4,7	64,2	31,1	.	100,0
		Bizkaia	N	640	722	648	239	2.250
			%	28,5	32,1	28,8	10,6	100,0
	25-44	CAPV	N	3.153	29.989	22.831	1.290	57.262
			%	5,5	52,4	39,9	2,3	100,0
		Araba	N	381	3.040	3.476	86	6.983
			%	5,5	43,5	49,8	1,2	100,0
		Gipuzkoa	N	781	9.480	6.873	281	17.414
			%	4,5	54,4	39,5	1,6	100,0
		Bizkaia	N	1.991	17.469	12.482	923	32.865
			%	6,1	53,2	38,0	2,8	100,0
	45-64	CAPV	N	4.696	29.844	35.478	5.004	75.022
			%	6,3	39,8	47,3	6,7	100,0
		Araba	N	270	4.661	6.179	920	12.030
			%	2,2	38,7	51,4	7,6	100,0
		Gipuzkoa	N	1.253	9.932	11.781	1.012	23.978
			%	5,2	41,4	49,1	4,2	100,0
		Bizkaia	N	3.173	15.250	17.519	3.073	39.015
			%	8,1	39,1	44,9	7,9	100,0
	65-74	CAPV	N	3.415	23.014	14.665	647	41.741
			%	8,2	55,1	35,1	1,6	100,0
		Araba	N	127	2.714	3.338	.	6.178
			%	2,0	43,9	54,0	.	100,0
	Gipuzkoa	N	566	8.352	5.280	163	14.361	
		%	3,9	58,2	36,8	1,1	100,0	
	Bizkaia	N	2.722	11.948	6.048	484	21.202	
		%	12,8	56,4	28,5	2,3	100,0	
>=75	CAPV	N	8.039	44.987	29.317	2.384	84.727	
		%	9,5	53,1	34,6	2,8	100,0	
	Araba	N	628	4.409	4.439	214	9.690	
		%	6,5	45,5	45,8	2,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	2.510	17.494	10.533	953	31.490	
		%	8,0	55,6	33,4	3,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 12. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

			Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total	
Mujeres	>=75	Bizkaia	N	4.901	23.085	14.344	1.217	43.547
			%	11,3	53,0	32,9	2,8	100,0
Ambos sexos	Total	CAPV	N	58.347	363.910	354.724	39.731	816.711
			%	7,1	44,6	43,4	4,9	100,0
		Araba	N	5.623	49.147	62.891	6.988	124.650
			%	4,5	39,4	50,5	5,6	100,0
		Gipuzkoa	N	15.892	123.187	119.768	11.439	270.285
			%	5,9	45,6	44,3	4,2	100,0
		Bizkaia	N	36.832	191.576	172.065	21.303	421.777
			%	8,7	45,4	40,8	5,1	100,0
	0-14	CAPV	N	2.400	11.875	12.570	1.896	28.741
			%	8,4	41,3	43,7	6,6	100,0
		Araba	N	198	1.934	3.158	368	5.658
			%	3,5	34,2	55,8	6,5	100,0
		Gipuzkoa	N	585	4.535	4.975	468	10.564
			%	5,5	42,9	47,1	4,4	100,0
		Bizkaia	N	1.617	5.406	4.437	1.059	12.519
			%	12,9	43,2	35,4	8,5	100,0
	15-24	CAPV	N	1.973	12.521	11.645	1.250	27.388
			%	7,2	45,7	42,5	4,6	100,0
		Araba	N	346	2.085	2.144	347	4.922
			%	7,0	42,4	43,6	7,0	100,0
		Gipuzkoa	N	434	4.696	3.582	215	8.928
			%	4,9	52,6	40,1	2,4	100,0
		Bizkaia	N	1.193	5.739	5.918	688	13.538
			%	8,8	42,4	43,7	5,1	100,0
	25-44	CAPV	N	15.950	89.504	75.444	6.226	187.123
			%	8,5	47,8	40,3	3,3	100,0
		Araba	N	1.852	11.852	13.210	1.400	28.314
			%	6,5	41,9	46,7	4,9	100,0
		Gipuzkoa	N	4.301	29.709	24.140	1.731	59.881
			%	7,2	49,6	40,3	2,9	100,0
		Bizkaia	N	9.797	47.942	38.094	3.095	98.928
			%	9,9	48,5	38,5	3,1	100,0
	45-64	CAPV	N	16.530	112.095	129.980	18.902	277.507

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 12. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

			Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total		
Ambos sexos	45-64	CAPV	%	6,0	40,4	46,8	6,8	100,0	
		Araba	N	1.488	16.332	22.719	3.162	43.702	
			%	3,4	37,4	52,0	7,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	4.868	37.184	42.791	5.544	90.387	
			%	5,4	41,1	47,3	6,1	100,0	
		Bizkaia	N	10.173	58.579	64.470	10.195	143.417	
			%	7,1	40,8	45,0	7,1	100,0	
		65-74	CAPV	N	7.284	56.912	62.372	6.125	132.694
			%	5,5	42,9	47,0	4,6	100,0	
		Araba	N	489	7.446	11.337	821	20.093	
			%	2,4	37,1	56,4	4,1	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.595	19.028	22.247	1.900	44.771	
	%		3,6	42,5	49,7	4,2	100,0		
	Bizkaia	N	5.200	30.438	28.788	3.404	67.830		
		%	7,7	44,9	42,4	5,0	100,0		
	>=75	CAPV	N	14.210	81.003	62.714	5.331	163.258	
		%	8,7	49,6	38,4	3,3	100,0		
	Araba	N	1.251	9.498	10.322	889	21.960		
		%	5,7	43,3	47,0	4,0	100,0		
	Gipuzkoa	N	4.108	28.034	22.032	1.581	55.755		
		%	7,4	50,3	39,5	2,8	100,0		
	Bizkaia	N	8.851	43.471	30.359	2.861	85.543		
		%	10,3	50,8	35,5	3,3	100,0		

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 13. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

			Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total
Hombres	Total	Total	N 38.196	233.183	250.572	30.167	552.117
			% 6,9	42,2	45,4	5,5	100,0
		I	N 1.315	15.348	59.053	15.447	91.163
			% 1,4	16,8	64,8	16,9	100,0
		II	N 2.400	16.951	36.774	3.942	60.067
			% 4,0	28,2	61,2	6,6	100,0
		III	N 7.378	57.699	61.429	4.521	131.028
			% 5,6	44,0	46,9	3,5	100,0
		IV	N 22.986	128.666	87.925	5.772	245.349
			% 9,4	52,4	35,8	2,4	100,0
		V	N 4.117	14.519	5.391	485	24.511
			% 16,8	59,2	22,0	2,0	100,0
	0-14	Total	N 2.400	11.875	12.570	1.896	28.741
			% 8,4	41,3	43,7	6,6	100,0
		I	N .	764	3.854	1.238	5.856
			% .	13,0	65,8	21,1	100,0
		II	N 177	2.379	3.061	477	6.095
			% 2,9	39,0	50,2	7,8	100,0
		III	N 254	5.177	5.099	.	10.530
			% 2,4	49,2	48,4	.	100,0
		IV	N 1.318	2.663	555	180	4.717
			% 27,9	56,5	11,8	3,8	100,0
		V	N 652	892	.	.	1.544
			% 42,2	57,8	.	.	100,0
	15-24	Total	N 1.124	9.628	9.784	1.011	21.547
			% 5,2	44,7	45,4	4,7	100,0
		I	N .	1.177	2.477	221	3.875
			% .	30,4	63,9	5,7	100,0
		II	N .	969	4.634	333	5.935
			% .	16,3	78,1	5,6	100,0
		III	N 402	4.022	2.031	339	6.794
			% 5,9	59,2	29,9	5,0	100,0
		IV	N 595	2.899	508	.	4.002
			% 14,9	72,4	12,7	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 13. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

			Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total
Hombres	15-24 V	N	127	562	134	118	941
		%	13,5	59,7	14,3	12,6	100,0
	25-44 Total	N	12.797	59.515	52.613	4.936	129.861
		%	9,9	45,8	40,5	3,8	100,0
	I	N	421	6.640	16.756	3.156	26.973
		%	1,6	24,6	62,1	11,7	100,0
	II	N	825	6.215	8.201	1.051	16.293
		%	5,1	38,1	50,3	6,5	100,0
	III	N	2.747	11.973	11.504	229	26.454
		%	10,4	45,3	43,5	0,9	100,0
	IV	N	7.066	30.390	15.819	360	53.637
		%	13,2	56,7	29,5	0,7	100,0
	V	N	1.737	4.296	332	139	6.504
		%	26,7	66,1	5,1	2,1	100,0
	45-64 Total	N	11.834	82.251	94.501	13.898	202.484
		%	5,8	40,6	46,7	6,9	100,0
	I	N	373	5.036	22.719	6.737	34.866
		%	1,1	14,4	65,2	19,3	100,0
	II	N	724	4.535	12.008	1.245	18.512
		%	3,9	24,5	64,9	6,7	100,0
	III	N	2.529	19.941	22.748	2.802	48.021
		%	5,3	41,5	47,4	5,8	100,0
	IV	N	7.803	48.419	34.869	2.887	93.978
		%	8,3	51,5	37,1	3,1	100,0
	V	N	404	4.320	2.157	227	7.107
		%	5,7	60,8	30,3	3,2	100,0
	65-74 Total	N	3.870	33.898	47.707	5.478	90.953
		%	4,3	37,3	52,5	6,0	100,0
	I	N	356	1.222	10.302	3.094	14.974
		%	2,4	8,2	68,8	20,7	100,0
	II	N	507	1.415	5.835	507	8.263
		%	6,1	17,1	70,6	6,1	100,0
	III	N	1.072	8.310	10.894	467	20.742
		%	5,2	40,1	52,5	2,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 13. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total
Hombres	65-74	IV	N	1.681	21.756	19.051	1.410	43.899
			%	3,8	49,6	43,4	3,2	100,0
		V	N	254	1.195	1.626	.	3.076
			%	8,3	38,9	52,9	.	100,0
	>=75	Total	N	6.171	36.015	33.397	2.948	78.531
			%	7,9	45,9	42,5	3,8	100,0
		I	N	164	510	2.944	1.000	4.618
			%	3,6	11,0	63,8	21,7	100,0
		II	N	167	1.438	3.036	329	4.970
			%	3,4	28,9	61,1	6,6	100,0
		III	N	374	8.275	9.154	684	18.487
			%	2,0	44,8	49,5	3,7	100,0
		IV	N	4.522	22.539	17.122	934	45.116
			%	10,0	50,0	37,9	2,1	100,0
	V	N	944	3.254	1.142	.	5.340	
		%	17,7	60,9	21,4	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	20.151	130.726	104.152	9.564	264.594
			%	7,6	49,4	39,4	3,6	100,0
		I	N	871	9.576	23.560	6.105	40.112
			%	2,2	23,9	58,7	15,2	100,0
		II	N	961	15.554	18.935	1.217	36.667
			%	2,6	42,4	51,6	3,3	100,0
		III	N	3.829	38.615	34.011	2.145	78.600
			%	4,9	49,1	43,3	2,7	100,0
		IV	N	9.089	44.220	20.926	98	74.332
			%	12,2	59,5	28,2	0,1	100,0
		V	N	5.402	22.762	6.719	.	34.883
			%	15,5	65,3	19,3	.	100,0
	15-24	Total	N	849	2.893	1.861	239	5.842
			%	14,5	49,5	31,9	4,1	100,0
	I	N	254	662	430	239	1.586	
		%	16,0	41,8	27,1	15,1	100,0	
	II	N	.	519	893	.	1.412	
		%	.	36,7	63,3	.	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 13. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total
Mujeres	15-24	III	N	386	902	389	.	1.677
			%	23,0	53,8	23,2	.	100,0
	IV	N	208	810	148	.	1.166	
		%	17,9	69,4	12,7	.	100,0	
	25-44	Total	N	3.153	29.989	22.831	1.290	57.262
			%	5,5	52,4	39,9	2,3	100,0
	I	N	454	5.621	9.500	1.016	16.591	
		%	2,7	33,9	57,3	6,1	100,0	
	II	N	.	6.479	5.961	188	12.628	
		%	.	51,3	47,2	1,5	100,0	
	III	N	914	9.330	6.689	86	17.019	
		%	5,4	54,8	39,3	0,5	100,0	
	IV	N	1.177	6.614	682	.	8.473	
		%	13,9	78,1	8,0	.	100,0	
	V	N	607	1.944	.	.	2.552	
		%	23,8	76,2	.	.	100,0	
	45-64	Total	N	4.696	29.844	35.478	5.004	75.022
			%	6,3	39,8	47,3	6,7	100,0
	I	N	.	1.355	8.966	3.515	13.835	
		%	.	9,8	64,8	25,4	100,0	
	II	N	180	3.943	6.870	626	11.619	
		%	1,5	33,9	59,1	5,4	100,0	
	III	N	985	12.607	13.692	864	28.148	
		%	3,5	44,8	48,6	3,1	100,0	
IV	N	2.086	7.107	4.184	.	13.378		
	%	15,6	53,1	31,3	.	100,0		
V	N	1.445	4.831	1.766	.	8.042		
	%	18,0	60,1	22,0	.	100,0		
65-74	Total	N	3.415	23.014	14.665	647	41.741	
		%	8,2	55,1	35,1	1,6	100,0	
I	N	.	942	2.107	355	3.404		
	%	.	27,7	61,9	10,4	100,0		
II	N	174	1.893	1.641	.	3.708		
	%	4,7	51,1	44,3	.	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 13. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total	
Mujeres	65-74	III	N	.	5.625	4.856	292	10.773	
			%	.	52,2	45,1	2,7	100,0	
		IV	N	2.537	8.592	4.763	.	15.892	
			%	16,0	54,1	30,0	.	100,0	
		V	N	704	5.961	1.297	.	7.963	
			%	8,8	74,9	16,3	.	100,0	
	>=75	Total	N	8.039	44.987	29.317	2.384	84.727	
			%	9,5	53,1	34,6	2,8	100,0	
	I	N	163	995	2.558	980	4.696		
		%	3,5	21,2	54,5	20,9	100,0		
	II	N	607	2.720	3.570	403	7.299		
		%	8,3	37,3	48,9	5,5	100,0		
	III	N	1.543	10.151	8.385	903	20.983		
		%	7,4	48,4	40,0	4,3	100,0		
	IV	N	3.080	21.096	11.149	98	35.422		
		%	8,7	59,6	31,5	0,3	100,0		
	V	N	2.645	10.026	3.656	.	16.327		
		%	16,2	61,4	22,4	.	100,0		
	Ambos sexos	Total	Total	N	58.347	363.910	354.724	39.731	816.711
				%	7,1	44,6	43,4	4,9	100,0
I		N	2.186	24.924	82.613	21.552	131.275		
		%	1,7	19,0	62,9	16,4	100,0		
II		N	3.361	32.506	55.709	5.159	96.734		
		%	3,5	33,6	57,6	5,3	100,0		
III		N	11.207	96.314	95.440	6.666	209.627		
		%	5,3	45,9	45,5	3,2	100,0		
IV		N	32.074	172.885	108.852	5.870	319.681		
		%	10,0	54,1	34,1	1,8	100,0		
V		N	9.519	37.281	12.110	485	59.395		
		%	16,0	62,8	20,4	0,8	100,0		
0-14		Total	N	2.400	11.875	12.570	1.896	28.741	
			%	8,4	41,3	43,7	6,6	100,0	
I		N	.	764	3.854	1.238	5.856		
		%	.	13,0	65,8	21,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 13. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

			Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total
Ambos sexos 0-14	II	N	177	2.379	3.061	477	6.095
		%	2,9	39,0	50,2	7,8	100,0
	III	N	254	5.177	5.099	.	10.530
		%	2,4	49,2	48,4	.	100,0
	IV	N	1.318	2.663	555	180	4.717
		%	27,9	56,5	11,8	3,8	100,0
	V	N	652	892	.	.	1.544
		%	42,2	57,8	.	.	100,0
	15-24 Total	N	1.973	12.521	11.645	1.250	27.388
		%	7,2	45,7	42,5	4,6	100,0
	I	N	254	1.839	2.907	460	5.461
		%	4,7	33,7	53,2	8,4	100,0
II	N	.	1.488	5.527	333	7.347	
	%	.	20,2	75,2	4,5	100,0	
III	N	789	4.924	2.420	339	8.471	
	%	9,3	58,1	28,6	4,0	100,0	
IV	N	804	3.708	656	.	5.168	
	%	15,6	71,8	12,7	.	100,0	
V	N	127	562	134	118	941	
	%	13,5	59,7	14,3	12,6	100,0	
25-44 Total	N	15.950	89.504	75.444	6.226	187.123	
	%	8,5	47,8	40,3	3,3	100,0	
I	N	875	12.261	26.256	4.172	43.565	
	%	2,0	28,1	60,3	9,6	100,0	
II	N	825	12.695	14.161	1.239	28.921	
	%	2,9	43,9	49,0	4,3	100,0	
III	N	3.661	21.303	18.193	315	43.472	
	%	8,4	49,0	41,8	0,7	100,0	
IV	N	8.244	37.005	16.501	360	62.110	
	%	13,3	59,6	26,6	0,6	100,0	
V	N	2.344	6.240	332	139	9.056	
	%	25,9	68,9	3,7	1,5	100,0	
45-64 Total	N	16.530	112.095	129.980	18.902	277.507	
	%	6,0	40,4	46,8	6,8	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 13. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

		Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total	
Ambos sexos	45-64	I N	373	6.391	31.684	10.252	48.701
		%	0,8	13,1	65,1	21,1	100,0
	II	N	904	8.478	18.878	1.871	30.131
		%	3,0	28,1	62,7	6,2	100,0
	III	N	3.514	32.549	36.440	3.666	76.169
		%	4,6	42,7	47,8	4,8	100,0
	IV	N	9.890	55.526	39.054	2.887	107.356
		%	9,2	51,7	36,4	2,7	100,0
	V	N	1.849	9.151	3.923	227	15.149
		%	12,2	60,4	25,9	1,5	100,0
65-74	Total N	7.284	56.912	62.372	6.125	132.694	
	%	5,5	42,9	47,0	4,6	100,0	
I	N	356	2.164	12.409	3.449	18.378	
	%	1,9	11,8	67,5	18,8	100,0	
II	N	680	3.308	7.476	507	11.971	
	%	5,7	27,6	62,5	4,2	100,0	
III	N	1.072	13.936	15.749	759	31.516	
	%	3,4	44,2	50,0	2,4	100,0	
IV	N	4.218	30.349	23.815	1.410	59.791	
	%	7,1	50,8	39,8	2,4	100,0	
V	N	959	7.156	2.924	.	11.039	
	%	8,7	64,8	26,5	.	100,0	
>=75	Total N	14.210	81.003	62.714	5.331	163.258	
	%	8,7	49,6	38,4	3,3	100,0	
I	N	327	1.505	5.502	1.980	9.314	
	%	3,5	16,2	59,1	21,3	100,0	
II	N	774	4.158	6.605	732	12.270	
	%	6,3	33,9	53,8	6,0	100,0	
III	N	1.917	18.426	17.539	1.587	39.470	
	%	4,9	46,7	44,4	4,0	100,0	
IV	N	7.602	43.635	28.270	1.032	80.539	
	%	9,4	54,2	35,1	1,3	100,0	
V	N	3.590	13.279	4.797	.	21.666	
	%	16,6	61,3	22,1	.	100,0	

Tabla 14. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

			Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total
Hombres	Total	Total	N 38.196	233.183	250.572	30.167	552.117
			% 6,9	42,2	45,4	5,5	100,0
		.	N 1.415	6.936	8.387	1.605	18.343
			% 7,7	37,8	45,7	8,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N 14.218	80.428	61.908	3.580	160.135
			% 8,9	50,2	38,7	2,2	100,0
		Secundaria, inferior	N 8.684	49.754	29.237	1.156	88.831
			% 9,8	56,0	32,9	1,3	100,0
		Secundaria, superior	N 11.167	75.133	82.293	8.552	177.145
			% 6,3	42,4	46,5	4,8	100,0
		Terciaria	N 2.711	20.932	68.747	15.273	107.663
			% 2,5	19,4	63,9	14,2	100,0
	0-14	Total	N 2.400	11.875	12.570	1.896	28.741
			% 8,4	41,3	43,7	6,6	100,0
		.	N 1.415	6.936	8.387	1.605	18.343
			% 7,7	37,8	45,7	8,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N 985	4.196	3.633	291	9.105
			% 10,8	46,1	39,9	3,2	100,0
		Secundaria, inferior	N .	743	550	.	1.293
			% .	57,5	42,5	.	100,0
	15-24	Total	N 1.124	9.628	9.784	1.011	21.547
			% 5,2	44,7	45,4	4,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N .	672	858	228	1.757
			% .	38,2	48,8	13,0	100,0
		Secundaria, inferior	N 268	3.393	3.246	332	7.239
			% 3,7	46,9	44,8	4,6	100,0
		Secundaria, superior	N 553	4.897	4.916	451	10.816
			% 5,1	45,3	45,5	4,2	100,0
		Terciaria	N 303	666	764	.	1.734
			% 17,5	38,4	44,1	.	100,0
	25-44	Total	N 12.797	59.515	52.613	4.936	129.861
			% 9,9	45,8	40,5	3,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N 2.097	7.525	3.879	.	13.501
			% 15,5	55,7	28,7	.	100,0

(continuación)

Tabla 14. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

			Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total	
Hombres	25-44	Secundaria, inferior	N	3.956	10.209	2.685	.	16.850
			%	23,5	60,6	15,9	.	100,0
		Secundaria, superior	N	5.162	31.568	22.926	1.119	60.775
	%		8,5	51,9	37,7	1,8	100,0	
		Terciaria	N	1.581	10.213	23.123	3.817	38.734
	%		4,1	26,4	59,7	9,9	100,0	
		45-64 Total	N	11.834	82.251	94.501	13.898	202.484
	%		5,8	40,6	46,7	6,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	3.958	24.426	17.975	1.086	47.444
	%		8,3	51,5	37,9	2,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	3.290	21.080	10.771	824	35.965
	%		9,1	58,6	29,9	2,3	100,0	
		Secundaria, superior	N	4.026	29.608	36.360	4.453	74.447
	%		5,4	39,8	48,8	6,0	100,0	
		Terciaria	N	561	7.137	29.396	7.535	44.628
	%		1,3	16,0	65,9	16,9	100,0	
		65-74 Total	N	3.870	33.898	47.707	5.478	90.953
	%		4,3	37,3	52,5	6,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.268	17.421	16.197	921	36.808
	%		6,2	47,3	44,0	2,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	573	8.169	6.915	.	15.657
	%		3,7	52,2	44,2	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	926	6.481	12.979	1.748	22.134
	%		4,2	29,3	58,6	7,9	100,0	
	Terciaria	N	102	1.828	11.616	2.809	16.354	
%		0,6	11,2	71,0	17,2	100,0		
	>=75 Total	N	6.171	36.015	33.397	2.948	78.531	
%		7,9	45,9	42,5	3,8	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	4.910	26.188	19.367	1.054	51.519	
%		9,5	50,8	37,6	2,0	100,0		
	Secundaria, inferior	N	597	6.160	5.070	.	11.827	
%		5,0	52,1	42,9	.	100,0		
	Secundaria, superior	N	499	2.580	5.112	781	8.972	
%		5,6	28,8	57,0	8,7	100,0		

(continuación)

Tabla 14. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

			Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total	
Hombres	>=75	Terciaria	N	164	1.088	3.849	1.112	6.213
			%	2,6	17,5	62,0	17,9	100,0
Mujeres	Total	Total	N	20.151	130.726	104.152	9.564	264.594
			%	7,6	49,4	39,4	3,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	10.301	55.874	29.500	945	96.620
	%		10,7	57,8	30,5	1,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	4.483	22.005	11.674	565	38.726
	%		11,6	56,8	30,1	1,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	3.737	34.121	24.925	1.768	64.551
	%		5,8	52,9	38,6	2,7	100,0	
		Terciaria	N	1.630	18.727	38.053	6.285	64.696
	%		2,5	28,9	58,8	9,7	100,0	
		15-24 Total	N	849	2.893	1.861	239	5.842
	%		14,5	49,5	31,9	4,1	100,0	
		Secundaria, inferior	N	208	356	.	.	564
	%		37,0	63,0	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	386	1.366	493	239	2.485
	%		15,5	55,0	19,8	9,6	100,0	
		Terciaria	N	254	1.171	1.368	.	2.793
	%		9,1	41,9	49,0	.	100,0	
		25-44 Total	N	3.153	29.989	22.831	1.290	57.262
	%		5,5	52,4	39,9	2,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	818	1.990	163	.	2.972
	%		27,5	67,0	5,5	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	697	2.339	479	.	3.515	
%		19,8	66,5	13,6	.	100,0		
	Secundaria, superior	N	848	14.126	5.777	86	20.837	
%		4,1	67,8	27,7	0,4	100,0		
	Terciaria	N	790	11.533	16.412	1.204	29.938	
%		2,6	38,5	54,8	4,0	100,0		
	45-64 Total	N	4.696	29.844	35.478	5.004	75.022	
%		6,3	39,8	47,3	6,7	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	1.625	7.013	5.616	.	14.255	
%		11,4	49,2	39,4	.	100,0		

(continuación)

Tabla 14. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

			Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total		
Mujeres	45-64	Secundaria, inferior	N	1.285	6.229	3.202	98	10.814	
			%	11,9	57,6	29,6	0,9	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.456	12.519	12.495	722	27.192	
			%	5,4	46,0	46,0	2,7	100,0	
		Terciaria	N	330	4.083	14.166	4.184	22.762	
			%	1,4	17,9	62,2	18,4	100,0	
	65-74	Total	N	3.415	23.014	14.665	647	41.741	
			%	8,2	55,1	35,1	1,6	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.335	13.666	6.642	163	22.805	
			%	10,2	59,9	29,1	0,7	100,0	
		Secundaria, inferior	N	461	4.972	2.412	129	7.974	
			%	5,8	62,4	30,3	1,6	100,0	
		Secundaria, superior	N	619	3.178	2.932	.	6.730	
			%	9,2	47,2	43,6	.	100,0	
		Terciaria	N	.	1.198	2.680	355	4.232	
			%	.	28,3	63,3	8,4	100,0	
		>=75	Total	N	8.039	44.987	29.317	2.384	84.727
				%	9,5	53,1	34,6	2,8	100,0
			Sin estudios, primaria	N	5.523	33.204	17.079	782	56.589
				%	9,8	58,7	30,2	1,4	100,0
	Secundaria, inferior		N	1.832	8.108	5.581	339	15.859	
			%	11,5	51,1	35,2	2,1	100,0	
	Secundaria, superior		N	427	2.931	3.228	721	7.308	
			%	5,8	40,1	44,2	9,9	100,0	
Terciaria	N		256	744	3.429	542	4.970		
	%		5,2	15,0	69,0	10,9	100,0		
Ambos sexos	Total		N	58.347	363.910	354.724	39.731	816.711	
			%	7,1	44,6	43,4	4,9	100,0	
	.		N	1.415	6.936	8.387	1.605	18.343	
			%	7,7	37,8	45,7	8,7	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	24.520	136.301	91.408	4.526	256.755		
		%	9,5	53,1	35,6	1,8	100,0		
	Secundaria, inferior	N	13.167	71.759	40.911	1.721	127.557		
		%	10,3	56,3	32,1	1,3	100,0		

(continuación)

Tabla 14. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

			Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total
Ambos sexos	Total	Secundaria, superior	N 14.904	109.254	107.218	10.320	241.696
			% 6,2	45,2	44,4	4,3	100,0
		Terciaria	N 4.342	39.659	106.800	21.559	172.360
			% 2,5	23,0	62,0	12,5	100,0
0-14	Total		N 2.400	11.875	12.570	1.896	28.741
			% 8,4	41,3	43,7	6,6	100,0
			N 1.415	6.936	8.387	1.605	18.343
			% 7,7	37,8	45,7	8,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N 985	4.196	3.633	291	9.105
			% 10,8	46,1	39,9	3,2	100,0
		Secundaria, inferior	N .	743	550	.	1.293
			% .	57,5	42,5	.	100,0
15-24	Total		N 1.973	12.521	11.645	1.250	27.388
			% 7,2	45,7	42,5	4,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N .	672	858	228	1.757
			% .	38,2	48,8	13,0	100,0
		Secundaria, inferior	N 477	3.749	3.246	332	7.803
			% 6,1	48,0	41,6	4,3	100,0
		Secundaria, superior	N 939	6.263	5.409	690	13.301
			% 7,1	47,1	40,7	5,2	100,0
		Terciaria	N 557	1.837	2.132	.	4.526
			% 12,3	40,6	47,1	.	100,0
25-44	Total		N 15.950	89.504	75.444	6.226	187.123
			% 8,5	47,8	40,3	3,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N 2.915	9.516	4.042	.	16.473
			% 17,7	57,8	24,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	N 4.653	12.548	3.164	.	20.366
			% 22,8	61,6	15,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N 6.010	45.694	28.703	1.205	81.612
			% 7,4	56,0	35,2	1,5	100,0
		Terciaria	N 2.372	21.746	39.534	5.021	68.673
			% 3,5	31,7	57,6	7,3	100,0
45-64	Total		N 16.530	112.095	129.980	18.902	277.507
			% 6,0	40,4	46,8	6,8	100,0

(continuación)

Tabla 14. Distribución de las familias según su situación económica percibida por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

			Pobre o muy pobre	Apañándose las, por debajo de la media	Apañándose las, por encima de la media	Acomodada	Total	
Ambos sexos 45-64	Sin estudios, primaria	N	5.583	31.439	23.591	1.086	61.698	
		%	9,0	51,0	38,2	1,8	100,0	
	Secundaria, inferior	N	4.575	27.310	13.972	922	46.779	
		%	9,8	58,4	29,9	2,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	5.482	42.127	48.855	5.176	101.639	
		%	5,4	41,4	48,1	5,1	100,0	
	Terciaria	N	891	11.219	43.561	11.719	67.391	
		%	1,3	16,6	64,6	17,4	100,0	
	65-74 Total	N	7.284	56.912	62.372	6.125	132.694	
		%	5,5	42,9	47,0	4,6	100,0	
	65-74	Sin estudios, primaria	N	4.603	31.087	22.839	1.085	59.614
			%	7,7	52,1	38,3	1,8	100,0
Secundaria, inferior		N	1.034	13.141	9.327	129	23.630	
		%	4,4	55,6	39,5	0,5	100,0	
Secundaria, superior		N	1.546	9.659	15.911	1.748	28.864	
		%	5,4	33,5	55,1	6,1	100,0	
Terciaria		N	102	3.025	14.295	3.164	20.587	
		%	0,5	14,7	69,4	15,4	100,0	
>=75 Total		N	14.210	81.003	62.714	5.331	163.258	
		%	8,7	49,6	38,4	3,3	100,0	
>=75		Sin estudios, primaria	N	10.434	59.392	36.445	1.837	108.108
			%	9,7	54,9	33,7	1,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.429	14.268	10.651	339	27.686	
		%	8,8	51,5	38,5	1,2	100,0	
	Secundaria, superior	N	927	5.511	8.340	1.502	16.280	
		%	5,7	33,9	51,2	9,2	100,0	
	Terciaria	N	420	1.831	7.278	1.654	11.184	
		%	3,8	16,4	65,1	14,8	100,0	

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 15. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

			Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Total	CAPV	N	67.101	157.678	196.344	133.730	554.853
		%	12,1	28,4	35,4	24,1	100,0
	Araba	N	7.505	23.245	32.416	25.926	89.091
		%	8,4	26,1	36,4	29,1	100,0
	Gipuzkoa	N	21.616	49.160	67.980	42.946	181.703
		%	11,9	27,1	37,4	23,6	100,0
	Bizkaia	N	37.979	85.274	95.948	64.858	284.059
		%	13,4	30,0	33,8	22,8	100,0
0-14	CAPV	N	4.841	7.246	9.232	7.364	28.683
		%	16,9	25,3	32,2	25,7	100,0
	Araba	N	439	1.482	1.770	1.968	5.658
		%	7,8	26,2	31,3	34,8	100,0
	Gipuzkoa	N	1.598	2.665	3.780	2.683	10.726
		%	14,9	24,8	35,2	25,0	100,0
	Bizkaia	N	2.805	3.099	3.682	2.713	12.299
		%	22,8	25,2	29,9	22,1	100,0
15-24	CAPV	N	3.686	5.731	7.240	4.564	21.221
		%	17,4	27,0	34,1	21,5	100,0
	Araba	N	343	1.265	833	1.508	3.949
		%	8,7	32,0	21,1	38,2	100,0
	Gipuzkoa	N	1.437	1.568	2.754	642	6.402
		%	22,5	24,5	43,0	10,0	100,0
	Bizkaia	N	1.906	2.897	3.653	2.415	10.870
		%	17,5	26,7	33,6	22,2	100,0
25-44	CAPV	N	23.966	36.997	44.877	24.829	130.669
		%	18,3	28,3	34,3	19,0	100,0
	Araba	N	2.780	5.872	8.181	4.739	21.573
		%	12,9	27,2	37,9	22,0	100,0
	Gipuzkoa	N	7.807	11.917	14.995	7.924	42.644
		%	18,3	27,9	35,2	18,6	100,0
	Bizkaia	N	13.378	19.208	21.700	12.166	66.453
		%	20,1	28,9	32,7	18,3	100,0
45-64	CAPV	N	21.619	60.462	68.208	52.956	203.245
		%	10,6	29,7	33,6	26,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 15. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total	
Hombres	45-64	Araba	N	2.478	8.328	11.557	9.273	31.636	
			%	7,8	26,3	36,5	29,3	100,0	
		Gipuzkoa	N	6.718	18.767	23.487	18.069	67.041	
			%	10,0	28,0	35,0	27,0	100,0	
		Bizkaia	N	12.422	33.368	33.165	25.614	104.569	
			%	11,9	31,9	31,7	24,5	100,0	
	65-74	CAPV	N	6.201	22.638	35.753	27.636	92.228	
			%	6,7	24,5	38,8	30,0	100,0	
		Araba	N	727	2.482	5.864	4.932	14.005	
			%	5,2	17,7	41,9	35,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	2.241	7.225	11.723	9.554	30.743	
			%	7,3	23,5	38,1	31,1	100,0	
		Bizkaia	N	3.233	12.931	18.166	13.150	47.479	
			%	6,8	27,2	38,3	27,7	100,0	
		>=75	CAPV	N	6.788	24.604	31.033	16.381	78.806
				%	8,6	31,2	39,4	20,8	100,0
			Araba	N	738	3.815	4.210	3.507	12.270
				%	6,0	31,1	34,3	28,6	100,0
Gipuzkoa	N		1.815	7.018	11.240	4.074	24.147		
	%		7,5	29,1	46,6	16,9	100,0		
Bizkaia	N	4.235	13.771	15.582	8.801	42.389			
	%	10,0	32,5	36,8	20,8	100,0			
Mujeres	Total	CAPV	N	32.996	84.594	88.686	58.568	264.844	
			%	12,5	31,9	33,5	22,1	100,0	
		Araba	N	2.303	8.126	15.195	10.230	35.854	
			%	6,4	22,7	42,4	28,5	100,0	
		Gipuzkoa	N	10.015	29.264	35.312	15.214	89.805	
			%	11,2	32,6	39,3	16,9	100,0	
	Bizkaia	N	20.678	47.204	38.179	33.124	139.185		
		%	14,9	33,9	27,4	23,8	100,0		
	15-24	CAPV	N	1.160	2.468	1.363	850	5.842	
			%	19,9	42,3	23,3	14,5	100,0	
		Araba	N	.	578	395	.	973	
			%	.	59,4	40,6	.	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 15. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Mujeres	15-24	Gipuzkoa	N	299	1.389	575	356	2.619
			%	11,4	53,0	21,9	13,6	100,0
		Bizkaia	N	861	501	394	494	2.250
			%	38,3	22,3	17,5	22,0	100,0
	25-44	CAPV	N	6.992	18.390	19.463	12.796	57.640
			%	12,1	31,9	33,8	22,2	100,0
		Araba	N	528	1.392	3.052	2.010	6.983
			%	7,6	19,9	43,7	28,8	100,0
		Gipuzkoa	N	2.474	4.212	6.737	3.832	17.255
			%	14,3	24,4	39,0	22,2	100,0
		Bizkaia	N	3.990	12.786	9.673	6.953	33.402
			%	11,9	38,3	29,0	20,8	100,0
	45-64	CAPV	N	9.967	17.429	25.636	22.108	75.141
			%	13,3	23,2	34,1	29,4	100,0
		Araba	N	949	1.989	4.926	4.167	12.030
			%	7,9	16,5	40,9	34,6	100,0
		Gipuzkoa	N	2.175	6.923	10.099	4.900	24.096
			%	9,0	28,7	41,9	20,3	100,0
		Bizkaia	N	6.844	8.518	10.612	13.042	39.015
			%	17,5	21,8	27,2	33,4	100,0
	65-74	CAPV	N	4.807	15.624	14.349	6.961	41.741
			%	11,5	37,4	34,4	16,7	100,0
		Araba	N	334	1.434	2.664	1.746	6.178
			%	5,4	23,2	43,1	28,3	100,0
	Gipuzkoa	N	1.677	5.293	5.435	1.956	14.361	
		%	11,7	36,9	37,8	13,6	100,0	
	Bizkaia	N	2.795	8.898	6.250	3.259	21.202	
		%	13,2	42,0	29,5	15,4	100,0	
>=75	CAPV	N	10.071	30.682	27.874	15.854	84.481	
		%	11,9	36,3	33,0	18,8	100,0	
	Araba	N	491	2.734	4.158	2.307	9.690	
		%	5,1	28,2	42,9	23,8	100,0	
	Gipuzkoa	N	3.390	11.447	12.466	4.171	31.474	
		%	10,8	36,4	39,6	13,3	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 15. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total	
Mujeres	>=75	Bizkaia	N	6.189	16.501	11.250	9.377	43.317	
			%	14,3	38,1	26,0	21,6	100,0	
Ambos sexos	Total	CAPV	N	100.097	242.272	285.029	192.298	819.697	
			%	12,2	29,6	34,8	23,5	100,0	
		Araba	N	9.808	31.371	47.611	36.155	124.945	
	%		7,8	25,1	38,1	28,9	100,0		
		Gipuzkoa	N	31.631	78.424	103.292	58.160	271.508	
	%		11,7	28,9	38,0	21,4	100,0		
		Bizkaia	N	58.658	132.478	134.127	97.982	423.244	
	%		13,9	31,3	31,7	23,2	100,0		
		0-14	CAPV	N	4.841	7.246	9.232	7.364	28.683
	%			16,9	25,3	32,2	25,7	100,0	
		Araba	N	439	1.482	1.770	1.968	5.658	
	%		7,8	26,2	31,3	34,8	100,0		
		Gipuzkoa	N	1.598	2.665	3.780	2.683	10.726	
	%		14,9	24,8	35,2	25,0	100,0		
		Bizkaia	N	2.805	3.099	3.682	2.713	12.299	
	%		22,8	25,2	29,9	22,1	100,0		
		15-24	CAPV	N	4.846	8.199	8.603	5.414	27.063
	%			17,9	30,3	31,8	20,0	100,0	
	Araba	N	343	1.844	1.228	1.508	4.922		
%		7,0	37,5	24,9	30,6	100,0			
	Gipuzkoa	N	1.737	2.957	3.329	998	9.021		
%		19,3	32,8	36,9	11,1	100,0			
	Bizkaia	N	2.767	3.398	4.046	2.908	13.120		
%		21,1	25,9	30,8	22,2	100,0			
	25-44	CAPV	N	30.958	55.387	64.340	37.625	188.310	
%			16,4	29,4	34,2	20,0	100,0		
	Araba	N	3.309	7.264	11.234	6.749	28.556		
%		11,6	25,4	39,3	23,6	100,0			
	Gipuzkoa	N	10.281	16.129	21.732	11.756	59.899		
%		17,2	26,9	36,3	19,6	100,0			
	Bizkaia	N	17.368	31.994	31.373	19.119	99.855		
%		17,4	32,0	31,4	19,1	100,0			
	45-64	CAPV	N	31.586	77.892	93.845	75.064	278.386	

(continuación)

Tabla 15. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Ambos sexos	45-64	CAPV	%	11,3	28,0	33,7	27,0	100,0
		Araba	N	3.427	10.316	16.483	13.440	43.665
			%	7,8	23,6	37,7	30,8	100,0
		Gipuzkoa	N	8.893	25.690	33.585	22.969	91.137
			%	9,8	28,2	36,9	25,2	100,0
		Bizkaia	N	19.266	41.886	43.777	38.655	143.583
		%	13,4	29,2	30,5	26,9	100,0	
	65-74	CAPV	N	11.008	38.262	50.103	34.596	133.969
			%	8,2	28,6	37,4	25,8	100,0
		Araba	N	1.062	3.916	8.528	6.678	20.183
			%	5,3	19,4	42,3	33,1	100,0
		Gipuzkoa	N	3.918	12.518	17.158	11.510	45.104
		%	8,7	27,8	38,0	25,5	100,0	
>=75	Bizkaia	N	6.027	21.828	24.417	16.408	68.681	
		%	8,8	31,8	35,6	23,9	100,0	
	CAPV	N	16.858	55.286	58.907	32.236	163.286	
		%	10,3	33,9	36,1	19,7	100,0	
	Araba	N	1.229	6.549	8.369	5.814	21.960	
		%	5,6	29,8	38,1	26,5	100,0	
	Gipuzkoa	N	5.205	18.465	23.706	8.245	55.621	
		%	9,4	33,2	42,6	14,8	100,0	
	Bizkaia	N	10.424	30.272	26.832	18.177	85.706	
		%	12,2	35,3	31,3	21,2	100,0	

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 16. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Hombres	Total	Total	N	67.101	157.678	196.344	133.730	554.853
			%	12,1	28,4	35,4	24,1	100,0
	I	Total	N	2.722	10.312	34.400	43.433	90.866
			%	3,0	11,3	37,9	47,8	100,0
	II	Total	N	5.191	12.969	22.633	19.449	60.242
			%	8,6	21,5	37,6	32,3	100,0
	III	Total	N	16.871	36.585	47.875	31.324	132.655
			%	12,7	27,6	36,1	23,6	100,0
	IV	Total	N	36.123	87.797	85.529	37.130	246.578
			%	14,6	35,6	34,7	15,1	100,0
	V	Total	N	6.194	10.016	5.908	2.394	24.511
			%	25,3	40,9	24,1	9,8	100,0
	0-14	Total	N	4.841	7.246	9.232	7.364	28.683
			%	16,9	25,3	32,2	25,7	100,0
	I	Total	N	255	475	1.608	3.519	5.856
			%	4,4	8,1	27,5	60,1	100,0
	II	Total	N	349	2.246	1.320	2.179	6.095
			%	5,7	36,9	21,7	35,8	100,0
	III	Total	N	1.293	2.977	4.871	1.331	10.472
			%	12,3	28,4	46,5	12,7	100,0
	IV	Total	N	1.972	1.296	1.115	334	4.717
			%	41,8	27,5	23,6	7,1	100,0
	V	Total	N	973	252	319	.	1.544
			%	63,0	16,3	20,6	.	100,0
	15-24	Total	N	3.686	5.731	7.240	4.564	21.221
			%	17,4	27,0	34,1	21,5	100,0
	I	Total	N	.	560	1.680	1.437	3.677
			%	.	15,2	45,7	39,1	100,0
	II	Total	N	177	992	2.800	1.747	5.715
			%	3,1	17,4	49,0	30,6	100,0
	III	Total	N	1.805	2.142	1.706	1.141	6.794
			%	26,6	31,5	25,1	16,8	100,0
	IV	Total	N	1.263	1.909	801	122	4.095
			%	30,8	46,6	19,6	3,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 16. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Hombres	15-24 V	N		441	128	253	118	941
		%		46,9	13,6	26,9	12,6	100,0
	25-44 Total	N		23.966	36.997	44.877	24.829	130.669
		%		18,3	28,3	34,3	19,0	100,0
	I	N		747	4.010	12.365	10.240	27.363
		%		2,7	14,7	45,2	37,4	100,0
	II	N		1.932	3.710	5.647	5.004	16.292
		%		11,9	22,8	34,7	30,7	100,0
	III	N		5.418	7.707	9.660	3.910	26.695
		%		20,3	28,9	36,2	14,6	100,0
	IV	N		13.584	19.018	15.970	5.242	53.814
		%		25,2	35,3	29,7	9,7	100,0
	V	N		2.286	2.552	1.234	432	6.504
		%		35,1	39,2	19,0	6,6	100,0
	45-64 Total	N		21.619	60.462	68.208	52.956	203.245
		%		10,6	29,7	33,6	26,1	100,0
	I	N		1.155	4.453	12.639	16.185	34.432
		%		3,4	12,9	36,7	47,0	100,0
	II	N		1.763	4.213	7.040	5.683	18.699
		%		9,4	22,5	37,6	30,4	100,0
	III	N		5.501	12.850	15.796	14.356	48.503
		%		11,3	26,5	32,6	29,6	100,0
	IV	N		12.160	35.147	31.318	15.877	94.503
		%		12,9	37,2	33,1	16,8	100,0
	V	N		1.039	3.798	1.415	855	7.107
		%		14,6	53,4	19,9	12,0	100,0
	65-74 Total	N		6.201	22.638	35.753	27.636	92.228
		%		6,7	24,5	38,8	30,0	100,0
I	N		401	814	4.126	9.412	14.752	
	%		2,7	5,5	28,0	63,8	100,0	
II	N		803	735	3.876	3.056	8.470	
	%		9,5	8,7	45,8	36,1	100,0	
III	N		1.768	5.592	8.020	6.259	21.638	
	%		8,2	25,8	37,1	28,9	100,0	

(continuación)

Tabla 16. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total	
Hombres	65-74	IV	N	2.969	14.278	18.520	8.525	44.292	
			%	6,7	32,2	41,8	19,2	100,0	
		V	N	261	1.219	1.212	384	3.076	
			%	8,5	39,6	39,4	12,5	100,0	
		>=75	Total N	6.788	24.604	31.033	16.381	78.806	
			%	8,6	31,2	39,4	20,8	100,0	
		I	N	164	.	1.982	2.640	4.786	
			%	3,4	.	41,4	55,2	100,0	
		II	N	167	1.073	1.951	1.779	4.970	
			%	3,4	21,6	39,2	35,8	100,0	
		III	N	1.086	5.317	7.822	4.328	18.552	
			%	5,9	28,7	42,2	23,3	100,0	
		IV	N	4.176	16.148	17.804	7.030	45.158	
			%	9,2	35,8	39,4	15,6	100,0	
		V	N	1.194	2.066	1.475	604	5.340	
			%	22,4	38,7	27,6	11,3	100,0	
	Mujeres	Total	Total	N	32.996	84.594	88.686	58.568	264.844
				%	12,5	31,9	33,5	22,1	100,0
		I	N	2.133	5.551	14.144	18.485	40.313	
			%	5,3	13,8	35,1	45,9	100,0	
		II	N	2.331	9.442	14.621	10.391	36.785	
			%	6,3	25,7	39,7	28,2	100,0	
		III	N	6.709	25.050	30.176	16.510	78.444	
			%	8,6	31,9	38,5	21,0	100,0	
		IV	N	13.754	28.979	21.314	10.097	74.144	
			%	18,6	39,1	28,7	13,6	100,0	
		V	N	8.070	15.572	8.431	3.085	35.158	
			%	23,0	44,3	24,0	8,8	100,0	
		15-24	Total	N	1.160	2.468	1.363	850	5.842
				%	19,9	42,3	23,3	14,5	100,0
		I	N	475	441	430	239	1.586	
			%	30,0	27,8	27,1	15,1	100,0	
		II	N	.	519	462	431	1.412	
			%	.	36,7	32,7	30,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 16. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total	
Mujeres	15-24	III	N	312	860	326	179	1.677	
			%	18,6	51,3	19,4	10,7	100,0	
		IV	N	373	648	145	.	1.166	
			%	32,0	55,6	12,4	.	100,0	
		25-44	Total	N	6.992	18.390	19.463	12.796	57.640
				%	12,1	31,9	33,8	22,2	100,0
			I	N	782	2.853	7.326	5.598	16.559
				%	4,7	17,2	44,2	33,8	100,0
			II	N	813	3.178	4.976	3.661	12.628
				%	6,4	25,2	39,4	29,0	100,0
			III	N	1.650	6.520	6.191	2.793	17.154
				%	9,6	38,0	36,1	16,3	100,0
			IV	N	2.466	4.819	649	540	8.473
				%	29,1	56,9	7,7	6,4	100,0
			V	N	1.280	1.021	321	204	2.826
				%	45,3	36,1	11,4	7,2	100,0
		45-64	Total	N	9.967	17.429	25.636	22.108	75.141
				%	13,3	23,2	34,1	29,4	100,0
			I	N	.	936	4.061	8.838	13.835
				%	.	6,8	29,4	63,9	100,0
			II	N	832	1.858	5.158	3.771	11.619
				%	7,2	16,0	44,4	32,5	100,0
			III	N	3.006	7.643	11.027	6.591	28.267
				%	10,6	27,0	39,0	23,3	100,0
		IV	N	3.192	4.597	3.426	2.164	13.378	
			%	23,9	34,4	25,6	16,2	100,0	
		V	N	2.937	2.396	1.964	745	8.042	
			%	36,5	29,8	24,4	9,3	100,0	
	65-74	Total	N	4.807	15.624	14.349	6.961	41.741	
			%	11,5	37,4	34,4	16,7	100,0	
		I	N	524	411	791	1.678	3.404	
			%	15,4	12,1	23,2	49,3	100,0	
		II	N	174	1.522	1.527	485	3.708	
			%	4,7	41,1	41,2	13,1	100,0	

(continuación)

Tabla 16. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total		
Mujeres	65-74	III	N	101	3.700	4.564	2.409	10.773		
			%	0,9	34,3	42,4	22,4	100,0		
		IV	N	3.176	5.484	5.662	1.570	15.892		
			%	20,0	34,5	35,6	9,9	100,0		
		V	N	831	4.507	1.806	819	7.963		
			%	10,4	56,6	22,7	10,3	100,0		
	>=75	Total	N	10.071	30.682	27.874	15.854	84.481		
			%	11,9	36,3	33,0	18,8	100,0		
	Ambos sexos	Total	I	N	351	910	1.536	2.132	4.928	
				%	7,1	18,5	31,2	43,3	100,0	
			II	N	511	2.366	2.497	2.043	7.418	
				%	6,9	31,9	33,7	27,5	100,0	
			III	N	1.639	6.328	8.068	4.538	20.573	
				%	8,0	30,8	39,2	22,1	100,0	
			IV	N	4.547	13.432	11.432	5.824	35.235	
				%	12,9	38,1	32,4	16,5	100,0	
			V	N	3.022	7.647	4.340	1.318	16.327	
				%	18,5	46,8	26,6	8,1	100,0	
Ambos sexos			Total	Total	N	100.097	242.272	285.029	192.298	819.697
					%	12,2	29,6	34,8	23,5	100,0
	I	N		4.854	15.863	48.544	61.918	131.179		
		%		3,7	12,1	37,0	47,2	100,0		
	II	N		7.522	22.411	37.253	29.840	97.027		
		%		7,8	23,1	38,4	30,8	100,0		
	III	N		23.580	61.634	78.051	47.834	211.099		
		%		11,2	29,2	37,0	22,7	100,0		
	IV	N		49.877	116.776	106.843	47.227	320.723		
		%		15,6	36,4	33,3	14,7	100,0		
	V	N		14.263	25.588	14.339	5.479	59.669		
		%		23,9	42,9	24,0	9,2	100,0		
0-14	Total	N	4.841	7.246	9.232	7.364	28.683			
		%	16,9	25,3	32,2	25,7	100,0			
	I	N	255	475	1.608	3.519	5.856			
		%	4,4	8,1	27,5	60,1	100,0			

(continuación)

Tabla 16. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

			Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Ambos sexos 0-14	II	N	349	2.246	1.320	2.179	6.095
		%	5,7	36,9	21,7	35,8	100,0
	III	N	1.293	2.977	4.871	1.331	10.472
		%	12,3	28,4	46,5	12,7	100,0
	IV	N	1.972	1.296	1.115	334	4.717
		%	41,8	27,5	23,6	7,1	100,0
	V	N	973	252	319	.	1.544
		%	63,0	16,3	20,6	.	100,0
	15-24 Total	N	4.846	8.199	8.603	5.414	27.063
		%	17,9	30,3	31,8	20,0	100,0
	I	N	475	1.001	2.110	1.676	5.262
		%	9,0	19,0	40,1	31,8	100,0
II	N	177	1.511	3.262	2.178	7.127	
	%	2,5	21,2	45,8	30,6	100,0	
III	N	2.117	3.002	2.031	1.320	8.471	
	%	25,0	35,4	24,0	15,6	100,0	
IV	N	1.636	2.557	947	122	5.261	
	%	31,1	48,6	18,0	2,3	100,0	
V	N	441	128	253	118	941	
	%	46,9	13,6	26,9	12,6	100,0	
25-44 Total	N	30.958	55.387	64.340	37.625	188.310	
	%	16,4	29,4	34,2	20,0	100,0	
I	N	1.529	6.863	19.691	15.839	43.922	
	%	3,5	15,6	44,8	36,1	100,0	
II	N	2.745	6.887	10.623	8.665	28.920	
	%	9,5	23,8	36,7	30,0	100,0	
III	N	7.068	14.227	15.851	6.703	43.849	
	%	16,1	32,4	36,1	15,3	100,0	
IV	N	16.050	23.836	16.619	5.782	62.287	
	%	25,8	38,3	26,7	9,3	100,0	
V	N	3.566	3.574	1.555	636	9.330	
	%	38,2	38,3	16,7	6,8	100,0	
45-64 Total	N	31.586	77.892	93.845	75.064	278.386	
	%	11,3	28,0	33,7	27,0	100,0	

(continuación)

Tabla 16. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total	
Ambos sexos	45-64	I	N	1.155	5.390	16.701	25.022	48.268	
			%	2,4	11,2	34,6	51,8	100,0	
		II	N	2.596	6.071	12.198	9.454	30.319	
			%	8,6	20,0	40,2	31,2	100,0	
		III	N	8.507	20.493	26.823	20.947	76.770	
			%	11,1	26,7	34,9	27,3	100,0	
		IV	N	15.351	39.744	34.744	18.041	107.881	
			%	14,2	36,8	32,2	16,7	100,0	
		V	N	3.976	6.194	3.379	1.600	15.149	
			%	26,2	40,9	22,3	10,6	100,0	
		Total	N	11.008	38.262	50.103	34.596	133.969	
			%	8,2	28,6	37,4	25,8	100,0	
			I	N	925	1.225	4.917	11.090	18.157
				%	5,1	6,7	27,1	61,1	100,0
			II	N	977	2.257	5.402	3.542	12.178
				%	8,0	18,5	44,4	29,1	100,0
			III	N	1.869	9.291	12.584	8.667	32.411
				%	5,8	28,7	38,8	26,7	100,0
		IV	N	6.145	19.762	24.182	10.095	60.185	
			%	10,2	32,8	40,2	16,8	100,0	
		V	N	1.092	5.727	3.018	1.203	11.039	
			%	9,9	51,9	27,3	10,9	100,0	
		Total	N	16.858	55.286	58.907	32.236	163.286	
			%	10,3	33,9	36,1	19,7	100,0	
		I	N	515	910	3.518	4.772	9.714	
			%	5,3	9,4	36,2	49,1	100,0	
		II	N	679	3.439	4.448	3.823	12.388	
			%	5,5	27,8	35,9	30,9	100,0	
		III	N	2.725	11.644	15.890	8.866	39.125	
			%	7,0	29,8	40,6	22,7	100,0	
	IV	N	8.724	29.580	29.235	12.853	80.393		
		%	10,9	36,8	36,4	16,0	100,0		
	V	N	4.216	9.713	5.815	1.922	21.666		
		%	19,5	44,8	26,8	8,9	100,0		

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 17. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

				Con	Con	Con	Con	Total
				dificultad	cierta	cierta	facilidad	
Hombres	Total	Total	N	67.101	157.678	196.344	133.730	554.853
			%	12,1	28,4	35,4	24,1	100,0
		.	N	2.745	4.277	6.057	5.426	18.506
			%	14,8	23,1	32,7	29,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	20.647	53.034	61.220	26.272	161.173
			%	12,8	32,9	38,0	16,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	17.068	32.848	25.034	13.798	88.748
			%	19,2	37,0	28,2	15,5	100,0
		Secundaria, superior	N	21.092	52.932	65.359	38.734	178.117
			%	11,8	29,7	36,7	21,7	100,0
		Terciaria	N	5.549	14.587	38.674	49.499	108.309
			%	5,1	13,5	35,7	45,7	100,0
	0-14	Total	N	4.841	7.246	9.232	7.364	28.683
			%	16,9	25,3	32,2	25,7	100,0
		.	N	2.745	4.277	6.057	5.426	18.506
			%	14,8	23,1	32,7	29,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.096	2.489	2.362	1.937	8.885
			%	23,6	28,0	26,6	21,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	479	813	.	1.293
			%	.	37,1	62,9	.	100,0
	15-24	Total	N	3.686	5.731	7.240	4.564	21.221
			%	17,4	27,0	34,1	21,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	415	522	473	346	1.757
			%	23,6	29,7	26,9	19,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.576	1.732	1.609	2.124	7.041
			%	22,4	24,6	22,9	30,2	100,0
		Secundaria, superior	N	1.392	2.970	4.369	1.959	10.690
			%	13,0	27,8	40,9	18,3	100,0
		Terciaria	N	303	507	789	135	1.734
			%	17,5	29,2	45,5	7,8	100,0
	25-44	Total	N	23.966	36.997	44.877	24.829	130.669
			%	18,3	28,3	34,3	19,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.457	4.130	5.188	903	13.679
			%	25,3	30,2	37,9	6,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 17. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Hombres	25-44	Secundaria, inferior	N	6.003	6.754	3.215	879	16.850
			%	35,6	40,1	19,1	5,2	100,0
		Secundaria, superior	N	11.980	19.674	20.262	9.102	61.017
			%	19,6	32,2	33,2	14,9	100,0
		Terciaria	N	2.527	6.440	16.212	13.945	39.124
			%	6,5	16,5	41,4	35,6	100,0
	45-64	Total	N	21.619	60.462	68.208	52.956	203.245
			%	10,6	29,7	33,6	26,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.578	16.414	16.560	8.561	48.112
			%	13,7	34,1	34,4	17,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.086	13.818	9.792	5.270	35.965
			%	19,7	38,4	27,2	14,7	100,0
		Secundaria, superior	N	6.281	23.748	27.052	17.712	74.793
			%	8,4	31,8	36,2	23,7	100,0
		Terciaria	N	1.674	6.482	14.805	21.414	44.375
			%	3,8	14,6	33,4	48,3	100,0
	65-74	Total	N	6.201	22.638	35.753	27.636	92.228
			%	6,7	24,5	38,8	30,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.026	12.114	15.244	6.838	37.222
			%	8,1	32,5	41,0	18,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.564	5.026	6.141	2.926	15.657
			%	10,0	32,1	39,2	18,7	100,0
		Secundaria, superior	N	899	4.757	9.621	7.376	22.653
			%	4,0	21,0	42,5	32,6	100,0
		Terciaria	N	712	741	4.748	10.495	16.696
			%	4,3	4,4	28,4	62,9	100,0
	>=75	Total	N	6.788	24.604	31.033	16.381	78.806
			%	8,6	31,2	39,4	20,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.074	17.364	21.393	7.687	51.518
			%	9,8	33,7	41,5	14,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	840	5.040	3.464	2.599	11.943
			%	7,0	42,2	29,0	21,8	100,0
		Secundaria, superior	N	540	1.782	4.056	2.585	8.964
			%	6,0	19,9	45,3	28,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Ingresos y situación económica

72

Tabla 17. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Hombres	>=75	Terciaria	N	333	418	2.120	3.510	6.381
			%	5,2	6,5	33,2	55,0	100,0
Mujeres	Total	Total	N	32.996	84.594	88.686	58.568	264.844
			%	12,5	31,9	33,5	22,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	15.221	36.343	31.077	14.023	96.665
			%	15,7	37,6	32,1	14,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.706	15.735	10.041	6.244	38.726
			%	17,3	40,6	25,9	16,1	100,0
		Secundaria, superior	N	8.047	21.132	23.250	12.233	64.662
			%	12,4	32,7	36,0	18,9	100,0
		Terciaria	N	3.022	11.383	24.317	26.069	64.791
			%	4,7	17,6	37,5	40,2	100,0
	15-24	Total	N	1.160	2.468	1.363	850	5.842
			%	19,9	42,3	23,3	14,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	123	441	.	.	564
			%	21,7	78,3	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	386	1.254	606	239	2.485
			%	15,5	50,5	24,4	9,6	100,0
		Terciaria	N	652	773	757	610	2.793
			%	23,3	27,7	27,1	21,9	100,0
	25-44	Total	N	6.992	18.390	19.463	12.796	57.640
			%	12,1	31,9	33,8	22,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.455	775	375	367	2.972
			%	49,0	26,1	12,6	12,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.150	1.722	643	.	3.515
			%	32,7	49,0	18,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N	3.217	9.412	6.325	2.286	21.239
			%	15,1	44,3	29,8	10,8	100,0
		Terciaria	N	1.169	6.482	12.121	10.143	29.915
			%	3,9	21,7	40,5	33,9	100,0
	45-64	Total	N	9.967	17.429	25.636	22.108	75.141
			%	13,3	23,2	34,1	29,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.200	3.864	4.539	2.652	14.255
			%	22,4	27,1	31,8	18,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Ingresos y situación económica

Tabla 17. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Mujeres	45-64	Secundaria, inferior	N	2.272	4.175	2.664	1.703	10.814
			%	21,0	38,6	24,6	15,8	100,0
		Secundaria, superior	N	3.885	6.801	10.093	6.530	27.310
			%	14,2	24,9	37,0	23,9	100,0
		Terciaria	N	611	2.589	8.340	11.223	22.762
			%	2,7	11,4	36,6	49,3	100,0
	65-74	Total	N	4.807	15.624	14.349	6.961	41.741
			%	11,5	37,4	34,4	16,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.189	9.933	6.828	2.856	22.805
			%	14,0	43,6	29,9	12,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	953	3.026	2.580	1.415	7.974
			%	11,9	38,0	32,4	17,8	100,0
		Secundaria, superior	N	559	1.839	3.379	953	6.730
			%	8,3	27,3	50,2	14,2	100,0
		Terciaria	N	107	826	1.563	1.737	4.232
			%	2,5	19,5	36,9	41,0	100,0
	>=75	Total	N	10.071	30.682	27.874	15.854	84.481
			%	11,9	36,3	33,0	18,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.378	21.772	19.335	8.148	56.633
			%	13,0	38,4	34,1	14,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.209	6.371	4.155	3.126	15.859
			%	13,9	40,2	26,2	19,7	100,0
		Secundaria, superior	N	.	1.826	2.848	2.225	6.899
			%	.	26,5	41,3	32,3	100,0
		Terciaria	N	484	713	1.536	2.356	5.089
			%	9,5	14,0	30,2	46,3	100,0
Ambos sexos	Total	Total	N	100.097	242.272	285.029	192.298	819.697
			%	12,2	29,6	34,8	23,5	100,0
		.	N	2.745	4.277	6.057	5.426	18.506
			%	14,8	23,1	32,7	29,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	35.868	89.377	92.297	40.295	257.838
			%	13,9	34,7	35,8	15,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	23.774	48.584	35.074	20.042	127.474
			%	18,6	38,1	27,5	15,7	100,0

(continuación)

Tabla 17. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

			Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Ambos sexos Total	Secundaria, superior	N	29.139	74.064	88.610	50.966	242.779
		%	12,0	30,5	36,5	21,0	100,0
	Terciaria	N	8.571	25.970	62.991	75.568	173.100
		%	5,0	15,0	36,4	43,7	100,0
0-14 Total	Total	N	4.841	7.246	9.232	7.364	28.683
		%	16,9	25,3	32,2	25,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.745	4.277	6.057	5.426	18.506
		%	14,8	23,1	32,7	29,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	479	813	.	1.293
		%	.	37,1	62,9	.	100,0
15-24 Total	Total	N	4.846	8.199	8.603	5.414	27.063
		%	17,9	30,3	31,8	20,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	415	522	473	346	1.757
		%	23,6	29,7	26,9	19,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.698	2.173	1.609	2.124	7.605
		%	22,3	28,6	21,2	27,9	100,0
	Secundaria, superior	N	1.777	4.224	4.975	2.198	13.174
		%	13,5	32,1	37,8	16,7	100,0
	Terciaria	N	955	1.280	1.546	746	4.526
		%	21,1	28,3	34,2	16,5	100,0
25-44 Total	Total	N	30.958	55.387	64.340	37.625	188.310
		%	16,4	29,4	34,2	20,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.912	4.904	5.563	1.271	16.650
		%	29,5	29,5	33,4	7,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	7.153	8.475	3.858	879	20.366
		%	35,1	41,6	18,9	4,3	100,0
	Secundaria, superior	N	15.197	29.086	26.586	11.387	82.256
		%	18,5	35,4	32,3	13,8	100,0
	Terciaria	N	3.696	12.922	28.333	24.087	69.038
		%	5,4	18,7	41,0	34,9	100,0
	Total	N	31.586	77.892	93.845	75.064	278.386
		%	11,3	28,0	33,7	27,0	100,0

(continuación)

Tabla 17. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

			Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Ambos sexos 45-64	Sin estudios, primaria	N	9.777	20.279	21.099	11.212	62.367
		%	15,7	32,5	33,8	18,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	9.357	17.993	12.455	6.973	46.779
		%	20,0	38,5	26,6	14,9	100,0
	Secundaria, superior	N	10.167	30.550	37.145	24.242	102.104
		%	10,0	29,9	36,4	23,7	100,0
Terciaria	N	2.285	9.070	23.145	32.637	67.137	
	%	3,4	13,5	34,5	48,6	100,0	
65-74 Total	N	11.008	38.262	50.103	34.596	133.969	
	%	8,2	28,6	37,4	25,8	100,0	
Sin estudios, primaria	N	6.215	22.047	22.071	9.694	60.027	
	%	10,4	36,7	36,8	16,1	100,0	
Secundaria, inferior	N	2.516	8.052	8.721	4.341	23.630	
	%	10,6	34,1	36,9	18,4	100,0	
Secundaria, superior	N	1.458	6.596	13.000	8.329	29.383	
	%	5,0	22,4	44,2	28,3	100,0	
Terciaria	N	819	1.567	6.311	12.232	20.929	
	%	3,9	7,5	30,2	58,4	100,0	
>=75 Total	N	16.858	55.286	58.907	32.236	163.286	
	%	10,3	33,9	36,1	19,7	100,0	
Sin estudios, primaria	N	12.452	39.136	40.728	15.835	108.152	
	%	11,5	36,2	37,7	14,6	100,0	
Secundaria, inferior	N	3.049	11.411	7.618	5.725	27.802	
	%	11,0	41,0	27,4	20,6	100,0	
Secundaria, superior	N	540	3.608	6.904	4.810	15.863	
	%	3,4	22,7	43,5	30,3	100,0	
Terciaria	N	817	1.131	3.656	5.866	11.470	
	%	7,1	9,9	31,9	51,1	100,0	

Tabla 18. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

Hombres	Total	CAPV	N	Siempre	Casi	En	Casi nunca	Nunca	Total
				que se realizan	siempre que se realizan	algunas ocasiones			
			N	252.689	149.101	234.384	106.789	325.617	1.068.580
			%	23,6	14,0	21,9	10,0	30,5	100,0
		Araba	N	42.564	20.875	29.315	13.265	48.878	154.896
			%	27,5	13,5	18,9	8,6	31,6	100,0
		Gipuzkoa	N	87.800	49.349	72.344	27.002	110.327	346.823
			%	25,3	14,2	20,9	7,8	31,8	100,0
		Bizkaia	N	122.325	78.878	132.725	66.522	166.412	566.861
			%	21,6	13,9	23,4	11,7	29,4	100,0
	0-14	CAPV	N	4.088	2.572	20.529	11.581	114.684	153.456
			%	2,7	1,7	13,4	7,5	74,7	100,0
		Araba	N	789	233	2.137	1.661	17.355	22.176
			%	3,6	1,0	9,6	7,5	78,3	100,0
		Gipuzkoa	N	976	1.825	7.663	2.118	39.442	52.024
			%	1,9	3,5	14,7	4,1	75,8	100,0
		Bizkaia	N	2.323	514	10.729	7.802	57.888	79.256
			%	2,9	0,6	13,5	9,8	73,0	100,0
	15-24	CAPV	N	9.247	6.788	29.523	15.878	33.023	94.458
			%	9,8	7,2	31,3	16,8	35,0	100,0
		Araba	N	1.335	502	4.432	2.113	5.865	14.247
			%	9,4	3,5	31,1	14,8	41,2	100,0
		Gipuzkoa	N	3.060	2.562	9.859	5.434	10.231	31.146
			%	9,8	8,2	31,7	17,4	32,8	100,0
		Bizkaia	N	4.852	3.724	15.232	8.330	16.928	49.066
			%	9,9	7,6	31,0	17,0	34,5	100,0
	25-44	CAPV	N	103.743	53.004	75.475	37.504	66.583	336.309
			%	30,8	15,8	22,4	11,2	19,8	100,0
		Araba	N	17.898	9.073	10.881	3.718	9.121	50.690
			%	35,3	17,9	21,5	7,3	18,0	100,0
		Gipuzkoa	N	40.447	15.851	20.530	8.755	21.785	107.367
			%	37,7	14,8	19,1	8,2	20,3	100,0
		Bizkaia	N	45.397	28.080	44.065	25.032	35.677	178.252
			%	25,5	15,8	24,7	14,0	20,0	100,0
	45-64	CAPV	N	90.024	61.824	76.126	24.897	49.785	302.655
			%	29,7	20,4	25,2	8,2	16,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 18. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

			Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total		
Hombres 45-64	Araba	N	15.179	8.164	8.884	3.199	7.783	43.210		
		%	35,1	18,9	20,6	7,4	18,0	100,0		
	Gipuzkoa	N	30.531	20.317	23.027	5.952	17.869	97.697		
		%	31,3	20,8	23,6	6,1	18,3	100,0		
	Bizkaia	N	44.314	33.342	44.214	15.746	24.133	161.749		
		%	27,4	20,6	27,3	9,7	14,9	100,0		
	65-74	CAPV	N	26.008	14.711	18.325	9.966	26.723	95.733	
			%	27,2	15,4	19,1	10,4	27,9	100,0	
		Araba	N	3.913	1.882	1.857	1.199	4.518	13.368	
			%	29,3	14,1	13,9	9,0	33,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	7.519	5.242	6.737	2.944	9.716	32.159	
			%	23,4	16,3	20,9	9,2	30,2	100,0	
Bizkaia		N	14.576	7.586	9.731	5.824	12.490	50.206		
		%	29,0	15,1	19,4	11,6	24,9	100,0		
>=75		CAPV	N	19.578	10.202	14.406	6.963	34.819	85.968	
			%	22,8	11,9	16,8	8,1	40,5	100,0	
		Araba	N	3.450	1.020	1.124	1.375	4.237	11.206	
			%	30,8	9,1	10,0	12,3	37,8	100,0	
	Gipuzkoa	N	5.266	3.552	4.528	1.799	11.285	26.430		
		%	19,9	13,4	17,1	6,8	42,7	100,0		
	Bizkaia	N	10.862	5.630	8.754	3.789	19.297	48.332		
		%	22,5	11,6	18,1	7,8	39,9	100,0		
	Mujeres	Total	CAPV	N	647.033	117.802	127.440	44.693	184.525	1.121.492
			%	57,7	10,5	11,4	4,0	16,5	100,0	
		Araba	N	92.930	18.186	15.230	5.898	24.777	157.021	
			%	59,2	11,6	9,7	3,8	15,8	100,0	
Gipuzkoa		N	221.153	32.223	34.824	12.159	60.567	360.926		
		%	61,3	8,9	9,6	3,4	16,8	100,0		
Bizkaia		N	332.950	67.392	77.386	26.637	99.181	603.545		
		%	55,2	11,2	12,8	4,4	16,4	100,0		
0-14		CAPV	N	3.243	3.985	21.806	11.920	104.656	145.610	
			%	2,2	2,7	15,0	8,2	71,9	100,0	
		Araba	N	687	428	2.895	1.954	14.957	20.921	
			%	3,3	2,0	13,8	9,3	71,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 18. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Mujeres	0-14	Gipuzkoa	N	1.301	1.317	9.124	4.260	33.680	49.682
			%	2,6	2,7	18,4	8,6	67,8	100,0
		Bizkaia	N	1.256	2.240	9.787	5.706	56.019	75.007
			%	1,7	3,0	13,0	7,6	74,7	100,0
	15-24	CAPV	N	12.608	13.052	32.912	12.459	18.468	89.499
			%	14,1	14,6	36,8	13,9	20,6	100,0
		Araba	N	1.919	1.978	4.064	2.104	2.931	12.995
			%	14,8	15,2	31,3	16,2	22,6	100,0
		Gipuzkoa	N	4.172	5.387	10.229	3.225	6.356	29.369
			%	14,2	18,3	34,8	11,0	21,6	100,0
		Bizkaia	N	6.517	5.688	18.619	7.130	9.181	47.134
			%	13,8	12,1	39,5	15,1	19,5	100,0
	25-44	CAPV	N	195.499	46.550	44.078	10.958	23.740	320.826
			%	60,9	14,5	13,7	3,4	7,4	100,0
		Araba	N	28.967	9.791	5.971	1.298	1.721	47.748
			%	60,7	20,5	12,5	2,7	3,6	100,0
		Gipuzkoa	N	70.572	11.223	9.166	2.373	7.335	100.669
			%	70,1	11,1	9,1	2,4	7,3	100,0
		Bizkaia	N	95.960	25.536	28.941	7.287	14.685	172.408
			%	55,7	14,8	16,8	4,2	8,5	100,0
	45-64	CAPV	N	260.702	32.500	14.054	1.215	5.299	313.769
			%	83,1	10,4	4,5	0,4	1,7	100,0
		Araba	N	37.496	4.317	1.133	83	668	43.698
			%	85,8	9,9	2,6	0,2	1,5	100,0
		Gipuzkoa	N	88.185	7.383	2.893	194	1.446	100.102
			%	88,1	7,4	2,9	0,2	1,4	100,0
		Bizkaia	N	135.021	20.799	10.027	937	3.184	169.969
			%	79,4	12,2	5,9	0,6	1,9	100,0
	65-74	CAPV	N	96.756	7.324	2.503	842	2.500	109.925
			%	88,0	6,7	2,3	0,8	2,3	100,0
		Araba	N	13.248	488	216	95	411	14.458
			%	91,6	3,4	1,5	0,7	2,8	100,0
		Gipuzkoa	N	32.314	2.100	695	176	696	35.981
			%	89,8	5,8	1,9	0,5	1,9	100,0

(continuación)

Tabla 18. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	51.194	4.736	1.592	570	1.392	59.485
			%	86,1	8,0	2,7	1,0	2,3	100,0
Ambos	>=75	CAPV	N	78.224	14.390	12.088	7.300	29.862	141.864
			%	55,1	10,1	8,5	5,1	21,0	100,0
		Araba	N	10.612	1.183	953	364	4.088	17.200
			%	61,7	6,9	5,5	2,1	23,8	100,0
		Gipuzkoa	N	24.609	4.813	2.717	1.930	11.055	45.124
			%	54,5	10,7	6,0	4,3	24,5	100,0
	Bizkaia	N	43.003	8.393	8.419	5.006	14.720	79.541	
		%	54,1	10,6	10,6	6,3	18,5	100,0	
	0-14	Total CAPV	N	899.721	266.903	361.823	151.482	510.142	2.190.072
			%	41,1	12,2	16,5	6,9	23,3	100,0
		Araba	N	135.494	39.061	44.545	19.163	73.655	311.917
			%	43,4	12,5	14,3	6,1	23,6	100,0
Gipuzkoa		N	308.953	81.572	107.168	39.161	170.895	707.749	
		%	43,7	11,5	15,1	5,5	24,1	100,0	
Bizkaia	N	455.275	146.270	210.110	93.158	265.593	1.170.406		
	%	38,9	12,5	18,0	8,0	22,7	100,0		
15-24	CAPV	N	7.332	6.558	42.335	23.501	219.340	299.066	
		%	2,5	2,2	14,2	7,9	73,3	100,0	
	Araba	N	1.476	661	5.031	3.616	32.312	43.097	
		%	3,4	1,5	11,7	8,4	75,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	2.277	3.142	16.787	6.378	73.121	101.706	
		%	2,2	3,1	16,5	6,3	71,9	100,0	
Bizkaia	N	3.579	2.754	20.516	13.507	113.907	154.263		
	%	2,3	1,8	13,3	8,8	73,8	100,0		
15-24	CAPV	N	21.856	19.840	62.435	28.336	51.491	183.958	
		%	11,9	10,8	33,9	15,4	28,0	100,0	
	Araba	N	3.254	2.480	8.495	4.217	8.795	27.242	
		%	11,9	9,1	31,2	15,5	32,3	100,0	
	Gipuzkoa	N	7.232	7.948	20.088	8.659	16.587	60.515	
		%	12,0	13,1	33,2	14,3	27,4	100,0	
Bizkaia	N	11.369	9.412	33.851	15.460	26.108	96.200		
	%	11,8	9,8	35,2	16,1	27,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 18. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Ambos	25-44	CAPV	N	299.242	99.555	119.552	48.462	90.324	657.135
			%	45,5	15,1	18,2	7,4	13,7	100,0
		Araba	N	46.865	18.865	16.852	5.015	10.842	98.439
			%	47,6	19,2	17,1	5,1	11,0	100,0
		Gipuzkoa	N	111.020	27.073	29.696	11.128	29.120	208.036
			%	53,4	13,0	14,3	5,3	14,0	100,0
		Bizkaia	N	141.357	53.616	73.005	32.319	50.362	350.660
			%	40,3	15,3	20,8	9,2	14,4	100,0
	45-64	CAPV	N	350.726	94.323	90.179	26.112	55.084	616.424
				%	56,9	15,3	14,6	4,2	8,9
		Araba	N	52.675	12.482	10.017	3.282	8.452	86.908
			%	60,6	14,4	11,5	3,8	9,7	100,0
		Gipuzkoa	N	118.717	27.700	25.920	6.146	19.315	197.798
			%	60,0	14,0	13,1	3,1	9,8	100,0
		Bizkaia	N	179.335	54.141	54.242	16.683	27.317	331.718
			%	54,1	16,3	16,4	5,0	8,2	100,0
	65-74	CAPV	N	122.764	22.035	20.828	10.808	29.223	205.658
				%	59,7	10,7	10,1	5,3	14,2
		Araba	N	17.161	2.370	2.073	1.294	4.929	27.826
			%	61,7	8,5	7,4	4,6	17,7	100,0
		Gipuzkoa	N	39.833	7.342	7.433	3.120	10.412	68.140
			%	58,5	10,8	10,9	4,6	15,3	100,0
		Bizkaia	N	65.770	12.323	11.323	6.394	13.882	109.692
			%	60,0	11,2	10,3	5,8	12,7	100,0
	>=75	CAPV	N	97.802	24.592	26.494	14.263	64.681	227.832
				%	42,9	10,8	11,6	6,3	28,4
		Araba	N	14.063	2.203	2.077	1.738	8.325	28.406
			%	49,5	7,8	7,3	6,1	29,3	100,0
		Gipuzkoa	N	29.875	8.365	7.245	3.729	22.339	71.553
			%	41,8	11,7	10,1	5,2	31,2	100,0
		Bizkaia	N	53.865	14.023	17.172	8.795	34.017	127.873
			%	42,1	11,0	13,4	6,9	26,6	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 19. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Casi			Casi nunca	Nunca	Total
		Siempre que se realizan	siempre que se realizan	En algunas ocasiones					
Hombres	Total	N	252.079	148.982	234.118	106.582	324.656	1.066.417	
		%	23,6	14,0	22,0	10,0	30,4	100,0	
I	N	29.800	17.796	30.989	16.268	48.190	143.043		
	%	20,8	12,4	21,7	11,4	33,7	100,0		
II	N	21.937	11.327	24.972	11.607	31.807	101.649		
	%	21,6	11,1	24,6	11,4	31,3	100,0		
III	N	51.687	29.727	50.588	25.468	70.795	228.264		
	%	22,6	13,0	22,2	11,2	31,0	100,0		
IV	N	126.067	77.112	109.270	46.863	144.762	504.074		
	%	25,0	15,3	21,7	9,3	28,7	100,0		
V	N	22.589	13.020	18.299	6.375	29.102	89.386		
	%	25,3	14,6	20,5	7,1	32,6	100,0		
0-14	Total	N	4.088	2.572	20.263	11.581	114.065	152.571	
		%	2,7	1,7	13,3	7,6	74,8	100,0	
I	N	536	591	2.782	1.968	25.674	31.550		
	%	1,7	1,9	8,8	6,2	81,4	100,0		
II	N	1.023	299	3.535	1.043	14.556	20.455		
	%	5,0	1,5	17,3	5,1	71,2	100,0		
III	N	933	915	6.221	4.100	29.924	42.094		
	%	2,2	2,2	14,8	9,7	71,1	100,0		
IV	N	1.349	559	7.155	3.844	39.319	52.226		
	%	2,6	1,1	13,7	7,4	75,3	100,0		
V	N	248	209	570	627	4.593	6.246		
	%	4,0	3,3	9,1	10,0	73,5	100,0		
15-24	Total	N	8.919	6.788	29.523	15.671	32.909	93.810	
		%	9,5	7,2	31,5	16,7	35,1	100,0	
I	N	879	598	4.942	2.773	6.018	15.209		
	%	5,8	3,9	32,5	18,2	39,6	100,0		
II	N	480	614	4.148	3.080	3.937	12.260		
	%	3,9	5,0	33,8	25,1	32,1	100,0		
III	N	2.041	2.074	5.474	3.453	4.479	17.521		
	%	11,6	11,8	31,2	19,7	25,6	100,0		
IV	N	3.948	3.011	12.751	5.474	15.365	40.549		
	%	9,7	7,4	31,4	13,5	37,9	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 19. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

			Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Hombres 15-24 V	N		1.572	490	2.209	890	3.110	8.270
	%		19,0	5,9	26,7	10,8	37,6	100,0
25-44 Total	N		103.557	53.004	75.475	37.504	66.583	336.124
	%		30,8	15,8	22,5	11,2	19,8	100,0
I	N		12.856	7.895	8.559	5.686	7.963	42.959
	%		29,9	18,4	19,9	13,2	18,5	100,0
II	N		10.232	4.037	9.054	3.825	5.073	32.220
	%		31,8	12,5	28,1	11,9	15,7	100,0
III	N		18.447	9.966	14.933	7.332	12.037	62.714
	%		29,4	15,9	23,8	11,7	19,2	100,0
IV	N		50.222	25.745	34.413	18.478	30.308	159.166
	%		31,6	16,2	21,6	11,6	19,0	100,0
V	N		11.801	5.363	8.516	2.183	11.202	39.065
	%		30,2	13,7	21,8	5,6	28,7	100,0
45-64 Total	N		89.928	61.704	76.126	24.897	49.785	302.440
	%		29,7	20,4	25,2	8,2	16,5	100,0
I	N		10.894	6.846	10.261	3.307	5.337	36.646
	%		29,7	18,7	28,0	9,0	14,6	100,0
II	N		7.893	4.576	6.234	2.413	3.676	24.792
	%		31,8	18,5	25,1	9,7	14,8	100,0
III	N		20.894	11.796	17.084	5.966	9.772	65.513
	%		31,9	18,0	26,1	9,1	14,9	100,0
IV	N		44.016	33.682	37.987	11.913	25.112	152.710
	%		28,8	22,1	24,9	7,8	16,4	100,0
V	N		6.231	4.804	4.560	1.297	5.888	22.779
	%		27,4	21,1	20,0	5,7	25,8	100,0
65-74 Total	N		26.008	14.711	18.325	9.966	26.723	95.733
	%		27,2	15,4	19,1	10,4	27,9	100,0
I	N		3.382	1.190	3.392	2.030	2.466	12.460
	%		27,1	9,6	27,2	16,3	19,8	100,0
II	N		2.062	1.549	749	919	1.911	7.189
	%		28,7	21,6	10,4	12,8	26,6	100,0
III	N		5.258	2.324	4.645	1.926	6.353	20.506
	%		25,6	11,3	22,7	9,4	31,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 19. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Casi	En	Casi nunca	Nunca	Total	
			Siempre que se realizan	siempre que se realizan	algunas ocasiones				
Hombres	65-74	IV	N	14.176	8.462	8.648	4.015	14.409	49.711
			%	28,5	17,0	17,4	8,1	29,0	100,0
		V	N	1.131	1.185	891	1.076	1.584	5.867
			%	19,3	20,2	15,2	18,3	27,0	100,0
	>=75	Total	N	19.578	10.202	14.406	6.963	34.590	85.739
			%	22,8	11,9	16,8	8,1	40,3	100,0
		I	N	1.253	677	1.054	503	732	4.219
			%	29,7	16,1	25,0	11,9	17,3	100,0
		II	N	247	252	1.253	327	2.654	4.733
			%	5,2	5,3	26,5	6,9	56,1	100,0
		III	N	4.115	2.652	2.229	2.692	8.230	19.917
			%	20,7	13,3	11,2	13,5	41,3	100,0
		IV	N	12.357	5.652	8.316	3.138	20.249	49.713
			%	24,9	11,4	16,7	6,3	40,7	100,0
		V	N	1.606	970	1.553	303	2.726	7.158
			%	22,4	13,5	21,7	4,2	38,1	100,0
Mujeres	Total	Total	N	645.002	117.627	127.057	44.488	183.681	1.117.854
			%	57,7	10,5	11,4	4,0	16,4	100,0
		I	N	53.777	14.404	22.227	8.214	36.639	135.260
			%	39,8	10,6	16,4	6,1	27,1	100,0
		II	N	54.656	15.136	14.702	5.522	22.619	112.634
			%	48,5	13,4	13,1	4,9	20,1	100,0
		III	N	162.355	29.049	34.296	10.203	48.441	284.344
			%	57,1	10,2	12,1	3,6	17,0	100,0
		IV	N	251.417	41.521	43.843	16.686	58.737	412.204
			%	61,0	10,1	10,6	4,0	14,2	100,0
		V	N	122.798	17.516	11.989	3.863	17.245	173.412
			%	70,8	10,1	6,9	2,2	9,9	100,0
	0-14	Total	N	3.243	3.985	21.806	11.920	103.986	144.940
			%	2,2	2,7	15,0	8,2	71,7	100,0
		I	N	1.159	686	3.949	2.414	23.841	32.050
			%	3,6	2,1	12,3	7,5	74,4	100,0
	II	N	341	729	2.998	1.279	13.738	19.085	
		%	1,8	3,8	15,7	6,7	72,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 19. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Mujeres	0-14	III	N	487	1.391	6.959	3.592	30.163	42.591
			%	1,1	3,3	16,3	8,4	70,8	100,0
		IV	N	1.000	949	7.387	4.405	31.365	45.106
			%	2,2	2,1	16,4	9,8	69,5	100,0
		V	N	256	230	512	230	4.879	6.108
			%	4,2	3,8	8,4	3,8	79,9	100,0
	15-24	Total	N	12.025	13.052	32.912	12.253	18.468	88.710
			%	13,6	14,7	37,1	13,8	20,8	100,0
		I	N	996	928	6.384	2.243	4.298	14.848
			%	6,7	6,2	43,0	15,1	28,9	100,0
		II	N	1.384	1.582	3.742	2.274	2.837	11.820
			%	11,7	13,4	31,7	19,2	24,0	100,0
		III	N	1.877	4.595	9.139	2.859	4.230	22.699
			%	8,3	20,2	40,3	12,6	18,6	100,0
		IV	N	5.457	5.468	11.778	3.901	5.531	32.135
			%	17,0	17,0	36,7	12,1	17,2	100,0
		V	N	2.311	479	1.868	977	1.572	7.208
			%	32,1	6,7	25,9	13,6	21,8	100,0
	25-44	Total	N	195.083	46.550	44.078	10.958	23.740	320.409
			%	60,9	14,5	13,8	3,4	7,4	100,0
		I	N	24.230	5.826	7.914	2.471	5.286	45.726
			%	53,0	12,7	17,3	5,4	11,6	100,0
		II	N	21.377	6.865	4.963	1.024	3.497	37.726
			%	56,7	18,2	13,2	2,7	9,3	100,0
		III	N	50.903	9.547	9.525	2.916	4.957	77.849
			%	65,4	12,3	12,2	3,7	6,4	100,0
		IV	N	68.768	16.874	17.312	3.800	7.658	114.412
			%	60,1	14,7	15,1	3,3	6,7	100,0
		V	N	29.805	7.439	4.363	747	2.342	44.697
			%	66,7	16,6	9,8	1,7	5,2	100,0
	45-64	Total	N	260.348	32.500	13.927	1.215	5.299	313.289
			%	83,1	10,4	4,4	0,4	1,7	100,0
		I	N	19.896	5.894	2.838	568	986	30.183
			%	65,9	19,5	9,4	1,9	3,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 19. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Mujeres	45-64	II	N	20.216	4.158	1.826	117	611	26.929
			%	75,1	15,4	6,8	0,4	2,3	100,0
		III	N	71.728	8.595	5.194	279	468	86.265
			%	83,1	10,0	6,0	0,3	0,5	100,0
		IV	N	94.862	8.485	2.376	250	1.252	107.225
			%	88,5	7,9	2,2	0,2	1,2	100,0
		V	N	53.646	5.368	1.693	.	1.981	62.687
			%	85,6	8,6	2,7	.	3,2	100,0
	65-74	Total	N	96.612	7.324	2.503	842	2.500	109.781
			%	88,0	6,7	2,3	0,8	2,3	100,0
		I	N	5.222	602	270	156	521	6.770
			%	77,1	8,9	4,0	2,3	7,7	100,0
		II	N	6.406	921	249	.	.	7.575
			%	84,6	12,2	3,3	.	.	100,0
		III	N	21.754	2.285	683	114	589	25.424
			%	85,6	9,0	2,7	0,4	2,3	100,0
		IV	N	44.817	2.509	530	321	948	49.125
			%	91,2	5,1	1,1	0,7	1,9	100,0
		V	N	18.414	1.008	773	251	442	20.887
			%	88,2	4,8	3,7	1,2	2,1	100,0
	>=75	Total	N	77.691	14.215	11.831	7.300	29.689	140.726
			%	55,2	10,1	8,4	5,2	21,1	100,0
		I	N	2.274	468	871	362	1.708	5.683
			%	40,0	8,2	15,3	6,4	30,1	100,0
		II	N	4.931	881	924	827	1.936	9.500
			%	51,9	9,3	9,7	8,7	20,4	100,0
		III	N	15.605	2.637	2.796	444	8.034	29.516
			%	52,9	8,9	9,5	1,5	27,2	100,0
		IV	N	36.514	7.237	4.460	4.009	11.981	64.201
			%	56,9	11,3	6,9	6,2	18,7	100,0
		V	N	18.367	2.992	2.780	1.658	6.030	31.826
			%	57,7	9,4	8,7	5,2	18,9	100,0
	Total	N	897.081	266.609	361.174	151.070	508.338	2.184.271	
			%	41,1	12,2	16,5	6,9	23,3	100,0

(continuación)

Tabla 19. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

Ambos	Total	I	N	Siempre	Casi	En	Casi nunca	Nunca	Total
				que se realizan	siempre que se realizan	algunas ocasiones			
				83.577	32.200	53.216	24.482	84.829	278.303
			%	30,0	11,6	19,1	8,8	30,5	100,0
		II	N	76.592	26.463	39.674	17.129	54.426	214.283
			%	35,7	12,3	18,5	8,0	25,4	100,0
		III	N	214.042	58.776	84.883	35.671	119.236	512.608
			%	41,8	11,5	16,6	7,0	23,3	100,0
		IV	N	377.484	118.633	153.114	63.549	203.499	916.279
			%	41,2	12,9	16,7	6,9	22,2	100,0
		V	N	145.387	30.536	30.288	10.239	46.348	262.798
			%	55,3	11,6	11,5	3,9	17,6	100,0
	0-14	Total	N	7.332	6.558	42.069	23.501	218.051	297.510
			%	2,5	2,2	14,1	7,9	73,3	100,0
		I	N	1.695	1.277	6.731	4.382	49.515	63.600
			%	2,7	2,0	10,6	6,9	77,9	100,0
		II	N	1.364	1.028	6.533	2.322	28.293	39.539
			%	3,4	2,6	16,5	5,9	71,6	100,0
		III	N	1.420	2.306	13.180	7.691	60.087	84.684
			%	1,7	2,7	15,6	9,1	71,0	100,0
		IV	N	2.348	1.508	14.542	8.249	70.684	97.332
			%	2,4	1,5	14,9	8,5	72,6	100,0
		V	N	504	438	1.083	857	9.472	12.354
			%	4,1	3,5	8,8	6,9	76,7	100,0
	15-24	Total	N	20.944	19.840	62.435	27.924	51.377	182.520
			%	11,5	10,9	34,2	15,3	28,1	100,0
		I	N	1.875	1.526	11.326	5.016	10.315	30.058
			%	6,2	5,1	37,7	16,7	34,3	100,0
		II	N	1.865	2.197	7.889	5.354	6.774	24.080
			%	7,7	9,1	32,8	22,2	28,1	100,0
		III	N	3.918	6.669	14.613	6.312	8.710	40.220
			%	9,7	16,6	36,3	15,7	21,7	100,0
		IV	N	9.404	8.479	24.529	9.375	20.896	72.684
			%	12,9	11,7	33,7	12,9	28,7	100,0
		V	N	3.883	970	4.077	1.867	4.681	15.478
			%	25,1	6,3	26,3	12,1	30,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 19. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Ambos	25-44	Total	N	298.640	99.555	119.552	48.462	90.324	656.533
			%	45,5	15,2	18,2	7,4	13,8	100,0
		I	N	37.086	13.720	16.473	8.157	13.248	88.685
			%	41,8	15,5	18,6	9,2	14,9	100,0
		II	N	31.608	10.901	14.017	4.849	8.570	69.946
			%	45,2	15,6	20,0	6,9	12,3	100,0
		III	N	69.350	19.513	24.459	10.247	16.994	140.563
			%	49,3	13,9	17,4	7,3	12,1	100,0
		IV	N	118.990	42.618	51.725	22.279	37.966	273.578
			%	43,5	15,6	18,9	8,1	13,9	100,0
		V	N	41.606	12.802	12.879	2.930	13.545	83.762
			%	49,7	15,3	15,4	3,5	16,2	100,0
	45-64	Total	N	350.276	94.204	90.053	26.112	55.084	615.728
			%	56,9	15,3	14,6	4,2	8,9	100,0
		I	N	30.790	12.740	13.100	3.876	6.324	66.829
			%	46,1	19,1	19,6	5,8	9,5	100,0
		II	N	28.109	8.735	8.060	2.530	4.287	51.721
			%	54,3	16,9	15,6	4,9	8,3	100,0
		III	N	92.622	20.391	22.278	6.245	10.240	151.777
			%	61,0	13,4	14,7	4,1	6,7	100,0
		IV	N	138.877	42.168	40.363	12.163	26.364	259.935
			%	53,4	16,2	15,5	4,7	10,1	100,0
		V	N	59.877	10.171	6.252	1.297	7.868	85.466
			%	70,1	11,9	7,3	1,5	9,2	100,0
	65-74	Total	N	122.620	22.035	20.828	10.808	29.223	205.514
			%	59,7	10,7	10,1	5,3	14,2	100,0
		I	N	8.604	1.792	3.661	2.186	2.987	19.230
			%	44,7	9,3	19,0	11,4	15,5	100,0
		II	N	8.468	2.470	997	919	1.911	14.765
			%	57,4	16,7	6,8	6,2	12,9	100,0
		III	N	27.012	4.608	5.328	2.040	6.942	45.930
			%	58,8	10,0	11,6	4,4	15,1	100,0
		IV	N	58.993	10.971	9.178	4.336	15.357	98.836
			%	59,7	11,1	9,3	4,4	15,5	100,0

(continuación)

Tabla 19. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

			Casi			Casi nunca	Nunca	Total
			Siempre que se realizan	siempre que se realizan	En algunas ocasiones			
Ambos	65-74 V	N	19.544	2.193	1.664	1.327	2.026	26.754
		%	73,1	8,2	6,2	5,0	7,6	100,0
	>=75 Total	N	97.269	24.417	26.237	14.263	64.279	226.465
		%	43,0	10,8	11,6	6,3	28,4	100,0
	I	N	3.527	1.146	1.925	865	2.440	9.902
		%	35,6	11,6	19,4	8,7	24,6	100,0
	II	N	5.178	1.133	2.177	1.155	4.590	14.233
		%	36,4	8,0	15,3	8,1	32,2	100,0
	III	N	19.720	5.289	5.026	3.136	16.263	49.433
		%	39,9	10,7	10,2	6,3	32,9	100,0
	IV	N	48.871	12.888	12.777	7.147	32.230	113.914
		%	42,9	11,3	11,2	6,3	28,3	100,0
	V	N	19.973	3.962	4.333	1.960	8.755	38.983
		%	51,2	10,2	11,1	5,0	22,5	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 20. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

			Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Hombres	Total	N	251.437	148.594	226.719	102.977	239.476	969.203
		%	25,9	15,3	23,4	10,6	24,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	50.774	33.220	56.320	27.242	94.189	261.746
		%	19,4	12,7	21,5	10,4	36,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	41.830	28.176	42.639	17.194	42.516	172.354
		%	24,3	16,3	24,7	10,0	24,7	100,0
	Secundaria, superior	N	105.356	60.024	83.692	40.906	71.612	361.590
		%	29,1	16,6	23,1	11,3	19,8	100,0
	Terciaria	N	53.477	27.173	44.068	17.635	31.159	173.513
		%	30,8	15,7	25,4	10,2	18,0	100,0
0-14	Total	N	2.836	2.065	12.865	7.770	28.543	54.079
		%	5,2	3,8	23,8	14,4	52,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.302	1.867	10.616	7.270	25.722	47.778
		%	4,8	3,9	22,2	15,2	53,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	534	198	2.248	499	2.821	6.301
		%	8,5	3,1	35,7	7,9	44,8	100,0
15-24	Total	N	9.247	6.788	29.523	15.878	33.023	94.458
		%	9,8	7,2	31,3	16,8	35,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	620	269	4.731	901	5.010	11.531
		%	5,4	2,3	41,0	7,8	43,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.872	3.005	8.038	5.133	12.503	31.551
		%	9,1	9,5	25,5	16,3	39,6	100,0
	Secundaria, superior	N	3.854	3.413	14.468	8.304	12.728	42.767
		%	9,0	8,0	33,8	19,4	29,8	100,0
	Terciaria	N	1.901	101	2.285	1.540	2.782	8.610
		%	22,1	1,2	26,5	17,9	32,3	100,0
25-44	Total	N	103.743	53.004	75.475	37.504	66.583	336.309
		%	30,8	15,8	22,4	11,2	19,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	8.628	5.512	9.758	4.032	12.049	39.979
		%	21,6	13,8	24,4	10,1	30,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	15.394	8.149	11.337	5.879	8.324	49.084
		%	31,4	16,6	23,1	12,0	17,0	100,0
	Secundaria, superior	N	53.150	27.373	33.453	18.603	31.638	164.217
		%	32,4	16,7	20,4	11,3	19,3	100,0

(continuación)

Tabla 20. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

			Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Hombres	25-44	Terciaria	N 26.571	11.970	20.927	8.989	14.572	83.029
			% 32,0	14,4	25,2	10,8	17,6	100,0
	45-64	Total	N 90.024	61.824	76.126	24.897	49.785	302.655
			% 29,7	20,4	25,2	8,2	16,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N 16.963	12.636	16.298	6.983	15.135	68.014
			% 24,9	18,6	24,0	10,3	22,3	100,0
		Secundaria, inferior	N 14.941	12.235	14.253	3.718	9.362	54.510
			% 27,4	22,4	26,1	6,8	17,2	100,0
		Secundaria, superior	N 39.353	23.799	29.575	9.754	17.489	119.971
			% 32,8	19,8	24,7	8,1	14,6	100,0
		Terciaria	N 18.767	13.154	16.000	4.442	7.799	60.161
			% 31,2	21,9	26,6	7,4	13,0	100,0
	65-74	Total	N 26.008	14.711	18.325	9.966	26.723	95.733
			% 27,2	15,4	19,1	10,4	27,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N 9.813	6.199	6.810	3.640	13.237	39.699
			% 24,7	15,6	17,2	9,2	33,3	100,0
		Secundaria, inferior	N 4.485	3.157	4.080	1.635	4.002	17.359
			% 25,8	18,2	23,5	9,4	23,1	100,0
		Secundaria, superior	N 6.890	4.272	4.373	2.784	5.715	24.034
			% 28,7	17,8	18,2	11,6	23,8	100,0
		Terciaria	N 4.820	1.083	3.062	1.907	3.769	14.641
			% 32,9	7,4	20,9	13,0	25,7	100,0
	>=75	Total	N 19.578	10.202	14.406	6.963	34.819	85.968
			% 22,8	11,9	16,8	8,1	40,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N 12.448	6.737	8.107	4.416	23.037	54.745
			% 22,7	12,3	14,8	8,1	42,1	100,0
		Secundaria, inferior	N 3.603	1.432	2.682	329	5.504	13.549
			% 26,6	10,6	19,8	2,4	40,6	100,0
		Secundaria, superior	N 2.108	1.168	1.823	1.460	4.042	10.602
			% 19,9	11,0	17,2	13,8	38,1	100,0
		Terciaria	N 1.419	866	1.794	757	2.236	7.072
			% 20,1	12,2	25,4	10,7	31,6	100,0
	Total		N 646.171	117.049	118.230	40.396	102.087	1.023.933
			% 63,1	11,4	11,5	3,9	10,0	100,0

(continuación)

Tabla 20. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres	Total		N	Siempre	Casi	En	Casi nunca	Nunca	Total
				que se realizan	siempre que se realizan	En algunas ocasiones			
	Sin estudios, primaria	N	202.714	27.753	30.043	14.034	52.367	326.911	
		%	62,0	8,5	9,2	4,3	16,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	121.189	15.253	16.638	6.777	13.882	173.739	
		%	69,8	8,8	9,6	3,9	8,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	199.848	39.749	39.859	10.871	19.471	309.797	
		%	64,5	12,8	12,9	3,5	6,3	100,0	
	Terciaria	N	122.420	34.294	31.690	8.714	16.368	213.486	
		%	57,3	16,1	14,8	4,1	7,7	100,0	
	0-14	Total	N	2.382	3.233	12.596	7.623	22.218	48.051
			%	5,0	6,7	26,2	15,9	46,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.382	2.966	10.367	6.713	20.618	43.046
			%	5,5	6,9	24,1	15,6	47,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	267	2.229	909	1.436	4.841	
		%	.	5,5	46,0	18,8	29,7	100,0	
	Secundaria, superior	N	164	164	
		%	100,0	100,0	
15-24	Total	N	12.608	13.052	32.912	12.459	18.468	89.499	
		%	14,1	14,6	36,8	13,9	20,6	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	692	1.184	3.510	1.344	4.357	11.087	
		%	6,2	10,7	31,7	12,1	39,3	100,0	
	Secundaria, inferior	N	3.471	1.508	8.383	2.673	3.815	19.850	
		%	17,5	7,6	42,2	13,5	19,2	100,0	
	Secundaria, superior	N	5.887	7.608	15.790	6.322	7.298	42.905	
		%	13,7	17,7	36,8	14,7	17,0	100,0	
	Terciaria	N	2.559	2.753	5.228	2.120	2.998	15.657	
		%	16,3	17,6	33,4	13,5	19,1	100,0	
25-44	Total	N	195.499	46.550	44.078	10.958	23.740	320.826	
		%	60,9	14,5	13,7	3,4	7,4	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	17.531	4.741	4.535	987	1.867	29.661	
		%	59,1	16,0	15,3	3,3	6,3	100,0	
	Secundaria, inferior	N	24.405	5.737	3.147	1.116	2.373	36.779	
		%	66,4	15,6	8,6	3,0	6,5	100,0	
	Secundaria, superior	N	88.559	17.889	16.153	3.938	8.928	135.466	
		%	65,4	13,2	11,9	2,9	6,6	100,0	

(continuación)

Tabla 20. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Mujeres	25-44	Terciaria	N	65.004	18.183	20.242	4.918	10.573	118.919
			%	54,7	15,3	17,0	4,1	8,9	100,0
	45-64	Total	N	260.702	32.500	14.054	1.215	5.299	313.769
			%	83,1	10,4	4,5	0,4	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	68.895	5.811	2.545	160	2.237	79.648
			%	86,5	7,3	3,2	0,2	2,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	57.052	3.826	648	.	1.000	62.525
			%	91,2	6,1	1,0	.	1,6	100,0
		Secundaria, superior	N	89.165	11.415	5.958	448	876	107.861
			%	82,7	10,6	5,5	0,4	0,8	100,0
		Terciaria	N	45.590	11.448	4.903	607	1.186	63.734
			%	71,5	18,0	7,7	1,0	1,9	100,0
	65-74	Total	N	96.756	7.324	2.503	842	2.500	109.925
			%	88,0	6,7	2,3	0,8	2,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	56.137	2.942	1.312	583	1.402	62.377
			%	90,0	4,7	2,1	0,9	2,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	22.855	1.845	143	103	466	25.412
			%	89,9	7,3	0,6	0,4	1,8	100,0
		Secundaria, superior	N	11.057	1.016	674	.	322	13.068
			%	84,6	7,8	5,2	.	2,5	100,0
		Terciaria	N	6.706	1.521	375	156	310	9.068
			%	74,0	16,8	4,1	1,7	3,4	100,0
	>=75	Total	N	78.224	14.390	12.088	7.300	29.862	141.864
			%	55,1	10,1	8,5	5,1	21,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	57.077	10.108	7.775	4.246	21.885	101.092
			%	56,5	10,0	7,7	4,2	21,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.405	2.070	2.088	1.976	4.791	24.331
			%	55,1	8,5	8,6	8,1	19,7	100,0
		Secundaria, superior	N	5.181	1.822	1.284	163	1.883	10.333
			%	50,1	17,6	12,4	1,6	18,2	100,0
		Terciaria	N	2.561	389	942	914	1.303	6.108
			%	41,9	6,4	15,4	15,0	21,3	100,0
		Total	N	897.608	265.643	344.949	143.373	341.563	1.993.136
			%	45,0	13,3	17,3	7,2	17,1	100,0

(continuación)

Tabla 20. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

Ambos	Total		N	Siempre	Casi	En	Casi nunca	Nunca	Total
				que se realizan	siempre que se realizan	ocasiones			
	Sin estudios, primaria	N	253.488	60.973	86.363	41.276	146.555	588.657	
		%	43,1	10,4	14,7	7,0	24,9	100,0	
	Secundaria, inferior	N	163.018	43.429	59.277	23.971	56.398	346.093	
		%	47,1	12,5	17,1	6,9	16,3	100,0	
	Secundaria, superior	N	305.204	99.773	123.551	51.777	91.082	671.388	
		%	45,5	14,9	18,4	7,7	13,6	100,0	
	Terciaria	N	175.897	61.468	75.758	26.350	47.527	386.999	
		%	45,5	15,9	19,6	6,8	12,3	100,0	
	0-14 Total	N	5.218	5.298	25.461	15.393	50.761	102.130	
		%	5,1	5,2	24,9	15,1	49,7	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	4.684	4.833	20.983	13.984	46.340	90.824	
		%	5,2	5,3	23,1	15,4	51,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	534	465	4.477	1.409	4.257	11.142	
		%	4,8	4,2	40,2	12,6	38,2	100,0	
	Secundaria, superior	N	164	164	
		%	100,0	100,0	
	15-24 Total	N	21.856	19.840	62.435	28.336	51.491	183.958	
		%	11,9	10,8	33,9	15,4	28,0	100,0	
Sin estudios, primaria	N	1.312	1.453	8.241	2.244	9.367	22.618		
	%	5,8	6,4	36,4	9,9	41,4	100,0		
Secundaria, inferior	N	6.343	4.513	16.421	7.806	16.318	51.401		
	%	12,3	8,8	31,9	15,2	31,7	100,0		
Secundaria, superior	N	9.741	11.021	30.258	14.626	20.026	85.672		
	%	11,4	12,9	35,3	17,1	23,4	100,0		
Terciaria	N	4.459	2.854	7.514	3.660	5.780	24.267		
	%	18,4	11,8	31,0	15,1	23,8	100,0		
25-44 Total	N	299.242	99.555	119.552	48.462	90.324	657.135		
	%	45,5	15,1	18,2	7,4	13,7	100,0		
Sin estudios, primaria	N	26.159	10.254	14.293	5.020	13.915	69.640		
	%	37,6	14,7	20,5	7,2	20,0	100,0		
Secundaria, inferior	N	39.799	13.886	14.484	6.995	10.698	85.863		
	%	46,4	16,2	16,9	8,1	12,5	100,0		
Secundaria, superior	N	141.708	45.262	49.607	22.541	40.566	299.683		
	%	47,3	15,1	16,6	7,5	13,5	100,0		

(continuación)

Tabla 20. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Ambos	25-44	Terciaria	N	91.575	30.153	41.169	13.907	25.145	201.949
			%	45,3	14,9	20,4	6,9	12,5	100,0
	45-64	Total	N	350.726	94.323	90.179	26.112	55.084	616.424
			%	56,9	15,3	14,6	4,2	8,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	85.858	18.447	18.843	7.143	17.372	147.663
			%	58,1	12,5	12,8	4,8	11,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	71.993	16.061	14.901	3.718	10.362	117.034
			%	61,5	13,7	12,7	3,2	8,9	100,0
		Secundaria, superior	N	128.518	35.214	35.533	10.202	18.365	227.832
			%	56,4	15,5	15,6	4,5	8,1	100,0
		Terciaria	N	64.357	24.602	20.903	5.049	8.984	123.895
			%	51,9	19,9	16,9	4,1	7,3	100,0
	65-74	Total	N	122.764	22.035	20.828	10.808	29.223	205.658
			%	59,7	10,7	10,1	5,3	14,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	65.950	9.142	8.121	4.223	14.639	102.075
			%	64,6	9,0	8,0	4,1	14,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	27.341	5.002	4.223	1.738	4.469	42.772
			%	63,9	11,7	9,9	4,1	10,4	100,0
		Secundaria, superior	N	17.948	5.287	5.047	2.784	6.036	37.102
			%	48,4	14,3	13,6	7,5	16,3	100,0
		Terciaria	N	11.526	2.604	3.437	2.063	4.079	23.709
			%	48,6	11,0	14,5	8,7	17,2	100,0
	>=75	Total	N	97.802	24.592	26.494	14.263	64.681	227.832
			%	42,9	10,8	11,6	6,3	28,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	69.525	16.845	15.882	8.663	44.922	155.837
			%	44,6	10,8	10,2	5,6	28,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	17.008	3.502	4.770	2.306	10.295	37.881
			%	44,9	9,2	12,6	6,1	27,2	100,0
		Secundaria, superior	N	7.289	2.990	3.107	1.623	5.926	20.935
			%	34,8	14,3	14,8	7,8	28,3	100,0
		Terciaria	N	3.980	1.254	2.735	1.671	3.539	13.179
			%	30,2	9,5	20,8	12,7	26,9	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 21. Proporción (%) de personas que realizan labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	37,6	41,0	39,5	35,5
	0-14	4,3	4,6	5,4	3,6
	15-24	17,0	12,9	18,1	17,5
	25-44	46,6	53,2	52,4	41,2
	45-64	50,2	54,0	52,0	48,0
	65-74	42,5	43,3	39,7	44,1
	>=75	34,6	39,9	33,4	34,1
	Mujeres	Total	68,2	70,8	70,2
	0-14	5,0	5,3	5,3	4,7
	15-24	28,7	30,0	32,5	25,9
	25-44	75,4	81,2	81,3	70,5
	45-64	93,4	95,7	95,5	91,7
	65-74	94,7	95,0	95,6	94,0
	>=75	65,3	68,6	65,2	64,6
Ambos sexos	Total	53,3	56,0	55,2	51,4
	0-14	4,6	5,0	5,3	4,1
	15-24	22,7	21,0	25,1	21,6
	25-44	60,7	66,8	66,4	55,6
	45-64	72,2	75,0	74,0	70,4
	65-74	70,4	70,2	69,2	71,2
	>=75	53,7	57,3	53,4	53,1

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 22. Proporción (%) de personas que realizan labores del hogar por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	37,6	33,3	32,7	35,7	40,3	39,8
	0-14	4,4	3,6	6,5	4,4	3,7	7,3
	15-24	16,7	9,7	8,9	23,5	17,2	24,9
	25-44	46,6	48,3	44,3	45,3	47,7	43,9
	45-64	50,1	48,4	50,3	49,9	50,9	48,4
	65-74	42,5	36,7	50,2	37,0	45,5	39,5
	>=75	34,7	45,8	10,5	34,0	36,2	36,0
Mujeres	Total	68,2	50,4	62,0	67,3	71,1	80,9
	0-14	5,0	5,8	5,6	4,4	4,3	8,0
	15-24	28,3	13,0	25,1	28,5	34,0	38,7
	25-44	75,4	65,7	74,9	77,7	74,9	83,3
	45-64	93,5	85,4	90,5	93,1	96,4	94,1
	65-74	94,7	86,0	96,7	94,6	96,3	93,0
	>=75	65,3	48,3	61,2	61,8	68,1	67,1
Ambos sexos	Total	53,3	41,6	48,1	53,2	54,1	66,9
	0-14	4,7	4,7	6,0	4,4	4,0	7,6
	15-24	22,3	11,3	16,9	26,3	24,6	31,4
	25-44	60,7	57,3	60,8	63,2	59,1	65,0
	45-64	72,2	65,1	71,2	74,5	69,7	82,0
	65-74	70,4	54,1	74,1	68,8	70,8	81,2
	>=75	53,7	47,2	44,3	50,6	54,2	61,4

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 23. Proporción (%) de personas que realizan labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	41,3	32,1	40,6	45,7	46,5
	0-14	9,1	8,7	11,6	.	.
	15-24	17,0	7,7	18,6	17,0	23,3
	25-44	46,6	35,4	48,0	49,0	46,4
	45-64	50,2	43,5	49,9	52,6	53,1
	65-74	42,5	40,3	44,0	46,4	40,3
	>=75	34,6	35,0	37,2	30,9	32,3
Mujeres	Total	74,5	70,5	78,5	77,3	73,4
	0-14	11,7	12,4	5,5	0,0	.
	15-24	28,7	16,9	25,1	31,5	33,9
	25-44	75,4	75,1	82,0	78,6	70,0
	45-64	93,4	93,8	97,4	93,2	89,5
	65-74	94,7	94,7	97,2	92,4	90,7
	>=75	65,3	66,5	63,6	67,8	48,3
Ambos sexos	Total	58,4	53,4	59,7	60,3	61,3
	0-14	10,3	10,5	9,0	0,0	.
	15-24	22,7	12,2	21,1	24,2	30,1
	25-44	60,7	52,3	62,5	62,4	60,3
	45-64	72,2	70,6	75,2	71,9	71,8
	65-74	70,4	73,6	75,6	62,6	59,6
	>=75	53,7	55,4	54,1	49,1	39,7

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 24. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	6,7	7,5	4,5	0,0	11,0
		Araba	6,0	5,6	4,0	0,0	10,0
		Gipuzkoa	7,4	7,5	6,5	0,0	14,0
		Bizkaia	6,6	8,2	4,5	0,0	10,0
	0-14	CAPV	1,0	2,5	0,0	0,0	0,5
		Araba	0,5	1,1	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	1,2	2,9	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	1,0	2,8	0,0	0,0	0,8
	15-24	CAPV	3,5	4,3	2,0	0,0	5,5
		Araba	2,7	3,0	1,0	0,0	3,5
		Gipuzkoa	4,4	4,7	3,5	0,0	7,0
		Bizkaia	3,2	4,4	2,0	0,0	4,5
	25-44	CAPV	7,9	8,3	7,0	2,0	12,0
		Araba	7,5	6,6	7,0	2,0	11,0
		Gipuzkoa	8,9	8,3	7,0	2,0	14,0
		Bizkaia	7,4	8,9	7,0	1,8	11,0
	45-64	CAPV	9,0	7,5	7,0	3,2	14,0
		Araba	8,1	5,6	7,0	2,0	14,0
		Gipuzkoa	9,8	7,5	9,0	3,5	14,0
		Bizkaia	8,7	8,2	7,0	3,3	13,5
	65-74	CAPV	8,0	6,6	7,0	0,0	14,0
		Araba	6,3	4,7	5,0	0,0	10,5
		Gipuzkoa	8,1	6,8	7,0	0,0	14,0
		Bizkaia	8,4	7,2	7,0	0,8	14,0
	>=75	CAPV	6,9	7,7	3,5	0,0	12,0
		Araba	6,0	4,9	4,0	0,0	10,5
		Gipuzkoa	6,8	7,2	3,5	0,0	14,0
		Bizkaia	7,1	9,0	3,5	0,0	10,5
Mujeres	Total	CAPV	14,4	11,4	14,0	4,0	21,0
		Araba	13,7	9,3	14,0	4,0	21,0
		Gipuzkoa	15,3	11,0	14,0	6,0	23,0
		Bizkaia	14,1	12,5	14,0	3,5	21,0
	0-14	CAPV	1,2	3,1	0,0	0,0	1,0
		Araba	0,7	1,3	0,0	0,0	1,0
		Gipuzkoa	1,6	3,5	0,0	0,0	1,8
		Bizkaia	1,1	3,3	0,0	0,0	0,3

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 24. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	15-24	CAPV	5,6	6,1	3,5	1,0	7,0
		Araba	4,6	4,4	3,5	1,2	7,0
		Gipuzkoa	6,8	6,4	4,5	1,0	12,0
		Bizkaia	5,2	6,4	3,5	1,2	7,0
	25-44	CAPV	14,4	11,1	14,0	7,0	21,0
		Araba	14,2	8,7	14,0	7,0	19,0
		Gipuzkoa	15,8	11,1	14,0	9,0	21,0
		Bizkaia	13,7	12,0	13,5	7,0	20,0
	45-64	CAPV	20,4	9,2	19,0	14,0	26,0
		Araba	18,9	7,1	17,5	14,0	23,9
		Gipuzkoa	21,4	8,4	21,0	14,0	28,0
		Bizkaia	20,1	10,5	19,0	14,0	26,0
	65-74	CAPV	22,9	9,2	21,0	14,0	28,0
		Araba	22,3	7,5	21,0	14,0	28,0
		Gipuzkoa	23,8	8,6	21,5	16,0	28,0
		Bizkaia	22,5	10,1	21,0	14,0	28,0
	>=75	CAPV	14,1	10,7	14,0	3,5	21,0
		Araba	14,4	9,5	14,0	2,0	21,0
		Gipuzkoa	14,7	10,5	14,0	1,8	21,0
		Bizkaia	13,7	11,2	14,0	3,5	21,0
Ambos sexos	Total	CAPV	10,7	10,5	7,5	1,2	16,0
		Araba	9,9	8,3	7,0	1,0	16,0
		Gipuzkoa	11,4	10,3	9,0	1,0	18,0
		Bizkaia	10,5	11,5	7,0	1,2	16,0
	0-14	CAPV	1,1	2,8	0,0	0,0	0,8
		Araba	0,6	1,2	0,0	0,0	0,3
		Gipuzkoa	1,4	3,2	0,0	0,0	1,2
		Bizkaia	1,0	3,1	0,0	0,0	0,5
	15-24	CAPV	4,5	5,4	3,5	0,0	7,0
		Araba	3,6	3,7	2,0	0,0	4,8
		Gipuzkoa	5,5	5,7	3,5	0,0	7,0
		Bizkaia	4,2	5,6	3,5	0,0	7,0
	25-44	CAPV	11,1	10,5	9,5	3,5	16,0
		Araba	10,8	8,4	9,0	4,5	16,0
		Gipuzkoa	12,2	10,5	12,0	5,0	18,0
		Bizkaia	10,5	11,3	9,0	3,5	15,0

(continuación)

Tabla 24. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos 45-64	CAPV		14,8	10,0	14,0	7,0	21,0
	Araba		13,5	7,7	14,0	6,8	19,0
	Gipuzkoa		15,7	9,5	14,0	7,0	21,5
	Bizkaia		14,5	11,2	14,0	7,0	21,0
65-74	CAPV		16,0	10,2	14,0	7,0	24,0
	Araba		14,6	8,4	14,0	4,0	21,0
	Gipuzkoa		16,3	10,0	14,0	7,0	25,5
	Bizkaia		16,1	10,9	14,0	7,0	24,0
>=75	CAPV		11,4	10,1	7,0	0,0	17,8
	Araba		11,1	8,5	7,0	0,0	16,5
	Gipuzkoa		11,8	9,9	10,0	0,0	19,0
	Bizkaia		11,2	10,9	7,0	0,0	18,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 25. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Hombres	Total	Total	6,7	7,5	4,5	0,0	11,0
		I	5,7	6,9	3,5	0,0	9,0
		II	6,4	7,3	4,0	0,0	11,0
		III	6,2	6,9	3,5	0,0	10,0
		IV	7,3	7,8	6,0	0,0	12,0
		V	7,1	8,2	5,0	0,0	12,0
	0-14	Total	1,0	2,5	0,0	0,0	0,5
		I	0,6	2,0	0,0	0,0	0,0
		II	1,2	3,0	0,0	0,0	1,8
		III	1,1	2,5	0,0	0,0	1,0
		IV	1,0	2,5	0,0	0,0	0,0
		V	1,0	3,2	0,0	0,0	0,7
	15-24	Total	3,5	4,3	2,0	0,0	5,5
		I	2,5	3,2	1,5	0,0	3,5
		II	3,6	4,6	2,0	0,0	5,5
		III	3,6	4,2	2,3	0,0	6,0
		IV	3,6	4,2	2,0	0,0	7,0
		V	4,5	5,5	3,3	0,0	7,0
	25-44	Total	7,9	8,3	7,0	2,0	12,0
		I	7,3	7,6	7,0	1,8	11,0
		II	8,1	7,7	7,0	3,5	12,0
		III	7,4	7,7	7,0	2,0	11,5
		IV	8,3	8,6	7,0	2,0	13,5
		V	7,6	9,1	7,0	0,0	12,0
	45-64	Total	9,0	7,5	7,0	3,0	14,0
		I	8,7	7,5	7,0	3,3	13,0
		II	9,9	7,9	8,0	3,5	14,0
		III	8,7	6,9	7,0	3,5	14,0
		IV	9,1	7,5	7,0	3,2	14,0
		V	8,6	8,6	7,0	0,0	14,0
65-74	Total	8,0	6,6	7,0	0,0	14,0	
	I	7,2	5,2	7,0	2,3	10,5	
	II	8,3	6,1	7,0	0,0	14,0	
	III	7,0	5,9	6,0	0,0	12,0	
	IV	8,8	7,4	7,0	0,0	14,0	
	V	6,0	4,8	5,0	0,0	8,5	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 25. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	>=75	Total	6,9	7,7	3,5	0,0	12,0
		I	8,4	6,3	7,0	3,5	14,0
		II	3,7	5,8	0,0	0,0	5,0
		III	6,2	7,5	3,5	0,0	7,0
		IV	7,1	7,9	5,0	0,0	14,0
		V	8,5	8,7	7,0	0,0	14,0
Mujeres	Total	Total	14,5	11,4	14,0	4,0	21,0
		I	9,3	10,2	7,0	0,0	14,0
		II	11,8	10,2	11,5	2,3	18,0
		III	14,0	11,2	14,0	4,0	21,0
		IV	15,9	11,9	14,0	7,0	24,0
		V	17,5	10,7	17,0	10,0	24,0
	0-14	Total	1,2	3,1	0,0	0,0	1,0
		I	1,0	2,5	0,0	0,0	0,3
		II	1,0	2,5	0,0	0,0	1,2
		III	1,3	3,2	0,0	0,0	1,0
		IV	1,4	3,7	0,0	0,0	1,8
		V	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	Total	5,6	6,1	3,5	1,0	7,0
		I	3,3	3,8	2,0	0,0	5,0
		II	4,5	4,4	3,5	1,0	7,0
		III	5,2	5,4	3,5	1,3	7,0
		IV	6,7	6,4	4,5	2,0	10,0
		V	8,1	10,3	4,5	1,0	14,0
	25-44	Total	14,4	11,2	14,0	7,0	21,0
		I	11,1	9,7	11,0	4,5	16,0
		II	12,9	10,1	13,0	7,0	18,0
		III	14,6	10,8	14,0	7,0	21,0
		IV	15,4	12,2	14,0	7,0	21,0
		V	16,3	9,9	16,0	11,0	21,0
	45-64	Total	20,4	9,2	19,0	14,0	26,0
		I	15,7	8,8	14,0	9,0	21,0
		II	18,1	7,3	18,0	13,5	23,0
		III	19,9	9,0	19,0	14,0	25,0
		IV	22,4	9,2	21,0	16,0	28,0
		V	20,8	9,5	21,0	14,0	27,0

(continuación)

Tabla 25. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Mujeres	65-74	Total	22,9	9,2	21,0	14,0	28,0	
		I	21,6	11,0	21,0	14,0	28,0	
		II	22,0	8,2	21,0	14,0	28,0	
		III	22,3	8,8	21,0	14,0	28,0	
		IV	23,6	9,3	21,0	16,0	28,0	
		V	22,9	8,9	21,0	14,0	28,0	
	>=75	Total	14,1	10,7	14,0	3,5	21,0	
		I	9,8	8,5	7,0	0,0	16,0	
		II	12,8	9,5	14,0	2,5	19,0	
		III	13,1	10,5	12,0	0,0	21,0	
		IV	14,9	11,0	14,0	3,5	23,0	
		V	14,6	10,7	14,0	3,5	21,0	
	Ambos sexos	Total	Total	10,7	10,5	7,5	1,2	16,0
			I	7,5	8,8	5,0	0,0	12,0
			II	9,3	9,4	7,0	0,0	14,0
III			10,5	10,3	7,0	1,0	16,0	
IV			11,2	10,7	8,5	1,8	17,5	
V			14,0	11,1	14,0	3,5	21,0	
0-14		Total	1,1	2,8	0,0	0,0	0,8	
		I	0,8	2,2	0,0	0,0	0,0	
		II	1,1	2,8	0,0	0,0	1,2	
		III	1,2	2,9	0,0	0,0	1,0	
		IV	1,2	3,1	0,0	0,0	1,0	
		V	0,8	2,6	0,0	0,0	0,0	
15-24		Total	4,5	5,3	3,5	0,0	7,0	
		I	2,9	3,5	2,0	0,0	4,0	
		II	4,0	4,5	3,5	0,0	7,0	
		III	4,5	5,0	3,5	1,0	7,0	
		IV	5,0	5,5	3,5	0,0	7,0	
		V	6,2	8,1	3,5	0,0	7,0	
25-44		Total	11,1	10,5	9,5	3,5	16,0	
		I	9,2	9,0	9,0	2,5	14,0	
		II	10,7	9,5	9,0	4,5	16,0	
		III	11,3	10,4	10,0	4,0	16,0	
		IV	11,2	11,1	9,0	3,5	16,0	
		V	12,3	10,8	12,0	4,0	19,0	

(continuación)

Tabla 25. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	45-64	Total	14,8	10,0	14,0	7,0	21,0
		I	11,9	8,8	11,0	5,5	16,0
		II	14,1	8,5	14,0	7,0	20,5
		III	15,0	9,7	14,0	7,0	21,0
		IV	14,5	10,3	14,0	7,0	21,0
		V	17,5	10,6	16,0	9,0	25,0
	65-74	Total	16,0	10,2	14,0	7,0	24,0
		I	12,3	9,6	9,5	3,5	18,0
		II	15,3	9,3	14,0	7,0	21,0
		III	15,4	9,9	14,0	7,0	24,0
		IV	16,2	10,4	14,0	7,0	24,0
		V	19,2	10,0	19,0	12,0	28,0
	>=75	Total	11,4	10,1	7,0	0,0	18,0
		I	9,2	7,6	7,0	1,2	14,0
		II	9,8	9,3	7,0	0,0	14,0
III		10,3	9,8	7,0	0,0	16,0	
IV		11,5	10,4	7,0	0,0	19,0	
V		13,5	10,5	14,0	2,0	21,0	

Tabla 26. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Hombres	Total	Total	7,4	7,5	7,0	0,5	12,0	
		Sin estudios, primaria	6,3	7,7	3,5	0,0	9,0	
		Secundaria, inferior	7,4	7,6	6,0	0,5	12,0	
		Secundaria, superior	8,0	7,5	7,0	2,0	12,0	
		Terciaria	7,7	6,9	7,0	2,0	12,0	
	0-14	Total	1,9	3,3	0,0	0,0	3,3	
		Sin estudios, primaria	1,8	3,2	0,0	0,0	2,8	
		Secundaria, inferior	2,8	3,9	2,0	0,0	4,5	
		15-24	Total	3,5	4,3	2,0	0,0	5,5
			Sin estudios, primaria	2,9	4,1	1,2	0,0	4,5
	Secundaria, inferior		3,4	4,4	1,8	0,0	4,5	
	25-44	Secundaria, superior	3,8	4,3	3,0	0,0	6,0	
		Terciaria	3,7	4,2	3,3	0,0	7,0	
		Total	7,9	8,3	7,0	2,0	12,0	
		Sin estudios, primaria	7,0	9,1	5,0	0,0	11,0	
		Secundaria, inferior	8,6	8,8	7,0	2,0	14,0	
	45-64	Secundaria, superior	8,1	8,4	7,0	2,0	12,0	
		Terciaria	7,5	7,4	7,0	2,0	11,5	
		Total	9,0	7,5	7,0	3,2	14,0	
		Sin estudios, primaria	8,3	7,8	7,0	1,8	14,0	
		Secundaria, inferior	8,8	8,1	7,0	2,0	14,0	
	65-74	Secundaria, superior	9,3	7,2	7,0	3,5	14,0	
		Terciaria	9,2	7,3	8,0	3,5	14,0	
		Total	8,0	6,6	7,0	0,0	14,0	
		Sin estudios, primaria	7,8	7,2	6,0	0,0	14,0	
		Secundaria, inferior	8,9	6,9	7,0	1,8	14,0	
	>=75	Secundaria, superior	8,4	6,4	7,0	1,7	14,0	
		Terciaria	6,7	4,7	7,0	0,0	10,0	
		Total	6,9	7,7	3,5	0,0	12,0	
		Sin estudios, primaria	6,8	8,1	3,5	0,0	11,0	
		Secundaria, inferior	7,2	7,0	7,0	0,0	14,0	
			Secundaria, superior	7,4	8,2	6,0	0,0	14,0
		Terciaria	5,9	5,4	5,0	0,0	8,5	

(continuación)

Tabla 26. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	Total	15,8	11,0	14,0	7,0	23,0
		Sin estudios, primaria	16,1	11,5	14,0	4,5	24,0
		Secundaria, inferior	18,4	11,8	18,0	9,0	26,8
		Secundaria, superior	15,7	10,3	14,0	8,0	21,0
		Terciaria	13,3	9,4	14,0	7,0	19,0
	0-14	Total	2,7	4,3	1,0	0,0	3,5
		Sin estudios, primaria	2,5	4,2	0,8	0,0	3,5
		Secundaria, inferior	4,2	4,8	3,5	0,0	7,0
		Secundaria, superior	0,0	.	0,0	0,0	0,0
		Terciaria					
	15-24	Total	5,6	6,1	3,5	1,0	7,0
		Sin estudios, primaria	4,0	6,4	1,2	0,0	4,5
		Secundaria, inferior	5,6	5,7	3,5	1,6	7,0
		Secundaria, superior	5,8	6,0	4,0	1,8	7,0
		Terciaria	6,3	6,8	4,0	1,8	10,5
	25-44	Total	14,4	11,1	14,0	7,0	21,0
		Sin estudios, primaria	17,0	13,1	16,0	9,0	23,0
		Secundaria, inferior	16,5	11,8	16,0	9,5	23,0
		Secundaria, superior	15,1	10,9	14,0	9,0	21,0
		Terciaria	12,3	10,1	11,5	6,3	18,0
	45-64	Total	20,4	9,2	19,0	14,0	26,0
		Sin estudios, primaria	21,5	9,5	21,0	14,0	28,0
		Secundaria, inferior	23,8	9,8	23,5	16,5	28,0
		Secundaria, superior	19,9	8,5	19,0	14,0	25,0
		Terciaria	16,3	7,8	15,0	11,0	21,0
	65-74	Total	22,9	9,2	21,0	14,0	28,0
		Sin estudios, primaria	23,2	9,0	21,0	14,0	28,0
		Secundaria, inferior	24,5	9,9	23,0	17,0	30,0
Secundaria, superior		21,0	9,1	20,0	14,0	28,0	
Terciaria		19,4	6,9	21,0	14,0	25,0	
>=75	Total	14,1	10,7	14,0	3,5	21,0	
	Sin estudios, primaria	14,3	10,6	14,0	3,5	21,0	
	Secundaria, inferior	14,1	11,4	12,0	3,0	21,0	
	Secundaria, superior	13,2	9,1	14,0	7,0	19,0	
	Terciaria	11,8	10,3	7,0	2,0	17,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 26. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Ambos sexos	Total	Total	11,7	10,4	9,5	3,5	18,0
		Sin estudios, primaria	11,7	11,0	7,5	0,3	19,0
		Secundaria, inferior	12,9	11,3	11,0	3,5	21,0
		Secundaria, superior	11,5	9,7	10,0	3,5	17,0
		Terciaria	10,8	8,9	9,0	3,5	16,0
	0-14	Total	2,3	3,8	0,5	0,0	3,5
		Sin estudios, primaria	2,1	3,7	0,0	0,0	3,5
		Secundaria, inferior	3,4	4,3	2,0	0,0	4,5
		Secundaria, superior	0,0	.	0,0	0,0	0,0
	15-24	Total	4,5	5,4	3,5	0,0	7,0
		Sin estudios, primaria	3,4	5,4	1,2	0,0	4,5
		Secundaria, inferior	4,2	5,1	3,0	0,0	7,0
		Secundaria, superior	4,8	5,3	3,5	0,8	7,0
		Terciaria	5,4	6,1	3,5	0,9	7,5
	25-44	Total	11,1	10,5	9,5	3,5	16,0
		Sin estudios, primaria	11,2	12,4	9,0	2,3	18,0
		Secundaria, inferior	12,0	11,2	10,5	4,5	18,0
		Secundaria, superior	11,3	10,4	10,5	4,0	16,0
		Terciaria	10,3	9,5	9,0	3,5	14,0
	45-64	Total	14,8	10,0	14,0	7,0	21,0
		Sin estudios, primaria	15,4	10,6	14,0	7,0	23,0
		Secundaria, inferior	16,8	11,5	16,0	7,0	25,0
		Secundaria, superior	14,3	9,3	14,0	7,0	21,0
		Terciaria	12,8	8,3	12,5	7,0	18,0
	65-74	Total	16,0	10,2	14,0	7,0	24,0
		Sin estudios, primaria	17,2	10,4	16,0	7,0	26,0
		Secundaria, inferior	18,1	10,8	17,0	7,0	26,0
		Secundaria, superior	12,9	9,0	12,0	5,0	19,0
		Terciaria	11,5	7,7	10,0	4,0	17,0
	>=75	Total	11,4	10,1	7,0	0,0	17,8
		Sin estudios, primaria	11,7	10,3	9,0	0,0	19,0
		Secundaria, inferior	11,7	10,4	9,5	0,0	17,5
		Secundaria, superior	10,2	9,0	7,0	0,0	16,0
		Terciaria	8,6	8,5	6,0	0,0	14,0

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 27. Proporción (%) de personas que cuidan dentro del hogar a personas que necesitan ayuda para realizar alguna de las actividades de la vida cotidiana por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	4,2	3,4	4,5	4,3
	0-14	0,1	0,6	0,0	0,0
	15-24	1,9	1,4	3,5	1,0
	25-44	4,1	3,3	5,9	3,3
	45-64	5,3	4,6	5,1	5,6
	65-74	6,8	4,5	6,2	7,8
	>=75	8,0	5,4	4,9	10,4
Mujeres	Total	4,7	4,1	5,3	4,5
	0-14	0,2	0,0	0,5	0,0
	15-24	1,6	2,7	1,4	1,4
	25-44	4,4	4,1	6,0	3,6
	45-64	6,8	5,2	6,5	7,4
	65-74	7,4	8,2	9,1	6,3
	>=75	5,4	3,5	6,1	5,4
Ambos sexos	Total	4,5	3,7	4,9	4,4
	0-14	0,1	0,3	0,2	0,0
	15-24	1,7	2,0	2,4	1,2
	25-44	4,3	3,7	6,0	3,4
	45-64	6,1	4,9	5,8	6,5
	65-74	7,1	6,4	7,7	7,0
	>=75	6,4	4,2	5,7	7,3

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 28. Proporción (%) de personas que cuidan dentro del hogar a personas que necesitan ayuda para realizar alguna de las actividades de la vida cotidiana por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	4,3	2,9	2,6	4,3	4,6	6,1
	0-14	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
	15-24	1,9	0,6	0,0	2,2	2,8	1,6
	25-44	4,1	2,8	0,7	4,5	4,7	5,6
	45-64	5,3	5,1	8,9	5,1	4,3	9,4
	65-74	6,8	5,1	3,6	5,8	8,1	7,4
	>=75	8,1	9,8	0,0	10,5	7,6	8,4
	Mujeres	Total	4,7	2,0	3,5	4,6	5,3
	0-14	0,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
	15-24	1,6	0,0	1,2	2,4	1,6	2,8
	25-44	4,4	1,9	3,8	4,6	3,0	11,0
	45-64	6,8	5,2	3,1	6,7	9,3	5,0
	65-74	7,4	2,4	12,3	7,6	7,7	6,6
	>=75	5,5	1,8	3,3	4,5	6,5	5,6
Ambos sexos	Total	4,5	2,5	3,1	4,5	4,9	6,4
	0-14	0,1	0,0	0,6	0,0	0,1	0,0
	15-24	1,7	0,3	0,6	2,3	2,3	2,1
	25-44	4,3	2,4	2,4	4,6	4,0	8,5
	45-64	6,1	5,1	5,9	6,0	6,4	6,1
	65-74	7,2	4,2	8,1	6,8	7,9	6,7
	>=75	6,4	5,2	2,2	6,9	7,0	6,1

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 29. Proporción (%) de personas que cuidan dentro del hogar a personas que necesitan ayuda para realizar alguna de las actividades de la vida cotidiana por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	4,7	5,1	6,3	4,4	3,0
	0-14	0,2	0,3	0,0	.	.
	15-24	1,9	0,0	2,2	2,2	1,2
	25-44	4,1	5,9	5,9	4,3	1,9
	45-64	5,3	4,9	8,4	4,6	4,5
	65-74	6,8	8,5	8,8	6,0	1,3
	>=75	8,0	7,5	9,1	9,4	7,9
	Mujeres	Total	5,2	5,9	7,2	4,5
	0-14	0,5	0,5	0,0	0,0	.
	15-24	1,6	1,8	3,0	1,1	0,9
	25-44	4,4	8,2	8,9	3,6	3,0
	45-64	6,8	7,8	8,5	7,0	3,5
	65-74	7,4	7,6	6,5	6,5	10,4
	>=75	5,4	5,5	6,8	2,3	3,1
Ambos sexos	Total	4,9	5,5	6,8	4,5	3,2
	0-14	0,3	0,4	0,0	0,0	.
	15-24	1,7	0,9	2,5	1,6	1,0
	25-44	4,3	6,9	7,2	4,0	2,6
	45-64	6,1	6,5	8,4	5,7	4,0
	65-74	7,1	7,9	7,5	6,1	4,8
	>=75	6,4	6,2	7,6	5,9	5,7

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 30. Distribución de la media de horas dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	4,4	11,6	0,0	0,0	0,0
		Araba	4,3	9,3	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	5,4	12,2	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	3,8	12,0	0,0	0,0	0,0
	0-14	CAPV	0,1	1,1	0,0	0,0	0,0
		Araba	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	0,1	0,9	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	0,1	1,5	0,0	0,0	0,0
	15-24	CAPV	0,7	3,8	0,0	0,0	0,0
		Araba	0,4	2,1	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	0,8	3,8	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	0,8	4,4	0,0	0,0	0,0
	25-44	CAPV	7,4	16,7	0,0	0,0	10,5
		Araba	7,6	14,3	0,0	0,0	14,0
		Gipuzkoa	9,6	17,4	0,0	0,0	18,0
		Bizkaia	6,0	16,8	0,0	0,0	0,0
	45-64	CAPV	5,2	11,3	0,0	0,0	0,0
		Araba	5,2	9,1	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	6,4	12,3	0,0	0,0	7,0
		Bizkaia	4,5	11,4	0,0	0,0	0,0
	65-74	CAPV	3,5	9,3	0,0	0,0	0,0
		Araba	3,1	7,3	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	4,1	10,0	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	3,2	9,6	0,0	0,0	0,0
	>=75	CAPV	2,8	9,2	0,0	0,0	0,0
		Araba	1,0	3,7	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	2,2	7,7	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	3,5	11,6	0,0	0,0	0,0
Mujeres	Total	CAPV	8,3	16,9	0,0	0,0	0,0
		Araba	8,6	14,4	0,0	0,0	3,5
		Gipuzkoa	8,6	15,9	0,0	0,0	6,5
		Bizkaia	8,1	18,5	0,0	0,0	0,0
	0-14	CAPV	0,2	2,9	0,0	0,0	0,0
		Araba	0,1	1,5	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	0,1	1,6	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	0,3	4,1	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Tabla 30. Distribución de la media de horas dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	15-24	CAPV	1,6	7,9	0,0	0,0	0,0
		Araba	1,6	6,8	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	1,2	5,4	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	1,8	10,3	0,0	0,0	0,0
	25-44	CAPV	18,6	26,4	0,0	0,0	37,0
		Araba	18,9	21,8	0,0	0,0	37,0
		Gipuzkoa	20,6	25,7	20,0	0,0	37,0
		Bizkaia	17,4	28,5	0,0	0,0	36,5
	45-64	CAPV	8,0	14,4	0,0	0,0	9,0
		Araba	7,5	11,9	0,0	0,0	7,0
		Gipuzkoa	7,4	12,9	0,0	0,0	7,0
		Bizkaia	8,4	16,4	0,0	0,0	10,0
	65-74	CAPV	3,8	9,5	0,0	0,0	0,0
		Araba	5,3	9,8	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	4,5	9,5	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	3,1	9,5	0,0	0,0	0,0
	>=75	CAPV	2,2	8,3	0,0	0,0	0,0
		Araba	1,6	6,4	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	2,3	7,7	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	2,3	9,4	0,0	0,0	0,0
Ambos sexos	Total	CAPV	6,4	14,7	0,0	0,0	0,0
		Araba	6,5	12,3	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	7,0	14,4	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	6,0	16,0	0,0	0,0	0,0
	0-14	CAPV	0,1	2,2	0,0	0,0	0,0
		Araba	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	0,1	1,3	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	0,2	3,1	0,0	0,0	0,0
	15-24	CAPV	1,1	6,2	0,0	0,0	0,0
		Araba	1,0	4,7	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	1,0	4,6	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	1,3	7,9	0,0	0,0	0,0
	25-44	CAPV	12,9	22,8	0,0	0,0	27,0
		Araba	13,1	19,2	0,0	0,0	28,0
		Gipuzkoa	14,9	22,6	0,0	0,0	28,5
		Bizkaia	11,6	24,4	0,0	0,0	23,0

(continuación)

Tabla 30. Distribución de la media de horas dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos 45-64	CAPV		6,6	13,1	0,0	0,0	4,0
	Araba		6,4	10,7	0,0	0,0	0,0
	Gipuzkoa		6,9	12,6	0,0	0,0	7,0
	Bizkaia		6,5	14,5	0,0	0,0	2,3
65-74	CAPV		3,7	9,4	0,0	0,0	0,0
	Araba		4,2	8,6	0,0	0,0	0,0
	Gipuzkoa		4,3	9,7	0,0	0,0	0,0
	Bizkaia		3,1	9,5	0,0	0,0	0,0
>=75	CAPV		2,4	8,7	0,0	0,0	0,0
	Araba		1,4	5,5	0,0	0,0	0,0
	Gipuzkoa		2,3	7,7	0,0	0,0	0,0
	Bizkaia		2,7	10,3	0,0	0,0	0,0

Tabla 31. Distribución de la media de horas dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Hombres	Total	Total	4,4	11,6	0,0	0,0	
		I	4,5	11,6	0,0	0,0	
		II	3,4	10,1	0,0	0,0	
		III	4,7	12,0	0,0	0,0	
		IV	4,5	11,6	0,0	0,0	
		V	4,2	12,3	0,0	0,0	
		0-14	Total	0,1	1,1	0,0	0,0
			I	0,0	0,0	0,0	0,0
			II	0,0	0,0	0,0	0,0
			III	0,1	1,0	0,0	0,0
			IV	0,1	1,6	0,0	0,0
			V	0,0	0,0	0,0	0,0
		15-24	Total	0,7	3,7	0,0	0,0
			I	0,2	1,3	0,0	0,0
			II	0,5	3,7	0,0	0,0
			III	0,7	3,1	0,0	0,0
			IV	0,7	3,8	0,0	0,0
			V	1,6	5,9	0,0	0,0
		25-44	Total	7,4	16,7	0,0	0,0
			I	8,4	17,3	0,0	11,0
			II	5,5	14,4	0,0	15,5
			III	8,4	17,9	0,0	0,0
			IV	7,6	16,6	0,0	16,0
			V	5,5	15,8	0,0	14,0
		45-64	Total	5,2	11,3	0,0	0,0
			I	5,9	11,7	0,0	0,0
			II	6,2	11,9	0,0	7,0
			III	6,2	11,8	0,0	7,0
			IV	6,2	11,8	0,0	9,0
			V	4,5	10,7	0,0	0,0
			V	5,0	12,2	0,0	0,0
		65-74	Total	3,5	9,3	0,0	0,0
			I	3,6	8,9	0,0	0,0
			II	1,5	6,3	0,0	0,0
			III	3,4	10,2	0,0	0,0
		IV	3,9	9,5	0,0	0,0	
		V	2,8	8,5	0,0	0,0	

(continuación)

Tabla 31. Distribución de la media de horas dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	>=75	Total	2,8	9,3	0,0	0,0	0,0
		I	3,1	10,2	0,0	0,0	0,0
		II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		III	3,3	10,1	0,0	0,0	0,0
		IV	2,8	9,2	0,0	0,0	0,0
		V	3,0	9,4	0,0	0,0	0,0
Mujeres	Total	Total	8,3	16,8	0,0	0,0	0,0
		I	6,1	15,5	0,0	0,0	0,0
		II	8,0	17,1	0,0	0,0	0,0
		III	8,7	16,8	0,0	0,0	7,0
		IV	8,4	16,9	0,0	0,0	0,0
		V	9,4	17,4	0,0	0,0	10,0
	0-14	Total	0,2	2,9	0,0	0,0	0,0
		I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		II	0,3	2,6	0,0	0,0	0,0
		III	0,1	1,3	0,0	0,0	0,0
		IV	0,5	5,0	0,0	0,0	0,0
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	Total	1,3	7,1	0,0	0,0	0,0
		I	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0
		II	0,5	4,1	0,0	0,0	0,0
		III	1,3	5,6	0,0	0,0	0,0
		IV	1,9	8,9	0,0	0,0	0,0
		V	3,0	11,1	0,0	0,0	0,0
	25-44	Total	18,6	26,3	0,0	0,0	37,0
		I	12,6	23,6	0,0	0,0	28,5
		II	16,8	26,0	0,0	0,0	35,0
		III	19,9	24,6	18,0	0,0	38,0
		IV	18,9	26,9	0,0	0,0	37,0
		V	22,9	29,2	20,0	0,0	40,8
	45-64	Total	8,0	14,4	0,0	0,0	9,0
		I	7,9	14,2	0,0	0,0	7,0
		II	7,6	14,4	0,0	0,0	8,5
		III	8,6	15,5	0,0	0,0	10,0
		IV	8,3	14,5	0,0	0,0	10,0
		V	6,8	12,7	0,0	0,0	2,5

(continuación)

Tabla 31. Distribución de la media de horas dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Mujeres	65-74	Total	3,8	9,6	0,0	0,0	0,0	
		I	1,5	5,4	0,0	0,0	0,0	
		II	5,2	11,7	0,0	0,0	0,0	
		III	4,6	10,5	0,0	0,0	0,0	
		IV	3,5	9,1	0,0	0,0	0,0	
		V	4,0	9,6	0,0	0,0	0,0	
	>=75	Total	2,2	8,4	0,0	0,0	0,0	
		I	1,0	6,7	0,0	0,0	0,0	
		II	1,2	4,9	0,0	0,0	0,0	
		III	1,7	7,1	0,0	0,0	0,0	
		IV	2,8	9,5	0,0	0,0	0,0	
		V	2,1	8,0	0,0	0,0	0,0	
	Ambos sexos	Total	Total	6,4	14,7	0,0	0,0	0,0
			I	5,3	13,6	0,0	0,0	0,0
II			5,8	14,5	0,0	0,0	0,0	
III			7,0	15,0	0,0	0,0	0,0	
IV			6,3	14,4	0,0	0,0	0,0	
V			7,6	16,2	0,0	0,0	0,0	
0-14		Total	0,1	2,2	0,0	0,0	0,0	
		I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		II	0,1	1,8	0,0	0,0	0,0	
		III	0,1	1,1	0,0	0,0	0,0	
		IV	0,3	3,5	0,0	0,0	0,0	
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15-24		Total	1,0	5,6	0,0	0,0	0,0	
		I	0,2	1,2	0,0	0,0	0,0	
		II	0,5	3,9	0,0	0,0	0,0	
		III	1,0	4,7	0,0	0,0	0,0	
		IV	1,2	6,6	0,0	0,0	0,0	
		V	2,3	8,6	0,0	0,0	0,0	
25-44		Total	12,8	22,8	0,0	0,0	27,0	
		I	10,5	20,8	0,0	0,0	21,0	
		II	11,6	22,4	0,0	0,0	26,0	
		III	14,8	22,9	0,0	0,0	30,0	
	IV	12,3	22,3	0,0	0,0	23,2		
	V	14,8	26,0	0,0	0,0	30,0		

(continuación)

Tabla 31. Distribución de la media de horas dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	45-64	Total	6,6	13,1	0,0	0,0	4,5
		I	6,8	12,9	0,0	0,0	7,0
		II	6,9	13,3	0,0	0,0	7,0
		III	7,5	14,2	0,0	0,0	9,0
		IV	6,1	12,6	0,0	0,0	0,0
		V	6,3	12,6	0,0	0,0	0,0
	65-74	Total	3,7	9,4	0,0	0,0	0,0
		I	2,8	7,9	0,0	0,0	0,0
		II	3,4	9,5	0,0	0,0	0,0
		III	4,0	10,4	0,0	0,0	0,0
		IV	3,7	9,3	0,0	0,0	0,0
		V	3,7	9,4	0,0	0,0	0,0
	>=75	Total	2,4	8,7	0,0	0,0	0,0
		I	1,9	8,4	0,0	0,0	0,0
		II	0,8	4,0	0,0	0,0	0,0
		III	2,3	8,5	0,0	0,0	0,0
		IV	2,8	9,4	0,0	0,0	0,0
		V	2,3	8,2	0,0	0,0	0,0

Tabla 32. Distribución de la media de horas dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Hombres	Total	Total	4,9	12,0	0,0	0,0	0,0	
		Sin estudios, primaria	3,2	10,1	0,0	0,0	0,0	
		Secundaria, inferior	5,1	12,2	0,0	0,0	0,0	
		Secundaria, superior	5,6	12,8	0,0	0,0	0,0	
		Terciaria	5,6	12,7	0,0	0,0	0,0	
	0-14	Total	0,2	1,8	0,0	0,0	0,0	
		Sin estudios, primaria	0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	
		Secundaria, inferior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		15-24	Total	0,7	3,8	0,0	0,0	0,0
			Sin estudios, primaria	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0
	Secundaria, inferior		1,2	5,3	0,0	0,0	0,0	
	Secundaria, superior		0,6	3,2	0,0	0,0	0,0	
	Terciaria		0,3	1,9	0,0	0,0	0,0	
	25-44	Total	7,4	16,7	0,0	0,0	10,5	
		Sin estudios, primaria	6,9	17,2	0,0	0,0	0,0	
		Secundaria, inferior	8,7	18,4	0,0	0,0	16,0	
		Secundaria, superior	7,5	16,3	0,0	0,0	14,0	
		Terciaria	6,7	16,0	0,0	0,0	0,0	
	45-64	Total	5,2	11,3	0,0	0,0	0,0	
		Sin estudios, primaria	4,0	10,0	0,0	0,0	0,0	
		Secundaria, inferior	5,5	11,6	0,0	0,0	3,5	
		Secundaria, superior	5,4	11,5	0,0	0,0	0,0	
		Terciaria	6,2	12,0	0,0	0,0	7,0	
	65-74	Total	3,5	9,3	0,0	0,0	0,0	
		Sin estudios, primaria	3,6	9,8	0,0	0,0	0,0	
		Secundaria, inferior	4,7	10,2	0,0	0,0	0,0	
		Secundaria, superior	3,8	9,5	0,0	0,0	0,0	
		Terciaria	1,4	5,7	0,0	0,0	0,0	
	>=75	Total	2,8	9,2	0,0	0,0	0,0	
		Sin estudios, primaria	2,7	9,2	0,0	0,0	0,0	
Secundaria, inferior		3,0	8,9	0,0	0,0	0,0		
Secundaria, superior		3,8	11,8	0,0	0,0	0,0		
Terciaria		1,5	5,1	0,0	0,0	0,0		

(continuación)

Tabla 32. Distribución de la media de horas dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	Total	9,1	17,2	0,0	0,0	9,0
		Sin estudios, primaria	5,0	12,8	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	9,0	17,0	0,0	0,0	9,0
		Secundaria, superior	11,8	19,3	0,0	0,0	23,0
		Terciaria	11,7	20,1	0,0	0,0	23,0
	0-14	Total	0,6	5,1	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	0,6	5,2	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	0,6	3,6	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	0,0	.	0,0	0,0	0,0
		Terciaria					
	15-24	Total	1,6	7,9	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	3,1	12,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	3,2	11,6	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	0,9	5,3	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	0,5	2,8	0,0	0,0	0,0
	25-44	Total	18,6	26,4	0,0	0,0	37,0
		Sin estudios, primaria	21,0	28,5	0,0	0,0	42,0
		Secundaria, inferior	22,6	28,5	19,5	0,0	37,0
		Secundaria, superior	19,4	25,8	14,0	0,0	37,0
		Terciaria	15,8	25,4	0,0	0,0	35,0
	45-64	Total	8,0	14,4	0,0	0,0	9,0
		Sin estudios, primaria	6,0	12,6	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	8,3	15,1	0,0	0,0	9,0
		Secundaria, superior	8,7	14,8	0,0	0,0	14,0
		Terciaria	8,8	15,1	0,0	0,0	13,0
	65-74	Total	3,8	9,5	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	3,9	9,8	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	3,5	8,2	0,0	0,0	0,0
Secundaria, superior		4,2	10,5	0,0	0,0	0,0	
Terciaria		3,8	9,7	0,0	0,0	0,0	
>=75	Total	2,2	8,3	0,0	0,0	0,0	
	Sin estudios, primaria	2,2	8,4	0,0	0,0	0,0	
	Secundaria, inferior	2,7	9,4	0,0	0,0	0,0	
	Secundaria, superior	0,9	3,7	0,0	0,0	0,0	
	Terciaria	2,2	7,5	0,0	0,0	0,0	

(continuación)

Tabla 32. Distribución de la media de horas dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Ambos sexos	Total	Total	7,1	15,1	0,0	0,0	
		Sin estudios, primaria	4,2	11,8	0,0	0,0	
		Secundaria, inferior	7,1	15,0	0,0	0,0	
		Secundaria, superior	8,5	16,5	0,0	0,0	
		Terciaria	8,9	17,4	0,0	13,0	
	0-14	Total	Total	0,4	3,7	0,0	0,0
			Sin estudios, primaria	0,4	3,9	0,0	0,0
			Secundaria, inferior	0,3	2,3	0,0	0,0
			Secundaria, superior	0,0	.	0,0	0,0
	15-24	Total	Total	1,1	6,2	0,0	0,0
			Sin estudios, primaria	1,6	8,5	0,0	0,0
			Secundaria, inferior	2,0	8,4	0,0	0,0
			Secundaria, superior	0,7	4,4	0,0	0,0
			Terciaria	0,4	2,5	0,0	0,0
	25-44	Total	Total	12,9	22,8	0,0	27,0
			Sin estudios, primaria	12,9	24,1	0,0	26,0
			Secundaria, inferior	14,6	24,6	0,0	28,0
			Secundaria, superior	12,9	22,2	0,0	27,0
			Terciaria	12,1	22,6	0,0	25,5
	45-64	Total	Total	6,6	13,1	0,0	4,0
		Sin estudios, primaria	5,1	11,6	0,0	0,0	
		Secundaria, inferior	7,0	13,8	0,0	7,0	
		Secundaria, superior	6,9	13,3	0,0	7,0	
		Terciaria	7,5	13,8	0,0	9,0	
65-74	Total	Total	3,7	9,4	0,0	0,0	
		Sin estudios, primaria	3,8	9,8	0,0	0,0	
		Secundaria, inferior	4,0	9,1	0,0	0,0	
		Secundaria, superior	3,9	9,8	0,0	0,0	
		Terciaria	2,3	7,5	0,0	0,0	
>=75	Total	Total	2,4	8,7	0,0	0,0	
		Sin estudios, primaria	2,4	8,7	0,0	0,0	
		Secundaria, inferior	2,8	9,2	0,0	0,0	
		Secundaria, superior	2,4	8,8	0,0	0,0	
		Terciaria	1,8	6,4	0,0	0,0	

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 33. Prevalencia (%) de familias que cuentan con alguna persona remunerada para realizar las labores del hogar por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	12,0	10,3	10,3	13,5
	0-14	16,5	10,6	14,4	20,9
	15-24	12,8	15,1	2,4	18,1
	25-44	7,1	3,6	3,4	10,3
	45-64	10,7	11,0	11,2	10,2
	65-74	11,9	7,6	8,6	14,9
	>=75	21,8	22,3	22,0	21,7
	Mujeres	Total	18,0	12,4	20,4
	15-24	4,0	11,4	5,1	0,0
	25-44	6,2	3,2	7,4	6,3
	45-64	13,3	3,7	13,4	16,0
	65-74	12,0	10,5	15,3	10,3
	>=75	34,4	31,2	36,6	33,6
Ambos sexos	Total	13,9	10,9	13,6	14,9
	0-14	16,5	10,6	14,4	20,9
	15-24	10,9	14,3	3,2	14,9
	25-44	6,8	3,5	4,6	9,0
	45-64	11,4	9,0	11,8	11,8
	65-74	11,9	8,5	10,7	13,6
	>=75	28,4	26,2	30,3	27,7

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 34. Prevalencia (%) de familias que cuentan con alguna persona remunerada para realizar las labores del hogar por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

		Clase social					
		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	12,0	27,6	14,6	10,8	6,5	6,6
	0-14	16,5	43,2	7,8	12,6	10,4	0,0
	15-24	12,8	32,9	14,7	5,8	4,8	0,0
	25-44	7,1	16,7	10,6	5,8	2,1	3,0
	45-64	10,7	28,2	9,2	10,2	5,2	1,2
	65-74	11,9	30,2	25,4	5,3	7,0	0,0
	>=75	21,8	56,0	40,3	26,1	13,9	26,0
	Mujeres	Total	18,0	23,1	20,8	14,4	18,7
	15-24	4,0	6,3	8,9	0,0	0,0	.
	25-44	6,2	10,9	4,7	5,0	3,7	0,0
	45-64	13,3	26,7	25,1	7,2	8,8	2,2
	65-74	12,0	27,7	14,3	14,1	8,3	8,7
	>=75	34,4	59,5	48,1	33,4	31,4	28,8
Ambos sexos	Total	13,9	26,3	17,0	12,1	9,3	12,0
	0-14	16,5	43,2	7,8	12,6	10,4	0,0
	15-24	10,9	25,3	13,5	4,7	3,7	0,0
	25-44	6,8	14,5	8,0	5,5	2,4	2,1
	45-64	11,4	27,8	15,2	9,1	5,6	1,7
	65-74	11,9	29,8	21,6	8,2	7,3	6,1
	>=75	28,4	57,7	45,1	29,9	21,6	28,1

Tabla 35. Prevalencia (%) de familias que cuentan con alguna persona remunerada para realizar las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

		Nivel de estudios				
		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	11,7	8,0	9,4	8,9	23,3
	0-14	11,0	10,4	15,4	.	.
	15-24	12,8	28,1	19,8	6,6	6,0
	25-44	7,1	0,0	3,8	2,9	17,1
	45-64	10,7	4,0	8,2	8,0	24,0
	65-74	11,9	2,9	9,9	17,9	25,6
	>=75	21,8	16,5	13,2	38,5	58,4
Mujeres	Total	18,0	18,2	19,7	14,1	20,8
	15-24	4,0	.	0,0	0,0	8,5
	25-44	6,2	0,0	0,0	6,5	7,4
	45-64	13,3	5,3	7,9	8,4	26,7
	65-74	12,0	7,2	8,2	21,0	30,3
	>=75	34,4	26,7	38,3	56,9	77,8
Ambos sexos	Total	13,8	11,8	12,5	10,3	22,4
	0-14	11,0	10,4	15,4	.	.
	15-24	10,9	28,1	18,4	5,3	7,5
	25-44	6,8	0,0	3,1	3,8	12,9
	45-64	11,4	4,3	8,1	8,1	24,9
	65-74	11,9	4,5	9,3	18,6	26,5
	>=75	28,4	21,9	27,5	46,9	66,9

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 36. Proporción (%) de personas que organizan sólo las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	9,3	10,8	9,0	9,1
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	0,7	1,4	0,9	0,4
	25-44	11,7	16,8	12,8	9,6
	45-64	10,9	9,9	10,2	11,5
	65-74	11,8	10,7	8,1	14,5
	>=75	18,0	20,6	17,1	17,8
	Mujeres	Total	41,1	37,1	41,5
	0-14	0,3	0,0	0,3	0,3
	15-24	2,9	6,0	1,6	2,8
	25-44	32,7	28,9	34,2	32,9
	45-64	59,5	55,6	60,2	60,1
	65-74	72,2	65,7	74,2	72,5
	>=75	61,2	57,5	61,3	61,9
Ambos sexos	Total	25,6	24,1	25,6	26,0
	0-14	0,1	0,0	0,1	0,2
	15-24	1,8	3,6	1,3	1,6
	25-44	22,0	22,7	23,2	21,1
	45-64	35,6	32,9	35,5	36,4
	65-74	44,1	39,2	43,0	46,0
	>=75	44,9	42,9	45,0	45,2

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 37. Proporción (%) de personas que organizan sólo las labores del hogar por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	9,4	8,0	8,2	7,9	10,4	10,8
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	0,7	0,0	0,0	0,0	1,2	2,4
	25-44	11,7	13,5	12,0	10,5	11,8	11,3
	45-64	10,9	9,8	10,5	9,9	11,4	12,0
	65-74	11,8	8,8	18,4	9,6	12,3	14,1
	>=75	18,0	21,5	10,7	15,2	19,1	20,9
	Mujeres	Total	41,2	28,7	30,4	39,2	44,4
	0-14	0,3	0,0	0,0	0,6	0,3	0,0
	15-24	2,9	1,0	0,0	1,8	5,4	4,4
	25-44	32,8	28,9	23,1	32,2	32,9	45,6
	45-64	59,6	57,9	53,9	59,3	62,4	58,5
	65-74	72,3	67,1	72,1	68,8	73,5	75,3
	>=75	61,7	61,6	59,0	57,7	63,2	63,1
Ambos sexos	Total	25,7	18,1	19,9	25,3	25,7	39,1
	0-14	0,1	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0
	15-24	1,8	0,5	0,0	1,0	3,1	3,3
	25-44	22,0	21,4	18,0	22,5	20,6	29,6
	45-64	35,7	31,5	33,1	38,0	32,5	46,1
	65-74	44,1	29,4	45,9	42,3	42,7	61,9
	>=75	45,2	44,5	42,9	40,6	44,0	55,3

Tabla 38. Proporción (%) de personas que organizan sólo las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	10,3	10,0	8,7	10,7	11,4
	0-14	0,0	0,0	0,0	.	.
	15-24	0,7	1,0	0,9	0,6	0,0
	25-44	11,7	9,4	11,0	11,9	12,9
	45-64	10,9	11,2	8,6	11,8	10,6
	65-74	11,8	10,5	12,9	13,0	12,4
	>=75	18,0	19,4	17,8	14,3	12,3
Mujeres	Total	45,0	50,4	51,4	42,3	35,5
	0-14	0,5	0,6	0,0	0,0	.
	15-24	2,9	3,7	1,9	3,3	2,4
	25-44	32,7	42,0	37,4	35,4	26,0
	45-64	59,5	59,5	63,9	60,2	54,0
	65-74	72,2	70,3	77,6	72,7	68,9
	>=75	61,2	59,7	63,4	68,9	63,1
Ambos sexos	Total	28,1	32,5	30,1	25,3	24,7
	0-14	0,2	0,3	0,0	0,0	.
	15-24	1,8	2,3	1,3	2,0	1,6
	25-44	22,0	23,3	22,3	22,5	20,6
	45-64	35,6	37,2	38,1	34,8	32,9
	65-74	44,1	47,1	51,4	34,0	34,0
	>=75	44,9	45,6	47,1	41,3	35,9

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 39. Proporción (%) de familias en las que una sólo persona organiza las labores del hogar por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	67,0	61,9	65,6	69,3
	0-14	55,6	45,4	60,8	55,7
	15-24	62,2	65,4	46,3	70,3
	25-44	64,3	63,5	62,5	65,6
	45-64	64,8	56,8	64,2	67,4
	65-74	73,4	71,1	70,5	75,8
	>=75	75,0	68,1	76,2	76,2
Mujeres	Total	80,7	76,6	82,0	80,9
	15-24	53,8	43,8	53,4	57,9
	25-44	64,6	65,0	63,4	65,1
	45-64	76,5	73,4	77,4	76,8
	65-74	90,8	81,4	93,2	91,8
	>=75	92,7	89,2	93,0	93,3
Ambos sexos	Total	71,4	66,1	71,0	73,1
	0-14	55,6	45,4	60,8	55,7
	15-24	60,3	61,1	48,3	68,1
	25-44	64,4	63,9	62,8	65,4
	45-64	67,9	61,3	67,7	69,9
	65-74	78,8	74,3	77,8	80,6
	>=75	84,2	77,4	85,7	84,9

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 40. Proporción (%) de familias en las que una sólo persona organiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

		Clase social					
		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	67,0	61,1	62,0	66,0	70,1	74,8
	0-14	55,6	64,4	33,8	56,9	64,0	78,2
	15-24	62,2	47,1	57,0	67,3	73,3	71,5
	25-44	64,3	57,4	62,4	61,6	68,5	75,0
	45-64	64,8	61,6	65,2	64,4	65,9	68,2
	65-74	73,4	66,4	71,3	72,2	76,1	83,9
	>=75	75,0	69,9	74,9	74,7	75,4	77,0
	Mujeres	Total	80,7	70,9	70,6	73,4	90,9
	15-24	53,8	49,1	58,8	42,2	68,1	.
	25-44	64,6	63,2	62,9	61,5	68,3	89,7
	45-64	76,5	73,5	62,2	72,1	88,9	96,3
	65-74	90,8	83,5	88,2	80,7	95,1	100,0
	>=75	92,7	89,7	89,3	84,0	96,0	99,2
Ambos sexos	Total	71,4	64,1	65,3	68,8	74,9	88,3
	0-14	55,6	64,4	33,8	56,9	64,0	78,2
	15-24	60,3	47,7	57,4	62,5	72,2	71,5
	25-44	64,4	59,6	62,6	61,5	68,5	79,1
	45-64	67,9	65,0	64,1	67,2	68,7	83,2
	65-74	78,8	69,5	77,0	75,0	81,0	95,2
	>=75	84,2	79,8	83,8	79,5	84,5	93,8

Tabla 41. Proporción (%) de familias en las que una sólo persona organiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

		Nivel de estudios				
		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	67,5	71,7	69,0	65,9	62,8
	0-14	64,1	65,0	57,4	.	.
	15-24	62,2	100,0	47,2	68,4	46,3
	25-44	64,3	70,8	67,2	63,5	62,2
	45-64	64,8	66,9	67,8	65,9	58,4
	65-74	73,4	74,1	81,8	67,8	72,3
	>=75	75,0	74,8	73,5	75,3	79,2
Mujeres	Total	80,7	90,7	87,0	74,4	68,9
	15-24	53,8	.	84,8	59,2	42,9
	25-44	64,6	75,1	71,8	63,9	63,3
	45-64	76,5	83,0	85,3	73,4	72,1
	65-74	90,8	89,6	88,8	97,2	90,5
	>=75	92,7	93,8	90,7	93,0	86,0
	Ambos sexos	Total	71,9	78,8	74,5	68,2
0-14		64,1	65,0	57,4	.	.
15-24		60,3	100,0	49,8	66,5	44,3
25-44		64,4	71,6	68,0	63,6	62,7
45-64		67,9	70,6	71,8	67,9	62,9
65-74		78,8	79,9	84,2	74,3	76,1
>=75		84,2	84,8	83,3	83,4	82,2

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 42. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y territorio histórico

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	CAPV	N	42.022	203.504	669.598	915.124
		%	4,6	22,2	73,2	100,0
	Araba	N	4.237	24.922	104.592	133.751
		%	3,2	18,6	78,2	100,0
	Gipuzkoa	N	14.179	58.318	221.314	293.812
		%	4,8	19,8	75,3	100,0
	Bizkaia	N	23.606	120.264	343.692	487.561
		%	4,8	24,7	70,5	100,0
15-24	CAPV	N	2.681	18.756	73.021	94.458
		%	2,8	19,9	77,3	100,0
	Araba	N	341	3.826	10.702	14.869
		%	2,3	25,7	72,0	100,0
	Gipuzkoa	N	1.818	3.266	26.221	31.305
		%	5,8	10,4	83,8	100,0
	Bizkaia	N	521	11.664	36.099	48.284
		%	1,1	24,2	74,8	100,0
25-44	CAPV	N	13.363	81.859	241.087	336.309
		%	4,0	24,3	71,7	100,0
	Araba	N	1.158	10.624	40.280	52.062
		%	2,2	20,4	77,4	100,0
	Gipuzkoa	N	5.063	20.770	80.957	106.790
		%	4,7	19,4	75,8	100,0
	Bizkaia	N	7.142	50.466	119.850	177.458
		%	4,0	28,4	67,5	100,0
45-64	CAPV	N	17.437	70.957	214.262	302.655
		%	5,8	23,4	70,8	100,0
	Araba	N	2.116	7.375	33.260	42.751
		%	5,0	17,3	77,8	100,0
	Gipuzkoa	N	4.633	23.691	69.095	97.419
		%	4,8	24,3	70,9	100,0
	Bizkaia	N	10.688	39.890	111.907	162.485
		%	6,6	24,6	68,9	100,0
65-74	CAPV	N	3.812	17.480	74.441	95.733
		%	4,0	18,3	77,8	100,0
	Araba	N	293	2.097	10.773	13.163
		%	2,2	15,9	81,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 42. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total	
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	1.501	5.469	25.160	32.130	
			%	4,7	17,0	78,3	100,0	
		Bizkaia	N	2.019	9.914	38.508	50.440	
			%	4,0	19,7	76,3	100,0	
	>=75	CAPV	N	4.729	14.452	66.786	85.968	
			%	5,5	16,8	77,7	100,0	
		Araba	N	328	1.000	9.577	10.905	
			%	3,0	9,2	87,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.165	5.123	19.881	26.168	
			%	4,5	19,6	76,0	100,0	
		Bizkaia	N	3.236	8.330	37.328	48.895	
			%	6,6	17,0	76,3	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	48.009	216.925	710.948	975.882
				%	4,9	22,2	72,9	100,0
		Araba	N	4.298	23.584	108.889	136.772	
			%	3,1	17,2	79,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	14.985	65.260	232.440	312.686	
			%	4,8	20,9	74,3	100,0	
		Bizkaia	N	28.727	128.081	369.618	526.425	
			%	5,5	24,3	70,2	100,0	
	15-24	CAPV	N	3.994	26.654	58.851	89.499	
			%	4,5	29,8	65,8	100,0	
			Araba	N	.	3.049	10.161	13.210
				%	.	23,1	76,9	100,0
			Gipuzkoa	N	1.617	7.155	20.671	29.443
				%	5,5	24,3	70,2	100,0
			Bizkaia	N	2.377	16.450	28.019	46.846
				%	5,1	35,1	59,8	100,0
		25-44	CAPV	N	17.522	69.485	233.818	320.826
				%	5,5	21,7	72,9	100,0
	Araba		N	2.431	7.410	38.027	47.869	
			%	5,1	15,5	79,4	100,0	
	Gipuzkoa		N	5.354	21.192	75.359	101.905	
			%	5,3	20,8	74,0	100,0	
	Bizkaia	N	9.737	40.883	120.431	171.052		
		%	5,7	23,9	70,4	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 42. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	17.387	75.708	220.674	313.769
			%	5,5	24,1	70,3	100,0
		Araba	N	1.436	7.889	34.939	44.263
			%	3,2	17,8	78,9	100,0
		Gipuzkoa	N	5.295	24.112	70.255	99.662
			%	5,3	24,2	70,5	100,0
	Bizkaia	N	10.656	43.707	115.480	169.843	
		%	6,3	25,7	68,0	100,0	
	65-74	CAPV	N	4.884	21.063	83.978	109.925
			%	4,4	19,2	76,4	100,0
		Araba	N	171	2.406	11.743	14.320
			%	1,2	16,8	82,0	100,0
		Gipuzkoa	N	1.663	5.042	29.416	36.120
			%	4,6	14,0	81,4	100,0
	Bizkaia	N	3.051	13.615	42.818	59.484	
		%	5,1	22,9	72,0	100,0	
	>=75	CAPV	N	4.222	24.015	113.628	141.864
			%	3,0	16,9	80,1	100,0
Araba		N	261	2.830	14.019	17.110	
		%	1,5	16,5	81,9	100,0	
Gipuzkoa		N	1.056	7.759	36.740	45.555	
		%	2,3	17,0	80,6	100,0	
Bizkaia	N	2.905	13.425	62.870	79.200		
	%	3,7	17,0	79,4	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	90.031	420.430	1.380.545	1.891.006
			%	4,8	22,2	73,0	100,0
	Araba	N	8.535	48.507	213.481	270.523	
		%	3,2	17,9	78,9	100,0	
	Gipuzkoa	N	29.164	123.578	453.755	606.497	
		%	4,8	20,4	74,8	100,0	
	Bizkaia	N	52.332	248.345	713.310	1.013.987	
		%	5,2	24,5	70,3	100,0	
	15-24	CAPV	N	6.675	45.411	131.872	183.958
			%	3,6	24,7	71,7	100,0
		Araba	N	341	6.875	20.863	28.079
			%	1,2	24,5	74,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 42. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	3.435	10.421	46.892	60.748
			%	5,7	17,2	77,2	100,0
		Bizkaia	N	2.898	28.114	64.117	95.130
			%	3,0	29,6	67,4	100,0
	25-44	CAPV	N	30.885	151.344	474.905	657.135
			%	4,7	23,0	72,3	100,0
		Araba	N	3.589	18.034	78.308	99.930
			%	3,6	18,0	78,4	100,0
		Gipuzkoa	N	10.417	41.961	156.316	208.695
			%	5,0	20,1	74,9	100,0
		Bizkaia	N	16.879	91.349	240.281	348.509
			%	4,8	26,2	68,9	100,0
	45-64	CAPV	N	34.823	146.665	434.936	616.424
			%	5,6	23,8	70,6	100,0
		Araba	N	3.552	15.265	68.198	87.015
			%	4,1	17,5	78,4	100,0
		Gipuzkoa	N	9.928	47.803	139.350	197.081
			%	5,0	24,3	70,7	100,0
		Bizkaia	N	21.344	83.597	227.388	332.328
			%	6,4	25,2	68,4	100,0
	65-74	CAPV	N	8.697	38.543	158.419	205.658
			%	4,2	18,7	77,0	100,0
		Araba	N	464	4.503	22.516	27.483
			%	1,7	16,4	81,9	100,0
		Gipuzkoa	N	3.163	10.511	54.576	68.251
			%	4,6	15,4	80,0	100,0
		Bizkaia	N	5.069	23.529	81.326	109.924
			%	4,6	21,4	74,0	100,0
	>=75	CAPV	N	8.951	38.467	180.414	227.832
			%	3,9	16,9	79,2	100,0
		Araba	N	589	3.830	23.596	28.015
			%	2,1	13,7	84,2	100,0
		Gipuzkoa	N	2.221	12.882	56.620	71.723
			%	3,1	18,0	78,9	100,0
		Bizkaia	N	6.141	21.755	100.198	128.094
			%	4,8	17,0	78,2	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	Total	Total N	42.022	203.504	668.337	913.863
		%	4,6	22,3	73,1	100,0
	I	N	3.372	27.039	83.279	113.690
		%	3,0	23,8	73,3	100,0
	II	N	3.020	15.169	60.017	78.206
		%	3,9	19,4	76,7	100,0
	III	N	9.583	39.241	139.531	188.355
		%	5,1	20,8	74,1	100,0
	IV	N	22.241	97.859	330.205	450.306
		%	4,9	21,7	73,3	100,0
	V	N	3.805	24.196	55.306	83.307
		%	4,6	29,0	66,4	100,0
	15-24	Total N	2.681	18.756	72.463	93.900
		%	2,9	20,0	77,2	100,0
	I	N	.	3.691	10.944	14.634
		%	.	25,2	74,8	100,0
	II	N	147	1.433	9.408	10.988
		%	1,3	13,0	85,6	100,0
	III	N	1.096	4.142	11.593	16.830
		%	6,5	24,6	68,9	100,0
	IV	N	1.243	8.124	33.370	42.737
		%	2,9	19,0	78,1	100,0
	V	N	195	1.367	7.149	8.711
		%	2,2	15,7	82,1	100,0
	25-44	Total N	13.363	81.859	241.087	336.309
		%	4,0	24,3	71,7	100,0
	I	N	1.208	8.580	33.944	43.732
		%	2,8	19,6	77,6	100,0
	II	N	967	5.959	25.570	32.496
		%	3,0	18,3	78,7	100,0
	III	N	2.940	16.736	42.580	62.257
		%	4,7	26,9	68,4	100,0
	IV	N	6.164	38.658	115.570	160.392
		%	3,8	24,1	72,1	100,0
	V	N	2.084	11.925	23.422	37.432
		%	5,6	31,9	62,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total	
Hombres	45-64	Total	N 17.437	70.957	213.975	302.368	
			% 5,8	23,5	70,8	100,0	
		I	N 1.294	11.259	25.353	37.907	
			% 3,4	29,7	66,9	100,0	
		II	N 1.491	5.488	16.440	23.419	
			% 6,4	23,4	70,2	100,0	
		III	N 3.938	12.962	49.422	66.322	
			% 5,9	19,5	74,5	100,0	
		IV	N 10.020	33.958	106.636	150.614	
			% 6,7	22,5	70,8	100,0	
		V	N 693	7.289	16.123	24.106	
			% 2,9	30,2	66,9	100,0	
		65-74	Total	N 3.812	17.480	74.441	95.733
			% 4,0	18,3	77,8	100,0	
		I	N 451	2.764	10.538	13.753	
			% 3,3	20,1	76,6	100,0	
		II	N 261	1.781	4.821	6.862	
			% 3,8	26,0	70,2	100,0	
	III	N 892	2.072	18.814	21.777		
		% 4,1	9,5	86,4	100,0		
	IV	N 1.734	9.439	36.580	47.753		
		% 3,6	19,8	76,6	100,0		
	V	N 475	1.425	3.689	5.588		
		% 8,5	25,5	66,0	100,0		
	>=75	Total	N 4.729	14.452	66.371	85.553	
		% 5,5	16,9	77,6	100,0		
	I	N 419	745	2.499	3.663		
		% 11,4	20,3	68,2	100,0		
	II	N 155	507	3.777	4.440		
		% 3,5	11,4	85,1	100,0		
	III	N 717	3.330	17.123	21.169		
		% 3,4	15,7	80,9	100,0		
	IV	N 3.080	7.681	38.049	48.810		
		% 6,3	15,7	78,0	100,0		
	V	N 359	2.190	4.922	7.470		
		% 4,8	29,3	65,9	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	Total	Total	N 47.740	216.135	709.617	973.492
			% 4,9	22,2	72,9	100,0
	I	N	4.885	22.422	77.531	104.838
		%	4,7	21,4	74,0	100,0
	II	N	4.670	23.699	66.659	95.028
		%	4,9	24,9	70,1	100,0
	III	N	13.442	49.068	179.597	242.107
		%	5,6	20,3	74,2	100,0
	IV	N	14.229	81.278	264.934	360.441
		%	3,9	22,5	73,5	100,0
	V	N	10.513	39.668	120.896	171.077
		%	6,1	23,2	70,7	100,0
	15-24	Total	N 3.994	26.447	58.092	88.533
		%	4,5	29,9	65,6	100,0
	I	N	594	4.601	9.366	14.562
		%	4,1	31,6	64,3	100,0
	II	N	653	4.148	8.697	13.497
		%	4,8	30,7	64,4	100,0
	III	N	410	5.309	14.351	20.069
		%	2,0	26,5	71,5	100,0
	IV	N	1.630	9.525	20.459	31.614
		%	5,2	30,1	64,7	100,0
	V	N	708	2.865	5.219	8.792
		%	8,1	32,6	59,4	100,0
	25-44	Total	N 17.253	69.260	233.818	320.330
		%	5,4	21,6	73,0	100,0
	I	N	781	11.354	32.951	45.086
		%	1,7	25,2	73,1	100,0
	II	N	1.072	8.069	28.082	37.223
		%	2,9	21,7	75,4	100,0
	III	N	7.027	13.263	61.740	82.029
		%	8,6	16,2	75,3	100,0
	IV	N	4.497	25.816	80.412	110.725
		%	4,1	23,3	72,6	100,0
	V	N	3.876	10.758	30.633	45.267
		%	8,6	23,8	67,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	Total	N 17.387	75.708	220.503	313.598
			% 5,5	24,1	70,3	100,0
		I	N 3.055	3.730	25.331	32.116
			% 9,5	11,6	78,9	100,0
		II	N 1.485	7.994	17.314	26.792
			% 5,5	29,8	64,6	100,0
		III	N 4.451	22.187	62.002	88.641
			% 5,0	25,0	69,9	100,0
		IV	N 4.305	25.123	74.674	104.102
			% 4,1	24,1	71,7	100,0
		V	N 4.091	16.674	41.181	61.946
			% 6,6	26,9	66,5	100,0
	65-74	Total	N 4.884	20.908	83.978	109.770
			% 4,4	19,0	76,5	100,0
		I	N 455	2.065	4.679	7.199
			% 6,3	28,7	65,0	100,0
		II	N 583	804	5.838	7.225
			% 8,1	11,1	80,8	100,0
		III	N 479	4.355	18.065	22.899
			% 2,1	19,0	78,9	100,0
		IV	N 2.141	10.633	37.361	50.134
			% 4,3	21,2	74,5	100,0
		V	N 1.227	3.051	18.035	22.312
			% 5,5	13,7	80,8	100,0
	>=75	Total	N 4.222	23.812	113.227	141.261
			% 3,0	16,9	80,2	100,0
		I	N .	671	5.204	5.875
			% .	11,4	88,6	100,0
		II	N 878	2.684	6.729	10.292
			% 8,5	26,1	65,4	100,0
		III	N 1.075	3.955	23.438	28.468
			% 3,8	13,9	82,3	100,0
		IV	N 1.656	10.182	52.028	63.866
			% 2,6	15,9	81,5	100,0
		V	N 612	6.320	25.828	32.760
			% 1,9	19,3	78,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	Total	Total	N 89.762	419.640	1.377.954	1.887.356
			% 4,8	22,2	73,0	100,0
	I	N	8.257	49.461	160.810	218.528
		%	3,8	22,6	73,6	100,0
	II	N	7.691	38.867	126.676	173.234
		%	4,4	22,4	73,1	100,0
	III	N	23.025	88.309	319.128	430.462
		%	5,3	20,5	74,1	100,0
	IV	N	36.470	179.138	595.139	810.747
		%	4,5	22,1	73,4	100,0
	V	N	14.319	63.864	176.202	254.385
		%	5,6	25,1	69,3	100,0
	15-24 Total	N	6.675	45.203	130.555	182.434
		%	3,7	24,8	71,6	100,0
	I	N	594	8.292	20.310	29.196
		%	2,0	28,4	69,6	100,0
	II	N	799	5.580	18.105	24.485
		%	3,3	22,8	73,9	100,0
	III	N	1.506	9.450	25.944	36.900
		%	4,1	25,6	70,3	100,0
	IV	N	2.873	17.649	53.829	74.351
		%	3,9	23,7	72,4	100,0
	V	N	903	4.232	12.368	17.503
		%	5,2	24,2	70,7	100,0
	25-44 Total	N	30.616	151.119	474.905	656.640
		%	4,7	23,0	72,3	100,0
	I	N	1.989	19.934	66.895	88.818
		%	2,2	22,4	75,3	100,0
	II	N	2.039	14.028	53.652	69.719
		%	2,9	20,1	77,0	100,0
	III	N	9.967	29.999	104.321	144.286
		%	6,9	20,8	72,3	100,0
	IV	N	10.661	64.474	195.983	271.117
		%	3,9	23,8	72,3	100,0
	V	N	5.960	22.684	54.055	82.699
		%	7,2	27,4	65,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	45-64	Total	N	34.823	146.665	434.477	615.965
			%	5,7	23,8	70,5	100,0
		I	N	4.350	14.989	50.684	70.023
			%	6,2	21,4	72,4	100,0
		II	N	2.976	13.482	33.754	50.212
			%	5,9	26,9	67,2	100,0
		III	N	8.389	35.149	111.424	154.963
			%	5,4	22,7	71,9	100,0
		IV	N	14.325	59.081	181.310	254.716
			%	5,6	23,2	71,2	100,0
		V	N	4.784	23.963	57.305	86.052
			%	5,6	27,8	66,6	100,0
	65-74	Total	N	8.697	38.388	158.419	205.503
			%	4,2	18,7	77,1	100,0
		I	N	906	4.829	15.217	20.952
			%	4,3	23,0	72,6	100,0
		II	N	843	2.585	10.658	14.087
			%	6,0	18,4	75,7	100,0
		III	N	1.371	6.426	36.879	44.676
			%	3,1	14,4	82,5	100,0
		IV	N	3.875	20.071	73.941	97.887
			%	4,0	20,5	75,5	100,0
		V	N	1.701	4.475	21.724	27.901
			%	6,1	16,0	77,9	100,0
	>=75	Total	N	8.951	38.265	179.598	226.814
			%	3,9	16,9	79,2	100,0
		I	N	419	1.416	7.703	9.538
			%	4,4	14,8	80,8	100,0
		II	N	1.033	3.191	10.507	14.731
			%	7,0	21,7	71,3	100,0
		III	N	1.792	7.285	40.561	49.638
			%	3,6	14,7	81,7	100,0
		IV	N	4.736	17.863	90.077	112.676
			%	4,2	15,9	79,9	100,0
		V	N	971	8.510	30.750	40.231
			%	2,4	21,2	76,4	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 44. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	Total	N	42.022	203.504	669.598	915.124
		%	4,6	22,2	73,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	11.561	42.700	156.339	210.600
		%	5,5	20,3	74,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	7.204	44.154	116.096	167.454
		%	4,3	26,4	69,3	100,0
	Secundaria, superior	N	15.419	78.959	266.293	360.670
		%	4,3	21,9	73,8	100,0
	Terciaria	N	7.838	37.691	130.871	176.400
		%	4,4	21,4	74,2	100,0
15-24	Total	N	2.681	18.756	73.021	94.458
		%	2,8	19,9	77,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	2.921	6.997	9.918
		%	.	29,4	70,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.109	6.507	23.513	31.129
		%	3,6	20,9	75,5	100,0
	Secundaria, superior	N	1.377	8.321	33.142	42.840
		%	3,2	19,4	77,4	100,0
	Terciaria	N	195	1.009	9.369	10.572
		%	1,8	9,5	88,6	100,0
25-44	Total	N	13.363	81.859	241.087	336.309
		%	4,0	24,3	71,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.705	9.334	25.737	37.776
		%	7,2	24,7	68,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.464	16.850	34.495	52.808
		%	2,8	31,9	65,3	100,0
	Secundaria, superior	N	6.101	39.091	119.082	164.274
		%	3,7	23,8	72,5	100,0
	Terciaria	N	3.093	16.584	61.774	81.451
		%	3,8	20,4	75,8	100,0
45-64	Total	N	17.437	70.957	214.262	302.655
		%	5,8	23,4	70,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.934	15.684	50.782	70.400
		%	5,6	22,3	72,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.991	14.759	35.494	53.244
		%	5,6	27,7	66,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 44. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	7.162	24.916	85.052	117.130
			%	6,1	21,3	72,6	100,0
		Terciaria	N	3.349	15.598	42.934	61.881
			%	5,4	25,2	69,4	100,0
	65-74	Total	N	3.812	17.480	74.441	95.733
			%	4,0	18,3	77,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.431	6.430	29.157	38.017
			%	6,4	16,9	76,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	654	3.293	12.344	16.291
			%	4,0	20,2	75,8	100,0
		Secundaria, superior	N	503	4.362	21.082	25.948
			%	1,9	16,8	81,2	100,0
		Terciaria	N	224	3.395	11.858	15.477
			%	1,4	21,9	76,6	100,0
	>=75	Total	N	4.729	14.452	66.786	85.968
			%	5,5	16,8	77,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.491	8.332	43.666	54.489
			%	4,6	15,3	80,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	986	2.745	10.250	13.981
			%	7,1	19,6	73,3	100,0
		Secundaria, superior	N	275	2.269	7.934	10.478
			%	2,6	21,7	75,7	100,0
		Terciaria	N	977	1.106	4.937	7.020
			%	13,9	15,8	70,3	100,0
Mujeres	Total	Total	N	48.009	216.925	710.948	975.882
			%	4,9	22,2	72,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	11.399	57.074	209.854	278.327
			%	4,1	20,5	75,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	11.707	36.424	121.635	169.766
			%	6,9	21,5	71,6	100,0
		Secundaria, superior	N	12.587	73.325	221.954	307.866
			%	4,1	23,8	72,1	100,0
		Terciaria	N	12.316	50.102	157.504	219.923
			%	5,6	22,8	71,6	100,0
	15-24	Total	N	3.994	26.654	58.851	89.499
			%	4,5	29,8	65,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 44. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	971	3.160	7.255	11.386
			%	8,5	27,8	63,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.553	3.208	12.002	16.763
			%	9,3	19,1	71,6	100,0
		Secundaria, superior	N	1.091	14.786	29.566	45.443
			%	2,4	32,5	65,1	100,0
		Terciaria	N	379	5.500	10.028	15.907
			%	2,4	34,6	63,0	100,0
	25-44	Total	N	17.522	69.485	233.818	320.826
			%	5,5	21,7	72,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	463	5.496	20.030	25.990
			%	1,8	21,1	77,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.059	8.224	25.654	38.937
			%	13,0	21,1	65,9	100,0
		Secundaria, superior	N	6.022	26.328	98.137	130.487
			%	4,6	20,2	75,2	100,0
		Terciaria	N	5.978	29.437	89.997	125.412
			%	4,8	23,5	71,8	100,0
	45-64	Total	N	17.387	75.708	220.674	313.769
			%	5,5	24,1	70,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.397	19.686	53.880	77.963
			%	5,6	25,2	69,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.409	16.015	42.311	61.735
			%	5,5	25,9	68,5	100,0
		Secundaria, superior	N	4.584	27.537	78.201	110.322
			%	4,2	25,0	70,9	100,0
		Terciaria	N	4.997	12.471	46.281	63.749
			%	7,8	19,6	72,6	100,0
	65-74	Total	N	4.884	21.063	83.978	109.925
			%	4,4	19,2	76,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.964	11.228	47.660	61.852
			%	4,8	18,2	77,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	852	5.621	20.979	27.452
			%	3,1	20,5	76,4	100,0
		Secundaria, superior	N	272	2.793	8.828	11.893
			%	2,3	23,5	74,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 44. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total		
Mujeres	65-74	Terciaria	N	796	1.421	6.510	8.727		
			%	9,1	16,3	74,6	100,0		
	>=75	Total	N	4.222	24.015	113.628	141.864		
			%	3,0	16,9	80,1	100,0		
		Sin estudios, primaria	N	2.604	17.503	81.029	101.136		
			%	2,6	17,3	80,1	100,0		
		Secundaria, inferior	N	833	3.356	20.690	24.879		
			%	3,3	13,5	83,2	100,0		
		Secundaria, superior	N	618	1.881	7.222	9.720		
			%	6,4	19,3	74,3	100,0		
		Terciaria	N	166	1.274	4.688	6.129		
			%	2,7	20,8	76,5	100,0		
		Ambos	Total	Total	N	90.031	420.430	1.380.545	1.891.006
					%	4,8	22,2	73,0	100,0
			Sin estudios, primaria	N	22.960	99.774	366.193	488.927	
				%	4,7	20,4	74,9	100,0	
			Secundaria, inferior	N	18.911	80.578	237.731	337.220	
				%	5,6	23,9	70,5	100,0	
Secundaria, superior	N		28.006	152.284	488.246	668.536			
	%		4,2	22,8	73,0	100,0			
Terciaria	N		20.154	87.794	288.375	396.323			
	%		5,1	22,2	72,8	100,0			
15-24	Total		N	6.675	45.411	131.872	183.958		
			%	3,6	24,7	71,7	100,0		
	Sin estudios, primaria		N	971	6.081	14.253	21.304		
			%	4,6	28,5	66,9	100,0		
	Secundaria, inferior		N	2.662	9.715	35.515	47.891		
			%	5,6	20,3	74,2	100,0		
	Secundaria, superior		N	2.468	23.107	62.708	88.283		
			%	2,8	26,2	71,0	100,0		
	Terciaria	N	574	6.508	19.396	26.479			
		%	2,2	24,6	73,3	100,0			
	25-44	Total	N	30.885	151.344	474.905	657.135		
			%	4,7	23,0	72,3	100,0		
Sin estudios, primaria		N	3.168	14.830	45.767	63.765			
		%	5,0	23,3	71,8	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 44. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	6.523	25.074	60.148	91.745
			%	7,1	27,3	65,6	100,0
		Secundaria, superior	N	12.123	65.419	217.219	294.762
			%	4,1	22,2	73,7	100,0
		Terciaria	N	9.071	46.021	151.771	206.862
			%	4,4	22,2	73,4	100,0
	45-64	Total	N	34.823	146.665	434.936	616.424
			%	5,6	23,8	70,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.331	35.369	104.662	148.363
			%	5,6	23,8	70,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.400	30.774	77.805	114.979
			%	5,6	26,8	67,7	100,0
		Secundaria, superior	N	11.746	52.452	163.253	227.452
			%	5,2	23,1	71,8	100,0
		Terciaria	N	8.346	28.069	89.215	125.630
			%	6,6	22,3	71,0	100,0
	65-74	Total	N	8.697	38.543	158.419	205.658
			%	4,2	18,7	77,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.395	17.658	76.817	99.869
			%	5,4	17,7	76,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.506	8.914	33.323	43.744
			%	3,4	20,4	76,2	100,0
		Secundaria, superior	N	776	7.155	29.910	37.841
			%	2,0	18,9	79,0	100,0
		Terciaria	N	1.020	4.815	18.369	24.204
			%	4,2	19,9	75,9	100,0
	>=75	Total	N	8.951	38.467	180.414	227.832
			%	3,9	16,9	79,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.095	25.836	124.694	155.625
			%	3,3	16,6	80,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.819	6.102	30.939	38.860
			%	4,7	15,7	79,6	100,0
		Secundaria, superior	N	893	4.150	15.155	20.198
			%	4,4	20,5	75,0	100,0
		Terciaria	N	1.144	2.380	9.625	13.149
			%	8,7	18,1	73,2	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 45. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y territorio histórico

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	CAPV	N	14.804	96.062	804.258	915.124
		%	1,6	10,5	87,9	100,0
	Araba	N	304	10.056	123.391	133.751
		%	0,2	7,5	92,3	100,0
	Gipuzkoa	N	7.226	35.736	250.850	293.812
		%	2,5	12,2	85,4	100,0
	Bizkaia	N	7.274	50.270	430.017	487.561
		%	1,5	10,3	88,2	100,0
15-24	CAPV	N	1.762	6.573	86.124	94.458
		%	1,9	7,0	91,2	100,0
	Araba	N	.	1.199	13.670	14.869
		%	.	8,1	91,9	100,0
	Gipuzkoa	N	1.116	3.645	26.544	31.305
		%	3,6	11,6	84,8	100,0
	Bizkaia	N	645	1.729	45.910	48.284
		%	1,3	3,6	95,1	100,0
25-44	CAPV	N	6.471	34.781	295.057	336.309
		%	1,9	10,3	87,7	100,0
	Araba	N	224	3.517	48.321	52.062
		%	0,4	6,8	92,8	100,0
	Gipuzkoa	N	3.276	12.470	91.044	106.790
		%	3,1	11,7	85,3	100,0
	Bizkaia	N	2.971	18.794	155.692	177.458
		%	1,7	10,6	87,7	100,0
45-64	CAPV	N	4.160	35.860	262.635	302.655
		%	1,4	11,8	86,8	100,0
	Araba	N	.	3.911	38.840	42.751
		%	.	9,1	90,9	100,0
	Gipuzkoa	N	2.052	13.502	81.866	97.419
		%	2,1	13,9	84,0	100,0
	Bizkaia	N	2.109	18.448	141.929	162.485
		%	1,3	11,4	87,3	100,0
65-74	CAPV	N	1.191	10.170	84.373	95.733
		%	1,2	10,6	88,1	100,0
	Araba	N	80	1.191	11.893	13.163
		%	0,6	9,0	90,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 45. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total	
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	782	3.293	28.055	32.130	
			%	2,4	10,2	87,3	100,0	
		Bizkaia	N	328	5.686	44.426	50.440	
			%	0,7	11,3	88,1	100,0	
	>=75	CAPV	N	1.221	8.678	76.069	85.968	
			%	1,4	10,1	88,5	100,0	
		Araba	N	.	238	10.667	10.905	
			%	.	2,2	97,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	.	2.826	23.342	26.168	
			%	.	10,8	89,2	100,0	
		Bizkaia	N	1.221	5.613	42.061	48.895	
			%	2,5	11,5	86,0	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	23.752	118.422	833.709	975.882
				%	2,4	12,1	85,4	100,0
		Araba	N	1.895	11.476	123.400	136.772	
			%	1,4	8,4	90,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	13.036	43.721	255.929	312.686		
		%	4,2	14,0	81,8	100,0		
	Bizkaia	N	8.821	63.225	454.379	526.425		
		%	1,7	12,0	86,3	100,0		
	15-24	CAPV	N	1.850	8.917	78.732	89.499	
			%	2,1	10,0	88,0	100,0	
		Araba	N	.	1.011	12.198	13.210	
			%	.	7,7	92,3	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.073	2.682	25.689	29.443	
			%	3,6	9,1	87,2	100,0	
	Bizkaia	N	778	5.224	40.844	46.846		
		%	1,7	11,2	87,2	100,0		
	25-44	CAPV	N	9.245	38.080	273.501	320.826	
			%	2,9	11,9	85,2	100,0	
Araba		N	755	3.951	43.163	47.869		
		%	1,6	8,3	90,2	100,0		
Gipuzkoa		N	6.198	14.287	81.420	101.905		
		%	6,1	14,0	79,9	100,0		
Bizkaia	N	2.292	19.842	148.918	171.052			
	%	1,3	11,6	87,1	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 45. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	7.986	45.681	260.102	313.769
			%	2,5	14,6	82,9	100,0
		Araba	N	940	4.513	38.810	44.263
			%	2,1	10,2	87,7	100,0
		Gipuzkoa	N	3.736	17.609	78.317	99.662
			%	3,7	17,7	78,6	100,0
	Bizkaia	N	3.309	23.559	142.975	169.843	
		%	1,9	13,9	84,2	100,0	
	65-74	CAPV	N	2.327	15.291	92.307	109.925
			%	2,1	13,9	84,0	100,0
		Araba	N	98	1.000	13.223	14.320
			%	0,7	7,0	92,3	100,0
		Gipuzkoa	N	802	4.982	30.336	36.120
			%	2,2	13,8	84,0	100,0
	Bizkaia	N	1.427	9.309	48.748	59.484	
		%	2,4	15,6	82,0	100,0	
	>=75	CAPV	N	2.344	10.454	129.067	141.864
			%	1,7	7,4	91,0	100,0
Araba		N	103	1.001	16.007	17.110	
		%	0,6	5,8	93,6	100,0	
Gipuzkoa		N	1.227	4.161	40.167	45.555	
		%	2,7	9,1	88,2	100,0	
Bizkaia	N	1.014	5.292	72.893	79.200		
	%	1,3	6,7	92,0	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	38.556	214.484	1.637.966	1.891.006
			%	2,0	11,3	86,6	100,0
	Araba	N	2.199	21.532	246.792	270.523	
		%	0,8	8,0	91,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	20.262	79.457	506.779	606.497	
		%	3,3	13,1	83,6	100,0	
	Bizkaia	N	16.096	113.495	884.396	1.013.987	
		%	1,6	11,2	87,2	100,0	
	15-24	CAPV	N	3.612	15.490	164.856	183.958
			%	2,0	8,4	89,6	100,0
		Araba	N	.	2.211	25.869	28.079
			%	.	7,9	92,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 45. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	2.189	6.326	52.232	60.748
			%	3,6	10,4	86,0	100,0
		Bizkaia	N	1.423	6.953	86.754	95.130
			%	1,5	7,3	91,2	100,0
	25-44	CAPV	N	15.716	72.861	568.558	657.135
			%	2,4	11,1	86,5	100,0
		Araba	N	979	7.468	91.484	99.930
			%	1,0	7,5	91,5	100,0
		Gipuzkoa	N	9.474	26.757	172.464	208.695
			%	4,5	12,8	82,6	100,0
		Bizkaia	N	5.264	38.636	304.610	348.509
			%	1,5	11,1	87,4	100,0
	45-64	CAPV	N	12.146	81.541	522.737	616.424
			%	2,0	13,2	84,8	100,0
		Araba	N	940	8.424	77.651	87.015
			%	1,1	9,7	89,2	100,0
		Gipuzkoa	N	5.788	31.110	160.182	197.081
			%	2,9	15,8	81,3	100,0
		Bizkaia	N	5.418	42.007	284.904	332.328
			%	1,6	12,6	85,7	100,0
	65-74	CAPV	N	3.518	25.460	176.680	205.658
			%	1,7	12,4	85,9	100,0
		Araba	N	178	2.191	25.115	27.483
			%	0,6	8,0	91,4	100,0
		Gipuzkoa	N	1.584	8.276	58.391	68.251
			%	2,3	12,1	85,6	100,0
		Bizkaia	N	1.756	14.994	93.174	109.924
			%	1,6	13,6	84,8	100,0
	>=75	CAPV	N	3.564	19.132	205.136	227.832
			%	1,6	8,4	90,0	100,0
		Araba	N	103	1.239	26.673	28.015
			%	0,4	4,4	95,2	100,0
		Gipuzkoa	N	1.227	6.987	63.509	71.723
			%	1,7	9,7	88,5	100,0
		Bizkaia	N	2.235	10.906	114.954	128.094
			%	1,7	8,5	89,7	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 46. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social

		Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	Total	Total N 14.804	95.802	803.257	913.863
		% 1,6	10,5	87,9	100,0
	I	N 1.411	11.004	101.275	113.690
		% 1,2	9,7	89,1	100,0
	II	N 1.242	4.478	72.486	78.206
		% 1,6	5,7	92,7	100,0
	III	N 1.318	19.937	167.100	188.355
		% 0,7	10,6	88,7	100,0
	IV	N 9.781	50.046	390.479	450.306
		% 2,2	11,1	86,7	100,0
	V	N 1.052	10.337	71.918	83.307
		% 1,3	12,4	86,3	100,0
	15-24	Total N 1.762	6.312	85.826	93.900
		% 1,9	6,7	91,4	100,0
	I	N .	1.248	13.386	14.634
		% .	8,5	91,5	100,0
	II	N .	.	10.988	10.988
		% .	.	100,0	100,0
	III	N .	1.209	15.622	16.830
		% .	7,2	92,8	100,0
	IV	N 1.762	3.271	37.705	42.737
		% 4,1	7,7	88,2	100,0
	V	N .	585	8.126	8.711
		% .	6,7	93,3	100,0
	25-44	Total N 6.471	34.781	295.057	336.309
		% 1,9	10,3	87,7	100,0
	I	N 473	3.553	39.706	43.732
		% 1,1	8,1	90,8	100,0
	II	N 628	1.573	30.296	32.496
		% 1,9	4,8	93,2	100,0
	III	N 812	7.513	53.932	62.257
		% 1,3	12,1	86,6	100,0
	IV	N 4.241	17.680	138.470	160.392
		% 2,6	11,0	86,3	100,0
	V	N 317	4.463	32.652	37.432
		% 0,8	11,9	87,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 46. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total	
Hombres 45-64	Total	N	4.160	35.860	262.347	302.368	
		%	1,4	11,9	86,8	100,0	
	I	N	938	4.657	32.311	37.907	
		%	2,5	12,3	85,2	100,0	
	II	N	490	2.353	20.576	23.419	
		%	2,1	10,0	87,9	100,0	
	III	N	285	7.814	58.223	66.322	
		%	0,4	11,8	87,8	100,0	
	IV	N	2.447	18.225	129.942	150.614	
		%	1,6	12,1	86,3	100,0	
	V	N	.	2.812	21.294	24.106	
		%	.	11,7	88,3	100,0	
	65-74	Total	N	1.191	10.170	84.373	95.733
			%	1,2	10,6	88,1	100,0
	I	N	.	1.180	12.573	13.753	
		%	.	8,6	91,4	100,0	
	II	N	124	397	6.341	6.862	
		%	1,8	5,8	92,4	100,0	
	III	N	221	1.086	20.469	21.777	
		%	1,0	5,0	94,0	100,0	
	IV	N	641	6.492	40.620	47.753	
		%	1,3	13,6	85,1	100,0	
	V	N	205	1.014	4.369	5.588	
		%	3,7	18,2	78,2	100,0	
	>=75	Total	N	1.221	8.678	75.654	85.553
			%	1,4	10,1	88,4	100,0
	I	N	.	365	3.298	3.663	
		%	.	10,0	90,0	100,0	
	II	N	.	155	4.285	4.440	
		%	.	3,5	96,5	100,0	
	III	N	.	2.316	18.853	21.169	
		%	.	10,9	89,1	100,0	
	IV	N	690	4.378	43.742	48.810	
		%	1,4	9,0	89,6	100,0	
	V	N	531	1.463	5.476	7.470	
		%	7,1	19,6	73,3	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 46. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	Total	Total	N 23.649	117.786	832.057	973.492
			% 2,4	12,1	85,5	100,0
	I	N	1.148	10.548	93.143	104.838
		%	1,1	10,1	88,8	100,0
	II	N	942	10.045	84.041	95.028
		%	1,0	10,6	88,4	100,0
	III	N	5.252	29.048	207.808	242.107
		%	2,2	12,0	85,8	100,0
	IV	N	9.365	46.687	304.389	360.441
		%	2,6	13,0	84,4	100,0
	V	N	6.942	21.458	142.677	171.077
		%	4,1	12,5	83,4	100,0
	15-24	Total	N 1.850	8.662	78.022	88.533
		%	2,1	9,8	88,1	100,0
	I	N	.	936	13.625	14.562
		%	.	6,4	93,6	100,0
	II	N	.	379	13.117	13.497
		%	.	2,8	97,2	100,0
	III	N	585	1.928	17.557	20.069
		%	2,9	9,6	87,5	100,0
	IV	N	550	4.220	26.844	31.614
		%	1,7	13,4	84,9	100,0
	V	N	716	1.198	6.879	8.792
		%	8,1	13,6	78,2	100,0
	25-44	Total	N 9.245	37.854	273.231	320.330
		%	2,9	11,8	85,3	100,0
	I	N	680	4.063	40.342	45.086
		%	1,5	9,0	89,5	100,0
	II	N	255	4.100	32.868	37.223
		%	0,7	11,0	88,3	100,0
	III	N	2.304	9.182	70.544	82.029
		%	2,8	11,2	86,0	100,0
	IV	N	3.395	15.379	91.951	110.725
		%	3,1	13,9	83,0	100,0
	V	N	2.611	5.130	37.526	45.267
		%	5,8	11,3	82,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 46. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	Total	N 7.986	45.681	259.931	313.598
			% 2,5	14,6	82,9	100,0
	I	N	467	4.272	27.378	32.116
		%	1,5	13,3	85,2	100,0
	II	N	554	4.102	22.137	26.792
		%	2,1	15,3	82,6	100,0
	III	N	1.410	12.658	74.573	88.641
		%	1,6	14,3	84,1	100,0
	IV	N	3.110	15.979	85.013	104.102
		%	3,0	15,3	81,7	100,0
	V	N	2.444	8.671	50.831	61.946
		%	3,9	14,0	82,1	100,0
	65-74	Total	N 2.327	15.135	92.307	109.770
		%	2,1	13,8	84,1	100,0
	I	N	.	1.110	6.089	7.199
		%	.	15,4	84,6	100,0
	II	N	133	1.126	5.965	7.225
		%	1,8	15,6	82,6	100,0
	III	N	536	2.697	19.666	22.899
		%	2,3	11,8	85,9	100,0
	IV	N	962	7.373	41.799	50.134
		%	1,9	14,7	83,4	100,0
	V	N	695	2.829	18.788	22.312
		%	3,1	12,7	84,2	100,0
	>=75	Total	N 2.241	10.454	128.566	141.261
		%	1,6	7,4	91,0	100,0
	I	N	.	166	5.708	5.875
		%	.	2,8	97,2	100,0
	II	N	.	338	9.954	10.292
		%	.	3,3	96,7	100,0
	III	N	418	2.583	25.468	28.468
		%	1,5	9,1	89,5	100,0
	IV	N	1.348	3.735	58.783	63.866
		%	2,1	5,8	92,0	100,0
	V	N	476	3.631	28.653	32.760
		%	1,5	11,1	87,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 46. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	Total	Total	N	38.453	213.587	1.635.315	1.887.356
			%	2,0	11,3	86,6	100,0
	I	N		2.559	21.552	194.417	218.528
			%	1,2	9,9	89,0	100,0
	II	N		2.184	14.523	156.527	173.234
			%	1,3	8,4	90,4	100,0
	III	N		6.570	48.985	374.907	430.462
			%	1,5	11,4	87,1	100,0
	IV	N		19.146	96.733	694.868	810.747
			%	2,4	11,9	85,7	100,0
	V	N		7.995	31.795	214.595	254.385
			%	3,1	12,5	84,4	100,0
	15-24	Total	N	3.612	14.974	163.848	182.434
			%	2,0	8,2	89,8	100,0
	I	N		.	2.185	27.011	29.196
			%	.	7,5	92,5	100,0
	II	N		.	379	24.105	24.485
			%	.	1,5	98,5	100,0
	III	N		585	3.136	33.178	36.900
			%	1,6	8,5	89,9	100,0
	IV	N		2.311	7.491	64.548	74.351
			%	3,1	10,1	86,8	100,0
	V	N		716	1.782	15.005	17.503
			%	4,1	10,2	85,7	100,0
	25-44	Total	N	15.716	72.635	568.288	656.640
			%	2,4	11,1	86,5	100,0
	I	N		1.153	7.616	80.048	88.818
			%	1,3	8,6	90,1	100,0
	II	N		882	5.673	63.164	69.719
			%	1,3	8,1	90,6	100,0
	III	N		3.116	16.694	124.476	144.286
			%	2,2	11,6	86,3	100,0
	IV	N		7.637	33.060	230.421	271.117
			%	2,8	12,2	85,0	100,0
	V	N		2.928	9.592	70.179	82.699
			%	3,5	11,6	84,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 46. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	45-64	Total	N 12.146	81.541	522.278	615.965
			% 2,0	13,2	84,8	100,0
	I	N	1.405	8.929	59.689	70.023
		%	2,0	12,8	85,2	100,0
	II	N	1.044	6.455	42.713	50.212
		%	2,1	12,9	85,1	100,0
	III	N	1.694	20.472	132.797	154.963
		%	1,1	13,2	85,7	100,0
	IV	N	5.557	34.204	214.955	254.716
		%	2,2	13,4	84,4	100,0
	V	N	2.444	11.483	72.125	86.052
		%	2,8	13,3	83,8	100,0
	65-74	Total	N 3.518	25.305	176.680	205.503
		%	1,7	12,3	86,0	100,0
	I	N	.	2.290	18.662	20.952
		%	.	10,9	89,1	100,0
	II	N	257	1.523	12.307	14.087
		%	1,8	10,8	87,4	100,0
	III	N	757	3.783	40.135	44.676
		%	1,7	8,5	89,8	100,0
	IV	N	1.603	13.865	82.419	97.887
		%	1,6	14,2	84,2	100,0
	V	N	900	3.844	23.157	27.901
		%	3,2	13,8	83,0	100,0
	>=75	Total	N 3.462	19.132	204.221	226.814
		%	1,5	8,4	90,0	100,0
	I	N	.	532	9.007	9.538
		%	.	5,6	94,4	100,0
	II	N	.	493	14.238	14.731
		%	.	3,3	96,7	100,0
	III	N	418	4.899	44.321	49.638
		%	0,8	9,9	89,3	100,0
	IV	N	2.037	8.114	102.525	112.676
		%	1,8	7,2	91,0	100,0
	V	N	1.007	5.094	34.130	40.231
		%	2,5	12,7	84,8	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 47. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	Total	N	14.804	96.062	804.258	915.124
		%	1,6	10,5	87,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.088	25.731	181.781	210.600
		%	1,5	12,2	86,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.989	18.242	145.223	167.454
		%	2,4	10,9	86,7	100,0
	Secundaria, superior	N	5.888	36.000	318.782	360.670
		%	1,6	10,0	88,4	100,0
	Terciaria	N	1.840	16.090	158.471	176.400
		%	1,0	9,1	89,8	100,0
15-24 Total	Total	N	1.762	6.573	86.124	94.458
		%	1,9	7,0	91,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	819	9.099	9.918
		%	.	8,3	91,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.116	1.525	28.487	31.129
		%	3,6	4,9	91,5	100,0
	Secundaria, superior	N	645	3.162	39.033	42.840
		%	1,5	7,4	91,1	100,0
	Terciaria	N	.	1.067	9.505	10.572
		%	.	10,1	89,9	100,0
25-44 Total	Total	N	6.471	34.781	295.057	336.309
		%	1,9	10,3	87,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	598	4.818	32.360	37.776
		%	1,6	12,8	85,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.586	5.444	45.779	52.808
		%	3,0	10,3	86,7	100,0
	Secundaria, superior	N	3.949	16.305	144.020	164.274
		%	2,4	9,9	87,7	100,0
	Terciaria	N	338	8.215	72.898	81.451
		%	0,4	10,1	89,5	100,0
45-64 Total	Total	N	4.160	35.860	262.635	302.655
		%	1,4	11,8	86,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.190	8.677	60.532	70.400
		%	1,7	12,3	86,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	766	8.738	43.741	53.244
		%	1,4	16,4	82,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 47. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	1.061	12.910	103.159	117.130
			%	0,9	11,0	88,1	100,0
		Terciaria	N	1.143	5.536	55.202	61.881
			%	1,8	8,9	89,2	100,0
	65-74	Total	N	1.191	10.170	84.373	95.733
			%	1,2	10,6	88,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	704	6.033	31.280	38.017
			%	1,9	15,9	82,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	255	821	15.216	16.291
			%	1,6	5,0	93,4	100,0
		Secundaria, superior	N	232	2.609	23.106	25.948
			%	0,9	10,1	89,0	100,0
		Terciaria	N	.	706	14.771	15.477
			%	.	4,6	95,4	100,0
	>=75	Total	N	1.221	8.678	76.069	85.968
			%	1,4	10,1	88,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	596	5.384	48.509	54.489
			%	1,1	9,9	89,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	266	1.715	12.000	13.981
			%	1,9	12,3	85,8	100,0
		Secundaria, superior	N	.	1.014	9.464	10.478
			%	.	9,7	90,3	100,0
		Terciaria	N	359	566	6.096	7.020
			%	5,1	8,1	86,8	100,0
Mujeres	Total	Total	N	23.752	118.422	833.709	975.882
			%	2,4	12,1	85,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.926	29.993	239.408	278.327
			%	3,2	10,8	86,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.723	23.180	140.863	169.766
			%	3,4	13,7	83,0	100,0
		Secundaria, superior	N	7.498	42.349	258.018	307.866
			%	2,4	13,8	83,8	100,0
		Terciaria	N	1.604	22.899	195.419	219.923
			%	0,7	10,4	88,9	100,0
	Total	N	1.850	8.917	78.732	89.499	
		%	2,1	10,0	88,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 47. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	620	1.274	9.492	11.386
			%	5,4	11,2	83,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	275	1.639	14.849	16.763
			%	1,6	9,8	88,6	100,0
		Secundaria, superior	N	956	4.914	39.573	45.443
			%	2,1	10,8	87,1	100,0
		Terciaria	N	.	1.090	14.817	15.907
			%	.	6,9	93,1	100,0
	25-44	Total	N	9.245	38.080	273.501	320.826
			%	2,9	11,9	85,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.545	1.905	22.540	25.990
			%	5,9	7,3	86,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.950	6.795	29.192	38.937
			%	7,6	17,5	75,0	100,0
		Secundaria, superior	N	4.167	16.210	110.110	130.487
			%	3,2	12,4	84,4	100,0
		Terciaria	N	584	13.169	111.659	125.412
			%	0,5	10,5	89,0	100,0
	45-64	Total	N	7.986	45.681	260.102	313.769
			%	2,5	14,6	82,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.227	9.642	65.094	77.963
			%	4,1	12,4	83,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.635	10.162	49.938	61.735
			%	2,6	16,5	80,9	100,0
		Secundaria, superior	N	2.103	18.088	90.131	110.322
			%	1,9	16,4	81,7	100,0
		Terciaria	N	1.021	7.788	54.940	63.749
			%	1,6	12,2	86,2	100,0
	65-74	Total	N	2.327	15.291	92.307	109.925
			%	2,1	13,9	84,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.685	8.882	51.285	61.852
			%	2,7	14,4	82,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	369	3.344	23.739	27.452
			%	1,3	12,2	86,5	100,0
		Secundaria, superior	N	272	2.446	9.175	11.893
			%	2,3	20,6	77,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 47. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

			Mucho	Algo	Nada	Total		
Mujeres	65-74	Terciaria	N	.	618	8.108	8.727	
			%	.	7,1	92,9	100,0	
	>=75	Total	N	2.344	10.454	129.067	141.864	
			%	1,7	7,4	91,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	1.850	8.290	90.997	101.136	
			%	1,8	8,2	90,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	494	1.240	23.146	24.879	
			%	2,0	5,0	93,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	691	9.029	9.720	
			%	.	7,1	92,9	100,0	
		Terciaria	N	.	233	5.896	6.129	
			%	.	3,8	96,2	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	38.556	214.484	1.637.966	1.891.006
				%	2,0	11,3	86,6	100,0
			Sin estudios, primaria	N	12.014	55.724	421.189	488.927
				%	2,5	11,4	86,1	100,0
			Secundaria, inferior	N	9.712	41.422	286.086	337.220
				%	2,9	12,3	84,8	100,0
		Secundaria, superior	N	13.386	78.349	576.801	668.536	
			%	2,0	11,7	86,3	100,0	
		Terciaria	N	3.444	38.989	353.890	396.323	
			%	0,9	9,8	89,3	100,0	
		15-24	Total	N	3.612	15.490	164.856	183.958
			%	2,0	8,4	89,6	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	620	2.093	18.592	21.304	
			%	2,9	9,8	87,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.391	3.164	43.336	47.891	
			%	2,9	6,6	90,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.601	8.076	78.606	88.283	
			%	1,8	9,1	89,0	100,0	
	Terciaria	N	.	2.157	24.322	26.479		
		%	.	8,1	91,9	100,0		
	25-44	Total	N	15.716	72.861	568.558	657.135	
		%	2,4	11,1	86,5	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	2.142	6.723	54.900	63.765		
		%	3,4	10,5	86,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 47. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	4.536	12.239	74.971	91.745
			%	4,9	13,3	81,7	100,0
		Secundaria, superior	N	8.116	32.515	254.131	294.762
			%	2,8	11,0	86,2	100,0
		Terciaria	N	922	21.384	184.557	206.862
			%	0,4	10,3	89,2	100,0
	45-64	Total	N	12.146	81.541	522.737	616.424
			%	2,0	13,2	84,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.418	18.319	125.626	148.363
			%	3,0	12,3	84,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.401	18.900	93.679	114.979
			%	2,1	16,4	81,5	100,0
		Secundaria, superior	N	3.164	30.998	193.290	227.452
			%	1,4	13,6	85,0	100,0
		Terciaria	N	2.164	13.324	110.141	125.630
			%	1,7	10,6	87,7	100,0
	65-74	Total	N	3.518	25.460	176.680	205.658
			%	1,7	12,4	85,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.389	14.916	82.565	99.869
			%	2,4	14,9	82,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	624	4.165	38.955	43.744
			%	1,4	9,5	89,1	100,0
		Secundaria, superior	N	505	5.055	32.281	37.841
			%	1,3	13,4	85,3	100,0
		Terciaria	N	.	1.325	22.879	24.204
			%	.	5,5	94,5	100,0
	>=75	Total	N	3.564	19.132	205.136	227.832
			%	1,6	8,4	90,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.446	13.674	139.506	155.625
			%	1,6	8,8	89,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	760	2.955	35.146	38.860
			%	2,0	7,6	90,4	100,0
		Secundaria, superior	N	.	1.705	18.493	20.198
			%	.	8,4	91,6	100,0
		Terciaria	N	359	799	11.991	13.149
			%	2,7	6,1	91,2	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 48. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y territorio histórico

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	Total	CAPV	N 8.142	53.368	853.614	915.124
			% 0,9	5,8	93,3	100,0
		Araba	N 898	5.276	127.577	133.751
			% 0,7	3,9	95,4	100,0
		Gipuzkoa	N 2.682	18.503	272.626	293.812
			% 0,9	6,3	92,8	100,0
		Bizkaia	N 4.562	29.588	453.411	487.561
			% 0,9	6,1	93,0	100,0
	15-24	CAPV	N 516	4.497	89.445	94.458
			% 0,5	4,8	94,7	100,0
		Araba	N 218	403	14.248	14.869
			% 1,5	2,7	95,8	100,0
		Gipuzkoa	N .	2.413	28.891	31.305
			% .	7,7	92,3	100,0
		Bizkaia	N 298	1.680	46.306	48.284
			% 0,6	3,5	95,9	100,0
	25-44	CAPV	N 2.535	24.001	309.773	336.309
			% 0,8	7,1	92,1	100,0
		Araba	N 404	1.929	49.729	52.062
			% 0,8	3,7	95,5	100,0
		Gipuzkoa	N 993	8.545	97.252	106.790
			% 0,9	8,0	91,1	100,0
		Bizkaia	N 1.138	13.528	162.792	177.458
			% 0,6	7,6	91,7	100,0
	45-64	CAPV	N 2.824	15.911	283.920	302.655
			% 0,9	5,3	93,8	100,0
		Araba	N .	2.410	40.341	42.751
			% .	5,6	94,4	100,0
		Gipuzkoa	N 1.327	6.055	90.037	97.419
			% 1,4	6,2	92,4	100,0
		Bizkaia	N 1.497	7.447	153.541	162.485
			% 0,9	4,6	94,5	100,0
	65-74	CAPV	N 897	5.489	89.347	95.733
			% 0,9	5,7	93,3	100,0
		Araba	N 275	273	12.615	13.163
			% 2,1	2,1	95,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 48. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total	
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	93	1.326	30.711	32.130	
			%	0,3	4,1	95,6	100,0	
		Bizkaia	N	529	3.889	46.022	50.440	
			%	1,0	7,7	91,2	100,0	
	>=75	CAPV	N	1.369	3.469	81.129	85.968	
			%	1,6	4,0	94,4	100,0	
		Araba	N	.	261	10.644	10.905	
			%	.	2,4	97,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	269	164	25.735	26.168	
			%	1,0	0,6	98,3	100,0	
		Bizkaia	N	1.100	3.044	44.750	48.895	
			%	2,3	6,2	91,5	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	13.460	65.578	896.844	975.882
				%	1,4	6,7	91,9	100,0
		Araba	N	1.238	6.731	128.803	136.772	
			%	0,9	4,9	94,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	4.503	24.523	283.660	312.686		
		%	1,4	7,8	90,7	100,0		
	Bizkaia	N	7.719	34.325	484.382	526.425		
		%	1,5	6,5	92,0	100,0		
	15-24	CAPV	N	844	4.894	83.762	89.499	
			%	0,9	5,5	93,6	100,0	
		Araba	N	.	366	12.844	13.210	
			%	.	2,8	97,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	.	2.513	26.930	29.443	
			%	.	8,5	91,5	100,0	
	Bizkaia	N	844	2.015	43.987	46.846		
		%	1,8	4,3	93,9	100,0		
	25-44	CAPV	N	5.537	23.327	291.962	320.826	
			%	1,7	7,3	91,0	100,0	
Araba		N	702	1.727	45.439	47.869		
		%	1,5	3,6	94,9	100,0		
Gipuzkoa		N	2.963	8.059	90.883	101.905		
		%	2,9	7,9	89,2	100,0		
Bizkaia	N	1.871	13.541	155.640	171.052			
	%	1,1	7,9	91,0	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 48. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	3.768	21.079	288.921	313.769
			%	1,2	6,7	92,1	100,0
		Araba	N	86	3.406	40.772	44.263
			%	0,2	7,7	92,1	100,0
		Gipuzkoa	N	873	8.728	90.060	99.662
			%	0,9	8,8	90,4	100,0
	Bizkaia	N	2.809	8.945	158.089	169.843	
		%	1,7	5,3	93,1	100,0	
	65-74	CAPV	N	1.071	7.917	100.937	109.925
			%	1,0	7,2	91,8	100,0
		Araba	N	85	167	14.069	14.320
			%	0,6	1,2	98,2	100,0
		Gipuzkoa	N	365	2.331	33.425	36.120
			%	1,0	6,5	92,5	100,0
	Bizkaia	N	622	5.419	53.443	59.484	
		%	1,0	9,1	89,8	100,0	
	>=75	CAPV	N	2.241	8.361	131.262	141.864
			%	1,6	5,9	92,5	100,0
Araba		N	366	1.065	15.679	17.110	
		%	2,1	6,2	91,6	100,0	
Gipuzkoa		N	301	2.892	42.361	45.555	
		%	0,7	6,3	93,0	100,0	
Bizkaia	N	1.574	4.404	73.222	79.200		
	%	2,0	5,6	92,5	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	21.602	118.946	1.750.458	1.891.006
			%	1,1	6,3	92,6	100,0
	Araba	N	2.136	12.007	256.380	270.523	
		%	0,8	4,4	94,8	100,0	
	Gipuzkoa	N	7.185	43.026	556.286	606.497	
		%	1,2	7,1	91,7	100,0	
	Bizkaia	N	12.281	63.913	937.793	1.013.987	
		%	1,2	6,3	92,5	100,0	
	15-24	CAPV	N	1.360	9.391	173.207	183.958
			%	0,7	5,1	94,2	100,0
		Araba	N	218	769	27.092	28.079
			%	0,8	2,7	96,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 48. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	.	4.927	55.821	60.748
			%	.	8,1	91,9	100,0
		Bizkaia	N	1.141	3.695	90.294	95.130
			%	1,2	3,9	94,9	100,0
	25-44	CAPV	N	8.071	47.329	601.735	657.135
			%	1,2	7,2	91,6	100,0
		Araba	N	1.107	3.656	95.168	99.930
			%	1,1	3,7	95,2	100,0
		Gipuzkoa	N	3.956	16.603	188.135	208.695
			%	1,9	8,0	90,1	100,0
		Bizkaia	N	3.008	27.069	318.432	348.509
			%	0,9	7,8	91,4	100,0
	45-64	CAPV	N	6.593	36.990	572.841	616.424
			%	1,1	6,0	92,9	100,0
		Araba	N	86	5.816	81.113	87.015
			%	0,1	6,7	93,2	100,0
		Gipuzkoa	N	2.200	14.783	180.098	197.081
			%	1,1	7,5	91,4	100,0
		Bizkaia	N	4.307	16.391	311.630	332.328
			%	1,3	4,9	93,8	100,0
	65-74	CAPV	N	1.968	13.405	190.284	205.658
			%	1,0	6,5	92,5	100,0
		Araba	N	360	440	26.684	27.483
			%	1,3	1,6	97,1	100,0
		Gipuzkoa	N	458	3.657	64.136	68.251
			%	0,7	5,4	94,0	100,0
		Bizkaia	N	1.150	9.309	99.465	109.924
			%	1,0	8,5	90,5	100,0
	>=75	CAPV	N	3.610	11.831	212.391	227.832
			%	1,6	5,2	93,2	100,0
		Araba	N	366	1.326	26.323	28.015
			%	1,3	4,7	94,0	100,0
		Gipuzkoa	N	571	3.056	68.096	71.723
			%	0,8	4,3	94,9	100,0
		Bizkaia	N	2.674	7.448	117.972	128.094
			%	2,1	5,8	92,1	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 49. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	Total	Total N	7.844	53.107	852.912	913.863
		%	0,9	5,8	93,3	100,0
	I	N	696	3.964	109.029	113.690
		%	0,6	3,5	95,9	100,0
	II	N	577	5.072	72.557	78.206
		%	0,7	6,5	92,8	100,0
	III	N	1.560	10.347	176.448	188.355
		%	0,8	5,5	93,7	100,0
	IV	N	3.756	29.088	417.462	450.306
		%	0,8	6,5	92,7	100,0
	V	N	1.255	4.637	77.416	83.307
		%	1,5	5,6	92,9	100,0
	15-24	Total N	218	4.237	89.445	93.900
		%	0,2	4,5	95,3	100,0
	I	N	218	.	14.416	14.634
		%	1,5	.	98,5	100,0
	II	N	.	343	10.645	10.988
		%	.	3,1	96,9	100,0
	III	N	.	831	15.999	16.830
		%	.	4,9	95,1	100,0
	IV	N	.	2.156	40.581	42.737
		%	.	5,0	95,0	100,0
	V	N	.	907	7.804	8.711
		%	.	10,4	89,6	100,0
	25-44	Total N	2.535	24.001	309.773	336.309
		%	0,8	7,1	92,1	100,0
	I	N	.	2.748	40.984	43.732
		%	.	6,3	93,7	100,0
	II	N	289	2.627	29.580	32.496
		%	0,9	8,1	91,0	100,0
	III	N	443	3.999	57.815	62.257
		%	0,7	6,4	92,9	100,0
	IV	N	1.803	12.405	146.185	160.392
		%	1,1	7,7	91,1	100,0
	V	N	.	2.223	35.209	37.432
		%	.	5,9	94,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 49. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total	
Hombres 45-64	Total	N	2.824	15.911	283.632	302.368	
		%	0,9	5,3	93,8	100,0	
	I	N	478	530	36.899	37.907	
		%	1,3	1,4	97,3	100,0	
	II	N	195	1.971	21.254	23.419	
		%	0,8	8,4	90,8	100,0	
	III	N	1.116	3.709	61.496	66.322	
		%	1,7	5,6	92,7	100,0	
	IV	N	504	8.925	141.186	150.614	
		%	0,3	5,9	93,7	100,0	
	V	N	531	776	22.798	24.106	
		%	2,2	3,2	94,6	100,0	
	65-74	Total	N	897	5.489	89.347	95.733
			%	0,9	5,7	93,3	100,0
	I	N	.	539	13.214	13.753	
		%	.	3,9	96,1	100,0	
	II	N	93	.	6.769	6.862	
		%	1,4	.	98,6	100,0	
	III	N	.	1.232	20.544	21.777	
		%	.	5,7	94,3	100,0	
	IV	N	539	3.429	43.784	47.753	
		%	1,1	7,2	91,7	100,0	
	V	N	265	288	5.036	5.588	
		%	4,7	5,2	90,1	100,0	
	>=75	Total	N	1.369	3.469	80.714	85.553
			%	1,6	4,1	94,3	100,0
	I	N	.	147	3.516	3.663	
		%	.	4,0	96,0	100,0	
	II	N	.	130	4.309	4.440	
		%	.	2,9	97,1	100,0	
	III	N	.	576	20.593	21.169	
		%	.	2,7	97,3	100,0	
	IV	N	911	2.173	45.726	48.810	
		%	1,9	4,5	93,7	100,0	
	V	N	459	442	6.569	7.470	
		%	6,1	5,9	87,9	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 49. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	Total	Total	N 13.460	65.145	894.886	973.492
			% 1,4	6,7	91,9	100,0
	I	N	.	6.136	98.702	104.838
		%	.	5,9	94,1	100,0
	II	N	1.257	4.623	89.148	95.028
		%	1,3	4,9	93,8	100,0
	III	N	4.647	16.938	220.522	242.107
		%	1,9	7,0	91,1	100,0
	IV	N	4.834	25.363	330.244	360.441
		%	1,3	7,0	91,6	100,0
	V	N	2.723	12.085	156.270	171.077
		%	1,6	7,1	91,3	100,0
	15-24	Total	N 844	4.687	83.003	88.533
		%	1,0	5,3	93,8	100,0
	I	N	.	.	14.562	14.562
		%	.	.	100,0	100,0
	II	N	.	752	12.744	13.497
		%	.	5,6	94,4	100,0
	III	N	526	1.771	17.773	20.069
		%	2,6	8,8	88,6	100,0
	IV	N	318	1.521	29.775	31.614
		%	1,0	4,8	94,2	100,0
	V	N	.	642	8.149	8.792
		%	.	7,3	92,7	100,0
	25-44	Total	N 5.537	23.102	291.692	320.330
		%	1,7	7,2	91,1	100,0
	I	N	.	4.294	40.792	45.086
		%	.	9,5	90,5	100,0
	II	N	396	2.223	34.604	37.223
		%	1,1	6,0	93,0	100,0
	III	N	1.732	6.155	74.143	82.029
		%	2,1	7,5	90,4	100,0
	IV	N	2.218	7.506	101.001	110.725
		%	2,0	6,8	91,2	100,0
	V	N	1.191	2.923	41.153	45.267
		%	2,6	6,5	90,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 49. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	Total	N 3.768	21.079	288.750	313.598
			% 1,2	6,7	92,1	100,0
		I	N .	1.668	30.448	32.116
			% .	5,2	94,8	100,0
		II	N 861	700	25.231	26.792
			% 3,2	2,6	94,2	100,0
		III	N 1.537	5.843	81.261	88.641
			% 1,7	6,6	91,7	100,0
		IV	N 919	8.238	94.945	104.102
			% 0,9	7,9	91,2	100,0
		V	N 453	4.629	56.865	61.946
			% 0,7	7,5	91,8	100,0
	65-74	Total	N 1.071	7.917	100.782	109.770
			% 1,0	7,2	91,8	100,0
		I	N .	.	7.199	7.199
			% .	.	100,0	100,0
		II	N .	417	6.808	7.225
			% .	5,8	94,2	100,0
		III	N 288	1.661	20.951	22.899
			% 1,3	7,3	91,5	100,0
		IV	N 236	4.567	45.331	50.134
			% 0,5	9,1	90,4	100,0
		V	N 547	1.272	20.493	22.312
			% 2,5	5,7	91,8	100,0
	>=75	Total	N 2.241	8.361	130.659	141.261
			% 1,6	5,9	92,5	100,0
		I	N .	174	5.701	5.875
			% .	3,0	97,0	100,0
		II	N .	531	9.761	10.292
			% .	5,2	94,8	100,0
		III	N 565	1.508	26.395	28.468
			% 2,0	5,3	92,7	100,0
		IV	N 1.143	3.531	59.192	63.866
			% 1,8	5,5	92,7	100,0
		V	N 532	2.618	29.610	32.760
			% 1,6	8,0	90,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 49. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	Total	Total	N	21.304	118.253	1.747.798	1.887.356
			%	1,1	6,3	92,6	100,0
	I	N		696	10.100	207.731	218.528
			%	0,3	4,6	95,1	100,0
	II	N		1.833	9.695	161.706	173.234
			%	1,1	5,6	93,3	100,0
	III	N		6.207	27.285	396.970	430.462
			%	1,4	6,3	92,2	100,0
	IV	N		8.590	54.451	747.706	810.747
			%	1,1	6,7	92,2	100,0
	V	N		3.978	16.721	233.686	254.385
			%	1,6	6,6	91,9	100,0
	15-24	Total	N	1.062	8.923	172.449	182.434
			%	0,6	4,9	94,5	100,0
	I	N		218	.	28.978	29.196
			%	0,7	.	99,3	100,0
	II	N		.	1.095	23.390	24.485
			%	.	4,5	95,5	100,0
	III	N		526	2.602	33.772	36.900
			%	1,4	7,1	91,5	100,0
	IV	N		318	3.677	70.356	74.351
			%	0,4	4,9	94,6	100,0
	V	N		.	1.550	15.953	17.503
			%	.	8,9	91,1	100,0
	25-44	Total	N	8.071	47.103	601.465	656.640
			%	1,2	7,2	91,6	100,0
	I	N		.	7.042	81.776	88.818
			%	.	7,9	92,1	100,0
	II	N		685	4.851	64.184	69.719
			%	1,0	7,0	92,1	100,0
	III	N		2.175	10.154	131.957	144.286
			%	1,5	7,0	91,5	100,0
	IV	N		4.021	19.911	247.186	271.117
			%	1,5	7,3	91,2	100,0
	V	N		1.191	5.145	76.362	82.699
			%	1,4	6,2	92,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 49. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	45-64	Total	N 6.593	36.990	572.382	615.965
			% 1,1	6,0	92,9	100,0
		I	N 478	2.198	67.347	70.023
			% 0,7	3,1	96,2	100,0
		II	N 1.055	2.671	46.485	50.212
			% 2,1	5,3	92,6	100,0
		III	N 2.653	9.553	142.757	154.963
			% 1,7	6,2	92,1	100,0
		IV	N 1.422	17.163	236.131	254.716
			% 0,6	6,7	92,7	100,0
		V	N 984	5.405	79.663	86.052
			% 1,1	6,3	92,6	100,0
	65-74	Total	N 1.968	13.405	190.129	205.503
			% 1,0	6,5	92,5	100,0
		I	N .	539	20.413	20.952
			% .	2,6	97,4	100,0
		II	N 93	417	13.577	14.087
			% 0,7	3,0	96,4	100,0
		III	N 288	2.893	41.495	44.676
			% 0,6	6,5	92,9	100,0
		IV	N 775	7.996	89.115	97.887
			% 0,8	8,2	91,0	100,0
		V	N 812	1.560	25.528	27.901
			% 2,9	5,6	91,5	100,0
	>=75	Total	N 3.610	11.831	211.373	226.814
			% 1,6	5,2	93,2	100,0
		I	N .	321	9.217	9.538
			% .	3,4	96,6	100,0
		II	N .	661	14.070	14.731
			% .	4,5	95,5	100,0
		III	N 565	2.084	46.988	49.638
			% 1,1	4,2	94,7	100,0
		IV	N 2.054	5.704	104.918	112.676
			% 1,8	5,1	93,1	100,0
		V	N 991	3.061	36.179	40.231
			% 2,5	7,6	89,9	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 50. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y nivel de estudios*

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	Total	N	8.142	53.368	853.614	915.124
		%	0,9	5,8	93,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.087	11.687	195.825	210.600
		%	1,5	5,5	93,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	732	13.587	153.135	167.454
		%	0,4	8,1	91,4	100,0
	Secundaria, superior	N	3.632	21.091	335.947	360.670
		%	1,0	5,8	93,1	100,0
	Terciaria	N	691	7.003	168.707	176.400
		%	0,4	4,0	95,6	100,0
15-24	Total	N	516	4.497	89.445	94.458
		%	0,5	4,8	94,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	1.047	8.871	9.918
		%	.	10,6	89,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	218	1.588	29.323	31.129
		%	0,7	5,1	94,2	100,0
	Secundaria, superior	N	298	1.659	40.884	42.840
		%	0,7	3,9	95,4	100,0
	Terciaria	N	.	203	10.368	10.572
		%	.	1,9	98,1	100,0
25-44	Total	N	2.535	24.001	309.773	336.309
		%	0,8	7,1	92,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	404	2.429	34.943	37.776
		%	1,1	6,4	92,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	6.911	45.898	52.808
		%	.	13,1	86,9	100,0
	Secundaria, superior	N	2.130	10.776	151.367	164.274
		%	1,3	6,6	92,1	100,0
	Terciaria	N	.	3.886	77.565	81.451
		%	.	4,8	95,2	100,0
45-64	Total	N	2.824	15.911	283.920	302.655
		%	0,9	5,3	93,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	968	3.413	66.019	70.400
		%	1,4	4,8	93,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	413	3.747	49.084	53.244
		%	0,8	7,0	92,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 50. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	1.111	6.708	109.311	117.130	
			%	0,9	5,7	93,3	100,0	
		Terciaria	N	332	2.043	59.506	61.881	
			%	0,5	3,3	96,2	100,0	
	65-74	Total	N	897	5.489	89.347	95.733	
			%	0,9	5,7	93,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	804	2.719	34.494	38.017	
			%	2,1	7,2	90,7	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	654	15.637	16.291	
			%	.	4,0	96,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	93	1.670	24.184	25.948	
			%	0,4	6,4	93,2	100,0	
		Terciaria	N	.	445	15.032	15.477	
			%	.	2,9	97,1	100,0	
	>=75	Total	N	1.369	3.469	81.129	85.968	
			%	1,6	4,0	94,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	911	2.080	51.498	54.489	
			%	1,7	3,8	94,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	100	687	13.194	13.981	
			%	0,7	4,9	94,4	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	277	10.201	10.478	
			%	.	2,6	97,4	100,0	
		Terciaria	N	359	425	6.236	7.020	
			%	5,1	6,1	88,8	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	13.460	65.578	896.844	975.882	
			%	1,4	6,7	91,9	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	4.602	19.540	254.185	278.327
				%	1,7	7,0	91,3	100,0
			Secundaria, inferior	N	1.959	17.051	150.756	169.766
				%	1,2	10,0	88,8	100,0
			Secundaria, superior	N	4.515	16.174	287.177	307.866
				%	1,5	5,3	93,3	100,0
			Terciaria	N	2.384	12.814	204.725	219.923
				%	1,1	5,8	93,1	100,0
		Total	N	844	4.894	83.762	89.499	
			%	0,9	5,5	93,6	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 50. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y nivel de estudios*

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	. 924	10.462	11.386
			%	. 8,1	91,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	. 1.361	15.402	16.763
			%	. 8,1	91,9	100,0
		Secundaria, superior	N	844 1.939	42.661	45.443
			%	1,9 4,3	93,9	100,0
		Terciaria	N	. 670	15.237	15.907
			%	. 4,2	95,8	100,0
	25-44	Total	N	5.537 23.327	291.962	320.826
			%	1,7 7,3	91,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	926 2.409	22.655	25.990
			%	3,6 9,3	87,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	729 5.029	33.179	38.937
			%	1,9 12,9	85,2	100,0
		Secundaria, superior	N	2.089 6.929	121.470	130.487
			%	1,6 5,3	93,1	100,0
		Terciaria	N	1.793 8.961	114.658	125.412
			%	1,4 7,1	91,4	100,0
	45-64	Total	N	3.768 21.079	288.921	313.769
			%	1,2 6,7	92,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	678 4.206	73.079	77.963
			%	0,9 5,4	93,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	916 7.729	53.089	61.735
			%	1,5 12,5	86,0	100,0
		Secundaria, superior	N	1.583 6.738	102.001	110.322
			%	1,4 6,1	92,5	100,0
		Terciaria	N	591 2.406	60.751	63.749
			%	0,9 3,8	95,3	100,0
	65-74	Total	N	1.071 7.917	100.937	109.925
			%	1,0 7,2	91,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	912 5.206	55.734	61.852
			%	1,5 8,4	90,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	159 1.980	25.313	27.452
			%	0,6 7,2	92,2	100,0
		Secundaria, superior	N	. 287	11.607	11.893
			%	. 2,4	97,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 50. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y nivel de estudios*

			Mucho	Algo	Nada	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N	. 444	8.283	8.727	
		%	. 5,1	94,9	100,0		
	>=75	Total	N	2.241	8.361	131.262	141.864
		%	1,6	5,9	92,5	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.086	6.795	92.255	101.136
		%	2,1	6,7	91,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	154	952	23.773	24.879
		%	0,6	3,8	95,6	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	281	9.439	9.720
		%	.	2,9	97,1	100,0	
		Terciaria	N	.	333	5.796	6.129
		%	.	5,4	94,6	100,0	
Ambos	Total	Total	N	21.602	118.946	1.750.458	1.891.006
		%	1,1	6,3	92,6	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	7.689	31.227	450.011	488.927
		%	1,6	6,4	92,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.691	30.638	303.892	337.220
		%	0,8	9,1	90,1	100,0	
		Secundaria, superior	N	8.148	37.264	623.124	668.536
		%	1,2	5,6	93,2	100,0	
		Terciaria	N	3.074	19.817	373.432	396.323
		%	0,8	5,0	94,2	100,0	
	15-24	Total	N	1.360	9.391	173.207	183.958
		%	0,7	5,1	94,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	.	1.971	19.333	21.304
		%	.	9,3	90,7	100,0	
		Secundaria, inferior	N	218	2.949	44.724	47.891
		%	0,5	6,2	93,4	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.141	3.597	83.545	88.283
		%	1,3	4,1	94,6	100,0	
		Terciaria	N	.	874	25.605	26.479
		%	.	3,3	96,7	100,0	
	25-44	Total	N	8.071	47.329	601.735	657.135
		%	1,2	7,2	91,6	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	1.331	4.837	57.597	63.765
		%	2,1	7,6	90,3	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 50. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y nivel de estudios*

			Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N 729	11.939	79.077	91.745
			% 0,8	13,0	86,2	100,0
		Secundaria, superior	N 4.219	17.706	272.837	294.762
			% 1,4	6,0	92,6	100,0
		Terciaria	N 1.793	12.846	192.223	206.862
			% 0,9	6,2	92,9	100,0
	45-64	Total	N 6.593	36.990	572.841	616.424
			% 1,1	6,0	92,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N 1.646	7.619	139.098	148.363
			% 1,1	5,1	93,8	100,0
		Secundaria, inferior	N 1.330	11.476	102.173	114.979
			% 1,2	10,0	88,9	100,0
		Secundaria, superior	N 2.694	13.446	211.312	227.452
			% 1,2	5,9	92,9	100,0
		Terciaria	N 923	4.449	120.257	125.630
			% 0,7	3,5	95,7	100,0
	65-74	Total	N 1.968	13.405	190.284	205.658
			% 1,0	6,5	92,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N 1.716	7.925	90.229	99.869
			% 1,7	7,9	90,3	100,0
		Secundaria, inferior	N 159	2.635	40.950	43.744
			% 0,4	6,0	93,6	100,0
		Secundaria, superior	N 93	1.957	35.791	37.841
			% 0,2	5,2	94,6	100,0
		Terciaria	N .	889	23.315	24.204
			% .	3,7	96,3	100,0
	>=75	Total	N 3.610	11.831	212.391	227.832
			% 1,6	5,2	93,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N 2.997	8.875	143.753	155.625
			% 1,9	5,7	92,4	100,0
		Secundaria, inferior	N 255	1.639	36.967	38.860
			% 0,7	4,2	95,1	100,0
		Secundaria, superior	N .	558	19.639	20.198
			% .	2,8	97,2	100,0
		Terciaria	N 359	758	12.032	13.149
			% 2,7	5,8	91,5	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 51. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y territorio histórico

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	CAPV	N	31.276	168.828	715.020	915.124
		%	3,4	18,4	78,1	100,0
	Araba	N	1.014	20.714	112.023	133.751
		%	0,8	15,5	83,8	100,0
	Gipuzkoa	N	9.730	56.931	227.150	293.812
		%	3,3	19,4	77,3	100,0
	Bizkaia	N	20.531	91.183	375.847	487.561
		%	4,2	18,7	77,1	100,0
15-24	CAPV	N	1.730	12.561	80.168	94.458
		%	1,8	13,3	84,9	100,0
	Araba	N	.	1.598	13.271	14.869
		%	.	10,8	89,2	100,0
	Gipuzkoa	N	891	3.879	26.535	31.305
		%	2,8	12,4	84,8	100,0
	Bizkaia	N	839	7.084	40.362	48.284
		%	1,7	14,7	83,6	100,0
25-44	CAPV	N	9.529	60.431	266.349	336.309
		%	2,8	18,0	79,2	100,0
	Araba	N	523	7.486	44.052	52.062
		%	1,0	14,4	84,6	100,0
	Gipuzkoa	N	3.865	18.964	83.961	106.790
		%	3,6	17,8	78,6	100,0
	Bizkaia	N	5.141	33.980	138.336	177.458
		%	2,9	19,1	78,0	100,0
45-64	CAPV	N	11.584	64.925	226.146	302.655
		%	3,8	21,5	74,7	100,0
	Araba	N	353	8.984	33.415	42.751
		%	0,8	21,0	78,2	100,0
	Gipuzkoa	N	3.995	21.884	71.540	97.419
		%	4,1	22,5	73,4	100,0
	Bizkaia	N	7.237	34.057	121.192	162.485
		%	4,5	21,0	74,6	100,0
65-74	CAPV	N	4.654	17.554	73.526	95.733
		%	4,9	18,3	76,8	100,0
	Araba	N	138	1.583	11.443	13.163
		%	1,0	12,0	86,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 51. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total		
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	727	7.821	23.583	32.130		
			%	2,3	24,3	73,4	100,0		
		Bizkaia	N	3.789	8.150	38.501	50.440		
			%	7,5	16,2	76,3	100,0		
	>=75	CAPV	N	3.779	13.358	68.831	85.968		
			%	4,4	15,5	80,1	100,0		
			Araba	N	.	1.062	9.843	10.905	
				%	.	9,7	90,3	100,0	
			Gipuzkoa	N	253	4.384	21.532	26.168	
				%	1,0	16,8	82,3	100,0	
			Bizkaia	N	3.526	7.912	37.456	48.895	
				%	7,2	16,2	76,6	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	31.631	173.161	771.091	975.882	
				%	3,2	17,7	79,0	100,0	
				Araba	N	2.791	21.021	112.960	136.772
					%	2,0	15,4	82,6	100,0
			Gipuzkoa	N	10.013	60.357	242.316	312.686	
				%	3,2	19,3	77,5	100,0	
			Bizkaia	N	18.828	91.783	415.815	526.425	
				%	3,6	17,4	79,0	100,0	
	15-24		CAPV	N	2.009	14.717	72.773	89.499	
				%	2,2	16,4	81,3	100,0	
				Araba	N	.	1.211	11.999	13.210
					%	.	9,2	90,8	100,0
				Gipuzkoa	N	1.204	5.548	22.691	29.443
					%	4,1	18,8	77,1	100,0
			Bizkaia	N	805	7.958	38.083	46.846	
				%	1,7	17,0	81,3	100,0	
	25-44		CAPV	N	9.820	49.521	261.484	320.826	
				%	3,1	15,4	81,5	100,0	
		Araba	N	1.385	7.473	39.010	47.869		
			%	2,9	15,6	81,5	100,0		
		Gipuzkoa	N	2.738	14.311	84.855	101.905		
			%	2,7	14,0	83,3	100,0		
	Bizkaia	N	5.696	27.737	137.619	171.052			
		%	3,3	16,2	80,5	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 51. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	9.715	65.022	239.031	313.769
			%	3,1	20,7	76,2	100,0
		Araba	N	872	8.304	35.086	44.263
			%	2,0	18,8	79,3	100,0
		Gipuzkoa	N	3.812	24.735	71.116	99.662
			%	3,8	24,8	71,4	100,0
	Bizkaia	N	5.031	31.984	132.829	169.843	
		%	3,0	18,8	78,2	100,0	
	65-74	CAPV	N	3.929	23.041	82.955	109.925
			%	3,6	21,0	75,5	100,0
		Araba	N	85	2.128	12.107	14.320
			%	0,6	14,9	84,5	100,0
		Gipuzkoa	N	1.097	7.938	27.085	36.120
			%	3,0	22,0	75,0	100,0
	Bizkaia	N	2.747	12.975	43.762	59.484	
		%	4,6	21,8	73,6	100,0	
	>=75	CAPV	N	6.159	20.858	114.847	141.864
			%	4,3	14,7	81,0	100,0
Araba		N	448	1.904	14.757	17.110	
		%	2,6	11,1	86,3	100,0	
Gipuzkoa		N	1.162	7.825	36.568	45.555	
		%	2,6	17,2	80,3	100,0	
Bizkaia	N	4.549	11.129	63.521	79.200		
	%	5,7	14,1	80,2	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	62.907	341.989	1.486.111	1.891.006
			%	3,3	18,1	78,6	100,0
		Araba	N	3.805	41.735	224.983	270.523
			%	1,4	15,4	83,2	100,0
		Gipuzkoa	N	19.743	117.288	469.466	606.497
			%	3,3	19,3	77,4	100,0
	Bizkaia	N	39.359	182.966	791.662	1.013.987	
		%	3,9	18,0	78,1	100,0	
	15-24	CAPV	N	3.739	27.278	152.940	183.958
			%	2,0	14,8	83,1	100,0
		Araba	N	.	2.810	25.270	28.079
			%	.	10,0	90,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 51. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	2.095	9.427	49.226	60.748
			%	3,4	15,5	81,0	100,0
		Bizkaia	N	1.643	15.042	78.445	95.130
			%	1,7	15,8	82,5	100,0
	25-44	CAPV	N	19.349	109.952	527.834	657.135
			%	2,9	16,7	80,3	100,0
		Araba	N	1.909	14.959	83.062	99.930
			%	1,9	15,0	83,1	100,0
		Gipuzkoa	N	6.603	33.275	168.816	208.695
			%	3,2	15,9	80,9	100,0
		Bizkaia	N	10.837	61.717	275.955	348.509
			%	3,1	17,7	79,2	100,0
	45-64	CAPV	N	21.299	129.947	465.178	616.424
			%	3,5	21,1	75,5	100,0
		Araba	N	1.225	17.289	68.501	87.015
			%	1,4	19,9	78,7	100,0
		Gipuzkoa	N	7.807	46.618	142.656	197.081
			%	4,0	23,7	72,4	100,0
		Bizkaia	N	12.267	66.040	254.021	332.328
			%	3,7	19,9	76,4	100,0
	65-74	CAPV	N	8.582	40.595	156.481	205.658
			%	4,2	19,7	76,1	100,0
		Araba	N	222	3.711	23.550	27.483
			%	0,8	13,5	85,7	100,0
		Gipuzkoa	N	1.823	15.759	50.668	68.251
			%	2,7	23,1	74,2	100,0
		Bizkaia	N	6.537	21.125	82.263	109.924
			%	5,9	19,2	74,8	100,0
	>=75	CAPV	N	9.938	34.216	183.678	227.832
			%	4,4	15,0	80,6	100,0
		Araba	N	448	2.966	24.600	28.015
			%	1,6	10,6	87,8	100,0
		Gipuzkoa	N	1.415	12.208	58.100	71.723
			%	2,0	17,0	81,0	100,0
		Bizkaia	N	8.075	19.042	100.978	128.094
			%	6,3	14,9	78,8	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	Total	Total N	31.276	168.379	714.208	913.863
		%	3,4	18,4	78,2	100,0
	I	N	2.262	19.509	91.919	113.690
		%	2,0	17,2	80,9	100,0
	II	N	1.767	14.846	61.593	78.206
		%	2,3	19,0	78,8	100,0
	III	N	6.159	31.863	150.333	188.355
		%	3,3	16,9	79,8	100,0
	IV	N	17.826	87.477	345.003	450.306
		%	4,0	19,4	76,6	100,0
	V	N	3.262	14.684	65.361	83.307
		%	3,9	17,6	78,5	100,0
	15-24 Total	N	1.730	12.301	79.870	93.900
		%	1,8	13,1	85,1	100,0
	I	N	294	1.178	13.162	14.634
		%	2,0	8,0	89,9	100,0
	II	N	.	1.321	9.667	10.988
		%	.	12,0	88,0	100,0
	III	N	521	3.102	13.207	16.830
		%	3,1	18,4	78,5	100,0
	IV	N	597	5.683	36.458	42.737
		%	1,4	13,3	85,3	100,0
	V	N	317	1.017	7.376	8.711
		%	3,6	11,7	84,7	100,0
	25-44 Total	N	9.529	60.431	266.349	336.309
		%	2,8	18,0	79,2	100,0
	I	N	473	8.019	35.240	43.732
		%	1,1	18,3	80,6	100,0
	II	N	263	5.960	26.274	32.496
		%	0,8	18,3	80,9	100,0
	III	N	2.070	8.964	51.223	62.257
		%	3,3	14,4	82,3	100,0
	IV	N	5.344	31.748	123.300	160.392
		%	3,3	19,8	76,9	100,0
	V	N	1.379	5.740	30.313	37.432
		%	3,7	15,3	81,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres 45-64	Total	N	11.584	64.736	226.047	302.368
		%	3,8	21,4	74,8	100,0
I	N		746	7.194	29.967	37.907
	%		2,0	19,0	79,1	100,0
II	N		1.304	5.403	16.712	23.419
	%		5,6	23,1	71,4	100,0
III	N		1.655	13.524	51.143	66.322
	%		2,5	20,4	77,1	100,0
IV	N		7.272	33.578	109.764	150.614
	%		4,8	22,3	72,9	100,0
V	N		607	5.037	18.462	24.106
	%		2,5	20,9	76,6	100,0
65-74	Total	N	4.654	17.554	73.526	95.733
		%	4,9	18,3	76,8	100,0
I	N		402	2.248	11.104	13.753
	%		2,9	16,3	80,7	100,0
II	N		199	1.667	4.996	6.862
	%		2,9	24,3	72,8	100,0
III	N		1.203	3.233	17.340	21.777
	%		5,5	14,8	79,6	100,0
IV	N		2.407	8.977	36.368	47.753
	%		5,0	18,8	76,2	100,0
V	N		442	1.428	3.718	5.588
	%		7,9	25,6	66,5	100,0
>=75	Total	N	3.779	13.358	68.416	85.553
		%	4,4	15,6	80,0	100,0
I	N		348	870	2.445	3.663
	%		9,5	23,8	66,8	100,0
II	N		.	495	3.945	4.440
	%		.	11,1	88,9	100,0
III	N		709	3.040	17.421	21.169
	%		3,3	14,4	82,3	100,0
IV	N		2.206	7.491	39.113	48.810
	%		4,5	15,3	80,1	100,0
V	N		517	1.462	5.492	7.470
	%		6,9	19,6	73,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	Total	Total	N 31.406	173.005	769.081	973.492
			% 3,2	17,8	79,0	100,0
	I	N	3.199	11.202	90.437	104.838
		%	3,1	10,7	86,3	100,0
	II	N	2.098	17.302	75.629	95.028
		%	2,2	18,2	79,6	100,0
	III	N	7.815	42.905	191.387	242.107
		%	3,2	17,7	79,1	100,0
	IV	N	11.558	66.867	282.017	360.441
		%	3,2	18,6	78,2	100,0
	V	N	6.737	34.729	129.611	171.077
		%	3,9	20,3	75,8	100,0
	15-24	Total	N 2.009	14.717	71.807	88.533
		%	2,3	16,6	81,1	100,0
	I	N	448	895	13.219	14.562
		%	3,1	6,1	90,8	100,0
	II	N	.	3.035	10.462	13.497
		%	.	22,5	77,5	100,0
	III	N	.	4.436	15.634	20.069
		%	.	22,1	77,9	100,0
	IV	N	1.006	4.852	25.755	31.614
		%	3,2	15,3	81,5	100,0
	V	N	555	1.500	6.737	8.792
		%	6,3	17,1	76,6	100,0
	25-44	Total	N 9.594	49.521	261.215	320.330
		%	3,0	15,5	81,5	100,0
	I	N	1.711	4.010	39.365	45.086
		%	3,8	8,9	87,3	100,0
	II	N	813	5.390	31.020	37.223
		%	2,2	14,5	83,3	100,0
	III	N	2.533	12.501	66.995	82.029
		%	3,1	15,2	81,7	100,0
	IV	N	3.003	19.003	88.720	110.725
		%	2,7	17,2	80,1	100,0
	V	N	1.535	8.618	35.114	45.267
		%	3,4	19,0	77,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	Total	N 9.715	65.022	238.860	313.598
			% 3,1	20,7	76,2	100,0
	I	N	752	5.246	26.119	32.116
		%	2,3	16,3	81,3	100,0
	II	N	765	4.713	21.315	26.792
		%	2,9	17,6	79,6	100,0
	III	N	3.480	18.612	66.550	88.641
		%	3,9	21,0	75,1	100,0
	IV	N	3.148	21.983	78.970	104.102
		%	3,0	21,1	75,9	100,0
	V	N	1.569	14.470	45.907	61.946
		%	2,5	23,4	74,1	100,0
	65-74	Total	N 3.929	22.886	82.955	109.770
		%	3,6	20,8	75,6	100,0
	I	N	140	493	6.567	7.199
		%	1,9	6,8	91,2	100,0
	II	N	140	1.578	5.506	7.225
		%	1,9	21,8	76,2	100,0
	III	N	1.208	3.896	17.794	22.899
		%	5,3	17,0	77,7	100,0
	IV	N	1.392	12.458	36.284	50.134
		%	2,8	24,8	72,4	100,0
	V	N	1.048	4.460	16.804	22.312
		%	4,7	20,0	75,3	100,0
	>=75	Total	N 6.159	20.858	114.244	141.261
		%	4,4	14,8	80,9	100,0
	I	N	148	560	5.167	5.875
		%	2,5	9,5	87,9	100,0
	II	N	380	2.586	7.326	10.292
		%	3,7	25,1	71,2	100,0
	III	N	594	3.461	24.414	28.468
		%	2,1	12,2	85,8	100,0
	IV	N	3.008	8.570	52.288	63.866
		%	4,7	13,4	81,9	100,0
	V	N	2.029	5.682	25.049	32.760
		%	6,2	17,3	76,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	Total	Total N	62.681	341.385	1.483.290	1.887.356
		%	3,3	18,1	78,6	100,0
	I	N	5.461	30.711	182.356	218.528
		%	2,5	14,1	83,4	100,0
	II	N	3.865	32.147	137.222	173.234
		%	2,2	18,6	79,2	100,0
	III	N	13.973	74.768	341.720	430.462
		%	3,2	17,4	79,4	100,0
	IV	N	29.384	154.344	627.020	810.747
		%	3,6	19,0	77,3	100,0
	V	N	9.999	49.414	194.972	254.385
		%	3,9	19,4	76,6	100,0
	15-24 Total	N	3.739	27.018	151.677	182.434
		%	2,0	14,8	83,1	100,0
	I	N	742	2.072	26.382	29.196
		%	2,5	7,1	90,4	100,0
	II	N	.	4.356	20.129	24.485
		%	.	17,8	82,2	100,0
	III	N	521	7.538	28.840	36.900
		%	1,4	20,4	78,2	100,0
	IV	N	1.603	10.535	62.213	74.351
		%	2,2	14,2	83,7	100,0
	V	N	872	2.517	14.113	17.503
		%	5,0	14,4	80,6	100,0
	25-44 Total	N	19.123	109.952	527.564	656.640
		%	2,9	16,7	80,3	100,0
	I	N	2.184	12.029	74.605	88.818
		%	2,5	13,5	84,0	100,0
	II	N	1.076	11.350	57.294	69.719
		%	1,5	16,3	82,2	100,0
	III	N	4.603	21.465	118.218	144.286
		%	3,2	14,9	81,9	100,0
	IV	N	8.347	50.751	212.020	271.117
		%	3,1	18,7	78,2	100,0
	V	N	2.914	14.358	65.427	82.699
		%	3,5	17,4	79,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	45-64	Total	N 21.299	129.759	464.908	615.965
			% 3,5	21,1	75,5	100,0
	I	N	1.498	12.440	56.086	70.023
		%	2,1	17,8	80,1	100,0
	II	N	2.070	10.116	38.026	50.212
		%	4,1	20,1	75,7	100,0
	III	N	5.135	32.135	117.692	154.963
		%	3,3	20,7	75,9	100,0
	IV	N	10.420	55.561	188.734	254.716
		%	4,1	21,8	74,1	100,0
	V	N	2.177	19.507	64.369	86.052
		%	2,5	22,7	74,8	100,0
	65-74	Total	N 8.582	40.440	156.481	205.503
		%	4,2	19,7	76,1	100,0
	I	N	542	2.740	17.670	20.952
		%	2,6	13,1	84,3	100,0
	II	N	339	3.246	10.502	14.087
		%	2,4	23,0	74,6	100,0
	III	N	2.412	7.130	35.134	44.676
		%	5,4	16,0	78,6	100,0
	IV	N	3.799	21.436	72.652	97.887
		%	3,9	21,9	74,2	100,0
	V	N	1.491	5.889	20.521	27.901
		%	5,3	21,1	73,6	100,0
	>=75	Total	N 9.938	34.216	182.660	226.814
		%	4,4	15,1	80,5	100,0
	I	N	496	1.430	7.612	9.538
		%	5,2	15,0	79,8	100,0
	II	N	380	3.081	11.270	14.731
		%	2,6	20,9	76,5	100,0
	III	N	1.302	6.501	41.835	49.638
		%	2,6	13,1	84,3	100,0
	IV	N	5.214	16.061	91.401	112.676
		%	4,6	14,3	81,1	100,0
	V	N	2.546	7.144	30.541	40.231
		%	6,3	17,8	75,9	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 53. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y nivel de estudios*

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	Total	N	31.276	168.828	715.020	915.124
		%	3,4	18,4	78,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	9.593	35.804	165.202	210.600
		%	4,6	17,0	78,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	5.998	33.653	127.802	167.454
		%	3,6	20,1	76,3	100,0
	Secundaria, superior	N	11.699	69.580	279.390	360.670
		%	3,2	19,3	77,5	100,0
	Terciaria	N	3.985	29.790	142.626	176.400
		%	2,3	16,9	80,9	100,0
15-24	Total	N	1.730	12.561	80.168	94.458
		%	1,8	13,3	84,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	294	1.493	8.131	9.918
		%	3,0	15,1	82,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.118	4.671	25.340	31.129
		%	3,6	15,0	81,4	100,0
	Secundaria, superior	N	317	5.113	37.410	42.840
		%	0,7	11,9	87,3	100,0
	Terciaria	N	.	1.284	9.287	10.572
		%	.	12,1	87,9	100,0
25-44	Total	N	9.529	60.431	266.349	336.309
		%	2,8	18,0	79,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.314	8.868	26.593	37.776
		%	6,1	23,5	70,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.523	9.222	42.063	52.808
		%	2,9	17,5	79,7	100,0
	Secundaria, superior	N	5.090	29.652	129.532	164.274
		%	3,1	18,1	78,9	100,0
	Terciaria	N	601	12.688	68.162	81.451
		%	0,7	15,6	83,7	100,0
45-64	Total	N	11.584	64.925	226.146	302.655
		%	3,8	21,5	74,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.746	12.849	54.805	70.400
		%	3,9	18,3	77,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.004	14.663	36.578	53.244
		%	3,8	27,5	68,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 53. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres 45-64	Secundaria, superior	N	4.641	25.817	86.673	117.130	
		%	4,0	22,0	74,0	100,0	
	Terciaria	N	2.194	11.595	48.092	61.881	
		%	3,5	18,7	77,7	100,0	
65-74	Total	N	4.654	17.554	73.526	95.733	
		%	4,9	18,3	76,8	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.295	6.037	30.685	38.017	
		%	3,4	15,9	80,7	100,0	
	Secundaria, inferior	N	866	2.932	12.494	16.291	
		%	5,3	18,0	76,7	100,0	
	Secundaria, superior	N	1.651	5.906	18.390	25.948	
		%	6,4	22,8	70,9	100,0	
	Terciaria	N	842	2.679	11.956	15.477	
		%	5,4	17,3	77,2	100,0	
>=75	Total	N	3.779	13.358	68.831	85.968	
		%	4,4	15,5	80,1	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	2.944	6.557	44.988	54.489	
		%	5,4	12,0	82,6	100,0	
	Secundaria, inferior	N	488	2.165	11.328	13.981	
		%	3,5	15,5	81,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	.	3.092	7.386	10.478	
		%	.	29,5	70,5	100,0	
	Terciaria	N	348	1.544	5.129	7.020	
		%	5,0	22,0	73,1	100,0	
Total	Total	N	31.631	173.161	771.091	975.882	
		%	3,2	17,7	79,0	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	11.873	52.488	213.967	278.327	
		%	4,3	18,9	76,9	100,0	
	Secundaria, inferior	N	5.261	32.221	132.284	169.766	
		%	3,1	19,0	77,9	100,0	
	Secundaria, superior	N	9.688	55.989	242.188	307.866	
		%	3,1	18,2	78,7	100,0	
	Terciaria	N	4.809	32.462	182.652	219.923	
		%	2,2	14,8	83,1	100,0	
Total	Total	N	2.009	14.717	72.773	89.499	
		%	2,2	16,4	81,3	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 53. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	275	3.399	7.712	11.386
			%	2,4	29,9	67,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	394	3.096	13.274	16.763
			%	2,3	18,5	79,2	100,0
		Secundaria, superior	N	1.341	5.740	38.363	45.443
			%	3,0	12,6	84,4	100,0
		Terciaria	N	.	2.483	13.424	15.907
			%	.	15,6	84,4	100,0
	25-44	Total	N	9.820	49.521	261.484	320.826
			%	3,1	15,4	81,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.022	4.889	20.078	25.990
			%	3,9	18,8	77,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.791	7.346	29.800	38.937
			%	4,6	18,9	76,5	100,0
		Secundaria, superior	N	4.010	21.157	105.320	130.487
			%	3,1	16,2	80,7	100,0
		Terciaria	N	2.996	16.129	106.286	125.412
			%	2,4	12,9	84,8	100,0
	45-64	Total	N	9.715	65.022	239.031	313.769
			%	3,1	20,7	76,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.954	14.973	60.036	77.963
			%	3,8	19,2	77,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.760	13.550	46.424	61.735
			%	2,9	21,9	75,2	100,0
		Secundaria, superior	N	3.735	24.859	81.728	110.322
			%	3,4	22,5	74,1	100,0
		Terciaria	N	1.265	11.640	50.843	63.749
			%	2,0	18,3	79,8	100,0
	65-74	Total	N	3.929	23.041	82.955	109.925
			%	3,6	21,0	75,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.596	14.388	44.869	61.852
			%	4,2	23,3	72,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	563	5.087	21.802	27.452
			%	2,1	18,5	79,4	100,0
		Secundaria, superior	N	488	2.425	8.980	11.893
			%	4,1	20,4	75,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 53. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N	282	1.141	7.304	8.727	
			%	3,2	13,1	83,7	100,0	
	>=75	Total	N	6.159	20.858	114.847	141.864	
			%	4,3	14,7	81,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	5.026	14.839	81.271	101.136	
			%	5,0	14,7	80,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N	753	3.142	20.984	24.879	
			%	3,0	12,6	84,3	100,0	
		Secundaria, superior	N	114	1.808	7.797	9.720	
			%	1,2	18,6	80,2	100,0	
		Terciaria	N	266	1.069	4.794	6.129	
			%	4,3	17,4	78,2	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	62.907	341.989	1.486.111	1.891.006
				%	3,3	18,1	78,6	100,0
			Sin estudios, primaria	N	21.466	88.292	379.169	488.927
				%	4,4	18,1	77,6	100,0
			Secundaria, inferior	N	11.260	65.875	260.086	337.220
				%	3,3	19,5	77,1	100,0
		Secundaria, superior	N	21.388	125.570	521.579	668.536	
			%	3,2	18,8	78,0	100,0	
		Terciaria	N	8.793	62.252	325.277	396.323	
			%	2,2	15,7	82,1	100,0	
15-24		Total	N	3.739	27.278	152.940	183.958	
			%	2,0	14,8	83,1	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	569	4.892	15.843	21.304	
			%	2,7	23,0	74,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.512	7.767	38.613	47.891	
			%	3,2	16,2	80,6	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.658	10.853	75.772	88.283	
			%	1,9	12,3	85,8	100,0	
	Terciaria	N	.	3.767	22.712	26.479		
		%	.	14,2	85,8	100,0		
25-44	Total	N	19.349	109.952	527.834	657.135		
		%	2,9	16,7	80,3	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	3.337	13.757	46.671	63.765		
		%	5,2	21,6	73,2	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 53. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	3.314	16.568	71.863	91.745
			%	3,6	18,1	78,3	100,0
		Secundaria, superior	N	9.100	50.810	234.852	294.762
			%	3,1	17,2	79,7	100,0
		Terciaria	N	3.597	28.817	174.448	206.862
			%	1,7	13,9	84,3	100,0
	45-64	Total	N	21.299	129.947	465.178	616.424
			%	3,5	21,1	75,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.700	27.822	114.841	148.363
			%	3,8	18,8	77,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.764	28.214	83.002	114.979
			%	3,3	24,5	72,2	100,0
		Secundaria, superior	N	8.376	50.676	168.400	227.452
			%	3,7	22,3	74,0	100,0
		Terciaria	N	3.459	23.236	98.935	125.630
			%	2,8	18,5	78,8	100,0
	65-74	Total	N	8.582	40.595	156.481	205.658
			%	4,2	19,7	76,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.891	20.425	75.554	99.869
			%	3,9	20,5	75,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.429	8.019	34.296	43.744
			%	3,3	18,3	78,4	100,0
		Secundaria, superior	N	2.139	8.331	27.371	37.841
			%	5,7	22,0	72,3	100,0
		Terciaria	N	1.124	3.820	19.260	24.204
			%	4,6	15,8	79,6	100,0
	>=75	Total	N	9.938	34.216	183.678	227.832
			%	4,4	15,0	80,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.970	21.396	126.260	155.625
			%	5,1	13,7	81,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.241	5.307	32.312	38.860
			%	3,2	13,7	83,1	100,0
		Secundaria, superior	N	114	4.900	15.183	20.198
			%	0,6	24,3	75,2	100,0
		Terciaria	N	613	2.612	9.923	13.149
			%	4,7	19,9	75,5	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 54. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y territorio histórico

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	CAPV	N	21.802	102.232	791.090	915.124
		%	2,4	11,2	86,4	100,0
	Araba	N	629	10.245	122.876	133.751
		%	0,5	7,7	91,9	100,0
	Gipuzkoa	N	10.911	33.526	249.375	293.812
		%	3,7	11,4	84,9	100,0
	Bizkaia	N	10.262	58.461	418.838	487.561
		%	2,1	12,0	85,9	100,0
15-24	CAPV	N	954	8.160	85.344	94.458
		%	1,0	8,6	90,4	100,0
	Araba	N	.	1.187	13.683	14.869
		%	.	8,0	92,0	100,0
	Gipuzkoa	N	503	3.649	27.152	31.305
		%	1,6	11,7	86,7	100,0
	Bizkaia	N	451	3.324	44.509	48.284
		%	0,9	6,9	92,2	100,0
25-44	CAPV	N	9.600	40.963	285.747	336.309
		%	2,9	12,2	85,0	100,0
	Araba	N	411	4.630	47.021	52.062
		%	0,8	8,9	90,3	100,0
	Gipuzkoa	N	4.200	11.954	90.635	106.790
		%	3,9	11,2	84,9	100,0
	Bizkaia	N	4.989	24.379	148.090	177.458
		%	2,8	13,7	83,5	100,0
45-64	CAPV	N	6.831	36.410	259.414	302.655
		%	2,3	12,0	85,7	100,0
	Araba	N	150	3.583	39.019	42.751
		%	0,3	8,4	91,3	100,0
	Gipuzkoa	N	4.166	12.645	80.607	97.419
		%	4,3	13,0	82,7	100,0
	Bizkaia	N	2.515	20.182	139.788	162.485
		%	1,5	12,4	86,0	100,0
65-74	CAPV	N	2.708	9.120	83.906	95.733
		%	2,8	9,5	87,6	100,0
	Araba	N	69	429	12.665	13.163
		%	0,5	3,3	96,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 54. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total	
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	1.830	2.560	27.741	32.130	
			%	5,7	8,0	86,3	100,0	
		Bizkaia	N	809	6.132	43.500	50.440	
			%	1,6	12,2	86,2	100,0	
	>=75	CAPV	N	1.710	7.579	76.679	85.968	
			%	2,0	8,8	89,2	100,0	
			Araba	N	.	417	10.488	10.905
				%	.	3,8	96,2	100,0
			Gipuzkoa	N	211	2.718	23.240	26.168
				%	0,8	10,4	88,8	100,0
			Bizkaia	N	1.499	4.444	42.951	48.895
				%	3,1	9,1	87,8	100,0
Mujeres		Total	CAPV	N	27.134	116.133	832.615	975.882
				%	2,8	11,9	85,3	100,0
			Araba	N	652	9.772	126.347	136.772
				%	0,5	7,1	92,4	100,0
		Gipuzkoa	N	13.111	40.136	259.438	312.686	
			%	4,2	12,8	83,0	100,0	
		Bizkaia	N	13.371	66.225	446.829	526.425	
			%	2,5	12,6	84,9	100,0	
	15-24	CAPV	N	1.330	12.857	75.312	89.499	
			%	1,5	14,4	84,1	100,0	
			Araba	N	.	730	12.480	13.210
				%	.	5,5	94,5	100,0
			Gipuzkoa	N	995	5.732	22.717	29.443
				%	3,4	19,5	77,2	100,0
		Bizkaia	N	335	6.395	40.115	46.846	
			%	0,7	13,7	85,6	100,0	
	25-44	CAPV	N	12.026	38.380	270.419	320.826	
			%	3,7	12,0	84,3	100,0	
		Araba	N	366	4.110	43.393	47.869	
			%	0,8	8,6	90,7	100,0	
		Gipuzkoa	N	5.369	12.859	83.678	101.905	
			%	5,3	12,6	82,1	100,0	
	Bizkaia	N	6.292	21.412	143.348	171.052		
		%	3,7	12,5	83,8	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 54. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	8.566	41.382	263.820	313.769
			%	2,7	13,2	84,1	100,0
		Araba	N	286	2.716	41.261	44.263
			%	0,6	6,1	93,2	100,0
		Gipuzkoa	N	4.115	14.245	81.302	99.662
			%	4,1	14,3	81,6	100,0
	Bizkaia	N	4.166	24.420	141.257	169.843	
		%	2,5	14,4	83,2	100,0	
	65-74	CAPV	N	2.806	10.564	96.554	109.925
			%	2,6	9,6	87,8	100,0
		Araba	N	.	1.371	12.949	14.320
			%	.	9,6	90,4	100,0
		Gipuzkoa	N	1.276	2.635	32.209	36.120
			%	3,5	7,3	89,2	100,0
	Bizkaia	N	1.530	6.559	51.396	59.484	
		%	2,6	11,0	86,4	100,0	
	>=75	CAPV	N	2.405	12.949	126.510	141.864
			%	1,7	9,1	89,2	100,0
Araba		N	.	846	16.264	17.110	
		%	.	4,9	95,1	100,0	
Gipuzkoa		N	1.357	4.665	39.533	45.555	
		%	3,0	10,2	86,8	100,0	
Bizkaia	N	1.048	7.438	70.713	79.200		
	%	1,3	9,4	89,3	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	48.936	218.365	1.623.705	1.891.006
			%	2,6	11,5	85,9	100,0
	Araba	N	1.281	20.018	249.224	270.523	
		%	0,5	7,4	92,1	100,0	
	Gipuzkoa	N	24.022	73.662	508.813	606.497	
		%	4,0	12,1	83,9	100,0	
	Bizkaia	N	23.633	124.686	865.667	1.013.987	
		%	2,3	12,3	85,4	100,0	
	15-24	CAPV	N	2.284	21.017	160.656	183.958
			%	1,2	11,4	87,3	100,0
		Araba	N	.	1.916	26.163	28.079
			%	.	6,8	93,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 54. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	1.498	9.381	49.869	60.748
			%	2,5	15,4	82,1	100,0
		Bizkaia	N	786	9.720	84.624	95.130
			%	0,8	10,2	89,0	100,0
	25-44	CAPV	N	21.626	79.343	556.166	657.135
			%	3,3	12,1	84,6	100,0
		Araba	N	776	8.740	90.414	99.930
			%	0,8	8,7	90,5	100,0
		Gipuzkoa	N	9.569	24.813	174.313	208.695
			%	4,6	11,9	83,5	100,0
		Bizkaia	N	11.280	45.790	291.439	348.509
			%	3,2	13,1	83,6	100,0
	45-64	CAPV	N	15.397	77.792	523.235	616.424
			%	2,5	12,6	84,9	100,0
		Araba	N	436	6.299	80.280	87.015
			%	0,5	7,2	92,3	100,0
		Gipuzkoa	N	8.281	26.890	161.910	197.081
			%	4,2	13,6	82,2	100,0
		Bizkaia	N	6.681	44.603	281.045	332.328
			%	2,0	13,4	84,6	100,0
	65-74	CAPV	N	5.514	19.685	180.460	205.658
			%	2,7	9,6	87,7	100,0
		Araba	N	69	1.800	25.615	27.483
			%	0,3	6,5	93,2	100,0
		Gipuzkoa	N	3.106	5.194	59.950	68.251
			%	4,6	7,6	87,8	100,0
		Bizkaia	N	2.338	12.690	94.895	109.924
			%	2,1	11,5	86,3	100,0
	>=75	CAPV	N	4.115	20.529	203.188	227.832
			%	1,8	9,0	89,2	100,0
		Araba	N	.	1.263	26.752	28.015
			%	.	4,5	95,5	100,0
		Gipuzkoa	N	1.568	7.383	62.772	71.723
			%	2,2	10,3	87,5	100,0
		Bizkaia	N	2.547	11.883	113.664	128.094
			%	2,0	9,3	88,7	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	Total	Total N	21.802	101.935	790.127	913.863
		%	2,4	11,2	86,5	100,0
	I	N	2.794	9.057	101.838	113.690
		%	2,5	8,0	89,6	100,0
	II	N	1.472	8.728	68.005	78.206
		%	1,9	11,2	87,0	100,0
	III	N	3.145	19.850	165.359	188.355
		%	1,7	10,5	87,8	100,0
	IV	N	11.951	54.390	383.965	450.306
		%	2,7	12,1	85,3	100,0
	V	N	2.439	9.909	70.960	83.307
		%	2,9	11,9	85,2	100,0
	15-24 Total	N	954	7.862	85.084	93.900
		%	1,0	8,4	90,6	100,0
	I	N	.	1.094	13.541	14.634
		%	.	7,5	92,5	100,0
	II	N	.	993	9.995	10.988
		%	.	9,0	91,0	100,0
	III	N	304	977	15.549	16.830
		%	1,8	5,8	92,4	100,0
	IV	N	650	4.799	37.289	42.737
		%	1,5	11,2	87,3	100,0
	V	N	.	.	8.711	8.711
		%	.	.	100,0	100,0
	25-44 Total	N	9.600	40.963	285.747	336.309
		%	2,9	12,2	85,0	100,0
	I	N	1.689	3.542	38.501	43.732
		%	3,9	8,1	88,0	100,0
	II	N	628	4.101	27.768	32.496
		%	1,9	12,6	85,4	100,0
	III	N	1.055	7.586	53.615	62.257
		%	1,7	12,2	86,1	100,0
	IV	N	5.109	21.224	134.059	160.392
		%	3,2	13,2	83,6	100,0
	V	N	1.118	4.510	31.804	37.432
		%	3,0	12,0	85,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total	
Hombres 45-64	Total	N	6.831	36.410	259.127	302.368	
		%	2,3	12,0	85,7	100,0	
	I	N	699	3.431	33.777	37.907	
		%	1,8	9,1	89,1	100,0	
	II	N	626	2.696	20.097	23.419	
		%	2,7	11,5	85,8	100,0	
	III	N	1.291	8.788	56.243	66.322	
		%	1,9	13,2	84,8	100,0	
	IV	N	3.613	18.964	128.036	150.614	
		%	2,4	12,6	85,0	100,0	
	V	N	602	2.532	20.972	24.106	
		%	2,5	10,5	87,0	100,0	
	65-74	Total	N	2.708	9.120	83.906	95.733
			%	2,8	9,5	87,6	100,0
	I	N	407	704	12.642	13.753	
		%	3,0	5,1	91,9	100,0	
	II	N	218	556	6.088	6.862	
		%	3,2	8,1	88,7	100,0	
	III	N	317	1.728	19.732	21.777	
		%	1,5	7,9	90,6	100,0	
	IV	N	1.406	4.763	41.584	47.753	
		%	2,9	10,0	87,1	100,0	
	V	N	360	1.369	3.859	5.588	
		%	6,4	24,5	69,1	100,0	
	>=75	Total	N	1.710	7.579	76.264	85.553
			%	2,0	8,9	89,1	100,0
	I	N	.	286	3.377	3.663	
		%	.	7,8	92,2	100,0	
	II	N	.	382	4.057	4.440	
		%	.	8,6	91,4	100,0	
	III	N	177	772	20.220	21.169	
		%	0,8	3,6	95,5	100,0	
	IV	N	1.174	4.640	42.996	48.810	
		%	2,4	9,5	88,1	100,0	
	V	N	359	1.499	5.613	7.470	
		%	4,8	20,1	75,1	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	Total	Total	N 26.708	116.133	830.651	973.492
			% 2,7	11,9	85,3	100,0
	I	N	844	6.405	97.589	104.838
		%	0,8	6,1	93,1	100,0
	II	N	2.111	11.774	81.144	95.028
		%	2,2	12,4	85,4	100,0
	III	N	6.360	27.701	208.046	242.107
		%	2,6	11,4	85,9	100,0
	IV	N	11.862	48.578	300.002	360.441
		%	3,3	13,5	83,2	100,0
	V	N	5.532	21.675	143.870	171.077
		%	3,2	12,7	84,1	100,0
	15-24	Total	N 1.330	12.857	74.346	88.533
		%	1,5	14,5	84,0	100,0
	I	N	.	1.264	13.297	14.562
		%	.	8,7	91,3	100,0
	II	N	.	1.502	11.995	13.497
		%	.	11,1	88,9	100,0
	III	N	553	2.698	16.818	20.069
		%	2,8	13,4	83,8	100,0
	IV	N	275	5.328	26.011	31.614
		%	0,9	16,9	82,3	100,0
	V	N	502	2.065	6.225	8.792
		%	5,7	23,5	70,8	100,0
	25-44	Total	N 11.801	38.380	270.150	320.330
		%	3,7	12,0	84,3	100,0
	I	N	429	2.468	42.189	45.086
		%	1,0	5,5	93,6	100,0
	II	N	1.339	5.714	30.170	37.223
		%	3,6	15,4	81,1	100,0
	III	N	2.716	10.608	68.706	82.029
		%	3,3	12,9	83,8	100,0
	IV	N	5.798	13.480	91.447	110.725
		%	5,2	12,2	82,6	100,0
	V	N	1.519	6.110	37.638	45.267
		%	3,4	13,5	83,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	Total	N 8.566	41.382	263.649	313.598
			% 2,7	13,2	84,1	100,0
	I	N	415	2.042	29.660	32.116
		%	1,3	6,4	92,4	100,0
	II	N	544	3.403	22.846	26.792
		%	2,0	12,7	85,3	100,0
	III	N	2.158	11.233	75.250	88.641
		%	2,4	12,7	84,9	100,0
	IV	N	3.683	16.316	84.102	104.102
		%	3,5	15,7	80,8	100,0
	V	N	1.767	8.388	51.791	61.946
		%	2,9	13,5	83,6	100,0
	65-74	Total	N 2.806	10.564	96.399	109.770
		%	2,6	9,6	87,8	100,0
	I	N	.	387	6.812	7.199
		%	.	5,4	94,6	100,0
	II	N	228	694	6.302	7.225
		%	3,2	9,6	87,2	100,0
	III	N	932	1.406	20.561	22.899
		%	4,1	6,1	89,8	100,0
	IV	N	895	6.865	42.375	50.134
		%	1,8	13,7	84,5	100,0
	V	N	751	1.212	20.349	22.312
		%	3,4	5,4	91,2	100,0
	>=75	Total	N 2.205	12.949	126.107	141.261
		%	1,6	9,2	89,3	100,0
	I	N	.	244	5.631	5.875
		%	.	4,2	95,8	100,0
	II	N	.	461	9.830	10.292
		%	.	4,5	95,5	100,0
	III	N	.	1.757	26.711	28.468
		%	.	6,2	93,8	100,0
	IV	N	1.212	6.588	56.066	63.866
		%	1,9	10,3	87,8	100,0
	V	N	993	3.899	27.868	32.760
		%	3,0	11,9	85,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	Total	Total N	48.510	218.068	1.620.778	1.887.356
		%	2,6	11,6	85,9	100,0
	I	N	3.638	15.462	199.428	218.528
		%	1,7	7,1	91,3	100,0
	II	N	3.583	20.502	149.149	173.234
		%	2,1	11,8	86,1	100,0
	III	N	9.505	47.552	373.405	430.462
		%	2,2	11,0	86,7	100,0
	IV	N	23.813	102.967	683.966	810.747
		%	2,9	12,7	84,4	100,0
	V	N	7.971	31.584	214.830	254.385
		%	3,1	12,4	84,5	100,0
	15-24 Total	N	2.284	20.719	159.430	182.434
		%	1,3	11,4	87,4	100,0
	I	N	.	2.358	26.838	29.196
		%	.	8,1	91,9	100,0
	II	N	.	2.495	21.990	24.485
		%	.	10,2	89,8	100,0
	III	N	857	3.675	32.367	36.900
		%	2,3	10,0	87,7	100,0
	IV	N	925	10.126	63.300	74.351
		%	1,2	13,6	85,1	100,0
	V	N	502	2.065	14.936	17.503
		%	2,9	11,8	85,3	100,0
	25-44 Total	N	21.400	79.343	555.896	656.640
		%	3,3	12,1	84,7	100,0
	I	N	2.118	6.010	80.690	88.818
		%	2,4	6,8	90,8	100,0
	II	N	1.966	9.815	57.938	69.719
		%	2,8	14,1	83,1	100,0
	III	N	3.772	18.194	122.320	144.286
		%	2,6	12,6	84,8	100,0
	IV	N	10.907	34.704	225.507	271.117
		%	4,0	12,8	83,2	100,0
	V	N	2.637	10.621	69.441	82.699
		%	3,2	12,8	84,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	45-64	Total	N 15.397	77.792	522.776	615.965
			% 2,5	12,6	84,9	100,0
	I	N	1.113	5.473	63.438	70.023
		%	1,6	7,8	90,6	100,0
	II	N	1.170	6.099	42.943	50.212
		%	2,3	12,1	85,5	100,0
	III	N	3.449	20.020	131.493	154.963
		%	2,2	12,9	84,9	100,0
	IV	N	7.296	35.281	212.139	254.716
		%	2,9	13,9	83,3	100,0
	V	N	2.369	10.919	72.763	86.052
		%	2,8	12,7	84,6	100,0
	65-74	Total	N 5.514	19.685	180.305	205.503
		%	2,7	9,6	87,7	100,0
	I	N	407	1.092	19.454	20.952
		%	1,9	5,2	92,8	100,0
	II	N	447	1.250	12.390	14.087
		%	3,2	8,9	88,0	100,0
	III	N	1.249	3.134	40.293	44.676
		%	2,8	7,0	90,2	100,0
	IV	N	2.300	11.628	83.959	97.887
		%	2,3	11,9	85,8	100,0
	V	N	1.111	2.581	24.209	27.901
		%	4,0	9,3	86,8	100,0
	>=75	Total	N 3.915	20.529	202.371	226.814
		%	1,7	9,1	89,2	100,0
	I	N	.	530	9.008	9.538
		%	.	5,6	94,4	100,0
	II	N	.	844	13.887	14.731
		%	.	5,7	94,3	100,0
	III	N	177	2.529	46.932	49.638
		%	0,4	5,1	94,5	100,0
	IV	N	2.385	11.228	99.062	112.676
		%	2,1	10,0	87,9	100,0
	V	N	1.352	5.398	33.481	40.231
		%	3,4	13,4	83,2	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 56. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y nivel de estudios*

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	Total	N	21.802	102.232	791.090	915.124
		%	2,4	11,2	86,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.405	26.193	180.001	210.600
		%	2,1	12,4	85,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	5.024	19.303	143.127	167.454
		%	3,0	11,5	85,5	100,0
	Secundaria, superior	N	7.975	40.554	312.141	360.670
		%	2,2	11,2	86,5	100,0
	Terciaria	N	4.398	16.183	155.820	176.400
		%	2,5	9,2	88,3	100,0
15-24 Total	Total	N	954	8.160	85.344	94.458
		%	1,0	8,6	90,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	756	9.162	9.918
		%	.	7,6	92,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	755	1.827	28.547	31.129
		%	2,4	5,9	91,7	100,0
	Secundaria, superior	N	199	4.562	38.079	42.840
		%	0,5	10,6	88,9	100,0
	Terciaria	N	.	1.016	9.556	10.572
		%	.	9,6	90,4	100,0
25-44 Total	Total	N	9.600	40.963	285.747	336.309
		%	2,9	12,2	85,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	941	3.629	33.206	37.776
		%	2,5	9,6	87,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.333	9.651	40.825	52.808
		%	4,4	18,3	77,3	100,0
	Secundaria, superior	N	4.009	21.301	138.965	164.274
		%	2,4	13,0	84,6	100,0
	Terciaria	N	2.316	6.383	72.752	81.451
		%	2,8	7,8	89,3	100,0
45-64 Total	Total	N	6.831	36.410	259.414	302.655
		%	2,3	12,0	85,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.197	11.017	58.185	70.400
		%	1,7	15,6	82,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.205	5.647	46.392	53.244
		%	2,3	10,6	87,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 56. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	3.113	12.414	101.603	117.130
			%	2,7	10,6	86,7	100,0
		Terciaria	N	1.316	7.332	53.233	61.881
			%	2,1	11,8	86,0	100,0
	65-74	Total	N	2.708	9.120	83.906	95.733
			%	2,8	9,5	87,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.121	5.417	31.479	38.017
			%	2,9	14,3	82,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	731	679	14.881	16.291
			%	4,5	4,2	91,3	100,0
		Secundaria, superior	N	449	1.857	23.642	25.948
			%	1,7	7,2	91,1	100,0
		Terciaria	N	407	1.167	13.904	15.477
			%	2,6	7,5	89,8	100,0
	>=75	Total	N	1.710	7.579	76.679	85.968
			%	2,0	8,8	89,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.145	5.374	47.970	54.489
			%	2,1	9,9	88,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	1.499	12.482	13.981
			%	.	10,7	89,3	100,0
		Secundaria, superior	N	206	420	9.852	10.478
			%	2,0	4,0	94,0	100,0
		Terciaria	N	359	286	6.375	7.020
			%	5,1	4,1	90,8	100,0
Mujeres	Total	Total	N	27.134	116.133	832.615	975.882
			%	2,8	11,9	85,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.673	36.095	233.560	278.327
			%	3,1	13,0	83,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.700	14.634	150.432	169.766
			%	2,8	8,6	88,6	100,0
		Secundaria, superior	N	10.075	44.076	253.715	307.866
			%	3,3	14,3	82,4	100,0
		Terciaria	N	3.686	21.328	194.909	219.923
			%	1,7	9,7	88,6	100,0
	15-24	Total	N	1.330	12.857	75.312	89.499
			%	1,5	14,4	84,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 56. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	497	1.623	9.266	11.386
			%	4,4	14,3	81,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	223	1.087	15.453	16.763
			%	1,3	6,5	92,2	100,0
		Secundaria, superior	N	275	8.610	36.558	45.443
			%	0,6	18,9	80,4	100,0
		Terciaria	N	335	1.537	14.034	15.907
			%	2,1	9,7	88,2	100,0
	25-44	Total	N	12.026	38.380	270.419	320.826
			%	3,7	12,0	84,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.941	3.636	20.413	25.990
			%	7,5	14,0	78,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.092	2.532	34.313	38.937
			%	5,4	6,5	88,1	100,0
		Secundaria, superior	N	6.222	17.796	106.469	130.487
			%	4,8	13,6	81,6	100,0
		Terciaria	N	1.771	14.417	109.224	125.412
			%	1,4	11,5	87,1	100,0
	45-64	Total	N	8.566	41.382	263.820	313.769
			%	2,7	13,2	84,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.713	12.329	62.921	77.963
			%	3,5	15,8	80,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.377	8.143	52.216	61.735
			%	2,2	13,2	84,6	100,0
		Secundaria, superior	N	3.268	15.950	91.104	110.322
			%	3,0	14,5	82,6	100,0
		Terciaria	N	1.209	4.960	57.579	63.749
			%	1,9	7,8	90,3	100,0
	65-74	Total	N	2.806	10.564	96.554	109.925
			%	2,6	9,6	87,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.456	6.943	53.454	61.852
			%	2,4	11,2	86,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	670	1.854	24.929	27.452
			%	2,4	6,8	90,8	100,0
		Secundaria, superior	N	311	1.354	10.229	11.893
			%	2,6	11,4	86,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 56. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N	370	414	7.943	8.727	
			%	4,2	4,7	91,0	100,0	
	>=75	Total	N	2.405	12.949	126.510	141.864	
			%	1,7	9,1	89,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.067	11.565	87.505	101.136	
			%	2,0	11,4	86,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	339	1.020	23.521	24.879	
			%	1,4	4,1	94,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	365	9.355	9.720	
			%	.	3,8	96,2	100,0	
		Terciaria	N	.	.	6.129	6.129	
			%	.	.	100,0	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	48.936	218.365	1.623.705	1.891.006
				%	2,6	11,5	85,9	100,0
			Sin estudios, primaria	N	13.078	62.288	413.561	488.927
				%	2,7	12,7	84,6	100,0
			Secundaria, inferior	N	9.724	33.937	293.559	337.220
				%	2,9	10,1	87,1	100,0
		Secundaria, superior	N	18.051	84.630	565.856	668.536	
			%	2,7	12,7	84,6	100,0	
		Terciaria	N	8.084	37.510	350.729	396.323	
			%	2,0	9,5	88,5	100,0	
	15-24	Total	N	2.284	21.017	160.656	183.958	
			%	1,2	11,4	87,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	497	2.379	18.428	21.304	
			%	2,3	11,2	86,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	978	2.914	44.000	47.891	
			%	2,0	6,1	91,9	100,0	
		Secundaria, superior	N	474	13.172	74.637	88.283	
			%	0,5	14,9	84,5	100,0	
		Terciaria	N	335	2.553	23.591	26.479	
			%	1,3	9,6	89,1	100,0	
	25-44	Total	N	21.626	79.343	556.166	657.135	
			%	3,3	12,1	84,6	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.882	7.264	53.619	63.765	
			%	4,5	11,4	84,1	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 56. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	4.425	12.183	75.138	91.745
			%	4,8	13,3	81,9	100,0
		Secundaria, superior	N	10.231	39.097	245.433	294.762
			%	3,5	13,3	83,3	100,0
		Terciaria	N	4.088	20.799	181.976	206.862
			%	2,0	10,1	88,0	100,0
	45-64	Total	N	15.397	77.792	523.235	616.424
			%	2,5	12,6	84,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.910	23.346	121.107	148.363
			%	2,6	15,7	81,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.582	13.789	98.608	114.979
			%	2,2	12,0	85,8	100,0
		Secundaria, superior	N	6.380	28.365	192.707	227.452
			%	2,8	12,5	84,7	100,0
		Terciaria	N	2.526	12.292	110.812	125.630
			%	2,0	9,8	88,2	100,0
	65-74	Total	N	5.514	19.685	180.460	205.658
			%	2,7	9,6	87,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.577	12.360	84.932	99.869
			%	2,6	12,4	85,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.401	2.533	39.810	43.744
			%	3,2	5,8	91,0	100,0
		Secundaria, superior	N	760	3.211	33.871	37.841
			%	2,0	8,5	89,5	100,0
		Terciaria	N	777	1.580	21.847	24.204
			%	3,2	6,5	90,3	100,0
	>=75	Total	N	4.115	20.529	203.188	227.832
			%	1,8	9,0	89,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.212	16.939	135.475	155.625
			%	2,1	10,9	87,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	339	2.519	36.003	38.860
			%	0,9	6,5	92,6	100,0
		Secundaria, superior	N	206	785	19.207	20.198
			%	1,0	3,9	95,1	100,0
		Terciaria	N	359	286	12.504	13.149
			%	2,7	2,2	95,1	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 57. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y territorio histórico

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	CAPV	N	17.452	133.217	764.454	915.124
		%	1,9	14,6	83,5	100,0
	Araba	N	738	11.429	121.584	133.751
		%	0,6	8,5	90,9	100,0
	Gipuzkoa	N	6.270	37.731	249.811	293.812
		%	2,1	12,8	85,0	100,0
	Bizkaia	N	10.444	84.058	393.060	487.561
		%	2,1	17,2	80,6	100,0
15-24	CAPV	N	755	10.254	83.449	94.458
		%	0,8	10,9	88,3	100,0
	Araba	N	.	1.160	13.710	14.869
		%	.	7,8	92,2	100,0
	Gipuzkoa	N	304	3.716	27.284	31.305
		%	1,0	11,9	87,2	100,0
	Bizkaia	N	451	5.378	42.455	48.284
		%	0,9	11,1	87,9	100,0
25-44	CAPV	N	5.919	53.449	276.941	336.309
		%	1,8	15,9	82,3	100,0
	Araba	N	.	4.476	47.586	52.062
		%	.	8,6	91,4	100,0
	Gipuzkoa	N	2.863	14.177	89.749	106.790
		%	2,7	13,3	84,0	100,0
	Bizkaia	N	3.056	34.796	139.606	177.458
		%	1,7	19,6	78,7	100,0
45-64	CAPV	N	6.217	46.819	249.620	302.655
		%	2,1	15,5	82,5	100,0
	Araba	N	418	3.988	38.346	42.751
		%	1,0	9,3	89,7	100,0
	Gipuzkoa	N	1.520	12.949	82.950	97.419
		%	1,6	13,3	85,1	100,0
	Bizkaia	N	4.279	29.882	128.324	162.485
		%	2,6	18,4	79,0	100,0
65-74	CAPV	N	2.501	12.926	80.307	95.733
		%	2,6	13,5	83,9	100,0
	Araba	N	226	1.243	11.694	13.163
		%	1,7	9,4	88,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 57. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	938	3.971	27.222	32.130
			%	2,9	12,4	84,7	100,0
		Bizkaia	N	1.337	7.712	41.391	50.440
			%	2,7	15,3	82,1	100,0
	>=75	CAPV	N	2.061	9.769	74.138	85.968
			%	2,4	11,4	86,2	100,0
		Araba	N	95	562	10.248	10.905
			%	0,9	5,2	94,0	100,0
		Gipuzkoa	N	645	2.918	22.605	26.168
			%	2,5	11,1	86,4	100,0
	Bizkaia	N	1.321	6.289	41.285	48.895	
		%	2,7	12,9	84,4	100,0	
Mujeres	Total	CAPV	N	21.453	147.826	806.604	975.882
			%	2,2	15,1	82,7	100,0
		Araba	N	1.391	11.549	123.831	136.772
			%	1,0	8,4	90,5	100,0
	Gipuzkoa	N	10.061	48.696	253.929	312.686	
		%	3,2	15,6	81,2	100,0	
	Bizkaia	N	10.001	87.581	428.844	526.425	
		%	1,9	16,6	81,5	100,0	
	15-24	CAPV	N	1.101	12.085	76.313	89.499
			%	1,2	13,5	85,3	100,0
		Araba	N	.	1.562	11.648	13.210
			%	.	11,8	88,2	100,0
		Gipuzkoa	N	520	5.823	23.100	29.443
			%	1,8	19,8	78,5	100,0
	Bizkaia	N	581	4.699	41.565	46.846	
		%	1,2	10,0	88,7	100,0	
	25-44	CAPV	N	8.934	48.253	263.639	320.826
			%	2,8	15,0	82,2	100,0
Araba		N	684	3.442	43.742	47.869	
		%	1,4	7,2	91,4	100,0	
Gipuzkoa		N	4.293	18.056	79.556	101.905	
		%	4,2	17,7	78,1	100,0	
Bizkaia	N	3.956	26.755	140.341	171.052		
	%	2,3	15,6	82,0	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 57. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	6.207	55.976	251.585	313.769
			%	2,0	17,8	80,2	100,0
		Araba	N	326	4.326	39.611	44.263
			%	0,7	9,8	89,5	100,0
		Gipuzkoa	N	2.941	17.141	79.579	99.662
			%	3,0	17,2	79,8	100,0
	Bizkaia	N	2.939	34.508	132.395	169.843	
		%	1,7	20,3	78,0	100,0	
	65-74	CAPV	N	2.728	15.443	91.754	109.925
			%	2,5	14,0	83,5	100,0
		Araba	N	278	1.492	12.550	14.320
			%	1,9	10,4	87,6	100,0
		Gipuzkoa	N	1.216	3.569	31.336	36.120
			%	3,4	9,9	86,8	100,0
	Bizkaia	N	1.234	10.382	47.868	59.484	
		%	2,1	17,5	80,5	100,0	
	>=75	CAPV	N	2.483	16.069	123.313	141.864
			%	1,8	11,3	86,9	100,0
Araba		N	103	727	16.280	17.110	
		%	0,6	4,2	95,2	100,0	
Gipuzkoa		N	1.090	4.107	40.358	45.555	
		%	2,4	9,0	88,6	100,0	
Bizkaia	N	1.290	11.236	66.674	79.200		
	%	1,6	14,2	84,2	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	38.905	281.043	1.571.058	1.891.006
			%	2,1	14,9	83,1	100,0
	Araba	N	2.130	22.977	245.415	270.523	
		%	0,8	8,5	90,7	100,0	
	Gipuzkoa	N	16.331	86.427	503.739	606.497	
		%	2,7	14,3	83,1	100,0	
	Bizkaia	N	20.445	171.638	821.904	1.013.987	
		%	2,0	16,9	81,1	100,0	
	15-24	CAPV	N	1.856	22.340	159.762	183.958
			%	1,0	12,1	86,8	100,0
		Araba	N	.	2.722	25.357	28.079
			%	.	9,7	90,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 57. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	825	9.540	50.384	60.748
			%	1,4	15,7	82,9	100,0
		Bizkaia	N	1.032	10.078	84.020	95.130
			%	1,1	10,6	88,3	100,0
	25-44	CAPV	N	14.852	101.702	540.580	657.135
			%	2,3	15,5	82,3	100,0
		Araba	N	684	7.917	91.329	99.930
			%	0,7	7,9	91,4	100,0
		Gipuzkoa	N	7.156	32.234	169.305	208.695
			%	3,4	15,4	81,1	100,0
		Bizkaia	N	7.012	61.551	279.946	348.509
			%	2,0	17,7	80,3	100,0
	45-64	CAPV	N	12.424	102.795	501.205	616.424
			%	2,0	16,7	81,3	100,0
		Araba	N	744	8.314	77.957	87.015
			%	0,9	9,6	89,6	100,0
		Gipuzkoa	N	4.461	30.090	162.530	197.081
			%	2,3	15,3	82,5	100,0
		Bizkaia	N	7.219	64.391	260.719	332.328
			%	2,2	19,4	78,5	100,0
	65-74	CAPV	N	5.229	28.369	172.061	205.658
			%	2,5	13,8	83,7	100,0
		Araba	N	504	2.735	24.245	27.483
			%	1,8	10,0	88,2	100,0
		Gipuzkoa	N	2.154	7.539	58.557	68.251
			%	3,2	11,0	85,8	100,0
		Bizkaia	N	2.571	18.094	89.259	109.924
			%	2,3	16,5	81,2	100,0
	>=75	CAPV	N	4.544	25.837	197.451	227.832
			%	2,0	11,3	86,7	100,0
		Araba	N	197	1.289	26.528	28.015
			%	0,7	4,6	94,7	100,0
		Gipuzkoa	N	1.735	7.024	62.963	71.723
			%	2,4	9,8	87,8	100,0
		Bizkaia	N	2.611	17.524	107.959	128.094
			%	2,0	13,7	84,3	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	Total	Total N	17.452	132.659	763.752	913.863
		%	1,9	14,5	83,6	100,0
	I	N	2.897	14.368	96.425	113.690
		%	2,5	12,6	84,8	100,0
	II	N	820	11.169	66.217	78.206
		%	1,0	14,3	84,7	100,0
	III	N	3.843	28.574	155.937	188.355
		%	2,0	15,2	82,8	100,0
	IV	N	7.027	67.595	375.683	450.306
		%	1,6	15,0	83,4	100,0
	V	N	2.865	10.953	69.489	83.307
		%	3,4	13,1	83,4	100,0
	15-24 Total	N	755	9.696	83.449	93.900
		%	0,8	10,3	88,9	100,0
	I	N	.	2.010	12.624	14.634
		%	.	13,7	86,3	100,0
	II	N	.	1.766	9.222	10.988
		%	.	16,1	83,9	100,0
	III	N	304	1.105	15.421	16.830
		%	1,8	6,6	91,6	100,0
	IV	N	451	4.240	38.047	42.737
		%	1,1	9,9	89,0	100,0
	V	N	.	575	8.136	8.711
		%	.	6,6	93,4	100,0
	25-44 Total	N	5.919	53.449	276.941	336.309
		%	1,8	15,9	82,3	100,0
	I	N	1.372	4.839	37.521	43.732
		%	3,1	11,1	85,8	100,0
	II	N	200	4.362	27.935	32.496
		%	0,6	13,4	86,0	100,0
	III	N	607	10.635	51.015	62.257
		%	1,0	17,1	81,9	100,0
	IV	N	1.875	29.542	128.975	160.392
		%	1,2	18,4	80,4	100,0
	V	N	1.865	4.071	31.496	37.432
		%	5,0	10,9	84,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total	
Hombres 45-64	Total	N	6.217	46.819	249.332	302.368	
		%	2,1	15,5	82,5	100,0	
	I	N	1.331	5.078	31.498	37.907	
		%	3,5	13,4	83,1	100,0	
	II	N	488	3.723	19.209	23.419	
		%	2,1	15,9	82,0	100,0	
	III	N	2.482	10.678	53.162	66.322	
		%	3,7	16,1	80,2	100,0	
	IV	N	1.916	22.599	126.099	150.614	
		%	1,3	15,0	83,7	100,0	
	V	N	.	4.741	19.364	24.106	
		%	.	19,7	80,3	100,0	
	65-74	Total	N	2.501	12.926	80.307	95.733
			%	2,6	13,5	83,9	100,0
	I	N	193	2.004	11.556	13.753	
		%	1,4	14,6	84,0	100,0	
	II	N	132	1.188	5.542	6.862	
		%	1,9	17,3	80,8	100,0	
	III	N	356	3.615	17.806	21.777	
		%	1,6	16,6	81,8	100,0	
	IV	N	1.194	5.546	41.012	47.753	
		%	2,5	11,6	85,9	100,0	
	V	N	625	573	4.391	5.588	
		%	11,2	10,2	78,6	100,0	
	>=75	Total	N	2.061	9.769	73.723	85.553
			%	2,4	11,4	86,2	100,0
	I	N	.	437	3.226	3.663	
		%	.	11,9	88,1	100,0	
	II	N	.	130	4.309	4.440	
		%	.	2,9	97,1	100,0	
	III	N	95	2.541	18.534	21.169	
		%	0,4	12,0	87,6	100,0	
	IV	N	1.592	5.667	41.551	48.810	
		%	3,3	11,6	85,1	100,0	
	V	N	375	993	6.103	7.470	
		%	5,0	13,3	81,7	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	Total	Total	N 21.350	147.500	804.642	973.492
			% 2,2	15,2	82,7	100,0
	I	N	1.292	16.249	87.297	104.838
		%	1,2	15,5	83,3	100,0
	II	N	534	18.217	76.277	95.028
		%	0,6	19,2	80,3	100,0
	III	N	6.995	35.231	199.881	242.107
		%	2,9	14,6	82,6	100,0
	IV	N	7.915	51.419	301.108	360.441
		%	2,2	14,3	83,5	100,0
	V	N	4.614	26.385	140.079	171.077
		%	2,7	15,4	81,9	100,0
	15-24	Total	N 1.101	12.085	75.347	88.533
		%	1,2	13,7	85,1	100,0
	I	N	245	2.298	12.018	14.562
		%	1,7	15,8	82,5	100,0
	II	N	.	3.038	10.459	13.497
		%	.	22,5	77,5	100,0
	III	N	581	1.756	17.733	20.069
		%	2,9	8,7	88,4	100,0
	IV	N	275	3.293	28.046	31.614
		%	0,9	10,4	88,7	100,0
	V	N	.	1.700	7.092	8.792
		%	.	19,3	80,7	100,0
	25-44	Total	N 8.934	48.028	263.369	320.330
		%	2,8	15,0	82,2	100,0
	I	N	411	5.176	39.500	45.086
		%	0,9	11,5	87,6	100,0
	II	N	143	7.446	29.634	37.223
		%	0,4	20,0	79,6	100,0
	III	N	3.684	11.368	66.978	82.029
		%	4,5	13,9	81,7	100,0
	IV	N	2.641	16.463	91.621	110.725
		%	2,4	14,9	82,7	100,0
	V	N	2.056	7.575	35.636	45.267
		%	4,5	16,7	78,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	Total	N 6.207	55.976	251.414	313.598
			% 2,0	17,8	80,2	100,0
		I	N 636	5.763	25.718	32.116
			% 2,0	17,9	80,1	100,0
		II	N 392	5.178	21.223	26.792
			% 1,5	19,3	79,2	100,0
		III	N 1.827	17.193	69.621	88.641
			% 2,1	19,4	78,5	100,0
		IV	N 2.416	17.939	83.748	104.102
			% 2,3	17,2	80,4	100,0
		V	N 938	9.903	51.105	61.946
			% 1,5	16,0	82,5	100,0
	65-74	Total	N 2.728	15.443	91.599	109.770
			% 2,5	14,1	83,4	100,0
		I	N .	1.763	5.436	7.199
			% .	24,5	75,5	100,0
		II	N .	1.593	5.632	7.225
			% .	22,0	78,0	100,0
		III	N 668	2.606	19.625	22.899
			% 2,9	11,4	85,7	100,0
		IV	N 1.056	6.921	42.157	50.134
			% 2,1	13,8	84,1	100,0
		V	N 1.004	2.559	18.749	22.312
			% 4,5	11,5	84,0	100,0
	>=75	Total	N 2.380	15.969	122.912	141.261
			% 1,7	11,3	87,0	100,0
		I	N .	1.250	4.625	5.875
			% .	21,3	78,7	100,0
		II	N .	962	9.329	10.292
			% .	9,3	90,7	100,0
		III	N 236	2.308	25.925	28.468
			% 0,8	8,1	91,1	100,0
		IV	N 1.528	6.802	55.536	63.866
			% 2,4	10,7	87,0	100,0
		V	N 617	4.647	27.496	32.760
			% 1,9	14,2	83,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	Total	Total N	38.802	280.160	1.568.394	1.887.356
		%	2,1	14,8	83,1	100,0
	I	N	4.189	30.617	183.722	218.528
		%	1,9	14,0	84,1	100,0
	II	N	1.355	29.386	142.494	173.234
		%	0,8	17,0	82,3	100,0
	III	N	10.838	63.805	355.819	430.462
		%	2,5	14,8	82,7	100,0
	IV	N	14.942	119.014	676.791	810.747
		%	1,8	14,7	83,5	100,0
	V	N	7.479	37.338	209.568	254.385
		%	2,9	14,7	82,4	100,0
	15-24 Total	N	1.856	21.782	158.796	182.434
		%	1,0	11,9	87,0	100,0
	I	N	245	4.308	24.643	29.196
		%	0,8	14,8	84,4	100,0
	II	N	.	4.804	19.680	24.485
		%	.	19,6	80,4	100,0
	III	N	885	2.861	33.153	36.900
		%	2,4	7,8	89,8	100,0
	IV	N	726	7.533	66.092	74.351
		%	1,0	10,1	88,9	100,0
	V	N	.	2.275	15.228	17.503
		%	.	13,0	87,0	100,0
	25-44 Total	N	14.852	101.477	540.310	656.640
		%	2,3	15,5	82,3	100,0
	I	N	1.783	10.014	77.021	88.818
		%	2,0	11,3	86,7	100,0
	II	N	343	11.808	57.569	69.719
		%	0,5	16,9	82,6	100,0
	III	N	4.290	22.003	117.993	144.286
		%	3,0	15,2	81,8	100,0
	IV	N	4.516	46.006	220.596	271.117
		%	1,7	17,0	81,4	100,0
	V	N	3.921	11.647	67.132	82.699
		%	4,7	14,1	81,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	45-64	Total	N 12.424	102.795	500.747	615.965
			% 2,0	16,7	81,3	100,0
	I	N	1.967	10.841	57.216	70.023
		%	2,8	15,5	81,7	100,0
	II	N	880	8.901	40.431	50.212
		%	1,8	17,7	80,5	100,0
	III	N	4.308	27.871	122.783	154.963
		%	2,8	18,0	79,2	100,0
	IV	N	4.331	40.538	209.847	254.716
		%	1,7	15,9	82,4	100,0
	V	N	938	14.645	70.470	86.052
		%	1,1	17,0	81,9	100,0
	65-74	Total	N 5.229	28.369	171.906	205.503
			% 2,5	13,8	83,7	100,0
	I	N	193	3.767	16.991	20.952
		%	0,9	18,0	81,1	100,0
	II	N	132	2.780	11.174	14.087
		%	0,9	19,7	79,3	100,0
	III	N	1.024	6.221	37.430	44.676
		%	2,3	13,9	83,8	100,0
	IV	N	2.250	12.468	83.170	97.887
		%	2,3	12,7	85,0	100,0
	V	N	1.629	3.132	23.140	27.901
		%	5,8	11,2	82,9	100,0
	>=75	Total	N 4.441	25.738	196.635	226.814
			% 2,0	11,3	86,7	100,0
	I	N	.	1.687	7.851	9.538
		%	.	17,7	82,3	100,0
	II	N	.	1.093	13.638	14.731
		%	.	7,4	92,6	100,0
	III	N	330	4.849	44.459	49.638
		%	0,7	9,8	89,6	100,0
	IV	N	3.119	12.469	97.087	112.676
		%	2,8	11,1	86,2	100,0
	V	N	992	5.640	33.599	40.231
		%	2,5	14,0	83,5	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 59. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y nivel de estudios*

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	Total	N	17.452	133.217	764.454	915.124
		%	1,9	14,6	83,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.514	25.575	180.511	210.600
		%	2,1	12,1	85,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	4.285	24.321	138.848	167.454
		%	2,6	14,5	82,9	100,0
	Secundaria, superior	N	5.580	60.363	294.728	360.670
		%	1,5	16,7	81,7	100,0
	Terciaria	N	3.074	22.959	150.368	176.400
		%	1,7	13,0	85,2	100,0
15-24	Total	N	755	10.254	83.449	94.458
		%	0,8	10,9	88,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	1.308	8.610	9.918
		%	.	13,2	86,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	755	2.076	28.297	31.129
		%	2,4	6,7	90,9	100,0
	Secundaria, superior	N	.	4.824	38.016	42.840
		%	.	11,3	88,7	100,0
	Terciaria	N	.	2.046	8.525	10.572
		%	.	19,4	80,6	100,0
25-44	Total	N	5.919	53.449	276.941	336.309
		%	1,8	15,9	82,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	660	5.205	31.911	37.776
		%	1,7	13,8	84,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.970	10.582	40.256	52.808
		%	3,7	20,0	76,2	100,0
	Secundaria, superior	N	1.844	29.122	133.309	164.274
		%	1,1	17,7	81,2	100,0
	Terciaria	N	1.445	8.541	71.465	81.451
		%	1,8	10,5	87,7	100,0
45-64	Total	N	6.217	46.819	249.620	302.655
		%	2,1	15,5	82,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	977	9.167	60.256	70.400
		%	1,4	13,0	85,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	744	8.690	43.810	53.244
		%	1,4	16,3	82,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 59. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres 45-64	Secundaria, superior	N	3.172	20.314	93.644	117.130	
		%	2,7	17,3	79,9	100,0	
	Terciaria	N	1.324	8.648	51.909	61.881	
		%	2,1	14,0	83,9	100,0	
65-74	Total	N	2.501	12.926	80.307	95.733	
		%	2,6	13,5	83,9	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.409	4.216	32.392	38.017	
		%	3,7	11,1	85,2	100,0	
	Secundaria, inferior	N	550	1.836	13.906	16.291	
		%	3,4	11,3	85,4	100,0	
	Secundaria, superior	N	332	4.257	21.358	25.948	
		%	1,3	16,4	82,3	100,0	
	Terciaria	N	210	2.617	12.650	15.477	
		%	1,4	16,9	81,7	100,0	
>=75	Total	N	2.061	9.769	74.138	85.968	
		%	2,4	11,4	86,2	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.468	5.680	47.341	54.489	
		%	2,7	10,4	86,9	100,0	
	Secundaria, inferior	N	266	1.137	12.578	13.981	
		%	1,9	8,1	90,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	232	1.846	8.400	10.478	
		%	2,2	17,6	80,2	100,0	
	Terciaria	N	95	1.106	5.819	7.020	
		%	1,3	15,8	82,9	100,0	
Total	Total	N	21.453	147.826	806.604	975.882	
		%	2,2	15,1	82,7	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	6.774	36.596	234.958	278.327	
		%	2,4	13,1	84,4	100,0	
	Secundaria, inferior	N	3.833	21.512	144.422	169.766	
		%	2,3	12,7	85,1	100,0	
	Secundaria, superior	N	6.260	51.251	250.355	307.866	
		%	2,0	16,6	81,3	100,0	
	Terciaria	N	4.587	38.467	176.869	219.923	
		%	2,1	17,5	80,4	100,0	
	Total	N	1.101	12.085	76.313	89.499	
		%	1,2	13,5	85,3	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 59. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	245	1.633	9.507	11.386
			%	2,2	14,3	83,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	1.858	14.905	16.763
			%	.	11,1	88,9	100,0
		Secundaria, superior	N	275	5.889	39.280	45.443
			%	0,6	13,0	86,4	100,0
		Terciaria	N	581	2.705	12.621	15.907
			%	3,7	17,0	79,3	100,0
	25-44	Total	N	8.934	48.253	263.639	320.826
			%	2,8	15,0	82,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.240	3.928	20.822	25.990
			%	4,8	15,1	80,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.525	3.431	33.982	38.937
			%	3,9	8,8	87,3	100,0
		Secundaria, superior	N	3.442	18.768	108.277	130.487
			%	2,6	14,4	83,0	100,0
		Terciaria	N	2.727	22.127	100.558	125.412
			%	2,2	17,6	80,2	100,0
	45-64	Total	N	6.207	55.976	251.585	313.769
			%	2,0	17,8	80,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.797	12.492	63.674	77.963
			%	2,3	16,0	81,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.341	9.238	51.156	61.735
			%	2,2	15,0	82,9	100,0
		Secundaria, superior	N	1.791	22.627	85.904	110.322
			%	1,6	20,5	77,9	100,0
		Terciaria	N	1.279	11.619	50.851	63.749
			%	2,0	18,2	79,8	100,0
	65-74	Total	N	2.728	15.443	91.754	109.925
			%	2,5	14,0	83,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.586	7.830	52.436	61.852
			%	2,6	12,7	84,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	776	3.512	23.164	27.452
			%	2,8	12,8	84,4	100,0
		Secundaria, superior	N	366	2.426	9.101	11.893
			%	3,1	20,4	76,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 59. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y nivel de estudios*

			Mucho	Algo	Nada	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N	. 1.674	7.053	8.727	
		%	. 19,2	80,8	100,0		
	>=75	Total	N	2.483 16.069	123.313	141.864	
		%	1,8 11,3	86,9	100,0		
		Sin estudios, primaria	N	1.906 10.713	88.518	101.136	
		%	1,9 10,6	87,5	100,0		
		Secundaria, inferior	N	192 3.473	21.215	24.879	
		%	0,8 14,0	85,3	100,0		
		Secundaria, superior	N	386 1.541	7.793	9.720	
		%	4,0 15,9	80,2	100,0		
		Terciaria	N	. 342	5.786	6.129	
		%	. 5,6	94,4	100,0		
	Ambos	Total	Total	N	38.905 281.043	1.571.058	1.891.006
			%	2,1 14,9	83,1	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	11.287 62.171	415.469	488.927
			%	2,3 12,7	85,0	100,0	
			Secundaria, inferior	N	8.118 45.833	283.269	337.220
			%	2,4 13,6	84,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	11.840 111.614	545.082	668.536	
		%	1,8 16,7	81,5	100,0		
		Terciaria	N	7.660 61.425	327.238	396.323	
		%	1,9 15,5	82,6	100,0		
15-24		Total	N	1.856 22.340	159.762	183.958	
		%	1,0 12,1	86,8	100,0		
		Sin estudios, primaria	N	245 2.941	18.118	21.304	
		%	1,2 13,8	85,0	100,0		
		Secundaria, inferior	N	755 3.935	43.202	47.891	
		%	1,6 8,2	90,2	100,0		
		Secundaria, superior	N	275 10.713	77.296	88.283	
		%	0,3 12,1	87,6	100,0		
	Terciaria	N	581 4.751	21.146	26.479		
	%	2,2 17,9	79,9	100,0			
25-44	Total	N	14.852 101.702	540.580	657.135		
	%	2,3 15,5	82,3	100,0			
	Sin estudios, primaria	N	1.899 9.132	52.734	63.765		
	%	3,0 14,3	82,7	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 59. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	3.495	14.013	74.238	91.745
			%	3,8	15,3	80,9	100,0
		Secundaria, superior	N	5.286	47.890	241.586	294.762
			%	1,8	16,2	82,0	100,0
		Terciaria	N	4.172	30.668	172.023	206.862
			%	2,0	14,8	83,2	100,0
	45-64	Total	N	12.424	102.795	501.205	616.424
			%	2,0	16,7	81,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.774	21.659	123.930	148.363
			%	1,9	14,6	83,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.084	17.929	94.966	114.979
			%	1,8	15,6	82,6	100,0
		Secundaria, superior	N	4.963	42.942	179.548	227.452
			%	2,2	18,9	78,9	100,0
		Terciaria	N	2.603	20.266	102.761	125.630
			%	2,1	16,1	81,8	100,0
	65-74	Total	N	5.229	28.369	172.061	205.658
			%	2,5	13,8	83,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.995	12.047	84.828	99.869
			%	3,0	12,1	84,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.326	5.348	37.070	43.744
			%	3,0	12,2	84,7	100,0
		Secundaria, superior	N	698	6.683	30.460	37.841
			%	1,8	17,7	80,5	100,0
		Terciaria	N	210	4.291	19.703	24.204
			%	0,9	17,7	81,4	100,0
	>=75	Total	N	4.544	25.837	197.451	227.832
			%	2,0	11,3	86,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.374	16.393	135.859	155.625
			%	2,2	10,5	87,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	458	4.609	33.793	38.860
			%	1,2	11,9	87,0	100,0
		Secundaria, superior	N	618	3.387	16.193	20.198
			%	3,1	16,8	80,2	100,0
		Terciaria	N	95	1.449	11.605	13.149
			%	0,7	11,0	88,3	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 60. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y territorio histórico

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	CAPV	N	41.661	167.469	705.994	915.124
		%	4,6	18,3	77,1	100,0
	Araba	N	908	7.163	125.680	133.751
		%	0,7	5,4	94,0	100,0
	Gipuzkoa	N	15.965	53.390	224.457	293.812
		%	5,4	18,2	76,4	100,0
	Bizkaia	N	24.788	106.917	355.857	487.561
		%	5,1	21,9	73,0	100,0
15-24	CAPV	N	3.717	13.102	77.640	94.458
		%	3,9	13,9	82,2	100,0
	Araba	N	147	828	13.895	14.869
		%	1,0	5,6	93,4	100,0
	Gipuzkoa	N	2.016	3.650	25.639	31.305
		%	6,4	11,7	81,9	100,0
	Bizkaia	N	1.554	8.625	38.106	48.284
		%	3,2	17,9	78,9	100,0
25-44	CAPV	N	16.497	70.389	249.423	336.309
		%	4,9	20,9	74,2	100,0
	Araba	N	176	2.871	49.015	52.062
		%	0,3	5,5	94,1	100,0
	Gipuzkoa	N	5.400	21.505	79.884	106.790
		%	5,1	20,1	74,8	100,0
	Bizkaia	N	10.921	46.012	120.525	177.458
		%	6,2	25,9	67,9	100,0
45-64	CAPV	N	12.344	55.554	234.758	302.655
		%	4,1	18,4	77,6	100,0
	Araba	N	448	2.573	39.730	42.751
		%	1,0	6,0	92,9	100,0
	Gipuzkoa	N	5.172	20.710	71.537	97.419
		%	5,3	21,3	73,4	100,0
	Bizkaia	N	6.724	32.270	123.491	162.485
		%	4,1	19,9	76,0	100,0
65-74	CAPV	N	5.085	15.247	75.402	95.733
		%	5,3	15,9	78,8	100,0
	Araba	N	138	427	12.599	13.163
		%	1,0	3,2	95,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 60. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total	
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	2.178	3.974	25.978	32.130	
			%	6,8	12,4	80,9	100,0	
		Bizkaia	N	2.769	10.846	36.825	50.440	
			%	5,5	21,5	73,0	100,0	
	>=75	CAPV	N	4.018	13.178	68.771	85.968	
			%	4,7	15,3	80,0	100,0	
		Araba	N	.	464	10.441	10.905	
			%	.	4,3	95,7	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.198	3.551	21.419	26.168	
			%	4,6	13,6	81,9	100,0	
		Bizkaia	N	2.820	9.164	36.911	48.895	
			%	5,8	18,7	75,5	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	55.394	180.145	740.343	975.882
				%	5,7	18,5	75,9	100,0
		Araba	N	2.676	9.381	124.714	136.772	
			%	2,0	6,9	91,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	18.805	59.658	234.223	312.686		
		%	6,0	19,1	74,9	100,0		
	Bizkaia	N	33.913	111.106	381.406	526.425		
		%	6,4	21,1	72,5	100,0		
	15-24	CAPV	N	3.921	16.659	68.920	89.499	
			%	4,4	18,6	77,0	100,0	
		Araba	N	367	567	12.276	13.210	
			%	2,8	4,3	92,9	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.858	7.013	20.573	29.443	
			%	6,3	23,8	69,9	100,0	
	Bizkaia	N	1.696	9.079	36.070	46.846		
		%	3,6	19,4	77,0	100,0		
	25-44	CAPV	N	19.524	60.612	240.690	320.826	
			%	6,1	18,9	75,0	100,0	
Araba		N	825	3.890	43.154	47.869		
		%	1,7	8,1	90,2	100,0		
Gipuzkoa		N	8.239	18.852	74.814	101.905		
		%	8,1	18,5	73,4	100,0		
Bizkaia	N	10.459	37.870	122.722	171.052			
	%	6,1	22,1	71,7	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 60. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	19.896	62.632	231.240	313.769
			%	6,3	20,0	73,7	100,0
		Araba	N	777	2.707	40.779	44.263
			%	1,8	6,1	92,1	100,0
		Gipuzkoa	N	5.501	21.706	72.455	99.662
			%	5,5	21,8	72,7	100,0
	Bizkaia	N	13.618	38.219	118.007	169.843	
		%	8,0	22,5	69,5	100,0	
	65-74	CAPV	N	5.098	18.738	86.089	109.925
			%	4,6	17,0	78,3	100,0
		Araba	N	149	1.377	12.793	14.320
			%	1,0	9,6	89,3	100,0
		Gipuzkoa	N	529	4.968	30.623	36.120
			%	1,5	13,8	84,8	100,0
	Bizkaia	N	4.419	12.392	42.673	59.484	
		%	7,4	20,8	71,7	100,0	
	>=75	CAPV	N	6.956	21.505	113.403	141.864
			%	4,9	15,2	79,9	100,0
Araba		N	558	840	15.712	17.110	
		%	3,3	4,9	91,8	100,0	
Gipuzkoa		N	2.677	7.120	35.758	45.555	
		%	5,9	15,6	78,5	100,0	
Bizkaia	N	3.721	13.546	61.933	79.200		
	%	4,7	17,1	78,2	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	97.055	347.615	1.446.336	1.891.006
			%	5,1	18,4	76,5	100,0
		Araba	N	3.584	16.544	250.394	270.523
			%	1,3	6,1	92,6	100,0
		Gipuzkoa	N	34.770	113.047	458.680	606.497
			%	5,7	18,6	75,6	100,0
	Bizkaia	N	58.701	218.024	737.262	1.013.987	
		%	5,8	21,5	72,7	100,0	
	15-24	CAPV	N	7.638	29.760	146.559	183.958
			%	4,2	16,2	79,7	100,0
	Araba	N	514	1.394	26.172	28.079	
		%	1,8	5,0	93,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 60. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	3.874	10.662	46.212	60.748
			%	6,4	17,6	76,1	100,0
		Bizkaia	N	3.251	17.704	74.176	95.130
			%	3,4	18,6	78,0	100,0
	25-44	CAPV	N	36.021	131.001	490.114	657.135
			%	5,5	19,9	74,6	100,0
		Araba	N	1.001	6.761	92.168	99.930
			%	1,0	6,8	92,2	100,0
		Gipuzkoa	N	13.640	40.357	154.698	208.695
			%	6,5	19,3	74,1	100,0
		Bizkaia	N	21.380	83.882	243.247	348.509
			%	6,1	24,1	69,8	100,0
	45-64	CAPV	N	32.240	118.186	465.998	616.424
			%	5,2	19,2	75,6	100,0
		Araba	N	1.225	5.280	80.509	87.015
			%	1,4	6,1	92,5	100,0
		Gipuzkoa	N	10.673	42.416	143.991	197.081
			%	5,4	21,5	73,1	100,0
		Bizkaia	N	20.342	70.489	241.497	332.328
			%	6,1	21,2	72,7	100,0
	65-74	CAPV	N	10.183	33.985	161.491	205.658
			%	5,0	16,5	78,5	100,0
		Araba	N	287	1.804	25.392	27.483
			%	1,0	6,6	92,4	100,0
		Gipuzkoa	N	2.708	8.942	56.601	68.251
			%	4,0	13,1	82,9	100,0
		Bizkaia	N	7.188	23.239	79.498	109.924
			%	6,5	21,1	72,3	100,0
	>=75	CAPV	N	10.974	34.684	182.175	227.832
			%	4,8	15,2	80,0	100,0
		Araba	N	558	1.304	26.153	28.015
			%	2,0	4,7	93,4	100,0
		Gipuzkoa	N	3.875	10.670	57.177	71.723
			%	5,4	14,9	79,7	100,0
		Bizkaia	N	6.541	22.710	98.844	128.094
			%	5,1	17,7	77,2	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	Total	N	41.661	167.172	705.031	913.863
		%	4,6	18,3	77,1	100,0
I	Total	N	4.662	23.633	85.395	113.690
		%	4,1	20,8	75,1	100,0
II	Total	N	1.917	18.366	57.922	78.206
		%	2,5	23,5	74,1	100,0
III	Total	N	8.456	31.796	148.103	188.355
		%	4,5	16,9	78,6	100,0
IV	Total	N	22.001	81.500	346.805	450.306
		%	4,9	18,1	77,0	100,0
V	Total	N	4.624	11.877	66.807	83.307
		%	5,6	14,3	80,2	100,0
15-24	Total	N	3.717	12.804	77.379	93.900
		%	4,0	13,6	82,4	100,0
I	Total	N	781	1.043	12.810	14.634
		%	5,3	7,1	87,5	100,0
II	Total	N	415	1.783	8.790	10.988
		%	3,8	16,2	80,0	100,0
III	Total	N	508	2.322	13.999	16.830
		%	3,0	13,8	83,2	100,0
IV	Total	N	1.115	6.624	34.998	42.737
		%	2,6	15,5	81,9	100,0
V	Total	N	899	1.031	6.781	8.711
		%	10,3	11,8	77,8	100,0
25-44	Total	N	16.497	70.389	249.423	336.309
		%	4,9	20,9	74,2	100,0
I	Total	N	1.813	12.504	29.415	43.732
		%	4,1	28,6	67,3	100,0
II	Total	N	387	9.202	22.907	32.496
		%	1,2	28,3	70,5	100,0
III	Total	N	3.125	10.214	48.918	62.257
		%	5,0	16,4	78,6	100,0
IV	Total	N	9.796	33.827	116.769	160.392
		%	6,1	21,1	72,8	100,0
V	Total	N	1.376	4.642	31.414	37.432
		%	3,7	12,4	83,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total	
Hombres	45-64	Total	N 12.344	55.554	234.470	302.368	
			% 4,1	18,4	77,5	100,0	
		I	N 928	7.969	29.009	37.907	
			% 2,4	21,0	76,5	100,0	
		II	N 870	5.078	17.471	23.419	
			% 3,7	21,7	74,6	100,0	
		III	N 2.231	12.254	51.837	66.322	
			% 3,4	18,5	78,2	100,0	
		IV	N 6.891	26.826	116.897	150.614	
			% 4,6	17,8	77,6	100,0	
		V	N 1.423	3.426	19.256	24.106	
			% 5,9	14,2	79,9	100,0	
		65-74	Total	N 5.085	15.247	75.402	95.733
			% 5,3	15,9	78,8	100,0	
		I	N 775	1.539	11.439	13.753	
			% 5,6	11,2	83,2	100,0	
		II	N 246	1.501	5.116	6.862	
			% 3,6	21,9	74,5	100,0	
	III	N 1.477	3.780	16.520	21.777		
		% 6,8	17,4	75,9	100,0		
	IV	N 2.020	7.415	38.318	47.753		
		% 4,2	15,5	80,2	100,0		
	V	N 567	1.012	4.010	5.588		
		% 10,2	18,1	71,7	100,0		
	>=75	Total	N 4.018	13.178	68.356	85.553	
		% 4,7	15,4	79,9	100,0		
	I	N 365	577	2.721	3.663		
		% 10,0	15,7	74,3	100,0		
	II	N .	802	3.637	4.440		
		% .	18,1	81,9	100,0		
	III	N 1.115	3.225	16.829	21.169		
		% 5,3	15,2	79,5	100,0		
	IV	N 2.180	6.807	39.823	48.810		
		% 4,5	13,9	81,6	100,0		
	V	N 359	1.766	5.346	7.470		
		% 4,8	23,6	71,6	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	Total	Total	N 55.169	179.946	738.377	973.492
			% 5,7	18,5	75,8	100,0
		I	N 5.679	22.626	76.532	104.838
			% 5,4	21,6	73,0	100,0
		II	N 9.072	19.957	65.999	95.028
			% 9,5	21,0	69,5	100,0
		III	N 15.324	44.141	182.643	242.107
			% 6,3	18,2	75,4	100,0
		IV	N 18.923	61.687	279.831	360.441
			% 5,3	17,1	77,6	100,0
		V	N 6.171	31.534	133.372	171.077
			% 3,6	18,4	78,0	100,0
	15-24	Total	N 3.921	16.659	67.954	88.533
			% 4,4	18,8	76,8	100,0
		I	N 538	1.731	12.293	14.562
			% 3,7	11,9	84,4	100,0
		II	N 1.114	2.675	9.707	13.497
			% 8,3	19,8	71,9	100,0
		III	N 747	3.763	15.559	20.069
			% 3,7	18,7	77,5	100,0
		IV	N 1.522	6.226	23.866	31.614
			% 4,8	19,7	75,5	100,0
		V	N .	2.263	6.529	8.792
			% .	25,7	74,3	100,0
	25-44	Total	N 19.298	60.612	240.421	320.330
			% 6,0	18,9	75,1	100,0
		I	N 2.098	12.896	30.092	45.086
			% 4,7	28,6	66,7	100,0
		II	N 4.295	7.059	25.870	37.223
			% 11,5	19,0	69,5	100,0
		III	N 6.512	12.965	62.552	82.029
			% 7,9	15,8	76,3	100,0
		IV	N 5.114	18.466	87.145	110.725
			% 4,6	16,7	78,7	100,0
		V	N 1.279	9.226	34.762	45.267
			% 2,8	20,4	76,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	Total	N 19.896	62.632	231.069	313.598
			% 6,3	20,0	73,7	100,0
	I	N	2.329	6.101	23.686	32.116
		%	7,3	19,0	73,8	100,0
	II	N	2.621	6.732	17.440	26.792
		%	9,8	25,1	65,1	100,0
	III	N	5.669	19.831	63.141	88.641
		%	6,4	22,4	71,2	100,0
	IV	N	6.118	18.752	79.232	104.102
		%	5,9	18,0	76,1	100,0
	V	N	3.160	11.216	47.570	61.946
		%	5,1	18,1	76,8	100,0
	65-74	Total	N 5.098	18.738	85.934	109.770
		%	4,6	17,1	78,3	100,0
	I	N	566	1.297	5.336	7.199
		%	7,9	18,0	74,1	100,0
	II	N	283	1.834	5.107	7.225
		%	3,9	25,4	70,7	100,0
	III	N	1.223	4.224	17.452	22.899
		%	5,3	18,4	76,2	100,0
	IV	N	2.616	8.496	39.022	50.134
		%	5,2	16,9	77,8	100,0
	V	N	409	2.887	19.016	22.312
		%	1,8	12,9	85,2	100,0
	>=75	Total	N 6.956	21.306	113.000	141.261
		%	4,9	15,1	80,0	100,0
	I	N	148	601	5.125	5.875
		%	2,5	10,2	87,2	100,0
	II	N	759	1.657	7.875	10.292
		%	7,4	16,1	76,5	100,0
	III	N	1.172	3.358	23.939	28.468
		%	4,1	11,8	84,1	100,0
	IV	N	3.553	9.747	50.565	63.866
		%	5,6	15,3	79,2	100,0
	V	N	1.323	5.942	25.495	32.760
		%	4,0	18,1	77,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	Total	Total	N 96.830	347.118	1.443.408	1.887.356
			% 5,1	18,4	76,5	100,0
	I	N	10.341	46.259	161.928	218.528
		%	4,7	21,2	74,1	100,0
	II	N	10.990	38.324	123.921	173.234
		%	6,3	22,1	71,5	100,0
	III	N	23.780	75.936	330.746	430.462
		%	5,5	17,6	76,8	100,0
	IV	N	40.925	143.187	626.635	810.747
		%	5,0	17,7	77,3	100,0
	V	N	10.794	43.412	200.179	254.385
		%	4,2	17,1	78,7	100,0
	15-24 Total	N	7.638	29.463	145.333	182.434
		%	4,2	16,1	79,7	100,0
	I	N	1.318	2.774	25.104	29.196
		%	4,5	9,5	86,0	100,0
	II	N	1.529	4.458	18.497	24.485
		%	6,2	18,2	75,5	100,0
	III	N	1.256	6.085	29.559	36.900
		%	3,4	16,5	80,1	100,0
	IV	N	2.636	12.851	58.864	74.351
		%	3,5	17,3	79,2	100,0
	V	N	899	3.294	13.310	17.503
		%	5,1	18,8	76,0	100,0
	25-44 Total	N	35.795	131.001	489.844	656.644
		%	5,5	20,0	74,6	100,0
	I	N	3.911	25.400	59.507	88.818
		%	4,4	28,6	67,0	100,0
	II	N	4.682	16.260	48.777	69.719
		%	6,7	23,3	70,0	100,0
	III	N	9.637	23.179	111.469	144.286
		%	6,7	16,1	77,3	100,0
	IV	N	14.910	52.293	203.914	271.117
		%	5,5	19,3	75,2	100,0
	V	N	2.655	13.868	66.176	82.699
		%	3,2	16,8	80,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	45-64	Total	N 32.240	118.186	465.539	615.965
			% 5,2	19,2	75,6	100,0
		I	N 3.257	14.070	52.696	70.023
			% 4,7	20,1	75,3	100,0
		II	N 3.491	11.810	34.910	50.212
			% 7,0	23,5	69,5	100,0
		III	N 7.900	32.084	114.978	154.963
			% 5,1	20,7	74,2	100,0
		IV	N 13.009	45.578	196.129	254.716
			% 5,1	17,9	77,0	100,0
		V	N 4.583	14.643	66.826	86.052
			% 5,3	17,0	77,7	100,0
	65-74	Total	N 10.183	33.985	161.336	205.503
			% 5,0	16,5	78,5	100,0
		I	N 1.340	2.836	16.775	20.952
			% 6,4	13,5	80,1	100,0
		II	N 529	3.335	10.223	14.087
			% 3,8	23,7	72,6	100,0
		III	N 2.700	8.004	33.972	44.676
			% 6,0	17,9	76,0	100,0
		IV	N 4.636	15.911	77.340	97.887
			% 4,7	16,3	79,0	100,0
		V	N 977	3.898	23.026	27.901
			% 3,5	14,0	82,5	100,0
	>=75	Total	N 10.974	34.484	181.356	226.814
			% 4,8	15,2	80,0	100,0
		I	N 514	1.178	7.846	9.538
			% 5,4	12,4	82,3	100,0
		II	N 759	2.460	11.513	14.731
			% 5,2	16,7	78,2	100,0
		III	N 2.287	6.583	40.768	49.638
			% 4,6	13,3	82,1	100,0
		IV	N 5.733	16.555	90.388	112.676
			% 5,1	14,7	80,2	100,0
		V	N 1.681	7.709	30.841	40.231
			% 4,2	19,2	76,7	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 62. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y nivel de estudios*

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	Total	N	41.661	167.469	705.994	915.124
		%	4,6	18,3	77,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	9.701	31.966	168.933	210.600
		%	4,6	15,2	80,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	5.156	30.171	132.126	167.454
		%	3,1	18,0	78,9	100,0
	Secundaria, superior	N	19.878	63.446	277.346	360.670
		%	5,5	17,6	76,9	100,0
	Terciaria	N	6.925	41.887	127.589	176.400
		%	3,9	23,7	72,3	100,0
15-24 Total	Total	N	3.717	13.102	77.640	94.458
		%	3,9	13,9	82,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	291	1.772	7.856	9.918
		%	2,9	17,9	79,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.141	4.633	25.354	31.129
		%	3,7	14,9	81,5	100,0
	Secundaria, superior	N	2.285	5.778	34.776	42.840
		%	5,3	13,5	81,2	100,0
	Terciaria	N	.	918	9.653	10.572
		%	.	8,7	91,3	100,0
25-44 Total	Total	N	16.497	70.389	249.423	336.309
		%	4,9	20,9	74,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	578	7.070	30.128	37.776
		%	1,5	18,7	79,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.337	11.187	40.284	52.808
		%	2,5	21,2	76,3	100,0
	Secundaria, superior	N	10.422	28.513	125.339	164.274
		%	6,3	17,4	76,3	100,0
	Terciaria	N	4.159	23.619	53.673	81.451
		%	5,1	29,0	65,9	100,0
45-64 Total	Total	N	12.344	55.554	234.758	302.655
		%	4,1	18,4	77,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.898	9.085	57.416	70.400
		%	5,5	12,9	81,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.855	10.539	40.850	53.244
		%	3,5	19,8	76,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 62. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	5.266	22.920	88.944	117.130
			%	4,5	19,6	75,9	100,0
		Terciaria	N	1.324	13.009	47.548	61.881
			%	2,1	21,0	76,8	100,0
	65-74	Total	N	5.085	15.247	75.402	95.733
			%	5,3	15,9	78,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.301	6.056	29.661	38.017
			%	6,1	15,9	78,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	542	1.656	14.093	16.291
			%	3,3	10,2	86,5	100,0
		Secundaria, superior	N	1.704	4.810	19.434	25.948
			%	6,6	18,5	74,9	100,0
		Terciaria	N	538	2.725	12.215	15.477
			%	3,5	17,6	78,9	100,0
	>=75	Total	N	4.018	13.178	68.771	85.968
			%	4,7	15,3	80,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.633	7.983	43.873	54.489
			%	4,8	14,7	80,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	280	2.155	11.545	13.981
			%	2,0	15,4	82,6	100,0
		Secundaria, superior	N	200	1.424	8.853	10.478
			%	1,9	13,6	84,5	100,0
		Terciaria	N	904	1.616	4.500	7.020
			%	12,9	23,0	64,1	100,0
Mujeres	Total	Total	N	55.394	180.145	740.343	975.882
			%	5,7	18,5	75,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	13.752	44.700	219.876	278.327
			%	4,9	16,1	79,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.961	31.355	130.450	169.766
			%	4,7	18,5	76,8	100,0
		Secundaria, superior	N	17.507	57.176	233.184	307.866
			%	5,7	18,6	75,7	100,0
		Terciaria	N	16.175	46.915	156.833	219.923
			%	7,4	21,3	71,3	100,0
	15-24	Total	N	3.921	16.659	68.920	89.499
			%	4,4	18,6	77,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 62. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	642	1.739	9.005	11.386
			%	5,6	15,3	79,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.107	3.336	12.320	16.763
			%	6,6	19,9	73,5	100,0
		Secundaria, superior	N	1.322	8.090	36.032	45.443
			%	2,9	17,8	79,3	100,0
		Terciaria	N	851	3.493	11.563	15.907
			%	5,3	22,0	72,7	100,0
	25-44	Total	N	19.524	60.612	240.690	320.826
			%	6,1	18,9	75,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.570	4.568	19.851	25.990
			%	6,0	17,6	76,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.749	8.112	29.076	38.937
			%	4,5	20,8	74,7	100,0
		Secundaria, superior	N	6.758	20.926	102.804	130.487
			%	5,2	16,0	78,8	100,0
		Terciaria	N	9.447	27.005	88.959	125.412
			%	7,5	21,5	70,9	100,0
	45-64	Total	N	19.896	62.632	231.240	313.769
			%	6,3	20,0	73,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.852	12.631	61.481	77.963
			%	4,9	16,2	78,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.339	11.583	46.813	61.735
			%	5,4	18,8	75,8	100,0
		Secundaria, superior	N	7.496	24.853	77.973	110.322
			%	6,8	22,5	70,7	100,0
		Terciaria	N	5.210	13.565	44.974	63.749
			%	8,2	21,3	70,5	100,0
	65-74	Total	N	5.098	18.738	86.089	109.925
			%	4,6	17,0	78,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.076	9.031	49.745	61.852
			%	5,0	14,6	80,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	904	5.093	21.455	27.452
			%	3,3	18,6	78,2	100,0
		Secundaria, superior	N	795	2.285	8.813	11.893
			%	6,7	19,2	74,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 62. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N	322	2.329	6.076	8.727	
			%	3,7	26,7	69,6	100,0	
	>=75	Total	N	6.956	21.505	113.403	141.864	
			%	4,9	15,2	79,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	4.612	16.731	79.794	101.136	
			%	4,6	16,5	78,9	100,0	
		Secundaria, inferior	N	862	3.231	20.786	24.879	
			%	3,5	13,0	83,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.136	1.021	7.563	9.720	
			%	11,7	10,5	77,8	100,0	
		Terciaria	N	346	522	5.261	6.129	
			%	5,6	8,5	85,8	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	97.055	347.615	1.446.336	1.891.006
				%	5,1	18,4	76,5	100,0
			Sin estudios, primaria	N	23.453	76.665	388.808	488.927
				%	4,8	15,7	79,5	100,0
			Secundaria, inferior	N	13.117	61.527	262.576	337.220
				%	3,9	18,2	77,9	100,0
		Secundaria, superior	N	37.385	120.621	510.530	668.536	
			%	5,6	18,0	76,4	100,0	
		Terciaria	N	23.100	88.801	284.422	396.323	
			%	5,8	22,4	71,8	100,0	
15-24		Total	N	7.638	29.760	146.559	183.958	
			%	4,2	16,2	79,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	932	3.511	16.861	21.304	
			%	4,4	16,5	79,1	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.248	7.970	37.674	47.891	
			%	4,7	16,6	78,7	100,0	
		Secundaria, superior	N	3.607	13.868	70.808	88.283	
			%	4,1	15,7	80,2	100,0	
	Terciaria	N	851	4.412	21.216	26.479		
		%	3,2	16,7	80,1	100,0		
25-44	Total	N	36.021	131.001	490.114	657.135		
		%	5,5	19,9	74,6	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	2.148	11.638	49.979	63.765		
		%	3,4	18,3	78,4	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 62. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	3.087	19.299	69.360	91.745
			%	3,4	21,0	75,6	100,0
		Secundaria, superior	N	17.180	49.439	228.143	294.762
			%	5,8	16,8	77,4	100,0
		Terciaria	N	13.605	50.625	142.632	206.862
			%	6,6	24,5	69,0	100,0
	45-64	Total	N	32.240	118.186	465.998	616.424
			%	5,2	19,2	75,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.750	21.716	118.897	148.363
			%	5,2	14,6	80,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.194	22.123	87.663	114.979
			%	4,5	19,2	76,2	100,0
		Secundaria, superior	N	12.762	47.774	166.916	227.452
			%	5,6	21,0	73,4	100,0
		Terciaria	N	6.534	26.573	92.522	125.630
			%	5,2	21,2	73,6	100,0
	65-74	Total	N	10.183	33.985	161.491	205.658
			%	5,0	16,5	78,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.377	15.087	79.406	99.869
			%	5,4	15,1	79,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.447	6.749	35.548	43.744
			%	3,3	15,4	81,3	100,0
		Secundaria, superior	N	2.499	7.095	28.247	37.841
			%	6,6	18,8	74,6	100,0
		Terciaria	N	860	5.054	18.290	24.204
			%	3,6	20,9	75,6	100,0
	>=75	Total	N	10.974	34.684	182.175	227.832
			%	4,8	15,2	80,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.245	24.714	123.667	155.625
			%	4,7	15,9	79,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.142	5.387	32.331	38.860
			%	2,9	13,9	83,2	100,0
		Secundaria, superior	N	1.336	2.445	16.416	20.198
			%	6,6	12,1	81,3	100,0
		Terciaria	N	1.250	2.138	9.761	13.149
			%	9,5	16,3	74,2	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 63. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y territorio histórico

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	CAPV	N	72.736	209.581	632.807	915.124
		%	7,9	22,9	69,1	100,0
	Araba	N	7.749	26.337	99.665	133.751
		%	5,8	19,7	74,5	100,0
	Gipuzkoa	N	22.276	70.446	201.090	293.812
		%	7,6	24,0	68,4	100,0
	Bizkaia	N	42.712	112.798	332.052	487.561
		%	8,8	23,1	68,1	100,0
15-24	CAPV	N	4.030	20.752	69.676	94.458
		%	4,3	22,0	73,8	100,0
	Araba	N	478	2.693	11.698	14.869
		%	3,2	18,1	78,7	100,0
	Gipuzkoa	N	2.057	7.619	21.629	31.305
		%	6,6	24,3	69,1	100,0
	Bizkaia	N	1.495	10.440	36.348	48.284
		%	3,1	21,6	75,3	100,0
25-44	CAPV	N	21.481	78.728	236.100	336.309
		%	6,4	23,4	70,2	100,0
	Araba	N	3.189	9.144	39.729	52.062
		%	6,1	17,6	76,3	100,0
	Gipuzkoa	N	6.482	26.766	73.542	106.790
		%	6,1	25,1	68,9	100,0
	Bizkaia	N	11.810	42.818	122.830	177.458
		%	6,7	24,1	69,2	100,0
45-64	CAPV	N	28.738	75.196	198.721	302.655
		%	9,5	24,8	65,7	100,0
	Araba	N	2.280	10.407	30.064	42.751
		%	5,3	24,3	70,3	100,0
	Gipuzkoa	N	8.235	25.099	64.085	97.419
		%	8,5	25,8	65,8	100,0
	Bizkaia	N	18.223	39.690	104.572	162.485
		%	11,2	24,4	64,4	100,0
65-74	CAPV	N	10.880	21.455	63.398	95.733
		%	11,4	22,4	66,2	100,0
	Araba	N	1.639	2.471	9.053	13.163
		%	12,4	18,8	68,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 63. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total	
Hombres 65-74	Gipuzkoa	N		3.912	6.328	21.890	32.130	
		%		12,2	19,7	68,1	100,0	
	Bizkaia	N		5.330	12.655	32.455	50.440	
		%		10,6	25,1	64,3	100,0	
	>=75	CAPV	N		7.606	13.450	64.911	85.968
			%		8,8	15,6	75,5	100,0
		Araba	N		162	1.621	9.121	10.905
			%		1,5	14,9	83,6	100,0
		Gipuzkoa	N		1.590	4.634	19.944	26.168
			%		6,1	17,7	76,2	100,0
		Bizkaia	N		5.854	7.195	35.846	48.895
			%		12,0	14,7	73,3	100,0
Mujeres Total		CAPV	N		80.980	212.889	682.013	975.882
			%		8,3	21,8	69,9	100,0
		Araba	N		6.248	29.554	100.970	136.772
			%		4,6	21,6	73,8	100,0
	Gipuzkoa	N		25.702	68.511	218.473	312.686	
		%		8,2	21,9	69,9	100,0	
	Bizkaia	N		49.030	114.824	362.571	526.425	
		%		9,3	21,8	68,9	100,0	
	15-24	CAPV	N		3.089	16.687	69.723	89.499
			%		3,5	18,6	77,9	100,0
		Araba	N		186	2.151	10.873	13.210
			%		1,4	16,3	82,3	100,0
Gipuzkoa		N		1.476	5.951	22.016	29.443	
		%		5,0	20,2	74,8	100,0	
Bizkaia		N		1.427	8.585	36.834	46.846	
		%		3,0	18,3	78,6	100,0	
25-44		CAPV	N		25.579	69.376	225.870	320.826
			%		8,0	21,6	70,4	100,0
		Araba	N		2.379	10.988	34.502	47.869
			%		5,0	23,0	72,1	100,0
	Gipuzkoa	N		9.395	20.742	71.768	101.905	
		%		9,2	20,4	70,4	100,0	
	Bizkaia	N		13.805	37.646	119.600	171.052	
		%		8,1	22,0	69,9	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 63. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	29.548	78.583	205.638	313.769
			%	9,4	25,0	65,5	100,0
		Araba	N	2.399	11.046	30.818	44.263
			%	5,4	25,0	69,6	100,0
		Gipuzkoa	N	8.686	26.387	64.588	99.662
			%	8,7	26,5	64,8	100,0
	Bizkaia	N	18.463	41.149	110.232	169.843	
		%	10,9	24,2	64,9	100,0	
	65-74	CAPV	N	12.767	24.018	73.139	109.925
			%	11,6	21,8	66,5	100,0
		Araba	N	761	2.850	10.710	14.320
			%	5,3	19,9	74,8	100,0
		Gipuzkoa	N	2.783	7.279	26.058	36.120
			%	7,7	20,2	72,1	100,0
	Bizkaia	N	9.224	13.889	36.371	59.484	
		%	15,5	23,3	61,1	100,0	
	>=75	CAPV	N	9.997	24.225	107.643	141.864
			%	7,0	17,1	75,9	100,0
Araba		N	524	2.519	14.067	17.110	
		%	3,1	14,7	82,2	100,0	
Gipuzkoa		N	3.362	8.151	34.042	45.555	
		%	7,4	17,9	74,7	100,0	
Bizkaia	N	6.111	13.555	59.533	79.200		
	%	7,7	17,1	75,2	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	153.716	422.470	1.314.820	1.891.006
			%	8,1	22,3	69,5	100,0
	Araba	N	13.997	55.891	200.635	270.523	
		%	5,2	20,7	74,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	47.978	138.957	419.562	606.497	
		%	7,9	22,9	69,2	100,0	
	Bizkaia	N	91.742	227.623	694.622	1.013.987	
		%	9,0	22,4	68,5	100,0	
	15-24	CAPV	N	7.119	37.439	139.399	183.958
			%	3,9	20,4	75,8	100,0
	Araba	N	664	4.844	22.571	28.079	
		%	2,4	17,3	80,4	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 63. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	3.533	13.570	43.645	60.748
			%	5,8	22,3	71,8	100,0
		Bizkaia	N	2.922	19.025	73.183	95.130
			%	3,1	20,0	76,9	100,0
	25-44	CAPV	N	47.060	148.104	461.970	657.135
			%	7,2	22,5	70,3	100,0
		Araba	N	5.568	20.132	74.230	99.930
			%	5,6	20,1	74,3	100,0
		Gipuzkoa	N	15.877	47.508	145.309	208.695
			%	7,6	22,8	69,6	100,0
		Bizkaia	N	25.615	80.464	242.430	348.509
			%	7,3	23,1	69,6	100,0
	45-64	CAPV	N	58.286	153.779	404.359	616.424
			%	9,5	24,9	65,6	100,0
		Araba	N	4.679	21.453	60.882	87.015
			%	5,4	24,7	70,0	100,0
		Gipuzkoa	N	16.922	51.486	128.673	197.081
			%	8,6	26,1	65,3	100,0
		Bizkaia	N	36.685	80.839	214.804	332.328
			%	11,0	24,3	64,6	100,0
	65-74	CAPV	N	23.647	45.473	136.538	205.658
			%	11,5	22,1	66,4	100,0
		Araba	N	2.399	5.321	19.763	27.483
			%	8,7	19,4	71,9	100,0
		Gipuzkoa	N	6.694	13.608	47.948	68.251
			%	9,8	19,9	70,3	100,0
		Bizkaia	N	14.554	26.544	68.826	109.924
			%	13,2	24,1	62,6	100,0
	>=75	CAPV	N	17.603	37.675	172.554	227.832
			%	7,7	16,5	75,7	100,0
		Araba	N	686	4.140	23.188	28.015
			%	2,4	14,8	82,8	100,0
		Gipuzkoa	N	4.952	12.784	53.987	71.723
			%	6,9	17,8	75,3	100,0
		Bizkaia	N	11.965	20.750	95.379	128.094
			%	9,3	16,2	74,5	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	Total	Total	72.736	209.321	631.806	913.863
		%	8,0	22,9	69,1	100,0
	I	N	5.184	28.043	80.463	113.690
		%	4,6	24,7	70,8	100,0
	II	N	3.959	19.689	54.557	78.206
		%	5,1	25,2	69,8	100,0
	III	N	16.205	46.825	125.325	188.355
		%	8,6	24,9	66,5	100,0
	IV	N	41.965	94.385	313.956	450.306
		%	9,3	21,0	69,7	100,0
	V	N	5.422	20.380	57.505	83.307
		%	6,5	24,5	69,0	100,0
	15-24	Total	4.030	20.492	69.378	93.900
		%	4,3	21,8	73,9	100,0
	I	N	323	3.016	11.295	14.634
		%	2,2	20,6	77,2	100,0
	II	N	.	3.209	7.779	10.988
		%	.	29,2	70,8	100,0
	III	N	739	3.881	12.210	16.830
		%	4,4	23,1	72,5	100,0
	IV	N	2.575	7.602	32.560	42.737
		%	6,0	17,8	76,2	100,0
	V	N	393	2.784	5.534	8.711
		%	4,5	32,0	63,5	100,0
	25-44	Total	21.481	78.728	236.100	336.309
		%	6,4	23,4	70,2	100,0
	I	N	879	9.819	33.035	43.732
		%	2,0	22,5	75,5	100,0
	II	N	1.640	7.687	23.169	32.496
		%	5,0	23,7	71,3	100,0
	III	N	3.691	16.426	42.139	62.257
		%	5,9	26,4	67,7	100,0
	IV	N	13.368	36.773	110.251	160.392
		%	8,3	22,9	68,7	100,0
	V	N	1.903	8.023	27.507	37.432
		%	5,1	21,4	73,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres 45-64	Total	N	28.738	75.196	198.433	302.368
		%	9,5	24,9	65,6	100,0
I	N	2.327	10.776	24.804	37.907	
	%	6,1	28,4	65,4	100,0	
II	N	1.304	6.434	15.682	23.419	
	%	5,6	27,5	67,0	100,0	
III	N	6.766	17.122	42.434	66.322	
	%	10,2	25,8	64,0	100,0	
IV	N	16.580	34.368	99.665	150.614	
	%	11,0	22,8	66,2	100,0	
V	N	1.760	6.497	15.848	24.106	
	%	7,3	27,0	65,7	100,0	
65-74	Total	N	10.880	21.455	63.398	95.733
		%	11,4	22,4	66,2	100,0
I	N	1.122	3.919	8.712	13.753	
	%	8,2	28,5	63,3	100,0	
II	N	838	1.567	4.457	6.862	
	%	12,2	22,8	64,9	100,0	
III	N	3.332	5.205	13.240	21.777	
	%	15,3	23,9	60,8	100,0	
IV	N	5.290	9.017	33.445	47.753	
	%	11,1	18,9	70,0	100,0	
V	N	298	1.747	3.544	5.588	
	%	5,3	31,3	63,4	100,0	
>=75	Total	N	7.606	13.450	64.497	85.553
		%	8,9	15,7	75,4	100,0
I	N	533	514	2.617	3.663	
	%	14,5	14,0	71,4	100,0	
II	N	177	791	3.471	4.440	
	%	4,0	17,8	78,2	100,0	
III	N	1.677	4.191	15.302	21.169	
	%	7,9	19,8	72,3	100,0	
IV	N	4.151	6.625	38.034	48.810	
	%	8,5	13,6	77,9	100,0	
V	N	1.068	1.329	5.073	7.470	
	%	14,3	17,8	67,9	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	Total	Total	N 80.754	212.420	680.317	973.492
			% 8,3	21,8	69,9	100,0
I	Total	N	6.367	22.058	76.413	104.838
		%	6,1	21,0	72,9	100,0
II	Total	N	6.207	22.766	66.055	95.028
		%	6,5	24,0	69,5	100,0
III	Total	N	19.152	50.943	172.012	242.107
		%	7,9	21,0	71,0	100,0
IV	Total	N	31.987	80.727	247.727	360.441
		%	8,9	22,4	68,7	100,0
V	Total	N	17.041	35.925	118.110	171.077
		%	10,0	21,0	69,0	100,0
15-24	Total	N	3.089	16.687	68.758	88.533
		%	3,5	18,8	77,7	100,0
I	Total	N	296	1.412	12.853	14.562
		%	2,0	9,7	88,3	100,0
II	Total	N	1.108	2.585	9.804	13.497
		%	8,2	19,2	72,6	100,0
III	Total	N	1.098	3.674	15.298	20.069
		%	5,5	18,3	76,2	100,0
IV	Total	N	586	6.527	24.500	31.614
		%	1,9	20,6	77,5	100,0
V	Total	N	.	2.489	6.303	8.792
		%	.	28,3	71,7	100,0
25-44	Total	N	25.354	69.107	225.870	320.330
		%	7,9	21,6	70,5	100,0
I	Total	N	3.120	8.808	33.158	45.086
		%	6,9	19,5	73,5	100,0
II	Total	N	1.923	9.687	25.613	37.223
		%	5,2	26,0	68,8	100,0
III	Total	N	7.379	13.719	60.932	82.029
		%	9,0	16,7	74,3	100,0
IV	Total	N	8.689	27.692	74.344	110.725
		%	7,8	25,0	67,1	100,0
V	Total	N	4.242	9.202	31.823	45.267
		%	9,4	20,3	70,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total	
Mujeres	45-64	Total	N 29.548	78.583	205.467	313.598	
			%	9,4	25,1	65,5	100,0
		I	N 1.940	8.396	21.780	32.116	
			%	6,0	26,1	67,8	100,0
		II	N 1.651	6.754	18.388	26.792	
			%	6,2	25,2	68,6	100,0
		III	N 5.900	23.428	59.314	88.641	
			%	6,7	26,4	66,9	100,0
		IV	N 11.770	24.732	67.600	104.102	
			%	11,3	23,8	64,9	100,0
		V	N 8.287	15.273	38.385	61.946	
			%	13,4	24,7	62,0	100,0
	65-74	Total	N 12.767	24.018	72.984	109.770	
			%	11,6	21,9	66,5	100,0
		I	N 741	2.316	4.141	7.199	
			%	10,3	32,2	57,5	100,0
		II	N 779	1.748	4.698	7.225	
			%	10,8	24,2	65,0	100,0
		III	N 3.238	5.405	14.256	22.899	
			%	14,1	23,6	62,3	100,0
		IV	N 5.856	10.229	34.050	50.134	
			%	11,7	20,4	67,9	100,0
		V	N 2.153	4.320	15.839	22.312	
			%	9,6	19,4	71,0	100,0
	>=75	Total	N 9.997	24.025	107.239	141.261	
			%	7,1	17,0	75,9	100,0
		I	N 269	1.125	4.481	5.875	
			%	4,6	19,1	76,3	100,0
		II	N 746	1.993	7.552	10.292	
			%	7,2	19,4	73,4	100,0
		III	N 1.538	4.718	22.213	28.468	
			%	5,4	16,6	78,0	100,0
		IV	N 5.085	11.548	47.233	63.866	
			%	8,0	18,1	74,0	100,0
		V	N 2.359	4.641	25.760	32.760	
			%	7,2	14,2	78,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	Total	Total	N	153.491	421.741	1.312.124	1.887.356
			%	8,1	22,3	69,5	100,0
		I	N	11.551	50.101	156.876	218.528
			%	5,3	22,9	71,8	100,0
		II	N	10.167	42.455	120.612	173.234
			%	5,9	24,5	69,6	100,0
		III	N	35.357	97.768	297.337	430.462
			%	8,2	22,7	69,1	100,0
		IV	N	73.952	175.112	561.683	810.747
			%	9,1	21,6	69,3	100,0
		V	N	22.464	56.306	175.615	254.385
			%	8,8	22,1	69,0	100,0
	15-24	Total	N	7.119	37.179	138.136	182.434
			%	3,9	20,4	75,7	100,0
		I	N	619	4.428	24.149	29.196
			%	2,1	15,2	82,7	100,0
		II	N	1.108	5.794	17.582	24.485
			%	4,5	23,7	71,8	100,0
		III	N	1.837	7.554	27.508	36.900
			%	5,0	20,5	74,5	100,0
		IV	N	3.161	14.129	57.060	74.351
			%	4,3	19,0	76,7	100,0
		V	N	393	5.273	11.836	17.503
			%	2,2	30,1	67,6	100,0
	25-44	Total	N	46.835	147.835	461.970	656.640
			%	7,1	22,5	70,4	100,0
		I	N	3.999	18.627	66.192	88.818
			%	4,5	21,0	74,5	100,0
		II	N	3.563	17.374	48.782	69.719
			%	5,1	24,9	70,0	100,0
		III	N	11.070	30.145	103.071	144.286
			%	7,7	20,9	71,4	100,0
		IV	N	22.058	64.465	184.595	271.117
			%	8,1	23,8	68,1	100,0
		V	N	6.145	17.224	59.330	82.699
			%	7,4	20,8	71,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	45-64	Total	N 58.286	153.779	403.900	615.965
			% 9,5	25,0	65,6	100,0
	I	N	4.268	19.172	46.584	70.023
		%	6,1	27,4	66,5	100,0
	II	N	2.955	13.187	34.070	50.212
		%	5,9	26,3	67,9	100,0
	III	N	12.666	40.550	101.747	154.963
		%	8,2	26,2	65,7	100,0
	IV	N	28.351	59.100	167.265	254.716
		%	11,1	23,2	65,7	100,0
	V	N	10.048	21.771	54.234	86.052
		%	11,7	25,3	63,0	100,0
	65-74	Total	N 23.647	45.473	136.382	205.503
		%	11,5	22,1	66,4	100,0
	I	N	1.863	6.235	12.854	20.952
		%	8,9	29,8	61,3	100,0
	II	N	1.617	3.315	9.155	14.087
		%	11,5	23,5	65,0	100,0
	III	N	6.570	10.610	27.496	44.676
		%	14,7	23,7	61,5	100,0
	IV	N	11.146	19.246	67.495	97.887
		%	11,4	19,7	69,0	100,0
	V	N	2.451	6.067	19.383	27.901
		%	8,8	21,7	69,5	100,0
	>=75	Total	N 17.603	37.475	171.735	226.814
		%	7,8	16,5	75,7	100,0
	I	N	802	1.639	7.098	9.538
		%	8,4	17,2	74,4	100,0
	II	N	924	2.785	11.023	14.731
		%	6,3	18,9	74,8	100,0
	III	N	3.214	8.909	37.515	49.638
		%	6,5	17,9	75,6	100,0
	IV	N	9.236	18.173	85.267	112.676
		%	8,2	16,1	75,7	100,0
	V	N	3.428	5.970	30.833	40.231
		%	8,5	14,8	76,6	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 65. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	Total	N	72.736	209.581	632.807	915.124
		%	7,9	22,9	69,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	18.676	41.020	150.903	210.600
		%	8,9	19,5	71,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	13.794	37.944	115.716	167.454
		%	8,2	22,7	69,1	100,0
	Secundaria, superior	N	30.420	83.489	246.761	360.670
		%	8,4	23,1	68,4	100,0
	Terciaria	N	9.846	47.128	119.426	176.400
		%	5,6	26,7	67,7	100,0
15-24 Total	Total	N	4.030	20.752	69.676	94.458
		%	4,3	22,0	73,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	1.661	8.257	9.918
		%	.	16,7	83,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.190	5.728	24.210	31.129
		%	3,8	18,4	77,8	100,0
	Secundaria, superior	N	2.595	10.297	29.948	42.840
		%	6,1	24,0	69,9	100,0
	Terciaria	N	245	3.066	7.261	10.572
		%	2,3	29,0	68,7	100,0
25-44 Total	Total	N	21.481	78.728	236.100	336.309
		%	6,4	23,4	70,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.131	9.967	24.678	37.776
		%	8,3	26,4	65,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	4.101	12.821	35.886	52.808
		%	7,8	24,3	68,0	100,0
	Secundaria, superior	N	11.580	35.562	117.132	164.274
		%	7,0	21,6	71,3	100,0
	Terciaria	N	2.668	20.379	58.404	81.451
		%	3,3	25,0	71,7	100,0
45-64 Total	Total	N	28.738	75.196	198.721	302.655
		%	9,5	24,8	65,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	5.834	14.238	50.328	70.400
		%	8,3	20,2	71,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	6.323	13.926	32.996	53.244
		%	11,9	26,2	62,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 65. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres 45-64	Secundaria, superior	N		12.854	29.127	75.150	117.130
		%		11,0	24,9	64,2	100,0
	Terciaria	N		3.728	17.905	40.248	61.881
		%		6,0	28,9	65,0	100,0
65-74	Total	N		10.880	21.455	63.398	95.733
		%		11,4	22,4	66,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N		4.604	7.597	25.816	38.017
		%		12,1	20,0	67,9	100,0
	Secundaria, inferior	N		1.634	3.434	11.224	16.291
		%		10,0	21,1	68,9	100,0
	Secundaria, superior	N		2.509	5.750	17.688	25.948
		%		9,7	22,2	68,2	100,0
	Terciaria	N		2.133	4.675	8.670	15.477
		%		13,8	30,2	56,0	100,0
>=75	Total	N		7.606	13.450	64.911	85.968
		%		8,8	15,6	75,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N		5.106	7.557	41.825	54.489
		%		9,4	13,9	76,8	100,0
	Secundaria, inferior	N		547	2.035	11.399	13.981
		%		3,9	14,6	81,5	100,0
	Secundaria, superior	N		882	2.753	6.843	10.478
		%		8,4	26,3	65,3	100,0
	Terciaria	N		1.072	1.104	4.844	7.020
		%		15,3	15,7	69,0	100,0
Total	Total	N		80.980	212.889	682.013	975.882
		%		8,3	21,8	69,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N		26.757	56.091	195.479	278.327
		%		9,6	20,2	70,2	100,0
	Secundaria, inferior	N		16.297	36.719	116.750	169.766
		%		9,6	21,6	68,8	100,0
	Secundaria, superior	N		26.174	69.206	212.486	307.866
		%		8,5	22,5	69,0	100,0
	Terciaria	N		11.752	50.873	157.297	219.923
		%		5,3	23,1	71,5	100,0
	Total	N		3.089	16.687	69.723	89.499
		%		3,5	18,6	77,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 65. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	772	3.695	6.919	11.386
			%	6,8	32,5	60,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	3.674	13.089	16.763
			%	.	21,9	78,1	100,0
		Secundaria, superior	N	1.990	6.689	36.764	45.443
			%	4,4	14,7	80,9	100,0
		Terciaria	N	326	2.629	12.952	15.907
			%	2,1	16,5	81,4	100,0
	25-44	Total	N	25.579	69.376	225.870	320.826
			%	8,0	21,6	70,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.622	5.848	17.519	25.990
			%	10,1	22,5	67,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.133	8.213	26.591	38.937
			%	10,6	21,1	68,3	100,0
		Secundaria, superior	N	12.040	28.478	89.969	130.487
			%	9,2	21,8	68,9	100,0
		Terciaria	N	6.784	26.837	91.791	125.412
			%	5,4	21,4	73,2	100,0
	45-64	Total	N	29.548	78.583	205.638	313.769
			%	9,4	25,0	65,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.216	16.787	52.961	77.963
			%	10,5	21,5	67,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.743	15.087	37.906	61.735
			%	14,2	24,4	61,4	100,0
		Secundaria, superior	N	9.479	29.243	71.600	110.322
			%	8,6	26,5	64,9	100,0
		Terciaria	N	3.111	17.466	43.171	63.749
			%	4,9	27,4	67,7	100,0
	65-74	Total	N	12.767	24.018	73.139	109.925
			%	11,6	21,8	66,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.915	11.883	42.054	61.852
			%	12,8	19,2	68,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.632	6.157	19.663	27.452
			%	5,9	22,4	71,6	100,0
		Secundaria, superior	N	1.960	3.213	6.721	11.893
			%	16,5	27,0	56,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 65. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total		
Mujeres	65-74	Terciaria	N	1.260	2.765	4.702	8.727		
			%	14,4	31,7	53,9	100,0		
	>=75	Total	N	9.997	24.225	107.643	141.864		
			%	7,0	17,1	75,9	100,0		
		Sin estudios, primaria	N	7.232	17.877	76.027	101.136		
			%	7,2	17,7	75,2	100,0		
		Secundaria, inferior	N	1.789	3.588	19.502	24.879		
			%	7,2	14,4	78,4	100,0		
		Secundaria, superior	N	705	1.583	7.432	9.720		
			%	7,3	16,3	76,5	100,0		
		Terciaria	N	271	1.176	4.682	6.129		
			%	4,4	19,2	76,4	100,0		
		Ambos	Total	Total	N	153.716	422.470	1.314.820	1.891.006
					%	8,1	22,3	69,5	100,0
			Sin estudios, primaria	N	45.433	97.112	346.383	488.927	
				%	9,3	19,9	70,8	100,0	
			Secundaria, inferior	N	30.091	74.663	232.466	337.220	
				%	8,9	22,1	68,9	100,0	
Secundaria, superior	N		56.594	152.694	459.248	668.536			
	%		8,5	22,8	68,7	100,0			
Terciaria	N		21.599	98.001	276.723	396.323			
	%		5,4	24,7	69,8	100,0			
15-24	Total		N	7.119	37.439	139.399	183.958		
			%	3,9	20,4	75,8	100,0		
	Sin estudios, primaria		N	772	5.356	15.176	21.304		
			%	3,6	25,1	71,2	100,0		
	Secundaria, inferior		N	1.190	9.402	37.299	47.891		
			%	2,5	19,6	77,9	100,0		
	Secundaria, superior		N	4.585	16.986	66.712	88.283		
			%	5,2	19,2	75,6	100,0		
	Terciaria	N	572	5.695	20.212	26.479			
		%	2,2	21,5	76,3	100,0			
	25-44	Total	N	47.060	148.104	461.970	657.135		
			%	7,2	22,5	70,3	100,0		
Sin estudios, primaria		N	5.754	15.815	42.197	63.765			
		%	9,0	24,8	66,2	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 65. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	8.234	21.034	62.477	91.745
			%	9,0	22,9	68,1	100,0
		Secundaria, superior	N	23.620	64.040	207.102	294.762
			%	8,0	21,7	70,3	100,0
		Terciaria	N	9.452	47.215	150.195	206.862
			%	4,6	22,8	72,6	100,0
	45-64	Total	N	58.286	153.779	404.359	616.424
			%	9,5	24,9	65,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	14.049	31.025	103.288	148.363
			%	9,5	20,9	69,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	15.065	29.013	70.902	114.979
			%	13,1	25,2	61,7	100,0
		Secundaria, superior	N	22.333	58.370	146.750	227.452
			%	9,8	25,7	64,5	100,0
		Terciaria	N	6.839	35.371	83.419	125.630
			%	5,4	28,2	66,4	100,0
	65-74	Total	N	23.647	45.473	136.538	205.658
			%	11,5	22,1	66,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	12.520	19.480	67.869	99.869
			%	12,5	19,5	68,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.266	9.590	30.887	43.744
			%	7,5	21,9	70,6	100,0
		Secundaria, superior	N	4.469	8.963	24.410	37.841
			%	11,8	23,7	64,5	100,0
		Terciaria	N	3.392	7.440	13.372	24.204
			%	14,0	30,7	55,2	100,0
	>=75	Total	N	17.603	37.675	172.554	227.832
			%	7,7	16,5	75,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	12.338	25.435	117.852	155.625
			%	7,9	16,3	75,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.336	5.624	30.901	38.860
			%	6,0	14,5	79,5	100,0
		Secundaria, superior	N	1.587	4.336	14.275	20.198
			%	7,9	21,5	70,7	100,0
		Terciaria	N	1.343	2.280	9.526	13.149
			%	10,2	17,3	72,4	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 66. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y territorio histórico

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	CAPV	N	23.480	181.003	710.641	915.124
		%	2,6	19,8	77,7	100,0
	Araba	N	1.583	24.397	107.771	133.751
		%	1,2	18,2	80,6	100,0
	Gipuzkoa	N	6.483	50.633	236.696	293.812
		%	2,2	17,2	80,6	100,0
	Bizkaia	N	15.414	105.972	366.175	487.561
		%	3,2	21,7	75,1	100,0
15-24	CAPV	N	1.253	16.453	76.753	94.458
		%	1,3	17,4	81,3	100,0
	Araba	N	.	3.300	11.570	14.869
		%	.	22,2	77,8	100,0
	Gipuzkoa	N	960	3.382	26.963	31.305
		%	3,1	10,8	86,1	100,0
	Bizkaia	N	293	9.771	38.220	48.284
		%	0,6	20,2	79,2	100,0
25-44	CAPV	N	9.165	69.516	257.628	336.309
		%	2,7	20,7	76,6	100,0
	Araba	N	.	9.471	42.591	52.062
		%	.	18,2	81,8	100,0
	Gipuzkoa	N	2.588	21.185	83.017	106.790
		%	2,4	19,8	77,7	100,0
	Bizkaia	N	6.577	38.860	132.020	177.458
		%	3,7	21,9	74,4	100,0
45-64	CAPV	N	8.462	60.756	233.438	302.655
		%	2,8	20,1	77,1	100,0
	Araba	N	967	8.130	33.655	42.751
		%	2,3	19,0	78,7	100,0
	Gipuzkoa	N	1.486	18.291	77.642	97.419
		%	1,5	18,8	79,7	100,0
	Bizkaia	N	6.009	34.335	122.140	162.485
		%	3,7	21,1	75,2	100,0
65-74	CAPV	N	2.916	19.136	73.681	95.733
		%	3,0	20,0	77,0	100,0
	Araba	N	616	2.234	10.314	13.163
		%	4,7	17,0	78,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 66. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total	
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	820	3.916	27.394	32.130	
			%	2,6	12,2	85,3	100,0	
		Bizkaia	N	1.480	12.986	35.974	50.440	
			%	2,9	25,7	71,3	100,0	
	>=75	CAPV	N	1.684	15.142	69.142	85.968	
			%	2,0	17,6	80,4	100,0	
			Araba	N	.	1.263	9.641	10.905
				%	.	11,6	88,4	100,0
			Gipuzkoa	N	629	3.859	21.680	26.168
				%	2,4	14,7	82,8	100,0
			Bizkaia	N	1.055	10.019	37.820	48.895
				%	2,2	20,5	77,4	100,0
Mujeres		Total	CAPV	N	29.201	200.450	746.231	975.882
				%	3,0	20,5	76,5	100,0
			Araba	N	1.030	24.070	111.672	136.772
				%	0,8	17,6	81,6	100,0
		Gipuzkoa	N	5.346	60.153	247.187	312.686	
			%	1,7	19,2	79,1	100,0	
		Bizkaia	N	22.826	116.227	387.372	526.425	
			%	4,3	22,1	73,6	100,0	
	15-24	CAPV	N	1.714	15.928	71.857	89.499	
			%	1,9	17,8	80,3	100,0	
			Araba	N	.	1.615	11.595	13.210
				%	.	12,2	87,8	100,0
			Gipuzkoa	N	459	5.818	23.166	29.443
				%	1,6	19,8	78,7	100,0
			Bizkaia	N	1.255	8.494	37.096	46.846
				%	2,7	18,1	79,2	100,0
		25-44	CAPV	N	13.022	62.999	244.806	320.826
				%	4,1	19,6	76,3	100,0
			Araba	N	331	9.525	38.012	47.869
				%	0,7	19,9	79,4	100,0
	Gipuzkoa		N	2.457	19.265	80.184	101.905	
			%	2,4	18,9	78,7	100,0	
	Bizkaia	N	10.234	34.209	126.610	171.052		
		%	6,0	20,0	74,0	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 66. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	8.343	71.146	234.280	313.769
			%	2,7	22,7	74,7	100,0
		Araba	N	428	7.379	36.456	44.263
			%	1,0	16,7	82,4	100,0
		Gipuzkoa	N	1.528	20.958	77.176	99.662
			%	1,5	21,0	77,4	100,0
	Bizkaia	N	6.387	42.809	120.648	169.843	
		%	3,8	25,2	71,0	100,0	
	65-74	CAPV	N	3.184	24.799	81.942	109.925
			%	2,9	22,6	74,5	100,0
		Araba	N	270	2.905	11.146	14.320
			%	1,9	20,3	77,8	100,0
		Gipuzkoa	N	247	5.859	30.014	36.120
			%	0,7	16,2	83,1	100,0
	Bizkaia	N	2.667	16.035	40.782	59.484	
		%	4,5	27,0	68,6	100,0	
	>=75	CAPV	N	2.939	25.579	113.347	141.864
			%	2,1	18,0	79,9	100,0
Araba		N	.	2.646	14.464	17.110	
		%	.	15,5	84,5	100,0	
Gipuzkoa		N	655	8.253	36.647	45.555	
		%	1,4	18,1	80,4	100,0	
Bizkaia	N	2.284	14.680	62.236	79.200		
	%	2,9	18,5	78,6	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	52.682	381.452	1.456.873	1.891.006
			%	2,8	20,2	77,0	100,0
	Araba	N	2.613	48.467	219.443	270.523	
		%	1,0	17,9	81,1	100,0	
	Gipuzkoa	N	11.828	110.786	483.882	606.497	
		%	2,0	18,3	79,8	100,0	
	Bizkaia	N	38.241	222.199	753.547	1.013.987	
		%	3,8	21,9	74,3	100,0	
	15-24	CAPV	N	2.967	32.380	148.610	183.958
			%	1,6	17,6	80,8	100,0
		Araba	N	.	4.915	23.164	28.079
			%	.	17,5	82,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 66. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	1.419	9.200	50.129	60.748
			%	2,3	15,1	82,5	100,0
		Bizkaia	N	1.548	18.265	75.317	95.130
			%	1,6	19,2	79,2	100,0
	25-44	CAPV	N	22.187	132.514	502.433	657.135
			%	3,4	20,2	76,5	100,0
		Araba	N	331	18.996	80.603	99.930
			%	0,3	19,0	80,7	100,0
		Gipuzkoa	N	5.045	40.449	163.201	208.695
			%	2,4	19,4	78,2	100,0
		Bizkaia	N	16.811	73.069	258.630	348.509
			%	4,8	21,0	74,2	100,0
	45-64	CAPV	N	16.804	131.902	467.718	616.424
			%	2,7	21,4	75,9	100,0
		Araba	N	1.395	15.509	70.111	87.015
			%	1,6	17,8	80,6	100,0
		Gipuzkoa	N	3.014	39.249	154.818	197.081
			%	1,5	19,9	78,6	100,0
		Bizkaia	N	12.396	77.144	242.789	332.328
			%	3,7	23,2	73,1	100,0
	65-74	CAPV	N	6.100	43.935	155.623	205.658
			%	3,0	21,4	75,7	100,0
		Araba	N	886	5.138	21.459	27.483
			%	3,2	18,7	78,1	100,0
		Gipuzkoa	N	1.067	9.776	57.408	68.251
			%	1,6	14,3	84,1	100,0
		Bizkaia	N	4.147	29.021	76.756	109.924
			%	3,8	26,4	69,8	100,0
	>=75	CAPV	N	4.622	40.721	182.489	227.832
			%	2,0	17,9	80,1	100,0
		Araba	N	.	3.909	24.106	28.015
			%	.	14,0	86,0	100,0
		Gipuzkoa	N	1.284	12.112	58.327	71.723
			%	1,8	16,9	81,3	100,0
		Bizkaia	N	3.339	24.700	100.056	128.094
			%	2,6	19,3	78,1	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 67. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	Total	Total	N 23.480	180.814	709.569	913.863
			% 2,6	19,8	77,6	100,0
	I	N	1.574	17.210	94.906	113.690
		%	1,4	15,1	83,5	100,0
	II	N	1.423	12.793	63.990	78.206
		%	1,8	16,4	81,8	100,0
	III	N	3.932	42.802	141.620	188.355
		%	2,1	22,7	75,2	100,0
	IV	N	13.884	88.127	348.295	450.306
		%	3,1	19,6	77,3	100,0
	V	N	2.668	19.881	60.759	83.307
		%	3,2	23,9	72,9	100,0
	15-24	Total	N 1.253	16.453	76.194	93.900
		%	1,3	17,5	81,1	100,0
	I	N	331	705	13.598	14.634
		%	2,3	4,8	92,9	100,0
	II	N	.	1.450	9.538	10.988
		%	.	13,2	86,8	100,0
	III	N	.	3.573	13.257	16.830
		%	.	21,2	78,8	100,0
	IV	N	730	7.495	34.512	42.737
		%	1,7	17,5	80,8	100,0
	V	N	192	3.230	5.289	8.711
		%	2,2	37,1	60,7	100,0
	25-44	Total	N 9.165	69.516	257.628	336.309
		%	2,7	20,7	76,6	100,0
	I	N	289	7.014	36.429	43.732
		%	0,7	16,0	83,3	100,0
	II	N	967	4.160	27.369	32.496
		%	3,0	12,8	84,2	100,0
	III	N	943	17.648	43.665	62.257
		%	1,5	28,3	70,1	100,0
	IV	N	5.591	33.749	121.052	160.392
		%	3,5	21,0	75,5	100,0
	V	N	1.376	6.944	29.112	37.432
		%	3,7	18,6	77,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 67. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social

		Mucho	Algo	Nada	Total		
Hombres	45-64	Total	N 8.462	60.567	233.339	302.368	
			% 2,8	20,0	77,2	100,0	
		I	N 621	6.861	30.425	37.907	
			% 1,6	18,1	80,3	100,0	
		II	N 252	4.929	18.238	23.419	
			% 1,1	21,0	77,9	100,0	
		III	N 1.344	12.849	52.129	66.322	
			% 2,0	19,4	78,6	100,0	
		IV	N 5.145	30.627	114.842	150.614	
			% 3,4	20,3	76,2	100,0	
		V	N 1.100	5.302	17.704	24.106	
			% 4,6	22,0	73,4	100,0	
		65-74	Total	N 2.916	19.136	73.681	95.733
			% 3,0	20,0	77,0	100,0	
		I	N 333	2.114	11.306	13.753	
			% 2,4	15,4	82,2	100,0	
		II	N 203	1.844	4.815	6.862	
			% 3,0	26,9	70,2	100,0	
	III	N 1.186	4.557	16.033	21.777		
		% 5,4	20,9	73,6	100,0		
	IV	N 1.193	8.164	38.396	47.753		
		% 2,5	17,1	80,4	100,0		
	V	N .	2.457	3.131	5.588		
		% .	44,0	56,0	100,0		
	>=75	Total	N 1.684	15.142	68.727	85.553	
		% 2,0	17,7	80,3	100,0		
	I	N .	516	3.147	3.663		
		% .	14,1	85,9	100,0		
	II	N .	411	4.029	4.440		
		% .	9,3	90,7	100,0		
	III	N 459	4.174	16.537	21.169		
		% 2,2	19,7	78,1	100,0		
	IV	N 1.225	8.092	39.493	48.810		
		% 2,5	16,6	80,9	100,0		
	V	N .	1.948	5.522	7.470		
		% .	26,1	73,9	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 67. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	Total	Total	N 29.201	199.714	744.577	973.492
			% 3,0	20,5	76,5	100,0
	I	N	3.289	18.783	82.766	104.838
		%	3,1	17,9	78,9	100,0
	II	N	3.974	17.369	73.686	95.028
		%	4,2	18,3	77,5	100,0
	III	N	7.412	48.027	186.668	242.107
		%	3,1	19,8	77,1	100,0
	IV	N	7.740	78.856	273.846	360.441
		%	2,1	21,9	76,0	100,0
	V	N	6.788	36.679	127.611	171.077
		%	4,0	21,4	74,6	100,0
	15-24	Total	N 1.714	15.720	71.099	88.533
		%	1,9	17,8	80,3	100,0
	I	N	596	2.827	11.139	14.562
		%	4,1	19,4	76,5	100,0
	II	N	625	2.450	10.422	13.497
		%	4,6	18,2	77,2	100,0
	III	N	.	3.848	16.221	20.069
		%	.	19,2	80,8	100,0
	IV	N	494	5.222	25.898	31.614
		%	1,6	16,5	81,9	100,0
	V	N	.	1.372	7.420	8.792
		%	.	15,6	84,4	100,0
	25-44	Total	N 13.022	62.773	244.536	320.330
		%	4,1	19,6	76,3	100,0
	I	N	1.430	7.338	36.318	45.086
		%	3,2	16,3	80,6	100,0
	II	N	1.878	5.964	29.381	37.223
		%	5,0	16,0	78,9	100,0
	III	N	3.867	14.386	63.777	82.029
		%	4,7	17,5	77,7	100,0
	IV	N	2.912	26.723	81.090	110.725
		%	2,6	24,1	73,2	100,0
	V	N	2.935	8.361	33.970	45.267
		%	6,5	18,5	75,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 67. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	45-64	Total	N 8.343	71.146	234.109	313.598
			% 2,7	22,7	74,7	100,0
		I	N 768	6.371	24.978	32.116
			% 2,4	19,8	77,8	100,0
		II	N 442	5.613	20.737	26.792
			% 1,6	21,0	77,4	100,0
		III	N 3.102	19.603	65.936	88.641
			% 3,5	22,1	74,4	100,0
		IV	N 1.349	22.089	80.664	104.102
			% 1,3	21,2	77,5	100,0
		V	N 2.682	17.471	41.793	61.946
			% 4,3	28,2	67,5	100,0
	65-74	Total	N 3.184	24.799	81.786	109.770
			% 2,9	22,6	74,5	100,0
		I	N 322	1.460	5.417	7.199
			% 4,5	20,3	75,2	100,0
		II	N 485	1.612	5.128	7.225
			% 6,7	22,3	71,0	100,0
		III	N 443	5.911	16.545	22.899
			% 1,9	25,8	72,3	100,0
		IV	N 1.390	11.998	36.746	50.134
			% 2,8	23,9	73,3	100,0
		V	N 544	3.818	17.950	22.312
			% 2,4	17,1	80,4	100,0
	>=75	Total	N 2.939	25.275	113.047	141.261
			% 2,1	17,9	80,0	100,0
		I	N 174	787	4.915	5.875
			% 3,0	13,4	83,7	100,0
		II	N 545	1.729	8.018	10.292
			% 5,3	16,8	77,9	100,0
		III	N .	4.279	24.189	28.468
			% .	15,0	85,0	100,0
		IV	N 1.595	12.824	49.447	63.866
			% 2,5	20,1	77,4	100,0
		V	N 626	5.657	26.478	32.760
			% 1,9	17,3	80,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 67. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social

			Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	Total	Total N	52.682	380.528	1.454.147	1.887.356
		%	2,8	20,2	77,0	100,0
	I	N	4.863	35.993	177.672	218.528
		%	2,2	16,5	81,3	100,0
	II	N	5.396	30.162	137.675	173.234
		%	3,1	17,4	79,5	100,0
	III	N	11.343	90.830	328.289	430.462
		%	2,6	21,1	76,3	100,0
	IV	N	21.624	166.983	622.140	810.747
		%	2,7	20,6	76,7	100,0
	V	N	9.455	56.560	188.370	254.385
		%	3,7	22,2	74,0	100,0
	15-24 Total	N	2.967	32.173	147.293	182.434
		%	1,6	17,6	80,7	100,0
	I	N	927	3.532	24.737	29.196
		%	3,2	12,1	84,7	100,0
	II	N	625	3.900	19.960	24.485
		%	2,6	15,9	81,5	100,0
	III	N	.	7.422	29.478	36.900
		%	.	20,1	79,9	100,0
	IV	N	1.224	12.717	60.410	74.351
		%	1,6	17,1	81,2	100,0
	V	N	192	4.602	12.709	17.503
		%	1,1	26,3	72,6	100,0
	25-44 Total	N	22.187	132.289	502.164	656.640
		%	3,4	20,1	76,5	100,0
	I	N	1.719	14.352	72.747	88.818
		%	1,9	16,2	81,9	100,0
	II	N	2.845	10.124	56.750	69.719
		%	4,1	14,5	81,4	100,0
	III	N	4.810	32.035	107.442	144.286
		%	3,3	22,2	74,5	100,0
	IV	N	8.503	60.472	202.143	271.117
		%	3,1	22,3	74,6	100,0
	V	N	4.311	15.305	63.082	82.699
		%	5,2	18,5	76,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 67. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	45-64	Total	N	16.804	131.713	467.448	615.965
			%	2,7	21,4	75,9	100,0
		I	N	1.389	13.231	55.404	70.023
			%	2,0	18,9	79,1	100,0
		II	N	694	10.542	38.976	50.212
			%	1,4	21,0	77,6	100,0
		III	N	4.445	32.452	118.065	154.963
			%	2,9	20,9	76,2	100,0
		IV	N	6.494	52.716	195.506	254.716
			%	2,5	20,7	76,8	100,0
		V	N	3.782	22.772	59.498	86.052
			%	4,4	26,5	69,1	100,0
	65-74	Total	N	6.100	43.935	155.467	205.503
			%	3,0	21,4	75,7	100,0
		I	N	655	3.574	16.723	20.952
			%	3,1	17,1	79,8	100,0
		II	N	688	3.456	9.943	14.087
			%	4,9	24,5	70,6	100,0
		III	N	1.630	10.468	32.578	44.676
			%	3,6	23,4	72,9	100,0
		IV	N	2.583	20.162	75.142	97.887
			%	2,6	20,6	76,8	100,0
		V	N	544	6.275	21.081	27.901
			%	2,0	22,5	75,6	100,0
	>=75	Total	N	4.622	40.417	181.774	226.814
			%	2,0	17,8	80,1	100,0
		I	N	174	1.303	8.062	9.538
			%	1,8	13,7	84,5	100,0
		II	N	545	2.140	12.047	14.731
			%	3,7	14,5	81,8	100,0
		III	N	459	8.453	40.726	49.638
			%	0,9	17,0	82,0	100,0
		IV	N	2.820	20.916	88.940	112.676
			%	2,5	18,6	78,9	100,0
		V	N	626	7.605	32.000	40.231
			%	1,6	18,9	79,5	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 68. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y nivel de estudios*

			Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres Total	Total	N	23.480	181.003	710.641	915.124
		%	2,6	19,8	77,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	5.113	33.923	171.563	210.600
		%	2,4	16,1	81,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	4.649	41.199	121.607	167.454
		%	2,8	24,6	72,6	100,0
	Secundaria, superior	N	9.872	73.686	277.112	360.670
		%	2,7	20,4	76,8	100,0
	Terciaria	N	3.846	32.195	140.359	176.400
		%	2,2	18,3	79,6	100,0
15-24	Total	N	1.253	16.453	76.753	94.458
		%	1,3	17,4	81,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	561	9.357	9.918
		%	.	5,7	94,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	533	8.215	22.380	31.129
		%	1,7	26,4	71,9	100,0
	Secundaria, superior	N	388	5.739	36.712	42.840
		%	0,9	13,4	85,7	100,0
	Terciaria	N	331	1.937	8.303	10.572
		%	3,1	18,3	78,5	100,0
25-44	Total	N	9.165	69.516	257.628	336.309
		%	2,7	20,7	76,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	427	7.714	29.634	37.776
		%	1,1	20,4	78,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.867	11.678	38.264	52.808
		%	5,4	22,1	72,5	100,0
	Secundaria, superior	N	4.859	35.950	123.466	164.274
		%	3,0	21,9	75,2	100,0
	Terciaria	N	1.013	14.174	66.264	81.451
		%	1,2	17,4	81,4	100,0
45-64	Total	N	8.462	60.756	233.438	302.655
		%	2,8	20,1	77,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.602	10.498	57.300	70.400
		%	3,7	14,9	81,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.248	15.167	36.829	53.244
		%	2,3	28,5	69,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 68. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	2.722	24.214	90.194	117.130	
			%	2,3	20,7	77,0	100,0	
		Terciaria	N	1.890	10.877	49.114	61.881	
	%		3,1	17,6	79,4	100,0		
		65-74	Total	N	2.916	19.136	73.681	95.733
			%	3,0	20,0	77,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	859	7.640	29.518	38.017	
	%		2,3	20,1	77,6	100,0		
		Secundaria, inferior	N	.	2.579	13.712	16.291	
	%		.	15,8	84,2	100,0		
		Secundaria, superior	N	1.444	5.364	19.140	25.948	
	%		5,6	20,7	73,8	100,0		
		Terciaria	N	613	3.554	11.311	15.477	
	%		4,0	23,0	73,1	100,0		
		>=75	Total	N	1.684	15.142	69.142	85.968
			%	2,0	17,6	80,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	1.225	7.510	45.754	54.489	
	%		2,2	13,8	84,0	100,0		
		Secundaria, inferior	N	.	3.560	10.421	13.981	
	%		.	25,5	74,5	100,0		
		Secundaria, superior	N	459	2.419	7.600	10.478	
	%		4,4	23,1	72,5	100,0		
		Terciaria	N	.	1.652	5.367	7.020	
	%		.	23,5	76,5	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	29.201	200.450	746.231	975.882	
		%	3,0	20,5	76,5	100,0		
		Sin estudios, primaria	N	6.208	57.365	214.754	278.327	
	%		2,2	20,6	77,2	100,0		
		Secundaria, inferior	N	4.761	39.896	125.110	169.766	
	%		2,8	23,5	73,7	100,0		
		Secundaria, superior	N	10.960	65.956	230.951	307.866	
	%		3,6	21,4	75,0	100,0		
		Terciaria	N	7.273	37.233	175.417	219.923	
	%		3,3	16,9	79,8	100,0		
	Total	N	1.714	15.928	71.857	89.499		
	%	1,9	17,8	80,3	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 68. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	280	2.605	8.500	11.386
			%	2,5	22,9	74,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	298	1.042	15.423	16.763
			%	1,8	6,2	92,0	100,0
		Secundaria, superior	N	757	9.459	35.227	45.443
			%	1,7	20,8	77,5	100,0
		Terciaria	N	379	2.821	12.707	15.907
			%	2,4	17,7	79,9	100,0
	25-44	Total	N	13.022	62.999	244.806	320.826
			%	4,1	19,6	76,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	881	5.812	19.296	25.990
			%	3,4	22,4	74,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.601	11.387	25.949	38.937
			%	4,1	29,2	66,6	100,0
		Secundaria, superior	N	5.641	26.753	98.093	130.487
			%	4,3	20,5	75,2	100,0
		Terciaria	N	4.898	19.046	101.467	125.412
			%	3,9	15,2	80,9	100,0
	45-64	Total	N	8.343	71.146	234.280	313.769
			%	2,7	22,7	74,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.886	16.978	59.099	77.963
			%	2,4	21,8	75,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	910	17.258	43.567	61.735
			%	1,5	28,0	70,6	100,0
		Secundaria, superior	N	3.988	24.780	81.554	110.322
			%	3,6	22,5	73,9	100,0
		Terciaria	N	1.559	12.130	50.060	63.749
			%	2,4	19,0	78,5	100,0
	65-74	Total	N	3.184	24.799	81.942	109.925
			%	2,9	22,6	74,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.238	14.910	45.704	61.852
			%	2,0	24,1	73,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.139	4.591	21.722	27.452
			%	4,1	16,7	79,1	100,0
		Secundaria, superior	N	371	3.489	8.033	11.893
			%	3,1	29,3	67,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 68. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	65-74	Terciaria	N	436	1.808	6.482	8.727
			%	5,0	20,7	74,3	100,0
	>=75	Total	N	2.939	25.579	113.347	141.864
			%	2,1	18,0	79,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.923	17.059	82.154	101.136
			%	1,9	16,9	81,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	813	5.618	18.448	24.879
			%	3,3	22,6	74,1	100,0
		Secundaria, superior	N	202	1.474	8.044	9.720
			%	2,1	15,2	82,8	100,0
		Terciaria	N	.	1.428	4.701	6.129
			%	.	23,3	76,7	100,0
Ambos	Total	Total	N	52.682	381.452	1.456.873	1.891.006
			%	2,8	20,2	77,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	11.322	91.288	386.317	488.927
			%	2,3	18,7	79,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	9.409	81.095	246.716	337.220
			%	2,8	24,0	73,2	100,0
		Secundaria, superior	N	20.831	139.642	508.063	668.536
			%	3,1	20,9	76,0	100,0
		Terciaria	N	11.119	69.427	315.776	396.323
			%	2,8	17,5	79,7	100,0
	15-24	Total	N	2.967	32.380	148.610	183.958
			%	1,6	17,6	80,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	280	3.166	17.858	21.304	
		%	1,3	14,9	83,8	100,0	
	Secundaria, inferior	N	831	9.257	37.804	47.891	
		%	1,7	19,3	78,9	100,0	
	Secundaria, superior	N	1.145	15.199	71.939	88.283	
		%	1,3	17,2	81,5	100,0	
	Terciaria	N	711	4.758	21.010	26.479	
		%	2,7	18,0	79,3	100,0	
25-44	Total	N	22.187	132.514	502.433	657.135	
		%	3,4	20,2	76,5	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.308	13.527	48.930	63.765	
		%	2,1	21,2	76,7	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 68. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	4.468	23.064	64.213	91.745
			%	4,9	25,1	70,0	100,0
		Secundaria, superior	N	10.500	62.703	221.559	294.762
			%	3,6	21,3	75,2	100,0
		Terciaria	N	5.911	33.220	167.731	206.862
			%	2,9	16,1	81,1	100,0
	45-64	Total	N	16.804	131.902	467.718	616.424
			%	2,7	21,4	75,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.488	27.476	116.399	148.363
			%	3,0	18,5	78,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.159	32.424	80.396	114.979
			%	1,9	28,2	69,9	100,0
		Secundaria, superior	N	6.709	48.994	171.749	227.452
			%	2,9	21,5	75,5	100,0
		Terciaria	N	3.448	23.007	99.174	125.630
			%	2,7	18,3	78,9	100,0
	65-74	Total	N	6.100	43.935	155.623	205.658
			%	3,0	21,4	75,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.097	22.550	75.222	99.869
			%	2,1	22,6	75,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.139	7.171	35.434	43.744
			%	2,6	16,4	81,0	100,0
		Secundaria, superior	N	1.815	8.853	27.173	37.841
			%	4,8	23,4	71,8	100,0
		Terciaria	N	1.049	5.361	17.793	24.204
			%	4,3	22,2	73,5	100,0
	>=75	Total	N	4.622	40.721	182.489	227.832
			%	2,0	17,9	80,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.148	24.569	127.908	155.625
			%	2,0	15,8	82,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	813	9.179	28.869	38.860
			%	2,1	23,6	74,3	100,0
		Secundaria, superior	N	661	3.893	15.644	20.198
			%	3,3	19,3	77,5	100,0
		Terciaria	N	.	3.080	10.068	13.149
			%	.	23,4	76,6	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 69. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	Total	CAPV	N	463.117	358.884	59.688	33.435	915.124
			%	50,6	39,2	6,5	3,7	100,0
		Araba	N	64.002	46.415	13.786	9.548	133.751
			%	47,9	34,7	10,3	7,1	100,0
		Gipuzkoa	N	163.251	115.463	10.688	4.409	293.812
			%	55,6	39,3	3,6	1,5	100,0
		Bizkaia	N	235.863	197.006	35.214	19.478	487.561
			%	48,4	40,4	7,2	4,0	100,0
	15-24	CAPV	N	42.175	43.211	4.897	4.176	94.458
			%	44,6	45,7	5,2	4,4	100,0
		Araba	N	7.504	6.022	591	752	14.869
			%	50,5	40,5	4,0	5,1	100,0
		Gipuzkoa	N	17.012	13.235	492	566	31.305
			%	54,3	42,3	1,6	1,8	100,0
		Bizkaia	N	17.660	23.954	3.814	2.857	48.284
			%	36,6	49,6	7,9	5,9	100,0
	25-44	CAPV	N	155.840	140.699	27.738	12.032	336.309
			%	46,3	41,8	8,2	3,6	100,0
		Araba	N	20.943	19.643	7.244	4.231	52.062
			%	40,2	37,7	13,9	8,1	100,0
		Gipuzkoa	N	58.068	41.132	6.208	1.382	106.790
			%	54,4	38,5	5,8	1,3	100,0
		Bizkaia	N	76.829	79.923	14.286	6.419	177.458
			%	43,3	45,0	8,1	3,6	100,0
	45-64	CAPV	N	158.064	117.278	18.761	8.553	302.655
			%	52,2	38,7	6,2	2,8	100,0
		Araba	N	21.306	14.105	4.512	2.829	42.751
			%	49,8	33,0	10,6	6,6	100,0
		Gipuzkoa	N	49.996	43.071	2.666	1.685	97.419
			%	51,3	44,2	2,7	1,7	100,0
		Bizkaia	N	86.762	60.102	11.582	4.039	162.485
			%	53,4	37,0	7,1	2,5	100,0
	65-74	CAPV	N	53.920	33.099	3.619	5.095	95.733
			%	56,3	34,6	3,8	5,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 69. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y territorio histórico

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Hombres 65-74	Araba	N	6.941	4.216	795	1.211	13.163	
		%	52,7	32,0	6,0	9,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	21.126	9.884	788	333	32.130	
		%	65,8	30,8	2,5	1,0	100,0	
	Bizkaia	N	25.853	18.999	2.036	3.551	50.440	
		%	51,3	37,7	4,0	7,0	100,0	
	>=75	CAPV	N	53.117	24.596	4.674	3.580	85.968
			%	61,8	28,6	5,4	4,2	100,0
		Araba	N	7.308	2.428	644	524	10.905
			%	67,0	22,3	5,9	4,8	100,0
		Gipuzkoa	N	17.050	8.141	534	444	26.168
			%	65,2	31,1	2,0	1,7	100,0
Bizkaia		N	28.760	14.028	3.496	2.612	48.895	
		%	58,8	28,7	7,1	5,3	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N 504.513	373.973	62.938	34.458	975.882
			%	51,7	38,3	6,4	3,5	100,0
		Araba	N	69.607	48.336	11.621	7.208	136.772
			%	50,9	35,3	8,5	5,3	100,0
	Gipuzkoa	N	179.445	111.976	18.406	2.859	312.686	
		%	57,4	35,8	5,9	0,9	100,0	
	Bizkaia	N	255.462	213.662	32.911	24.390	526.425	
		%	48,5	40,6	6,3	4,6	100,0	
	15-24	CAPV	N	38.506	40.290	7.769	2.934	89.499
			%	43,0	45,0	8,7	3,3	100,0
		Araba	N	7.156	4.285	700	1.069	13.210
			%	54,2	32,4	5,3	8,1	100,0
Gipuzkoa		N	15.174	11.230	3.039	.	29.443	
		%	51,5	38,1	10,3	.	100,0	
Bizkaia		N	16.176	24.775	4.030	1.865	46.846	
		%	34,5	52,9	8,6	4,0	100,0	
25-44		CAPV	N	149.587	133.896	25.622	11.720	320.826
			%	46,6	41,7	8,0	3,7	100,0
		Araba	N	21.304	18.507	5.682	2.376	47.869
			%	44,5	38,7	11,9	5,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 69. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y territorio histórico

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N 53.429	40.949	6.620	907	101.905
			% 52,4	40,2	6,5	0,9	100,0
		Bizkaia	N 74.854	74.441	13.320	8.437	171.052
			% 43,8	43,5	7,8	4,9	100,0
	45-64	CAPV	N 168.348	116.172	18.007	11.242	313.769
			% 53,7	37,0	5,7	3,6	100,0
		Araba	N 24.287	14.436	3.289	2.251	44.263
			% 54,9	32,6	7,4	5,1	100,0
		Gipuzkoa	N 56.767	37.135	4.997	762	99.662
			% 57,0	37,3	5,0	0,8	100,0
		Bizkaia	N 87.293	64.601	9.721	8.229	169.843
			% 51,4	38,0	5,7	4,8	100,0
	65-74	CAPV	N 64.104	35.351	5.264	5.206	109.925
			% 58,3	32,2	4,8	4,7	100,0
		Araba	N 8.106	4.836	617	761	14.320
			% 56,6	33,8	4,3	5,3	100,0
		Gipuzkoa	N 23.651	9.622	2.000	848	36.120
			% 65,5	26,6	5,5	2,3	100,0
		Bizkaia	N 32.347	20.892	2.647	3.598	59.484
			% 54,4	35,1	4,5	6,0	100,0
	>=75	CAPV	N 83.968	48.264	6.277	3.356	141.864
			% 59,2	34,0	4,4	2,4	100,0
		Araba	N 8.753	6.272	1.334	751	17.110
			% 51,2	36,7	7,8	4,4	100,0
		Gipuzkoa	N 30.423	13.039	1.749	343	45.555
			% 66,8	28,6	3,8	0,8	100,0
		Bizkaia	N 44.792	28.953	3.193	2.261	79.200
			% 56,6	36,6	4,0	2,9	100,0
Ambos	Total	CAPV	N 967.630	732.857	122.627	67.893	1.891.006
			% 51,2	38,8	6,5	3,6	100,0
		Araba	N 133.609	94.750	25.408	16.756	270.523
			% 49,4	35,0	9,4	6,2	100,0
		Gipuzkoa	N 342.696	227.439	29.093	7.269	606.497
			% 56,5	37,5	4,8	1,2	100,0
		Bizkaia	N 491.325	410.668	68.126	43.868	1.013.987

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 69. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	Total	Bizkaia	%	48,5	40,5	6,7	4,3	100,0
	15-24	CAPV	N	80.681	83.501	12.665	7.110	183.958
			%	43,9	45,4	6,9	3,9	100,0
		Araba	N	14.660	10.307	1.290	1.822	28.079
			%	52,2	36,7	4,6	6,5	100,0
		Gipuzkoa	N	32.186	24.465	3.531	566	60.748
			%	53,0	40,3	5,8	0,9	100,0
		Bizkaia	N	33.836	48.729	7.844	4.722	95.130
			%	35,6	51,2	8,2	5,0	100,0
	25-44	CAPV	N	305.427	274.595	53.360	23.752	657.135
			%	46,5	41,8	8,1	3,6	100,0
		Araba	N	42.247	38.150	12.926	6.607	99.930
			%	42,3	38,2	12,9	6,6	100,0
		Gipuzkoa	N	111.497	82.081	12.828	2.288	208.695
			%	53,4	39,3	6,1	1,1	100,0
		Bizkaia	N	151.683	154.364	27.606	14.856	348.509
			%	43,5	44,3	7,9	4,3	100,0
	45-64	CAPV	N	326.412	233.450	36.767	19.795	616.424
			%	53,0	37,9	6,0	3,2	100,0
		Araba	N	45.593	28.540	7.801	5.080	87.015
			%	52,4	32,8	9,0	5,8	100,0
		Gipuzkoa	N	106.764	80.207	7.664	2.447	197.081
			%	54,2	40,7	3,9	1,2	100,0
		Bizkaia	N	174.055	124.703	21.303	12.268	332.328
			%	52,4	37,5	6,4	3,7	100,0
	65-74	CAPV	N	118.023	68.450	8.883	10.301	205.658
			%	57,4	33,3	4,3	5,0	100,0
		Araba	N	15.047	9.052	1.412	1.972	27.483
			%	54,7	32,9	5,1	7,2	100,0
		Gipuzkoa	N	44.777	19.506	2.788	1.180	68.251
			%	65,6	28,6	4,1	1,7	100,0
		Bizkaia	N	58.200	39.892	4.683	7.149	109.924
			%	52,9	36,3	4,3	6,5	100,0
	>=75	CAPV	N	137.086	72.860	10.950	6.936	227.832
			%	60,2	32,0	4,8	3,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 69. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	>=75	Araba	N	16.061	8.700	1.978	1.275	28.015
			%	57,3	31,1	7,1	4,6	100,0
	Gipuzkoa	N	47.473	21.179	2.283	787	71.723	
		%	66,2	29,5	3,2	1,1	100,0	
	Bizkaia	N	73.551	42.981	6.689	4.873	128.094	
		%	57,4	33,6	5,2	3,8	100,0	

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 70. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

		Muy de acuerdo		En desacuerdo		Muy en desacuerdo		Total	
Hombres	Total	Total	N 462.720	N 358.435	N 59.688	N 33.020	N 913.863		
			% 50,6	% 39,2	% 6,5	% 3,6	% 100,0		
	I	N	62.241	39.097	7.945	4.406	113.690		
			% 54,7	% 34,4	% 7,0	% 3,9	% 100,0		
	II	N	40.884	30.469	4.745	2.108	78.206		
			% 52,3	% 39,0	% 6,1	% 2,7	% 100,0		
	III	N	103.827	70.484	9.641	4.402	188.355		
			% 55,1	% 37,4	% 5,1	% 2,3	% 100,0		
	IV	N	218.626	184.026	30.516	17.138	450.306		
			% 48,6	% 40,9	% 6,8	% 3,8	% 100,0		
	V	N	37.142	34.358	6.841	4.966	83.307		
			% 44,6	% 41,2	% 8,2	% 6,0	% 100,0		
	15-24	Total	N 41.877	N 42.951	N 4.897	N 4.176	N 93.900		
			% 44,6	% 45,7	% 5,2	% 4,4	% 100,0		
	I	N	9.075	4.447	590	522	14.634		
			% 62,0	% 30,4	% 4,0	% 3,6	% 100,0		
	II	N	4.687	4.683	1.156	463	10.988		
			% 42,7	% 42,6	% 10,5	% 4,2	% 100,0		
	III	N	7.216	9.084	530	.	16.830		
			% 42,9	% 54,0	% 3,2	% .	% 100,0		
	IV	N	17.191	20.445	2.371	2.730	42.737		
			% 40,2	% 47,8	% 5,5	% 6,4	% 100,0		
	V	N	3.709	4.291	249	462	8.711		
			% 42,6	% 49,3	% 2,9	% 5,3	% 100,0		
	25-44	Total	N 155.840	N 140.699	N 27.738	N 12.032	N 336.309		
			% 46,3	% 41,8	% 8,2	% 3,6	% 100,0		
	I	N	18.947	17.951	4.364	2.470	43.732		
			% 43,3	% 41,0	% 10,0	% 5,6	% 100,0		
	II	N	17.714	12.379	2.223	181	32.496		
			% 54,5	% 38,1	% 6,8	% 0,6	% 100,0		
	III	N	29.215	25.356	5.519	2.167	62.257		
			% 46,9	% 40,7	% 8,9	% 3,5	% 100,0		
	IV	N	71.880	70.250	12.807	5.455	160.392		
			% 44,8	% 43,8	% 8,0	% 3,4	% 100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 70. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	25-44 V	N	18.084	14.763	2.826	1.758	37.432
		%	48,3	39,4	7,6	4,7	100,0
45-64	Total	N	157.965	117.089	18.761	8.553	302.368
		%	52,2	38,7	6,2	2,8	100,0
I		N	22.401	11.817	2.852	837	37.907
		%	59,1	31,2	7,5	2,2	100,0
II		N	12.152	9.442	1.100	724	23.419
		%	51,9	40,3	4,7	3,1	100,0
III		N	39.060	24.143	1.902	1.216	66.322
		%	58,9	36,4	2,9	1,8	100,0
IV		N	74.516	61.274	10.064	4.760	150.614
		%	49,5	40,7	6,7	3,2	100,0
V		N	9.836	10.413	2.842	1.015	24.106
		%	40,8	43,2	11,8	4,2	100,0
65-74	Total	N	53.920	33.099	3.619	5.095	95.733
		%	56,3	34,6	3,8	5,3	100,0
I		N	9.493	3.814	139	306	13.753
		%	69,0	27,7	1,0	2,2	100,0
II		N	3.497	2.479	146	740	6.862
		%	51,0	36,1	2,1	10,8	100,0
III		N	15.320	4.983	1.224	250	21.777
		%	70,3	22,9	5,6	1,1	100,0
IV		N	24.265	18.590	2.040	2.858	47.753
		%	50,8	38,9	4,3	6,0	100,0
V		N	1.344	3.234	70	941	5.588
		%	24,0	57,9	1,3	16,8	100,0
>=75	Total	N	53.117	24.596	4.674	3.165	85.553
		%	62,1	28,8	5,5	3,7	100,0
I		N	2.325	1.067	.	271	3.663
		%	63,5	29,1	.	7,4	100,0
II		N	2.833	1.486	120	.	4.440
		%	63,8	33,5	2,7	.	100,0
III		N	13.017	6.919	466	768	21.169
		%	61,5	32,7	2,2	3,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 70. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Hombres	>=75	IV	N 30.773	13.467	3.234	1.335	48.810	
			% 63,0	27,6	6,6	2,7	100,0	
		V	N 4.169	1.657	854	790	7.470	
			% 55,8	22,2	11,4	10,6	100,0	
Mujeres	Total	Total	N 503.284	372.812	62.938	34.458	973.492	
			% 51,7	38,3	6,5	3,5	100,0	
	I	N	59.069	36.616	6.753	2.400	104.838	
		%	56,3	34,9	6,4	2,3	100,0	
	II	N	55.361	32.538	3.019	4.110	95.028	
		%	58,3	34,2	3,2	4,3	100,0	
	III	N	123.659	96.975	13.085	8.388	242.107	
		%	51,1	40,1	5,4	3,5	100,0	
	IV	N	176.252	143.876	27.766	12.547	360.441	
		%	48,9	39,9	7,7	3,5	100,0	
	V	N	88.944	62.806	12.316	7.012	171.077	
		%	52,0	36,7	7,2	4,1	100,0	
	15-24	Total	N	38.003	39.827	7.769	2.934	88.533
			%	42,9	45,0	8,8	3,3	100,0
		I	N	5.730	7.323	1.509	.	14.562
			%	39,3	50,3	10,4	.	100,0
		II	N	8.340	4.260	.	897	13.497
			%	61,8	31,6	.	6,6	100,0
		III	N	8.123	9.032	2.500	414	20.069
			%	40,5	45,0	12,5	2,1	100,0
		IV	N	10.778	16.854	2.615	1.367	31.614
			%	34,1	53,3	8,3	4,3	100,0
	V	N	5.032	2.358	1.145	256	8.792	
		%	57,2	26,8	13,0	2,9	100,0	
25-44	Total	N	149.318	133.671	25.622	11.720	320.330	
		%	46,6	41,7	8,0	3,7	100,0	
	I	N	24.687	16.058	3.435	907	45.086	
		%	54,8	35,6	7,6	2,0	100,0	
	II	N	18.641	14.408	1.705	2.469	37.223	
		%	50,1	38,7	4,6	6,6	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 70. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Mujeres	25-44	III	N	37.263	37.898	3.759	3.109	82.029
			%	45,4	46,2	4,6	3,8	100,0
		IV	N	48.689	46.519	12.380	3.137	110.725
			%	44,0	42,0	11,2	2,8	100,0
		V	N	20.038	18.788	4.343	2.098	45.267
			%	44,3	41,5	9,6	4,6	100,0
	45-64	Total	N	168.348	116.001	18.007	11.242	313.598
			%	53,7	37,0	5,7	3,6	100,0
	I	N	19.053	10.546	1.423	1.094	32.116	
		%	59,3	32,8	4,4	3,4	100,0	
	II	N	16.464	9.112	610	607	26.792	
		%	61,5	34,0	2,3	2,3	100,0	
	III	N	46.568	34.261	4.594	3.218	88.641	
		%	52,5	38,7	5,2	3,6	100,0	
	IV	N	54.724	38.716	6.909	3.753	104.102	
		%	52,6	37,2	6,6	3,6	100,0	
	V	N	31.539	23.366	4.471	2.570	61.946	
		%	50,9	37,7	7,2	4,1	100,0	
	65-74	Total	N	63.949	35.351	5.264	5.206	109.770
			%	58,3	32,2	4,8	4,7	100,0
	I	N	5.088	1.499	387	225	7.199	
		%	70,7	20,8	5,4	3,1	100,0	
	II	N	4.128	2.639	319	138	7.225	
		%	57,1	36,5	4,4	1,9	100,0	
III	N	14.699	6.069	986	1.145	22.899		
	%	64,2	26,5	4,3	5,0	100,0		
IV	N	25.106	19.512	2.382	3.134	50.134		
	%	50,1	38,9	4,8	6,3	100,0		
V	N	14.928	5.632	1.189	563	22.312		
	%	66,9	25,2	5,3	2,5	100,0		
>=75	Total	N	83.667	47.962	6.277	3.356	141.261	
		%	59,2	34,0	4,4	2,4	100,0	
I	N	4.511	1.190	.	174	5.875		
	%	76,8	20,3	.	3,0	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 70. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Mujeres	>=75	II	N 7.788	2.119	384	.	10.292	
			% 75,7	20,6	3,7	.	100,0	
		III	N 17.006	9.715	1.245	502	28.468	
			% 59,7	34,1	4,4	1,8	100,0	
		IV	N 36.955	22.275	3.480	1.156	63.866	
			% 57,9	34,9	5,4	1,8	100,0	
		V	N 17.406	12.662	1.167	1.525	32.760	
		% 53,1	38,7	3,6	4,7	100,0		
	Ambos	Total	Total	N 966.004	731.247	122.627	67.478	1.887.356
				% 51,2	38,7	6,5	3,6	100,0
			I	N 121.309	75.714	14.699	6.806	218.528
			% 55,5	34,6	6,7	3,1	100,0	
		II	N 96.245	63.007	7.764	6.218	173.234	
		% 55,6	36,4	4,5	3,6	100,0		
		III	N 227.486	167.460	22.726	12.791	430.462	
		% 52,8	38,9	5,3	3,0	100,0		
		IV	N 394.878	327.902	58.282	29.685	810.747	
		% 48,7	40,4	7,2	3,7	100,0		
		V	N 126.085	97.164	19.157	11.978	254.385	
		% 49,6	38,2	7,5	4,7	100,0		
		15-24 Total	N 79.881	82.778	12.665	7.110	182.434	
		% 43,8	45,4	6,9	3,9	100,0		
		I	N 14.805	11.771	2.099	522	29.196	
		% 50,7	40,3	7,2	1,8	100,0		
		II	N 13.026	8.943	1.156	1.360	24.485	
		% 53,2	36,5	4,7	5,6	100,0		
		III	N 15.339	18.115	3.031	414	36.900	
		% 41,6	49,1	8,2	1,1	100,0		
		IV	N 27.968	37.299	4.986	4.097	74.351	
		% 37,6	50,2	6,7	5,5	100,0		
		V	N 8.741	6.650	1.394	718	17.503	
		% 49,9	38,0	8,0	4,1	100,0		
	25-44 Total	N 305.158	274.370	53.360	23.752	656.640		
	% 46,5	41,8	8,1	3,6	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 70. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	25-44	I	N 43.634	34.008	7.799	3.377	88.818
			% 49,1	38,3	8,8	3,8	100,0
		II	N 36.355	26.787	3.928	2.649	69.719
			% 52,1	38,4	5,6	3,8	100,0
		III	N 66.477	63.254	9.278	5.276	144.286
			% 46,1	43,8	6,4	3,7	100,0
		IV	N 120.569	116.769	25.186	8.593	271.117
			% 44,5	43,1	9,3	3,2	100,0
		V	N 38.122	33.551	7.170	3.856	82.699
			% 46,1	40,6	8,7	4,7	100,0
	45-64	Total	N 326.313	233.090	36.767	19.795	615.965
			% 53,0	37,8	6,0	3,2	100,0
		I	N 41.454	22.363	4.275	1.931	70.023
			% 59,2	31,9	6,1	2,8	100,0
		II	N 28.616	18.555	1.710	1.331	50.212
			% 57,0	37,0	3,4	2,7	100,0
		III	N 85.628	58.403	6.496	4.435	154.963
			% 55,3	37,7	4,2	2,9	100,0
		IV	N 129.240	99.989	16.973	8.513	254.716
			% 50,7	39,3	6,7	3,3	100,0
		V	N 41.374	33.780	7.313	3.585	86.052
			% 48,1	39,3	8,5	4,2	100,0
	65-74	Total	N 117.868	68.450	8.883	10.301	205.503
			% 57,4	33,3	4,3	5,0	100,0
		I	N 14.581	5.313	526	532	20.952
			% 69,6	25,4	2,5	2,5	100,0
		II	N 7.626	5.117	466	878	14.087
			% 54,1	36,3	3,3	6,2	100,0
		III	N 30.019	11.052	2.210	1.395	44.676
			% 67,2	24,7	4,9	3,1	100,0
		IV	N 49.371	38.102	4.422	5.992	97.887
			% 50,4	38,9	4,5	6,1	100,0
		V	N 16.272	8.866	1.259	1.504	27.901
			% 58,3	31,8	4,5	5,4	100,0
	>=75	Total	N 136.784	72.558	10.950	6.521	226.814

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 70. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Ambos	>=75	Total	%	60,3	32,0	4,8	2,9	100,0
		I	N	6.836	2.258	.	445	9.538
			%	71,7	23,7	.	4,7	100,0
	II	N	10.622	3.605	505	.	14.731	
			%	72,1	24,5	3,4	.	100,0
	III	N	30.022	16.634	1.711	1.270	49.638	
			%	60,5	33,5	3,4	2,6	100,0
	IV	N	67.729	35.742	6.714	2.491	112.676	
			%	60,1	31,7	6,0	2,2	100,0
	V	N	21.576	14.319	2.021	2.315	40.231	
			%	53,6	35,6	5,0	5,8	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 71. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

		Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres Total	Total	N 463.117	358.884	59.688	33.435	915.124
		% 50,6	39,2	6,5	3,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N 105.115	81.813	10.864	12.807	210.600
		% 49,9	38,8	5,2	6,1	100,0
	Secundaria, inferior	N 78.160	74.956	10.887	3.451	167.454
		% 46,7	44,8	6,5	2,1	100,0
	Secundaria, superior	N 178.736	143.649	26.600	11.685	360.670
		% 49,6	39,8	7,4	3,2	100,0
	Terciaria	N 101.105	58.466	11.337	5.492	176.400
		% 57,3	33,1	6,4	3,1	100,0
15-24	Total	N 42.175	43.211	4.897	4.176	94.458
		% 44,6	45,7	5,2	4,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N 4.069	5.271	.	579	9.918
		% 41,0	53,1	.	5,8	100,0
	Secundaria, inferior	N 13.287	15.040	1.755	1.046	31.129
		% 42,7	48,3	5,6	3,4	100,0
	Secundaria, superior	N 19.376	19.579	1.796	2.088	42.840
		% 45,2	45,7	4,2	4,9	100,0
	Terciaria	N 5.443	3.321	1.345	463	10.572
		% 51,5	31,4	12,7	4,4	100,0
25-44	Total	N 155.840	140.699	27.738	12.032	336.309
		% 46,3	41,8	8,2	3,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N 14.844	18.356	2.317	2.259	37.776
		% 39,3	48,6	6,1	6,0	100,0
	Secundaria, inferior	N 20.616	27.426	3.874	892	52.808
		% 39,0	51,9	7,3	1,7	100,0
	Secundaria, superior	N 76.565	66.559	15.258	5.893	164.274
		% 46,6	40,5	9,3	3,6	100,0
	Terciaria	N 43.816	28.358	6.289	2.988	81.451
		% 53,8	34,8	7,7	3,7	100,0
45-64	Total	N 158.064	117.278	18.761	8.553	302.655
		% 52,2	38,7	6,2	2,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N 32.174	30.163	3.801	4.261	70.400
		% 45,7	42,8	5,4	6,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

278

Tabla 71. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres 45-64	Secundaria, inferior	N	27.268	22.303	3.587	86	53.244
		%	51,2	41,9	6,7	0,2	100,0
	Secundaria, superior	N	61.957	44.318	8.004	2.851	117.130
		%	52,9	37,8	6,8	2,4	100,0
	Terciaria	N	36.664	20.494	3.368	1.355	61.881
		%	59,2	33,1	5,4	2,2	100,0
	65-74 Total	N	53.920	33.099	3.619	5.095	95.733
		%	56,3	34,6	3,8	5,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	19.751	13.560	1.500	3.206	38.017
		%	52,0	35,7	3,9	8,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	9.236	5.619	677	760	16.291
		%	56,7	34,5	4,2	4,7	100,0
Secundaria, superior	N	14.670	9.194	1.370	714	25.948	
	%	56,5	35,4	5,3	2,8	100,0	
Terciaria	N	10.263	4.727	71	416	15.477	
	%	66,3	30,5	0,5	2,7	100,0	
>=75 Total	N	53.117	24.596	4.674	3.580	85.968	
	%	61,8	28,6	5,4	4,2	100,0	
Sin estudios, primaria	N	34.277	14.464	3.246	2.502	54.489	
	%	62,9	26,5	6,0	4,6	100,0	
Secundaria, inferior	N	7.754	4.567	994	667	13.981	
	%	55,5	32,7	7,1	4,8	100,0	
Secundaria, superior	N	6.168	3.999	171	140	10.478	
	%	58,9	38,2	1,6	1,3	100,0	
Terciaria	N	4.919	1.566	263	271	7.020	
	%	70,1	22,3	3,8	3,9	100,0	
Mujeres Total	Total	N	504.513	373.973	62.938	34.458	975.882
		%	51,7	38,3	6,4	3,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	150.011	102.832	14.218	11.267	278.327
		%	53,9	36,9	5,1	4,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	80.182	68.444	14.688	6.452	169.766
		%	47,2	40,3	8,7	3,8	100,0
	Secundaria, superior	N	151.727	126.251	22.074	7.815	307.866
		%	49,3	41,0	7,2	2,5	100,0
	Terciaria	N	122.594	76.446	11.959	8.924	219.923

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 71. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	Total	Terciaria	% 55,7	34,8	5,4	4,1	100,0
	15-24	Total	N 38.506	40.290	7.769	2.934	89.499
			% 43,0	45,0	8,7	3,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N 6.783	3.310	1.293	.	11.386
			% 59,6	29,1	11,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	N 7.196	7.764	1.044	758	16.763
			% 42,9	46,3	6,2	4,5	100,0
		Secundaria, superior	N 17.309	22.806	3.532	1.797	45.443
			% 38,1	50,2	7,8	4,0	100,0
		Terciaria	N 7.218	6.410	1.900	379	15.907
			% 45,4	40,3	11,9	2,4	100,0
	25-44	Total	N 149.587	133.896	25.622	11.720	320.826
			% 46,6	41,7	8,0	3,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N 10.701	12.877	1.866	544	25.990
			% 41,2	49,5	7,2	2,1	100,0
		Secundaria, inferior	N 15.142	15.848	5.795	2.151	38.937
			% 38,9	40,7	14,9	5,5	100,0
		Secundaria, superior	N 59.211	57.661	11.235	2.381	130.487
			% 45,4	44,2	8,6	1,8	100,0
		Terciaria	N 64.533	47.510	6.726	6.643	125.412
			% 51,5	37,9	5,4	5,3	100,0
	45-64	Total	N 168.348	116.172	18.007	11.242	313.769
			% 53,7	37,0	5,7	3,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N 39.531	30.305	4.405	3.722	77.963
			% 50,7	38,9	5,7	4,8	100,0
		Secundaria, inferior	N 27.779	26.980	4.729	2.246	61.735
			% 45,0	43,7	7,7	3,6	100,0
		Secundaria, superior	N 60.901	40.214	5.835	3.372	110.322
			% 55,2	36,5	5,3	3,1	100,0
		Terciaria	N 40.137	18.673	3.037	1.901	63.749
			% 63,0	29,3	4,8	3,0	100,0
	65-74	Total	N 64.104	35.351	5.264	5.206	109.925
			% 58,3	32,2	4,8	4,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N 35.375	19.364	3.119	3.994	61.852
			% 57,2	31,3	5,0	6,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 71. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total		
Mujeres	65-74	Secundaria, inferior	N	14.535	10.931	1.039	947	27.452	
			%	52,9	39,8	3,8	3,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	8.145	2.378	1.105	265	11.893	
			%	68,5	20,0	9,3	2,2	100,0	
		Terciaria	N	6.049	2.678	.	.	8.727	
			%	69,3	30,7	.	.	100,0	
	>=75	Total	N	83.968	48.264	6.277	3.356	141.864	
			%	59,2	34,0	4,4	2,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	57.620	36.976	3.534	3.006	101.136	
			%	57,0	36,6	3,5	3,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	15.530	6.920	2.080	349	24.879	
			%	62,4	27,8	8,4	1,4	100,0	
	Secundaria, superior	N	6.161	3.192	367	.	9.720		
		%	63,4	32,8	3,8	.	100,0		
	Terciaria	N	4.657	1.176	296	.	6.129		
		%	76,0	19,2	4,8	.	100,0		
	Ambos	Total	Total	N	967.630	732.857	122.627	67.893	1.891.006
				%	51,2	38,8	6,5	3,6	100,0
Sin estudios, primaria		N	255.126	184.646	25.082	24.073	488.927		
		%	52,2	37,8	5,1	4,9	100,0		
Secundaria, inferior		N	158.342	143.399	25.575	9.904	337.220		
		%	47,0	42,5	7,6	2,9	100,0		
Secundaria, superior		N	330.463	269.900	48.673	19.500	668.536		
		%	49,4	40,4	7,3	2,9	100,0		
Terciaria		N	223.699	134.912	23.296	14.416	396.323		
		%	56,4	34,0	5,9	3,6	100,0		
15-24		Total	N	80.681	83.501	12.665	7.110	183.958	
			%	43,9	45,4	6,9	3,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	10.852	8.581	1.293	579	21.304	
			%	50,9	40,3	6,1	2,7	100,0	
		Secundaria, inferior	N	20.483	22.804	2.799	1.804	47.891	
			%	42,8	47,6	5,8	3,8	100,0	
Secundaria, superior		N	36.685	42.385	5.328	3.885	88.283		
		%	41,6	48,0	6,0	4,4	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 71. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Ambos	15-24	Terciaria	N	12.661	9.730	3.246	842	26.479
			%	47,8	36,7	12,3	3,2	100,0
	25-44	Total	N	305.427	274.595	53.360	23.752	657.135
			%	46,5	41,8	8,1	3,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	25.545	31.233	4.183	2.803	63.765
			%	40,1	49,0	6,6	4,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	35.758	43.275	9.669	3.044	91.745
			%	39,0	47,2	10,5	3,3	100,0
		Secundaria, superior	N	135.775	124.220	26.493	8.274	294.762
			%	46,1	42,1	9,0	2,8	100,0
		Terciaria	N	108.349	75.867	13.015	9.631	206.862
			%	52,4	36,7	6,3	4,7	100,0
	45-64	Total	N	326.412	233.450	36.767	19.795	616.424
			%	53,0	37,9	6,0	3,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	71.705	60.468	8.206	7.983	148.363
			%	48,3	40,8	5,5	5,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	55.047	49.284	8.317	2.333	114.979
			%	47,9	42,9	7,2	2,0	100,0
		Secundaria, superior	N	122.858	84.531	13.840	6.223	227.452
			%	54,0	37,2	6,1	2,7	100,0
		Terciaria	N	76.802	39.167	6.405	3.256	125.630
			%	61,1	31,2	5,1	2,6	100,0
	65-74	Total	N	118.023	68.450	8.883	10.301	205.658
			%	57,4	33,3	4,3	5,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	55.126	32.923	4.620	7.200	99.869
			%	55,2	33,0	4,6	7,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	23.770	16.550	1.717	1.707	43.744
			%	54,3	37,8	3,9	3,9	100,0
		Secundaria, superior	N	22.815	11.572	2.475	979	37.841
			%	60,3	30,6	6,5	2,6	100,0
		Terciaria	N	16.312	7.405	71	416	24.204
			%	67,4	30,6	0,3	1,7	100,0
	>=75	Total	N	137.086	72.860	10.950	6.936	227.832
			%	60,2	32,0	4,8	3,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 71. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Ambos	>=75	Sin estudios, primaria	N	91.897	51.440	6.780	5.509	155.625
			%	59,1	33,1	4,4	3,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	23.284	11.487	3.074	1.016	38.860
			%	59,9	29,6	7,9	2,6	100,0
		Secundaria, superior	N	12.329	7.192	538	140	20.198
			%	61,0	35,6	2,7	0,7	100,0
		Terciaria	N	9.576	2.742	559	271	13.149
			%	72,8	20,9	4,3	2,1	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 72. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	Total	CAPV	N 223.094	360.315	193.073	138.642	915.124
			% 24,4	39,4	21,1	15,2	100,0
		Araba	N 37.712	49.656	24.169	22.215	133.751
			% 28,2	37,1	18,1	16,6	100,0
		Gipuzkoa	N 68.690	113.487	59.294	52.340	293.812
			% 23,4	38,6	20,2	17,8	100,0
		Bizkaia	N 116.692	197.172	109.611	64.087	487.561
			% 23,9	40,4	22,5	13,1	100,0
	15-24	CAPV	N 20.148	36.834	24.717	12.759	94.458
			% 21,3	39,0	26,2	13,5	100,0
		Araba	N 4.509	4.963	3.836	1.561	14.869
			% 30,3	33,4	25,8	10,5	100,0
		Gipuzkoa	N 6.875	12.415	6.141	5.874	31.305
			% 22,0	39,7	19,6	18,8	100,0
		Bizkaia	N 8.765	19.456	14.740	5.324	48.284
			% 18,2	40,3	30,5	11,0	100,0
	25-44	CAPV	N 81.484	132.218	71.996	50.611	336.309
			% 24,2	39,3	21,4	15,0	100,0
		Araba	N 13.953	21.590	8.727	7.793	52.062
			% 26,8	41,5	16,8	15,0	100,0
		Gipuzkoa	N 27.944	38.383	23.458	17.006	106.790
			% 26,2	35,9	22,0	15,9	100,0
		Bizkaia	N 39.588	72.246	39.812	25.813	177.458
			% 22,3	40,7	22,4	14,5	100,0
	45-64	CAPV	N 71.133	123.118	63.755	44.650	302.655
			% 23,5	40,7	21,1	14,8	100,0
		Araba	N 11.284	13.945	8.885	8.638	42.751
			% 26,4	32,6	20,8	20,2	100,0
		Gipuzkoa	N 17.597	42.299	19.230	18.293	97.419
			% 18,1	43,4	19,7	18,8	100,0
		Bizkaia	N 42.252	66.874	35.640	17.719	162.485
			% 26,0	41,2	21,9	10,9	100,0
	65-74	CAPV	N 23.438	37.351	17.390	17.554	95.733
			% 24,5	39,0	18,2	18,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 72. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total		
Hombres 65-74	Araba	N	3.736	5.075	1.752	2.601	13.163		
		%	28,4	38,6	13,3	19,8	100,0		
	Gipuzkoa	N	8.677	11.057	5.968	6.428	32.130		
		%	27,0	34,4	18,6	20,0	100,0		
	Bizkaia	N	11.026	21.219	9.670	8.525	50.440		
		%	21,9	42,1	19,2	16,9	100,0		
	>=75	CAPV	N	26.891	30.793	15.215	13.068	85.968	
			%	31,3	35,8	17,7	15,2	100,0	
		Araba	N	4.231	4.083	969	1.622	10.905	
			%	38,8	37,4	8,9	14,9	100,0	
		Gipuzkoa	N	7.598	9.333	4.498	4.740	26.168	
			%	29,0	35,7	17,2	18,1	100,0	
Bizkaia		N	15.062	17.377	9.749	6.707	48.895		
		%	30,8	35,5	19,9	13,7	100,0		
Mujeres		Total	CAPV	N 252.043	366.941	205.971	150.928	975.882	
			%	25,8	37,6	21,1	15,5	100,0	
		Araba	N	40.915	47.401	25.328	23.127	136.772	
			%	29,9	34,7	18,5	16,9	100,0	
	Gipuzkoa	N	80.744	108.981	74.042	48.919	312.686		
		%	25,8	34,9	23,7	15,6	100,0		
	Bizkaia	N	130.384	210.560	106.600	78.881	526.425		
		%	24,8	40,0	20,2	15,0	100,0		
	15-24	CAPV	N	19.437	31.240	21.509	17.313	89.499	
			%	21,7	34,9	24,0	19,3	100,0	
		Araba	N	3.801	4.612	2.047	2.750	13.210	
			%	28,8	34,9	15,5	20,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	6.643	11.196	6.498	5.106	29.443	
			%	22,6	38,0	22,1	17,3	100,0	
		Bizkaia	N	8.992	15.432	12.964	9.458	46.846	
			%	19,2	32,9	27,7	20,2	100,0	
		25-44	CAPV	N	77.642	124.451	73.881	44.852	320.826
				%	24,2	38,8	23,0	14,0	100,0
Araba			N	13.283	17.155	9.673	7.758	47.869	
			%	27,7	35,8	20,2	16,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 72. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N 24.775	37.816	25.100	14.215	101.905
			% 24,3	37,1	24,6	13,9	100,0
		Bizkaia	N 39.583	69.480	39.109	22.880	171.052
			% 23,1	40,6	22,9	13,4	100,0
	45-64	CAPV	N 86.242	115.425	63.856	48.246	313.769
			% 27,5	36,8	20,4	15,4	100,0
		Araba	N 14.475	14.258	8.977	6.553	44.263
			% 32,7	32,2	20,3	14,8	100,0
		Gipuzkoa	N 24.975	35.661	25.394	13.631	99.662
			% 25,1	35,8	25,5	13,7	100,0
		Bizkaia	N 46.792	65.505	29.485	28.061	169.843
			% 27,6	38,6	17,4	16,5	100,0
	65-74	CAPV	N 29.834	39.499	21.952	18.639	109.925
			% 27,1	35,9	20,0	17,0	100,0
		Araba	N 4.454	5.311	2.197	2.358	14.320
			% 31,1	37,1	15,3	16,5	100,0
		Gipuzkoa	N 9.770	10.171	8.144	8.036	36.120
			% 27,0	28,2	22,5	22,2	100,0
		Bizkaia	N 15.610	24.017	11.611	8.246	59.484
			% 26,2	40,4	19,5	13,9	100,0
	>=75	CAPV	N 38.888	56.326	24.772	21.878	141.864
			% 27,4	39,7	17,5	15,4	100,0
		Araba	N 4.902	6.065	2.434	3.710	17.110
			% 28,6	35,4	14,2	21,7	100,0
		Gipuzkoa	N 14.580	14.137	8.907	7.931	45.555
			% 32,0	31,0	19,6	17,4	100,0
		Bizkaia	N 19.407	36.125	13.431	10.237	79.200
			% 24,5	45,6	17,0	12,9	100,0
Ambos	Total	CAPV	N 475.137	727.256	399.044	289.570	1.891.006
			% 25,1	38,5	21,1	15,3	100,0
		Araba	N 78.627	97.057	49.497	45.342	270.523
			% 29,1	35,9	18,3	16,8	100,0
		Gipuzkoa	N 149.434	222.468	133.336	101.259	606.497
			% 24,6	36,7	22,0	16,7	100,0
		Bizkaia	N 247.076	407.731	216.211	142.968	1.013.987

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 72. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	Total	Bizkaia	%	24,4	40,2	21,3	14,1	100,0
	15-24	CAPV	N	39.585	68.074	46.226	30.072	183.958
			%	21,5	37,0	25,1	16,3	100,0
		Araba	N	8.310	9.575	5.884	4.311	28.079
			%	29,6	34,1	21,0	15,4	100,0
		Gipuzkoa	N	13.518	23.611	12.639	10.980	60.748
			%	22,3	38,9	20,8	18,1	100,0
		Bizkaia	N	17.757	34.888	27.704	14.781	95.130
			%	18,7	36,7	29,1	15,5	100,0
	25-44	CAPV	N	159.126	256.669	145.877	95.463	657.135
			%	24,2	39,1	22,2	14,5	100,0
		Araba	N	27.236	38.744	18.400	15.550	99.930
			%	27,3	38,8	18,4	15,6	100,0
		Gipuzkoa	N	52.719	76.198	48.557	31.220	208.695
			%	25,3	36,5	23,3	15,0	100,0
		Bizkaia	N	79.171	141.726	78.920	48.693	348.509
			%	22,7	40,7	22,6	14,0	100,0
	45-64	CAPV	N	157.375	238.543	127.611	92.896	616.424
			%	25,5	38,7	20,7	15,1	100,0
		Araba	N	25.759	28.203	17.862	15.191	87.015
			%	29,6	32,4	20,5	17,5	100,0
		Gipuzkoa	N	42.572	77.961	44.624	31.924	197.081
			%	21,6	39,6	22,6	16,2	100,0
		Bizkaia	N	89.043	132.379	65.126	45.780	332.328
			%	26,8	39,8	19,6	13,8	100,0
	65-74	CAPV	N	53.272	76.851	39.342	36.193	205.658
			%	25,9	37,4	19,1	17,6	100,0
		Araba	N	8.190	10.386	3.949	4.959	27.483
			%	29,8	37,8	14,4	18,0	100,0
		Gipuzkoa	N	18.447	21.228	14.112	14.464	68.251
			%	27,0	31,1	20,7	21,2	100,0
		Bizkaia	N	26.636	45.236	21.282	16.770	109.924
			%	24,2	41,2	19,4	15,3	100,0
	>=75	CAPV	N	65.779	87.120	39.987	34.946	227.832
			%	28,9	38,2	17,6	15,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 72. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Ambos	>=75	Araba	N	9.132	10.148	3.403	5.331	28.015
			%	32,6	36,2	12,1	19,0	100,0
		Gipuzkoa	N	22.178	23.470	13.405	12.671	71.723
			%	30,9	32,7	18,7	17,7	100,0
		Bizkaia	N	34.469	53.502	23.179	16.944	128.094
			%	26,9	41,8	18,1	13,2	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

		Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Hombres	Total	N 222.437	360.126	193.073	138.227	913.863	
		% 24,3	39,4	21,1	15,1	100,0	
	I	N 32.725	45.341	22.307	13.317	113.690	
		% 28,8	39,9	19,6	11,7	100,0	
	II	N 16.006	31.881	19.524	10.795	78.206	
		% 20,5	40,8	25,0	13,8	100,0	
	III	N 49.996	73.251	37.868	27.241	188.355	
		% 26,5	38,9	20,1	14,5	100,0	
	IV	N 106.058	179.544	94.157	70.546	450.306	
		% 23,6	39,9	20,9	15,7	100,0	
	V	N 17.653	30.110	19.217	16.328	83.307	
		% 21,2	36,1	23,1	19,6	100,0	
	15-24	Total	N 19.590	36.834	24.717	12.759	93.900
			% 20,9	39,2	26,3	13,6	100,0
		I	N 4.573	5.864	2.482	1.716	14.634
			% 31,2	40,1	17,0	11,7	100,0
		II	N 2.451	2.857	4.907	773	10.988
			% 22,3	26,0	44,7	7,0	100,0
		III	N 3.367	4.716	6.262	2.485	16.830
			% 20,0	28,0	37,2	14,8	100,0
		IV	N 7.387	19.818	10.067	5.466	42.737
			% 17,3	46,4	23,6	12,8	100,0
		V	N 1.813	3.579	1.000	2.319	8.711
			% 20,8	41,1	11,5	26,6	100,0
	25-44	Total	N 81.484	132.218	71.996	50.611	336.309
			% 24,2	39,3	21,4	15,0	100,0
		I	N 11.678	16.992	8.796	6.267	43.732
			% 26,7	38,9	20,1	14,3	100,0
		II	N 5.621	12.174	9.370	5.331	32.496
			% 17,3	37,5	28,8	16,4	100,0
		III	N 16.462	25.285	13.128	7.382	62.257
			% 26,4	40,6	21,1	11,9	100,0
		IV	N 38.712	64.773	32.627	24.280	160.392
			% 24,1	40,4	20,3	15,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	25-44 V	N	9.011	12.995	8.075	7.351	37.432
		%	24,1	34,7	21,6	19,6	100,0
45-64	Total	N	71.034	122.929	63.755	44.650	302.368
		%	23,5	40,7	21,1	14,8	100,0
	I	N	10.992	15.736	7.992	3.187	37.907
		%	29,0	41,5	21,1	8,4	100,0
	II	N	4.862	12.542	3.356	2.658	23.419
		%	20,8	53,6	14,3	11,4	100,0
	III	N	16.966	28.028	10.861	10.467	66.322
		%	25,6	42,3	16,4	15,8	100,0
	IV	N	33.731	57.489	35.275	24.119	150.614
		%	22,4	38,2	23,4	16,0	100,0
	V	N	4.483	9.135	6.270	4.218	24.106
		%	18,6	37,9	26,0	17,5	100,0
65-74	Total	N	23.438	37.351	17.390	17.554	95.733
		%	24,5	39,0	18,2	18,3	100,0
	I	N	3.787	5.330	3.037	1.599	13.753
		%	27,5	38,8	22,1	11,6	100,0
	II	N	1.975	2.080	1.311	1.496	6.862
		%	28,8	30,3	19,1	21,8	100,0
	III	N	6.707	6.095	5.073	3.901	21.777
		%	30,8	28,0	23,3	17,9	100,0
	IV	N	10.855	20.919	6.804	9.174	47.753
		%	22,7	43,8	14,2	19,2	100,0
	V	N	114	2.926	1.164	1.384	5.588
		%	2,0	52,4	20,8	24,8	100,0
>=75	Total	N	26.891	30.793	15.215	12.653	85.553
		%	31,4	36,0	17,8	14,8	100,0
	I	N	1.695	1.420	.	549	3.663
		%	46,3	38,8	.	15,0	100,0
	II	N	1.097	2.227	579	536	4.440
		%	24,7	50,2	13,0	12,1	100,0
	III	N	6.494	9.127	2.543	3.006	21.169
		%	30,7	43,1	12,0	14,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	>=75	IV	N 15.373	16.545	9.385	7.506	48.810
			% 31,5	33,9	19,2	15,4	100,0
		V	N 2.232	1.475	2.708	1.056	7.470
			% 29,9	19,7	36,2	14,1	100,0
Mujeres	Total	Total	N 250.706	366.445	205.514	150.828	973.492
			% 25,8	37,6	21,1	15,5	100,0
	I	N 34.435	42.874	18.637	8.892	104.838	
		% 32,8	40,9	17,8	8,5	100,0	
	II	N 21.632	34.924	22.184	16.289	95.028	
		% 22,8	36,8	23,3	17,1	100,0	
	III	N 64.555	91.893	49.026	36.632	242.107	
		% 26,7	38,0	20,2	15,1	100,0	
	IV	N 86.784	134.288	81.102	58.268	360.441	
		% 24,1	37,3	22,5	16,2	100,0	
	V	N 43.300	62.466	34.565	30.747	171.077	
		% 25,3	36,5	20,2	18,0	100,0	
	15-24	Total	N 18.725	31.240	21.255	17.313	88.533
			% 21,1	35,3	24,0	19,6	100,0
		I	N 1.886	6.246	4.034	2.396	14.562
			% 13,0	42,9	27,7	16,5	100,0
		II	N 4.273	2.815	2.967	3.441	13.497
			% 31,7	20,9	22,0	25,5	100,0
		III	N 3.734	6.488	6.364	3.483	20.069
			% 18,6	32,3	31,7	17,4	100,0
IV		N 6.743	13.096	5.492	6.283	31.614	
		% 21,3	41,4	17,4	19,9	100,0	
V		N 2.088	2.595	2.398	1.711	8.792	
		% 23,7	29,5	27,3	19,5	100,0	
25-44		Total	N 77.372	124.225	73.881	44.852	320.330
			% 24,2	38,8	23,1	14,0	100,0
	I	N 14.772	19.695	7.775	2.844	45.086	
		% 32,8	43,7	17,2	6,3	100,0	
	II	N 6.416	14.203	10.022	6.582	37.223	
		% 17,2	38,2	26,9	17,7	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Mujeres	25-44	III	N	18.833	34.376	17.348	11.472	82.029
			%	23,0	41,9	21,1	14,0	100,0
		IV	N	26.083	39.087	29.529	16.027	110.725
			%	23,6	35,3	26,7	14,5	100,0
		V	N	11.268	16.865	9.207	7.928	45.267
			%	24,9	37,3	20,3	17,5	100,0
	45-64	Total	N	86.242	115.254	63.856	48.246	313.598
			%	27,5	36,8	20,4	15,4	100,0
	I	N	11.763	12.288	5.288	2.777	32.116	
			%	36,6	38,3	16,5	8,6	100,0
	II	N	7.466	10.547	4.749	4.031	26.792	
			%	27,9	39,4	17,7	15,0	100,0
	III	N	24.026	33.754	16.617	14.245	88.641	
			%	27,1	38,1	18,7	16,1	100,0
	IV	N	26.267	37.913	23.867	16.055	104.102	
			%	25,2	36,4	22,9	15,4	100,0
	V	N	16.722	20.751	13.335	11.138	61.946	
			%	27,0	33,5	21,5	18,0	100,0
	65-74	Total	N	29.679	39.499	21.952	18.639	109.770
			%	27,0	36,0	20,0	17,0	100,0
	I	N	2.543	3.046	1.261	349	7.199	
			%	35,3	42,3	17,5	4,9	100,0
	II	N	1.693	2.714	2.037	780	7.225	
			%	23,4	37,6	28,2	10,8	100,0
III	N	8.722	6.604	4.661	2.912	22.899		
		%	38,1	28,8	20,4	12,7	100,0	
IV	N	10.602	19.415	10.046	10.071	50.134		
		%	21,1	38,7	20,0	20,1	100,0	
V	N	6.118	7.721	3.947	4.526	22.312		
		%	27,4	34,6	17,7	20,3	100,0	
>=75	Total	N	38.688	56.227	24.568	21.778	141.261	
		%	27,4	39,8	17,4	15,4	100,0	
I	N	3.471	1.599	278	527	5.875		
		%	59,1	27,2	4,7	9,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Mujeres >=75	II	N	1.783	4.644	2.408	1.456	10.292	
		%	17,3	45,1	23,4	14,1	100,0	
	III	N	9.241	10.671	4.037	4.519	28.468	
		%	32,5	37,5	14,2	15,9	100,0	
	IV	N	17.089	24.778	12.167	9.832	63.866	
		%	26,8	38,8	19,1	15,4	100,0	
	V	N	7.104	14.534	5.678	5.444	32.760	
		%	21,7	44,4	17,3	16,6	100,0	
	Total	N	473.143	726.571	398.587	289.055	1.887.356	
		%	25,1	38,5	21,1	15,3	100,0	
	15-24	I	N	67.159	88.214	40.945	22.210	218.528
			%	30,7	40,4	18,7	10,2	100,0
		II	N	37.638	66.805	41.708	27.084	173.234
			%	21,7	38,6	24,1	15,6	100,0
		III	N	114.551	165.144	86.894	63.873	430.462
			%	26,6	38,4	20,2	14,8	100,0
		IV	N	192.842	313.832	175.259	128.814	810.747
			%	23,8	38,7	21,6	15,9	100,0
V		N	60.953	92.576	53.781	47.075	254.385	
		%	24,0	36,4	21,1	18,5	100,0	
Total		N	38.315	68.074	45.972	30.072	182.434	
		%	21,0	37,3	25,2	16,5	100,0	
I		N	6.459	12.110	6.516	4.111	29.196	
		%	22,1	41,5	22,3	14,1	100,0	
II		N	6.724	5.672	7.874	4.214	24.485	
		%	27,5	23,2	32,2	17,2	100,0	
III		N	7.101	11.204	12.626	5.968	36.900	
		%	19,2	30,4	34,2	16,2	100,0	
IV	N	14.130	32.914	15.558	11.749	74.351		
	%	19,0	44,3	20,9	15,8	100,0		
V	N	3.901	6.174	3.398	4.030	17.503		
	%	22,3	35,3	19,4	23,0	100,0		
Total	N	158.856	256.443	145.877	95.463	656.640		
	%	24,2	39,1	22,2	14,5	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	25-44	I	N 26.450	36.687	16.571	9.110	88.818
			% 29,8	41,3	18,7	10,3	100,0
		II	N 12.037	26.377	19.393	11.913	69.719
			% 17,3	37,8	27,8	17,1	100,0
		III	N 35.295	59.660	30.477	18.854	144.286
			% 24,5	41,3	21,1	13,1	100,0
		IV	N 64.795	103.860	62.155	40.307	271.117
			% 23,9	38,3	22,9	14,9	100,0
		V	N 20.279	29.860	17.281	15.279	82.699
			% 24,5	36,1	20,9	18,5	100,0
	45-64	Total	N 157.276	238.183	127.611	92.896	615.965
			% 25,5	38,7	20,7	15,1	100,0
		I	N 22.755	28.024	13.281	5.964	70.023
			% 32,5	40,0	19,0	8,5	100,0
		II	N 12.328	23.090	8.105	6.689	50.212
			% 24,6	46,0	16,1	13,3	100,0
		III	N 40.991	61.781	27.478	24.712	154.963
			% 26,5	39,9	17,7	15,9	100,0
		IV	N 59.998	95.402	59.142	40.174	254.716
			% 23,6	37,5	23,2	15,8	100,0
		V	N 21.204	29.886	19.605	15.356	86.052
			% 24,6	34,7	22,8	17,8	100,0
	65-74	Total	N 53.117	76.851	39.342	36.193	205.503
			% 25,8	37,4	19,1	17,6	100,0
		I	N 6.330	8.375	4.298	1.949	20.952
			% 30,2	40,0	20,5	9,3	100,0
		II	N 3.668	4.795	3.349	2.276	14.087
			% 26,0	34,0	23,8	16,2	100,0
		III	N 15.429	12.700	9.734	6.813	44.676
			% 34,5	28,4	21,8	15,2	100,0
		IV	N 21.457	40.334	16.851	19.246	97.887
			% 21,9	41,2	17,2	19,7	100,0
		V	N 6.233	10.647	5.112	5.910	27.901
			% 22,3	38,2	18,3	21,2	100,0
	>=75	Total	N 65.579	87.020	39.784	34.432	226.814

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

		Muy de acuerdo		En desacuerdo		Muy en desacuerdo		Total
Ambos	>=75	Total	%	28,9	38,4	17,5	15,2	100,0
		I	N	5.166	3.019	278	1.076	9.538
		%	54,2	31,6	2,9	11,3	100,0	
	II	N	2.881	6.871	2.988	1.992	14.731	
		%	19,6	46,6	20,3	13,5	100,0	
	III	N	15.734	19.798	6.580	7.525	49.638	
		%	31,7	39,9	13,3	15,2	100,0	
	IV	N	32.462	41.323	21.553	17.338	112.676	
		%	28,8	36,7	19,1	15,4	100,0	
	V	N	9.336	16.009	8.386	6.500	40.231	
		%	23,2	39,8	20,8	16,2	100,0	

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 74. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	Total	N	223.094	360.315	193.073	138.642	915.124
		%	24,4	39,4	21,1	15,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	49.059	79.701	40.584	41.256	210.600
		%	23,3	37,8	19,3	19,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	39.428	67.545	38.577	21.903	167.454
		%	23,5	40,3	23,0	13,1	100,0
	Secundaria, superior	N	83.761	139.648	79.930	57.331	360.670
		%	23,2	38,7	22,2	15,9	100,0
	Terciaria	N	50.845	73.421	33.983	18.152	176.400
		%	28,8	41,6	19,3	10,3	100,0
	15-24 Total	N	20.148	36.834	24.717	12.759	94.458
		%	21,3	39,0	26,2	13,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.670	4.646	2.757	845	9.918
		%	16,8	46,8	27,8	8,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	6.818	12.674	7.430	4.206	31.129
		%	21,9	40,7	23,9	13,5	100,0
	Secundaria, superior	N	9.592	15.877	10.307	7.065	42.840
		%	22,4	37,1	24,1	16,5	100,0
	Terciaria	N	2.068	3.638	4.223	643	10.572
		%	19,6	34,4	39,9	6,1	100,0
	25-44 Total	N	81.484	132.218	71.996	50.611	336.309
		%	24,2	39,3	21,4	15,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	7.498	13.932	8.181	8.165	37.776
		%	19,8	36,9	21,7	21,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	13.674	21.083	11.131	6.919	52.808
		%	25,9	39,9	21,1	13,1	100,0
	Secundaria, superior	N	37.851	66.903	33.324	26.196	164.274
		%	23,0	40,7	20,3	15,9	100,0
	Terciaria	N	22.461	30.300	19.360	9.330	81.451
		%	27,6	37,2	23,8	11,5	100,0
	45-64 Total	N	71.133	123.118	63.755	44.650	302.655
		%	23,5	40,7	21,1	14,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	14.226	25.886	15.280	15.008	70.400
		%	20,2	36,8	21,7	21,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 74. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres 45-64	Secundaria, inferior	N	12.026	23.759	13.625	3.834	53.244
		%	22,6	44,6	25,6	7,2	100,0
	Secundaria, superior	N	25.747	44.131	26.963	20.289	117.130
		%	22,0	37,7	23,0	17,3	100,0
	Terciaria	N	19.133	29.341	7.886	5.520	61.881
		%	30,9	47,4	12,7	8,9	100,0
	65-74 Total	N	23.438	37.351	17.390	17.554	95.733
		%	24,5	39,0	18,2	18,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	8.325	16.465	4.738	8.490	38.017
		%	21,9	43,3	12,5	22,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.295	5.517	3.223	4.257	16.291
		%	20,2	33,9	19,8	26,1	100,0
Secundaria, superior	N	6.971	8.581	7.536	2.860	25.948	
	%	26,9	33,1	29,0	11,0	100,0	
Terciaria	N	4.848	6.789	1.893	1.948	15.477	
	%	31,3	43,9	12,2	12,6	100,0	
>=75 Total	N	26.891	30.793	15.215	13.068	85.968	
	%	31,3	35,8	17,7	15,2	100,0	
Sin estudios, primaria	N	17.340	18.772	9.628	8.749	54.489	
	%	31,8	34,5	17,7	16,1	100,0	
Secundaria, inferior	N	3.615	4.512	3.166	2.687	13.981	
	%	25,9	32,3	22,6	19,2	100,0	
Secundaria, superior	N	3.601	4.156	1.799	921	10.478	
	%	34,4	39,7	17,2	8,8	100,0	
Terciaria	N	2.335	3.353	622	710	7.020	
	%	33,3	47,8	8,9	10,1	100,0	
Mujeres Total	Total	N	252.043	366.941	205.971	150.928	975.882
		%	25,8	37,6	21,1	15,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	67.600	107.094	55.875	47.758	278.327
		%	24,3	38,5	20,1	17,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	41.867	61.116	39.192	27.591	169.766
		%	24,7	36,0	23,1	16,3	100,0
	Secundaria, superior	N	80.876	110.179	69.555	47.257	307.866
		%	26,3	35,8	22,6	15,3	100,0
	Terciaria	N	61.699	88.553	41.350	28.321	219.923
		%					

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 74. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	Total	Terciaria	% 28,1	40,3	18,8	12,9	100,0
	15-24	Total	N 19.437	31.240	21.509	17.313	89.499
			% 21,7	34,9	24,0	19,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N 2.130	4.505	3.237	1.514	11.386
			% 18,7	39,6	28,4	13,3	100,0
		Secundaria, inferior	N 3.275	5.819	3.702	3.967	16.763
			% 19,5	34,7	22,1	23,7	100,0
		Secundaria, superior	N 11.084	15.329	10.193	8.837	45.443
			% 24,4	33,7	22,4	19,4	100,0
		Terciaria	N 2.948	5.587	4.377	2.996	15.907
			% 18,5	35,1	27,5	18,8	100,0
	25-44	Total	N 77.642	124.451	73.881	44.852	320.826
			% 24,2	38,8	23,0	14,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N 5.605	10.399	6.731	3.255	25.990
			% 21,6	40,0	25,9	12,5	100,0
		Secundaria, inferior	N 8.795	13.671	11.373	5.098	38.937
			% 22,6	35,1	29,2	13,1	100,0
		Secundaria, superior	N 31.743	48.150	30.734	19.860	130.487
			% 24,3	36,9	23,6	15,2	100,0
		Terciaria	N 31.499	52.231	25.043	16.639	125.412
			% 25,1	41,6	20,0	13,3	100,0
	45-64	Total	N 86.242	115.425	63.856	48.246	313.769
			% 27,5	36,8	20,4	15,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N 17.559	29.725	16.547	14.131	77.963
			% 22,5	38,1	21,2	18,1	100,0
		Secundaria, inferior	N 15.900	22.180	13.570	10.085	61.735
			% 25,8	35,9	22,0	16,3	100,0
		Secundaria, superior	N 30.626	39.450	24.063	16.184	110.322
			% 27,8	35,8	21,8	14,7	100,0
		Terciaria	N 22.157	24.070	9.677	7.845	63.749
			% 34,8	37,8	15,2	12,3	100,0
	65-74	Total	N 29.834	39.499	21.952	18.639	109.925
			% 27,1	35,9	20,0	17,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N 15.546	22.475	12.105	11.727	61.852
			% 25,1	36,3	19,6	19,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 74. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total		
Mujeres	65-74	Secundaria, inferior	N	6.981	10.212	5.414	4.845	27.452	
			%	25,4	37,2	19,7	17,6	100,0	
		Secundaria, superior	N	4.155	3.350	2.902	1.486	11.893	
			%	34,9	28,2	24,4	12,5	100,0	
		Terciaria	N	3.152	3.463	1.531	581	8.727	
			%	36,1	39,7	17,5	6,7	100,0	
	>=75	Total	N	38.888	56.326	24.772	21.878	141.864	
			%	27,4	39,7	17,5	15,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	26.760	39.991	17.254	17.132	101.136	
			%	26,5	39,5	17,1	16,9	100,0	
		Secundaria, inferior	N	6.916	9.234	5.134	3.596	24.879	
			%	27,8	37,1	20,6	14,5	100,0	
	Secundaria, superior	N	3.268	3.899	1.663	890	9.720		
		%	33,6	40,1	17,1	9,2	100,0		
	Terciaria	N	1.944	3.203	722	261	6.129		
		%	31,7	52,3	11,8	4,3	100,0		
	Ambos	Total	Total	N	475.137	727.256	399.044	289.570	1.891.006
				%	25,1	38,5	21,1	15,3	100,0
Sin estudios, primaria		N	116.659	186.795	96.458	89.015	488.927		
		%	23,9	38,2	19,7	18,2	100,0		
Secundaria, inferior		N	81.296	128.661	77.769	49.495	337.220		
		%	24,1	38,2	23,1	14,7	100,0		
Secundaria, superior		N	164.638	249.826	149.484	104.588	668.536		
		%	24,6	37,4	22,4	15,6	100,0		
Terciaria		N	112.544	161.973	75.333	46.473	396.323		
		%	28,4	40,9	19,0	11,7	100,0		
15-24		Total	N	39.585	68.074	46.226	30.072	183.958	
			%	21,5	37,0	25,1	16,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	3.801	9.151	5.994	2.358	21.304	
			%	17,8	43,0	28,1	11,1	100,0	
		Secundaria, inferior	N	10.093	18.493	11.132	8.173	47.891	
			%	21,1	38,6	23,2	17,1	100,0	
Secundaria, superior		N	20.676	31.206	20.500	15.902	88.283		
		%	23,4	35,3	23,2	18,0	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 74. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Ambos	15-24	Terciaria	N	5.016	9.224	8.600	3.638	26.479
			%	18,9	34,8	32,5	13,7	100,0
	25-44	Total	N	159.126	256.669	145.877	95.463	657.135
			%	24,2	39,1	22,2	14,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	13.103	24.331	14.912	11.419	63.765
			%	20,5	38,2	23,4	17,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	22.469	34.754	22.504	12.017	91.745
			%	24,5	37,9	24,5	13,1	100,0
		Secundaria, superior	N	69.594	115.053	64.058	46.056	294.762
			%	23,6	39,0	21,7	15,6	100,0
		Terciaria	N	53.960	82.530	44.402	25.970	206.862
			%	26,1	39,9	21,5	12,6	100,0
	45-64	Total	N	157.375	238.543	127.611	92.896	616.424
			%	25,5	38,7	20,7	15,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	31.785	55.611	31.827	29.139	148.363
			%	21,4	37,5	21,5	19,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	27.926	45.939	27.195	13.919	114.979
			%	24,3	40,0	23,7	12,1	100,0
		Secundaria, superior	N	56.373	83.581	51.026	36.472	227.452
			%	24,8	36,7	22,4	16,0	100,0
		Terciaria	N	41.290	53.411	17.563	13.365	125.630
			%	32,9	42,5	14,0	10,6	100,0
	65-74	Total	N	53.272	76.851	39.342	36.193	205.658
			%	25,9	37,4	19,1	17,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	23.871	38.939	16.843	20.217	99.869
			%	23,9	39,0	16,9	20,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	10.276	15.728	8.638	9.102	43.744
			%	23,5	36,0	19,7	20,8	100,0
		Secundaria, superior	N	11.126	11.931	10.438	4.346	37.841
			%	29,4	31,5	27,6	11,5	100,0
		Terciaria	N	7.999	10.252	3.424	2.529	24.204
			%	33,1	42,4	14,1	10,4	100,0
	>=75	Total	N	65.779	87.120	39.987	34.946	227.832
			%	28,9	38,2	17,6	15,3	100,0

(continuación)

Tabla 74. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	>=75	Sin estudios, primaria	N 44.100	58.763	26.882	25.881	155.625
			% 28,3	37,8	17,3	16,6	100,0
		Secundaria, inferior	N 10.532	13.746	8.300	6.283	38.860
			% 27,1	35,4	21,4	16,2	100,0
		Secundaria, superior	N 6.869	8.055	3.462	1.811	20.198
			% 34,0	39,9	17,1	9,0	100,0
		Terciaria	N 4.279	6.556	1.344	971	13.149
			% 32,5	49,9	10,2	7,4	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 75. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	Total	CAPV	N	384.365	380.740	87.635	62.383	915.124
			%	42,0	41,6	9,6	6,8	100,0
		Araba	N	64.863	49.355	10.394	9.139	133.751
			%	48,5	36,9	7,8	6,8	100,0
		Gipuzkoa	N	142.514	113.576	21.903	15.818	293.812
			%	48,5	38,7	7,5	5,4	100,0
		Bizkaia	N	176.988	217.810	55.338	37.426	487.561
			%	36,3	44,7	11,4	7,7	100,0
	15-24	CAPV	N	34.556	45.421	7.274	7.207	94.458
			%	36,6	48,1	7,7	7,6	100,0
		Araba	N	6.870	5.990	1.413	597	14.869
			%	46,2	40,3	9,5	4,0	100,0
		Gipuzkoa	N	15.863	12.228	1.290	1.923	31.305
			%	50,7	39,1	4,1	6,1	100,0
		Bizkaia	N	11.824	27.202	4.571	4.687	48.284
			%	24,5	56,3	9,5	9,7	100,0
	25-44	CAPV	N	130.971	141.284	39.999	24.055	336.309
			%	38,9	42,0	11,9	7,2	100,0
		Araba	N	23.341	20.483	5.363	2.876	52.062
			%	44,8	39,3	10,3	5,5	100,0
		Gipuzkoa	N	50.799	39.780	9.912	6.298	106.790
			%	47,6	37,3	9,3	5,9	100,0
		Bizkaia	N	56.832	81.020	24.723	14.882	177.458
			%	32,0	45,7	13,9	8,4	100,0
	45-64	CAPV	N	133.501	125.713	25.206	18.236	302.655
			%	44,1	41,5	8,3	6,0	100,0
		Araba	N	22.233	14.450	2.435	3.633	42.751
			%	52,0	33,8	5,7	8,5	100,0
		Gipuzkoa	N	44.463	42.612	5.848	4.497	97.419
			%	45,6	43,7	6,0	4,6	100,0
		Bizkaia	N	66.805	68.652	16.923	10.105	162.485
			%	41,1	42,3	10,4	6,2	100,0
	65-74	CAPV	N	45.101	35.315	7.278	8.038	95.733
			%	47,1	36,9	7,6	8,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 75. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Hombres 65-74	Araba	N	7.265	4.272	356	1.271	13.163	
		%	55,2	32,5	2,7	9,7	100,0	
	Gipuzkoa	N	17.275	10.332	2.611	1.911	32.130	
		%	53,8	32,2	8,1	5,9	100,0	
	Bizkaia	N	20.561	20.712	4.311	4.856	50.440	
		%	40,8	41,1	8,5	9,6	100,0	
	>=75	CAPV	N	40.236	33.007	7.879	4.846	85.968
			%	46,8	38,4	9,2	5,6	100,0
		Araba	N	5.155	4.160	827	762	10.905
			%	47,3	38,2	7,6	7,0	100,0
		Gipuzkoa	N	14.115	8.623	2.242	1.189	26.168
			%	53,9	33,0	8,6	4,5	100,0
Bizkaia		N	20.966	20.223	4.810	2.895	48.895	
		%	42,9	41,4	9,8	5,9	100,0	
Mujeres Total		CAPV	N	436.738	383.434	88.486	67.225	975.882
			%	44,8	39,3	9,1	6,9	100,0
		Araba	N	68.602	48.962	10.606	8.602	136.772
			%	50,2	35,8	7,8	6,3	100,0
	Gipuzkoa	N	158.430	112.440	24.605	17.210	312.686	
		%	50,7	36,0	7,9	5,5	100,0	
	Bizkaia	N	209.706	222.033	53.274	41.413	526.425	
		%	39,8	42,2	10,1	7,9	100,0	
	15-24	CAPV	N	38.459	34.578	7.522	8.939	89.499
			%	43,0	38,6	8,4	10,0	100,0
		Araba	N	8.116	3.086	803	1.205	13.210
			%	61,4	23,4	6,1	9,1	100,0
Gipuzkoa		N	13.537	10.961	2.080	2.866	29.443	
		%	46,0	37,2	7,1	9,7	100,0	
Bizkaia		N	16.807	20.532	4.638	4.869	46.846	
		%	35,9	43,8	9,9	10,4	100,0	
25-44		CAPV	N	128.997	137.009	33.503	21.317	320.826
			%	40,2	42,7	10,4	6,6	100,0
		Araba	N	21.248	18.198	5.651	2.771	47.869
			%	44,4	38,0	11,8	5,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 75. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	48.811	39.258	8.219	5.617	101.905
			%	47,9	38,5	8,1	5,5	100,0
	Bizkaia	N	58.938	79.553	19.633	12.929	171.052	
		%	34,5	46,5	11,5	7,6	100,0	
	45-64	CAPV	N	152.786	114.462	26.911	19.610	313.769
		%	48,7	36,5	8,6	6,2	100,0	
	Araba	N	24.273	15.392	2.441	2.157	44.263	
		%	54,8	34,8	5,5	4,9	100,0	
	Gipuzkoa	N	51.240	36.221	7.626	4.576	99.662	
		%	51,4	36,3	7,7	4,6	100,0	
	Bizkaia	N	77.274	62.849	16.844	12.877	169.843	
		%	45,5	37,0	9,9	7,6	100,0	
	65-74	CAPV	N	52.526	40.393	9.186	7.820	109.925
		%	47,8	36,7	8,4	7,1	100,0	
	Araba	N	7.105	5.778	658	778	14.320	
		%	49,6	40,4	4,6	5,4	100,0	
	Gipuzkoa	N	19.976	11.910	2.669	1.565	36.120	
		%	55,3	33,0	7,4	4,3	100,0	
Bizkaia	N	25.445	22.705	5.858	5.477	59.484		
	%	42,8	38,2	9,8	9,2	100,0		
>=75	CAPV	N	63.969	56.992	11.364	9.539	141.864	
	%	45,1	40,2	8,0	6,7	100,0		
Araba	N	7.860	6.508	1.052	1.690	17.110		
	%	45,9	38,0	6,1	9,9	100,0		
Gipuzkoa	N	24.866	14.090	4.011	2.588	45.555		
	%	54,6	30,9	8,8	5,7	100,0		
Bizkaia	N	31.243	36.394	6.302	5.261	79.200		
	%	39,4	46,0	8,0	6,6	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	821.103	764.174	176.121	129.608	1.891.006
		%	43,4	40,4	9,3	6,9	100,0	
	Araba	N	133.465	98.316	21.000	17.741	270.523	
		%	49,3	36,3	7,8	6,6	100,0	
	Gipuzkoa	N	300.944	226.016	46.509	33.029	606.497	
		%	49,6	37,3	7,7	5,4	100,0	
	Bizkaia	N	386.694	439.842	108.612	78.838	1.013.987	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 75. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

		Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Ambos	Total	% 38,1	43,4	10,7	7,8	100,0	
	15-24	CAPV	N 73.016	79.999	14.796	16.147	183.958
		% 39,7	43,5	8,0	8,8	100,0	
	Araba	N 14.986	9.076	2.216	1.802	28.079	
		% 53,4	32,3	7,9	6,4	100,0	
	Gipuzkoa	N 29.400	23.189	3.371	4.789	60.748	
		% 48,4	38,2	5,5	7,9	100,0	
	Bizkaia	N 28.630	47.734	9.210	9.556	95.130	
		% 30,1	50,2	9,7	10,0	100,0	
	25-44	CAPV	N 259.968	278.292	73.502	45.372	657.135
		% 39,6	42,3	11,2	6,9	100,0	
	Araba	N 44.589	38.681	11.014	5.647	99.930	
		% 44,6	38,7	11,0	5,7	100,0	
	Gipuzkoa	N 99.610	79.038	18.131	11.915	208.695	
		% 47,7	37,9	8,7	5,7	100,0	
	Bizkaia	N 115.769	160.573	44.356	27.811	348.509	
		% 33,2	46,1	12,7	8,0	100,0	
	45-64	CAPV	N 286.287	240.175	52.117	37.846	616.424
		% 46,4	39,0	8,5	6,1	100,0	
	Araba	N 46.506	29.842	4.877	5.790	87.015	
		% 53,4	34,3	5,6	6,7	100,0	
	Gipuzkoa	N 95.702	78.832	13.474	9.073	197.081	
		% 48,6	40,0	6,8	4,6	100,0	
	Bizkaia	N 144.079	131.501	33.766	22.982	332.328	
		% 43,4	39,6	10,2	6,9	100,0	
	65-74	CAPV	N 97.627	75.709	16.464	15.858	205.658
		% 47,5	36,8	8,0	7,7	100,0	
	Araba	N 14.370	10.050	1.014	2.050	27.483	
		% 52,3	36,6	3,7	7,5	100,0	
	Gipuzkoa	N 37.251	22.243	5.281	3.476	68.251	
		% 54,6	32,6	7,7	5,1	100,0	
	Bizkaia	N 46.006	43.416	10.169	10.333	109.924	
		% 41,9	39,5	9,3	9,4	100,0	
	>=75	CAPV	N 104.205	89.999	19.243	14.385	227.832
		% 45,7	39,5	8,4	6,3	100,0	

(continuación)

Tabla 75. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Ambos	>=75	Araba	N	13.015	10.668	1.879	2.452	28.015
			%	46,5	38,1	6,7	8,8	100,0
		Gipuzkoa	N	38.981	22.714	6.252	3.776	71.723
			%	54,3	31,7	8,7	5,3	100,0
		Bizkaia	N	52.209	56.617	11.112	8.157	128.094
			%	40,8	44,2	8,7	6,4	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	Total	Total	N 384.365	379.993	87.536	61.968	913.863
		%	42,1	41,6	9,6	6,8	100,0
	I	N	47.321	46.730	10.945	8.694	113.690
		%	41,6	41,1	9,6	7,6	100,0
	II	N	31.152	34.632	7.878	4.544	78.206
		%	39,8	44,3	10,1	5,8	100,0
	III	N	89.921	70.005	18.144	10.285	188.355
		%	47,7	37,2	9,6	5,5	100,0
	IV	N	187.328	192.779	40.727	29.472	450.306
		%	41,6	42,8	9,0	6,5	100,0
	V	N	28.643	35.847	9.844	8.974	83.307
		%	34,4	43,0	11,8	10,8	100,0
	15-24	Total	N 34.556	44.863	7.274	7.207	93.900
		%	36,8	47,8	7,7	7,7	100,0
	I	N	6.391	6.583	467	1.192	14.634
		%	43,7	45,0	3,2	8,1	100,0
	II	N	3.729	5.114	1.170	975	10.988
		%	33,9	46,5	10,6	8,9	100,0
	III	N	7.624	6.708	1.329	1.169	16.830
		%	45,3	39,9	7,9	6,9	100,0
	IV	N	14.038	22.530	2.713	3.457	42.737
		%	32,8	52,7	6,3	8,1	100,0
	V	N	2.775	3.927	1.594	414	8.711
		%	31,9	45,1	18,3	4,8	100,0
	25-44	Total	N 130.971	141.284	39.999	24.055	336.309
		%	38,9	42,0	11,9	7,2	100,0
	I	N	14.846	19.950	4.359	4.577	43.732
		%	33,9	45,6	10,0	10,5	100,0
	II	N	13.928	11.723	5.580	1.266	32.496
		%	42,9	36,1	17,2	3,9	100,0
	III	N	26.066	24.004	8.940	3.246	62.257
		%	41,9	38,6	14,4	5,2	100,0
	IV	N	63.207	69.944	16.974	10.268	160.392
		%	39,4	43,6	10,6	6,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	25-44	V	N 12.924	15.663	4.146	4.699	37.432
			% 34,5	41,8	11,1	12,6	100,0
	45-64	Total	N 133.501	125.525	25.107	18.236	302.368
			% 44,2	41,5	8,3	6,0	100,0
	I	N	17.325	14.496	3.841	2.246	37.907
		%	45,7	38,2	10,1	5,9	100,0
	II	N	8.883	12.155	1.057	1.325	23.419
		%	37,9	51,9	4,5	5,7	100,0
	III	N	33.719	25.243	4.380	2.979	66.322
		%	50,8	38,1	6,6	4,5	100,0
	IV	N	65.514	62.169	13.499	9.431	150.614
		%	43,5	41,3	9,0	6,3	100,0
	V	N	8.060	11.461	2.329	2.255	24.106
		%	33,4	47,5	9,7	9,4	100,0
	65-74	Total	N 45.101	35.315	7.278	8.038	95.733
			% 47,1	36,9	7,6	8,4	100,0
	I	N	6.651	4.962	1.732	408	13.753
		%	48,4	36,1	12,6	3,0	100,0
	II	N	3.148	3.041	71	602	6.862
		%	45,9	44,3	1,0	8,8	100,0
	III	N	11.786	5.978	2.313	1.700	21.777
		%	54,1	27,5	10,6	7,8	100,0
	IV	N	22.018	18.401	2.780	4.555	47.753
		%	46,1	38,5	5,8	9,5	100,0
	V	N	1.500	2.933	382	774	5.588
		%	26,8	52,5	6,8	13,8	100,0
	>=75	Total	N 40.236	33.007	7.879	4.431	85.553
			% 47,0	38,6	9,2	5,2	100,0
	I	N	2.109	739	545	271	3.663
		%	57,6	20,2	14,9	7,4	100,0
	II	N	1.465	2.599	.	376	4.440
		%	33,0	58,5	.	8,5	100,0
	III	N	10.727	8.071	1.181	1.191	21.169
		%	50,7	38,1	5,6	5,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Hombres	>=75	IV	N 22.552	19.735	4.761	1.762	48.810	
			% 46,2	40,4	9,8	3,6	100,0	
		V	N 3.384	1.863	1.392	832	7.470	
			% 45,3	24,9	18,6	11,1	100,0	
Mujeres	Total	Total	N 436.032	382.344	87.891	67.225	973.492	
			% 44,8	39,3	9,0	6,9	100,0	
	I	N	46.156	45.173	8.696	4.813	104.838	
		%	44,0	43,1	8,3	4,6	100,0	
	II	N	43.751	36.141	9.243	5.892	95.028	
		%	46,0	38,0	9,7	6,2	100,0	
	III	N	110.628	95.772	21.224	14.484	242.107	
		%	45,7	39,6	8,8	6,0	100,0	
	IV	N	156.048	141.818	33.012	29.563	360.441	
		%	43,3	39,3	9,2	8,2	100,0	
	V	N	79.448	63.441	15.716	12.472	171.077	
		%	46,4	37,1	9,2	7,3	100,0	
	15-24	Total	N	38.210	33.862	7.522	8.939	88.533
			%	43,2	38,2	8,5	10,1	100,0
	I	N	5.797	5.992	1.454	1.318	14.562	
		%	39,8	41,2	10,0	9,0	100,0	
	II	N	7.627	4.250	1.059	561	13.497	
		%	56,5	31,5	7,8	4,2	100,0	
	III	N	6.929	9.869	1.619	1.653	20.069	
		%	34,5	49,2	8,1	8,2	100,0	
	IV	N	12.203	11.960	2.712	4.740	31.614	
		%	38,6	37,8	8,6	15,0	100,0	
V	N	5.655	1.791	677	669	8.792		
	%	64,3	20,4	7,7	7,6	100,0		
25-44	Total	N	128.997	137.009	33.008	21.317	320.330	
		%	40,3	42,8	10,3	6,7	100,0	
I	N	16.898	22.615	4.505	1.068	45.086		
	%	37,5	50,2	10,0	2,4	100,0		
II	N	15.046	13.454	5.237	3.485	37.223		
	%	40,4	36,1	14,1	9,4	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Mujeres	25-44	III	N	36.442	33.364	8.069	4.154	82.029
			%	44,4	40,7	9,8	5,1	100,0
		IV	N	41.042	49.541	10.580	9.562	110.725
			%	37,1	44,7	9,6	8,6	100,0
		V	N	19.569	18.034	4.616	3.048	45.267
			%	43,2	39,8	10,2	6,7	100,0
	45-64	Total	N	152.786	114.291	26.911	19.610	313.598
			%	48,7	36,4	8,6	6,3	100,0
	I	N	16.566	12.759	1.325	1.468	32.116	
		%	51,6	39,7	4,1	4,6	100,0	
	II	N	14.392	9.913	1.742	746	26.792	
		%	53,7	37,0	6,5	2,8	100,0	
	III	N	42.326	32.798	8.362	5.155	88.641	
		%	47,8	37,0	9,4	5,8	100,0	
	IV	N	50.972	35.401	9.859	7.870	104.102	
		%	49,0	34,0	9,5	7,6	100,0	
	V	N	28.530	23.421	5.624	4.371	61.946	
		%	46,1	37,8	9,1	7,1	100,0	
	65-74	Total	N	52.371	40.393	9.186	7.820	109.770
			%	47,7	36,8	8,4	7,1	100,0
	I	N	3.465	2.001	1.251	482	7.199	
		%	48,1	27,8	17,4	6,7	100,0	
	II	N	3.224	2.815	550	636	7.225	
		%	44,6	39,0	7,6	8,8	100,0	
III	N	11.780	7.980	1.440	1.699	22.899		
	%	51,4	34,8	6,3	7,4	100,0		
IV	N	22.330	20.567	3.911	3.327	50.134		
	%	44,5	41,0	7,8	6,6	100,0		
V	N	11.571	7.031	2.034	1.676	22.312		
	%	51,9	31,5	9,1	7,5	100,0		
>=75	Total	N	63.668	56.789	11.264	9.539	141.261	
		%	45,1	40,2	8,0	6,8	100,0	
I	N	3.430	1.806	161	479	5.875		
	%	58,4	30,7	2,7	8,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	>=75	II	N 3.462	5.710	655	465	10.292
			% 33,6	55,5	6,4	4,5	100,0
		III	N 13.150	11.761	1.734	1.823	28.468
			% 46,2	41,3	6,1	6,4	100,0
		IV	N 29.502	24.350	5.950	4.065	63.866
			% 46,2	38,1	9,3	6,4	100,0
		V	N 14.124	13.163	2.765	2.708	32.760
			% 43,1	40,2	8,4	8,3	100,0
	Total	Total	N 820.397	762.338	175.427	129.193	1.887.356
			% 43,5	40,4	9,3	6,8	100,0
		I	N 93.477	91.903	19.641	13.507	218.528
			% 42,8	42,1	9,0	6,2	100,0
		II	N 74.903	70.774	17.121	10.436	173.234
			% 43,2	40,9	9,9	6,0	100,0
		III	N 200.549	165.777	39.367	24.769	430.462
			% 46,6	38,5	9,1	5,8	100,0
		IV	N 343.377	334.597	73.739	59.035	810.747
			% 42,4	41,3	9,1	7,3	100,0
		V	N 108.091	99.287	25.560	21.447	254.385
			% 42,5	39,0	10,0	8,4	100,0
	15-24	Total	N 72.766	78.725	14.796	16.147	182.434
			% 39,9	43,2	8,1	8,9	100,0
		I	N 12.188	12.576	1.922	2.510	29.196
			% 41,7	43,1	6,6	8,6	100,0
		II	N 11.356	9.364	2.230	1.535	24.485
			% 46,4	38,2	9,1	6,3	100,0
		III	N 14.553	16.577	2.949	2.822	36.900
			% 39,4	44,9	8,0	7,6	100,0
		IV	N 26.240	34.489	5.425	8.197	74.351
			% 35,3	46,4	7,3	11,0	100,0
		V	N 8.430	5.719	2.271	1.083	17.503
			% 48,2	32,7	13,0	6,2	100,0
		Total	N 259.968	278.292	73.007	45.372	656.640
			% 39,6	42,4	11,1	6,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

		Muy de acuerdo		De acuerdo		En desacuerdo		Muy en desacuerdo		Total	
Ambos	25-44	I	N	31.744	42.565	8.864	5.645	88.818			
			%	35,7	47,9	10,0	6,4	100,0			
		II	N	28.974	25.177	10.817	4.752	69.719			
			%	41,6	36,1	15,5	6,8	100,0			
		III	N	62.509	57.368	17.010	7.399	144.286			
			%	43,3	39,8	11,8	5,1	100,0			
		IV	N	104.249	119.485	27.554	19.830	271.117			
			%	38,5	44,1	10,2	7,3	100,0			
		V	N	32.493	33.697	8.762	7.747	82.699			
			%	39,3	40,7	10,6	9,4	100,0			
	45-64	Total	N	286.287	239.816	52.017	37.846	615.965			
			%	46,5	38,9	8,4	6,1	100,0			
		I	N	33.890	27.254	5.166	3.713	70.023			
			%	48,4	38,9	7,4	5,3	100,0			
		II	N	23.275	22.068	2.799	2.071	50.212			
			%	46,4	43,9	5,6	4,1	100,0			
		III	N	76.045	58.042	12.742	8.134	154.963			
			%	49,1	37,5	8,2	5,2	100,0			
		IV	N	116.486	97.570	23.358	17.301	254.716			
			%	45,7	38,3	9,2	6,8	100,0			
		V	N	36.591	34.882	7.953	6.627	86.052			
			%	42,5	40,5	9,2	7,7	100,0			
	65-74	Total	N	97.472	75.709	16.464	15.858	205.503			
			%	47,4	36,8	8,0	7,7	100,0			
		I	N	10.116	6.963	2.983	890	20.952			
			%	48,3	33,2	14,2	4,2	100,0			
		II	N	6.372	5.856	621	1.238	14.087			
			%	45,2	41,6	4,4	8,8	100,0			
		III	N	23.566	13.958	3.753	3.399	44.676			
			%	52,7	31,2	8,4	7,6	100,0			
		IV	N	44.348	38.967	6.691	7.881	97.887			
			%	45,3	39,8	6,8	8,1	100,0			
		V	N	13.070	9.964	2.416	2.450	27.901			
			%	46,8	35,7	8,7	8,8	100,0			
	>=75	Total	N	103.904	89.796	19.143	13.970	226.814			

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

		Muy de acuerdo		En desacuerdo		Muy en desacuerdo		Total
Ambos	>=75	Total	%	45,8	39,6	8,4	6,2	100,0
		I	N	5.538	2.544	706	750	9.538
			%	58,1	26,7	7,4	7,9	100,0
		II	N	4.927	8.309	655	841	14.731
			%	33,4	56,4	4,4	5,7	100,0
		III	N	23.877	19.832	2.914	3.014	49.638
			%	48,1	40,0	5,9	6,1	100,0
		IV	N	52.054	44.085	10.711	5.826	112.676
			%	46,2	39,1	9,5	5,2	100,0
		V	N	17.508	15.026	4.158	3.540	40.231
			%	43,5	37,3	10,3	8,8	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 77. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	Total	N	384.365	380.740	87.635	62.383	915.124
		%	42,0	41,6	9,6	6,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	86.764	88.386	15.734	19.715	210.600
		%	41,2	42,0	7,5	9,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	68.344	72.332	17.268	9.510	167.454
		%	40,8	43,2	10,3	5,7	100,0
	Secundaria, superior	N	148.717	153.424	34.619	23.910	360.670
		%	41,2	42,5	9,6	6,6	100,0
	Terciaria	N	80.541	66.598	20.014	9.247	176.400
		%	45,7	37,8	11,3	5,2	100,0
15-24	Total	N	34.556	45.421	7.274	7.207	94.458
		%	36,6	48,1	7,7	7,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.836	5.282	570	1.230	9.918
		%	28,6	53,3	5,7	12,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	11.525	15.331	1.544	2.729	31.129
		%	37,0	49,3	5,0	8,8	100,0
	Secundaria, superior	N	17.047	19.079	3.927	2.786	42.840
		%	39,8	44,5	9,2	6,5	100,0
	Terciaria	N	3.147	5.728	1.234	463	10.572
		%	29,8	54,2	11,7	4,4	100,0
25-44	Total	N	130.971	141.284	39.999	24.055	336.309
		%	38,9	42,0	11,9	7,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	12.630	16.083	3.474	5.589	37.776
		%	33,4	42,6	9,2	14,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	18.632	25.022	6.925	2.229	52.808
		%	35,3	47,4	13,1	4,2	100,0
	Secundaria, superior	N	64.208	70.971	17.228	11.867	164.274
		%	39,1	43,2	10,5	7,2	100,0
	Terciaria	N	35.502	29.207	12.371	4.371	81.451
		%	43,6	35,9	15,2	5,4	100,0
45-64	Total	N	133.501	125.713	25.206	18.236	302.655
		%	44,1	41,5	8,3	6,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	30.178	31.374	4.459	4.389	70.400
		%	42,9	44,6	6,3	6,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 77. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres 45-64	Secundaria, inferior	N	23.599	20.903	5.837	2.905	53.244
		%	44,3	39,3	11,0	5,5	100,0
	Secundaria, superior	N	50.245	48.903	10.536	7.447	117.130
		%	42,9	41,8	9,0	6,4	100,0
	Terciaria	N	29.479	24.533	4.374	3.495	61.881
		%	47,6	39,6	7,1	5,6	100,0
	65-74 Total	N	45.101	35.315	7.278	8.038	95.733
		%	47,1	36,9	7,6	8,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	15.853	14.617	2.489	5.058	38.017
		%	41,7	38,4	6,5	13,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	8.128	5.810	1.017	1.337	16.291
		%	49,9	35,7	6,2	8,2	100,0
Secundaria, superior	N	12.451	9.805	2.418	1.273	25.948	
	%	48,0	37,8	9,3	4,9	100,0	
Terciaria	N	8.669	5.083	1.355	370	15.477	
	%	56,0	32,8	8,8	2,4	100,0	
>=75 Total	N	40.236	33.007	7.879	4.846	85.968	
	%	46,8	38,4	9,2	5,6	100,0	
Sin estudios, primaria	N	25.267	21.030	4.743	3.449	54.489	
	%	46,4	38,6	8,7	6,3	100,0	
Secundaria, inferior	N	6.459	5.265	1.946	311	13.981	
	%	46,2	37,7	13,9	2,2	100,0	
Secundaria, superior	N	4.766	4.666	510	536	10.478	
	%	45,5	44,5	4,9	5,1	100,0	
Terciaria	N	3.744	2.046	681	549	7.020	
	%	53,3	29,1	9,7	7,8	100,0	
Mujeres Total	Total	N	436.738	383.434	88.486	67.225	975.882
		%	44,8	39,3	9,1	6,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	120.935	114.221	20.301	22.871	278.327
		%	43,5	41,0	7,3	8,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	79.466	62.005	16.076	12.220	169.766
		%	46,8	36,5	9,5	7,2	100,0
	Secundaria, superior	N	135.824	120.990	30.707	20.346	307.866
		%	44,1	39,3	10,0	6,6	100,0
	Terciaria	N	100.513	86.219	21.403	11.788	219.923

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 77. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	Total	Terciaria	% 45,7	39,2	9,7	5,4	100,0
	15-24	Total	N 38.459	34.578	7.522	8.939	89.499
			% 43,0	38,6	8,4	10,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N 4.684	4.346	1.034	1.323	11.386
			% 41,1	38,2	9,1	11,6	100,0
		Secundaria, inferior	N 8.238	5.744	1.219	1.561	16.763
			% 49,1	34,3	7,3	9,3	100,0
		Secundaria, superior	N 18.425	18.115	3.876	5.027	45.443
			% 40,5	39,9	8,5	11,1	100,0
		Terciaria	N 7.112	6.374	1.393	1.028	15.907
			% 44,7	40,1	8,8	6,5	100,0
	25-44	Total	N 128.997	137.009	33.503	21.317	320.826
			% 40,2	42,7	10,4	6,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N 9.351	13.684	1.383	1.572	25.990
			% 36,0	52,7	5,3	6,0	100,0
		Secundaria, inferior	N 16.236	15.242	4.641	2.817	38.937
			% 41,7	39,1	11,9	7,2	100,0
		Secundaria, superior	N 50.548	58.768	12.177	8.995	130.487
			% 38,7	45,0	9,3	6,9	100,0
		Terciaria	N 52.862	49.315	15.302	7.933	125.412
			% 42,2	39,3	12,2	6,3	100,0
	45-64	Total	N 152.786	114.462	26.911	19.610	313.769
			% 48,7	36,5	8,6	6,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N 32.912	32.302	6.169	6.580	77.963
			% 42,2	41,4	7,9	8,4	100,0
		Secundaria, inferior	N 30.860	20.867	4.844	5.165	61.735
			% 50,0	33,8	7,8	8,4	100,0
		Secundaria, superior	N 55.124	37.718	12.266	5.214	110.322
			% 50,0	34,2	11,1	4,7	100,0
		Terciaria	N 33.890	23.575	3.632	2.651	63.749
			% 53,2	37,0	5,7	4,2	100,0
	65-74	Total	N 52.526	40.393	9.186	7.820	109.925
			% 47,8	36,7	8,4	7,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N 28.464	23.751	4.475	5.162	61.852
			% 46,0	38,4	7,2	8,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 77. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total		
Mujeres	65-74	Secundaria, inferior	N	13.157	10.619	2.145	1.532	27.452	
			%	47,9	38,7	7,8	5,6	100,0	
		Secundaria, superior	N	6.568	2.670	1.706	950	11.893	
	%		55,2	22,4	14,3	8,0	100,0		
		Terciaria	N	4.336	3.353	861	176	8.727	
	%		49,7	38,4	9,9	2,0	100,0		
		>=75	Total	N	63.969	56.992	11.364	9.539	141.864
	%		45,1	40,2	8,0	6,7	100,0		
		Sin estudios, primaria	N	45.523	40.138	7.240	8.235	101.136	
	%		45,0	39,7	7,2	8,1	100,0		
		Secundaria, inferior	N	10.975	9.533	3.226	1.145	24.879	
	%		44,1	38,3	13,0	4,6	100,0		
		Secundaria, superior	N	5.158	3.720	682	160	9.720	
	%		53,1	38,3	7,0	1,6	100,0		
		Terciaria	N	2.312	3.601	215	.	6.129	
	%		37,7	58,8	3,5	.	100,0		
	Ambos	Total	Total	N	821.103	764.174	176.121	129.608	1.891.006
				%	43,4	40,4	9,3	6,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	207.698	202.607	36.035	42.587	488.927	
%			42,5	41,4	7,4	8,7	100,0		
		Secundaria, inferior	N	147.810	134.337	33.344	21.730	337.220	
%			43,8	39,8	9,9	6,4	100,0		
		Secundaria, superior	N	284.541	274.414	65.326	44.256	668.536	
%			42,6	41,0	9,8	6,6	100,0		
		Terciaria	N	181.054	152.816	41.417	21.036	396.323	
%			45,7	38,6	10,5	5,3	100,0		
		15-24	Total	N	73.016	79.999	14.796	16.147	183.958
%				39,7	43,5	8,0	8,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	7.520	9.628	1.603	2.553	21.304	
%			35,3	45,2	7,5	12,0	100,0		
		Secundaria, inferior	N	19.764	21.075	2.763	4.290	47.891	
%			41,3	44,0	5,8	9,0	100,0		
		Secundaria, superior	N	35.473	37.194	7.803	7.813	88.283	
%			40,2	42,1	8,8	8,9	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 77. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Ambos	15-24	Terciaria	N	10.259	12.102	2.627	1.491	26.479
			%	38,7	45,7	9,9	5,6	100,0
	25-44	Total	N	259.968	278.292	73.502	45.372	657.135
			%	39,6	42,3	11,2	6,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	21.981	29.767	4.858	7.160	63.765
			%	34,5	46,7	7,6	11,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	34.869	40.265	11.566	5.046	91.745
			%	38,0	43,9	12,6	5,5	100,0
		Secundaria, superior	N	114.756	129.739	29.405	20.862	294.762
			%	38,9	44,0	10,0	7,1	100,0
		Terciaria	N	88.364	78.522	27.673	12.304	206.862
			%	42,7	38,0	13,4	5,9	100,0
	45-64	Total	N	286.287	240.175	52.117	37.846	616.424
			%	46,4	39,0	8,5	6,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	63.090	63.676	10.628	10.969	148.363
			%	42,5	42,9	7,2	7,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	54.459	41.770	10.681	8.069	114.979
			%	47,4	36,3	9,3	7,0	100,0
		Secundaria, superior	N	105.369	86.621	22.802	12.661	227.452
			%	46,3	38,1	10,0	5,6	100,0
		Terciaria	N	63.369	48.108	8.006	6.146	125.630
			%	50,4	38,3	6,4	4,9	100,0
	65-74	Total	N	97.627	75.709	16.464	15.858	205.658
			%	47,5	36,8	8,0	7,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	44.317	38.369	6.963	10.220	99.869
			%	44,4	38,4	7,0	10,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	21.285	16.429	3.161	2.869	43.744
			%	48,7	37,6	7,2	6,6	100,0
		Secundaria, superior	N	19.020	12.475	4.124	2.223	37.841
			%	50,3	33,0	10,9	5,9	100,0
		Terciaria	N	13.006	8.436	2.216	546	24.204
			%	53,7	34,9	9,2	2,3	100,0
	>=75	Total	N	104.205	89.999	19.243	14.385	227.832
			%	45,7	39,5	8,4	6,3	100,0

(continuación)

Tabla 77. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Ambos	>=75	Sin estudios, primaria	N	70.791	61.168	11.983	11.684	155.625
			%	45,5	39,3	7,7	7,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	17.434	14.798	5.172	1.456	38.860
			%	44,9	38,1	13,3	3,7	100,0
		Secundaria, superior	N	9.924	8.385	1.192	696	20.198
			%	49,1	41,5	5,9	3,4	100,0
		Terciaria	N	6.056	5.647	896	549	13.149
			%	46,1	42,9	6,8	4,2	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	Total	CAPV	N	458.043	375.724	62.874	18.482	915.124
			%	50,1	41,1	6,9	2,0	100,0
		Araba	N	85.564	44.526	3.448	213	133.751
			%	64,0	33,3	2,6	0,2	100,0
		Gipuzkoa	N	164.984	111.037	13.196	4.594	293.812
			%	56,2	37,8	4,5	1,6	100,0
		Bizkaia	N	207.495	220.161	46.230	13.675	487.561
			%	42,6	45,2	9,5	2,8	100,0
	15-24	CAPV	N	45.134	44.560	4.200	564	94.458
			%	47,8	47,2	4,4	0,6	100,0
		Araba	N	9.801	5.068	.	.	14.869
			%	65,9	34,1	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	17.515	12.072	1.153	564	31.305
			%	56,0	38,6	3,7	1,8	100,0
		Bizkaia	N	17.818	27.420	3.046	.	48.284
			%	36,9	56,8	6,3	.	100,0
	25-44	CAPV	N	156.008	139.195	32.343	8.763	336.309
			%	46,4	41,4	9,6	2,6	100,0
		Araba	N	32.582	17.733	1.534	213	52.062
			%	62,6	34,1	2,9	0,4	100,0
		Gipuzkoa	N	61.889	37.378	5.640	1.882	106.790
			%	58,0	35,0	5,3	1,8	100,0
		Bizkaia	N	61.537	84.084	25.169	6.668	177.458
			%	34,7	47,4	14,2	3,8	100,0
	45-64	CAPV	N	156.989	123.825	15.803	6.039	302.655
			%	51,9	40,9	5,2	2,0	100,0
		Araba	N	27.821	13.798	1.132	.	42.751
			%	65,1	32,3	2,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	49.986	42.371	3.798	1.263	97.419
			%	51,3	43,5	3,9	1,3	100,0
		Bizkaia	N	79.183	67.655	10.872	4.775	162.485
			%	48,7	41,6	6,7	2,9	100,0
	65-74	CAPV	N	52.907	36.584	4.655	1.587	95.733
			%	55,3	38,2	4,9	1,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Hombres 65-74	Araba	N	8.818	4.158	187	.	13.163	
		%	67,0	31,6	1,4	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	19.842	10.741	1.111	436	32.130	
		%	61,8	33,4	3,5	1,4	100,0	
	Bizkaia	N	24.246	21.686	3.356	1.151	50.440	
		%	48,1	43,0	6,7	2,3	100,0	
	>=75	CAPV	N	47.005	31.561	5.873	1.529	85.968
			%	54,7	36,7	6,8	1,8	100,0
		Araba	N	6.542	3.768	595	.	10.905
			%	60,0	34,6	5,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	15.751	8.476	1.493	448	26.168
			%	60,2	32,4	5,7	1,7	100,0
Bizkaia		N	24.712	19.317	3.785	1.081	48.895	
		%	50,5	39,5	7,7	2,2	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N 491.519	390.980	72.781	20.603	975.882
			%	50,4	40,1	7,5	2,1	100,0
		Araba	N	83.521	46.783	6.116	352	136.772
			%	61,1	34,2	4,5	0,3	100,0
	Gipuzkoa	N	175.868	111.288	20.968	4.561	312.686	
		%	56,2	35,6	6,7	1,5	100,0	
	Bizkaia	N	232.130	232.909	45.697	15.690	526.425	
		%	44,1	44,2	8,7	3,0	100,0	
	15-24	CAPV	N	42.482	37.633	7.349	2.034	89.499
			%	47,5	42,0	8,2	2,3	100,0
		Araba	N	8.164	3.821	1.225	.	13.210
			%	61,8	28,9	9,3	.	100,0
Gipuzkoa		N	15.302	9.721	3.353	1.067	29.443	
		%	52,0	33,0	11,4	3,6	100,0	
Bizkaia		N	19.015	24.091	2.772	968	46.846	
		%	40,6	51,4	5,9	2,1	100,0	
25-44		CAPV	N	150.422	137.193	26.890	6.320	320.826
			%	46,9	42,8	8,4	2,0	100,0
		Araba	N	27.609	18.368	1.749	143	47.869
			%	57,7	38,4	3,7	0,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N 55.460	36.486	8.698	1.261	101.905	
			% 54,4	35,8	8,5	1,2	100,0	
		Bizkaia	N 67.353	82.339	16.443	4.916	171.052	
			% 39,4	48,1	9,6	2,9	100,0	
	45-64	CAPV	N 170.454	113.151	21.191	8.972	313.769	
			% 54,3	36,1	6,8	2,9	100,0	
		Araba	N 29.278	13.176	1.692	117	44.263	
			% 66,1	29,8	3,8	0,3	100,0	
		Gipuzkoa	N 56.702	36.046	5.073	1.841	99.662	
			% 56,9	36,2	5,1	1,8	100,0	
		Bizkaia	N 84.474	63.929	14.426	7.014	169.843	
			% 49,7	37,6	8,5	4,1	100,0	
65-74		CAPV	N 57.859	42.930	7.666	1.469	109.925	
			% 52,6	39,1	7,0	1,3	100,0	
		Araba	N 8.415	5.077	827	.	14.320	
			% 58,8	35,5	5,8	.	100,0	
	Gipuzkoa	N 22.831	11.735	1.312	242	36.120		
		% 63,2	32,5	3,6	0,7	100,0		
	Bizkaia	N 26.612	26.118	5.526	1.227	59.484		
		% 44,7	43,9	9,3	2,1	100,0		
	>=75	CAPV	N 70.301	60.073	9.684	1.807	141.864	
			% 49,6	42,3	6,8	1,3	100,0	
		Araba	N 10.053	6.341	623	93	17.110	
			% 58,8	37,1	3,6	0,5	100,0	
Gipuzkoa		N 25.572	17.301	2.532	149	45.555		
		% 56,1	38,0	5,6	0,3	100,0		
Bizkaia		N 34.675	36.431	6.529	1.565	79.200		
		% 43,8	46,0	8,2	2,0	100,0		
Ambos		Total	CAPV	N 949.562	766.704	135.655	39.085	1.891.006
			% 50,2	40,5	7,2	2,1	100,0	
		Araba	N 169.085	91.309	9.564	565	270.523	
			% 62,5	33,8	3,5	0,2	100,0	
	Gipuzkoa	N 340.852	222.326	34.165	9.155	606.497		
		% 56,2	36,7	5,6	1,5	100,0		
	Bizkaia	N 439.625	453.070	91.926	29.365	1.013.987		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

		Muy de acuerdo		En desacuerdo		Muy en desacuerdo		Total
Ambos	Total	Bizkaia	% 43,4	44,7	9,1	2,9	100,0	
	15-24	CAPV	N 87.616	82.193	11.549	2.599	183.958	
			% 47,6	44,7	6,3	1,4	100,0	
		Araba	N 17.965	8.890	1.225	.	28.079	
			% 64,0	31,7	4,4	.	100,0	
		Gipuzkoa	N 32.818	21.793	4.507	1.631	60.748	
			% 54,0	35,9	7,4	2,7	100,0	
		Bizkaia	N 36.833	51.511	5.818	968	95.130	
			% 38,7	54,1	6,1	1,0	100,0	
	25-44	CAPV	N 306.431	276.387	59.233	15.084	657.135	
			% 46,6	42,1	9,0	2,3	100,0	
		Araba	N 60.192	36.101	3.282	355	99.930	
			% 60,2	36,1	3,3	0,4	100,0	
		Gipuzkoa	N 117.350	73.863	14.338	3.144	208.695	
			% 56,2	35,4	6,9	1,5	100,0	
		Bizkaia	N 128.889	166.423	41.613	11.584	348.509	
			% 37,0	47,8	11,9	3,3	100,0	
	45-64	CAPV	N 327.444	236.976	36.994	15.011	616.424	
			% 53,1	38,4	6,0	2,4	100,0	
		Araba	N 57.099	26.974	2.825	117	87.015	
			% 65,6	31,0	3,2	0,1	100,0	
		Gipuzkoa	N 106.687	78.417	8.871	3.105	197.081	
			% 54,1	39,8	4,5	1,6	100,0	
		Bizkaia	N 163.657	131.584	25.298	11.789	332.328	
			% 49,2	39,6	7,6	3,5	100,0	
	65-74	CAPV	N 110.765	79.515	12.321	3.057	205.658	
			% 53,9	38,7	6,0	1,5	100,0	
		Araba	N 17.234	9.235	1.015	.	27.483	
			% 62,7	33,6	3,7	.	100,0	
		Gipuzkoa	N 42.674	22.475	2.424	678	68.251	
			% 62,5	32,9	3,6	1,0	100,0	
		Bizkaia	N 50.858	47.805	8.883	2.378	109.924	
			% 46,3	43,5	8,1	2,2	100,0	
	>=75	CAPV	N 117.306	91.634	15.557	3.336	227.832	
			% 51,5	40,2	6,8	1,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	>=75	Araba	N	16.595	10.109	1.217	93	28.015
			%	59,2	36,1	4,3	0,3	100,0
	Gipuzkoa	N	41.323	25.777	4.025	598	71.723	
		%	57,6	35,9	5,6	0,8	100,0	
	Bizkaia	N	59.387	55.747	10.315	2.645	128.094	
		%	46,4	43,5	8,1	2,1	100,0	

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

		Muy de acuerdo		En desacuerdo		Muy en desacuerdo		Total	
Hombres	Total	Total	N 457.386	N 375.121	N 62.874	N 18.482	N 913.863		
		%	50,0	41,0	6,9	2,0	100,0		
	I	N	60.553	43.883	7.215	2.039	113.690		
		%	53,3	38,6	6,3	1,8	100,0		
	II	N	39.078	33.745	5.057	326	78.206		
		%	50,0	43,1	6,5	0,4	100,0		
	III	N	97.633	75.902	13.173	1.646	188.355		
		%	51,8	40,3	7,0	0,9	100,0		
	IV	N	223.890	185.166	28.142	13.108	450.306		
		%	49,7	41,1	6,2	2,9	100,0		
	V	N	36.232	36.425	9.289	1.362	83.307		
		%	43,5	43,7	11,1	1,6	100,0		
	15-24	Total	N 44.576	N 44.560	N 4.200	N 564	N 93.900		
		%	47,5	47,5	4,5	0,6	100,0		
	I	N	8.695	5.600	339	.	14.634		
		%	59,4	38,3	2,3	.	100,0		
	II	N	5.078	5.567	343	.	10.988		
		%	46,2	50,7	3,1	.	100,0		
	III	N	7.043	8.837	950	.	16.830		
		%	41,8	52,5	5,6	.	100,0		
	IV	N	20.726	20.239	1.207	564	42.737		
		%	48,5	47,4	2,8	1,3	100,0		
	V	N	3.034	4.317	1.360	.	8.711		
		%	34,8	49,6	15,6	.	100,0		
	25-44	Total	N 156.008	N 139.195	N 32.343	N 8.763	N 336.309		
		%	46,4	41,4	9,6	2,6	100,0		
	I	N	18.922	19.011	4.767	1.032	43.732		
		%	43,3	43,5	10,9	2,4	100,0		
	II	N	18.736	10.177	3.584	.	32.496		
		%	57,7	31,3	11,0	.	100,0		
	III	N	28.924	27.000	5.469	864	62.257		
		%	46,5	43,4	8,8	1,4	100,0		
	IV	N	73.945	65.447	14.556	6.444	160.392		
		%	46,1	40,8	9,1	4,0	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	25-44 V	N	15.482	17.560	3.967	424	37.432
		%	41,4	46,9	10,6	1,1	100,0
45-64	Total	N	156.890	123.636	15.803	6.039	302.368
		%	51,9	40,9	5,2	2,0	100,0
	I	N	23.261	12.882	1.308	456	37.907
		%	61,4	34,0	3,5	1,2	100,0
	II	N	10.110	12.237	747	326	23.419
		%	43,2	52,2	3,2	1,4	100,0
	III	N	35.800	26.742	3.779	.	66.322
		%	54,0	40,3	5,7	.	100,0
	IV	N	76.617	61.793	7.815	4.389	150.614
		%	50,9	41,0	5,2	2,9	100,0
	V	N	11.102	9.982	2.154	867	24.106
		%	46,1	41,4	8,9	3,6	100,0
65-74	Total	N	52.907	36.584	4.655	1.587	95.733
		%	55,3	38,2	4,9	1,7	100,0
	I	N	7.671	5.600	350	133	13.753
		%	55,8	40,7	2,5	1,0	100,0
	II	N	3.557	3.102	204	.	6.862
		%	51,8	45,2	3,0	.	100,0
	III	N	13.488	5.482	2.164	643	21.777
		%	61,9	25,2	9,9	3,0	100,0
	IV	N	25.327	19.958	1.727	740	47.753
		%	53,0	41,8	3,6	1,6	100,0
	V	N	2.864	2.442	211	71	5.588
		%	51,3	43,7	3,8	1,3	100,0
>=75	Total	N	47.005	31.146	5.873	1.529	85.553
		%	54,9	36,4	6,9	1,8	100,0
	I	N	2.004	790	451	419	3.663
		%	54,7	21,6	12,3	11,4	100,0
	II	N	1.598	2.662	180	.	4.440
		%	36,0	60,0	4,0	.	100,0
	III	N	12.378	7.842	810	140	21.169
		%	58,5	37,0	3,8	0,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Hombres	>=75	IV	N 27.275	17.728	2.836	971	48.810	
			% 55,9	36,3	5,8	2,0	100,0	
		V	N 3.750	2.124	1.597	.	7.470	
			% 50,2	28,4	21,4	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N 490.714	389.498	72.678	20.603	973.492	
			% 50,4	40,0	7,5	2,1	100,0	
	I	N	51.160	41.024	12.134	520	104.838	
		%	48,8	39,1	11,6	0,5	100,0	
	II	N	53.034	35.835	3.691	2.467	95.028	
		%	55,8	37,7	3,9	2,6	100,0	
	III	N	126.805	93.745	17.585	3.972	242.107	
		%	52,4	38,7	7,3	1,6	100,0	
	IV	N	174.129	153.720	22.957	9.636	360.441	
		%	48,3	42,6	6,4	2,7	100,0	
	V	N	85.585	65.174	16.311	4.007	171.077	
		%	50,0	38,1	9,5	2,3	100,0	
	15-24	Total	N	42.233	36.917	7.349	2.034	88.533
			%	47,7	41,7	8,3	2,3	100,0
	I	N	7.522	6.076	963	.	14.562	
		%	51,7	41,7	6,6	.	100,0	
	II	N	8.283	3.416	909	889	13.497	
		%	61,4	25,3	6,7	6,6	100,0	
	III	N	8.595	9.666	1.809	.	20.069	
		%	42,8	48,2	9,0	.	100,0	
	IV	N	13.252	15.106	2.367	889	31.614	
		%	41,9	47,8	7,5	2,8	100,0	
V	N	4.581	2.654	1.301	256	8.792		
	%	52,1	30,2	14,8	2,9	100,0		
25-44	Total	N	150.422	136.698	26.890	6.320	320.330	
		%	47,0	42,7	8,4	2,0	100,0	
I	N	18.708	19.790	6.587	.	45.086		
	%	41,5	43,9	14,6	.	100,0		
II	N	20.436	14.715	1.370	702	37.223		
	%	54,9	39,5	3,7	1,9	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Mujeres	25-44	III	N	39.427	34.429	5.793	2.380	82.029
			%	48,1	42,0	7,1	2,9	100,0
		IV	N	48.601	50.789	8.406	2.929	110.725
			%	43,9	45,9	7,6	2,6	100,0
		V	N	23.250	16.974	4.734	309	45.267
			%	51,4	37,5	10,5	0,7	100,0
	45-64	Total	N	170.454	112.980	21.191	8.972	313.598
			%	54,4	36,0	6,8	2,9	100,0
	I	N	17.624	10.700	3.438	354	32.116	
		%	54,9	33,3	10,7	1,1	100,0	
	II	N	15.981	9.889	583	339	26.792	
		%	59,6	36,9	2,2	1,3	100,0	
	III	N	50.339	29.962	6.934	1.405	88.641	
		%	56,8	33,8	7,8	1,6	100,0	
	IV	N	56.382	37.663	5.899	4.158	104.102	
		%	54,2	36,2	5,7	4,0	100,0	
	V	N	30.129	24.765	4.336	2.716	61.946	
		%	48,6	40,0	7,0	4,4	100,0	
	65-74	Total	N	57.704	42.930	7.666	1.469	109.770
			%	52,6	39,1	7,0	1,3	100,0
	I	N	3.410	2.645	1.145	.	7.199	
		%	47,4	36,7	15,9	.	100,0	
	II	N	3.612	3.187	249	176	7.225	
		%	50,0	44,1	3,5	2,4	100,0	
III	N	12.946	8.366	1.400	187	22.899		
	%	56,5	36,5	6,1	0,8	100,0		
IV	N	26.030	21.367	2.357	380	50.134		
	%	51,9	42,6	4,7	0,8	100,0		
V	N	11.706	7.365	2.515	726	22.312		
	%	52,5	33,0	11,3	3,3	100,0		
>=75	Total	N	69.900	59.973	9.581	1.807	141.261	
		%	49,5	42,5	6,8	1,3	100,0	
I	N	3.896	1.813	.	166	5.875		
	%	66,3	30,9	.	2,8	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	>=75	II	N 4.723	4.627	580	361	10.292
			% 45,9	45,0	5,6	3,5	100,0
		III	N 15.498	11.323	1.648	.	28.468
			% 54,4	39,8	5,8	.	100,0
		IV	N 29.864	28.795	3.927	1.280	63.866
			% 46,8	45,1	6,1	2,0	100,0
		V	N 15.920	13.415	3.425	.	32.760
		% 48,6	40,9	10,5	.	100,0	
	Total	Total	N 948.100	764.619	135.552	39.085	1.887.356
		% 50,2	40,5	7,2	2,1	100,0	
		I	N 111.713	84.907	19.348	2.560	218.528
		% 51,1	38,9	8,9	1,2	100,0	
		II	N 92.112	69.580	8.748	2.794	173.234
		% 53,2	40,2	5,0	1,6	100,0	
		III	N 224.439	169.647	30.757	5.619	430.462
		% 52,1	39,4	7,1	1,3	100,0	
		IV	N 398.019	338.886	51.099	22.744	810.747
		% 49,1	41,8	6,3	2,8	100,0	
	V	N 121.817	101.599	25.600	5.369	254.385	
	% 47,9	39,9	10,1	2,1	100,0		
15-24	Total	N 86.809	81.477	11.549	2.599	182.434	
		% 47,6	44,7	6,3	1,4	100,0	
		I	N 16.217	11.676	1.303	.	29.196
		% 55,5	40,0	4,5	.	100,0	
		II	N 13.361	8.983	1.251	889	24.485
		% 54,6	36,7	5,1	3,6	100,0	
		III	N 15.638	18.503	2.759	.	36.900
		% 42,4	50,1	7,5	.	100,0	
		IV	N 33.978	35.345	3.575	1.453	74.351
		% 45,7	47,5	4,8	2,0	100,0	
		V	N 7.614	6.971	2.661	256	17.503
		% 43,5	39,8	15,2	1,5	100,0	
		Total	N 306.431	275.892	59.233	15.084	656.640
		% 46,7	42,0	9,0	2,3	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	25-44	I	N 37.630	38.802	11.354	1.032	88.818
			% 42,4	43,7	12,8	1,2	100,0
		II	N 39.172	24.892	4.954	702	69.719
			% 56,2	35,7	7,1	1,0	100,0
		III	N 68.351	61.429	11.262	3.244	144.286
			% 47,4	42,6	7,8	2,2	100,0
		IV	N 122.546	116.236	22.962	9.373	271.117
			% 45,2	42,9	8,5	3,5	100,0
		V	N 38.731	34.534	8.701	733	82.699
			% 46,8	41,8	10,5	0,9	100,0
	45-64	Total	N 327.345	236.616	36.994	15.011	615.965
			% 53,1	38,4	6,0	2,4	100,0
		I	N 40.885	23.582	4.746	810	70.023
			% 58,4	33,7	6,8	1,2	100,0
		II	N 26.091	22.126	1.330	665	50.212
			% 52,0	44,1	2,6	1,3	100,0
		III	N 86.140	56.704	10.713	1.405	154.963
			% 55,6	36,6	6,9	0,9	100,0
		IV	N 132.998	99.456	13.714	8.548	254.716
			% 52,2	39,0	5,4	3,4	100,0
		V	N 41.231	34.748	6.491	3.583	86.052
			% 47,9	40,4	7,5	4,2	100,0
	65-74	Total	N 110.610	79.515	12.321	3.057	205.503
			% 53,8	38,7	6,0	1,5	100,0
		I	N 11.081	8.244	1.494	133	20.952
			% 52,9	39,3	7,1	0,6	100,0
		II	N 7.168	6.290	453	176	14.087
			% 50,9	44,6	3,2	1,3	100,0
		III	N 26.434	13.847	3.564	830	44.676
			% 59,2	31,0	8,0	1,9	100,0
		IV	N 51.357	41.325	4.085	1.120	97.887
			% 52,5	42,2	4,2	1,1	100,0
		V	N 14.570	9.808	2.725	798	27.901
			% 52,2	35,2	9,8	2,9	100,0
	>=75	Total	N 116.905	91.119	15.454	3.336	226.814

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Ambos	>=75	Total	%	51,5	40,2	6,8	1,5	100,0
		I	N	5.899	2.603	451	585	9.538
			%	61,8	27,3	4,7	6,1	100,0
		II	N	6.321	7.290	760	361	14.731
			%	42,9	49,5	5,2	2,4	100,0
		III	N	27.876	19.164	2.458	140	49.638
			%	56,2	38,6	5,0	0,3	100,0
		IV	N	57.139	46.523	6.763	2.250	112.676
			%	50,7	41,3	6,0	2,0	100,0
		V	N	19.670	15.539	5.022	.	40.231
			%	48,9	38,6	12,5	.	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 80. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

		Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres Total	Total	N 458.043	375.724	62.874	18.482	915.124
		% 50,1	41,1	6,9	2,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N 107.687	87.918	11.608	3.387	210.600
		% 51,1	41,7	5,5	1,6	100,0
	Secundaria, inferior	N 76.911	73.563	13.048	3.932	167.454
		% 45,9	43,9	7,8	2,3	100,0
	Secundaria, superior	N 177.239	147.879	25.778	9.775	360.670
		% 49,1	41,0	7,1	2,7	100,0
	Terciaria	N 96.206	66.365	12.441	1.389	176.400
		% 54,5	37,6	7,1	0,8	100,0
15-24	Total	N 45.134	44.560	4.200	564	94.458
		% 47,8	47,2	4,4	0,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N 3.858	5.445	291	324	9.918
		% 38,9	54,9	2,9	3,3	100,0
	Secundaria, inferior	N 14.168	14.755	1.965	240	31.129
		% 45,5	47,4	6,3	0,8	100,0
	Secundaria, superior	N 21.035	19.861	1.944	.	42.840
		% 49,1	46,4	4,5	.	100,0
	Terciaria	N 6.073	4.499	.	.	10.572
		% 57,4	42,6	.	.	100,0
25-44	Total	N 156.008	139.195	32.343	8.763	336.309
		% 46,4	41,4	9,6	2,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N 15.205	18.633	3.739	199	37.776
		% 40,2	49,3	9,9	0,5	100,0
	Secundaria, inferior	N 20.212	25.403	6.193	1.001	52.808
		% 38,3	48,1	11,7	1,9	100,0
	Secundaria, superior	N 77.909	65.215	14.099	7.052	164.274
		% 47,4	39,7	8,6	4,3	100,0
	Terciaria	N 42.683	29.944	8.312	511	81.451
		% 52,4	36,8	10,2	0,6	100,0
45-64	Total	N 156.989	123.825	15.803	6.039	302.655
		% 51,9	40,9	5,2	2,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N 37.418	29.079	2.574	1.329	70.400
		% 53,2	41,3	3,7	1,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 80. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres 45-64	Secundaria, inferior	N	25.609	22.327	2.973	2.336	53.244
		%	48,1	41,9	5,6	4,4	100,0
	Secundaria, superior	N	58.976	48.628	7.479	2.047	117.130
		%	50,4	41,5	6,4	1,7	100,0
	Terciaria	N	34.987	23.791	2.777	326	61.881
		%	56,5	38,4	4,5	0,5	100,0
	65-74 Total	N	52.907	36.584	4.655	1.587	95.733
		%	55,3	38,2	4,9	1,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	21.094	14.119	1.785	1.019	38.017
		%	55,5	37,1	4,7	2,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	9.782	5.944	494	71	16.291
		%	60,0	36,5	3,0	0,4	100,0
Secundaria, superior	N	12.971	11.036	1.577	365	25.948	
	%	50,0	42,5	6,1	1,4	100,0	
Terciaria	N	9.059	5.486	800	133	15.477	
	%	58,5	35,4	5,2	0,9	100,0	
>=75 Total	N	47.005	31.561	5.873	1.529	85.968	
	%	54,7	36,7	6,8	1,8	100,0	
Sin estudios, primaria	N	30.113	20.641	3.219	517	54.489	
	%	55,3	37,9	5,9	0,9	100,0	
Secundaria, inferior	N	7.140	5.134	1.423	283	13.981	
	%	51,1	36,7	10,2	2,0	100,0	
Secundaria, superior	N	6.348	3.140	680	310	10.478	
	%	60,6	30,0	6,5	3,0	100,0	
Terciaria	N	3.404	2.646	552	419	7.020	
	%	48,5	37,7	7,9	6,0	100,0	
Mujeres Total	Total	N	491.519	390.980	72.781	20.603	975.882
		%	50,4	40,1	7,5	2,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	137.055	120.934	16.116	4.222	278.327
		%	49,2	43,5	5,8	1,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	88.675	63.874	13.911	3.307	169.766
		%	52,2	37,6	8,2	1,9	100,0
	Secundaria, superior	N	149.407	126.141	25.774	6.545	307.866
		%	48,5	41,0	8,4	2,1	100,0
	Terciaria	N	116.383	80.032	16.980	6.529	219.923

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 80. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	Total	Terciaria	% 52,9	36,4	7,7	3,0	100,0
	15-24	Total	N 42.482	37.633	7.349	2.034	89.499
			% 47,5	42,0	8,2	2,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N 5.641	4.858	887	.	11.386
			% 49,5	42,7	7,8	.	100,0
		Secundaria, inferior	N 7.960	7.321	1.482	.	16.763
			% 47,5	43,7	8,8	.	100,0
		Secundaria, superior	N 21.409	20.377	2.562	1.096	45.443
			% 47,1	44,8	5,6	2,4	100,0
		Terciaria	N 7.473	5.077	2.418	939	15.907
			% 47,0	31,9	15,2	5,9	100,0
	25-44	Total	N 150.422	137.193	26.890	6.320	320.826
			% 46,9	42,8	8,4	2,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N 11.792	12.598	1.599	.	25.990
			% 45,4	48,5	6,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	N 19.324	15.068	4.544	.	38.937
			% 49,6	38,7	11,7	.	100,0
		Secundaria, superior	N 56.913	60.394	10.461	2.719	130.487
			% 43,6	46,3	8,0	2,1	100,0
		Terciaria	N 62.393	49.133	10.285	3.601	125.412
			% 49,8	39,2	8,2	2,9	100,0
	45-64	Total	N 170.454	113.151	21.191	8.972	313.769
			% 54,3	36,1	6,8	2,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N 37.687	35.158	2.839	2.280	77.963
			% 48,3	45,1	3,6	2,9	100,0
		Secundaria, inferior	N 35.402	19.451	4.106	2.776	61.735
			% 57,3	31,5	6,7	4,5	100,0
		Secundaria, superior	N 58.100	39.334	10.784	2.104	110.322
			% 52,7	35,7	9,8	1,9	100,0
		Terciaria	N 39.265	19.207	3.463	1.812	63.749
			% 61,6	30,1	5,4	2,8	100,0
	65-74	Total	N 57.859	42.930	7.666	1.469	109.925
			% 52,6	39,1	7,0	1,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N 31.344	25.759	3.783	966	61.852
			% 50,7	41,6	6,1	1,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 80. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total		
Mujeres	65-74	Secundaria, inferior	N	14.337	11.026	1.949	140	27.452	
			%	52,2	40,2	7,1	0,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	7.594	2.662	1.450	187	11.893	
			%	63,9	22,4	12,2	1,6	100,0	
		Terciaria	N	4.584	3.483	484	176	8.727	
			%	52,5	39,9	5,5	2,0	100,0	
	>=75	Total	N	70.301	60.073	9.684	1.807	141.864	
			%	49,6	42,3	6,8	1,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	50.591	42.561	7.008	976	101.136	
			%	50,0	42,1	6,9	1,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	11.651	11.007	1.830	391	24.879	
			%	46,8	44,2	7,4	1,6	100,0	
	Secundaria, superior	N	5.390	3.373	517	439	9.720		
		%	55,5	34,7	5,3	4,5	100,0		
	Terciaria	N	2.669	3.132	329	.	6.129		
		%	43,5	51,1	5,4	.	100,0		
	Ambos	Total	Total	N	949.562	766.704	135.655	39.085	1.891.006
				%	50,2	40,5	7,2	2,1	100,0
Sin estudios, primaria		N	244.743	208.851	27.724	7.609	488.927		
		%	50,1	42,7	5,7	1,6	100,0		
Secundaria, inferior		N	165.585	137.437	26.959	7.239	337.220		
		%	49,1	40,8	8,0	2,1	100,0		
Secundaria, superior		N	326.646	274.019	51.551	16.319	668.536		
		%	48,9	41,0	7,7	2,4	100,0		
Terciaria		N	212.588	146.397	29.421	7.917	396.323		
		%	53,6	36,9	7,4	2,0	100,0		
15-24		Total	N	87.616	82.193	11.549	2.599	183.958	
			%	47,6	44,7	6,3	1,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	9.499	10.304	1.178	324	21.304	
			%	44,6	48,4	5,5	1,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	22.128	22.076	3.447	240	47.891	
			%	46,2	46,1	7,2	0,5	100,0	
Secundaria, superior		N	42.444	40.237	4.506	1.096	88.283		
		%	48,1	45,6	5,1	1,2	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 80. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Ambos	15-24	Terciaria	N	13.546	9.576	2.418	939	26.479
			%	51,2	36,2	9,1	3,5	100,0
	25-44	Total	N	306.431	276.387	59.233	15.084	657.135
			%	46,6	42,1	9,0	2,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	26.997	31.231	5.338	199	63.765
			%	42,3	49,0	8,4	0,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	39.536	40.471	10.737	1.001	91.745
			%	43,1	44,1	11,7	1,1	100,0
		Secundaria, superior	N	134.822	125.609	24.560	9.771	294.762
			%	45,7	42,6	8,3	3,3	100,0
		Terciaria	N	105.076	79.076	18.598	4.112	206.862
			%	50,8	38,2	9,0	2,0	100,0
	45-64	Total	N	327.444	236.976	36.994	15.011	616.424
			%	53,1	38,4	6,0	2,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	75.105	64.237	5.413	3.609	148.363
			%	50,6	43,3	3,6	2,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	61.010	41.778	7.078	5.112	114.979
			%	53,1	36,3	6,2	4,4	100,0
		Secundaria, superior	N	117.076	87.962	18.263	4.151	227.452
			%	51,5	38,7	8,0	1,8	100,0
		Terciaria	N	74.252	42.998	6.241	2.139	125.630
			%	59,1	34,2	5,0	1,7	100,0
	65-74	Total	N	110.765	79.515	12.321	3.057	205.658
			%	53,9	38,7	6,0	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	52.438	39.878	5.568	1.985	99.869
			%	52,5	39,9	5,6	2,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	24.119	16.970	2.443	211	43.744
			%	55,1	38,8	5,6	0,5	100,0
		Secundaria, superior	N	20.565	13.698	3.026	552	37.841
			%	54,3	36,2	8,0	1,5	100,0
		Terciaria	N	13.643	8.969	1.284	309	24.204
			%	56,4	37,1	5,3	1,3	100,0
>=75	Total		N	117.306	91.634	15.557	3.336	227.832
			%	51,5	40,2	6,8	1,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 80. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total	
Ambos	>=75	Sin estudios, primaria	N	80.704	63.201	10.227	1.493	155.625
			%	51,9	40,6	6,6	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	18.792	16.142	3.253	674	38.860
			%	48,4	41,5	8,4	1,7	100,0
		Secundaria, superior	N	11.738	6.513	1.197	750	20.198
			%	58,1	32,2	5,9	3,7	100,0
		Terciaria	N	6.072	5.777	880	419	13.149
			%	46,2	43,9	6,7	3,2	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Discriminación

Tabla 81. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas (por su edad, sexo, lugar de nacimiento, ...) por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	4,7	5,1	4,8	4,5
	15-24	4,5	5,7	4,0	4,4
	25-44	5,6	7,2	5,7	5,1
	45-64	5,6	5,1	6,3	5,3
	65-74	1,6	0,0	0,6	2,7
	>=75	1,1	0,0	1,3	1,2
	Mujeres	Total	6,5	7,1	6,0
	15-24	7,8	10,5	4,5	9,2
	25-44	10,8	12,7	10,0	10,8
	45-64	5,3	3,4	6,6	5,1
	65-74	2,2	2,6	0,7	3,0
	>=75	1,6	1,8	1,2	1,9
Ambos sexos	Total	5,6	6,1	5,4	5,6
	15-24	6,1	7,9	4,2	6,8
	25-44	8,2	9,8	7,8	7,9
	45-64	5,5	4,2	6,5	5,2
	65-74	1,9	1,4	0,7	2,9
	>=75	1,4	1,1	1,2	1,6

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Discriminación

Tabla 82. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas (por su edad, sexo, lugar de nacimiento, ...) por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	4,7	3,6	3,6	4,4	4,4	8,9
	15-24	4,5	5,2	0,0	4,9	4,5	8,3
	25-44	5,6	2,7	5,9	4,7	4,9	13,2
	45-64	5,6	4,9	1,7	5,6	6,2	7,3
	65-74	1,6	2,2	6,7	1,6	1,0	0,0
	>=75	1,1	0,0	0,0	2,3	0,9	0,0
	Mujeres	Total	6,4	5,2	9,4	6,4	6,1
	15-24	7,6	3,3	9,8	6,6	7,5	14,1
	25-44	10,8	5,4	13,3	12,4	10,4	12,2
	45-64	5,3	7,9	9,9	3,6	4,9	5,3
	65-74	2,2	0,0	0,0	2,4	3,1	1,3
	>=75	1,6	0,0	0,0	1,0	2,4	1,5
Ambos sexos	Total	5,6	4,4	6,8	5,5	5,2	7,2
	15-24	6,0	4,3	5,4	5,8	5,8	11,2
	25-44	8,1	4,1	9,9	9,0	7,2	12,6
	45-64	5,5	6,2	6,1	4,5	5,6	5,8
	65-74	1,9	1,4	3,3	2,0	2,1	1,1
	>=75	1,4	0,0	0,0	1,6	1,8	1,2

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Discriminación

Tabla 83. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas (por su edad, sexo, lugar de nacimiento, ...) por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	4,7	4,3	5,1	4,6	4,8
	15-24	4,5	5,5	4,1	3,9	6,9
	25-44	5,6	10,4	7,0	4,6	4,5
	45-64	5,6	5,0	5,8	5,8	5,8
	65-74	1,6	0,9	2,8	1,0	3,4
	>=75	1,1	1,5	0,0	1,2	0,0
Mujeres	Total	6,5	4,2	5,1	7,8	8,5
	15-24	7,8	14,0	7,5	6,4	7,9
	25-44	10,8	12,0	9,4	12,0	9,8
	45-64	5,3	4,8	4,2	4,8	8,1
	65-74	2,2	2,7	2,0	1,6	0,0
	>=75	1,6	1,5	2,3	1,8	0,0
Ambos sexos	Total	5,6	4,2	5,1	6,1	6,9
	15-24	6,1	10,0	5,3	5,2	7,5
	25-44	8,2	11,1	8,0	7,9	7,7
	45-64	5,5	4,9	4,9	5,3	6,9
	65-74	1,9	2,0	2,3	1,2	2,2
	>=75	1,4	1,5	1,5	1,5	0,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Discriminación

Tabla 84. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el ámbito en el que se produce la discriminación por sexo y edad

	Hombres						Mujeres					
	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Buscando trabajo	2,2	1,5	3,1	2,8	0,0	0,0	2,4	3,7	4,5	1,8	0,0	0,0
En el lugar de trabajo o estudios	2,2	3,1	3,0	2,5	0,0	0,0	2,9	2,9	5,6	2,6	0,0	0,0
En casa, por su pareja	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,7	0,1	0,3
En casa, por otra persona	0,3	1,0	0,4	0,0	0,3	0,3	0,4	1,9	0,1	0,5	0,1	0,4
En asistencia sanitaria	0,3	0,3	0,2	0,4	0,6	0,3	0,8	0,2	1,4	0,6	0,6	0,3
En sitio público	1,8	2,3	2,4	1,6	0,9	0,6	2,5	4,6	3,4	1,9	1,5	1,1

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Discriminación

Tabla 85. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el ámbito en el que se produce la discriminación por sexo, edad y territorio histórico

	Hombres			Mujeres		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Buscando trabajo	2,7	1,3	2,6	2,5	1,9	2,7
En el lugar de trabajo o estudios	2,6	2,5	1,9	3,6	2,9	2,8
En casa, por su pareja	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5
En casa, por otra persona	0,1	0,2	0,4	0,3	0,5	0,5
En asistencia sanitaria	0,5	0,4	0,2	0,4	1,0	0,7
En sitio público	2,8	2,7	0,9	2,1	1,8	3,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Discriminación

Tabla 86. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el ámbito en el que se produce la discriminación por sexo y clase social

	Hombres					Mujeres				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Buscando trabajo	0,7	1,2	1,7	2,3	6,0	2,2	2,8	1,6	2,7	2,6
En el lugar de trabajo o estudios	1,5	1,7	1,5	2,4	4,1	3,1	5,1	3,4	2,2	2,5
En casa, por su pareja	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3	0,5	0,0	0,5	0,3	0,6
En casa, por otra persona	0,3	0,0	0,6	0,2	1,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,4
En asistencia sanitaria	0,3	0,7	0,3	0,2	0,8	1,7	1,5	0,8	0,5	0,4
En sitio público	1,3	0,7	1,2	1,8	4,9	1,6	2,8	2,3	2,8	2,4

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Discriminación

Tabla 87. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el ámbito en el que se produce la discriminación por sexo y nivel de estudios*

	Hombres				Mujeres			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Buscando trabajo	2,4	2,1	2,4	1,9	0,8	2,5	3,7	2,5
En el lugar de trabajo o estudios	2,0	1,9	2,4	2,4	1,1	1,4	4,1	4,8
En casa, por su pareja	0,0	0,2	0,3	0,0	0,4	0,4	0,3	0,5
En casa, por otra persona	0,5	0,5	0,2	0,1	0,4	0,4	0,7	0,2
En asistencia sanitaria	0,6	0,1	0,3	0,2	1,1	0,4	0,3	1,4
En sitio público	1,5	2,5	1,8	1,4	1,8	2,1	3,0	2,9

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Discriminación

Tabla 88. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el motivo de la discriminación por sexo y edad

	Hombres						Mujeres					
	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Por edad	1,1	1,8	0,5	1,9	0,6	0,3	2,3	3,8	3,2	1,9	0,4	1,5
Por sexo	0,3	1,0	0,1	0,4	0,0	0,0	1,9	2,6	3,4	1,6	0,4	0,2
Por etnia, lugar de nacimiento	0,8	0,8	1,3	0,7	0,3	0,0	1,5	2,5	3,3	0,6	0,4	0,0
Por clase social	1,5	1,3	2,7	1,0	0,2	0,0	1,5	2,8	2,7	0,9	0,4	0,1
Por lengua	1,0	1,0	1,5	1,0	0,6	0,0	1,4	1,5	2,5	1,1	0,4	0,0
Por ideas políticas	0,7	1,3	0,7	0,7	0,3	0,0	0,9	2,0	1,5	0,5	0,1	0,0
Por religión	0,4	0,8	0,8	0,2	0,0	0,0	0,3	0,8	0,6	0,1	0,0	0,0
Por orientación sexual	0,2	0,8	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Por discapacidad	0,5	0,2	0,7	0,5	0,0	0,6	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,0
Por enfermedad	0,4	0,0	0,4	0,5	0,4	0,3	0,6	0,4	0,9	0,6	0,5	0,2

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Discriminación

Tabla 89. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el motivo de la discriminación por sexo y territorio histórico

	Hombres			Mujeres		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Por edad	1,0	0,7	1,4	2,4	1,9	2,5
Por sexo	0,3	0,2	0,3	2,2	1,1	2,3
Por etnia, lugar de nacimiento	1,9	0,6	0,6	2,0	0,8	1,9
Por clase social	1,8	1,6	1,3	1,7	1,7	1,3
Por lengua	1,1	1,5	0,7	1,4	1,9	1,1
Por ideas políticas	1,3	0,7	0,5	1,0	0,8	0,9
Por religión	1,0	0,5	0,3	0,1	0,1	0,4
Por orientación sexual	0,2	0,4	0,0	0,1	0,0	0,1
Por discapacidad	0,7	0,5	0,4	0,1	0,3	0,5
Por enfermedad	0,7	0,4	0,3	0,9	0,5	0,6

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Discriminación

Tabla 90. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el motivo de la discriminación por sexo y clase social

	Hombres					Mujeres				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Por edad	0,3	0,5	1,1	1,4	1,2	2,2	1,8	2,5	2,3	2,3
Por sexo	0,4	0,0	0,3	0,2	1,0	2,6	3,6	2,4	1,3	1,0
Por etnia, lugar de nacimiento	0,1	0,0	0,2	1,1	2,5	1,4	0,3	1,3	1,6	2,4
Por clase social	0,3	1,6	1,3	1,5	3,4	0,6	3,0	1,4	1,4	1,5
Por lengua	1,3	1,4	1,6	0,6	1,4	1,3	1,9	1,2	1,4	1,2
Por ideas políticas	1,1	0,9	0,6	0,5	1,1	1,2	1,1	1,4	0,7	0,2
Por religión	0,6	0,0	0,5	0,3	1,2	0,1	0,6	0,5	0,0	0,5
Por orientación sexual	0,3	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Por discapacidad	0,0	0,0	0,3	0,6	1,2	0,6	0,6	0,4	0,2	0,3
Por enfermedad	0,4	0,3	0,2	0,3	1,2	0,0	1,0	0,5	0,9	0,3

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Discriminación

Tabla 91. Proporción (%) de personas que se sienten discriminadas según el motivo de la discriminación por sexo y nivel de estudios*

	Hombres				Mujeres			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Por edad	0,7	1,2	1,5	0,6	1,7	2,2	2,5	2,8
Por sexo	0,0	0,4	0,3	0,4	0,5	0,7	2,6	3,8
Por etnia, lugar de nacimiento	0,8	1,0	0,8	0,6	1,1	0,8	2,1	1,8
Por clase social	1,7	1,4	1,3	1,5	0,7	1,6	1,7	2,1
Por lengua	0,6	0,8	1,1	1,6	0,5	1,5	1,7	1,9
Por ideas políticas	0,5	0,9	0,7	0,8	0,2	0,2	1,2	1,8
Por religión	0,5	0,0	0,7	0,2	0,1	0,1	0,3	0,7
Por orientación sexual	0,1	0,2	0,1	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0
Por discapacidad	0,4	0,8	0,5	0,4	0,3	0,9	0,2	0,3
Por enfermedad	0,5	0,6	0,2	0,5	0,6	0,5	0,8	0,4

Factores psicosociales Apoyo social

Tabla 92. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=18) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	28,9	5,6	30,0	26,0	33,0
		Araba	30,0	4,4	31,0	27,0	35,0
		Gipuzkoa	28,7	5,3	29,0	26,0	33,0
		Bizkaia	28,7	6,3	30,0	25,0	33,0
	15-24	CAPV	30,3	5,4	31,0	28,0	35,0
		Araba	31,6	3,5	33,0	29,0	35,0
		Gipuzkoa	29,5	5,0	30,0	27,0	33,0
		Bizkaia	30,5	6,5	32,0	28,0	35,0
	25-44	CAPV	29,1	6,6	30,0	26,0	33,0
		Araba	30,3	5,5	32,0	28,0	35,0
		Gipuzkoa	28,8	6,3	30,0	26,0	33,0
		Bizkaia	29,0	7,3	30,0	26,0	33,0
	45-64	CAPV	28,3	5,3	29,0	25,0	33,0
		Araba	29,4	4,0	31,0	26,0	34,0
		Gipuzkoa	28,0	5,2	28,0	25,0	33,0
		Bizkaia	28,2	6,0	29,0	24,0	33,0
	65-74	CAPV	28,8	4,4	30,0	25,0	33,0
		Araba	29,1	3,7	30,0	26,0	34,0
		Gipuzkoa	29,4	4,3	30,0	27,0	34,0
		Bizkaia	28,4	4,9	29,0	24,0	33,0
>=75	CAPV	28,7	5,2	30,0	25,0	33,0	
	Araba	30,0	3,9	32,0	28,0	35,0	
	Gipuzkoa	29,0	4,5	30,0	27,0	33,0	
	Bizkaia	28,3	6,1	30,0	25,0	33,0	
Mujeres	Total	CAPV	29,0	5,2	30,0	26,0	33,0
		Araba	29,1	4,3	30,0	26,0	34,0
		Gipuzkoa	29,1	4,9	30,0	27,0	33,0
		Bizkaia	28,9	5,8	30,0	26,0	33,0
	15-24	CAPV	30,4	4,9	32,0	28,0	34,0
		Araba	30,7	4,9	33,0	28,0	35,0
		Gipuzkoa	30,6	4,1	31,0	28,0	34,0
		Bizkaia	30,2	5,5	31,0	28,0	34,0
	25-44	CAPV	29,6	5,9	31,0	27,0	33,0
		Araba	29,4	5,2	30,0	27,0	34,0
		Gipuzkoa	29,6	5,9	31,0	27,0	33,0
		Bizkaia	29,8	6,2	31,0	27,0	33,0

(continuación)

Tabla 92. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=18) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	45-64	CAPV	28,5	5,0	30,0	25,0	33,0
		Araba	28,9	3,9	30,0	26,0	33,0
		Gipuzkoa	28,1	4,7	28,0	25,0	33,0
		Bizkaia	28,5	5,8	30,0	26,0	33,0
	65-74	CAPV	28,3	4,9	30,0	25,0	33,0
		Araba	27,6	4,4	28,0	25,0	33,0
		Gipuzkoa	28,7	4,8	29,0	25,0	34,0
		Bizkaia	28,1	5,2	30,0	24,0	32,0
	>=75	CAPV	28,5	4,9	29,0	26,0	33,0
		Araba	29,0	3,5	29,0	27,0	34,0
		Gipuzkoa	29,5	4,3	30,0	27,0	35,0
		Bizkaia	27,8	5,7	29,0	24,0	32,0
Ambos sexos	Total	CAPV	29,0	5,4	30,0	26,0	33,0
		Araba	29,6	4,4	31,0	27,0	34,0
		Gipuzkoa	28,9	5,1	30,0	26,0	33,0
		Bizkaia	28,8	6,0	30,0	26,0	33,0
	15-24	CAPV	30,4	5,2	31,0	28,0	35,0
		Araba	31,2	4,3	33,0	29,0	35,0
		Gipuzkoa	30,1	4,6	31,0	27,0	33,0
		Bizkaia	30,3	6,0	32,0	28,0	35,0
	25-44	CAPV	29,4	6,3	31,0	27,0	33,0
		Araba	29,9	5,3	31,0	27,0	34,0
		Gipuzkoa	29,2	6,1	30,0	27,0	33,0
		Bizkaia	29,4	6,8	31,0	27,0	33,0
	45-64	CAPV	28,4	5,2	29,0	25,0	33,0
		Araba	29,2	3,9	31,0	26,0	33,0
		Gipuzkoa	28,1	4,9	28,0	25,0	33,0
		Bizkaia	28,4	5,9	30,0	25,0	33,0
	65-74	CAPV	28,5	4,7	30,0	25,0	33,0
		Araba	28,3	4,1	30,0	25,0	33,0
		Gipuzkoa	29,0	4,6	30,0	26,0	34,0
		Bizkaia	28,3	5,1	30,0	24,0	33,0
>=75	CAPV	28,6	5,0	30,0	25,0	33,0	
	Araba	29,4	3,7	30,0	27,0	34,0	
	Gipuzkoa	29,3	4,4	30,0	27,0	35,0	
	Bizkaia	28,0	5,9	29,0	24,0	33,0	

Factores psicosociales Apoyo social

Tabla 93. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 18) por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Hombres	Total	Total	28,9	5,6	30,0	26,0	33,0	
		I	30,1	4,8	31,0	28,0	34,0	
		II	29,6	5,0	31,0	27,0	33,0	
		III	29,4	5,1	30,0	26,0	34,0	
		IV	28,4	5,8	29,0	25,0	33,0	
		V	28,2	6,5	30,0	25,0	33,0	
		15-24	Total	30,3	5,5	31,0	27,0	35,0
			I	30,9	4,6	31,0	29,0	34,0
			II	31,3	4,8	33,0	28,0	35,0
			III	30,5	5,3	32,0	27,0	35,0
			IV	30,0	5,5	31,0	27,0	35,0
			V	29,4	7,4	32,0	26,0	34,0
		25-44	Total	29,1	6,6	30,0	26,0	33,0
			I	30,7	5,0	32,0	28,0	34,0
			II	30,1	5,0	31,0	28,0	33,0
			III	29,7	5,9	31,0	27,0	34,0
			IV	28,6	6,9	30,0	26,0	33,0
			V	27,7	8,1	30,0	24,0	33,0
		45-64	Total	28,3	5,3	29,0	25,0	33,0
			I	29,4	4,8	31,0	26,0	33,0
			II	28,6	5,2	30,0	25,0	33,0
			III	28,9	4,8	29,0	25,0	33,0
			IV	27,8	5,6	29,0	24,0	33,0
			V	28,0	5,2	28,0	24,0	32,0
		65-74	Total	28,8	4,4	30,0	25,0	33,0
			I	29,9	4,2	31,0	26,0	34,0
			II	28,2	4,5	30,0	24,0	33,0
			III	28,7	4,5	29,0	25,0	34,0
			IV	28,7	4,5	30,0	25,0	33,0
		V	28,9	4,2	30,0	26,0	32,0	
	>=75	Total	28,7	5,2	30,0	25,0	33,0	
		I	28,4	5,9	30,0	25,0	34,0	
		II	28,8	4,2	30,0	26,0	33,0	
		III	29,4	5,0	31,0	25,0	35,0	
		IV	28,3	5,3	30,0	25,0	33,0	
		V	29,2	5,4	31,0	27,0	35,0	

(continuación)

Factores psicosociales Apoyo social

Tabla 93. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=18) por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Mujeres	Total	Total	29,0	5,2	30,0	26,0	33,0	
		I	30,2	4,8	31,0	28,0	34,0	
		II	29,7	5,2	31,0	27,0	34,0	
		III	29,3	4,8	30,0	27,0	33,0	
		IV	28,7	5,3	30,0	26,0	33,0	
		V	28,2	5,6	29,0	25,0	33,0	
		15-24	Total	30,5	4,9	32,0	28,0	34,0
			I	31,5	4,0	32,0	30,0	34,0
			II	30,3	5,5	31,0	28,0	34,0
			III	30,4	4,8	31,0	28,0	34,0
			IV	29,9	5,2	31,0	28,0	33,0
			V	31,1	4,1	32,0	29,0	34,0
		25-44	Total	29,7	5,9	31,0	27,0	33,0
			I	30,9	5,2	32,0	28,0	35,0
			II	30,3	5,2	31,0	28,0	34,0
			III	29,4	5,9	31,0	26,0	33,0
			IV	29,4	5,9	31,0	27,0	33,0
			V	28,8	6,6	30,0	26,0	33,0
		45-64	Total	28,5	5,0	30,0	25,0	33,0
			I	28,8	4,8	30,0	26,0	33,0
			II	29,0	5,1	30,0	27,0	33,0
			III	29,1	4,5	30,0	27,0	33,0
			IV	28,2	5,2	29,0	25,0	33,0
			V	27,5	5,6	29,0	24,0	32,0
		65-74	Total	28,3	5,0	30,0	25,0	33,0
			I	29,6	4,5	31,0	28,0	33,0
			II	29,8	4,4	32,0	27,0	34,0
			III	29,1	4,1	30,0	26,0	33,0
			IV	27,8	5,3	29,0	23,0	33,0
			V	27,4	5,1	28,0	24,0	32,0
	>=75	Total	28,5	4,9	29,0	26,0	33,0	
		I	29,6	3,3	30,0	26,0	32,0	
		II	28,3	5,5	30,0	23,0	34,0	
		III	28,9	4,6	29,0	27,0	33,0	
		IV	28,3	4,8	29,0	25,0	33,0	
		V	28,4	5,4	29,0	25,0	34,0	

(continuación)

Factores psicosociales Apoyo social

Tabla 93. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 18) por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Ambos sexos	Total	Total	29,0	5,4	30,0	26,0	33,0	
		I	30,1	4,8	31,0	28,0	34,0	
		II	29,6	5,1	31,0	27,0	34,0	
		III	29,3	4,9	30,0	26,0	33,0	
		IV	28,5	5,6	30,0	25,0	33,0	
		V	28,2	5,9	29,0	25,0	33,0	
		15-24	Total	30,4	5,2	31,0	28,0	35,0
			I	31,2	4,3	32,0	29,0	34,0
			II	30,7	5,2	32,0	28,0	35,0
			III	30,4	5,0	32,0	28,0	35,0
			IV	30,0	5,3	31,0	27,0	35,0
			V	30,3	6,1	32,0	28,0	34,0
		25-44	Total	29,4	6,3	31,0	27,0	33,0
			I	30,8	5,1	32,0	28,0	34,0
			II	30,2	5,1	31,0	28,0	34,0
			III	29,6	5,9	31,0	27,0	33,0
			IV	28,9	6,5	30,0	26,0	33,0
			V	28,3	7,3	30,0	25,0	33,0
		45-64	Total	28,4	5,2	29,0	25,0	33,0
			I	29,1	4,8	30,0	26,0	33,0
			II	28,8	5,1	30,0	26,0	33,0
			III	29,0	4,6	30,0	26,0	33,0
			IV	27,9	5,4	29,0	24,0	33,0
			V	27,6	5,5	29,0	24,0	32,0
		65-74	Total	28,5	4,7	30,0	25,0	33,0
		I	29,8	4,2	31,0	26,0	33,0	
		II	29,0	4,5	31,0	25,0	33,0	
		III	28,9	4,3	30,0	26,0	33,0	
		IV	28,2	4,9	30,0	24,0	33,0	
		V	27,7	5,0	28,0	25,0	32,0	
	>=75	Total	28,6	5,0	30,0	25,0	33,0	
		I	29,1	4,5	30,0	26,0	34,0	
		II	28,4	5,1	30,0	24,0	34,0	
		III	29,1	4,7	30,0	27,0	34,0	
		IV	28,3	5,0	29,0	25,0	33,0	
		V	28,6	5,4	29,0	26,0	34,0	

Factores psicosociales Apoyo social

Tabla 94. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 18) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	Total	28,9	5,6	30,0	26,0	33,0
		Sin estudios, primaria	28,5	5,3	30,0	25,0	33,0
		Secundaria, inferior	28,3	6,4	30,0	25,0	34,0
		Secundaria, superior	29,1	5,6	30,0	26,0	33,0
		Terciaria	29,7	5,0	31,0	27,0	34,0
	15-24	Total	30,3	5,4	31,0	28,0	35,0
		Sin estudios, primaria	31,2	4,4	33,0	28,0	35,0
		Secundaria, inferior	29,6	6,2	31,0	26,0	35,0
		Secundaria, superior	30,4	5,1	31,0	28,0	35,0
		Terciaria	31,6	5,2	33,0	30,0	35,0
	25-44	Total	29,1	6,6	30,0	26,0	33,0
		Sin estudios, primaria	28,3	7,1	30,0	25,0	33,0
		Secundaria, inferior	28,1	8,3	30,0	24,0	34,0
		Secundaria, superior	29,2	6,2	30,0	27,0	33,0
		Terciaria	30,1	5,6	32,0	27,0	34,0
	45-64	Total	28,3	5,3	29,0	25,0	33,0
		Sin estudios, primaria	28,1	5,2	29,0	24,0	33,0
		Secundaria, inferior	27,5	6,2	29,0	23,0	33,0
		Secundaria, superior	28,5	5,3	29,0	25,0	33,0
		Terciaria	28,9	4,6	29,0	26,0	32,0
	65-74	Total	28,8	4,4	30,0	25,0	33,0
		Sin estudios, primaria	28,7	4,4	29,0	25,0	33,0
		Secundaria, inferior	28,3	4,4	28,0	25,0	34,0
		Secundaria, superior	28,8	4,8	31,0	25,0	33,0
		Terciaria	29,9	3,9	31,0	27,0	34,0
>=75	Total	28,7	5,2	30,0	25,0	33,0	
	Sin estudios, primaria	28,6	5,2	30,0	25,0	33,0	
	Secundaria, inferior	29,0	5,7	31,0	28,0	33,0	
	Secundaria, superior	29,1	4,6	30,0	25,0	34,0	
	Terciaria	28,5	5,2	30,0	25,0	34,0	
Mujeres	Total	Total	29,0	5,2	30,0	26,0	33,0
		Sin estudios, primaria	28,3	5,2	29,0	25,0	33,0
		Secundaria, inferior	28,7	5,3	30,0	26,0	33,0
		Secundaria, superior	29,1	5,5	30,0	27,0	33,0
		Terciaria	30,0	4,6	31,0	27,0	34,0

(continuación)

Factores psicosociales Apoyo social

Tabla 94. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 18) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	15-24	Total	30,4	4,9	32,0	28,0	34,0
		Sin estudios, primaria	28,8	5,9	30,0	27,0	33,0
		Secundaria, inferior	30,0	4,8	31,0	28,0	33,0
		Secundaria, superior	30,9	4,9	32,0	28,0	34,0
		Terciaria	30,8	4,0	32,0	28,0	34,0
	25-44	Total	29,6	5,9	31,0	27,0	33,0
		Sin estudios, primaria	29,4	7,1	31,0	27,0	34,0
		Secundaria, inferior	28,8	6,7	30,0	26,0	33,0
		Secundaria, superior	29,3	6,1	30,0	27,0	33,0
		Terciaria	30,3	5,0	31,0	28,0	34,0
	45-64	Total	28,5	5,0	30,0	25,0	33,0
		Sin estudios, primaria	28,1	5,0	29,0	26,0	32,0
		Secundaria, inferior	28,1	5,5	29,0	25,0	33,0
		Secundaria, superior	28,5	5,1	30,0	25,0	33,0
		Terciaria	29,2	4,4	30,0	26,0	33,0
	65-74	Total	28,3	4,9	30,0	25,0	33,0
		Sin estudios, primaria	27,9	5,0	29,0	24,0	33,0
		Secundaria, inferior	28,4	4,9	29,0	25,0	33,0
		Secundaria, superior	28,2	5,3	30,0	26,0	33,0
		Terciaria	30,5	3,7	31,0	28,0	34,0
>=75	Total	28,5	4,9	29,0	26,0	33,0	
	Sin estudios, primaria	28,4	5,0	29,0	25,0	33,0	
	Secundaria, inferior	29,3	4,3	30,0	27,0	34,0	
	Secundaria, superior	26,9	5,3	28,0	24,0	32,0	
	Terciaria	30,4	3,9	31,0	29,0	34,0	
Ambos sexos	Total	Total	29,0	5,4	30,0	26,0	33,0
		Sin estudios, primaria	28,4	5,2	29,0	25,0	33,0
		Secundaria, inferior	28,5	5,9	30,0	25,0	33,0
		Secundaria, superior	29,1	5,5	30,0	26,0	33,0
		Terciaria	29,9	4,8	31,0	27,0	34,0
	15-24	Total	30,4	5,2	31,0	28,0	35,0
		Sin estudios, primaria	29,9	5,4	31,0	27,0	33,0
		Secundaria, inferior	29,7	5,6	31,0	27,0	35,0
		Secundaria, superior	30,6	5,0	32,0	28,0	35,0
		Terciaria	31,1	4,5	32,0	28,0	35,0

(continuación)

Tabla 94. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 18) por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	25-44 Total	29,4	6,3	31,0	27,0	33,0
	Sin estudios, primaria	28,7	7,1	31,0	25,0	33,0
	Secundaria, inferior	28,4	7,7	30,0	26,0	33,0
	Secundaria, superior	29,2	6,2	30,0	27,0	33,0
	Terciaria	30,2	5,3	31,0	27,0	34,0
45-64	Total	28,4	5,2	29,0	25,0	33,0
	Sin estudios, primaria	28,1	5,1	29,0	25,0	32,0
	Secundaria, inferior	27,8	5,8	29,0	24,0	33,0
	Secundaria, superior	28,5	5,2	30,0	25,0	33,0
	Terciaria	29,0	4,5	30,0	26,0	33,0
65-74	Total	28,5	4,7	30,0	25,0	33,0
	Sin estudios, primaria	28,2	4,8	29,0	24,0	33,0
	Secundaria, inferior	28,3	4,7	29,0	25,0	33,0
	Secundaria, superior	28,6	4,9	30,0	25,0	33,0
	Terciaria	30,1	3,8	31,0	27,0	34,0
≥ 75	Total	28,6	5,0	30,0	25,0	33,0
	Sin estudios, primaria	28,4	5,1	29,0	25,0	33,0
	Secundaria, inferior	29,2	4,8	30,0	27,0	33,0
	Secundaria, superior	28,0	5,0	29,0	24,0	33,0
	Terciaria	29,4	4,7	31,0	27,0	34,0

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

356

Tabla 95. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=15) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	16,9	2,9	18,0	15,0	19,0
		Araba	17,3	2,4	18,0	16,0	20,0
		Gipuzkoa	16,8	2,7	17,0	15,0	19,0
		Bizkaia	16,9	3,2	18,0	15,0	19,0
	15-24	CAPV	17,8	2,7	19,0	16,0	20,0
		Araba	18,3	1,9	19,0	17,0	20,0
		Gipuzkoa	17,4	2,7	18,0	16,0	20,0
		Bizkaia	18,0	2,9	19,0	17,0	20,0
	25-44	CAPV	16,9	3,3	17,0	16,0	19,0
		Araba	17,3	2,9	18,0	16,0	20,0
		Gipuzkoa	16,7	3,1	17,0	15,0	19,0
		Bizkaia	16,9	3,6	18,0	16,0	19,0
	45-64	CAPV	16,6	2,8	17,0	15,0	19,0
		Araba	17,0	2,2	18,0	16,0	19,0
		Gipuzkoa	16,5	2,7	17,0	15,0	19,0
		Bizkaia	16,5	3,2	17,0	15,0	19,0
	65-74	CAPV	17,0	2,3	18,0	16,0	19,0
		Araba	17,0	2,0	18,0	16,0	19,0
		Gipuzkoa	17,2	2,2	18,0	16,0	20,0
		Bizkaia	16,9	2,5	18,0	15,0	19,0
>=75	CAPV	17,1	2,6	18,0	16,0	20,0	
	Araba	17,5	2,1	18,0	16,0	20,0	
	Gipuzkoa	17,1	2,2	18,0	16,0	20,0	
	Bizkaia	17,1	3,0	18,0	16,0	19,0	
Mujeres	Total	CAPV	17,0	2,9	18,0	16,0	19,0
		Araba	16,9	2,5	18,0	16,0	19,0
		Gipuzkoa	16,9	2,8	18,0	15,0	19,0
		Bizkaia	17,0	3,2	18,0	16,0	19,0
	15-24	CAPV	17,9	2,5	18,0	17,0	20,0
		Araba	17,8	2,6	19,0	17,0	20,0
		Gipuzkoa	18,1	2,3	18,0	17,0	20,0
		Bizkaia	17,9	2,6	18,0	17,0	20,0
	25-44	CAPV	17,1	3,5	18,0	16,0	19,0
		Araba	16,9	3,0	18,0	16,0	19,0
		Gipuzkoa	16,8	3,7	17,0	16,0	19,0
		Bizkaia	17,3	3,5	18,0	16,0	19,0

(continuación)

Tabla 95. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=15) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	45-64	CAPV	16,5	2,8	17,0	15,0	19,0
		Araba	16,6	2,2	17,0	15,0	19,0
		Gipuzkoa	16,3	2,6	16,0	14,0	19,0
		Bizkaia	16,6	3,2	18,0	15,0	19,0
	65-74	CAPV	16,7	2,7	18,0	15,0	19,0
		Araba	16,4	2,5	17,0	15,0	19,0
		Gipuzkoa	17,0	2,5	18,0	16,0	20,0
		Bizkaia	16,6	2,9	18,0	15,0	19,0
	>=75	CAPV	17,3	2,6	18,0	16,0	20,0
		Araba	17,3	1,9	18,0	16,0	19,0
		Gipuzkoa	17,6	2,3	18,0	16,0	20,0
		Bizkaia	17,1	3,1	18,0	16,0	20,0
Ambos sexos	Total	CAPV	17,0	2,9	18,0	16,0	19,0
		Araba	17,1	2,4	18,0	16,0	19,0
		Gipuzkoa	16,9	2,8	17,0	15,0	19,0
		Bizkaia	17,0	3,2	18,0	16,0	19,0
	15-24	CAPV	17,9	2,6	19,0	17,0	20,0
		Araba	18,0	2,3	19,0	17,0	20,0
		Gipuzkoa	17,7	2,5	18,0	16,0	20,0
		Bizkaia	17,9	2,8	19,0	17,0	20,0
	25-44	CAPV	17,0	3,4	18,0	16,0	19,0
		Araba	17,1	3,0	18,0	16,0	19,0
		Gipuzkoa	16,8	3,4	17,0	16,0	19,0
		Bizkaia	17,1	3,6	18,0	16,0	19,0
	45-64	CAPV	16,5	2,8	17,0	15,0	19,0
		Araba	16,8	2,2	18,0	15,0	19,0
		Gipuzkoa	16,4	2,6	17,0	15,0	19,0
		Bizkaia	16,6	3,2	17,0	15,0	19,0
	65-74	CAPV	16,9	2,5	18,0	15,0	19,0
		Araba	16,7	2,3	18,0	15,0	19,0
		Gipuzkoa	17,1	2,4	18,0	16,0	20,0
		Bizkaia	16,8	2,7	18,0	15,0	19,0
>=75	CAPV	17,2	2,6	18,0	16,0	20,0	
	Araba	17,4	1,9	18,0	16,0	20,0	
	Gipuzkoa	17,4	2,3	18,0	16,0	20,0	
	Bizkaia	17,1	3,0	18,0	16,0	20,0	

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

358

Tabla 96. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 15) por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Hombres	Total	Total	16,9	2,9	18,0	15,0	19,0	
		I	17,3	2,6	18,0	16,0	19,0	
		II	17,3	2,6	18,0	16,0	19,0	
		III	17,1	2,6	18,0	16,0	19,0	
		IV	16,7	3,0	18,0	15,0	19,0	
		V	16,8	3,2	18,0	15,0	19,0	
		15-24	Total	17,8	2,7	19,0	16,0	20,0
			I	18,0	2,4	18,0	17,0	20,0
			II	18,5	2,0	19,0	17,0	20,0
			III	17,6	2,6	18,0	16,0	20,0
			IV	17,8	2,7	19,0	16,0	20,0
			V	17,3	3,2	19,0	15,0	20,0
		25-44	Total	16,9	3,3	17,0	16,0	19,0
			I	17,4	2,5	17,0	16,0	19,0
			II	17,4	2,6	18,0	16,0	19,0
			III	17,3	2,9	18,0	16,0	19,0
			IV	16,6	3,6	17,0	15,0	19,0
			V	16,8	4,0	17,0	15,0	20,0
		45-64	Total	16,6	2,8	17,0	15,0	19,0
			I	16,8	2,8	17,0	15,0	19,0
			II	16,7	2,8	17,0	15,0	19,0
			III	16,7	2,6	17,0	15,0	19,0
			IV	16,5	2,9	17,0	15,0	19,0
			V	16,3	2,7	17,0	14,0	18,0
		65-74	Total	17,0	2,3	18,0	16,0	19,0
			I	17,5	2,0	17,0	16,0	20,0
			II	16,8	2,6	17,0	15,0	20,0
			III	16,8	2,4	18,0	15,0	20,0
			IV	17,0	2,4	18,0	15,0	19,0
			V	17,7	2,1	18,0	17,0	20,0
	>=75	Total	17,1	2,6	18,0	16,0	20,0	
		I	16,7	2,9	17,0	13,0	20,0	
		II	18,0	1,9	19,0	17,0	20,0	
		III	17,4	2,4	18,0	16,0	20,0	
		IV	17,0	2,7	18,0	16,0	19,0	
		V	17,2	2,7	18,0	16,0	20,0	

(continuación)

Factores psicosociales Apoyo social

Tabla 96. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 15) por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Mujeres	Total	Total	17,0	2,9	18,0	16,0	19,0	
		I	17,4	2,7	18,0	16,0	19,0	
		II	17,3	2,9	18,0	16,0	19,0	
		III	17,0	2,8	18,0	16,0	19,0	
		IV	16,9	3,0	18,0	16,0	19,0	
		V	16,6	3,1	17,0	15,0	19,0	
		15-24	Total	17,9	2,5	18,0	17,0	20,0
			I	18,4	1,7	19,0	18,0	20,0
			II	17,7	2,5	18,0	16,0	20,0
			III	18,0	2,2	18,0	16,0	20,0
			IV	17,7	2,9	19,0	17,0	20,0
			V	18,4	2,0	18,0	17,0	20,0
		25-44	Total	17,1	3,5	18,0	16,0	19,0
			I	17,6	2,8	18,0	16,0	19,0
			II	17,6	3,1	18,0	17,0	19,0
			III	17,0	3,4	18,0	16,0	19,0
			IV	17,0	3,6	18,0	16,0	19,0
			V	16,8	4,0	18,0	15,0	19,0
		45-64	Total	16,5	2,8	17,0	15,0	19,0
			I	16,5	2,8	17,0	15,0	19,0
			II	16,8	2,8	17,0	15,0	19,0
			III	16,7	2,7	17,0	15,0	19,0
			IV	16,6	2,8	17,0	15,0	19,0
			V	16,0	3,0	17,0	14,0	19,0
		65-74	Total	16,7	2,7	18,0	15,0	19,0
			I	17,4	2,4	18,0	16,0	19,0
			II	17,2	2,5	18,0	16,0	20,0
			III	17,0	2,3	18,0	15,0	19,0
			IV	16,4	2,9	18,0	15,0	19,0
			V	16,7	2,6	17,0	16,0	19,0
	>=75	Total	17,3	2,6	18,0	16,0	20,0	
		I	18,1	1,4	18,0	17,0	20,0	
		II	16,9	3,3	18,0	15,0	20,0	
		III	17,4	2,4	18,0	16,0	20,0	
		IV	17,3	2,5	18,0	16,0	20,0	
		V	17,1	2,9	18,0	16,0	20,0	

(continuación)

Factores psicosociales Apoyo social

Tabla 96. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 15) por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75			
Ambos sexos	Total	Total	17,0	2,9	18,0	16,0	19,0		
		I	17,3	2,6	18,0	16,0	19,0		
		II	17,3	2,8	18,0	16,0	19,0		
		III	17,0	2,7	18,0	16,0	19,0		
		IV	16,8	3,0	18,0	15,0	19,0		
		V	16,7	3,1	18,0	15,0	19,0		
		15-24	Total	17,9	2,6	19,0	17,0	20,0	
			I	18,2	2,1	19,0	17,0	20,0	
			II	18,1	2,3	19,0	17,0	20,0	
			III	17,8	2,4	18,0	16,0	20,0	
			IV	17,7	2,8	19,0	16,0	20,0	
			V	17,9	2,7	18,0	17,0	20,0	
			25-44	Total	17,0	3,4	18,0	16,0	19,0
			I	17,5	2,6	18,0	16,0	19,0	
			II	17,5	2,9	18,0	16,0	19,0	
			III	17,1	3,2	18,0	16,0	19,0	
			IV	16,7	3,6	17,0	15,0	19,0	
			V	16,8	4,0	18,0	15,0	20,0	
			45-64	Total	16,5	2,8	17,0	15,0	19,0
			I	16,6	2,8	17,0	15,0	19,0	
			II	16,8	2,8	17,0	15,0	19,0	
			III	16,7	2,6	17,0	15,0	19,0	
			IV	16,5	2,9	17,0	15,0	19,0	
			V	16,1	2,9	17,0	14,0	19,0	
			65-74	Total	16,9	2,5	18,0	15,0	19,0
		I	17,4	2,1	18,0	16,0	20,0		
		II	17,0	2,5	18,0	16,0	20,0		
		III	16,9	2,3	18,0	15,0	19,0		
		IV	16,7	2,7	18,0	15,0	19,0		
		V	16,9	2,5	18,0	16,0	19,0		
		>=75	Total	17,2	2,6	18,0	16,0	20,0	
		I	17,5	2,2	18,0	17,0	20,0		
		II	17,2	2,9	19,0	15,0	20,0		
		III	17,4	2,4	18,0	16,0	20,0		
		IV	17,1	2,6	18,0	16,0	19,0		
		V	17,1	2,9	18,0	16,0	20,0		

Factores psicosociales Apoyo social

Tabla 97. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 15) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	Total	16,9	2,9	18,0	15,0	19,0
		Sin estudios, primaria	16,9	2,7	18,0	16,0	19,0
		Secundaria, inferior	16,9	3,1	18,0	15,0	19,0
		Secundaria, superior	16,9	2,9	18,0	15,0	19,0
		Terciaria	17,1	2,7	17,0	16,0	19,0
	15-24	Total	17,8	2,7	19,0	16,0	20,0
		Sin estudios, primaria	18,7	1,7	19,0	18,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,8	2,7	18,0	16,0	20,0
		Secundaria, superior	17,5	2,8	18,0	16,0	20,0
		Terciaria	18,3	2,5	19,0	17,0	20,0
	25-44	Total	16,9	3,3	17,0	16,0	19,0
		Sin estudios, primaria	16,6	3,8	17,0	15,0	19,0
		Secundaria, inferior	16,6	4,0	17,0	15,0	19,0
		Secundaria, superior	16,9	3,2	17,0	16,0	19,0
		Terciaria	17,2	2,8	17,0	16,0	19,0
	45-64	Total	16,6	2,8	17,0	15,0	19,0
		Sin estudios, primaria	16,7	2,8	17,0	15,0	19,0
		Secundaria, inferior	16,4	3,1	18,0	15,0	19,0
		Secundaria, superior	16,6	2,8	17,0	15,0	19,0
		Terciaria	16,6	2,7	17,0	15,0	19,0
	65-74	Total	17,0	2,3	18,0	16,0	19,0
		Sin estudios, primaria	17,0	2,3	18,0	16,0	19,0
		Secundaria, inferior	17,1	2,2	18,0	15,0	19,0
		Secundaria, superior	16,9	2,5	17,0	15,0	20,0
		Terciaria	17,3	2,2	18,0	16,0	20,0
	>=75	Total	17,1	2,6	18,0	16,0	20,0
Sin estudios, primaria		17,1	2,6	18,0	16,0	19,0	
Secundaria, inferior		17,3	2,6	18,0	16,0	19,0	
Secundaria, superior		17,2	2,5	18,0	16,0	20,0	
Terciaria		17,2	2,7	18,0	16,0	20,0	
Mujeres	Total	Total	17,0	2,9	18,0	16,0	19,0
		Sin estudios, primaria	16,9	2,8	18,0	16,0	19,0
		Secundaria, inferior	17,0	2,9	18,0	16,0	19,0
		Secundaria, superior	16,8	3,1	18,0	15,0	19,0
		Terciaria	17,3	2,7	18,0	16,0	19,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Factores psicosociales Apoyo social

362

Tabla 97. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 15) por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Mujeres	15-24	Total	17,9	2,5	18,0	17,0	20,0
		Sin estudios, primaria	17,2	3,2	18,0	17,0	19,0
		Secundaria, inferior	17,9	2,3	18,0	16,0	20,0
		Secundaria, superior	18,1	2,5	19,0	17,0	20,0
		Terciaria	17,9	2,1	18,0	16,0	20,0
	25-44	Total	17,1	3,5	18,0	16,0	19,0
		Sin estudios, primaria	16,9	4,7	19,0	16,0	20,0
		Secundaria, inferior	16,9	3,9	18,0	16,0	19,0
		Secundaria, superior	16,9	3,5	18,0	16,0	19,0
		Terciaria	17,5	2,9	18,0	16,0	19,0
	45-64	Total	16,5	2,8	17,0	15,0	19,0
		Sin estudios, primaria	16,6	2,7	17,0	15,0	19,0
		Secundaria, inferior	16,7	2,8	17,0	15,0	19,0
		Secundaria, superior	16,3	2,9	17,0	15,0	19,0
		Terciaria	16,6	2,7	17,0	15,0	19,0
	65-74	Total	16,7	2,7	18,0	15,0	19,0
		Sin estudios, primaria	16,8	2,7	18,0	16,0	19,0
		Secundaria, inferior	16,6	2,8	17,0	15,0	19,0
		Secundaria, superior	16,1	2,8	17,0	15,0	18,0
		Terciaria	17,7	2,0	18,0	16,0	20,0
>=75	Total	17,3	2,6	18,0	16,0	20,0	
	Sin estudios, primaria	17,2	2,7	18,0	16,0	20,0	
	Secundaria, inferior	17,7	2,1	18,0	16,0	20,0	
	Secundaria, superior	16,1	3,2	16,0	15,0	19,0	
	Terciaria	18,0	2,0	18,0	17,0	20,0	
Ambos sexos	Total	Total	17,0	2,9	18,0	16,0	19,0
		Sin estudios, primaria	16,9	2,8	18,0	16,0	19,0
		Secundaria, inferior	16,9	3,0	18,0	15,0	19,0
		Secundaria, superior	16,8	3,0	18,0	15,0	19,0
		Terciaria	17,2	2,7	18,0	16,0	19,0
	15-24	Total	17,9	2,6	19,0	17,0	20,0
		Sin estudios, primaria	17,9	2,7	19,0	17,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,8	2,6	18,0	16,0	20,0
		Secundaria, superior	17,8	2,6	19,0	17,0	20,0
		Terciaria	18,0	2,2	19,0	16,0	20,0

(continuación)

Tabla 97. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 15) por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	25-44 Total	17,0	3,4	18,0	16,0	19,0
	Sin estudios, primaria	16,7	4,2	18,0	15,0	19,0
	Secundaria, inferior	16,7	3,9	18,0	15,0	19,0
	Secundaria, superior	16,9	3,3	18,0	16,0	19,0
	Terciaria	17,4	2,9	18,0	16,0	19,0
45-64	Total	16,5	2,8	17,0	15,0	19,0
	Sin estudios, primaria	16,6	2,7	17,0	15,0	19,0
	Secundaria, inferior	16,5	3,0	17,0	15,0	19,0
	Secundaria, superior	16,4	2,9	17,0	15,0	19,0
	Terciaria	16,6	2,7	17,0	15,0	19,0
65-74	Total	16,9	2,5	18,0	15,0	19,0
	Sin estudios, primaria	16,9	2,5	18,0	16,0	19,0
	Secundaria, inferior	16,7	2,6	18,0	15,0	19,0
	Secundaria, superior	16,6	2,6	17,0	15,0	19,0
	Terciaria	17,5	2,1	18,0	16,0	20,0
>=75	Total	17,2	2,6	18,0	16,0	20,0
	Sin estudios, primaria	17,2	2,6	18,0	16,0	20,0
	Secundaria, inferior	17,6	2,3	18,0	16,0	20,0
	Secundaria, superior	16,6	2,9	18,0	15,0	19,0
	Terciaria	17,6	2,4	18,0	17,0	20,0

Tabla 98. Proporción (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	4,8	2,8	4,9	5,4
	15-24	1,8	0,0	3,1	1,4
	25-44	5,2	3,4	6,0	5,4
	45-64	4,9	2,7	4,9	5,5
	65-74	4,8	3,1	3,5	6,2
	>=75	6,3	4,4	3,9	8,0
	Mujeres	Total	5,2	5,2	4,1
	15-24	2,6	6,4	1,3	2,3
	25-44	3,5	4,5	3,1	3,5
	45-64	6,2	5,0	5,4	7,1
	65-74	7,9	9,2	5,7	8,9
	>=75	5,9	3,2	3,8	7,8
Ambos sexos	Total	5,0	4,0	4,5	5,6
	15-24	2,2	3,0	2,2	1,9
	25-44	4,4	3,9	4,6	4,4
	45-64	5,6	3,9	5,2	6,3
	65-74	6,5	6,2	4,7	7,7
	>=75	6,1	3,7	3,8	7,8

Tabla 99. Proporción (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	4,8	1,8	3,0	2,9	5,9	9,4
	15-24	1,8	0,0	0,0	2,0	1,7	6,9
	25-44	5,2	0,0	1,4	2,4	6,4	14,5
	45-64	4,9	2,4	6,0	2,2	6,9	2,9
	65-74	4,8	3,6	7,0	5,9	4,1	7,6
	>=75	6,3	16,3	0,0	3,9	6,7	9,1
	Mujeres	Total	5,2	2,0	3,8	4,1	5,8
	15-24	2,6	0,0	5,0	3,0	3,3	0,0
	25-44	3,5	1,1	1,6	3,7	3,4	7,4
	45-64	6,3	4,2	4,7	4,2	7,4	8,9
	65-74	7,9	3,6	3,1	3,3	10,4	10,0
	>=75	6,0	0,0	8,3	6,5	4,8	8,0
Ambos sexos	Total	5,0	1,9	3,4	3,6	5,9	8,5
	15-24	2,2	0,0	2,7	2,5	2,4	3,5
	25-44	4,4	0,6	1,5	3,1	5,2	10,6
	45-64	5,6	3,2	5,3	3,3	7,1	7,2
	65-74	6,5	3,6	5,0	4,6	7,3	9,5
	>=75	6,1	6,3	5,8	5,4	5,6	8,2

Tabla 100. Proporción (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	4,8	5,6	8,0	4,2	2,2
	15-24	1,8	0,0	1,9	2,5	0,0
	25-44	5,2	8,4	11,3	4,2	1,9
	45-64	4,9	5,1	9,4	4,4	2,0
	65-74	4,8	5,2	4,4	5,7	2,9
	>=75	6,3	5,7	8,3	4,7	9,1
Mujeres	Total	5,2	7,2	7,2	4,7	1,6
	15-24	2,6	10,1	2,8	1,5	0,0
	25-44	3,5	5,5	8,4	3,6	1,5
	45-64	6,2	6,7	9,9	6,0	2,7
	65-74	7,9	9,5	6,4	8,7	0,0
	>=75	5,9	6,3	2,6	14,1	1,4
Ambos sexos	Total	5,0	6,5	7,6	4,4	1,9
	15-24	2,2	5,4	2,2	2,0	0,0
	25-44	4,4	7,2	10,0	4,0	1,7
	45-64	5,6	5,9	9,6	5,1	2,4
	65-74	6,5	7,9	5,7	6,7	1,9
	>=75	6,1	6,0	4,6	9,2	5,5

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 101. Proporción (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	25,2	19,7	26,4	26,0
	15-24	16,5	13,4	19,3	15,6
	25-44	23,8	17,5	25,2	24,7
	45-64	30,5	24,1	32,1	31,2
	65-74	24,6	21,1	22,4	27,0
	>=75	22,8	19,8	23,2	23,2
	Mujeres	Total	24,0	23,8	25,2
	15-24	13,1	14,9	10,3	14,3
	25-44	21,0	21,9	23,9	19,1
	45-64	30,5	27,8	35,0	28,5
	65-74	26,5	29,1	23,4	27,8
	>=75	21,4	20,9	18,2	23,4
Ambos sexos	Total	24,6	21,7	25,8	24,6
	15-24	14,8	14,1	14,9	15,0
	25-44	22,4	19,6	24,6	21,9
	45-64	30,5	26,0	33,6	29,8
	65-74	25,6	25,3	22,9	27,4
	>=75	21,9	20,5	20,0	23,3

Tabla 102. Proporción (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	25,2	20,6	18,4	24,7	27,1	28,8
	15-24	16,3	13,3	3,5	19,3	17,4	26,3
	25-44	23,8	17,3	16,2	20,0	27,7	27,3
	45-64	30,5	26,7	26,3	30,5	30,9	37,2
	65-74	24,6	20,1	27,4	28,2	25,1	14,6
	>=75	22,9	28,6	15,2	21,3	23,8	23,5
	Mujeres	Total	24,0	17,6	20,2	23,7	24,6
	15-24	12,7	7,1	12,9	11,7	17,4	7,0
	25-44	21,0	11,3	12,9	22,6	22,1	31,7
	45-64	30,5	35,2	27,9	27,6	29,6	34,8
	65-74	26,4	12,3	21,9	27,3	29,8	23,8
	>=75	21,5	1,6	35,4	20,0	20,4	24,0
Ambos sexos	Total	24,6	19,2	19,4	24,1	26,0	29,0
	15-24	14,6	10,2	8,6	15,2	17,4	16,6
	25-44	22,4	14,3	14,5	21,5	25,4	29,7
	45-64	30,5	30,6	27,2	28,8	30,4	35,4
	65-74	25,6	17,4	24,6	27,7	27,5	21,9
	>=75	22,0	12,0	29,3	20,5	21,9	23,9

Tabla 103. Proporción (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	25,2	24,5	26,1	26,6	22,5
	15-24	16,5	3,6	17,3	19,2	15,8
	25-44	23,8	26,0	27,4	24,6	18,7
	45-64	30,5	28,9	31,4	31,8	28,9
	65-74	24,6	22,1	25,6	29,6	21,4
	>=75	22,8	23,2	20,8	23,4	23,0
Mujeres	Total	24,0	24,6	24,1	25,9	20,6
	15-24	13,1	21,5	17,5	9,2	13,3
	25-44	21,0	24,4	23,0	23,9	16,8
	45-64	30,5	27,8	27,8	33,6	31,0
	65-74	26,5	24,4	29,1	37,9	17,8
	>=75	21,4	22,7	15,4	28,7	13,1
Ambos sexos	Total	24,6	24,6	25,1	26,3	21,4
	15-24	14,8	13,2	17,3	14,0	14,3
	25-44	22,4	25,4	25,5	24,3	17,5
	45-64	30,5	28,3	29,5	32,7	30,0
	65-74	25,6	23,5	27,8	32,2	20,1
	>=75	21,9	22,9	17,4	25,9	18,4

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 104. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y territorio histórico

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Hombres	Total	CAPV	N	401.822	249.197	37.892	226.212	915.124
			%	43,9	27,2	4,1	24,7	100,0
		Araba	N	56.019	42.939	4.279	30.514	133.751
			%	41,9	32,1	3,2	22,8	100,0
		Gipuzkoa	N	137.231	75.092	12.703	68.786	293.812
			%	46,7	25,6	4,3	23,4	100,0
		Bizkaia	N	208.572	131.166	20.911	126.913	487.561
			%	42,8	26,9	4,3	26,0	100,0
	15-24	CAPV	N	73.509	2.860	4.876	13.214	94.458
			%	77,8	3,0	5,2	14,0	100,0
		Araba	N	11.813	233	863	1.960	14.869
			%	79,4	1,6	5,8	13,2	100,0
		Gipuzkoa	N	24.637	1.222	1.534	3.911	31.305
			%	78,7	3,9	4,9	12,5	100,0
		Bizkaia	N	37.058	1.405	2.478	7.343	48.284
			%	76,7	2,9	5,1	15,2	100,0
	25-44	CAPV	N	165.349	52.671	18.393	99.896	336.309
			%	49,2	15,7	5,5	29,7	100,0
		Araba	N	23.407	12.105	2.097	14.452	52.062
			%	45,0	23,3	4,0	27,8	100,0
		Gipuzkoa	N	54.023	13.611	6.598	32.557	106.790
			%	50,6	12,7	6,2	30,5	100,0
		Bizkaia	N	87.918	26.955	9.697	52.887	177.458
			%	49,5	15,2	5,5	29,8	100,0
	45-64	CAPV	N	94.910	106.182	10.761	90.802	302.655
			%	31,4	35,1	3,6	30,0	100,0
		Araba	N	11.879	19.044	887	10.941	42.751
			%	27,8	44,5	2,1	25,6	100,0
		Gipuzkoa	N	36.275	32.503	3.519	25.123	97.419
			%	37,2	33,4	3,6	25,8	100,0
		Bizkaia	N	46.756	54.635	6.356	54.738	162.485
			%	28,8	33,6	3,9	33,7	100,0
	65-74	CAPV	N	33.566	46.319	2.734	13.115	95.733
			%	35,1	48,4	2,9	13,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 104. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y territorio histórico

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total		
Hombres 65-74	Araba	N	4.468	6.788	75	1.832	13.163		
		%	33,9	51,6	0,6	13,9	100,0		
	Gipuzkoa	N	11.691	14.803	672	4.964	32.130		
		%	36,4	46,1	2,1	15,4	100,0		
	Bizkaia	N	17.407	24.728	1.986	6.319	50.440		
		%	34,5	49,0	3,9	12,5	100,0		
	>=75	CAPV	N	34.489	41.166	1.128	9.185	85.968	
			%	40,1	47,9	1,3	10,7	100,0	
		Araba	N	4.451	4.769	356	1.329	10.905	
			%	40,8	43,7	3,3	12,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	10.605	12.953	379	2.231	26.168	
			%	40,5	49,5	1,4	8,5	100,0	
Bizkaia		N	19.432	23.444	393	5.625	48.895		
		%	39,7	47,9	0,8	11,5	100,0		
Mujeres		Total	CAPV	N	605.829	164.041	29.682	176.331	975.882
			%	62,1	16,8	3,0	18,1	100,0	
		Araba	N	83.931	22.884	3.691	26.266	136.772	
			%	61,4	16,7	2,7	19,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	196.981	49.845	8.973	56.887	312.686		
		%	63,0	15,9	2,9	18,2	100,0		
	Bizkaia	N	324.917	91.312	17.018	93.179	526.425		
		%	61,7	17,3	3,2	17,7	100,0		
	15-24	CAPV	N	67.296	3.647	5.486	13.071	89.499	
			%	75,2	4,1	6,1	14,6	100,0	
		Araba	N	9.776	293	803	2.338	13.210	
			%	74,0	2,2	6,1	17,7	100,0	
Gipuzkoa		N	22.973	846	1.452	4.172	29.443		
		%	78,0	2,9	4,9	14,2	100,0		
Bizkaia		N	34.547	2.508	3.230	6.561	46.846		
		%	73,7	5,4	6,9	14,0	100,0		
25-44		CAPV	N	162.744	61.246	14.596	82.241	320.826	
			%	50,7	19,1	4,5	25,6	100,0	
		Araba	N	24.010	9.205	2.513	12.141	47.869	
			%	50,2	19,2	5,2	25,4	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 104. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y territorio histórico

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total	
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	47.592	21.277	3.529	29.507	101.905	
			%	46,7	20,9	3,5	29,0	100,0	
		Bizkaia	N	91.142	30.764	8.554	40.593	171.052	
	%		53,3	18,0	5,0	23,7	100,0		
		45-64	CAPV	N	148.354	81.553	9.011	74.851	313.769
	%			47,3	26,0	2,9	23,9	100,0	
		Araba	N	21.121	11.956	376	10.810	44.263	
	%		47,7	27,0	0,8	24,4	100,0		
		Gipuzkoa	N	51.349	23.129	3.716	21.469	99.662	
	%		51,5	23,2	3,7	21,5	100,0		
		Bizkaia	N	75.884	46.467	4.920	42.572	169.843	
	%		44,7	27,4	2,9	25,1	100,0		
		65-74	CAPV	N	92.528	12.063	589	4.744	109.925
	%			84,2	11,0	0,5	4,3	100,0	
		Araba	N	12.708	846	.	767	14.320	
	%		88,7	5,9	.	5,4	100,0		
		Gipuzkoa	N	30.926	3.600	276	1.319	36.120	
	%		85,6	10,0	0,8	3,7	100,0		
		Bizkaia	N	48.894	7.618	314	2.658	59.484	
	%		82,2	12,8	0,5	4,5	100,0		
		>=75	CAPV	N	134.907	5.532	.	1.425	141.864
	%			95,1	3,9	.	1,0	100,0	
		Araba	N	16.316	583	.	210	17.110	
	%		95,4	3,4	.	1,2	100,0		
	Gipuzkoa	N	44.141	994	.	420	45.555		
%		96,9	2,2	.	0,9	100,0			
	Bizkaia	N	74.450	3.955	.	795	79.200		
%		94,0	5,0	.	1,0	100,0			
Ambos	Total	CAPV	N	1.007.651	413.238	67.574	402.543	1.891.006	
			%	53,3	21,9	3,6	21,3	100,0	
		Araba	N	139.950	65.823	7.970	56.780	270.523	
	%		51,7	24,3	2,9	21,0	100,0		
		Gipuzkoa	N	334.212	124.937	21.676	125.672	606.497	
	%		55,1	20,6	3,6	20,7	100,0		
		Bizkaia	N	533.489	222.478	37.928	220.092	1.013.987	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 104. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y territorio histórico

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Ambos	Total	Bizkaia	%	52,6	21,9	3,7	21,7	100,0
	15-24	CAPV	N	140.805	6.507	10.361	26.285	183.958
			%	76,5	3,5	5,6	14,3	100,0
		Araba	N	21.590	526	1.666	4.297	28.079
			%	76,9	1,9	5,9	15,3	100,0
		Gipuzkoa	N	47.610	2.068	2.987	8.084	60.748
			%	78,4	3,4	4,9	13,3	100,0
		Bizkaia	N	71.605	3.913	5.709	13.904	95.130
			%	75,3	4,1	6,0	14,6	100,0
	25-44	CAPV	N	328.093	113.917	32.989	182.137	657.135
			%	49,9	17,3	5,0	27,7	100,0
		Araba	N	47.417	21.310	4.610	26.593	99.930
			%	47,5	21,3	4,6	26,6	100,0
		Gipuzkoa	N	101.615	34.888	10.128	62.064	208.695
			%	48,7	16,7	4,9	29,7	100,0
		Bizkaia	N	179.060	57.718	18.251	93.480	348.509
			%	51,4	16,6	5,2	26,8	100,0
	45-64	CAPV	N	243.264	187.734	19.773	165.653	616.424
			%	39,5	30,5	3,2	26,9	100,0
		Araba	N	33.000	31.001	1.263	21.751	87.015
			%	37,9	35,6	1,5	25,0	100,0
		Gipuzkoa	N	87.624	55.632	7.234	46.591	197.081
			%	44,5	28,2	3,7	23,6	100,0
		Bizkaia	N	122.640	101.102	11.276	97.310	332.328
			%	36,9	30,4	3,4	29,3	100,0
	65-74	CAPV	N	126.094	58.382	3.323	17.859	205.658
			%	61,3	28,4	1,6	8,7	100,0
		Araba	N	17.176	7.633	75	2.599	27.483
			%	62,5	27,8	0,3	9,5	100,0
		Gipuzkoa	N	42.617	18.403	948	6.282	68.251
			%	62,4	27,0	1,4	9,2	100,0
		Bizkaia	N	66.302	32.346	2.300	8.977	109.924
			%	60,3	29,4	2,1	8,2	100,0
	>=75	CAPV	N	169.396	46.698	1.128	10.610	227.832
			%	74,4	20,5	0,5	4,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 104. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y territorio histórico

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Ambos	>=75	Araba	N	20.767	5.352	356	1.539	28.015
			%	74,1	19,1	1,3	5,5	100,0
		Gipuzkoa	N	54.746	13.947	379	2.651	71.723
			%	76,3	19,4	0,5	3,7	100,0
		Bizkaia	N	93.882	27.399	393	6.420	128.094
			%	73,3	21,4	0,3	5,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 105. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

		Nunca ha fumado		Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total	
Hombres	Total	Total	N	401.562	248.684	37.704	225.914	913.863
			%	43,9	27,2	4,1	24,7	100,0
	I	N	N	58.103	26.820	6.489	22.279	113.690
			%	51,1	23,6	5,7	19,6	100,0
	II	N	N	40.951	19.198	3.839	14.217	78.206
			%	52,4	24,5	4,9	18,2	100,0
	III	N	N	88.921	51.182	5.766	42.486	188.355
			%	47,2	27,2	3,1	22,6	100,0
	IV	N	N	181.585	130.314	16.285	122.121	450.306
			%	40,3	28,9	3,6	27,1	100,0
	V	N	N	32.002	21.170	5.325	24.811	83.307
			%	38,4	25,4	6,4	29,8	100,0
	15-24	Total	N	73.248	2.860	4.876	12.916	93.900
			%	78,0	3,0	5,2	13,8	100,0
	I	N	N	11.896	.	733	2.005	14.634
			%	81,3	.	5,0	13,7	100,0
	II	N	N	10.209	.	207	571	10.988
			%	92,9	.	1,9	5,2	100,0
	III	N	N	13.736	488	.	2.606	16.830
			%	81,6	2,9	.	15,5	100,0
	IV	N	N	33.232	1.840	2.395	5.271	42.737
			%	77,8	4,3	5,6	12,3	100,0
	V	N	N	4.175	533	1.541	2.462	8.711
			%	47,9	6,1	17,7	28,3	100,0
	25-44	Total	N	165.349	52.671	18.393	99.896	336.309
			%	49,2	15,7	5,5	29,7	100,0
	I	N	N	26.055	4.695	4.106	8.876	43.732
			%	59,6	10,7	9,4	20,3	100,0
	II	N	N	21.064	2.443	2.801	6.188	32.496
			%	64,8	7,5	8,6	19,0	100,0
	III	N	N	34.938	8.662	1.365	17.291	62.257
			%	56,1	13,9	2,2	27,8	100,0
	IV	N	N	68.177	30.468	7.024	54.723	160.392
			%	42,5	19,0	4,4	34,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 105. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Hombres 25-44	V	N 15.115	6.401	3.098	12.818	37.432
		% 40,4	17,1	8,3	34,2	100,0
45-64	Total	N 94.910	106.083	10.573	90.802	302.368
		% 31,4	35,1	3,5	30,0	100,0
I	N	13.980	13.669	1.174	9.084	37.907
	%	36,9	36,1	3,1	24,0	100,0
II	N	7.116	10.028	495	5.781	23.419
	%	30,4	42,8	2,1	24,7	100,0
III	N	21.490	23.421	3.407	18.004	66.322
	%	32,4	35,3	5,1	27,1	100,0
IV	N	44.898	51.458	4.811	49.447	150.614
	%	29,8	34,2	3,2	32,8	100,0
V	N	7.425	7.507	686	8.487	24.106
	%	30,8	31,1	2,8	35,2	100,0
65-74	Total	N 33.566	46.319	2.734	13.115	95.733
		% 35,1	48,4	2,9	13,7	100,0
I	N	4.259	6.948	378	2.168	13.753
	%	31,0	50,5	2,7	15,8	100,0
II	N	1.139	3.710	337	1.677	6.862
	%	16,6	54,1	4,9	24,4	100,0
III	N	9.183	9.249	696	2.648	21.777
	%	42,2	42,5	3,2	12,2	100,0
IV	N	17.577	22.833	1.324	6.020	47.753
	%	36,8	47,8	2,8	12,6	100,0
V	N	1.407	3.579	.	602	5.588
	%	25,2	64,0	.	10,8	100,0
>=75	Total	N 34.489	40.751	1.128	9.185	85.553
		% 40,3	47,6	1,3	10,7	100,0
I	N	1.912	1.507	98	146	3.663
	%	52,2	41,1	2,7	4,0	100,0
II	N	1.422	3.018	.	.	4.440
	%	32,0	68,0	.	.	100,0
III	N	9.573	9.362	298	1.937	21.169
	%	45,2	44,2	1,4	9,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 105. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total	
Hombres >=75	IV	N		17.702	23.715	732	6.660	48.810	
		%		36,3	48,6	1,5	13,6	100,0	
	V	N		3.880	3.149	.	442	7.470	
		%		51,9	42,1	.	5,9	100,0	
Mujeres	Total	Total N		604.312	163.167	29.682	176.331	973.492	
		%		62,1	16,8	3,0	18,1	100,0	
	I	N		60.184	22.563	5.003	17.088	104.838	
		%		57,4	21,5	4,8	16,3	100,0	
	II	N		57.115	18.756	5.289	13.868	95.028	
		%		60,1	19,7	5,6	14,6	100,0	
	III	N		140.188	47.386	8.240	46.293	242.107	
		%		57,9	19,6	3,4	19,1	100,0	
	IV	N		233.613	51.646	7.572	67.610	360.441	
		%		64,8	14,3	2,1	18,8	100,0	
	V	N		113.212	22.816	3.576	31.473	171.077	
		%		66,2	13,3	2,1	18,4	100,0	
	15-24	Total	Total N		66.538	3.439	5.486	13.071	88.533
			%		75,2	3,9	6,2	14,8	100,0
		I	N		11.656	1.008	1.162	736	14.562
			%		80,0	6,9	8,0	5,1	100,0
		II	N		10.911	424	1.116	1.046	13.497
			%		80,8	3,1	8,3	7,8	100,0
		III	N		15.634	613	750	3.072	20.069
			%		77,9	3,1	3,7	15,3	100,0
IV		N		21.732	916	2.311	6.655	31.614	
		%		68,7	2,9	7,3	21,1	100,0	
V		N		6.605	478	147	1.562	8.792	
		%		75,1	5,4	1,7	17,8	100,0	
25-44		Total	Total N		162.744	60.751	14.596	82.241	320.330
			%		50,8	19,0	4,6	25,7	100,0
	I	N		25.150	8.549	2.443	8.943	45.086	
		%		55,8	19,0	5,4	19,8	100,0	
	II	N		21.643	7.286	3.476	4.817	37.223	
		%		58,1	19,6	9,3	12,9	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 105. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total		
Mujeres	25-44	III	N	44.148	15.598	2.991	19.292	82.029	
			%	53,8	19,0	3,6	23,5	100,0	
		IV	N	49.557	22.164	3.592	35.412	110.725	
			%	44,8	20,0	3,2	32,0	100,0	
		V	N	22.245	7.153	2.093	13.776	45.267	
			%	49,1	15,8	4,6	30,4	100,0	
	45-64	Total	N	148.354	81.382	9.011	74.851	313.598	
			%	47,3	26,0	2,9	23,9	100,0	
		I	N	13.479	10.569	1.398	6.671	32.116	
			%	42,0	32,9	4,4	20,8	100,0	
		II	N	9.919	8.931	697	7.245	26.792	
			%	37,0	33,3	2,6	27,0	100,0	
		III	N	35.146	26.863	4.391	22.240	88.641	
			%	39,7	30,3	5,0	25,1	100,0	
		IV	N	56.729	22.755	1.397	23.221	104.102	
			%	54,5	21,9	1,3	22,3	100,0	
		V	N	33.081	12.264	1.128	15.473	61.946	
			%	53,4	19,8	1,8	25,0	100,0	
		65-74	Total	N	92.373	12.063	589	4.744	109.770
				%	84,2	11,0	0,5	4,3	100,0
			I	N	4.751	1.961	.	487	7.199
				%	66,0	27,2	.	6,8	100,0
			II	N	5.979	702	.	543	7.225
				%	82,8	9,7	.	7,5	100,0
III	N		18.958	2.341	108	1.493	22.899		
	%		82,8	10,2	0,5	6,5	100,0		
IV	N		43.236	4.891	273	1.735	50.134		
	%		86,2	9,8	0,5	3,5	100,0		
V	N		19.448	2.168	209	487	22.312		
	%		87,2	9,7	0,9	2,2	100,0		
>=75	Total	N	134.304	5.532	.	1.425	141.261		
		%	95,1	3,9	.	1,0	100,0		
	I	N	5.147	477	.	251	5.875		
		%	87,6	8,1	.	4,3	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 105. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total	
Mujeres	>=75	II	N	8.662	1.412	.	217	10.292
			%	84,2	13,7	.	2,1	100,0
		III	N	26.301	1.972	.	196	28.468
			%	92,4	6,9	.	0,7	100,0
		IV	N	62.360	919	.	587	63.866
			%	97,6	1,4	.	0,9	100,0
	V	N	31.833	753	.	174	32.760	
		%	97,2	2,3	.	0,5	100,0	
	Ambos	Total	Total N	1.005.874	411.851	67.386	402.245	1.887.356
			%	53,3	21,8	3,6	21,3	100,0
		I	N	118.287	49.383	11.492	39.366	218.528
			%	54,1	22,6	5,3	18,0	100,0
II		N	98.066	37.954	9.129	28.085	173.234	
		%	56,6	21,9	5,3	16,2	100,0	
III		N	229.109	98.568	14.006	88.779	430.462	
		%	53,2	22,9	3,3	20,6	100,0	
IV		N	415.198	181.960	23.857	189.732	810.747	
		%	51,2	22,4	2,9	23,4	100,0	
V		N	145.214	43.986	8.902	56.283	254.385	
		%	57,1	17,3	3,5	22,1	100,0	
15-24		Total	N	139.786	6.300	10.361	25.987	182.434
			%	76,6	3,5	5,7	14,2	100,0
		I	N	23.552	1.008	1.895	2.741	29.196
			%	80,7	3,5	6,5	9,4	100,0
		II	N	21.120	424	1.323	1.618	24.485
			%	86,3	1,7	5,4	6,6	100,0
		III	N	29.370	1.101	750	5.678	36.900
			%	79,6	3,0	2,0	15,4	100,0
		IV	N	54.963	2.756	4.705	11.927	74.351
			%	73,9	3,7	6,3	16,0	100,0
		V	N	10.780	1.011	1.688	4.024	17.503
			%	61,6	5,8	9,6	23,0	100,0
	25-44	Total	N	328.093	113.422	32.989	182.137	656.640
			%	50,0	17,3	5,0	27,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 105. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total	
Ambos	25-44	I	N	51.206	13.244	6.549	17.819	88.818
			%	57,7	14,9	7,4	20,1	100,0
		II	N	42.708	9.730	6.277	11.005	69.719
			%	61,3	14,0	9,0	15,8	100,0
		III	N	79.086	24.261	4.356	36.583	144.286
			%	54,8	16,8	3,0	25,4	100,0
		IV	N	117.734	52.633	10.616	90.135	271.117
			%	43,4	19,4	3,9	33,2	100,0
		V	N	37.359	13.554	5.191	26.594	82.699
			%	45,2	16,4	6,3	32,2	100,0
	45-64	Total	N	243.264	187.464	19.584	165.653	615.965
			%	39,5	30,4	3,2	26,9	100,0
		I	N	27.459	24.238	2.572	15.755	70.023
			%	39,2	34,6	3,7	22,5	100,0
		II	N	17.035	18.958	1.192	13.026	50.212
			%	33,9	37,8	2,4	25,9	100,0
		III	N	56.637	50.284	7.798	40.244	154.963
			%	36,5	32,4	5,0	26,0	100,0
		IV	N	101.626	74.213	6.208	72.668	254.716
			%	39,9	29,1	2,4	28,5	100,0
		V	N	40.506	19.771	1.814	23.960	86.052
			%	47,1	23,0	2,1	27,8	100,0
	65-74	Total	N	125.939	58.382	3.323	17.859	205.503
			%	61,3	28,4	1,6	8,7	100,0
		I	N	9.011	8.909	378	2.655	20.952
			%	43,0	42,5	1,8	12,7	100,0
		II	N	7.118	4.412	337	2.220	14.087
			%	50,5	31,3	2,4	15,8	100,0
		III	N	28.142	11.590	803	4.141	44.676
			%	63,0	25,9	1,8	9,3	100,0
		IV	N	60.813	27.724	1.596	7.754	97.887
			%	62,1	28,3	1,6	7,9	100,0
		V	N	20.856	5.747	209	1.089	27.901
			%	74,7	20,6	0,7	3,9	100,0
	>=75	Total	N	168.792	46.283	1.128	10.610	226.814

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 105. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Ambos	>=75	Total	%	74,4	20,4	0,5	4,7	100,0
		I	N	7.059	1.984	98	397	9.538
			%	74,0	20,8	1,0	4,2	100,0
		II	N	10.084	4.430	.	217	14.731
			%	68,5	30,1	.	1,5	100,0
		III	N	35.874	11.334	298	2.132	49.638
			%	72,3	22,8	0,6	4,3	100,0
		IV	N	80.062	24.634	732	7.248	112.676
			%	71,1	21,9	0,6	6,4	100,0
		V	N	35.713	3.902	.	616	40.231
			%	88,8	9,7	.	1,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 106. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios*

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Hombres Total	Total	N	401.822	249.197	37.892	226.212	915.124
		%	43,9	27,2	4,1	24,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	82.563	72.341	5.993	49.704	210.600
		%	39,2	34,3	2,8	23,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	66.325	46.912	5.758	48.459	167.454
		%	39,6	28,0	3,4	28,9	100,0
	Secundaria, superior	N	164.549	82.104	18.000	96.018	360.670
		%	45,6	22,8	5,0	26,6	100,0
	Terciaria	N	88.386	47.841	8.142	32.031	176.400
		%	50,1	27,1	4,6	18,2	100,0
15-24	Total	N	73.509	2.860	4.876	13.214	94.458
		%	77,8	3,0	5,2	14,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	8.551	.	511	856	9.918
		%	86,2	.	5,1	8,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	24.579	440	1.695	4.415	31.129
		%	79,0	1,4	5,4	14,2	100,0
	Secundaria, superior	N	31.216	1.810	2.670	7.145	42.840
		%	72,9	4,2	6,2	16,7	100,0
	Terciaria	N	9.163	611	.	798	10.572
		%	86,7	5,8	.	7,6	100,0
25-44	Total	N	165.349	52.671	18.393	99.896	336.309
		%	49,2	15,7	5,5	29,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	16.592	4.568	1.263	15.352	37.776
		%	43,9	12,1	3,3	40,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	15.807	12.127	1.887	22.987	52.808
		%	29,9	23,0	3,6	43,5	100,0
	Secundaria, superior	N	82.932	25.019	10.111	46.212	164.274
		%	50,5	15,2	6,2	28,1	100,0
	Terciaria	N	50.017	10.956	5.132	15.345	81.451
		%	61,4	13,5	6,3	18,8	100,0
45-64	Total	N	94.910	106.182	10.761	90.802	302.655
		%	31,4	35,1	3,6	30,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	21.181	24.679	2.152	22.388	70.400
		%	30,1	35,1	3,1	31,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 106. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios*

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Hombres 45-64	Secundaria, inferior	N	15.227	19.184	1.344	17.490	53.244
		%	28,6	36,0	2,5	32,8	100,0
	Secundaria, superior	N	36.372	38.413	4.845	37.499	117.130
		%	31,1	32,8	4,1	32,0	100,0
	Terciaria	N	22.130	23.906	2.420	13.425	61.881
		%	35,8	38,6	3,9	21,7	100,0
65-74	Total	N	33.566	46.319	2.734	13.115	95.733
		%	35,1	48,4	2,9	13,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	15.748	16.774	1.429	4.065	38.017
		%	41,4	44,1	3,8	10,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	4.737	8.610	565	2.378	16.291
		%	29,1	52,9	3,5	14,6	100,0
	Secundaria, superior	N	9.030	12.368	247	4.303	25.948
		%	34,8	47,7	1,0	16,6	100,0
	Terciaria	N	4.051	8.566	492	2.368	15.477
		%	26,2	55,3	3,2	15,3	100,0
>=75	Total	N	34.489	41.166	1.128	9.185	85.968
		%	40,1	47,9	1,3	10,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	20.491	26.319	637	7.042	54.489
		%	37,6	48,3	1,2	12,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	5.975	6.551	266	1.189	13.981
		%	42,7	46,9	1,9	8,5	100,0
	Secundaria, superior	N	4.999	4.493	127	859	10.478
		%	47,7	42,9	1,2	8,2	100,0
	Terciaria	N	3.025	3.802	98	95	7.020
		%	43,1	54,2	1,4	1,3	100,0
Mujeres Total	Total	N	605.829	164.041	29.682	176.331	975.882
		%	62,1	16,8	3,0	18,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	218.697	24.047	1.966	33.617	278.327
		%	78,6	8,6	0,7	12,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	109.415	24.932	3.885	31.534	169.766
		%	64,5	14,7	2,3	18,6	100,0
	Secundaria, superior	N	158.247	67.730	10.494	71.395	307.866
		%	51,4	22,0	3,4	23,2	100,0
	Terciaria	N	119.469	47.331	13.337	39.785	219.923

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 106. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios*

		Nunca ha fumado		Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total	
Mujeres	Total	Terciaria	%	54,3	21,5	6,1	18,1	100,0
	15-24	Total	N	67.296	3.647	5.486	13.071	89.499
			%	75,2	4,1	6,1	14,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	9.546	263	208	1.369	11.386
			%	83,8	2,3	1,8	12,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	12.328	250	523	3.662	16.763
			%	73,5	1,5	3,1	21,8	100,0
		Secundaria, superior	N	34.306	2.106	2.516	6.516	45.443
			%	75,5	4,6	5,5	14,3	100,0
		Terciaria	N	11.116	1.029	2.239	1.523	15.907
			%	69,9	6,5	14,1	9,6	100,0
	25-44	Total	N	162.744	61.246	14.596	82.241	320.826
			%	50,7	19,1	4,5	25,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	11.865	1.211	285	12.628	25.990
			%	45,7	4,7	1,1	48,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	16.706	8.772	1.336	12.123	38.937
			%	42,9	22,5	3,4	31,1	100,0
		Secundaria, superior	N	59.831	29.825	4.602	36.229	130.487
			%	45,9	22,9	3,5	27,8	100,0
		Terciaria	N	74.341	21.437	8.373	21.260	125.412
			%	59,3	17,1	6,7	17,0	100,0
	45-64	Total	N	148.354	81.553	9.011	74.851	313.769
			%	47,3	26,0	2,9	23,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	46.159	14.116	1.264	16.424	77.963
			%	59,2	18,1	1,6	21,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	32.073	12.993	1.751	14.918	61.735
			%	52,0	21,0	2,8	24,2	100,0
		Secundaria, superior	N	47.235	32.197	3.272	27.618	110.322
			%	42,8	29,2	3,0	25,0	100,0
		Terciaria	N	22.887	22.246	2.725	15.891	63.749
			%	35,9	34,9	4,3	24,9	100,0
	65-74	Total	N	92.528	12.063	589	4.744	109.925
			%	84,2	11,0	0,5	4,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	53.783	5.521	209	2.339	61.852
			%	87,0	8,9	0,3	3,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 106. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios*

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total			
Mujeres	65-74	Secundaria, inferior	N	24.322	2.023	276	831	27.452		
			%	88,6	7,4	1,0	3,0	100,0		
		Secundaria, superior	N	8.232	2.626	105	930	11.893		
			%	69,2	22,1	0,9	7,8	100,0		
		Terciaria	N	6.192	1.892	.	643	8.727		
			%	71,0	21,7	.	7,4	100,0		
	>=75	Total	N	134.907	5.532	.	1.425	141.864		
			%	95,1	3,9	.	1,0	100,0		
		Sin estudios, primaria	N	97.344	2.936	.	856	101.136		
			%	96,3	2,9	.	0,8	100,0		
		Secundaria, inferior	N	23.986	894	.	.	24.879		
			%	96,4	3,6	.	.	100,0		
		Secundaria, superior	N	8.643	975	.	101	9.720		
			%	88,9	10,0	.	1,0	100,0		
		Terciaria	N	4.934	727	.	467	6.129		
			%	80,5	11,9	.	7,6	100,0		
		Ambos	Total	Total	N	1.007.651	413.238	67.574	402.543	1.891.006
				%	53,3	21,9	3,6	21,3	100,0	
Sin estudios, primaria	N		301.260	96.388	7.959	83.321	488.927			
	%		61,6	19,7	1,6	17,0	100,0			
Secundaria, inferior	N		175.740	71.844	9.643	79.993	337.220			
	%		52,1	21,3	2,9	23,7	100,0			
Secundaria, superior	N		322.796	149.833	28.494	167.413	668.536			
	%		48,3	22,4	4,3	25,0	100,0			
Terciaria	N		207.855	95.173	21.479	71.816	396.323			
	%		52,4	24,0	5,4	18,1	100,0			
15-24	Total		N	140.805	6.507	10.361	26.285	183.958		
			%	76,5	3,5	5,6	14,3	100,0		
	Sin estudios, primaria		N	18.097	263	719	2.226	21.304		
			%	84,9	1,2	3,4	10,4	100,0		
	Secundaria, inferior		N	36.908	689	2.218	8.077	47.891		
			%	77,1	1,4	4,6	16,9	100,0		
	Secundaria, superior		N	65.522	3.915	5.185	13.661	88.283		
			%	74,2	4,4	5,9	15,5	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 106. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios*

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total	
Ambos	15-24	Terciaria	N	20.278	1.640	2.239	2.321	26.479
			%	76,6	6,2	8,5	8,8	100,0
	25-44	Total	N	328.093	113.917	32.989	182.137	657.135
			%	49,9	17,3	5,0	27,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	28.458	5.779	1.548	27.980	63.765
			%	44,6	9,1	2,4	43,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	32.513	20.899	3.223	35.110	91.745
			%	35,4	22,8	3,5	38,3	100,0
		Secundaria, superior	N	142.763	54.845	14.712	82.441	294.762
			%	48,4	18,6	5,0	28,0	100,0
		Terciaria	N	124.358	32.393	13.505	36.606	206.862
			%	60,1	15,7	6,5	17,7	100,0
	45-64	Total	N	243.264	187.734	19.773	165.653	616.424
			%	39,5	30,5	3,2	26,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	67.339	38.795	3.416	38.812	148.363
			%	45,4	26,1	2,3	26,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	47.300	32.177	3.095	32.408	114.979
			%	41,1	28,0	2,7	28,2	100,0
		Secundaria, superior	N	83.607	70.610	8.117	65.117	227.452
			%	36,8	31,0	3,6	28,6	100,0
		Terciaria	N	45.017	46.152	5.144	29.316	125.630
			%	35,8	36,7	4,1	23,3	100,0
	65-74	Total	N	126.094	58.382	3.323	17.859	205.658
			%	61,3	28,4	1,6	8,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	69.531	22.296	1.638	6.404	99.869
			%	69,6	22,3	1,6	6,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	29.059	10.634	841	3.210	43.744
			%	66,4	24,3	1,9	7,3	100,0
		Secundaria, superior	N	17.262	14.994	352	5.233	37.841
			%	45,6	39,6	0,9	13,8	100,0
		Terciaria	N	10.243	10.458	492	3.011	24.204
			%	42,3	43,2	2,0	12,4	100,0
>=75	Total		N	169.396	46.698	1.128	10.610	227.832
			%	74,4	20,5	0,5	4,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 106. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Ambos	>=75	Sin estudios, primaria	N	117.835	29.255	637	7.899	155.625
			%	75,7	18,8	0,4	5,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	29.960	7.445	266	1.189	38.860
			%	77,1	19,2	0,7	3,1	100,0
		Secundaria, superior	N	13.642	5.469	127	960	20.198
			%	67,5	27,1	0,6	4,8	100,0
		Terciaria	N	7.959	4.529	98	562	13.149
			%	60,5	34,4	0,7	4,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 107. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y territorio histórico

			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Hombres Total	CAPV	N	32.057	72.488	72.469	49.197	226.212
		%	14,2	32,0	32,0	21,7	100,0
	Araba	N	3.888	10.838	9.611	6.177	30.514
		%	12,7	35,5	31,5	20,2	100,0
	Gipuzkoa	N	9.094	23.597	20.700	15.395	68.786
		%	13,2	34,3	30,1	22,4	100,0
	Bizkaia	N	19.076	38.054	42.158	27.625	126.913
		%	15,0	30,0	33,2	21,8	100,0
15-24	CAPV	N	402	6.062	6.012	738	13.214
		%	3,0	45,9	45,5	5,6	100,0
	Araba	N	146	1.168	646	.	1.960
		%	7,4	59,6	33,0	.	100,0
	Gipuzkoa	N	256	2.638	855	161	3.911
		%	6,6	67,5	21,9	4,1	100,0
	Bizkaia	N	.	2.256	4.510	576	7.343
		%	.	30,7	61,4	7,9	100,0
25-44	CAPV	N	13.138	31.700	35.361	19.697	99.896
		%	13,2	31,7	35,4	19,7	100,0
	Araba	N	1.439	5.576	5.109	2.328	14.452
		%	10,0	38,6	35,4	16,1	100,0
	Gipuzkoa	N	3.646	12.171	9.814	6.927	32.557
		%	11,2	37,4	30,1	21,3	100,0
	Bizkaia	N	8.054	13.953	20.438	10.442	52.887
		%	15,2	26,4	38,6	19,7	100,0
45-64	CAPV	N	13.836	29.569	25.513	21.884	90.802
		%	15,2	32,6	28,1	24,1	100,0
	Araba	N	1.810	3.076	3.367	2.688	10.941
		%	16,5	28,1	30,8	24,6	100,0
	Gipuzkoa	N	3.654	7.107	8.244	6.118	25.123
		%	14,5	28,3	32,8	24,4	100,0
	Bizkaia	N	8.372	19.386	13.903	13.078	54.738
		%	15,3	35,4	25,4	23,9	100,0
65-74	CAPV	N	2.758	2.525	3.852	3.980	13.115
		%	21,0	19,3	29,4	30,3	100,0
	Araba	N	73	677	319	763	1.832
		%	4,0	36,9	17,4	41,6	100,0

(continuación)

Tabla 107. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y territorio histórico

				10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total	
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	1.126	778	1.648	1.412	4.964	
			%	22,7	15,7	33,2	28,5	100,0	
		Bizkaia	N	1.558	1.070	1.885	1.805	6.319	
			%	24,7	16,9	29,8	28,6	100,0	
		>=75	CAPV	N	1.923	2.633	1.732	2.898	9.185
				%	20,9	28,7	18,9	31,6	100,0
	Araba		N	419	341	170	398	1.329	
			%	31,6	25,7	12,8	30,0	100,0	
	Gipuzkoa		N	412	903	140	776	2.231	
			%	18,5	40,5	6,3	34,8	100,0	
	Bizkaia	N	1.092	1.388	1.423	1.723	5.625		
		%	19,4	24,7	25,3	30,6	100,0		
	Mujeres	Total	CAPV	N	19.010	53.195	55.751	48.375	176.331
				%	10,8	30,2	31,6	27,4	100,0
			Araba	N	4.211	8.741	7.576	5.738	26.266
				%	16,0	33,3	28,8	21,8	100,0
			Gipuzkoa	N	6.678	16.285	18.077	15.846	56.887
				%	11,7	28,6	31,8	27,9	100,0
Bizkaia		N	8.121	28.170	30.098	26.790	93.179		
		%	8,7	30,2	32,3	28,8	100,0		
15-24		CAPV	N	2.952	5.142	4.399	578	13.071	
			%	22,6	39,3	33,7	4,4	100,0	
		Araba	N	881	872	585	.	2.338	
			%	37,7	37,3	25,0	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.454	1.211	1.508	.	4.172	
			%	34,8	29,0	36,1	.	100,0	
Bizkaia		N	618	3.060	2.305	578	6.561		
		%	9,4	46,6	35,1	8,8	100,0		
25-44		CAPV	N	8.391	27.315	28.361	18.173	82.241	
			%	10,2	33,2	34,5	22,1	100,0	
	Araba	N	1.920	5.063	2.467	2.691	12.141		
		%	15,8	41,7	20,3	22,2	100,0		
	Gipuzkoa	N	3.821	8.800	9.776	7.110	29.507		
		%	12,9	29,8	33,1	24,1	100,0		
Bizkaia	N	2.651	13.452	16.118	8.372	40.593			
	%	6,5	33,1	39,7	20,6	100,0			

(continuación)

Tabla 107. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y territorio histórico

				10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	7.117	20.657	21.959	25.118	74.851
			%	9,5	27,6	29,3	33,6	100,0
		Araba	N	1.118	2.806	4.146	2.740	10.810
			%	10,3	26,0	38,4	25,3	100,0
		Gipuzkoa	N	1.404	6.193	6.661	7.211	21.469
			%	6,5	28,8	31,0	33,6	100,0
	Bizkaia	N	4.596	11.657	11.151	15.167	42.572	
		%	10,8	27,4	26,2	35,6	100,0	
	65-74	CAPV	N	549	82	917	3.196	4.744
			%	11,6	1,7	19,3	67,4	100,0
		Araba	N	293	.	262	212	767
			%	38,2	.	34,1	27,7	100,0
		Gipuzkoa	N	.	82	132	1.105	1.319
			%	.	6,2	10,0	83,8	100,0
	Bizkaia	N	257	.	523	1.879	2.658	
		%	9,7	.	19,7	70,7	100,0	
	>=75	CAPV	N	.	.	115	1.309	1.425
			%	.	.	8,1	91,9	100,0
		Araba	N	.	.	115	95	210
			%	.	.	55,0	45,0	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	.	420	420
			%	.	.	.	100,0	100,0
	Bizkaia	N	.	.	.	795	795	
		%	.	.	.	100,0	100,0	
Ambos	Total	CAPV	N	51.067	125.684	128.221	97.572	402.543
			%	12,7	31,2	31,9	24,2	100,0
	Araba	N	8.099	19.579	17.187	11.915	56.780	
		%	14,3	34,5	30,3	21,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	15.771	39.881	38.777	31.242	125.672	
		%	12,5	31,7	30,9	24,9	100,0	
	Bizkaia	N	27.197	66.223	72.256	54.415	220.092	
		%	12,4	30,1	32,8	24,7	100,0	
	15-24	CAPV	N	3.354	11.204	10.411	1.316	26.285
			%	12,8	42,6	39,6	5,0	100,0
		Araba	N	1.026	2.039	1.232	.	4.297
			%	23,9	47,5	28,7	.	100,0

(continuación)

Tabla 107. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y territorio histórico

			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total	
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	1.710	3.849	2.363	161	8.084
			%	21,2	47,6	29,2	2,0	100,0
		Bizkaia	N	618	5.316	6.816	1.154	13.904
			%	4,4	38,2	49,0	8,3	100,0
	25-44	CAPV	N	21.530	59.014	63.722	37.871	182.137
			%	11,8	32,4	35,0	20,8	100,0
		Araba	N	3.358	10.639	7.576	5.019	26.593
			%	12,6	40,0	28,5	18,9	100,0
		Gipuzkoa	N	7.466	20.970	19.590	14.037	62.064
			%	12,0	33,8	31,6	22,6	100,0
		Bizkaia	N	10.705	27.406	36.556	18.814	93.480
			%	11,5	29,3	39,1	20,1	100,0
	45-64	CAPV	N	20.953	50.226	47.472	47.002	165.653
			%	12,6	30,3	28,7	28,4	100,0
		Araba	N	2.928	5.882	7.513	5.428	21.751
			%	13,5	27,0	34,5	25,0	100,0
		Gipuzkoa	N	5.057	13.300	14.905	13.329	46.591
			%	10,9	28,5	32,0	28,6	100,0
		Bizkaia	N	12.967	31.044	25.054	28.245	97.310
			%	13,3	31,9	25,7	29,0	100,0
	65-74	CAPV	N	3.308	2.606	4.769	7.176	17.859
			%	18,5	14,6	26,7	40,2	100,0
		Araba	N	366	677	581	975	2.599
			%	14,1	26,0	22,4	37,5	100,0
		Gipuzkoa	N	1.126	859	1.779	2.518	6.282
			%	17,9	13,7	28,3	40,1	100,0
		Bizkaia	N	1.815	1.070	2.408	3.683	8.977
			%	20,2	11,9	26,8	41,0	100,0
	>=75	CAPV	N	1.923	2.633	1.847	4.207	10.610
			%	18,1	24,8	17,4	39,7	100,0
		Araba	N	419	341	285	493	1.539
			%	27,3	22,2	18,5	32,0	100,0
		Gipuzkoa	N	412	903	140	1.197	2.651
			%	15,5	34,1	5,3	45,1	100,0
		Bizkaia	N	1.092	1.388	1.423	2.518	6.420
			%	17,0	21,6	22,2	39,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 108. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social

		10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total	
Hombres	Total	Total N	32.057	72.488	72.172	49.197	225.914
		%	14,2	32,1	31,9	21,8	100,0
	I	N	2.763	6.087	7.015	6.414	22.279
		%	12,4	27,3	31,5	28,8	100,0
	II	N	1.527	3.160	5.415	4.115	14.217
		%	10,7	22,2	38,1	28,9	100,0
	III	N	3.935	11.103	17.278	10.170	42.486
		%	9,3	26,1	40,7	23,9	100,0
	IV	N	19.968	45.019	34.479	22.655	122.121
		%	16,4	36,9	28,2	18,6	100,0
	V	N	3.864	7.119	7.984	5.843	24.811
		%	15,6	28,7	32,2	23,6	100,0
	15-24	Total N	402	6.062	5.714	738	12.916
		%	3,1	46,9	44,2	5,7	100,0
	I	N	.	1.026	728	252	2.005
		%	.	51,2	36,3	12,5	100,0
	II	N	.	268	304	.	571
		%	.	46,9	53,1	.	100,0
	III	N	.	816	1.790	.	2.606
		%	.	31,3	68,7	.	100,0
	IV	N	402	2.920	1.464	486	5.271
		%	7,6	55,4	27,8	9,2	100,0
	V	N	.	1.033	1.429	.	2.462
		%	.	41,9	58,1	.	100,0
	25-44	Total N	13.138	31.700	35.361	19.697	99.896
		%	13,2	31,7	35,4	19,7	100,0
	I	N	602	2.736	3.198	2.339	8.876
		%	6,8	30,8	36,0	26,4	100,0
	II	N	670	786	2.914	1.818	6.188
		%	10,8	12,7	47,1	29,4	100,0
	III	N	1.094	3.744	8.236	4.217	17.291
		%	6,3	21,7	47,6	24,4	100,0
	IV	N	9.085	20.585	16.781	8.272	54.723
		%	16,6	37,6	30,7	15,1	100,0
	V	N	1.687	3.848	4.231	3.051	12.818
		%	13,2	30,0	33,0	23,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 108. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social

			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total		
Hombres	45-64	Total	N	13.836	29.569	25.513	21.884	90.802	
			%	15,2	32,6	28,1	24,1	100,0	
	I	N	1.871	1.987	2.424	2.801	9.084		
		%	20,6	21,9	26,7	30,8	100,0		
	II	N	361	1.797	1.705	1.919	5.781		
		%	6,2	31,1	29,5	33,2	100,0		
	III	N	2.458	6.100	5.996	3.450	18.004		
		%	13,7	33,9	33,3	19,2	100,0		
	IV	N	7.214	17.875	13.219	11.140	49.447		
		%	14,6	36,2	26,7	22,5	100,0		
	V	N	1.933	1.810	2.170	2.575	8.487		
		%	22,8	21,3	25,6	30,3	100,0		
	Mujeres	65-74	Total	N	2.758	2.525	3.852	3.980	13.115
				%	21,0	19,3	29,4	30,3	100,0
		I	N	144	337	666	1.022	2.168	
			%	6,6	15,5	30,7	47,1	100,0	
		II	N	497	309	492	379	1.677	
			%	29,6	18,4	29,4	22,6	100,0	
		III	N	382	.	910	1.356	2.648	
			%	14,4	.	34,4	51,2	100,0	
		IV	N	1.634	1.647	1.629	1.110	6.020	
			%	27,1	27,4	27,1	18,4	100,0	
		V	N	102	232	154	114	602	
			%	16,9	38,5	25,6	19,0	100,0	
Mujeres		>=75	Total	N	1.923	2.633	1.732	2.898	9.185
				%	20,9	28,7	18,9	31,6	100,0
		I	N	146	.	.	.	146	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
		III	N	.	443	346	1.147	1.937	
			%	.	22,9	17,9	59,2	100,0	
		IV	N	1.634	1.992	1.386	1.648	6.660	
			%	24,5	29,9	20,8	24,7	100,0	
		V	N	142	197	.	103	442	
			%	32,2	44,6	.	23,2	100,0	
		Mujeres Total	Total	N	19.010	53.195	55.751	48.375	176.331
				%	10,8	30,2	31,6	27,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 108. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social

				10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Mujeres Total	Total	I	N	1.642	5.771	3.912	5.762	17.088
			%	9,6	33,8	22,9	33,7	100,0
		II	N	2.957	3.254	3.456	4.202	13.868
			%	21,3	23,5	24,9	30,3	100,0
		III	N	3.424	14.765	14.461	13.643	46.293
			%	7,4	31,9	31,2	29,5	100,0
		IV	N	8.623	20.031	22.325	16.630	67.610
			%	12,8	29,6	33,0	24,6	100,0
		V	N	2.364	9.374	11.598	8.137	31.473
			%	7,5	29,8	36,9	25,9	100,0
	15-24	Total	N	2.952	5.142	4.399	578	13.071
			%	22,6	39,3	33,7	4,4	100,0
		I	N	308	.	427	.	736
			%	41,9	.	58,1	.	100,0
		II	N	678	369	.	.	1.046
			%	64,8	35,2	.	.	100,0
		III	N	463	908	1.456	246	3.072
			%	15,1	29,5	47,4	8,0	100,0
		IV	N	1.327	3.040	1.957	332	6.655
			%	19,9	45,7	29,4	5,0	100,0
		V	N	177	826	559	.	1.562
			%	11,3	52,9	35,8	.	100,0
	25-44	Total	N	8.391	27.315	28.361	18.173	82.241
			%	10,2	33,2	34,5	22,1	100,0
		I	N	909	3.465	1.882	2.688	8.943
			%	10,2	38,7	21,0	30,1	100,0
		II	N	637	1.119	1.888	1.172	4.817
			%	13,2	23,2	39,2	24,3	100,0
		III	N	984	6.004	6.405	5.899	19.292
			%	5,1	31,1	33,2	30,6	100,0
		IV	N	5.267	11.861	11.762	6.523	35.412
			%	14,9	33,5	33,2	18,4	100,0
		V	N	594	4.867	6.424	1.891	13.776
			%	4,3	35,3	46,6	13,7	100,0
	45-64	Total	N	7.117	20.657	21.959	25.118	74.851
			%	9,5	27,6	29,3	33,6	100,0

(continuación)

Tabla 108. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social

			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total	
Mujeres	45-64	I	N	168	2.307	1.602	2.594	6.671
			%	2,5	34,6	24,0	38,9	100,0
		II	N	1.642	1.766	1.270	2.567	7.245
			%	22,7	24,4	17,5	35,4	100,0
		III	N	1.684	7.772	6.516	6.269	22.240
			%	7,6	34,9	29,3	28,2	100,0
		IV	N	2.030	5.131	7.957	8.103	23.221
		%	8,7	22,1	34,3	34,9	100,0	
		V	N	1.593	3.681	4.615	5.585	15.473
		%	10,3	23,8	29,8	36,1	100,0	
		65-74 Total	N	549	82	917	3.196	4.744
			%	11,6	1,7	19,3	67,4	100,0
		I	N	257	.	.	230	487
			%	52,7	.	.	47,3	100,0
		II	N	.	.	182	361	543
			%	.	.	33,6	66,4	100,0
		III	N	293	82	85	1.033	1.493
			%	19,6	5,5	5,7	69,2	100,0
	IV	N	.	.	650	1.085	1.735	
		%	.	.	37,5	62,5	100,0	
	V	N	.	.	.	487	487	
		%	.	.	.	100,0	100,0	
	>=75 Total	N	.	.	115	1.309	1.425	
		%	.	.	8,1	91,9	100,0	
	I	N	.	.	.	251	251	
		%	.	.	.	100,0	100,0	
	II	N	.	.	115	101	217	
		%	.	.	53,3	46,7	100,0	
	III	N	.	.	.	196	196	
		%	.	.	.	100,0	100,0	
	IV	N	.	.	.	587	587	
		%	.	.	.	100,0	100,0	
	V	N	.	.	.	174	174	
		%	.	.	.	100,0	100,0	
Ambos sexos Total		Total	N	51.067	125.684	127.923	97.572	402.245
			%	12,7	31,2	31,8	24,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 108. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social

			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Total	I	N	4.406	11.858	10.927	12.176	39.366
		%	11,2	30,1	27,8	30,9	100,0
	II	N	4.484	6.414	8.871	8.317	28.085
		%	16,0	22,8	31,6	29,6	100,0
	III	N	7.358	25.868	31.739	23.813	88.779
		%	8,3	29,1	35,8	26,8	100,0
	IV	N	28.592	65.050	56.804	39.286	189.732
		%	15,1	34,3	29,9	20,7	100,0
	V	N	6.228	16.493	19.582	13.981	56.283
		%	11,1	29,3	34,8	24,8	100,0
15-24	Total	N	3.354	11.204	10.113	1.316	25.987
		%	12,9	43,1	38,9	5,1	100,0
	I	N	308	1.026	1.155	252	2.741
		%	11,2	37,4	42,1	9,2	100,0
	II	N	678	636	304	.	1.618
		%	41,9	39,3	18,8	.	100,0
	III	N	463	1.724	3.246	246	5.678
		%	8,1	30,4	57,2	4,3	100,0
	IV	N	1.728	5.959	3.420	819	11.927
		%	14,5	50,0	28,7	6,9	100,0
	V	N	177	1.859	1.988	.	4.024
		%	4,4	46,2	49,4	.	100,0
25-44	Total	N	21.530	59.014	63.722	37.871	182.137
		%	11,8	32,4	35,0	20,8	100,0
	I	N	1.512	6.201	5.080	5.027	17.819
		%	8,5	34,8	28,5	28,2	100,0
	II	N	1.307	1.905	4.802	2.990	11.005
		%	11,9	17,3	43,6	27,2	100,0
	III	N	2.078	9.748	14.640	10.116	36.583
		%	5,7	26,6	40,0	27,7	100,0
	IV	N	14.351	32.445	28.544	14.794	90.135
		%	15,9	36,0	31,7	16,4	100,0
	V	N	2.281	8.715	10.655	4.943	26.594
		%	8,6	32,8	40,1	18,6	100,0
45-64	Total	N	20.953	50.226	47.472	47.002	165.653
		%	12,6	30,3	28,7	28,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 108. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social

			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total		
Ambos	45-64	I	N	2.039	4.294	4.026	5.395	15.755	
			%	12,9	27,3	25,6	34,2	100,0	
		II	N	2.002	3.563	2.975	4.486	13.026	
			%	15,4	27,4	22,8	34,4	100,0	
		III	N	4.142	13.871	12.512	9.719	40.244	
			%	10,3	34,5	31,1	24,2	100,0	
		IV	N	9.244	23.006	21.175	19.243	72.668	
			%	12,7	31,7	29,1	26,5	100,0	
		V	N	3.526	5.491	6.784	8.159	23.960	
			%	14,7	22,9	28,3	34,1	100,0	
		65-74	Total	N	3.308	2.606	4.769	7.176	17.859
				%	18,5	14,6	26,7	40,2	100,0
	I	N	400	337	666	1.252	2.655		
		%	15,1	12,7	25,1	47,1	100,0		
	II	N	497	309	675	739	2.220		
		%	22,4	13,9	30,4	33,3	100,0		
	III	N	675	82	995	2.389	4.141		
		%	16,3	2,0	24,0	57,7	100,0		
	IV	N	1.634	1.647	2.279	2.194	7.754		
		%	21,1	21,2	29,4	28,3	100,0		
	V	N	102	232	154	601	1.089		
		%	9,3	21,3	14,2	55,2	100,0		
	>=75	Total	N	1.923	2.633	1.847	4.207	10.610	
			%	18,1	24,8	17,4	39,7	100,0	
	I	N	146	.	.	251	397		
		%	36,8	.	.	63,2	100,0		
	II	N	.	.	115	101	217		
		%	.	.	53,3	46,7	100,0		
	III	N	.	443	346	1.343	2.132		
		%	.	20,8	16,2	63,0	100,0		
	IV	N	1.634	1.992	1.386	2.235	7.248		
		%	22,5	27,5	19,1	30,8	100,0		
	V	N	142	197	.	277	616		
		%	23,1	32,0	.	44,9	100,0		

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 109. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y nivel de estudios*

			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Hombres	Total	N	32.057	72.488	72.469	49.197	226.212
		%	14,2	32,0	32,0	21,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	8.314	14.788	13.600	13.002	49.704
		%	16,7	29,8	27,4	26,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	8.059	17.296	15.077	8.027	48.459
		%	16,6	35,7	31,1	16,6	100,0
	Secundaria, superior	N	12.907	32.030	33.552	17.529	96.018
		%	13,4	33,4	34,9	18,3	100,0
	Terciaria	N	2.776	8.375	10.241	10.640	32.031
		%	8,7	26,1	32,0	33,2	100,0
15-24	Total	N	402	6.062	6.012	738	13.214
		%	3,0	45,9	45,5	5,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	.	856	.	856
		%	.	.	100,0	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	402	2.545	1.306	161	4.415
		%	9,1	57,6	29,6	3,7	100,0
	Secundaria, superior	N	.	3.272	3.548	325	7.145
		%	.	45,8	49,7	4,5	100,0
	Terciaria	N	.	245	301	252	798
		%	.	30,7	37,7	31,5	100,0
25-44	Total	N	13.138	31.700	35.361	19.697	99.896
		%	13,2	31,7	35,4	19,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.953	4.900	4.257	3.242	15.352
		%	19,2	31,9	27,7	21,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.202	7.907	8.633	3.245	22.987
		%	13,9	34,4	37,6	14,1	100,0
	Secundaria, superior	N	5.558	14.993	17.313	8.348	46.212
		%	12,0	32,4	37,5	18,1	100,0
	Terciaria	N	1.425	3.901	5.158	4.862	15.345
		%	9,3	25,4	33,6	31,7	100,0
45-64	Total	N	13.836	29.569	25.513	21.884	90.802
		%	15,2	32,6	28,1	24,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.099	6.360	6.172	6.757	22.388
		%	13,8	28,4	27,6	30,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.734	6.264	4.186	3.305	17.490
		%	21,4	35,8	23,9	18,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 109. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y nivel de estudios*

			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Hombres 45-64	Secundaria, superior	N	5.652	13.192	10.982	7.674	37.499
		%	15,1	35,2	29,3	20,5	100,0
	Terciaria	N	1.351	3.753	4.173	4.148	13.425
		%	10,1	28,0	31,1	30,9	100,0
65-74	Total	N	2.758	2.525	3.852	3.980	13.115
		%	21,0	19,3	29,4	30,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	625	1.181	1.063	1.197	4.065
		%	15,4	29,0	26,1	29,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	721	295	611	752	2.378
		%	30,3	12,4	25,7	31,6	100,0
	Secundaria, superior	N	1.412	573	1.569	748	4.303
		%	32,8	13,3	36,5	17,4	100,0
	Terciaria	N	.	476	609	1.283	2.368
		%	.	20,1	25,7	54,2	100,0
>=75	Total	N	1.923	2.633	1.732	2.898	9.185
		%	20,9	28,7	18,9	31,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.638	2.347	1.251	1.806	7.042
		%	23,3	33,3	17,8	25,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	286	341	563	1.189
		%	.	24,0	28,7	47,3	100,0
	Secundaria, superior	N	285	.	140	435	859
		%	33,2	.	16,2	50,6	100,0
	Terciaria	N	.	.	.	95	95
		%	.	.	.	100,0	100,0
Total	Total	N	19.010	53.195	55.751	48.375	176.331
		%	10,8	30,2	31,6	27,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	5.097	7.234	9.694	11.592	33.617
		%	15,2	21,5	28,8	34,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.747	11.999	10.389	6.399	31.534
		%	8,7	38,1	32,9	20,3	100,0
	Secundaria, superior	N	7.780	22.801	24.806	16.008	71.395
		%	10,9	31,9	34,7	22,4	100,0
	Terciaria	N	3.385	11.162	10.863	14.376	39.785
		%	8,5	28,1	27,3	36,1	100,0
Total	Total	N	2.952	5.142	4.399	578	13.071
		%	22,6	39,3	33,7	4,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 109. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y nivel de estudios*

			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total	
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	1.128	241	.	.	1.369
			%	82,4	17,6	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	546	1.975	1.142	.	3.662
			%	14,9	53,9	31,2	.	100,0
		Secundaria, superior	N	775	2.649	2.760	332	6.516
			%	11,9	40,7	42,4	5,1	100,0
		Terciaria	N	504	277	497	246	1.523
			%	33,1	18,2	32,6	16,1	100,0
	25-44	Total	N	8.391	27.315	28.361	18.173	82.241
			%	10,2	33,2	34,5	22,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.275	4.402	4.154	1.797	12.628
			%	18,0	34,9	32,9	14,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	608	5.523	4.517	1.475	12.123
			%	5,0	45,6	37,3	12,2	100,0
		Secundaria, superior	N	3.903	12.335	13.560	6.431	36.229
			%	10,8	34,0	37,4	17,8	100,0
		Terciaria	N	1.605	5.055	6.131	8.469	21.260
			%	7,5	23,8	28,8	39,8	100,0
	45-64	Total	N	7.117	20.657	21.959	25.118	74.851
			%	9,5	27,6	29,3	33,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.581	2.591	5.363	6.889	16.424
			%	9,6	15,8	32,7	41,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.413	4.502	4.365	4.638	14.918
			%	9,5	30,2	29,3	31,1	100,0
		Secundaria, superior	N	2.846	7.735	8.270	8.767	27.618
			%	10,3	28,0	29,9	31,7	100,0
		Terciaria	N	1.276	5.829	3.961	4.824	15.891
			%	8,0	36,7	24,9	30,4	100,0
	65-74	Total	N	549	82	917	3.196	4.744
			%	11,6	1,7	19,3	67,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	112	.	177	2.049	2.339
			%	4,8	.	7,6	87,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	180	.	365	286	831
			%	21,7	.	43,9	34,4	100,0
		Secundaria, superior	N	257	82	216	376	930
			%	27,6	8,8	23,2	40,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 109. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y nivel de estudios*

			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total		
Mujeres	65-74	Terciaria	N	.	.	159	485	643	
			%	.	.	24,6	75,4	100,0	
	>=75	Total	N	.	.	115	1.309	1.425	
			%	.	.	8,1	91,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	.	.	.	856	856	
			%	.	.	.	100,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	.	.	101	101	
			%	.	.	.	100,0	100,0	
		Terciaria	N	.	.	115	352	467	
			%	.	.	24,7	75,3	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	51.067	125.684	128.221	97.572	402.543
				%	12,7	31,2	31,9	24,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	13.412	22.022	23.294	24.594	83.321	
			%	16,1	26,4	28,0	29,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	10.806	29.295	25.466	14.426	79.993	
			%	13,5	36,6	31,8	18,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	20.688	54.831	58.358	33.537	167.413	
			%	12,4	32,8	34,9	20,0	100,0	
		Terciaria	N	6.161	19.536	21.103	25.015	71.816	
			%	8,6	27,2	29,4	34,8	100,0	
	15-24	Total	N	3.354	11.204	10.411	1.316	26.285	
			%	12,8	42,6	39,6	5,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	1.128	241	856	.	2.226	
			%	50,7	10,8	38,5	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	948	4.520	2.448	161	8.077	
			%	11,7	56,0	30,3	2,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	775	5.921	6.308	657	13.661	
			%	5,7	43,3	46,2	4,8	100,0	
		Terciaria	N	504	522	798	497	2.321	
			%	21,7	22,5	34,4	21,4	100,0	
	25-44	Total	N	21.530	59.014	63.722	37.871	182.137	
			%	11,8	32,4	35,0	20,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	5.228	9.302	8.411	5.039	27.980	
			%	18,7	33,2	30,1	18,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	3.810	13.429	13.150	4.721	35.110	
			%	10,9	38,2	37,5	13,4	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 109. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y nivel de estudios*

			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total	
Ambos	25-44	Secundaria, superior	N	9.461	27.327	30.873	14.779	82.441
			%	11,5	33,1	37,4	17,9	100,0
		Terciaria	N	3.030	8.956	11.288	13.332	36.606
			%	8,3	24,5	30,8	36,4	100,0
	45-64	Total	N	20.953	50.226	47.472	47.002	165.653
			%	12,6	30,3	28,7	28,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.680	8.951	11.535	13.646	38.812
			%	12,1	23,1	29,7	35,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.147	10.766	8.552	7.943	32.408
			%	15,9	33,2	26,4	24,5	100,0
		Secundaria, superior	N	8.498	20.927	19.251	16.441	65.117
			%	13,0	32,1	29,6	25,2	100,0
		Terciaria	N	2.627	9.582	8.134	8.973	29.316
			%	9,0	32,7	27,7	30,6	100,0
	65-74	Total	N	3.308	2.606	4.769	7.176	17.859
			%	18,5	14,6	26,7	40,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	737	1.181	1.240	3.246	6.404
			%	11,5	18,4	19,4	50,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	901	295	975	1.039	3.210
			%	28,1	9,2	30,4	32,4	100,0
		Secundaria, superior	N	1.669	655	1.786	1.124	5.233
			%	31,9	12,5	34,1	21,5	100,0
		Terciaria	N	.	476	768	1.768	3.011
			%	.	15,8	25,5	58,7	100,0
	>=75	Total	N	1.923	2.633	1.847	4.207	10.610
			%	18,1	24,8	17,4	39,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.638	2.347	1.251	2.662	7.899
			%	20,7	29,7	15,8	33,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	286	341	563	1.189
			%	.	24,0	28,7	47,3	100,0
		Secundaria, superior	N	285	.	140	536	960
			%	29,7	.	14,5	55,8	100,0
		Terciaria	N	.	.	115	447	562
			%	.	.	20,5	79,5	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 110. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y territorio histórico

			1-10	11-20	>20	Total
Hombres Total	CAPV	N	113.642	87.645	24.925	226.212
		%	50,2	38,7	11,0	100,0
	Araba	N	16.299	11.392	2.823	30.514
		%	53,4	37,3	9,3	100,0
	Gipuzkoa	N	36.463	26.213	6.110	68.786
		%	53,0	38,1	8,9	100,0
	Bizkaia	N	60.880	50.040	15.993	126.913
		%	48,0	39,4	12,6	100,0
15-24	CAPV	N	10.092	2.865	256	13.214
		%	76,4	21,7	1,9	100,0
	Araba	N	1.633	327	.	1.960
		%	83,3	16,7	.	100,0
	Gipuzkoa	N	2.454	1.201	256	3.911
		%	62,7	30,7	6,6	100,0
	Bizkaia	N	6.005	1.337	.	7.343
		%	81,8	18,2	.	100,0
25-44	CAPV	N	51.061	40.943	7.892	99.896
		%	51,1	41,0	7,9	100,0
	Araba	N	7.617	5.877	957	14.452
		%	52,7	40,7	6,6	100,0
	Gipuzkoa	N	17.378	13.041	2.138	32.557
		%	53,4	40,1	6,6	100,0
	Bizkaia	N	26.066	22.025	4.796	52.887
		%	49,3	41,6	9,1	100,0
45-64	CAPV	N	39.008	37.486	14.308	90.802
		%	43,0	41,3	15,8	100,0
	Araba	N	4.993	4.370	1.579	10.941
		%	45,6	39,9	14,4	100,0
	Gipuzkoa	N	11.945	9.835	3.342	25.123
		%	47,5	39,1	13,3	100,0
	Bizkaia	N	22.070	23.281	9.387	54.738
		%	40,3	42,5	17,1	100,0
65-74	CAPV	N	7.259	4.008	1.848	13.115
		%	55,3	30,6	14,1	100,0
	Araba	N	1.011	535	286	1.832
		%	55,2	29,2	15,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 110. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y territorio histórico

				1-10	11-20	>20	Total		
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	2.873	1.718	373	4.964		
			%	57,9	34,6	7,5	100,0		
		Bizkaia	N	3.375	1.755	1.189	6.319		
			%	53,4	27,8	18,8	100,0		
	>=75	CAPV	N	6.222	2.343	620	9.185		
			%	67,7	25,5	6,8	100,0		
			Araba	N	1.045	284	.	1.329	
				%	78,7	21,3	.	100,0	
			Gipuzkoa	N	1.813	418	.	2.231	
				%	81,3	18,7	.	100,0	
			Bizkaia	N	3.364	1.641	620	5.625	
				%	59,8	29,2	11,0	100,0	
		Mujeres	Total	CAPV	N	99.074	65.629	11.628	176.331
					%	56,2	37,2	6,6	100,0
				Araba	N	14.688	9.817	1.760	26.266
					%	55,9	37,4	6,7	100,0
			Gipuzkoa	N	32.348	22.075	2.464	56.887	
				%	56,9	38,8	4,3	100,0	
	Bizkaia		N	52.038	33.737	7.404	93.179		
			%	55,8	36,2	7,9	100,0		
15-24	CAPV		N	8.601	3.046	1.425	13.071		
			%	65,8	23,3	10,9	100,0		
			Araba	N	1.524	619	195	2.338	
				%	65,2	26,5	8,4	100,0	
			Gipuzkoa	N	3.119	1.054	.	4.172	
				%	74,7	25,3	.	100,0	
			Bizkaia	N	3.958	1.373	1.229	6.561	
				%	60,3	20,9	18,7	100,0	
	25-44		CAPV	N	46.320	30.493	5.428	82.241	
				%	56,3	37,1	6,6	100,0	
			Araba	N	5.889	5.071	1.181	12.141	
				%	48,5	41,8	9,7	100,0	
		Gipuzkoa	N	17.603	10.387	1.517	29.507		
			%	59,7	35,2	5,1	100,0		
	Bizkaia	N	22.828	15.035	2.730	40.593			
		%	56,2	37,0	6,7	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 110. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y territorio histórico

				1-10	11-20	>20	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	40.317	30.140	4.393	74.851
			%	53,9	40,3	5,9	100,0
		Araba	N	7.048	3.378	384	10.810
			%	65,2	31,3	3,6	100,0
		Gipuzkoa	N	10.202	10.451	815	21.469
			%	47,5	48,7	3,8	100,0
	Bizkaia	N	23.067	16.311	3.194	42.572	
		%	54,2	38,3	7,5	100,0	
	65-74	CAPV	N	2.858	1.754	132	4.744
			%	60,3	37,0	2,8	100,0
		Araba	N	112	655	.	767
			%	14,7	85,3	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.105	82	132	1.319
			%	83,8	6,2	10,0	100,0
	Bizkaia	N	1.641	1.018	.	2.658	
		%	61,7	38,3	.	100,0	
	≥75	CAPV	N	978	196	251	1.425
			%	68,7	13,7	17,6	100,0
Araba		N	115	95	.	210	
		%	55,0	45,0	.	100,0	
Gipuzkoa		N	319	101	.	420	
		%	75,9	24,1	.	100,0	
Bizkaia	N	544	.	251	795		
	%	68,4	.	31,6	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	212.716	153.274	36.553	402.543
			%	52,8	38,1	9,1	100,0
		Araba	N	30.987	21.209	4.583	56.780
			%	54,6	37,4	8,1	100,0
		Gipuzkoa	N	68.811	48.287	8.573	125.672
			%	54,8	38,4	6,8	100,0
	Bizkaia	N	112.917	83.777	23.397	220.092	
		%	51,3	38,1	10,6	100,0	
	15-24	CAPV	N	18.693	5.911	1.681	26.285
			%	71,1	22,5	6,4	100,0
	Araba	N	3.157	946	195	4.297	
		%	73,4	22,0	4,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 110. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y territorio histórico

				1-10	11-20	>20	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	5.573	2.254	256	8.084
			%	68,9	27,9	3,2	100,0
		Bizkaia	N	9.964	2.711	1.229	13.904
			%	71,7	19,5	8,8	100,0
	25-44	CAPV	N	97.381	71.436	13.320	182.137
			%	53,5	39,2	7,3	100,0
		Araba	N	13.506	10.948	2.139	26.593
			%	50,8	41,2	8,0	100,0
		Gipuzkoa	N	34.981	23.428	3.655	62.064
			%	56,4	37,7	5,9	100,0
		Bizkaia	N	48.894	37.060	7.526	93.480
			%	52,3	39,6	8,1	100,0
	45-64	CAPV	N	79.325	67.627	18.702	165.653
			%	47,9	40,8	11,3	100,0
		Araba	N	12.041	7.748	1.963	21.751
			%	55,4	35,6	9,0	100,0
		Gipuzkoa	N	22.147	20.286	4.157	46.591
			%	47,5	43,5	8,9	100,0
		Bizkaia	N	45.137	39.592	12.582	97.310
			%	46,4	40,7	12,9	100,0
	65-74	CAPV	N	10.117	5.762	1.980	17.859
			%	56,7	32,3	11,1	100,0
		Araba	N	1.124	1.189	286	2.599
			%	43,2	45,8	11,0	100,0
		Gipuzkoa	N	3.978	1.800	504	6.282
			%	63,3	28,6	8,0	100,0
		Bizkaia	N	5.015	2.773	1.189	8.977
			%	55,9	30,9	13,2	100,0
	>=75	CAPV	N	7.200	2.539	871	10.610
			%	67,9	23,9	8,2	100,0
		Araba	N	1.161	378	.	1.539
			%	75,4	24,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.132	519	.	2.651
			%	80,4	19,6	.	100,0
		Bizkaia	N	3.908	1.641	871	6.420
			%	60,9	25,6	13,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 111. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social

			1-10	11-20	>20	Total
Hombres	Total	Total	N 113.344	87.645	24.925	225.914
			% 50,2	38,8	11,0	100,0
	I	N	13.253	6.407	2.619	22.279
		%	59,5	28,8	11,8	100,0
	II	N	6.550	6.156	1.511	14.217
		%	46,1	43,3	10,6	100,0
	III	N	22.484	16.018	3.984	42.486
		%	52,9	37,7	9,4	100,0
	IV	N	59.916	48.682	13.524	122.121
		%	49,1	39,9	11,1	100,0
	V	N	11.141	10.383	3.287	24.811
		%	44,9	41,8	13,2	100,0
	15-24	Total	N 9.795	2.865	256	12.916
			% 75,8	22,2	2,0	100,0
	I	N	2.005	.	.	2.005
		%	100,0	.	.	100,0
	II	N	304	268	.	571
		%	53,1	46,9	.	100,0
	III	N	2.279	327	.	2.606
		%	87,4	12,6	.	100,0
	IV	N	4.039	976	256	5.271
		%	76,6	18,5	4,9	100,0
	V	N	1.168	1.294	.	2.462
		%	47,4	52,6	.	100,0
	25-44	Total	N 51.061	40.943	7.892	99.896
			% 51,1	41,0	7,9	100,0
	I	N	5.471	2.825	580	8.876
		%	61,6	31,8	6,5	100,0
	II	N	2.471	3.126	592	6.188
		%	39,9	50,5	9,6	100,0
	III	N	9.994	6.645	652	17.291
		%	57,8	38,4	3,8	100,0
	IV	N	26.195	23.538	4.990	54.723
		%	47,9	43,0	9,1	100,0
	V	N	6.930	4.809	1.079	12.818
		%	54,1	37,5	8,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 111. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social

		1-10	11-20	>20	Total
Hombres 45-64	Total	N 39.008	37.486	14.308	90.802
		% 43,0	41,3	15,8	100,0
I	N	4.199	3.508	1.377	9.084
	%	46,2	38,6	15,2	100,0
II	N	3.228	1.898	655	5.781
	%	55,8	32,8	11,3	100,0
III	N	7.571	7.362	3.070	18.004
	%	42,1	40,9	17,1	100,0
IV	N	21.815	20.635	6.997	49.447
	%	44,1	41,7	14,2	100,0
V	N	2.195	4.083	2.209	8.487
	%	25,9	48,1	26,0	100,0
65-74	Total	N 7.259	4.008	1.848	13.115
		% 55,3	30,6	14,1	100,0
I	N	1.432	73	663	2.168
	%	66,0	3,4	30,6	100,0
II	N	548	864	264	1.677
	%	32,7	51,5	15,8	100,0
III	N	1.286	1.363	.	2.648
	%	48,6	51,4	.	100,0
IV	N	3.391	1.708	921	6.020
	%	56,3	28,4	15,3	100,0
V	N	602	.	.	602
	%	100,0	.	.	100,0
>=75	Total	N 6.222	2.343	620	9.185
		% 67,7	25,5	6,8	100,0
I	N	146	.	.	146
	%	100,0	.	.	100,0
III	N	1.354	322	261	1.937
	%	69,9	16,6	13,5	100,0
IV	N	4.477	1.824	359	6.660
	%	67,2	27,4	5,4	100,0
V	N	245	197	.	442
	%	55,4	44,6	.	100,0
Mujeres Total	Total	N 99.074	65.629	11.628	176.331
		% 56,2	37,2	6,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 111. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social

		1-10	11-20	>20	Total		
Mujeres	Total	I	N	11.302	3.682	2.103	17.088
			%	66,1	21,6	12,3	100,0
		II	N	9.338	4.371	159	13.868
			%	67,3	31,5	1,1	100,0
		III	N	25.084	18.156	3.053	46.293
			%	54,2	39,2	6,6	100,0
		IV	N	36.827	26.695	4.089	67.610
			%	54,5	39,5	6,0	100,0
		V	N	16.524	12.725	2.224	31.473
			%	52,5	40,4	7,1	100,0
		15-24 Total	N	8.601	3.046	1.425	13.071
			%	65,8	23,3	10,9	100,0
		I	N	736	.	.	736
			%	100,0	.	.	100,0
		II	N	678	368	.	1.046
		%	64,8	35,2	.	100,0	
	III	N	2.339	733	.	3.072	
		%	76,1	23,9	.	100,0	
	IV	N	4.301	929	1.425	6.655	
		%	64,6	14,0	21,4	100,0	
	V	N	547	1.015	.	1.562	
		%	35,0	65,0	.	100,0	
	25-44 Total	N	46.320	30.493	5.428	82.241	
		%	56,3	37,1	6,6	100,0	
	I	N	6.146	1.905	892	8.943	
		%	68,7	21,3	10,0	100,0	
	II	N	3.991	826	.	4.817	
		%	82,8	17,2	.	100,0	
	III	N	10.367	7.311	1.614	19.292	
		%	53,7	37,9	8,4	100,0	
	IV	N	17.471	16.181	1.760	35.412	
		%	49,3	45,7	5,0	100,0	
	V	N	8.345	4.270	1.161	13.776	
		%	60,6	31,0	8,4	100,0	
	45-64 Total	N	40.317	30.140	4.393	74.851	
		%	53,9	40,3	5,9	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 111. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social

				1-10	11-20	>20	Total	
Mujeres	45-64	I	N	3.934	1.778	960	6.671	
			%	59,0	26,6	14,4	100,0	
		II	N	3.909	3.177	159	7.245	
			%	54,0	43,8	2,2	100,0	
		III	N	11.714	9.087	1.439	22.240	
			%	52,7	40,9	6,5	100,0	
		IV	N	13.669	8.780	772	23.221	
			%	58,9	37,8	3,3	100,0	
		V	N	7.091	7.319	1.063	15.473	
			%	45,8	47,3	6,9	100,0	
	65-74	Total	N	2.858	1.754	132	4.744	
			%	60,3	37,0	2,8	100,0	
		I	N	487	.	.	487	
			%	100,0	.	.	100,0	
		II	N	543	.	.	543	
			%	100,0	.	.	100,0	
		III	N	563	929	.	1.493	
			%	37,7	62,3	.	100,0	
		IV	N	899	704	132	1.735	
			%	51,8	40,6	7,6	100,0	
		V	N	366	121	.	487	
			%	75,2	24,8	.	100,0	
	>=75	Total	N	978	196	251	1.425	
			%	68,7	13,7	17,6	100,0	
		I	N	.	.	251	251	
			%	.	.	100,0	100,0	
		II	N	217	.	.	217	
			%	100,0	.	.	100,0	
		III	N	101	95	.	196	
			%	51,7	48,3	.	100,0	
		IV	N	486	101	.	587	
			%	82,8	17,2	.	100,0	
		V	N	174	.	.	174	
			%	100,0	.	.	100,0	
Ambos sexos Total			Total	N	212.418	153.274	36.553	402.245
				%	52,8	38,1	9,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 111. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social

				1-10	11-20	>20	Total
Ambos sexos	Total	I	N	24.555	10.089	4.723	39.366
			%	62,4	25,6	12,0	100,0
		II	N	15.889	10.527	1.670	28.085
			%	56,6	37,5	5,9	100,0
		III	N	47.568	34.174	7.037	88.779
			%	53,6	38,5	7,9	100,0
		IV	N	96.743	75.376	17.613	189.732
			%	51,0	39,7	9,3	100,0
		V	N	27.664	23.108	5.512	56.283
			%	49,2	41,1	9,8	100,0
	15-24	Total	N	18.395	5.911	1.681	25.987
			%	70,8	22,7	6,5	100,0
		I	N	2.741	.	.	2.741
			%	100,0	.	.	100,0
		II	N	982	636	.	1.618
			%	60,7	39,3	.	100,0
		III	N	4.618	1.060	.	5.678
			%	81,3	18,7	.	100,0
		IV	N	8.340	1.905	1.681	11.927
			%	69,9	16,0	14,1	100,0
		V	N	1.715	2.309	.	4.024
			%	42,6	57,4	.	100,0
	25-44	Total	N	97.381	71.436	13.320	182.137
			%	53,5	39,2	7,3	100,0
		I	N	11.617	4.730	1.472	17.819
			%	65,2	26,5	8,3	100,0
		II	N	6.461	3.952	592	11.005
			%	58,7	35,9	5,4	100,0
		III	N	20.361	13.956	2.266	36.583
			%	55,7	38,1	6,2	100,0
		IV	N	43.666	39.719	6.750	90.135
			%	48,4	44,1	7,5	100,0
		V	N	15.275	9.079	2.240	26.594
			%	57,4	34,1	8,4	100,0
	45-64	Total	N	79.325	67.627	18.702	165.653
			%	47,9	40,8	11,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 111. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social

				1-10	11-20	>20	Total
Ambos	45-64	I	N	8.133	5.285	2.337	15.755
			%	51,6	33,5	14,8	100,0
		II	N	7.137	5.075	814	13.026
			%	54,8	39,0	6,2	100,0
		III	N	19.285	16.449	4.509	40.244
			%	47,9	40,9	11,2	100,0
		IV	N	35.483	29.415	7.770	72.668
			%	48,8	40,5	10,7	100,0
		V	N	9.287	11.402	3.271	23.960
			%	38,8	47,6	13,7	100,0
	65-74	Total	N	10.117	5.762	1.980	17.859
			%	56,7	32,3	11,1	100,0
		I	N	1.919	73	663	2.655
			%	72,3	2,8	25,0	100,0
		II	N	1.092	864	264	2.220
			%	49,2	38,9	11,9	100,0
		III	N	1.849	2.292	.	4.141
			%	44,6	55,4	.	100,0
		IV	N	4.290	2.412	1.053	7.754
			%	55,3	31,1	13,6	100,0
		V	N	968	121	.	1.089
			%	88,9	11,1	.	100,0
	>=75	Total	N	7.200	2.539	871	10.610
			%	67,9	23,9	8,2	100,0
		I	N	146	.	251	397
			%	36,8	.	63,2	100,0
		II	N	217	.	.	217
			%	100,0	.	.	100,0
		III	N	1.455	416	261	2.132
			%	68,2	19,5	12,2	100,0
		IV	N	4.963	1.925	359	7.248
			%	68,5	26,6	5,0	100,0
		V	N	419	197	.	616
			%	68,0	32,0	.	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 112. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y nivel de estudios*

			1-10	11-20	>20	Total
Hombres	Total	N	113.642	87.645	24.925	226.212
		%	50,2	38,7	11,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	22.789	20.337	6.578	49.704
		%	45,9	40,9	13,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	25.162	19.306	3.991	48.459
		%	51,9	39,8	8,2	100,0
	Secundaria, superior	N	47.283	37.496	11.239	96.018
		%	49,2	39,1	11,7	100,0
	Terciaria	N	18.407	10.506	3.118	32.031
		%	57,5	32,8	9,7	100,0
	15-24 Total	N	10.092	2.865	256	13.214
		%	76,4	21,7	1,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	606	250	.	856
		%	70,8	29,2	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.149	1.010	256	4.415
		%	71,3	22,9	5,8	100,0
	Secundaria, superior	N	5.539	1.606	.	7.145
		%	77,5	22,5	.	100,0
	Terciaria	N	798	.	.	798
		%	100,0	.	.	100,0
	25-44 Total	N	51.061	40.943	7.892	99.896
		%	51,1	41,0	7,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	6.550	6.839	1.963	15.352
		%	42,7	44,6	12,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	12.250	9.765	973	22.987
		%	53,3	42,5	4,2	100,0
	Secundaria, superior	N	23.156	19.272	3.784	46.212
		%	50,1	41,7	8,2	100,0
	Terciaria	N	9.106	5.067	1.173	15.345
		%	59,3	33,0	7,6	100,0
	45-64 Total	N	39.008	37.486	14.308	90.802
		%	43,0	41,3	15,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	8.715	10.600	3.073	22.388
		%	38,9	47,3	13,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	7.639	7.089	2.762	17.490
		%	43,7	40,5	15,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 112. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y nivel de estudios*

				1-10	11-20	>20	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	15.522	14.927	7.051	37.499	
			%	41,4	39,8	18,8	100,0	
		Terciaria	N	7.131	4.871	1.422	13.425	
	%		53,1	36,3	10,6	100,0		
		65-74	Total	N	7.259	4.008	1.848	13.115
			%	55,3	30,6	14,1	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.320	824	921	4.065	
	%		57,1	20,3	22,7	100,0		
		Secundaria, inferior	N	1.133	1.246	.	2.378	
	%		47,6	52,4	.	100,0		
		Secundaria, superior	N	2.434	1.465	404	4.303	
	%		56,6	34,0	9,4	100,0		
		Terciaria	N	1.372	474	523	2.368	
	%		57,9	20,0	22,1	100,0		
		>=75	Total	N	6.222	2.343	620	9.185
			%	67,7	25,5	6,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	4.598	1.824	620	7.042	
	%		65,3	25,9	8,8	100,0		
		Secundaria, inferior	N	992	197	.	1.189	
	%		83,4	16,6	.	100,0		
	Secundaria, superior	N	632	227	.	859		
%		73,6	26,4	.	100,0			
	Terciaria	N	.	95	.	95		
%		.	100,0	.	100,0			
Mujeres	Total	Total	N	99.074	65.629	11.628	176.331	
		%	56,2	37,2	6,6	100,0		
		Sin estudios, primaria	N	18.281	12.196	3.140	33.617	
	%		54,4	36,3	9,3	100,0		
		Secundaria, inferior	N	14.417	15.123	1.994	31.534	
	%		45,7	48,0	6,3	100,0		
		Secundaria, superior	N	37.786	29.665	3.944	71.395	
	%		52,9	41,6	5,5	100,0		
		Terciaria	N	28.590	8.644	2.551	39.785	
	%		71,9	21,7	6,4	100,0		
	Total	N	8.601	3.046	1.425	13.071		
%		65,8	23,3	10,9	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 112. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y nivel de estudios*

			1-10	11-20	>20	Total
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N 1.128	241	.	1.369
			% 82,4	17,6	.	100,0
		Secundaria, inferior	N 2.376	774	512	3.662
			% 64,9	21,1	14,0	100,0
		Secundaria, superior	N 3.740	1.864	912	6.516
			% 57,4	28,6	14,0	100,0
		Terciaria	N 1.356	167	.	1.523
			% 89,0	11,0	.	100,0
	25-44	Total	N 46.320	30.493	5.428	82.241
			% 56,3	37,1	6,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N 5.796	4.695	2.137	12.628
			% 45,9	37,2	16,9	100,0
		Secundaria, inferior	N 4.613	6.834	676	12.123
			% 38,1	56,4	5,6	100,0
		Secundaria, superior	N 19.776	14.941	1.512	36.229
			% 54,6	41,2	4,2	100,0
		Terciaria	N 16.134	4.023	1.102	21.260
			% 75,9	18,9	5,2	100,0
	45-64	Total	N 40.317	30.140	4.393	74.851
			% 53,9	40,3	5,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N 9.211	6.210	1.003	16.424
			% 56,1	37,8	6,1	100,0
		Secundaria, inferior	N 6.959	7.153	806	14.918
			% 46,7	47,9	5,4	100,0
		Secundaria, superior	N 13.907	12.323	1.388	27.618
			% 50,4	44,6	5,0	100,0
		Terciaria	N 10.240	4.454	1.197	15.891
			% 64,4	28,0	7,5	100,0
	65-74	Total	N 2.858	1.754	132	4.744
			% 60,3	37,0	2,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N 1.384	955	.	2.339
			% 59,2	40,8	.	100,0
		Secundaria, inferior	N 469	363	.	831
			% 56,4	43,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N 363	436	132	930
			% 39,0	46,9	14,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 112. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y nivel de estudios*

				1-10	11-20	>20	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N	643	.	.	643	
			%	100,0	.	.	100,0	
	>=75	Total	N	978	196	251	1.425	
			%	68,7	13,7	17,6	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	762	95	.	856	
			%	88,9	11,1	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	101	.	101	
			%	.	100,0	.	100,0	
		Terciaria	N	217	.	251	467	
			%	46,4	.	53,6	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	212.716	153.274	36.553	402.543
			%	52,8	38,1	9,1	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	41.070	32.533	9.718	83.321		
		%	49,3	39,0	11,7	100,0		
	Secundaria, inferior	N	39.580	34.429	5.984	79.993		
		%	49,5	43,0	7,5	100,0		
	Secundaria, superior	N	85.069	67.161	15.183	167.413		
		%	50,8	40,1	9,1	100,0		
	Terciaria	N	46.997	19.151	5.668	71.816		
		%	65,4	26,7	7,9	100,0		
	15-24	Total	N	18.693	5.911	1.681	26.285	
			%	71,1	22,5	6,4	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.735	491	.	2.226		
		%	77,9	22,1	.	100,0		
	Secundaria, inferior	N	5.525	1.783	769	8.077		
		%	68,4	22,1	9,5	100,0		
	Secundaria, superior	N	9.280	3.469	912	13.661		
		%	67,9	25,4	6,7	100,0		
	Terciaria	N	2.154	167	.	2.321		
		%	92,8	7,2	.	100,0		
	25-44	Total	N	97.381	71.436	13.320	182.137	
			%	53,5	39,2	7,3	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	12.346	11.534	4.100	27.980		
		%	44,1	41,2	14,7	100,0		
	Secundaria, inferior	N	16.863	16.598	1.649	35.110		
		%	48,0	47,3	4,7	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 112. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y nivel de estudios*

				1-10	11-20	>20	Total
Ambos	25-44	Secundaria, superior	N	42.932	34.213	5.296	82.441
			%	52,1	41,5	6,4	100,0
		Terciaria	N	25.240	9.091	2.275	36.606
			%	69,0	24,8	6,2	100,0
	45-64	Total	N	79.325	67.627	18.702	165.653
			%	47,9	40,8	11,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	17.926	16.810	4.076	38.812
			%	46,2	43,3	10,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	14.599	14.242	3.567	32.408
			%	45,0	43,9	11,0	100,0
		Secundaria, superior	N	29.429	27.250	8.439	65.117
			%	45,2	41,8	13,0	100,0
		Terciaria	N	17.371	9.325	2.620	29.316
			%	59,3	31,8	8,9	100,0
	65-74	Total	N	10.117	5.762	1.980	17.859
			%	56,7	32,3	11,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.704	1.779	921	6.404
			%	57,8	27,8	14,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.602	1.608	.	3.210
			%	49,9	50,1	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.796	1.901	536	5.233
			%	53,4	36,3	10,2	100,0
		Terciaria	N	2.015	474	523	3.011
			%	66,9	15,7	17,4	100,0
	>=75	Total	N	7.200	2.539	871	10.610
			%	67,9	23,9	8,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.360	1.919	620	7.899
			%	67,9	24,3	7,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	992	197	.	1.189
			%	83,4	16,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N	632	328	.	960
			%	65,8	34,2	.	100,0
		Terciaria	N	217	95	251	562
			%	38,6	16,8	44,6	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 113. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	24.327	84.834	117.051	226.212	
			%	10,8	37,5	51,7	100,0	
		Araba	N	3.172	9.040	18.302	30.514	
			%	10,4	29,6	60,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	7.381	26.046	35.359	68.786	
			%	10,7	37,9	51,4	100,0	
		Bizkaia	N	13.775	49.748	63.390	126.913	
			%	10,9	39,2	49,9	100,0	
		15-24	CAPV	N	2.446	4.913	5.855	13.214
				%	18,5	37,2	44,3	100,0
			Araba	N	594	818	548	1.960
				%	30,3	41,7	28,0	100,0
			Gipuzkoa	N	693	1.097	2.122	3.911
				%	17,7	28,1	54,2	100,0
			Bizkaia	N	1.159	2.998	3.186	7.343
				%	15,8	40,8	43,4	100,0
		25-44	CAPV	N	12.690	35.761	51.445	99.896
				%	12,7	35,8	51,5	100,0
			Araba	N	2.178	2.835	9.439	14.452
				%	15,1	19,6	65,3	100,0
			Gipuzkoa	N	2.960	12.789	16.808	32.557
				%	9,1	39,3	51,6	100,0
			Bizkaia	N	7.551	20.138	25.198	52.887
				%	14,3	38,1	47,6	100,0
	45-64	CAPV	N	8.498	35.250	47.054	90.802	
			%	9,4	38,8	51,8	100,0	
		Araba	N	210	4.353	6.378	10.941	
			%	1,9	39,8	58,3	100,0	
		Gipuzkoa	N	3.495	8.698	12.929	25.123	
			%	13,9	34,6	51,5	100,0	
		Bizkaia	N	4.792	22.198	27.748	54.738	
			%	8,8	40,6	50,7	100,0	
	65-74	CAPV	N	369	5.257	7.489	13.115	
			%	2,8	40,1	57,1	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 113. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total	
Hombres	65-74	Araba	N	.	613	1.219	1.832	
			%	.	33,5	66,5	100,0	
		Gipuzkoa	N	233	2.403	2.328	4.964	
			%	4,7	48,4	46,9	100,0	
		Bizkaia	N	136	2.241	3.942	6.319	
			%	2,2	35,5	62,4	100,0	
	>=75	CAPV	N	325	3.653	5.207	9.185	
			%	3,5	39,8	56,7	100,0	
			Araba	N	189	422	718	1.329
				%	14,2	31,7	54,0	100,0
			Gipuzkoa	N	.	1.058	1.173	2.231
				%	.	47,4	52,6	100,0
		Bizkaia	N	136	2.173	3.317	5.625	
			%	2,4	38,6	59,0	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	27.598	69.652	79.081	176.331
				%	15,7	39,5	44,8	100,0
			Araba	N	3.700	9.869	12.696	26.266
				%	14,1	37,6	48,3	100,0
		Gipuzkoa	N	7.731	21.676	27.479	56.887	
			%	13,6	38,1	48,3	100,0	
		Bizkaia	N	16.167	38.106	38.905	93.179	
			%	17,4	40,9	41,8	100,0	
	15-24	CAPV	N	2.165	5.526	5.379	13.071	
			%	16,6	42,3	41,2	100,0	
			Araba	N	179	593	1.565	2.338
				%	7,7	25,4	66,9	100,0
			Gipuzkoa	N	534	2.286	1.352	4.172
				%	12,8	54,8	32,4	100,0
		Bizkaia	N	1.452	2.647	2.463	6.561	
			%	22,1	40,3	37,5	100,0	
	25-44	CAPV	N	15.504	30.643	36.094	82.241	
			%	18,9	37,3	43,9	100,0	
		Araba	N	2.497	5.519	4.125	12.141	
			%	20,6	45,5	34,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 113. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	4.020	9.561	15.926	29.507
			%	13,6	32,4	54,0	100,0
		Bizkaia	N	8.987	15.563	16.043	40.593
			%	22,1	38,3	39,5	100,0
	45-64	CAPV	N	9.651	32.024	33.176	74.851
			%	12,9	42,8	44,3	100,0
		Araba	N	847	3.757	6.207	10.810
			%	7,8	34,8	57,4	100,0
		Gipuzkoa	N	3.075	8.915	9.479	21.469
			%	14,3	41,5	44,2	100,0
		Bizkaia	N	5.729	19.353	17.490	42.572
			%	13,5	45,5	41,1	100,0
	65-74	CAPV	N	177	1.241	3.326	4.744
			%	3,7	26,2	70,1	100,0
		Araba	N	177	.	590	767
			%	23,1	.	76,9	100,0
		Gipuzkoa	N	.	697	622	1.319
			%	.	52,9	47,1	100,0
		Bizkaia	N	.	544	2.115	2.658
			%	.	20,5	79,5	100,0
	>=75	CAPV	N	101	218	1.106	1.425
			%	7,1	15,3	77,6	100,0
		Araba	N	.	.	210	210
			%	.	.	100,0	100,0
	Gipuzkoa	N	101	218	101	420	
		%	24,1	51,8	24,1	100,0	
	Bizkaia	N	.	.	795	795	
		%	.	.	100,0	100,0	
Ambos	Total	CAPV	N	51.925	154.486	196.132	402.543
			%	12,9	38,4	48,7	100,0
		Araba	N	6.872	18.910	30.998	56.780
			%	12,1	33,3	54,6	100,0
		Gipuzkoa	N	15.112	47.722	62.838	125.672
			%	12,0	38,0	50,0	100,0
		Bizkaia	N	29.942	87.855	102.295	220.092

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 113. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total	
Mujeres	Total	Bizkaia	%	13,6	39,9	46,5	100,0	
	15-24	CAPV	N	4.611	10.439	11.234	26.285	
			%	17,5	39,7	42,7	100,0	
		Araba	N	773	1.411	2.113	4.297	
			%	18,0	32,8	49,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.227	3.384	3.473	8.084	
			%	15,2	41,9	43,0	100,0	
		Bizkaia	N	2.611	5.644	5.649	13.904	
			%	18,8	40,6	40,6	100,0	
		25-44	CAPV	N	28.194	66.404	87.539	182.137
			%	15,5	36,5	48,1	100,0	
		Araba	N	4.675	8.354	13.564	26.593	
			%	17,6	31,4	51,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	6.981	22.349	32.734	62.064	
			%	11,2	36,0	52,7	100,0	
		Bizkaia	N	16.538	35.701	41.241	93.480	
			%	17,7	38,2	44,1	100,0	
		45-64	CAPV	N	18.149	67.275	80.230	165.653
			%	11,0	40,6	48,4	100,0	
		Araba	N	1.057	8.110	12.584	21.751	
			%	4,9	37,3	57,9	100,0	
		Gipuzkoa	N	6.570	17.613	22.408	46.591	
			%	14,1	37,8	48,1	100,0	
		Bizkaia	N	10.521	41.552	45.237	97.310	
			%	10,8	42,7	46,5	100,0	
		65-74	CAPV	N	546	6.498	10.815	17.859
			%	3,1	36,4	60,6	100,0	
		Araba	N	177	613	1.809	2.599	
		%	6,8	23,6	69,6	100,0		
	Gipuzkoa	N	233	3.100	2.950	6.282		
		%	3,7	49,3	46,9	100,0		
	Bizkaia	N	136	2.785	6.056	8.977		
		%	1,5	31,0	67,5	100,0		
	>=75	CAPV	N	426	3.871	6.313	10.610	
		%	4,0	36,5	59,5	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 113. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Ambos	>=75	Araba	N	189	422	928	1.539
			%	12,3	27,4	60,3	100,0
	Gipuzkoa	N	101	1.276	1.274	2.651	
		%	3,8	48,1	48,0	100,0	
	Bizkaia	N	136	2.173	4.111	6.420	
		%	2,1	33,9	64,0	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

		Fuma más-o-marca más fuerte		Fuma menos-o-marca más suave		Fuma lo mismo		Total	
Hombres	Total	Total	N	24.327	84.834	116.753	225.914		
			%	10,8	37,6	51,7	100,0		
	I	N	1.574	10.651	10.054	22.279			
		%	7,1	47,8	45,1	100,0			
	II	N	2.222	4.249	7.746	14.217			
		%	15,6	29,9	54,5	100,0			
	III	N	5.609	15.296	21.581	42.486			
		%	13,2	36,0	50,8	100,0			
	IV	N	12.486	45.776	63.860	122.121			
		%	10,2	37,5	52,3	100,0			
	V	N	2.436	8.862	13.512	24.811			
		%	9,8	35,7	54,5	100,0			
	15-24	Total	N	2.446	4.913	5.557	12.916		
			%	18,9	38,0	43,0	100,0		
	I	N	473	1.065	467	2.005			
		%	23,6	53,1	23,3	100,0			
	II	N	268	304	.	571			
		%	46,9	53,1	.	100,0			
	III	N	212	1.008	1.386	2.606			
		%	8,1	38,7	53,2	100,0			
	IV	N	755	1.690	2.826	5.271			
		%	14,3	32,1	53,6	100,0			
	V	N	738	846	878	2.462			
		%	30,0	34,4	35,7	100,0			
	25-44	Total	N	12.690	35.761	51.445	99.896		
			%	12,7	35,8	51,5	100,0		
	I	N	255	5.267	3.354	8.876			
		%	2,9	59,3	37,8	100,0			
	II	N	1.460	1.032	3.696	6.188			
		%	23,6	16,7	59,7	100,0			
	III	N	2.916	6.640	7.735	17.291			
		%	16,9	38,4	44,7	100,0			
	IV	N	6.532	19.411	28.780	54.723			
		%	11,9	35,5	52,6	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

			Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Hombres 25-44 V	N		1.527	3.411	7.880	12.818
	%		11,9	26,6	61,5	100,0
45-64 Total	N		8.498	35.250	47.054	90.802
	%		9,4	38,8	51,8	100,0
I	N		710	3.290	5.084	9.084
	%		7,8	36,2	56,0	100,0
II	N		401	2.140	3.239	5.781
	%		6,9	37,0	56,0	100,0
III	N		2.341	6.251	9.411	18.004
	%		13,0	34,7	52,3	100,0
IV	N		4.874	19.519	25.054	49.447
	%		9,9	39,5	50,7	100,0
V	N		171	4.050	4.266	8.487
	%		2,0	47,7	50,3	100,0
65-74 Total	N		369	5.257	7.489	13.115
	%		2,8	40,1	57,1	100,0
I	N		136	1.029	1.003	2.168
	%		6,3	47,5	46,3	100,0
II	N		94	772	810	1.677
	%		5,6	46,1	48,3	100,0
III	N		139	709	1.800	2.648
	%		5,3	26,8	68,0	100,0
IV	N		.	2.530	3.489	6.020
	%		.	42,0	58,0	100,0
V	N		.	216	386	602
	%		.	35,9	64,1	100,0
>=75 Total	N		325	3.653	5.207	9.185
	%		3,5	39,8	56,7	100,0
I	N		.	.	146	146
	%		.	.	100,0	100,0
III	N		.	688	1.249	1.937
	%		.	35,5	64,5	100,0
IV	N		325	2.626	3.710	6.660
	%		4,9	39,4	55,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

			Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total	
Hombres	>=75	V	N	.	339	103	442
			%	.	76,8	23,2	100,0
Mujeres	Total	Total	N	27.598	69.652	79.081	176.331
			%	15,7	39,5	44,8	100,0
		I	N	706	8.952	7.429	17.088
			%	4,1	52,4	43,5	100,0
		II	N	2.455	5.622	5.791	13.868
			%	17,7	40,5	41,8	100,0
		III	N	7.543	17.868	20.881	46.293
			%	16,3	38,6	45,1	100,0
		IV	N	10.660	26.076	30.874	67.610
			%	15,8	38,6	45,7	100,0
		V	N	6.233	11.134	14.105	31.473
			%	19,8	35,4	44,8	100,0
	15-24	Total	N	2.165	5.526	5.379	13.071
			%	16,6	42,3	41,2	100,0
		I	N	.	736	.	736
			%	.	100,0	.	100,0
		II	N	.	310	737	1.046
			%	.	29,6	70,4	100,0
		III	N	770	900	1.402	3.072
			%	25,1	29,3	45,6	100,0
		IV	N	1.060	2.742	2.853	6.655
			%	15,9	41,2	42,9	100,0
		V	N	335	839	388	1.562
			%	21,5	53,7	24,8	100,0
	25-44	Total	N	15.504	30.643	36.094	82.241
			%	18,9	37,3	43,9	100,0
		I	N	706	5.329	2.908	8.943
			%	7,9	59,6	32,5	100,0
		II	N	909	2.074	1.833	4.817
			%	18,9	43,1	38,1	100,0
		III	N	3.796	7.108	8.388	19.292
			%	19,7	36,8	43,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Mujeres	25-44	IV	N	6.509	11.324	17.580	35.412
			%	18,4	32,0	49,6	100,0
		V	N	3.583	4.808	5.385	13.776
			%	26,0	34,9	39,1	100,0
	45-64	Total	N	9.651	32.024	33.176	74.851
			%	12,9	42,8	44,3	100,0
		I	N	.	2.764	3.907	6.671
			%	.	41,4	58,6	100,0
		II	N	1.546	3.032	2.667	7.245
			%	21,3	41,9	36,8	100,0
		III	N	2.977	9.501	9.762	22.240
			%	13,4	42,7	43,9	100,0
		IV	N	2.813	11.394	9.014	23.221
			%	12,1	49,1	38,8	100,0
		V	N	2.315	5.333	7.826	15.473
			%	15,0	34,5	50,6	100,0
	65-74	Total	N	177	1.241	3.326	4.744
			%	3,7	26,2	70,1	100,0
		I	N	.	124	363	487
			%	.	25,4	74,6	100,0
		II	N	.	206	338	543
			%	.	37,9	62,1	100,0
		III	N	.	258	1.235	1.493
			%	.	17,3	82,7	100,0
	IV	N	177	499	1.058	1.735	
		%	10,2	28,8	61,0	100,0	
	V	N	.	154	333	487	
		%	.	31,7	68,3	100,0	
>=75	Total	N	101	218	1.106	1.425	
		%	7,1	15,3	77,6	100,0	
	I	N	.	.	251	251	
		%	.	.	100,0	100,0	
	II	N	.	.	217	217	
		%	.	.	100,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Mujeres	>=75	III	N	.	101	95	196
			%	.	51,7	48,3	100,0
		IV	N	101	117	370	587
			%	17,2	19,8	62,9	100,0
		V	N	.	.	174	174
			%	.	.	100,0	100,0
Ambos	Total	Total	N	51.925	154.486	195.834	402.245
			%	12,9	38,4	48,7	100,0
	I	N	2.280	19.603	17.483	39.366	
		%	5,8	49,8	44,4	100,0	
	II	N	4.678	9.871	13.537	28.085	
		%	16,7	35,1	48,2	100,0	
	III	N	13.152	33.164	42.463	88.779	
		%	14,8	37,4	47,8	100,0	
	IV	N	23.146	71.852	94.734	189.732	
		%	12,2	37,9	49,9	100,0	
	V	N	8.670	19.996	27.617	56.283	
		%	15,4	35,5	49,1	100,0	
	15-24	Total	N	4.611	10.439	10.937	25.987
			%	17,7	40,2	42,1	100,0
	I	N	473	1.801	467	2.741	
		%	17,2	65,7	17,1	100,0	
	II	N	268	613	737	1.618	
		%	16,6	37,9	45,5	100,0	
	III	N	982	1.908	2.788	5.678	
		%	17,3	33,6	49,1	100,0	
	IV	N	1.815	4.432	5.679	11.927	
		%	15,2	37,2	47,6	100,0	
	V	N	1.073	1.685	1.265	4.024	
		%	26,7	41,9	31,4	100,0	
25-44	Total	N	28.194	66.404	87.539	182.137	
		%	15,5	36,5	48,1	100,0	
I	N	961	10.596	6.262	17.819		
	%	5,4	59,5	35,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

			Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
25-44	II	N	2.369	3.107	5.530	11.005
		%	21,5	28,2	50,2	100,0
	III	N	6.713	13.747	16.123	36.583
		%	18,3	37,6	44,1	100,0
	IV	N	13.041	30.735	46.360	90.135
		%	14,5	34,1	51,4	100,0
V	N	5.110	8.219	13.264	26.594	
	%	19,2	30,9	49,9	100,0	
45-64	Total	N	18.149	67.275	80.230	165.653
		%	11,0	40,6	48,4	100,0
I	N	710	6.054	8.991	15.755	
	%	4,5	38,4	57,1	100,0	
II	N	1.947	5.173	5.906	13.026	
	%	15,0	39,7	45,3	100,0	
III	N	5.318	15.752	19.174	40.244	
	%	13,2	39,1	47,6	100,0	
IV	N	7.687	30.913	34.068	72.668	
	%	10,6	42,5	46,9	100,0	
V	N	2.486	9.382	12.092	23.960	
	%	10,4	39,2	50,5	100,0	
65-74	Total	N	546	6.498	10.815	17.859
		%	3,1	36,4	60,6	100,0
I	N	136	1.153	1.366	2.655	
	%	5,1	43,4	51,5	100,0	
II	N	94	978	1.148	2.220	
	%	4,2	44,1	51,7	100,0	
III	N	139	967	3.035	4.141	
	%	3,4	23,4	73,3	100,0	
IV	N	177	3.029	4.548	7.754	
	%	2,3	39,1	58,6	100,0	
V	N	.	370	719	1.089	
	%	.	34,0	66,0	100,0	
>=75	Total	N	426	3.871	6.313	10.610
		%	4,0	36,5	59,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Ambos	>=75	I	N	.	.	397	397
			%	.	.	100,0	100,0
		II	N	.	.	217	217
	%		.	.	100,0	100,0	
		III	N	.	789	1.343	2.132
	%		.	37,0	63,0	100,0	
		IV	N	426	2.742	4.080	7.248
	%		5,9	37,8	56,3	100,0	
		V	N	.	339	277	616
	%		.	55,1	44,9	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 115. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Hombres	Total	Total	N	24.327	84.834	117.051	226.212
			%	10,8	37,5	51,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.262	17.648	28.794	49.704
			%	6,6	35,5	57,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.978	18.301	23.180	48.459
			%	14,4	37,8	47,8	100,0
		Secundaria, superior	N	10.846	35.320	49.852	96.018
			%	11,3	36,8	51,9	100,0
		Terciaria	N	3.242	13.565	15.225	32.031
			%	10,1	42,3	47,5	100,0
		15-24 Total	N	2.446	4.913	5.855	13.214
			%	18,5	37,2	44,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	496	361	856
			%	.	57,9	42,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.944	293	2.177	4.415
			%	44,0	6,6	49,3	100,0
		Secundaria, superior	N	502	3.326	3.317	7.145
			%	7,0	46,5	46,4	100,0
	Terciaria	N	.	798	.	798	
		%	.	100,0	.	100,0	
	25-44 Total	N	12.690	35.761	51.445	99.896	
		%	12,7	35,8	51,5	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	694	5.895	8.763	15.352	
		%	4,5	38,4	57,1	100,0	
	Secundaria, inferior	N	3.236	9.899	9.852	22.987	
		%	14,1	43,1	42,9	100,0	
	Secundaria, superior	N	6.997	13.639	25.576	46.212	
		%	15,1	29,5	55,3	100,0	
	Terciaria	N	1.763	6.328	7.254	15.345	
		%	11,5	41,2	47,3	100,0	
	45-64 Total	N	8.498	35.250	47.054	90.802	
		%	9,4	38,8	51,8	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	2.243	8.043	12.102	22.388	
		%	10,0	35,9	54,1	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 115. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	1.704	6.182	9.604	17.490
			%	9,7	35,3	54,9	100,0
		Secundaria, superior	N	3.208	15.416	18.876	37.499
			%	8,6	41,1	50,3	100,0
		Terciaria	N	1.342	5.610	6.472	13.425
			%	10,0	41,8	48,2	100,0
	65-74	Total	N	369	5.257	7.489	13.115
			%	2,8	40,1	57,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.042	3.023	4.065
			%	.	25,6	74,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	94	1.079	1.206	2.378
			%	3,9	45,4	50,7	100,0
	Secundaria, superior	N	139	2.307	1.856	4.303	
		%	3,2	53,6	43,1	100,0	
	Terciaria	N	136	828	1.404	2.368	
		%	5,7	35,0	59,3	100,0	
	>=75	Total	N	325	3.653	5.207	9.185
			%	3,5	39,8	56,7	100,0
Sin estudios, primaria		N	325	2.173	4.545	7.042	
		%	4,6	30,9	64,5	100,0	
Secundaria, inferior		N	.	848	341	1.189	
		%	.	71,3	28,7	100,0	
Secundaria, superior	N	.	632	227	859		
	%	.	73,6	26,4	100,0		
Terciaria	N	.	.	95	95		
	%	.	.	100,0	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	27.598	69.652	79.081	176.331
		%	15,7	39,5	44,8	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	6.508	10.417	16.692	33.617	
		%	19,4	31,0	49,7	100,0	
	Secundaria, inferior	N	6.211	12.128	13.195	31.534	
		%	19,7	38,5	41,8	100,0	
	Secundaria, superior	N	9.798	29.273	32.324	71.395	
		%	13,7	41,0	45,3	100,0	
	Terciaria	N	5.081	17.834	16.870	39.785	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 115. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Mujeres	Total	Terciaria	%	12,8	44,8	42,4	100,0
	15-24	Total	N	2.165	5.526	5.379	13.071
			%	16,6	42,3	41,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.128	241	1.369
			%	.	82,4	17,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.395	1.195	1.072	3.662
			%	38,1	32,6	29,3	100,0
		Secundaria, superior	N	358	2.895	3.263	6.516
			%	5,5	44,4	50,1	100,0
		Terciaria	N	412	308	803	1.523
			%	27,0	20,2	52,7	100,0
	25-44	Total	N	15.504	30.643	36.094	82.241
			%	18,9	37,3	43,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.069	3.424	5.136	12.628
			%	32,2	27,1	40,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.433	3.368	6.322	12.123
			%	20,1	27,8	52,2	100,0
		Secundaria, superior	N	6.009	12.978	17.242	36.229
			%	16,6	35,8	47,6	100,0
		Terciaria	N	2.993	10.873	7.394	21.260
			%	14,1	51,1	34,8	100,0
	45-64	Total	N	9.651	32.024	33.176	74.851
			%	12,9	42,8	44,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.261	5.186	8.977	16.424
			%	13,8	31,6	54,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.383	7.383	5.152	14.918
			%	16,0	49,5	34,5	100,0
		Secundaria, superior	N	3.330	13.133	11.155	27.618
			%	12,1	47,6	40,4	100,0
		Terciaria	N	1.677	6.323	7.892	15.891
			%	10,6	39,8	49,7	100,0
	65-74	Total	N	177	1.241	3.326	4.744
			%	3,7	26,2	70,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	177	462	1.700	2.339
			%	7,6	19,8	72,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 115. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

			Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total	
Mujeres	65-74	Secundaria, inferior	N	.	182	649	831
			%	.	21,9	78,1	100,0
		Secundaria, superior	N	.	267	663	930
			%	.	28,7	71,3	100,0
		Terciaria	N	.	330	314	643
			%	.	51,2	48,8	100,0
		>=75 Total	N	101	218	1.106	1.425
			%	7,1	15,3	77,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	218	638	856
			%	.	25,4	74,6	100,0
		Secundaria, superior	N	101	.	.	101
			%	100,0	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	.	467	467
			%	.	.	100,0	100,0
Ambos	Total	Total	N	51.925	154.486	196.132	402.543
			%	12,9	38,4	48,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	9.770	28.066	45.485	83.321
			%	11,7	33,7	54,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.189	30.429	36.375	79.993
			%	16,5	38,0	45,5	100,0
		Secundaria, superior	N	20.644	64.593	82.176	167.413
			%	12,3	38,6	49,1	100,0
		Terciaria	N	8.323	31.398	32.095	71.816
			%	11,6	43,7	44,7	100,0
		15-24 Total	N	4.611	10.439	11.234	26.285
			%	17,5	39,7	42,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.624	602	2.226
			%	.	73,0	27,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.340	1.488	3.249	8.077	
		%	41,3	18,4	40,2	100,0	
	Secundaria, superior	N	860	6.220	6.581	13.661	
		%	6,3	45,5	48,2	100,0	
	Terciaria	N	412	1.106	803	2.321	
		%	17,7	47,7	34,6	100,0	
	25-44 Total	N	28.194	66.404	87.539	182.137	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 115. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Ambos	25-44	Total	%	15,5	36,5	48,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.763	9.319	13.899	27.980
			%	17,0	33,3	49,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.669	13.267	16.174	35.110
			%	16,1	37,8	46,1	100,0
		Secundaria, superior	N	13.005	26.618	42.818	82.441
		%	15,8	32,3	51,9	100,0	
	Terciaria	N	4.757	17.201	14.648	36.606	
		%	13,0	47,0	40,0	100,0	
	45-64	Total	N	18.149	67.275	80.230	165.653
			%	11,0	40,6	48,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.505	13.228	21.079	38.812
			%	11,6	34,1	54,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.087	13.564	14.757	32.408
			%	12,6	41,9	45,5	100,0
	Secundaria, superior	N	6.538	28.549	30.031	65.117	
		%	10,0	43,8	46,1	100,0	
	Terciaria	N	3.019	11.933	14.364	29.316	
		%	10,3	40,7	49,0	100,0	
	65-74	Total	N	546	6.498	10.815	17.859
			%	3,1	36,4	60,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	177	1.504	4.723	6.404
			%	2,8	23,5	73,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	94	1.261	1.855	3.210
		%	2,9	39,3	57,8	100,0	
Secundaria, superior	N	139	2.574	2.520	5.233		
	%	2,7	49,2	48,2	100,0		
Terciaria	N	136	1.158	1.717	3.011		
	%	4,5	38,5	57,0	100,0		
>=75	Total	N	426	3.871	6.313	10.610	
		%	4,0	36,5	59,5	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	325	2.391	5.183	7.899	
		%	4,1	30,3	65,6	100,0	
Secundaria, inferior	N	.	848	341	1.189		
	%	.	71,3	28,7	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 115. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Ambos	>=75	Secundaria, superior	N	101	632	227	960
			%	10,5	65,8	23,7	100,0
	Terciaria	N	.	.	562	562	
		%	.	.	100,0	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 116. Proporción (%) de personas fumadoras habituales que han intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	27,7	28,9	24,6	29,1
	15-24	18,6	19,9	10,4	22,6
	25-44	31,2	28,8	26,9	34,5
	45-64	24,8	29,8	21,0	25,5
	65-74	30,2	31,5	34,5	26,5
	>=75	28,3	32,9	35,5	24,4
	Mujeres	Total	28,7	32,5	28,7
15-24		33,7	31,7	28,6	37,6
25-44		30,1	35,4	25,9	31,6
45-64		26,6	27,5	33,7	22,8
65-74		33,1	68,7	17,7	30,4
>=75		0,0	0,0	0,0	0,0
Ambos sexos		Total	28,2	30,6	26,5
	15-24	26,1	26,3	19,8	29,7
	25-44	30,7	31,8	26,4	33,3
	45-64	25,6	28,7	26,9	24,3
	65-74	31,0	42,5	31,0	27,7
	>=75	24,5	28,4	29,9	21,4

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 117. Proporción (%) de personas fumadoras habituales que han intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	27,6	30,1	27,1	25,7	27,4	30,0
	15-24	16,7	0,0	0,0	21,3	30,4	0,0
	25-44	31,2	49,1	37,5	21,6	28,2	41,8
	45-64	24,8	18,6	22,4	25,3	26,2	23,5
	65-74	30,2	30,0	13,8	45,5	29,5	16,9
	>=75	28,3	0,0		44,3	26,2	0,0
	Mujeres	Total	28,7	22,8	25,0	27,5	27,5
	15-24	33,7	58,1	0,0	16,7	47,0	21,5
	25-44	30,1	24,0	35,7	35,2	22,8	44,0
	45-64	26,6	15,8	24,0	21,2	29,9	35,3
	65-74	33,1	52,7	0,0	48,2	28,3	20,8
	>=75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ambos sexos	Total	28,1	26,9	26,0	26,6	27,5	34,5
	15-24	25,3	15,6	0,0	18,8	39,7	8,3
	25-44	30,7	36,5	36,7	28,8	26,0	42,9
	45-64	25,6	17,4	23,3	23,0	27,4	31,1
	65-74	31,0	34,2	10,4	46,5	29,3	18,6
	>=75	24,5	0,0	0,0	40,3	24,0	0,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 118. Proporción (%) de personas fumadoras habituales que han intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	27,7	22,6	38,3	24,8	28,4
	15-24	18,6	28,6	25,0	15,5	0,0
	25-44	31,2	25,4	43,8	26,2	33,3
	45-64	24,8	18,9	34,6	24,0	24,0
	65-74	30,2	24,1	35,1	32,3	32,3
	>=75	28,3	26,6	42,3	26,4	0,0
Mujeres	Total	28,7	27,0	32,2	31,8	21,8
	15-24	33,7	26,8	38,1	36,8	16,1
	25-44	30,1	28,8	29,8	30,4	30,6
	45-64	26,6	26,2	32,1	32,2	12,1
	65-74	33,1	33,4	43,6	45,8	0,0
	>=75	0,0	0,0	.	0,0	0,0
Ambos sexos	Total	28,2	24,4	35,9	27,8	24,7
	15-24	26,1	27,5	30,9	25,7	10,6
	25-44	30,7	27,0	39,0	28,0	31,7
	45-64	25,6	22,0	33,4	27,5	17,5
	65-74	31,0	27,5	37,3	34,7	25,4
	>=75	24,5	23,7	42,3	23,7	0,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 119. Proporción (%) de personas fumadoras habituales a las que les hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV Araba Gipuzkoa Bizkaia			
Hombres	Total	69,5	74,1	59,2	74,0
	15-24	59,9	81,3	31,6	69,3
	25-44	72,0	76,9	60,0	78,0
	45-64	70,1	75,1	64,1	71,8
	65-74	69,6	68,8	56,0	80,5
	>=75	50,7	32,9	47,0	56,3
	Mujeres	Total	70,5	74,7	67,7
	15-24	71,4	54,7	74,2	75,7
	25-44	71,6	72,6	65,5	75,8
	45-64	70,7	81,0	73,3	66,8
	65-74	55,8	85,3	29,4	60,4
	>=75	30,4	55,0	0,0	40,0
Ambos sexos	Total	69,9	74,4	63,1	72,7
	15-24	65,6	66,8	53,6	72,3
	25-44	71,8	75,0	62,6	77,1
	45-64	70,4	78,0	68,3	69,6
	65-74	65,9	73,7	50,4	74,5
	>=75	47,9	35,9	39,6	54,3

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 120. Proporción (%) de personas fumadoras habituales a las que les hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	69,5	73,5	67,3	68,7	69,6	68,0
	15-24	59,0	64,1	53,1	51,9	66,5	47,4
	25-44	72,0	83,2	72,4	71,7	70,3	71,8
	45-64	70,1	70,7	53,7	69,3	72,7	67,2
	65-74	69,6	59,0	100,0	77,0	61,2	74,4
	>=75	50,7	0,0		49,2	50,5	76,8
Mujeres	Total	70,5	58,8	64,4	73,7	68,7	78,5
	15-24	71,4	100,0	100,0	41,1	76,9	75,2
	25-44	71,6	53,5	63,5	74,9	68,7	89,2
	45-64	70,7	64,0	60,4	78,1	69,9	69,1
	65-74	55,8	52,7	62,1	68,6	37,6	77,3
	>=75	30,4	0,0	53,3	0,0	24,5	100,0
Ambos sexos	Total	69,9	67,1	65,9	71,3	69,3	73,8
	15-24	65,3	73,8	83,4	46,0	72,4	58,2
	25-44	71,8	68,3	68,5	73,4	69,7	80,8
	45-64	70,4	67,8	57,4	74,2	71,8	68,4
	65-74	65,9	57,8	90,7	73,9	55,9	75,7
	>=75	47,9	0,0	53,3	44,7	48,4	83,3

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 121. Proporción (%) de personas fumadoras habituales a las que les hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	69,5	69,4	71,6	69,6	66,4
	15-24	59,9	28,6	60,0	62,6	68,5
	25-44	72,0	70,3	79,1	70,5	67,8
	45-64	70,1	76,9	65,6	69,3	66,6
	65-74	69,6	71,1	68,9	74,5	58,8
	>=75	50,7	47,6	63,9	63,1	0,0
Mujeres	Total	70,5	75,1	71,9	72,4	61,9
	15-24	71,4	82,4	75,1	69,7	60,2
	25-44	71,6	87,8	72,8	69,1	65,8
	45-64	70,7	69,1	72,0	78,0	58,5
	65-74	55,8	58,1	43,6	65,7	48,8
	>=75	30,4	37,1	.	0,0	24,7
Ambos sexos	Total	69,9	71,7	71,7	70,8	63,9
	15-24	65,6	61,7	66,8	66,0	63,0
	25-44	71,8	78,2	76,9	69,8	66,6
	45-64	70,4	73,6	68,5	73,0	62,2
	65-74	65,9	66,3	62,4	72,9	56,6
	>=75	47,9	46,5	63,9	56,5	20,5

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 122. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	98.017	19.863	64.012	62.114	671.119	915.124	
			%	10,7	2,2	7,0	6,8	73,3	100,0	
		Araba	N	12.305	4.015	10.089	8.639	98.703	133.751	
	%		9,2	3,0	7,5	6,5	73,8	100,0		
		Gipuzkoa	N	29.349	4.235	15.233	13.737	231.257	293.812	
	%		10,0	1,4	5,2	4,7	78,7	100,0		
		Bizkaia	N	56.363	11.613	38.689	39.738	341.159	487.561	
	%		11,6	2,4	7,9	8,2	70,0	100,0		
		15-24	CAPV	N	10.992	3.036	9.032	9.554	61.844	94.458
	%			11,6	3,2	9,6	10,1	65,5	100,0	
		Araba	N	1.366	606	1.897	1.415	9.585	14.869	
	%		9,2	4,1	12,8	9,5	64,5	100,0		
		Gipuzkoa	N	4.000	772	1.624	1.563	23.346	31.305	
	%		12,8	2,5	5,2	5,0	74,6	100,0		
		Bizkaia	N	5.625	1.659	5.511	6.576	28.914	48.284	
	%		11,7	3,4	11,4	13,6	59,9	100,0		
		25-44	CAPV	N	38.309	8.304	26.275	24.545	238.876	336.309
	%			11,4	2,5	7,8	7,3	71,0	100,0	
		Araba	N	4.077	1.359	5.011	3.948	37.668	52.062	
	%		7,8	2,6	9,6	7,6	72,4	100,0		
		Gipuzkoa	N	12.118	1.653	5.597	4.998	82.425	106.790	
	%		11,3	1,5	5,2	4,7	77,2	100,0		
		Bizkaia	N	22.114	5.292	15.668	15.600	118.784	177.458	
	%		12,5	3,0	8,8	8,8	66,9	100,0		
	45-64	CAPV	N	38.130	6.556	24.865	18.787	214.318	302.655	
%			12,6	2,2	8,2	6,2	70,8	100,0		
	Araba	N	5.098	1.873	2.943	2.452	30.385	42.751		
%		11,9	4,4	6,9	5,7	71,1	100,0			
	Gipuzkoa	N	10.100	1.323	6.609	4.402	74.984	97.419		
%		10,4	1,4	6,8	4,5	77,0	100,0			
	Bizkaia	N	22.932	3.359	15.314	11.933	108.949	162.485		
%		14,1	2,1	9,4	7,3	67,1	100,0			
	65-74	CAPV	N	6.014	1.642	1.998	5.343	80.736	95.733	
%			6,3	1,7	2,1	5,6	84,3	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 122. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Hombres	65-74	Araba	N	1.323	176	69	337	11.258	13.163
			%	10,1	1,3	0,5	2,6	85,5	100,0
		Gipuzkoa	N	2.417	362	1.213	1.702	26.436	32.130
			%	7,5	1,1	3,8	5,3	82,3	100,0
		Bizkaia	N	2.274	1.105	716	3.303	43.042	50.440
			%	4,5	2,2	1,4	6,5	85,3	100,0
	>=75	CAPV	N	4.573	324	1.840	3.885	75.345	85.968
			%	5,3	0,4	2,1	4,5	87,6	100,0
		Araba	N	440	.	170	487	9.808	10.905
			%	4,0	.	1,6	4,5	89,9	100,0
		Gipuzkoa	N	715	126	190	1.071	24.066	26.168
			%	2,7	0,5	0,7	4,1	92,0	100,0
Mujeres	Total	CAPV	N	103.022	24.983	61.290	59.431	727.155	975.882
			%	10,6	2,6	6,3	6,1	74,5	100,0
		Araba	N	12.575	3.836	7.215	12.299	100.847	136.772
			%	9,2	2,8	5,3	9,0	73,7	100,0
		Gipuzkoa	N	30.836	6.647	14.928	17.753	242.522	312.686
			%	9,9	2,1	4,8	5,7	77,6	100,0
	15-24	Bizkaia	N	59.612	14.500	39.147	29.380	383.786	526.425
			%	11,3	2,8	7,4	5,6	72,9	100,0
		CAPV	N	11.272	6.414	5.579	6.651	59.583	89.499
			%	12,6	7,2	6,2	7,4	66,6	100,0
		Araba	N	1.049	447	837	1.867	9.010	13.210
			%	7,9	3,4	6,3	14,1	68,2	100,0
25-44	Gipuzkoa	N	2.216	2.390	1.290	1.200	22.348	29.443	
		%	7,5	8,1	4,4	4,1	75,9	100,0	
	Bizkaia	N	8.007	3.578	3.452	3.584	28.225	46.846	
		%	17,1	7,6	7,4	7,6	60,3	100,0	
	CAPV	N	36.767	10.342	22.642	22.272	228.803	320.826	
		%	11,5	3,2	7,1	6,9	71,3	100,0	
Araba	N	5.282	1.648	2.776	5.309	32.853	47.869		
	%	11,0	3,4	5,8	11,1	68,6	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 122. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	13.448	2.647	4.761	5.381	75.668	101.905	
			%	13,2	2,6	4,7	5,3	74,3	100,0	
		Bizkaia	N	18.037	6.046	15.105	11.581	120.283	171.052	
			%	10,5	3,5	8,8	6,8	70,3	100,0	
	45-64	CAPV	N	44.349	6.257	24.575	20.332	218.255	313.769	
			%	14,1	2,0	7,8	6,5	69,6	100,0	
		Araba	N	5.154	1.377	3.266	3.899	30.567	44.263	
			%	11,6	3,1	7,4	8,8	69,1	100,0	
		Gipuzkoa	N	11.348	930	6.864	6.491	74.029	99.662	
			%	11,4	0,9	6,9	6,5	74,3	100,0	
		Bizkaia	N	27.847	3.949	14.445	9.942	113.659	169.843	
			%	16,4	2,3	8,5	5,9	66,9	100,0	
		65-74	CAPV	N	4.965	949	4.283	4.721	95.006	109.925
				%	4,5	0,9	3,9	4,3	86,4	100,0
			Araba	N	373	175	149	709	12.914	14.320
				%	2,6	1,2	1,0	5,0	90,2	100,0
	Gipuzkoa		N	1.652	.	686	1.940	31.842	36.120	
			%	4,6	.	1,9	5,4	88,2	100,0	
	Bizkaia		N	2.940	774	3.448	2.072	50.250	59.484	
			%	4,9	1,3	5,8	3,5	84,5	100,0	
	>=75	CAPV	N	5.670	1.021	4.212	5.455	125.507	141.864	
			%	4,0	0,7	3,0	3,8	88,5	100,0	
		Araba	N	717	189	186	514	15.503	17.110	
			%	4,2	1,1	1,1	3,0	90,6	100,0	
Gipuzkoa		N	2.172	680	1.328	2.740	38.636	45.555		
		%	4,8	1,5	2,9	6,0	84,8	100,0		
Bizkaia		N	2.781	152	2.698	2.201	71.368	79.200		
		%	3,5	0,2	3,4	2,8	90,1	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	201.039	44.846	125.302	121.545	1.398.274	1.891.006	
			%	10,6	2,4	6,6	6,4	73,9	100,0	
	Araba	N	24.880	7.851	17.304	20.938	199.550	270.523		
		%	9,2	2,9	6,4	7,7	73,8	100,0		
	Gipuzkoa	N	60.185	10.882	30.161	31.490	473.780	606.497		
		%	9,9	1,8	5,0	5,2	78,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 122. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	Total	Bizkaia	N	115.975	26.113	77.836	69.118	724.945	1.013.987
			%	11,4	2,6	7,7	6,8	71,5	100,0
	15-24	CAPV	N	22.263	9.451	14.611	16.205	121.428	183.958
			%	12,1	5,1	7,9	8,8	66,0	100,0
		Araba	N	2.415	1.052	2.735	3.282	18.595	28.079
			%	8,6	3,7	9,7	11,7	66,2	100,0
		Gipuzkoa	N	6.216	3.162	2.914	2.763	45.694	60.748
			%	10,2	5,2	4,8	4,5	75,2	100,0
		Bizkaia	N	13.633	5.237	8.962	10.159	57.139	95.130
			%	14,3	5,5	9,4	10,7	60,1	100,0
	25-44	CAPV	N	75.075	18.646	48.917	46.817	467.679	657.135
			%	11,4	2,8	7,4	7,1	71,2	100,0
		Araba	N	9.359	3.007	7.787	9.257	70.520	99.930
			%	9,4	3,0	7,8	9,3	70,6	100,0
		Gipuzkoa	N	25.566	4.300	10.358	10.379	158.093	208.695
			%	12,3	2,1	5,0	5,0	75,8	100,0
		Bizkaia	N	40.151	11.339	30.773	27.181	239.066	348.509
			%	11,5	3,3	8,8	7,8	68,6	100,0
	45-64	CAPV	N	82.479	12.813	49.440	39.119	432.573	616.424
			%	13,4	2,1	8,0	6,3	70,2	100,0
		Araba	N	10.252	3.251	6.209	6.351	60.952	87.015
			%	11,8	3,7	7,1	7,3	70,0	100,0
		Gipuzkoa	N	21.448	2.254	13.473	10.894	149.013	197.081
			%	10,9	1,1	6,8	5,5	75,6	100,0
		Bizkaia	N	50.779	7.308	29.759	21.875	222.608	332.328
			%	15,3	2,2	9,0	6,6	67,0	100,0
	65-74	CAPV	N	10.979	2.592	6.282	10.063	175.743	205.658
			%	5,3	1,3	3,1	4,9	85,5	100,0
		Araba	N	1.696	351	218	1.046	24.172	27.483
			%	6,2	1,3	0,8	3,8	87,9	100,0
		Gipuzkoa	N	4.069	362	1.899	3.642	58.278	68.251
			%	6,0	0,5	2,8	5,3	85,4	100,0
		Bizkaia	N	5.213	1.879	4.164	5.375	93.293	109.924
			%	4,7	1,7	3,8	4,9	84,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 122. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	>=75	CAPV	N	10.243	1.345	6.052	9.340	200.852	227.832
			%	4,5	0,6	2,7	4,1	88,2	100,0
		Araba	N	1.157	189	356	1.001	25.311	28.015
			%	4,1	0,7	1,3	3,6	90,4	100,0
		Gipuzkoa	N	2.887	805	1.518	3.811	62.702	71.723
			%	4,0	1,1	2,1	5,3	87,4	100,0
		Bizkaia	N	6.200	350	4.178	4.528	112.839	128.094
			%	4,8	0,3	3,3	3,5	88,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 123. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres Total	Total	N	98.017	19.565	63.751	62.114	670.417	913.863
		%	10,7	2,1	7,0	6,8	73,4	100,0
I	N	9.440	2.022	7.668	8.401	86.158	113.690	
	%	8,3	1,8	6,7	7,4	75,8	100,0	
II	N	5.679	1.365	6.949	4.075	60.138	78.206	
	%	7,3	1,7	8,9	5,2	76,9	100,0	
III	N	19.276	2.434	10.917	13.604	142.124	188.355	
	%	10,2	1,3	5,8	7,2	75,5	100,0	
IV	N	53.045	10.866	32.657	29.216	324.522	450.306	
	%	11,8	2,4	7,3	6,5	72,1	100,0	
V	N	10.577	2.877	5.561	6.819	57.475	83.307	
	%	12,7	3,5	6,7	8,2	69,0	100,0	
15-24 Total	N	10.992	2.739	8.772	9.554	61.844	93.900	
	%	11,7	2,9	9,3	10,2	65,9	100,0	
I	N	245	828	780	1.455	11.326	14.634	
	%	1,7	5,7	5,3	9,9	77,4	100,0	
II	N	749	227	1.053	304	8.655	10.988	
	%	6,8	2,1	9,6	2,8	78,8	100,0	
III	N	2.729	.	1.066	2.463	10.571	16.830	
	%	16,2	.	6,3	14,6	62,8	100,0	
IV	N	5.542	1.116	5.460	4.870	25.749	42.737	
	%	13,0	2,6	12,8	11,4	60,3	100,0	
V	N	1.727	567	413	461	5.543	8.711	
	%	19,8	6,5	4,7	5,3	63,6	100,0	
25-44 Total	N	38.309	8.304	26.275	24.545	238.876	336.309	
	%	11,4	2,5	7,8	7,3	71,0	100,0	
I	N	2.583	360	2.516	4.088	34.186	43.732	
	%	5,9	0,8	5,8	9,3	78,2	100,0	
II	N	2.896	237	2.581	1.147	25.636	32.496	
	%	8,9	0,7	7,9	3,5	78,9	100,0	
III	N	6.644	880	4.933	5.591	44.209	62.257	
	%	10,7	1,4	7,9	9,0	71,0	100,0	
IV	N	21.080	5.473	13.476	9.389	110.974	160.392	
	%	13,1	3,4	8,4	5,9	69,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 123. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres 25-44	V	N	5.105	1.354	2.769	4.332	23.871	37.432
		%	13,6	3,6	7,4	11,6	63,8	100,0
45-64	Total	N	38.130	6.556	24.865	18.787	214.030	302.368
		%	12,6	2,2	8,2	6,2	70,8	100,0
I	N	4.640	621	3.901	2.691	26.054	37.907	
	%	12,2	1,6	10,3	7,1	68,7	100,0	
II	N	1.537	328	2.764	1.952	16.838	23.419	
	%	6,6	1,4	11,8	8,3	71,9	100,0	
III	N	7.697	1.287	4.535	3.595	49.207	66.322	
	%	11,6	1,9	6,8	5,4	74,2	100,0	
IV	N	20.767	3.364	11.586	9.134	105.763	150.614	
	%	13,8	2,2	7,7	6,1	70,2	100,0	
V	N	3.488	956	2.079	1.415	16.168	24.106	
	%	14,5	4,0	8,6	5,9	67,1	100,0	
65-74	Total	N	6.014	1.642	1.998	5.343	80.736	95.733
		%	6,3	1,7	2,1	5,6	84,3	100,0
I	N	1.714	214	471	167	11.187	13.753	
	%	12,5	1,6	3,4	1,2	81,3	100,0	
II	N	497	573	551	333	4.909	6.862	
	%	7,2	8,4	8,0	4,9	71,5	100,0	
III	N	1.683	266	107	575	19.146	21.777	
	%	7,7	1,2	0,5	2,6	87,9	100,0	
IV	N	2.006	589	870	3.658	40.630	47.753	
	%	4,2	1,2	1,8	7,7	85,1	100,0	
V	N	114	.	.	610	4.864	5.588	
	%	2,0	.	.	10,9	87,0	100,0	
>=75	Total	N	4.573	324	1.840	3.885	74.930	85.553
		%	5,3	0,4	2,2	4,5	87,6	100,0
I	N	258	.	.	.	3.405	3.663	
	%	7,0	.	.	.	93,0	100,0	
II	N	.	.	.	340	4.100	4.440	
	%	.	.	.	7,7	92,3	100,0	
III	N	522	.	276	1.380	18.991	21.169	
	%	2,5	.	1,3	6,5	89,7	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 123. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Hombres >=75	IV	N	3.650	324	1.265	2.165	41.405	48.810	
		%	7,5	0,7	2,6	4,4	84,8	100,0	
	V	N	142	.	300	.	7.028	7.470	
		%	1,9	.	4,0	.	94,1	100,0	
Mujeres	Total	Total N	103.022	24.983	61.290	59.224	724.972	973.492	
		%	10,6	2,6	6,3	6,1	74,5	100,0	
	I	N	7.387	2.924	5.750	7.960	80.816	104.838	
		%	7,0	2,8	5,5	7,6	77,1	100,0	
	II	N	7.251	2.664	5.147	5.399	74.567	95.028	
		%	7,6	2,8	5,4	5,7	78,5	100,0	
	III	N	20.246	5.513	17.470	13.043	185.836	242.107	
		%	8,4	2,3	7,2	5,4	76,8	100,0	
	IV	N	44.666	11.172	20.970	23.227	260.408	360.441	
		%	12,4	3,1	5,8	6,4	72,2	100,0	
	V	N	23.473	2.710	11.954	9.595	123.345	171.077	
		%	13,7	1,6	7,0	5,6	72,1	100,0	
	15-24	Total	N	11.272	6.414	5.579	6.443	58.825	88.533
			%	12,7	7,2	6,3	7,3	66,4	100,0
		I	N	821	968	1.645	967	10.161	14.562
			%	5,6	6,6	11,3	6,6	69,8	100,0
		II	N	1.238	498	254	1.078	10.429	13.497
			%	9,2	3,7	1,9	8,0	77,3	100,0
		III	N	1.393	1.850	1.268	1.509	14.048	20.069
			%	6,9	9,2	6,3	7,5	70,0	100,0
IV		N	6.334	3.098	1.497	1.841	18.844	31.614	
		%	20,0	9,8	4,7	5,8	59,6	100,0	
V	N	1.486	.	915	1.048	5.343	8.792		
	%	16,9	.	10,4	11,9	60,8	100,0		
25-44	Total	N	36.767	10.342	22.642	22.272	228.308	320.330	
		%	11,5	3,2	7,1	7,0	71,3	100,0	
	I	N	3.637	1.211	1.904	3.311	35.023	45.086	
		%	8,1	2,7	4,2	7,3	77,7	100,0	
	II	N	2.987	1.210	1.346	2.385	29.295	37.223	
		%	8,0	3,3	3,6	6,4	78,7	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 123. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	7.329	1.802	6.849	4.826	61.223	82.029
			%	8,9	2,2	8,3	5,9	74,6	100,0
		IV	N	16.645	4.480	9.381	8.854	71.366	110.725
			%	15,0	4,0	8,5	8,0	64,5	100,0
		V	N	6.169	1.638	3.162	2.897	31.401	45.267
			%	13,6	3,6	7,0	6,4	69,4	100,0
	45-64	Total	N	44.349	6.257	24.575	20.332	218.084	313.598
			%	14,1	2,0	7,8	6,5	69,5	100,0
		I	N	2.823	489	2.019	3.280	23.506	32.116
			%	8,8	1,5	6,3	10,2	73,2	100,0
		II	N	2.532	801	2.976	1.223	19.262	26.792
			%	9,4	3,0	11,1	4,6	71,9	100,0
		III	N	9.230	1.429	7.229	5.040	65.713	88.641
			%	10,4	1,6	8,2	5,7	74,1	100,0
		IV	N	16.639	2.466	7.126	7.524	70.347	104.102
			%	16,0	2,4	6,8	7,2	67,6	100,0
		V	N	13.125	1.073	5.225	3.266	39.257	61.946
			%	21,2	1,7	8,4	5,3	63,4	100,0
	65-74	Total	N	4.965	949	4.283	4.721	94.851	109.770
			%	4,5	0,9	3,9	4,3	86,4	100,0
		I	N	106	257	182	.	6.654	7.199
			%	1,5	3,6	2,5	.	92,4	100,0
		II	N	182	155	226	114	6.547	7.225
			%	2,5	2,1	3,1	1,6	90,6	100,0
		III	N	919	431	1.592	991	18.966	22.899
			%	4,0	1,9	7,0	4,3	82,8	100,0
		IV	N	2.363	106	1.820	2.759	43.087	50.134
			%	4,7	0,2	3,6	5,5	85,9	100,0
		V	N	1.394	.	463	857	19.597	22.312
			%	6,2	.	2,1	3,8	87,8	100,0
	>=75	Total	N	5.670	1.021	4.212	5.455	124.904	141.261
			%	4,0	0,7	3,0	3,9	88,4	100,0
		I	N	.	.	.	402	5.473	5.875
			%	.	.	.	6,8	93,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 123. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Mujeres	>=75	II	N	312	.	345	600	9.035	10.292	
			%	3,0	.	3,4	5,8	87,8	100,0	
		III	N	1.375	.	532	677	25.885	28.468	
			%	4,8	.	1,9	2,4	90,9	100,0	
		IV	N	2.685	1.021	1.147	2.249	56.765	63.866	
			%	4,2	1,6	1,8	3,5	88,9	100,0	
		V	N	1.298	.	2.188	1.527	27.747	32.760	
			%	4,0	.	6,7	4,7	84,7	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	201.039	44.548	125.042	121.338	1.395.389	1.887.356
				%	10,7	2,4	6,6	6,4	73,9	100,0
		I	N	16.827	4.946	13.419	16.361	166.974	218.528	
			%	7,7	2,3	6,1	7,5	76,4	100,0	
		II	N	12.930	4.030	12.095	9.474	134.705	173.234	
			%	7,5	2,3	7,0	5,5	77,8	100,0	
		III	N	39.521	7.946	28.387	26.647	327.960	430.462	
			%	9,2	1,8	6,6	6,2	76,2	100,0	
		IV	N	97.711	22.038	53.626	52.442	584.930	810.747	
			%	12,1	2,7	6,6	6,5	72,1	100,0	
	V	N	34.050	5.587	17.515	16.414	180.820	254.385		
		%	13,4	2,2	6,9	6,5	71,1	100,0		
15-24	Total	Total	N	22.263	9.153	14.351	15.997	120.669	182.434	
			%	12,2	5,0	7,9	8,8	66,1	100,0	
		I	N	1.066	1.796	2.424	2.423	21.487	29.196	
			%	3,7	6,2	8,3	8,3	73,6	100,0	
		II	N	1.987	726	1.307	1.382	19.084	24.485	
			%	8,1	3,0	5,3	5,6	77,9	100,0	
		III	N	4.122	1.850	2.335	3.973	24.620	36.900	
			%	11,2	5,0	6,3	10,8	66,7	100,0	
		IV	N	11.875	4.214	6.957	6.711	44.593	74.351	
			%	16,0	5,7	9,4	9,0	60,0	100,0	
	V	N	3.213	567	1.328	1.509	10.886	17.503		
		%	18,4	3,2	7,6	8,6	62,2	100,0		
25-44	Total	Total	N	75.075	18.646	48.917	46.817	467.184	656.640	
			%	11,4	2,8	7,4	7,1	71,1	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 123. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	25-44	I	N	6.220	1.571	4.420	7.398	69.209	88.818
			%	7,0	1,8	5,0	8,3	77,9	100,0
		II	N	5.883	1.447	3.927	3.532	54.931	69.719
			%	8,4	2,1	5,6	5,1	78,8	100,0
		III	N	13.972	2.683	11.782	10.416	105.432	144.286
			%	9,7	1,9	8,2	7,2	73,1	100,0
		IV	N	37.725	9.954	22.856	18.242	182.340	271.117
			%	13,9	3,7	8,4	6,7	67,3	100,0
		V	N	11.274	2.991	5.932	7.229	55.272	82.699
			%	13,6	3,6	7,2	8,7	66,8	100,0
	45-64	Total	N	82.479	12.813	49.440	39.119	432.114	615.965
			%	13,4	2,1	8,0	6,4	70,2	100,0
		I	N	7.463	1.109	5.921	5.971	49.559	70.023
			%	10,7	1,6	8,5	8,5	70,8	100,0
		II	N	4.069	1.129	5.740	3.174	36.100	50.212
			%	8,1	2,2	11,4	6,3	71,9	100,0
		III	N	16.927	2.716	11.764	8.635	114.921	154.963
			%	10,9	1,8	7,6	5,6	74,2	100,0
		IV	N	37.406	5.830	18.712	16.658	176.110	254.716
			%	14,7	2,3	7,3	6,5	69,1	100,0
		V	N	16.613	2.029	7.304	4.681	55.425	86.052
			%	19,3	2,4	8,5	5,4	64,4	100,0
	65-74	Total	N	10.979	2.592	6.282	10.063	175.587	205.503
			%	5,3	1,3	3,1	4,9	85,4	100,0
		I	N	1.820	471	653	167	17.841	20.952
			%	8,7	2,2	3,1	0,8	85,2	100,0
		II	N	679	728	777	447	11.456	14.087
			%	4,8	5,2	5,5	3,2	81,3	100,0
		III	N	2.602	697	1.699	1.565	38.112	44.676
			%	5,8	1,6	3,8	3,5	85,3	100,0
		IV	N	4.369	695	2.690	6.417	83.717	97.887
			%	4,5	0,7	2,7	6,6	85,5	100,0
		V	N	1.509	.	463	1.467	24.461	27.901
			%	5,4	.	1,7	5,3	87,7	100,0

(continuación)

Tabla 123. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	>=75	Total	N 10.243	1.345	6.052	9.340	199.834	226.814
			% 4,5	0,6	2,7	4,1	88,1	100,0
		I	N 258	.	.	402	8.878	9.538
			% 2,7	.	.	4,2	93,1	100,0
		II	N 312	.	345	939	13.135	14.731
			% 2,1	.	2,3	6,4	89,2	100,0
		III	N 1.897	.	807	2.057	44.876	49.638
			% 3,8	.	1,6	4,1	90,4	100,0
		IV	N 6.335	1.345	2.412	4.414	98.170	112.676
			% 5,6	1,2	2,1	3,9	87,1	100,0
		V	N 1.441	.	2.488	1.527	34.775	40.231
			% 3,6	.	6,2	3,8	86,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 124. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres Total	Total	N	98.017	19.863	64.012	62.114	671.119	915.124
		%	10,7	2,2	7,0	6,8	73,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	25.662	4.665	14.173	12.724	153.376	210.600
		%	12,2	2,2	6,7	6,0	72,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	22.984	5.376	12.371	11.863	114.860	167.454
		%	13,7	3,2	7,4	7,1	68,6	100,0
	Secundaria, superior	N	34.233	6.293	25.936	23.066	271.142	360.670
		%	9,5	1,7	7,2	6,4	75,2	100,0
	Terciaria	N	15.138	3.529	11.532	14.461	131.741	176.400
		%	8,6	2,0	6,5	8,2	74,7	100,0
	15-24 Total	N	10.992	3.036	9.032	9.554	61.844	94.458
		%	11,6	3,2	9,6	10,1	65,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.651	265	1.102	1.300	5.599	9.918
		%	16,6	2,7	11,1	13,1	56,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	4.111	1.275	3.815	2.415	19.512	31.129
		%	13,2	4,1	12,3	7,8	62,7	100,0
	Secundaria, superior	N	4.521	510	3.135	4.543	30.131	42.840
		%	10,6	1,2	7,3	10,6	70,3	100,0
	Terciaria	N	708	985	980	1.296	6.602	10.572
		%	6,7	9,3	9,3	12,3	62,5	100,0
	25-44 Total	N	38.309	8.304	26.275	24.545	238.876	336.309
		%	11,4	2,5	7,8	7,3	71,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	7.708	1.179	4.503	3.758	20.628	37.776
		%	20,4	3,1	11,9	9,9	54,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	8.996	3.083	3.250	4.632	32.847	52.808
		%	17,0	5,8	6,2	8,8	62,2	100,0
	Secundaria, superior	N	15.662	2.801	14.097	8.136	123.578	164.274
		%	9,5	1,7	8,6	5,0	75,2	100,0
	Terciaria	N	5.943	1.240	4.425	8.020	61.823	81.451
		%	7,3	1,5	5,4	9,8	75,9	100,0
	45-64 Total	N	38.130	6.556	24.865	18.787	214.318	302.655
		%	12,6	2,2	8,2	6,2	70,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	11.099	2.296	6.781	3.156	47.067	70.400
		%	15,8	3,3	9,6	4,5	66,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 124. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total		
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	8.389	1.017	4.335	3.347	36.156	53.244	
			%	15,8	1,9	8,1	6,3	67,9	100,0	
		Secundaria, superior	N	11.762	2.459	8.093	8.258	86.557	117.130	
			%	10,0	2,1	6,9	7,1	73,9	100,0	
		Terciaria	N	6.879	783	5.655	4.026	44.538	61.881	
			%	11,1	1,3	9,1	6,5	72,0	100,0	
		65-74	Total	N	6.014	1.642	1.998	5.343	80.736	95.733
			%	6,3	1,7	2,1	5,6	84,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.143	599	418	1.901	32.955	38.017	
			%	5,6	1,6	1,1	5,0	86,7	100,0	
		Secundaria, inferior	N	702	.	625	1.025	13.939	16.291	
			%	4,3	.	3,8	6,3	85,6	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.655	523	484	1.638	21.649	25.948	
			%	6,4	2,0	1,9	6,3	83,4	100,0	
		Terciaria	N	1.514	520	471	779	12.193	15.477	
			%	9,8	3,4	3,0	5,0	78,8	100,0	
		>=75	Total	N	4.573	324	1.840	3.885	75.345	85.968
			%	5,3	0,4	2,1	4,5	87,6	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	3.061	324	1.368	2.610	47.126	54.489		
		%	5,6	0,6	2,5	4,8	86,5	100,0		
	Secundaria, inferior	N	785	.	346	444	12.406	13.981		
		%	5,6	.	2,5	3,2	88,7	100,0		
	Secundaria, superior	N	633	.	127	491	9.228	10.478		
		%	6,0	.	1,2	4,7	88,1	100,0		
	Terciaria	N	95	.	.	340	6.586	7.020		
		%	1,3	.	.	4,8	93,8	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	103.022	24.983	61.290	59.431	727.155	975.882	
			%	10,6	2,6	6,3	6,1	74,5	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	28.628	4.277	13.392	11.894	220.136	278.327	
			%	10,3	1,5	4,8	4,3	79,1	100,0	
		Secundaria, inferior	N	21.744	2.811	13.266	8.100	123.845	169.766	
			%	12,8	1,7	7,8	4,8	73,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	35.537	11.356	23.265	22.738	214.970	307.866	
			%	11,5	3,7	7,6	7,4	69,8	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 124. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N	17.113	6.539	11.367	16.700	168.204	219.923
			%	7,8	3,0	5,2	7,6	76,5	100,0
	15-24	Total	N	11.272	6.414	5.579	6.651	59.583	89.499
			%	12,6	7,2	6,2	7,4	66,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	504	586	727	1.746	7.823	11.386
			%	4,4	5,1	6,4	15,3	68,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.600	640	1.038	166	12.318	16.763
			%	15,5	3,8	6,2	1,0	73,5	100,0
		Secundaria, superior	N	7.079	4.627	2.640	3.405	27.693	45.443
			%	15,6	10,2	5,8	7,5	60,9	100,0
		Terciaria	N	1.089	562	1.174	1.333	11.750	15.907
			%	6,8	3,5	7,4	8,4	73,9	100,0
	25-44	Total	N	36.767	10.342	22.642	22.272	228.803	320.826
			%	11,5	3,2	7,1	6,9	71,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.901	1.174	2.357	575	15.982	25.990
			%	22,7	4,5	9,1	2,2	61,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.595	490	4.445	1.995	25.411	38.937
			%	16,9	1,3	11,4	5,1	65,3	100,0
		Secundaria, superior	N	13.966	4.067	9.762	10.794	91.899	130.487
			%	10,7	3,1	7,5	8,3	70,4	100,0
		Terciaria	N	10.304	4.611	6.077	8.908	95.511	125.412
			%	8,2	3,7	4,8	7,1	76,2	100,0
	45-64	Total	N	44.349	6.257	24.575	20.332	218.255	313.769
			%	14,1	2,0	7,8	6,5	69,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	14.160	1.300	5.341	3.514	53.648	77.963
			%	18,2	1,7	6,9	4,5	68,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	10.734	1.425	5.519	3.598	40.459	61.735
			%	17,4	2,3	8,9	5,8	65,5	100,0
		Secundaria, superior	N	14.175	2.322	9.940	7.721	76.164	110.322
			%	12,8	2,1	9,0	7,0	69,0	100,0
		Terciaria	N	5.280	1.211	3.775	5.499	47.984	63.749
			%	8,3	1,9	5,9	8,6	75,3	100,0
	65-74	Total	N	4.965	949	4.283	4.721	95.006	109.925
			%	4,5	0,9	3,9	4,3	86,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 124. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	3.893	196	1.789	2.689	53.285	61.852
			%	6,3	0,3	2,9	4,3	86,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	834	257	1.580	1.054	23.727	27.452
			%	3,0	0,9	5,8	3,8	86,4	100,0
		Secundaria, superior	N	132	341	573	657	10.190	11.893
			%	1,1	2,9	4,8	5,5	85,7	100,0
	Terciaria	N	106	155	341	320	7.804	8.727	
		%	1,2	1,8	3,9	3,7	89,4	100,0	
	>=75	Total	N	5.670	1.021	4.212	5.455	125.507	141.864
			%	4,0	0,7	3,0	3,8	88,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.170	1.021	3.179	3.369	89.398	101.136
			%	4,1	1,0	3,1	3,3	88,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	981	.	683	1.286	21.929	24.879
			%	3,9	.	2,7	5,2	88,1	100,0
		Secundaria, superior	N	184	.	350	161	9.025	9.720
			%	1,9	.	3,6	1,7	92,8	100,0
		Terciaria	N	334	.	.	639	5.155	6.129
			%	5,5	.	.	10,4	84,1	100,0
Ambos		Total	N	201.039	44.846	125.302	121.545	1.398.274	1.891.006
			%	10,6	2,4	6,6	6,4	73,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	54.290	8.942	27.565	24.618	373.512	488.927	
		%	11,1	1,8	5,6	5,0	76,4	100,0	
	Secundaria, inferior	N	44.728	8.187	25.637	19.963	238.705	337.220	
		%	13,3	2,4	7,6	5,9	70,8	100,0	
	Secundaria, superior	N	69.770	17.650	49.201	45.804	486.112	668.536	
		%	10,4	2,6	7,4	6,9	72,7	100,0	
	Terciaria	N	32.251	10.068	22.899	31.160	299.945	396.323	
		%	8,1	2,5	5,8	7,9	75,7	100,0	
	15-24	Total	N	22.263	9.451	14.611	16.205	121.428	183.958
			%	12,1	5,1	7,9	8,8	66,0	100,0
Sin estudios, primaria		N	2.155	851	1.829	3.046	13.423	21.304	
		%	10,1	4,0	8,6	14,3	63,0	100,0	
Secundaria, inferior	N	6.712	1.916	4.853	2.581	31.830	47.891		
	%	14,0	4,0	10,1	5,4	66,5	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 124. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	11.600	5.137	5.775	7.948	57.823	88.283
			%	13,1	5,8	6,5	9,0	65,5	100,0
		Terciaria	N	1.796	1.547	2.154	2.629	18.352	26.479
			%	6,8	5,8	8,1	9,9	69,3	100,0
	25-44	Total	N	75.075	18.646	48.917	46.817	467.679	657.135
			%	11,4	2,8	7,4	7,1	71,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	13.609	2.353	6.860	4.333	36.610	63.765
			%	21,3	3,7	10,8	6,8	57,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	15.591	3.573	7.695	6.627	58.259	91.745
			%	17,0	3,9	8,4	7,2	63,5	100,0
		Secundaria, superior	N	29.629	6.868	23.859	18.930	215.477	294.762
			%	10,1	2,3	8,1	6,4	73,1	100,0
		Terciaria	N	16.247	5.851	10.502	16.928	157.334	206.862
			%	7,9	2,8	5,1	8,2	76,1	100,0
	45-64	Total	N	82.479	12.813	49.440	39.119	432.573	616.424
			%	13,4	2,1	8,0	6,3	70,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	25.259	3.597	12.122	6.670	100.715	148.363
			%	17,0	2,4	8,2	4,5	67,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	19.123	2.442	9.854	6.945	76.615	114.979
			%	16,6	2,1	8,6	6,0	66,6	100,0
		Secundaria, superior	N	25.937	4.781	18.034	15.979	162.721	227.452
			%	11,4	2,1	7,9	7,0	71,5	100,0
		Terciaria	N	12.159	1.994	9.430	9.525	92.522	125.630
			%	9,7	1,6	7,5	7,6	73,6	100,0
	65-74	Total	N	10.979	2.592	6.282	10.063	175.743	205.658
			%	5,3	1,3	3,1	4,9	85,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.036	796	2.207	4.590	86.240	99.869
			%	6,0	0,8	2,2	4,6	86,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.536	257	2.206	2.079	37.667	43.744
			%	3,5	0,6	5,0	4,8	86,1	100,0
		Secundaria, superior	N	1.786	864	1.057	2.295	31.839	37.841
			%	4,7	2,3	2,8	6,1	84,1	100,0
		Terciaria	N	1.620	675	813	1.099	19.997	24.204
			%	6,7	2,8	3,4	4,5	82,6	100,0

(continuación)

Tabla 124. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	>=75	Total	N	10.243	1.345	6.052	9.340	200.852	227.832
			%	4,5	0,6	2,7	4,1	88,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.231	1.345	4.546	5.979	136.524	155.625
			%	4,6	0,9	2,9	3,8	87,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.766	.	1.029	1.730	34.335	38.860
			%	4,5	.	2,6	4,5	88,4	100,0
		Secundaria, superior	N	817	.	477	652	18.252	20.198
			%	4,0	.	2,4	3,2	90,4	100,0
		Terciaria	N	429	.	.	979	11.741	13.149
			%	3,3	.	.	7,4	89,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 125. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	34.219	20.896	47.349	89.769	722.892	915.124	
			%	3,7	2,3	5,2	9,8	79,0	100,0	
		Araba	N	3.208	2.939	3.644	9.724	114.236	133.751	
			%	2,4	2,2	2,7	7,3	85,4	100,0	
		Gipuzkoa	N	11.727	5.531	16.005	27.904	232.645	293.812	
			%	4,0	1,9	5,4	9,5	79,2	100,0	
		Bizkaia	N	19.284	12.426	27.700	52.141	376.011	487.561	
			%	4,0	2,5	5,7	10,7	77,1	100,0	
		15-24	CAPV	N	2.932	2.923	6.714	9.153	72.736	94.458
				%	3,1	3,1	7,1	9,7	77,0	100,0
			Araba	N	839	560	385	1.342	11.743	14.869
				%	5,6	3,8	2,6	9,0	79,0	100,0
			Gipuzkoa	N	1.746	488	2.454	2.021	24.596	31.305
				%	5,6	1,6	7,8	6,5	78,6	100,0
			Bizkaia	N	347	1.875	3.875	5.790	36.398	48.284
				%	0,7	3,9	8,0	12,0	75,4	100,0
		25-44	CAPV	N	18.125	11.962	19.649	38.646	247.928	336.309
				%	5,4	3,6	5,8	11,5	73,7	100,0
			Araba	N	1.181	1.245	2.204	5.019	42.413	52.062
				%	2,3	2,4	4,2	9,6	81,5	100,0
			Gipuzkoa	N	5.121	2.801	7.426	11.669	79.773	106.790
				%	4,8	2,6	7,0	10,9	74,7	100,0
			Bizkaia	N	11.822	7.917	10.019	21.958	125.742	177.458
				%	6,7	4,5	5,6	12,4	70,9	100,0
	45-64	CAPV	N	9.559	4.880	17.133	30.595	240.488	302.655	
			%	3,2	1,6	5,7	10,1	79,5	100,0	
		Araba	N	553	990	828	2.325	38.055	42.751	
			%	1,3	2,3	1,9	5,4	89,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	3.012	1.875	4.702	10.059	77.771	97.419	
			%	3,1	1,9	4,8	10,3	79,8	100,0	
		Bizkaia	N	5.993	2.015	11.603	18.211	124.663	162.485	
			%	3,7	1,2	7,1	11,2	76,7	100,0	
	65-74	CAPV	N	2.496	1.131	2.331	7.662	82.114	95.733	
			%	2,6	1,2	2,4	8,0	85,8	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 125. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total		
Hombres 65-74	Araba	N	453	144	140	868	11.557	13.163		
		%	3,4	1,1	1,1	6,6	87,8	100,0		
	Gipuzkoa	N	1.241	367	901	2.932	26.690	32.130		
		%	3,9	1,1	2,8	9,1	83,1	100,0		
	Bizkaia	N	801	620	1.290	3.862	43.866	50.440		
		%	1,6	1,2	2,6	7,7	87,0	100,0		
	>=75	CAPV	N	1.108	.	1.521	3.713	79.627	85.968	
			%	1,3	.	1,8	4,3	92,6	100,0	
		Araba	N	180	.	85	170	10.469	10.905	
			%	1,7	.	0,8	1,6	96,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	608	.	523	1.223	23.815	26.168	
			%	2,3	.	2,0	4,7	91,0	100,0	
Bizkaia		N	320	.	912	2.320	45.342	48.895		
		%	0,7	.	1,9	4,7	92,7	100,0		
Mujeres		Total	CAPV	N	13.840	10.296	29.436	54.142	868.167	975.882
			%	1,4	1,1	3,0	5,5	89,0	100,0	
		Araba	N	2.582	2.065	3.152	3.858	125.113	136.772	
			%	1,9	1,5	2,3	2,8	91,5	100,0	
	Gipuzkoa	N	5.885	3.486	11.727	17.819	273.768	312.686		
		%	1,9	1,1	3,8	5,7	87,6	100,0		
	Bizkaia	N	5.372	4.745	14.557	32.465	469.286	526.425		
		%	1,0	0,9	2,8	6,2	89,1	100,0		
	15-24	CAPV	N	1.788	2.971	5.676	8.207	70.857	89.499	
			%	2,0	3,3	6,3	9,2	79,2	100,0	
		Araba	N	130	546	169	483	11.881	13.210	
			%	1,0	4,1	1,3	3,7	89,9	100,0	
Gipuzkoa		N	1.076	1.099	2.354	2.204	22.709	29.443		
		%	3,7	3,7	8,0	7,5	77,1	100,0		
Bizkaia		N	581	1.325	3.153	5.520	36.267	46.846		
		%	1,2	2,8	6,7	11,8	77,4	100,0		
25-44		CAPV	N	3.433	3.984	12.705	23.030	277.673	320.826	
			%	1,1	1,2	4,0	7,2	86,5	100,0	
		Araba	N	1.115	773	1.127	1.526	43.327	47.869	
			%	2,3	1,6	2,4	3,2	90,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 125. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	1.049	1.728	6.451	8.174	84.502	101.905	
			%	1,0	1,7	6,3	8,0	82,9	100,0	
		Bizkaia	N	1.269	1.482	5.127	13.330	149.843	171.052	
	%		0,7	0,9	3,0	7,8	87,6	100,0		
		45-64	CAPV	N	6.762	2.948	9.183	15.285	279.590	313.769
	%			2,2	0,9	2,9	4,9	89,1	100,0	
		Araba	N	879	656	1.520	1.484	39.723	44.263	
	%		2,0	1,5	3,4	3,4	89,7	100,0		
		Gipuzkoa	N	2.691	509	2.028	4.986	89.448	99.662	
	%		2,7	0,5	2,0	5,0	89,8	100,0		
		Bizkaia	N	3.191	1.783	5.635	8.814	150.419	169.843	
	%		1,9	1,1	3,3	5,2	88,6	100,0		
		65-74	CAPV	N	624	90	537	4.266	104.407	109.925
	%			0,6	0,1	0,5	3,9	95,0	100,0	
		Araba	N	.	90	149	185	13.895	14.320	
	%		.	0,6	1,0	1,3	97,0	100,0		
		Gipuzkoa	N	624	.	117	1.446	33.933	36.120	
	%		1,7	.	0,3	4,0	93,9	100,0		
		Bizkaia	N	.	.	271	2.635	56.579	59.484	
	%		.	.	0,5	4,4	95,1	100,0		
		>=75	CAPV	N	1.233	304	1.335	3.354	135.639	141.864
	%			0,9	0,2	0,9	2,4	95,6	100,0	
		Araba	N	457	.	186	180	16.286	17.110	
	%		2,7	.	1,1	1,1	95,2	100,0		
	Gipuzkoa	N	444	149	777	1.009	43.176	45.555		
%		1,0	0,3	1,7	2,2	94,8	100,0			
	Bizkaia	N	332	154	371	2.165	76.177	79.200		
%		0,4	0,2	0,5	2,7	96,2	100,0			
Ambos	Total	CAPV	N	48.059	31.192	76.785	143.911	1.591.059	1.891.006	
			%	2,5	1,6	4,1	7,6	84,1	100,0	
		Araba	N	5.790	5.004	6.796	13.582	239.350	270.523	
			%	2,1	1,8	2,5	5,0	88,5	100,0	
		Gipuzkoa	N	17.613	9.017	27.732	45.723	506.413	606.497	
			%	2,9	1,5	4,6	7,5	83,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 125. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	Total	Bizkaia	N	24.656	17.171	42.257	84.606	845.296	1.013.987
			%	2,4	1,7	4,2	8,3	83,4	100,0
	15-24	CAPV	N	4.720	5.894	12.390	17.360	143.593	183.958
			%	2,6	3,2	6,7	9,4	78,1	100,0
		Araba	N	970	1.106	555	1.825	23.624	28.079
			%	3,5	3,9	2,0	6,5	84,1	100,0
		Gipuzkoa	N	2.822	1.588	4.808	4.225	47.305	60.748
			%	4,6	2,6	7,9	7,0	77,9	100,0
		Bizkaia	N	928	3.200	7.027	11.311	72.664	95.130
			%	1,0	3,4	7,4	11,9	76,4	100,0
	25-44	CAPV	N	21.558	15.945	32.354	61.677	525.601	657.135
			%	3,3	2,4	4,9	9,4	80,0	100,0
		Araba	N	2.296	2.018	3.331	6.546	85.740	99.930
			%	2,3	2,0	3,3	6,6	85,8	100,0
		Gipuzkoa	N	6.170	4.529	13.877	19.843	164.275	208.695
			%	3,0	2,2	6,6	9,5	78,7	100,0
		Bizkaia	N	13.091	9.399	15.146	35.288	275.585	348.509
			%	3,8	2,7	4,3	10,1	79,1	100,0
	45-64	CAPV	N	16.321	7.828	26.316	45.880	520.078	616.424
			%	2,6	1,3	4,3	7,4	84,4	100,0
		Araba	N	1.433	1.646	2.349	3.809	77.778	87.015
			%	1,6	1,9	2,7	4,4	89,4	100,0
		Gipuzkoa	N	5.703	2.384	6.729	15.045	167.218	197.081
			%	2,9	1,2	3,4	7,6	84,8	100,0
		Bizkaia	N	9.185	3.798	17.238	27.025	275.082	332.328
			%	2,8	1,1	5,2	8,1	82,8	100,0
	65-74	CAPV	N	3.120	1.221	2.869	11.928	186.521	205.658
			%	1,5	0,6	1,4	5,8	90,7	100,0
		Araba	N	453	235	290	1.053	25.453	27.483
			%	1,6	0,9	1,1	3,8	92,6	100,0
		Gipuzkoa	N	1.865	367	1.018	4.378	60.623	68.251
			%	2,7	0,5	1,5	6,4	88,8	100,0
		Bizkaia	N	801	620	1.561	6.497	100.445	109.924
			%	0,7	0,6	1,4	5,9	91,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 125. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	>=75	CAPV	N	2.340	304	2.855	7.067	215.266	227.832
			%	1,0	0,1	1,3	3,1	94,5	100,0
		Araba	N	638	.	272	350	26.755	28.015
			%	2,3	.	1,0	1,2	95,5	100,0
		Gipuzkoa	N	1.052	149	1.300	2.232	66.991	71.723
			%	1,5	0,2	1,8	3,1	93,4	100,0
		Bizkaia	N	651	154	1.284	4.486	121.520	128.094
			%	0,5	0,1	1,0	3,5	94,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres Total	Total	N	34.219	20.896	47.349	89.509	721.892	913.863
		%	3,7	2,3	5,2	9,8	79,0	100,0
I	N		2.490	149	3.778	7.703	99.571	113.690
		%	2,2	0,1	3,3	6,8	87,6	100,0
II	N		2.567	1.282	1.647	6.691	66.018	78.206
		%	3,3	1,6	2,1	8,6	84,4	100,0
III	N		3.526	5.540	10.861	19.587	148.841	188.355
		%	1,9	2,9	5,8	10,4	79,0	100,0
IV	N		21.414	10.942	28.357	47.294	342.300	450.306
		%	4,8	2,4	6,3	10,5	76,0	100,0
V	N		4.223	2.984	2.706	8.233	65.162	83.307
		%	5,1	3,6	3,2	9,9	78,2	100,0
15-24 Total	Total	N	2.932	2.923	6.714	8.892	72.438	93.900
		%	3,1	3,1	7,2	9,5	77,1	100,0
I	N		458	.	1.504	826	11.846	14.634
		%	3,1	.	10,3	5,6	80,9	100,0
II	N		.	268	.	1.602	9.119	10.988
		%	.	2,4	.	14,6	83,0	100,0
III	N		.	995	926	1.086	13.823	16.830
		%	.	5,9	5,5	6,5	82,1	100,0
IV	N		1.838	841	3.760	4.666	31.631	42.737
		%	4,3	2,0	8,8	10,9	74,0	100,0
V	N		636	819	523	713	6.019	8.711
		%	7,3	9,4	6,0	8,2	69,1	100,0
25-44 Total	Total	N	18.125	11.962	19.649	38.646	247.928	336.309
		%	5,4	3,6	5,8	11,5	73,7	100,0
I	N		.	.	695	3.523	39.514	43.732
		%	.	.	1,6	8,1	90,4	100,0
II	N		1.594	764	1.264	1.543	27.331	32.496
		%	4,9	2,4	3,9	4,7	84,1	100,0
III	N		1.204	2.811	4.463	8.111	45.666	62.257
		%	1,9	4,5	7,2	13,0	73,4	100,0
IV	N		12.439	7.874	11.502	20.929	107.648	160.392
		%	7,8	4,9	7,2	13,0	67,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres 25-44	V	N	2.887	512	1.724	4.540	27.769	37.432
		%	7,7	1,4	4,6	12,1	74,2	100,0
45-64	Total	N	9.559	4.880	17.133	30.595	240.200	302.368
		%	3,2	1,6	5,7	10,1	79,4	100,0
	I	N	1.076	149	1.299	1.950	33.433	37.907
		%	2,8	0,4	3,4	5,1	88,2	100,0
	II	N	738	.	383	2.799	19.500	23.419
		%	3,2	.	1,6	11,9	83,3	100,0
	III	N	1.734	1.040	4.322	7.423	51.803	66.322
		%	2,6	1,6	6,5	11,2	78,1	100,0
	IV	N	5.426	2.039	10.907	16.252	115.990	150.614
		%	3,6	1,4	7,2	10,8	77,0	100,0
	V	N	585	1.653	223	2.172	19.474	24.106
		%	2,4	6,9	0,9	9,0	80,8	100,0
65-74	Total	N	2.496	1.131	2.331	7.662	82.114	95.733
		%	2,6	1,2	2,4	8,0	85,8	100,0
	I	N	956	.	279	1.404	11.114	13.753
		%	7,0	.	2,0	10,2	80,8	100,0
	II	N	234	250	.	408	5.969	6.862
		%	3,4	3,6	.	6,0	87,0	100,0
	III	N	493	693	1.020	1.482	18.089	21.777
		%	2,3	3,2	4,7	6,8	83,1	100,0
	IV	N	697	187	899	3.559	42.410	47.753
		%	1,5	0,4	1,9	7,5	88,8	100,0
	V	N	114	.	133	809	4.532	5.588
		%	2,0	.	2,4	14,5	81,1	100,0
>=75	Total	N	1.108	.	1.521	3.713	79.212	85.553
		%	1,3	.	1,8	4,3	92,6	100,0
	I	N	3.663	3.663
		%	100,0	100,0
	II	N	.	.	.	340	4.100	4.440
		%	.	.	.	7,7	92,3	100,0
	III	N	94	.	130	1.485	19.460	21.169
		%	0,4	.	0,6	7,0	91,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres >=75	IV	N	1.014	.	1.287	1.888	44.620	48.810
		%	2,1	.	2,6	3,9	91,4	100,0
	V	N	.	.	103	.	7.368	7.470
		%	.	.	1,4	.	98,6	100,0
Mujeres	Total	Total N	13.840	10.089	29.436	54.142	865.984	973.492
		%	1,4	1,0	3,0	5,6	89,0	100,0
	I	N	897	554	4.008	6.282	93.097	104.838
		%	0,9	0,5	3,8	6,0	88,8	100,0
	II	N	551	560	3.075	4.149	86.694	95.028
		%	0,6	0,6	3,2	4,4	91,2	100,0
	III	N	3.322	3.555	7.495	12.372	215.363	242.107
		%	1,4	1,5	3,1	5,1	89,0	100,0
	IV	N	5.700	4.223	7.095	20.641	322.782	360.441
		%	1,6	1,2	2,0	5,7	89,6	100,0
	V	N	3.370	1.198	7.763	10.697	148.049	171.077
		%	2,0	0,7	4,5	6,3	86,5	100,0
	15-24	Total	N	1.788	2.763	5.676	8.207	70.099
		%	2,0	3,1	6,4	9,3	79,2	100,0
I		N	.	.	1.109	1.687	11.765	14.562
		%	.	.	7,6	11,6	80,8	100,0
II		N	.	.	498	1.257	11.742	13.497
		%	.	.	3,7	9,3	87,0	100,0
III		N	.	658	932	1.292	17.187	20.069
		%	.	3,3	4,6	6,4	85,6	100,0
IV		N	1.401	2.105	2.213	2.487	23.408	31.614
		%	4,4	6,7	7,0	7,9	74,0	100,0
V	N	386	.	924	1.485	5.997	8.792	
	%	4,4	.	10,5	16,9	68,2	100,0	
25-44	Total	N	3.433	3.984	12.705	23.030	277.178	320.330
		%	1,1	1,2	4,0	7,2	86,5	100,0
	I	N	435	156	2.175	2.329	39.991	45.086
		%	1,0	0,3	4,8	5,2	88,7	100,0
	II	N	551	409	822	1.677	33.765	37.223
		%	1,5	1,1	2,2	4,5	90,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	283	1.807	3.838	4.188	71.913	82.029
			%	0,3	2,2	4,7	5,1	87,7	100,0
		IV	N	1.692	1.102	2.616	10.209	95.106	110.725
			%	1,5	1,0	2,4	9,2	85,9	100,0
		V	N	472	510	3.254	4.628	36.402	45.267
			%	1,0	1,1	7,2	10,2	80,4	100,0
	45-64	Total	N	6.762	2.948	9.183	15.285	279.419	313.598
			%	2,2	0,9	2,9	4,9	89,1	100,0
		I	N	462	399	723	1.362	29.171	32.116
			%	1,4	1,2	2,3	4,2	90,8	100,0
		II	N	.	151	1.527	586	24.528	26.792
			%	.	0,6	5,7	2,2	91,6	100,0
		III	N	2.264	849	2.454	5.362	77.712	88.641
			%	2,6	1,0	2,8	6,0	87,7	100,0
		IV	N	2.302	861	1.866	5.129	93.943	104.102
			%	2,2	0,8	1,8	4,9	90,2	100,0
		V	N	1.734	688	2.614	2.846	54.065	61.946
			%	2,8	1,1	4,2	4,6	87,3	100,0
	65-74	Total	N	624	90	537	4.266	104.252	109.770
			%	0,6	0,1	0,5	3,9	95,0	100,0
		I	N	.	.	.	502	6.697	7.199
			%	.	.	.	7,0	93,0	100,0
		II	N	.	.	.	359	6.865	7.225
			%	.	.	.	5,0	95,0	100,0
		III	N	.	90	271	1.052	21.486	22.899
			%	.	0,4	1,2	4,6	93,8	100,0
		IV	N	132	.	.	1.711	48.292	50.134
			%	0,3	.	.	3,4	96,3	100,0
		V	N	493	.	267	641	20.912	22.312
			%	2,2	.	1,2	2,9	93,7	100,0
	>=75	Total	N	1.233	304	1.335	3.354	135.036	141.261
			%	0,9	0,2	0,9	2,4	95,6	100,0
		I	N	.	.	.	402	5.473	5.875
			%	.	.	.	6,8	93,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Mujeres	>=75	II	N	.	.	228	271	9.793	10.292
			%	.	.	2,2	2,6	95,2	100,0
		III	N	776	149	.	478	27.065	28.468
			%	2,7	0,5	.	1,7	95,1	100,0
		IV	N	173	154	400	1.106	62.032	63.866
			%	0,3	0,2	0,6	1,7	97,1	100,0
	V	N	284	.	706	1.097	30.673	32.760	
		%	0,9	.	2,2	3,3	93,6	100,0	
	Total	Total	N	48.059	30.985	76.785	143.651	1.587.875	1.887.356
			%	2,5	1,6	4,1	7,6	84,1	100,0
	15-24	I	N	3.387	703	7.785	13.986	192.667	218.528
			%	1,6	0,3	3,6	6,4	88,2	100,0
		II	N	3.117	1.842	4.722	10.840	152.712	173.234
			%	1,8	1,1	2,7	6,3	88,2	100,0
		III	N	6.848	9.094	18.356	31.959	364.204	430.462
			%	1,6	2,1	4,3	7,4	84,6	100,0
		IV	N	27.114	15.164	35.452	67.935	665.081	810.747
			%	3,3	1,9	4,4	8,4	82,0	100,0
V		N	7.592	4.182	10.470	18.930	213.211	254.385	
		%	3,0	1,6	4,1	7,4	83,8	100,0	
Total		Total	N	4.720	5.687	12.390	17.100	142.537	182.434
			%	2,6	3,1	6,8	9,4	78,1	100,0
I		N	458	.	2.614	2.513	23.612	29.196	
		%	1,6	.	9,0	8,6	80,9	100,0	
II		N	.	268	498	2.858	20.861	24.485	
		%	.	1,1	2,0	11,7	85,2	100,0	
III		N	.	1.654	1.858	2.378	31.010	36.900	
		%	.	4,5	5,0	6,4	84,0	100,0	
IV	N	3.240	2.946	5.973	7.153	55.039	74.351		
	%	4,4	4,0	8,0	9,6	74,0	100,0		
V	N	1.023	819	1.447	2.198	12.016	17.503		
	%	5,8	4,7	8,3	12,6	68,7	100,0		
Total	Total	N	21.558	15.945	32.354	61.677	525.105	656.640	
		%	3,3	2,4	4,9	9,4	80,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	25-44	I	N	435	156	2.871	5.852	79.505	88.818
			%	0,5	0,2	3,2	6,6	89,5	100,0
		II	N	2.145	1.173	2.086	3.220	61.096	69.719
			%	3,1	1,7	3,0	4,6	87,6	100,0
		III	N	1.487	4.619	8.302	12.299	117.579	144.286
			%	1,0	3,2	5,8	8,5	81,5	100,0
		IV	N	14.131	8.976	14.119	31.138	202.754	271.117
			%	5,2	3,3	5,2	11,5	74,8	100,0
		V	N	3.359	1.022	4.978	9.168	64.171	82.699
			%	4,1	1,2	6,0	11,1	77,6	100,0
	45-64	Total	N	16.321	7.828	26.316	45.880	519.620	615.965
			%	2,6	1,3	4,3	7,4	84,4	100,0
		I	N	1.538	547	2.022	3.312	62.604	70.023
			%	2,2	0,8	2,9	4,7	89,4	100,0
		II	N	738	151	1.910	3.384	44.028	50.212
			%	1,5	0,3	3,8	6,7	87,7	100,0
		III	N	3.998	1.889	6.776	12.785	129.515	154.963
			%	2,6	1,2	4,4	8,3	83,6	100,0
		IV	N	7.727	2.901	12.773	21.381	209.933	254.716
			%	3,0	1,1	5,0	8,4	82,4	100,0
		V	N	2.319	2.340	2.836	5.017	73.539	86.052
			%	2,7	2,7	3,3	5,8	85,5	100,0
	65-74	Total	N	3.120	1.221	2.869	11.928	186.366	205.503
			%	1,5	0,6	1,4	5,8	90,7	100,0
		I	N	956	.	279	1.907	17.810	20.952
			%	4,6	.	1,3	9,1	85,0	100,0
		II	N	234	250	.	768	12.835	14.087
			%	1,7	1,8	.	5,4	91,1	100,0
		III	N	493	783	1.290	2.534	39.575	44.676
			%	1,1	1,8	2,9	5,7	88,6	100,0
		IV	N	829	187	899	5.270	90.702	97.887
			%	0,8	0,2	0,9	5,4	92,7	100,0
		V	N	607	.	400	1.450	25.444	27.901
			%	2,2	.	1,4	5,2	91,2	100,0

(continuación)

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	>=75	Total	N 2.340	304	2.855	7.067	214.248	226.814
			% 1,0	0,1	1,3	3,1	94,5	100,0
I		N	.	.	.	402	9.136	9.538
		%	.	.	.	4,2	95,8	100,0
II		N	.	.	228	610	13.893	14.731
		%	.	.	1,5	4,1	94,3	100,0
III		N	869	149	130	1.963	46.525	49.638
		%	1,8	0,3	0,3	4,0	93,7	100,0
IV		N	1.187	154	1.688	2.994	106.653	112.676
		%	1,1	0,1	1,5	2,7	94,7	100,0
V		N	284	.	809	1.097	38.041	40.231
		%	0,7	.	2,0	2,7	94,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres Total	Total	N	34.219	20.896	47.349	89.769	722.892	915.124
		%	3,7	2,3	5,2	9,8	79,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	7.457	4.277	8.569	14.879	175.418	210.600
		%	3,5	2,0	4,1	7,1	83,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	7.096	3.996	10.267	19.953	126.142	167.454
		%	4,2	2,4	6,1	11,9	75,3	100,0
	Secundaria, superior	N	14.253	11.533	23.624	38.765	272.494	360.670
		%	4,0	3,2	6,6	10,7	75,6	100,0
	Terciaria	N	5.414	1.089	4.889	16.171	148.838	176.400
		%	3,1	0,6	2,8	9,2	84,4	100,0
	15-24 Total	N	2.932	2.923	6.714	9.153	72.736	94.458
		%	3,1	3,1	7,1	9,7	77,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	.	265	1.193	8.460	9.918
		%	.	.	2,7	12,0	85,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	935	1.010	2.250	4.245	22.689	31.129
		%	3,0	3,2	7,2	13,6	72,9	100,0
	Secundaria, superior	N	1.752	1.914	3.808	2.426	32.940	42.840
		%	4,1	4,5	8,9	5,7	76,9	100,0
	Terciaria	N	245	.	390	1.289	8.647	10.572
		%	2,3	.	3,7	12,2	81,8	100,0
	25-44 Total	N	18.125	11.962	19.649	38.646	247.928	336.309
		%	5,4	3,6	5,8	11,5	73,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.185	2.361	1.914	3.242	27.074	37.776
		%	8,4	6,2	5,1	8,6	71,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.893	1.605	3.813	8.824	34.674	52.808
		%	7,4	3,0	7,2	16,7	65,7	100,0
	Secundaria, superior	N	8.347	7.055	11.933	18.127	118.812	164.274
		%	5,1	4,3	7,3	11,0	72,3	100,0
	Terciaria	N	2.700	941	1.990	8.452	67.368	81.451
		%	3,3	1,2	2,4	10,4	82,7	100,0
	45-64 Total	N	9.559	4.880	17.133	30.595	240.488	302.655
		%	3,2	1,6	5,7	10,1	79,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.991	1.441	5.291	5.780	54.897	70.400
		%	4,2	2,0	7,5	8,2	78,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	1.491	1.265	3.174	5.189	42.125	53.244
			%	2,8	2,4	6,0	9,7	79,1	100,0
		Secundaria, superior	N	3.255	2.025	6.674	14.930	90.247	117.130
			%	2,8	1,7	5,7	12,7	77,0	100,0
		Terciaria	N	1.822	149	1.994	4.697	53.219	61.881
			%	2,9	0,2	3,2	7,6	86,0	100,0
	65-74	Total	N	2.496	1.131	2.331	7.662	82.114	95.733
			%	2,6	1,2	2,4	8,0	85,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	459	475	308	2.568	34.206	38.017
			%	1,2	1,3	0,8	6,8	90,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	490	116	300	1.338	14.047	16.291
			%	3,0	0,7	1,8	8,2	86,2	100,0
		Secundaria, superior	N	900	539	1.209	2.363	20.937	25.948
			%	3,5	2,1	4,7	9,1	80,7	100,0
		Terciaria	N	646	.	515	1.393	12.923	15.477
			%	4,2	.	3,3	9,0	83,5	100,0
	>=75	Total	N	1.108	.	1.521	3.713	79.627	85.968
			%	1,3	.	1,8	4,3	92,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	821	.	791	2.096	50.781	54.489	
		%	1,5	.	1,5	3,8	93,2	100,0	
	Secundaria, inferior	N	287	.	729	358	12.607	13.981	
		%	2,1	.	5,2	2,6	90,2	100,0	
	Secundaria, superior	N	.	.	.	919	9.558	10.478	
		%	.	.	.	8,8	91,2	100,0	
	Terciaria	N	.	.	.	340	6.680	7.020	
		%	.	.	.	4,8	95,2	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	13.840	10.296	29.436	54.142	868.167	975.882
			%	1,4	1,1	3,0	5,5	89,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.199	1.123	5.940	11.232	255.834	278.327
			%	1,5	0,4	2,1	4,0	91,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.051	1.433	4.370	9.218	151.694	169.766
			%	1,8	0,8	2,6	5,4	89,4	100,0
		Secundaria, superior	N	5.436	6.001	13.957	20.582	261.890	307.866
			%	1,8	1,9	4,5	6,7	85,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N	1.153	1.740	5.169	13.111	198.750	219.923
			%	0,5	0,8	2,4	6,0	90,4	100,0
	15-24	Total	N	1.788	2.971	5.676	8.207	70.857	89.499
			%	2,0	3,3	6,3	9,2	79,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	263	367	311	1.191	9.255	11.386
			%	2,3	3,2	2,7	10,5	81,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	909	179	747	1.650	13.276	16.763
			%	5,4	1,1	4,5	9,8	79,2	100,0
		Secundaria, superior	N	615	2.424	3.753	4.600	34.049	45.443
			%	1,4	5,3	8,3	10,1	74,9	100,0
		Terciaria	N	.	.	865	766	14.277	15.907
			%	.	.	5,4	4,8	89,8	100,0
	25-44	Total	N	3.433	3.984	12.705	23.030	277.673	320.826
			%	1,1	1,2	4,0	7,2	86,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	431	285	2.256	852	22.166	25.990
			%	1,7	1,1	8,7	3,3	85,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	709	1.713	3.957	32.558	38.937
			%	.	1,8	4,4	10,2	83,6	100,0
		Secundaria, superior	N	2.274	1.649	5.758	9.231	111.576	130.487
			%	1,7	1,3	4,4	7,1	85,5	100,0
		Terciaria	N	728	1.341	2.979	8.990	111.374	125.412
			%	0,6	1,1	2,4	7,2	88,8	100,0
	45-64	Total	N	6.762	2.948	9.183	15.285	279.590	313.769
			%	2,2	0,9	2,9	4,9	89,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.126	227	2.683	4.480	68.447	77.963
			%	2,7	0,3	3,4	5,7	87,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.796	545	956	2.343	56.096	61.735
			%	2,9	0,9	1,5	3,8	90,9	100,0
		Secundaria, superior	N	2.415	1.778	4.218	5.777	96.134	110.322
			%	2,2	1,6	3,8	5,2	87,1	100,0
		Terciaria	N	426	399	1.326	2.684	58.914	63.749
			%	0,7	0,6	2,1	4,2	92,4	100,0
	65-74	Total	N	624	90	537	4.266	104.407	109.925
			%	0,6	0,1	0,5	3,9	95,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	146	90	267	2.480	58.870	61.852
			%	0,2	0,1	0,4	4,0	95,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	346	.	271	544	26.291	27.452
			%	1,3	.	1,0	2,0	95,8	100,0
		Secundaria, superior	N	132	.	.	812	10.949	11.893
			%	1,1	.	.	6,8	92,1	100,0
	Terciaria	N	.	.	.	430	8.297	8.727	
		%	.	.	.	4,9	95,1	100,0	
	>=75	Total	N	1.233	304	1.335	3.354	135.639	141.864
			%	0,9	0,2	0,9	2,4	95,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.233	154	423	2.229	97.097	101.136
			%	1,2	0,2	0,4	2,2	96,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	683	723	23.473	24.879
			%	.	.	2,7	2,9	94,3	100,0
		Secundaria, superior	N	.	149	228	161	9.181	9.720
			%	.	1,5	2,3	1,7	94,5	100,0
		Terciaria	N	.	.	.	241	5.887	6.129
			%	.	.	.	3,9	96,1	100,0
Ambos		Total	N	48.059	31.192	76.785	143.911	1.591.059	1.891.006
			%	2,5	1,6	4,1	7,6	84,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	11.656	5.400	14.509	26.111	431.252	488.927	
		%	2,4	1,1	3,0	5,3	88,2	100,0	
	Secundaria, inferior	N	10.147	5.430	14.637	29.171	277.836	337.220	
		%	3,0	1,6	4,3	8,7	82,4	100,0	
	Secundaria, superior	N	19.689	17.534	37.581	59.347	534.384	668.536	
		%	2,9	2,6	5,6	8,9	79,9	100,0	
	Terciaria	N	6.567	2.829	10.058	29.282	347.587	396.323	
		%	1,7	0,7	2,5	7,4	87,7	100,0	
	15-24	Total	N	4.720	5.894	12.390	17.360	143.593	183.958
			%	2,6	3,2	6,7	9,4	78,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	263	367	576	2.384	17.715	21.304
			%	1,2	1,7	2,7	11,2	83,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.844	1.189	2.998	5.895	35.965	47.891
			%	3,9	2,5	6,3	12,3	75,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

476

Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	2.368	4.338	7.562	7.026	66.990	88.283
			%	2,7	4,9	8,6	8,0	75,9	100,0
		Terciaria	N	245	.	1.255	2.055	22.924	26.479
			%	0,9	.	4,7	7,8	86,6	100,0
	25-44	Total	N	21.558	15.945	32.354	61.677	525.601	657.135
			%	3,3	2,4	4,9	9,4	80,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.616	2.646	4.169	4.094	49.240	63.765
			%	5,7	4,1	6,5	6,4	77,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.893	2.314	5.526	12.781	67.232	91.745
			%	4,2	2,5	6,0	13,9	73,3	100,0
		Secundaria, superior	N	10.621	8.704	17.691	27.358	230.387	294.762
			%	3,6	3,0	6,0	9,3	78,2	100,0
		Terciaria	N	3.428	2.282	4.968	17.443	178.742	206.862
			%	1,7	1,1	2,4	8,4	86,4	100,0
	45-64	Total	N	16.321	7.828	26.316	45.880	520.078	616.424
			%	2,6	1,3	4,3	7,4	84,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.117	1.668	7.975	10.260	123.343	148.363
			%	3,4	1,1	5,4	6,9	83,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.287	1.810	4.130	7.531	98.221	114.979
			%	2,9	1,6	3,6	6,6	85,4	100,0
		Secundaria, superior	N	5.670	3.803	10.891	20.707	186.381	227.452
			%	2,5	1,7	4,8	9,1	81,9	100,0
		Terciaria	N	2.248	547	3.320	7.381	112.133	125.630
			%	1,8	0,4	2,6	5,9	89,3	100,0
	65-74	Total	N	3.120	1.221	2.869	11.928	186.521	205.658
			%	1,5	0,6	1,4	5,8	90,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	606	566	574	5.048	93.076	99.869
			%	0,6	0,6	0,6	5,1	93,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	837	116	571	1.882	40.338	43.744
			%	1,9	0,3	1,3	4,3	92,2	100,0
		Secundaria, superior	N	1.031	539	1.209	3.176	31.886	37.841
			%	2,7	1,4	3,2	8,4	84,3	100,0
		Terciaria	N	646	.	515	1.822	21.221	24.204
			%	2,7	.	2,1	7,5	87,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	>=75	Total	N	2.340	304	2.855	7.067	215.266	227.832
			%	1,0	0,1	1,3	3,1	94,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.053	154	1.214	4.325	147.878	155.625
			%	1,3	0,1	0,8	2,8	95,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	287	.	1.413	1.081	36.080	38.860
			%	0,7	.	3,6	2,8	92,8	100,0
		Secundaria, superior	N	.	149	228	1.080	18.740	20.198
			%	.	0,7	1,1	5,3	92,8	100,0
		Terciaria	N	.	.	.	581	12.567	13.149
			%	.	.	.	4,4	95,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 128. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	9.921	18.555	64.475	109.415	712.759	915.124	
			%	1,1	2,0	7,0	12,0	77,9	100,0	
		Araba	N	1.198	976	4.434	12.598	114.545	133.751	
			%	0,9	0,7	3,3	9,4	85,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	3.654	10.599	22.185	40.922	216.452	293.812	
			%	1,2	3,6	7,6	13,9	73,7	100,0	
		Bizkaia	N	5.069	6.980	37.856	55.895	381.762	487.561	
			%	1,0	1,4	7,8	11,5	78,3	100,0	
		15-24	CAPV	N	2.730	5.744	12.918	11.532	61.533	94.458
				%	2,9	6,1	13,7	12,2	65,1	100,0
			Araba	N	900	301	1.432	1.819	10.418	14.869
				%	6,1	2,0	9,6	12,2	70,1	100,0
			Gipuzkoa	N	788	3.140	4.613	3.337	19.426	31.305
				%	2,5	10,0	14,7	10,7	62,1	100,0
			Bizkaia	N	1.043	2.303	6.873	6.376	31.689	48.284
				%	2,2	4,8	14,2	13,2	65,6	100,0
		25-44	CAPV	N	3.898	8.665	25.926	47.064	250.757	336.309
				%	1,2	2,6	7,7	14,0	74,6	100,0
			Araba	N	.	.	2.330	6.339	43.392	52.062
				%	.	.	4,5	12,2	83,3	100,0
			Gipuzkoa	N	2.371	5.800	9.645	16.084	72.889	106.790
				%	2,2	5,4	9,0	15,1	68,3	100,0
			Bizkaia	N	1.527	2.865	13.951	24.640	134.475	177.458
				%	0,9	1,6	7,9	13,9	75,8	100,0
	45-64	CAPV	N	2.880	3.506	19.132	36.860	240.278	302.655	
			%	1,0	1,2	6,3	12,2	79,4	100,0	
		Araba	N	298	675	463	3.545	37.770	42.751	
			%	0,7	1,6	1,1	8,3	88,3	100,0	
		Gipuzkoa	N	495	1.364	5.696	15.244	74.619	97.419	
			%	0,5	1,4	5,8	15,6	76,6	100,0	
		Bizkaia	N	2.086	1.467	12.972	18.071	127.888	162.485	
			%	1,3	0,9	8,0	11,1	78,7	100,0	
	65-74	CAPV	N	413	639	4.849	8.384	81.448	95.733	
			%	0,4	0,7	5,1	8,8	85,1	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 128. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y territorio histórico

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Hombres	65-74	Araba	N	.	.	209	654	12.301	13.163
			%	.	.	1,6	5,0	93,4	100,0
		Gipuzkoa	N	.	294	1.886	4.038	25.912	32.130
			%	.	0,9	5,9	12,6	80,6	100,0
		Bizkaia	N	413	345	2.755	3.693	43.235	50.440
			%	0,8	0,7	5,5	7,3	85,7	100,0
	>=75	CAPV	N	.	.	1.649	5.575	78.743	85.968
			%	.	.	1,9	6,5	91,6	100,0
		Araba	N	.	.	.	241	10.664	10.905
			%	.	.	.	2,2	97,8	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	344	2.219	23.605	26.168
			%	.	.	1,3	8,5	90,2	100,0
Mujeres	Total	CAPV	N	3.207	13.750	42.727	99.113	817.086	975.882
			%	0,3	1,4	4,4	10,2	83,7	100,0
		Araba	N	473	1.778	4.089	10.774	119.657	136.772
			%	0,3	1,3	3,0	7,9	87,5	100,0
		Gipuzkoa	N	1.254	6.348	18.352	40.519	246.212	312.686
			%	0,4	2,0	5,9	13,0	78,7	100,0
	15-24	Bizkaia	N	1.479	5.624	20.285	47.819	451.218	526.425
			%	0,3	1,1	3,9	9,1	85,7	100,0
		CAPV	N	280	6.147	10.304	10.053	62.715	89.499
			%	0,3	6,9	11,5	11,2	70,1	100,0
		Araba	N	.	1.085	1.723	1.039	9.363	13.210
			%	.	8,2	13,0	7,9	70,9	100,0
25-44	Gipuzkoa	N	.	2.851	5.148	3.847	17.598	29.443	
		%	.	9,7	17,5	13,1	59,8	100,0	
	Bizkaia	N	280	2.211	3.433	5.166	35.755	46.846	
		%	0,6	4,7	7,3	11,0	76,3	100,0	
	CAPV	N	781	4.739	18.063	44.460	252.783	320.826	
		%	0,2	1,5	5,6	13,9	78,8	100,0	
Araba	N	150	457	2.034	5.500	39.727	47.869		
	%	0,3	1,0	4,2	11,5	83,0	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 128. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	630	3.136	7.006	16.456	74.677	101.905
			%	0,6	3,1	6,9	16,1	73,3	100,0
		Bizkaia	N	.	1.146	9.023	22.504	138.379	171.052
			%	.	0,7	5,3	13,2	80,9	100,0
	45-64	CAPV	N	1.543	2.765	10.625	33.445	265.391	313.769
			%	0,5	0,9	3,4	10,7	84,6	100,0
		Araba	N	323	137	.	3.436	40.367	44.263
			%	0,7	0,3	.	7,8	91,2	100,0
		Gipuzkoa	N	160	361	4.450	16.233	78.457	99.662
			%	0,2	0,4	4,5	16,3	78,7	100,0
		Bizkaia	N	1.060	2.266	6.175	13.776	146.567	169.843
			%	0,6	1,3	3,6	8,1	86,3	100,0
	65-74	CAPV	N	382	.	2.362	5.749	101.431	109.925
			%	0,3	.	2,1	5,2	92,3	100,0
		Araba	N	.	.	332	279	13.709	14.320
			%	.	.	2,3	1,9	95,7	100,0
		Gipuzkoa	N	244	.	1.052	2.318	32.506	36.120
			%	0,7	.	2,9	6,4	90,0	100,0
		Bizkaia	N	139	.	978	3.152	55.216	59.484
			%	0,2	.	1,6	5,3	92,8	100,0
	>=75	CAPV	N	220	100	1.372	5.407	134.766	141.864
			%	0,2	0,1	1,0	3,8	95,0	100,0
		Araba	N	.	100	.	520	16.491	17.110
			%	.	0,6	.	3,0	96,4	100,0
	Gipuzkoa	N	220	.	696	1.665	42.973	45.555	
		%	0,5	.	1,5	3,7	94,3	100,0	
	Bizkaia	N	.	.	676	3.222	75.302	79.200	
		%	.	.	0,9	4,1	95,1	100,0	
Ambos	Total	CAPV	N	13.127	32.305	107.201	208.528	1.529.845	1.891.006
			%	0,7	1,7	5,7	11,0	80,9	100,0
		Araba	N	1.671	2.754	8.523	23.372	234.202	270.523
			%	0,6	1,0	3,2	8,6	86,6	100,0
		Gipuzkoa	N	4.909	16.946	40.537	81.441	462.664	606.497
			%	0,8	2,8	6,7	13,4	76,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 128. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y territorio histórico

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Ambos	Total	Bizkaia	N	6.547	12.604	58.141	103.714	832.980	1.013.987
			%	0,6	1,2	5,7	10,2	82,1	100,0
	15-24	CAPV	N	3.011	11.892	23.222	21.585	124.248	183.958
			%	1,6	6,5	12,6	11,7	67,5	100,0
		Araba	N	900	1.386	3.155	2.859	19.781	28.079
			%	3,2	4,9	11,2	10,2	70,4	100,0
		Gipuzkoa	N	788	5.991	9.761	7.184	37.024	60.748
			%	1,3	9,9	16,1	11,8	60,9	100,0
		Bizkaia	N	1.323	4.515	10.307	11.542	67.443	95.130
			%	1,4	4,7	10,8	12,1	70,9	100,0
	25-44	CAPV	N	4.678	13.404	43.989	91.524	503.540	657.135
			%	0,7	2,0	6,7	13,9	76,6	100,0
		Araba	N	150	457	4.364	11.840	83.119	99.930
			%	0,2	0,5	4,4	11,8	83,2	100,0
		Gipuzkoa	N	3.001	8.936	16.651	32.540	147.566	208.695
			%	1,4	4,3	8,0	15,6	70,7	100,0
		Bizkaia	N	1.527	4.011	22.974	47.144	272.854	348.509
			%	0,4	1,2	6,6	13,5	78,3	100,0
	45-64	CAPV	N	4.423	6.271	29.757	70.305	505.668	616.424
			%	0,7	1,0	4,8	11,4	82,0	100,0
		Araba	N	621	812	463	6.981	78.137	87.015
			%	0,7	0,9	0,5	8,0	89,8	100,0
		Gipuzkoa	N	656	1.725	10.147	31.477	153.076	197.081
			%	0,3	0,9	5,1	16,0	77,7	100,0
		Bizkaia	N	3.146	3.733	19.147	31.847	274.455	332.328
			%	0,9	1,1	5,8	9,6	82,6	100,0
	65-74	CAPV	N	795	639	7.211	14.133	182.879	205.658
			%	0,4	0,3	3,5	6,9	88,9	100,0
		Araba	N	.	.	541	933	26.010	27.483
			%	.	.	2,0	3,4	94,6	100,0
		Gipuzkoa	N	244	294	2.938	6.356	58.418	68.251
			%	0,4	0,4	4,3	9,3	85,6	100,0
		Bizkaia	N	552	345	3.733	6.844	98.451	109.924
			%	0,5	0,3	3,4	6,2	89,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 128. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	>=75	CAPV	N	220	100	3.021	10.981	213.510	227.832
			%	0,1	0,0	1,3	4,8	93,7	100,0
		Araba	N	.	100	.	760	27.155	28.015
			%	.	0,4	.	2,7	96,9	100,0
		Gipuzkoa	N	220	.	1.040	3.884	66.579	71.723
			%	0,3	.	1,5	5,4	92,8	100,0
		Bizkaia	N	.	.	1.981	6.337	119.776	128.094
			%	.	.	1,5	4,9	93,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres Total	Total	N	9.921	18.555	64.214	109.415	711.759	913.863
		%	1,1	2,0	7,0	12,0	77,9	100,0
I	N	646	3.098	8.671	15.974	85.301	113.690	
	%	0,6	2,7	7,6	14,1	75,0	100,0	
II	N	528	1.476	4.315	12.081	59.805	78.206	
	%	0,7	1,9	5,5	15,4	76,5	100,0	
III	N	3.814	5.579	16.706	23.843	138.412	188.355	
	%	2,0	3,0	8,9	12,7	73,5	100,0	
IV	N	2.883	6.822	30.565	50.288	359.747	450.306	
	%	0,6	1,5	6,8	11,2	79,9	100,0	
V	N	2.049	1.580	3.957	7.228	68.494	83.307	
	%	2,5	1,9	4,7	8,7	82,2	100,0	
15-24 Total	N	2.730	5.744	12.658	11.532	61.235	93.900	
	%	2,9	6,1	13,5	12,3	65,2	100,0	
I	N	331	2.137	2.858	797	8.511	14.634	
	%	2,3	14,6	19,5	5,4	58,2	100,0	
II	N	.	268	1.037	2.901	6.782	10.988	
	%	.	2,4	9,4	26,4	61,7	100,0	
III	N	1.224	909	2.194	757	11.747	16.830	
	%	7,3	5,4	13,0	4,5	69,8	100,0	
IV	N	539	1.802	5.318	5.933	29.146	42.737	
	%	1,3	4,2	12,4	13,9	68,2	100,0	
V	N	636	628	1.251	1.146	5.049	8.711	
	%	7,3	7,2	14,4	13,2	58,0	100,0	
25-44 Total	N	3.898	8.665	25.926	47.064	250.757	336.309	
	%	1,2	2,6	7,7	14,0	74,6	100,0	
I	N	.	845	2.458	7.884	32.546	43.732	
	%	.	1,9	5,6	18,0	74,4	100,0	
II	N	387	1.041	2.133	3.347	25.588	32.496	
	%	1,2	3,2	6,6	10,3	78,7	100,0	
III	N	806	2.655	8.089	10.856	39.851	62.257	
	%	1,3	4,3	13,0	17,4	64,0	100,0	
IV	N	1.720	3.782	11.176	21.594	122.121	160.392	
	%	1,1	2,4	7,0	13,5	76,1	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres 25-44	V	N	985	342	2.071	3.383	30.651	37.432
		%	2,6	0,9	5,5	9,0	81,9	100,0
45-64	Total	N	2.880	3.506	19.132	36.860	239.990	302.368
		%	1,0	1,2	6,3	12,2	79,4	100,0
	I	N	179	.	2.154	5.466	30.109	37.907
		%	0,5	.	5,7	14,4	79,4	100,0
	II	N	.	167	676	4.358	18.219	23.419
		%	.	0,7	2,9	18,6	77,8	100,0
	III	N	1.649	1.786	4.571	8.931	49.385	66.322
		%	2,5	2,7	6,9	13,5	74,5	100,0
	IV	N	625	945	11.471	16.317	121.256	150.614
		%	0,4	0,6	7,6	10,8	80,5	100,0
	V	N	427	609	259	1.788	21.022	24.106
		%	1,8	2,5	1,1	7,4	87,2	100,0
65-74	Total	N	413	639	4.849	8.384	81.448	95.733
		%	0,4	0,7	5,1	8,8	85,1	100,0
	I	N	136	116	1.058	1.682	10.761	13.753
		%	1,0	0,8	7,7	12,2	78,2	100,0
	II	N	141	.	292	1.136	5.294	6.862
		%	2,1	.	4,3	16,6	77,1	100,0
	III	N	136	229	1.722	1.807	17.883	21.777
		%	0,6	1,1	7,9	8,3	82,1	100,0
	IV	N	.	294	1.644	3.152	42.663	47.753
		%	.	0,6	3,4	6,6	89,3	100,0
	V	N	.	.	133	607	4.848	5.588
		%	.	.	2,4	10,9	86,7	100,0
>=75	Total	N	.	.	1.649	5.575	78.329	85.553
		%	.	.	1,9	6,5	91,6	100,0
	I	N	.	.	143	146	3.374	3.663
		%	.	.	3,9	4,0	92,1	100,0
	II	N	.	.	177	340	3.922	4.440
		%	.	.	4,0	7,7	88,4	100,0
	III	N	.	.	130	1.492	19.547	21.169
		%	.	.	0,6	7,0	92,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Hombres >=75	IV	N	.	.	956	3.292	44.562	48.810	
		%	.	.	2,0	6,7	91,3	100,0	
	V	N	.	.	242	304	6.924	7.470	
		%	.	.	3,2	4,1	92,7	100,0	
Mujeres	Total	Total N	3.207	13.750	42.727	98.322	815.487	973.492	
		%	0,3	1,4	4,4	10,1	83,8	100,0	
	I	N	168	2.534	5.930	13.033	83.173	104.838	
		%	0,2	2,4	5,7	12,4	79,3	100,0	
	II	N	.	2.515	5.609	14.448	72.456	95.028	
		%	.	2,6	5,9	15,2	76,2	100,0	
	III	N	953	4.396	11.160	24.901	200.696	242.107	
		%	0,4	1,8	4,6	10,3	82,9	100,0	
	IV	N	1.340	2.318	11.226	34.694	310.863	360.441	
		%	0,4	0,6	3,1	9,6	86,2	100,0	
	V	N	745	1.986	8.802	11.246	148.298	171.077	
		%	0,4	1,2	5,1	6,6	86,7	100,0	
	15-24	Total	N	280	6.147	10.304	9.590	62.212	88.533
			%	0,3	6,9	11,6	10,8	70,3	100,0
		I	N	.	1.346	1.487	1.397	10.331	14.562
			%	.	9,2	10,2	9,6	70,9	100,0
II		N	.	900	1.923	1.691	8.983	13.497	
		%	.	6,7	14,2	12,5	66,6	100,0	
III		N	.	1.992	1.685	1.745	14.647	20.069	
		%	.	9,9	8,4	8,7	73,0	100,0	
IV		N	280	1.252	3.587	3.743	22.752	31.614	
		%	0,9	4,0	11,3	11,8	72,0	100,0	
V		N	.	657	1.622	1.013	5.499	8.792	
		%	.	7,5	18,5	11,5	62,5	100,0	
25-44	Total	N	781	4.739	18.063	44.235	252.513	320.330	
		%	0,2	1,5	5,6	13,8	78,8	100,0	
	I	N	.	630	2.968	5.904	35.584	45.086	
		%	.	1,4	6,6	13,1	78,9	100,0	
	II	N	.	1.275	2.619	8.149	25.180	37.223	
		%	.	3,4	7,0	21,9	67,6	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	.	1.259	6.352	13.316	61.102	82.029
			%	.	1,5	7,7	16,2	74,5	100,0
		IV	N	308	545	3.774	12.459	93.639	110.725
			%	0,3	0,5	3,4	11,3	84,6	100,0
		V	N	472	1.030	2.351	4.406	37.008	45.267
			%	1,0	2,3	5,2	9,7	81,8	100,0
	45-64	Total	N	1.543	2.765	10.625	33.445	265.220	313.598
			%	0,5	0,9	3,4	10,7	84,6	100,0
		I	N	168	558	1.346	5.017	25.028	32.116
			%	0,5	1,7	4,2	15,6	77,9	100,0
		II	N	.	240	903	4.248	21.401	26.792
			%	.	0,9	3,4	15,9	79,9	100,0
		III	N	595	1.145	2.493	7.239	77.169	88.641
			%	0,7	1,3	2,8	8,2	87,1	100,0
		IV	N	620	521	2.465	13.108	87.388	104.102
			%	0,6	0,5	2,4	12,6	83,9	100,0
		V	N	160	300	3.419	3.833	54.234	61.946
			%	0,3	0,5	5,5	6,2	87,6	100,0
	65-74	Total	N	382	.	2.362	5.749	101.276	109.770
			%	0,3	.	2,2	5,2	92,3	100,0
		I	N	.	.	129	374	6.697	7.199
			%	.	.	1,8	5,2	93,0	100,0
		II	N	.	.	165	359	6.701	7.225
			%	.	.	2,3	5,0	92,7	100,0
		III	N	139	.	516	1.202	21.042	22.899
			%	0,6	.	2,3	5,2	91,9	100,0
		IV	N	132	.	675	2.481	46.847	50.134
			%	0,3	.	1,3	4,9	93,4	100,0
		V	N	112	.	878	1.332	19.990	22.312
			%	0,5	.	3,9	6,0	89,6	100,0
	>=75	Total	N	220	100	1.372	5.304	134.266	141.261
			%	0,2	0,1	1,0	3,8	95,0	100,0
		I	N	.	.	.	341	5.534	5.875
			%	.	.	.	5,8	94,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	>=75	II	N	.	100	.	.	10.192	10.292
			%	.	1,0	.	.	99,0	100,0
		III	N	220	.	114	1.398	26.736	28.468
			%	0,8	.	0,4	4,9	93,9	100,0
		IV	N	.	.	726	2.903	60.238	63.866
			%	.	.	1,1	4,5	94,3	100,0
	V	N	.	.	532	662	31.566	32.760	
		%	.	.	1,6	2,0	96,4	100,0	
	Total	Total	N	13.127	32.305	106.941	207.737	1.527.246	1.887.356
			%	0,7	1,7	5,7	11,0	80,9	100,0
	15-24	I	N	815	5.632	14.600	29.007	168.474	218.528
			%	0,4	2,6	6,7	13,3	77,1	100,0
		II	N	528	3.991	9.925	26.529	132.261	173.234
			%	0,3	2,3	5,7	15,3	76,3	100,0
		III	N	4.768	9.975	27.866	48.745	339.108	430.462
			%	1,1	2,3	6,5	11,3	78,8	100,0
		IV	N	4.223	9.141	41.791	84.982	670.610	810.747
			%	0,5	1,1	5,2	10,5	82,7	100,0
V		N	2.794	3.566	12.759	18.474	216.792	254.385	
		%	1,1	1,4	5,0	7,3	85,2	100,0	
Total		Total	N	3.011	11.892	22.962	21.122	123.447	182.434
			%	1,7	6,5	12,6	11,6	67,7	100,0
I		N	331	3.484	4.346	2.194	18.842	29.196	
		%	1,1	11,9	14,9	7,5	64,5	100,0	
II		N	.	1.168	2.960	4.592	15.765	24.485	
		%	.	4,8	12,1	18,8	64,4	100,0	
III		N	1.224	2.901	3.878	2.502	26.394	36.900	
		%	3,3	7,9	10,5	6,8	71,5	100,0	
IV	N	819	3.054	8.904	9.675	51.898	74.351		
	%	1,1	4,1	12,0	13,0	69,8	100,0		
V	N	636	1.285	2.874	2.159	10.548	17.503		
	%	3,6	7,3	16,4	12,3	60,3	100,0		
Total	Total	N	4.678	13.404	43.989	91.298	503.270	656.640	
		%	0,7	2,0	6,7	13,9	76,6	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	25-44	I	N	.	1.475	5.425	13.788	68.130	88.818
			%	.	1,7	6,1	15,5	76,7	100,0
		II	N	387	2.316	4.752	11.497	50.768	69.719
			%	0,6	3,3	6,8	16,5	72,8	100,0
		III	N	806	3.914	14.440	24.172	100.954	144.286
			%	0,6	2,7	10,0	16,8	70,0	100,0
		IV	N	2.028	4.327	14.950	34.053	215.760	271.117
			%	0,7	1,6	5,5	12,6	79,6	100,0
		V	N	1.457	1.372	4.422	7.789	67.659	82.699
			%	1,8	1,7	5,3	9,4	81,8	100,0
	45-64	Total	N	4.423	6.271	29.757	70.305	505.210	615.965
			%	0,7	1,0	4,8	11,4	82,0	100,0
		I	N	347	558	3.500	10.482	55.137	70.023
			%	0,5	0,8	5,0	15,0	78,7	100,0
		II	N	.	408	1.579	8.606	39.620	50.212
			%	.	0,8	3,1	17,1	78,9	100,0
		III	N	2.243	2.931	7.064	16.171	126.553	154.963
			%	1,4	1,9	4,6	10,4	81,7	100,0
		IV	N	1.244	1.466	13.936	29.425	208.643	254.716
			%	0,5	0,6	5,5	11,6	81,9	100,0
		V	N	588	909	3.678	5.621	75.256	86.052
			%	0,7	1,1	4,3	6,5	87,5	100,0
	65-74	Total	N	795	639	7.211	14.133	182.724	205.503
			%	0,4	0,3	3,5	6,9	88,9	100,0
		I	N	136	116	1.187	2.056	17.458	20.952
			%	0,6	0,6	5,7	9,8	83,3	100,0
		II	N	141	.	457	1.495	11.994	14.087
			%	1,0	.	3,2	10,6	85,1	100,0
		III	N	275	229	2.238	3.009	38.925	44.676
			%	0,6	0,5	5,0	6,7	87,1	100,0
		IV	N	132	294	2.319	5.634	89.509	97.887
			%	0,1	0,3	2,4	5,8	91,4	100,0
		V	N	112	.	1.011	1.940	24.838	27.901
			%	0,4	.	3,6	7,0	89,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	>=75	Total	N 220	100	3.021	10.879	212.594	226.814
			% 0,1	0,0	1,3	4,8	93,7	100,0
I		N	.	.	143	487	8.908	9.538
		%	.	.	1,5	5,1	93,4	100,0
II		N	.	100	177	340	14.114	14.731
		%	.	0,7	1,2	2,3	95,8	100,0
III		N	220	.	245	2.890	46.283	49.638
		%	0,4	.	0,5	5,8	93,2	100,0
IV		N	.	.	1.682	6.195	104.799	112.676
		%	.	.	1,5	5,5	93,0	100,0
V		N	.	.	775	966	38.490	40.231
		%	.	.	1,9	2,4	95,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres Total	Total	N	9.921	18.555	64.475	109.415	712.759	915.124
		%	1,1	2,0	7,0	12,0	77,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.374	2.095	10.462	15.078	180.590	210.600
		%	1,1	1,0	5,0	7,2	85,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.310	3.016	11.706	17.264	133.158	167.454
		%	1,4	1,8	7,0	10,3	79,5	100,0
	Secundaria, superior	N	3.977	8.935	32.080	45.865	269.814	360.670
		%	1,1	2,5	8,9	12,7	74,8	100,0
	Terciaria	N	1.260	4.509	10.226	31.209	129.197	176.400
		%	0,7	2,6	5,8	17,7	73,2	100,0
15-24	Total	N	2.730	5.744	12.918	11.532	61.533	94.458
		%	2,9	6,1	13,7	12,2	65,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	291	.	1.720	307	7.600	9.918
		%	2,9	.	17,3	3,1	76,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	668	2.231	3.952	3.776	20.501	31.129
		%	2,1	7,2	12,7	12,1	65,9	100,0
	Secundaria, superior	N	1.035	3.074	6.553	5.653	26.524	42.840
		%	2,4	7,2	15,3	13,2	61,9	100,0
	Terciaria	N	737	439	693	1.796	6.907	10.572
		%	7,0	4,2	6,6	17,0	65,3	100,0
25-44	Total	N	3.898	8.665	25.926	47.064	250.757	336.309
		%	1,2	2,6	7,7	14,0	74,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.420	684	3.637	3.287	28.747	37.776
		%	3,8	1,8	9,6	8,7	76,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	932	.	2.535	5.646	43.695	52.808
		%	1,8	.	4,8	10,7	82,7	100,0
	Secundaria, superior	N	1.159	4.127	16.084	21.217	121.687	164.274
		%	0,7	2,5	9,8	12,9	74,1	100,0
	Terciaria	N	387	3.853	3.669	16.913	56.628	81.451
		%	0,5	4,7	4,5	20,8	69,5	100,0
45-64	Total	N	2.880	3.506	19.132	36.860	240.278	302.655
		%	1,0	1,2	6,3	12,2	79,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	664	999	3.781	6.598	58.359	70.400
		%	0,9	1,4	5,4	9,4	82,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	570	674	3.845	5.703	42.452	53.244
			%	1,1	1,3	7,2	10,7	79,7	100,0
		Secundaria, superior	N	1.646	1.617	6.655	15.303	91.909	117.130
			%	1,4	1,4	5,7	13,1	78,5	100,0
		Terciaria	N	.	216	4.851	9.256	47.558	61.881
			%	.	0,3	7,8	15,0	76,9	100,0
	65-74	Total	N	413	639	4.849	8.384	81.448	95.733
			%	0,4	0,7	5,1	8,8	85,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	412	643	1.911	35.051	38.017
			%	.	1,1	1,7	5,0	92,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	141	111	976	1.112	13.951	16.291
			%	0,9	0,7	6,0	6,8	85,6	100,0
		Secundaria, superior	N	136	116	2.360	2.608	20.728	25.948
			%	0,5	0,4	9,1	10,1	79,9	100,0
		Terciaria	N	136	.	870	2.753	11.719	15.477
			%	0,9	.	5,6	17,8	75,7	100,0
	>=75	Total	N	.	.	1.649	5.575	78.743	85.968
			%	.	.	1,9	6,5	91,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	.	681	2.975	50.833	54.489	
		%	.	.	1,2	5,5	93,3	100,0	
	Secundaria, inferior	N	.	.	397	1.025	12.559	13.981	
		%	.	.	2,8	7,3	89,8	100,0	
	Secundaria, superior	N	.	.	429	1.083	8.966	10.478	
		%	.	.	4,1	10,3	85,6	100,0	
	Terciaria	N	.	.	143	491	6.385	7.020	
		%	.	.	2,0	7,0	91,0	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	3.207	13.750	42.727	99.113	817.086	975.882
			%	0,3	1,4	4,4	10,2	83,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.206	1.070	9.966	15.592	250.494	278.327
			%	0,4	0,4	3,6	5,6	90,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	273	1.775	6.452	13.556	147.710	169.766
			%	0,2	1,0	3,8	8,0	87,0	100,0
		Secundaria, superior	N	1.728	6.845	14.062	35.007	250.223	307.866
			%	0,6	2,2	4,6	11,4	81,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N	.	4.060	12.246	34.957	168.659	219.923
			%	.	1,8	5,6	15,9	76,7	100,0
	15-24	Total	N	280	6.147	10.304	10.053	62.715	89.499
			%	0,3	6,9	11,5	11,2	70,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	280	.	1.817	720	8.569	11.386
			%	2,5	.	16,0	6,3	75,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	742	2.221	3.055	10.745	16.763
			%	.	4,4	13,2	18,2	64,1	100,0
		Secundaria, superior	N	.	4.069	3.615	4.716	33.043	45.443
			%	.	9,0	8,0	10,4	72,7	100,0
		Terciaria	N	.	1.336	2.651	1.563	10.358	15.907
			%	.	8,4	16,7	9,8	65,1	100,0
	25-44	Total	N	781	4.739	18.063	44.460	252.783	320.826
			%	0,2	1,5	5,6	13,9	78,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	830	3.279	1.484	20.397	25.990
			%	.	3,2	12,6	5,7	78,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	317	1.435	3.831	33.355	38.937
			%	.	0,8	3,7	9,8	85,7	100,0
		Secundaria, superior	N	781	2.282	6.374	16.359	104.692	130.487
			%	0,6	1,7	4,9	12,5	80,2	100,0
		Terciaria	N	.	1.310	6.976	22.786	94.339	125.412
			%	.	1,0	5,6	18,2	75,2	100,0
	45-64	Total	N	1.543	2.765	10.625	33.445	265.391	313.769
			%	0,5	0,9	3,4	10,7	84,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	705	240	3.336	6.923	66.757	77.963
			%	0,9	0,3	4,3	8,9	85,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	160	716	1.307	3.704	55.847	61.735
			%	0,3	1,2	2,1	6,0	90,5	100,0
		Secundaria, superior	N	677	494	3.656	13.026	92.468	110.322
			%	0,6	0,4	3,3	11,8	83,8	100,0
		Terciaria	N	.	1.314	2.326	9.791	50.318	63.749
			%	.	2,1	3,6	15,4	78,9	100,0
	65-74	Total	N	382	.	2.362	5.749	101.431	109.925
			%	0,3	.	2,1	5,2	92,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total		
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	.	.	858	2.945	58.049	61.852	
			%	.	.	1,4	4,8	93,9	100,0	
		Secundaria, inferior	N	112	.	908	2.037	24.395	27.452	
			%	0,4	.	3,3	7,4	88,9	100,0	
		Secundaria, superior	N	270	.	303	466	10.855	11.893	
			%	2,3	.	2,5	3,9	91,3	100,0	
		Terciaria	N	.	.	294	301	8.133	8.727	
			%	.	.	3,4	3,4	93,2	100,0	
		>=75	Total	N	220	100	1.372	5.407	134.766	141.864
			%	0,2	0,1	1,0	3,8	95,0	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	220	.	676	3.519	96.721	101.136
				%	0,2	.	0,7	3,5	95,6	100,0
			Secundaria, inferior	N	.	.	582	930	23.368	24.879
				%	.	.	2,3	3,7	93,9	100,0
			Secundaria, superior	N	.	.	114	441	9.165	9.720
				%	.	.	1,2	4,5	94,3	100,0
			Terciaria	N	.	100	.	517	5.512	6.129
				%	.	1,6	.	8,4	89,9	100,0
Ambos	Total	Total	N	13.127	32.305	107.201	208.528	1.529.845	1.891.006	
			%	0,7	1,7	5,7	11,0	80,9	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	3.580	3.165	20.428	30.670	431.084	488.927
			%	0,7	0,6	4,2	6,3	88,2	100,0	
			Secundaria, inferior	N	2.583	4.791	18.158	30.820	280.868	337.220
			%	0,8	1,4	5,4	9,1	83,3	100,0	
			Secundaria, superior	N	5.705	15.780	46.143	80.872	520.037	668.536
			%	0,9	2,4	6,9	12,1	77,8	100,0	
			Terciaria	N	1.260	8.569	22.472	66.166	297.857	396.323
			%	0,3	2,2	5,7	16,7	75,2	100,0	
		15-24	Total	N	3.011	11.892	23.222	21.585	124.248	183.958
			%	1,6	6,5	12,6	11,7	67,5	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	571	.	3.537	1.026	16.170	21.304	
		%	2,7	.	16,6	4,8	75,9	100,0		
		Secundaria, inferior	N	668	2.974	6.173	6.831	31.246	47.891	
		%	1,4	6,2	12,9	14,3	65,2	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	1.035	7.143	10.169	10.369	59.567	88.283
			%	1,2	8,1	11,5	11,7	67,5	100,0
		Terciaria	N	737	1.775	3.344	3.359	17.265	26.479
			%	2,8	6,7	12,6	12,7	65,2	100,0
	25-44	Total	N	4.678	13.404	43.989	91.524	503.540	657.135
				%	0,7	2,0	6,7	13,9	76,6
		Sin estudios, primaria	N	1.420	1.514	6.916	4.771	49.144	63.765
			%	2,2	2,4	10,8	7,5	77,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	932	317	3.970	9.477	77.050	91.745
			%	1,0	0,3	4,3	10,3	84,0	100,0
		Secundaria, superior	N	1.940	6.409	22.458	37.576	226.379	294.762
			%	0,7	2,2	7,6	12,7	76,8	100,0
		Terciaria	N	387	5.164	10.645	39.700	150.967	206.862
			%	0,2	2,5	5,1	19,2	73,0	100,0
	45-64	Total	N	4.423	6.271	29.757	70.305	505.668	616.424
				%	0,7	1,0	4,8	11,4	82,0
		Sin estudios, primaria	N	1.369	1.239	7.117	13.521	125.116	148.363
			%	0,9	0,8	4,8	9,1	84,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	730	1.390	5.152	9.408	98.299	114.979
			%	0,6	1,2	4,5	8,2	85,5	100,0
		Secundaria, superior	N	2.323	2.112	10.311	28.329	184.377	227.452
			%	1,0	0,9	4,5	12,5	81,1	100,0
		Terciaria	N	.	1.530	7.177	19.046	97.876	125.630
			%	.	1,2	5,7	15,2	77,9	100,0
	65-74	Total	N	795	639	7.211	14.133	182.879	205.658
				%	0,4	0,3	3,5	6,9	88,9
		Sin estudios, primaria	N	.	412	1.501	4.857	93.100	99.869
			%	.	0,4	1,5	4,9	93,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	253	111	1.885	3.149	38.345	43.744
			%	0,6	0,3	4,3	7,2	87,7	100,0
		Secundaria, superior	N	406	116	2.662	3.074	31.582	37.841
			%	1,1	0,3	7,0	8,1	83,5	100,0
		Terciaria	N	136	.	1.163	3.053	19.851	24.204
			%	0,6	.	4,8	12,6	82,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	N	220	100	3.021	10.981	213.510	227.832
			%	0,1	0,0	1,3	4,8	93,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	220	.	1.357	6.494	147.554	155.625
			%	0,1	.	0,9	4,2	94,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	978	1.955	35.927	38.860
			%	.	.	2,5	5,0	92,5	100,0
		Secundaria, superior	N	.	.	543	1.524	18.131	20.198
			%	.	.	2,7	7,5	89,8	100,0
		Terciaria	N	.	100	143	1.008	11.898	13.149
			%	.	0,8	1,1	7,7	90,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 131. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	23.616	14.839	35.731	54.415	786.523	915.124	
			%	2,6	1,6	3,9	5,9	85,9	100,0	
		Araba	N	3.185	2.483	5.162	7.036	115.884	133.751	
			%	2,4	1,9	3,9	5,3	86,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	6.283	4.936	13.546	13.007	256.039	293.812	
			%	2,1	1,7	4,6	4,4	87,1	100,0	
		Bizkaia	N	14.149	7.419	17.022	34.372	414.600	487.561	
			%	2,9	1,5	3,5	7,0	85,0	100,0	
		15-24	CAPV	N	1.836	2.807	3.868	6.173	79.774	94.458
				%	1,9	3,0	4,1	6,5	84,5	100,0
		Araba	N	729	846	545	348	12.402	14.869	
				%	4,9	5,7	3,7	2,3	83,4	100,0
		Gipuzkoa	N	539	523	1.573	1.762	26.907	31.305	
				%	1,7	1,7	5,0	5,6	86,0	100,0
		Bizkaia	N	568	1.437	1.750	4.063	40.465	48.284	
				%	1,2	3,0	3,6	8,4	83,8	100,0
		25-44	CAPV	N	11.049	7.965	19.978	22.690	274.627	336.309
				%	3,3	2,4	5,9	6,7	81,7	100,0
		Araba	N	1.059	1.108	3.245	4.172	42.477	52.062	
				%	2,0	2,1	6,2	8,0	81,6	100,0
		Gipuzkoa	N	2.410	3.384	7.827	5.345	87.825	106.790	
				%	2,3	3,2	7,3	5,0	82,2	100,0
		Bizkaia	N	7.580	3.473	8.906	13.173	144.325	177.458	
				%	4,3	2,0	5,0	7,4	81,3	100,0
	45-64	CAPV	N	9.870	3.543	10.672	21.350	257.220	302.655	
			%	3,3	1,2	3,5	7,1	85,0	100,0	
	Araba	N	1.257	529	1.146	2.319	37.500	42.751		
			%	2,9	1,2	2,7	5,4	87,7	100,0	
	Gipuzkoa	N	3.167	736	3.920	4.219	85.377	97.419		
			%	3,3	0,8	4,0	4,3	87,6	100,0	
	Bizkaia	N	5.446	2.278	5.605	14.812	134.343	162.485		
			%	3,4	1,4	3,4	9,1	82,7	100,0	
	65-74	CAPV	N	861	523	861	2.498	90.990	95.733	
			%	0,9	0,5	0,9	2,6	95,0	100,0	

(continuación)

Tabla 131. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y territorio histórico

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total		
Hombres 65-74	Araba	N	140	.	140	198	12.685	13.163		
		%	1,1	.	1,1	1,5	96,4	100,0		
	Gipuzkoa	N	167	293	227	1.349	30.094	32.130		
		%	0,5	0,9	0,7	4,2	93,7	100,0		
	Bizkaia	N	554	230	495	951	48.211	50.440		
		%	1,1	0,5	1,0	1,9	95,6	100,0		
	>=75	CAPV	N	.	.	352	1.703	83.913	85.968	
			%	.	.	0,4	2,0	97,6	100,0	
		Araba	N	.	.	85	.	10.819	10.905	
			%	.	.	0,8	.	99,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	.	.	.	331	25.837	26.168	
			%	.	.	.	1,3	98,7	100,0	
Bizkaia		N	.	.	266	1.372	47.256	48.895		
		%	.	.	0,5	2,8	96,6	100,0		
Mujeres		Total	CAPV	N	12.535	14.157	35.220	40.577	873.394	975.882
			%	1,3	1,5	3,6	4,2	89,5	100,0	
		Araba	N	1.690	4.257	5.048	5.006	120.770	136.772	
			%	1,2	3,1	3,7	3,7	88,3	100,0	
	Gipuzkoa	N	5.633	2.768	9.788	10.384	284.113	312.686		
		%	1,8	0,9	3,1	3,3	90,9	100,0		
	Bizkaia	N	5.213	7.132	20.383	25.187	468.510	526.425		
		%	1,0	1,4	3,9	4,8	89,0	100,0		
	15-24	CAPV	N	679	2.682	7.295	6.786	72.057	89.499	
			%	0,8	3,0	8,2	7,6	80,5	100,0	
		Araba	N	.	504	1.452	416	10.838	13.210	
			%	.	3,8	11,0	3,1	82,0	100,0	
Gipuzkoa		N	167	387	1.324	1.517	26.048	29.443		
		%	0,6	1,3	4,5	5,2	88,5	100,0		
Bizkaia		N	512	1.791	4.519	4.853	35.170	46.846		
		%	1,1	3,8	9,6	10,4	75,1	100,0		
25-44		CAPV	N	6.967	6.927	16.059	17.691	273.180	320.826	
			%	2,2	2,2	5,0	5,5	85,1	100,0	
		Araba	N	1.360	2.856	1.690	2.489	39.475	47.869	
			%	2,8	6,0	3,5	5,2	82,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 131. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	3.121	1.686	5.933	4.419	86.746	101.905
			%	3,1	1,7	5,8	4,3	85,1	100,0
		Bizkaia	N	2.487	2.385	8.436	10.784	146.960	171.052
			%	1,5	1,4	4,9	6,3	85,9	100,0
	45-64	CAPV	N	4.537	4.051	10.522	12.258	282.402	313.769
			%	1,4	1,3	3,4	3,9	90,0	100,0
		Araba	N	330	898	1.413	1.653	39.970	44.263
			%	0,7	2,0	3,2	3,7	90,3	100,0
		Gipuzkoa	N	1.993	563	2.347	3.027	91.732	99.662
			%	2,0	0,6	2,4	3,0	92,0	100,0
		Bizkaia	N	2.213	2.591	6.762	7.578	150.700	169.843
			%	1,3	1,5	4,0	4,5	88,7	100,0
	65-74	CAPV	N	132	365	273	1.447	107.708	109.925
			%	0,1	0,3	0,2	1,3	98,0	100,0
		Araba	N	.	.	90	170	14.060	14.320
			%	.	.	0,6	1,2	98,2	100,0
		Gipuzkoa	N	132	.	.	526	35.462	36.120
			%	0,4	.	.	1,5	98,2	100,0
		Bizkaia	N	.	365	182	750	58.187	59.484
			%	.	0,6	0,3	1,3	97,8	100,0
	>=75	CAPV	N	220	132	1.071	2.394	138.047	141.864
			%	0,2	0,1	0,8	1,7	97,3	100,0
		Araba	N	.	.	404	278	16.428	17.110
			%	.	.	2,4	1,6	96,0	100,0
Gipuzkoa		N	220	132	184	895	44.124	45.555	
		%	0,5	0,3	0,4	2,0	96,9	100,0	
Bizkaia		N	.	.	483	1.222	77.495	79.200	
		%	.	.	0,6	1,5	97,8	100,0	
Ambos	Total	CAPV	N	36.152	28.996	70.951	94.991	1.659.917	1.891.006
			%	1,9	1,5	3,8	5,0	87,8	100,0
	Araba	N	4.875	6.740	10.211	12.042	236.654	270.523	
		%	1,8	2,5	3,8	4,5	87,5	100,0	
	Gipuzkoa	N	11.916	7.704	23.335	23.391	540.152	606.497	
		%	2,0	1,3	3,8	3,9	89,1	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 131. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	Total	Bizkaia	N	19.361	14.552	37.405	59.558	883.110	1.013.987
			%	1,9	1,4	3,7	5,9	87,1	100,0
	15-24	CAPV	N	2.516	5.489	11.163	12.959	151.830	183.958
			%	1,4	3,0	6,1	7,0	82,5	100,0
		Araba	N	729	1.349	1.998	764	23.240	28.079
			%	2,6	4,8	7,1	2,7	82,8	100,0
		Gipuzkoa	N	707	911	2.896	3.279	52.955	60.748
			%	1,2	1,5	4,8	5,4	87,2	100,0
		Bizkaia	N	1.081	3.229	6.269	8.917	75.635	95.130
			%	1,1	3,4	6,6	9,4	79,5	100,0
	25-44	CAPV	N	18.017	14.893	36.037	40.381	547.807	657.135
			%	2,7	2,3	5,5	6,1	83,4	100,0
		Araba	N	2.419	3.964	4.935	6.660	81.952	99.930
			%	2,4	4,0	4,9	6,7	82,0	100,0
		Gipuzkoa	N	5.531	5.070	13.760	9.764	174.570	208.695
			%	2,7	2,4	6,6	4,7	83,6	100,0
		Bizkaia	N	10.067	5.859	17.343	23.956	291.284	348.509
			%	2,9	1,7	5,0	6,9	83,6	100,0
	45-64	CAPV	N	14.407	7.594	21.194	33.608	539.622	616.424
			%	2,3	1,2	3,4	5,5	87,5	100,0
		Araba	N	1.588	1.427	2.559	3.972	77.470	87.015
			%	1,8	1,6	2,9	4,6	89,0	100,0
		Gipuzkoa	N	5.160	1.298	6.267	7.246	177.109	197.081
			%	2,6	0,7	3,2	3,7	89,9	100,0
		Bizkaia	N	7.660	4.869	12.367	22.390	285.042	332.328
			%	2,3	1,5	3,7	6,7	85,8	100,0
	65-74	CAPV	N	992	888	1.134	3.945	198.698	205.658
			%	0,5	0,4	0,6	1,9	96,6	100,0
		Araba	N	140	.	230	369	26.745	27.483
			%	0,5	.	0,8	1,3	97,3	100,0
		Gipuzkoa	N	299	293	227	1.876	65.556	68.251
			%	0,4	0,4	0,3	2,7	96,1	100,0
		Bizkaia	N	554	595	677	1.701	106.397	109.924
			%	0,5	0,5	0,6	1,5	96,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 131. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	>=75	CAPV	N	220	132	1.423	4.098	221.960	227.832
			%	0,1	0,1	0,6	1,8	97,4	100,0
		Araba	N	.	.	489	278	27.248	28.015
			%	.	.	1,7	1,0	97,3	100,0
		Gipuzkoa	N	220	132	184	1.226	69.961	71.723
			%	0,3	0,2	0,3	1,7	97,5	100,0
		Bizkaia	N	.	.	750	2.594	124.751	128.094
			%	.	.	0,6	2,0	97,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres Total	Total	N	23.616	14.839	35.731	54.155	785.523	913.863
		%	2,6	1,6	3,9	5,9	86,0	100,0
I	N	1.788	758	2.667	6.795	101.683	113.690	
	%	1,6	0,7	2,3	6,0	89,4	100,0	
II	N	1.753	1.291	2.035	4.048	69.079	78.206	
	%	2,2	1,7	2,6	5,2	88,3	100,0	
III	N	4.018	3.739	7.057	10.117	163.423	188.355	
	%	2,1	2,0	3,7	5,4	86,8	100,0	
IV	N	13.360	7.243	21.596	29.583	378.524	450.306	
	%	3,0	1,6	4,8	6,6	84,1	100,0	
V	N	2.698	1.807	2.376	3.612	72.814	83.307	
	%	3,2	2,2	2,9	4,3	87,4	100,0	
15-24 Total	N	1.836	2.807	3.868	5.913	79.476	93.900	
	%	2,0	3,0	4,1	6,3	84,6	100,0	
I	N	814	.	.	.	13.821	14.634	
	%	5,6	.	.	.	94,4	100,0	
II	N	.	.	.	506	10.482	10.988	
	%	.	.	.	4,6	95,4	100,0	
III	N	194	793	361	767	14.715	16.830	
	%	1,2	4,7	2,1	4,6	87,4	100,0	
IV	N	539	1.189	3.212	4.478	33.319	42.737	
	%	1,3	2,8	7,5	10,5	78,0	100,0	
V	N	289	825	295	162	7.140	8.711	
	%	3,3	9,5	3,4	1,9	82,0	100,0	
25-44 Total	N	11.049	7.965	19.978	22.690	274.627	336.309	
	%	3,3	2,4	5,9	6,7	81,7	100,0	
I	N	.	366	1.154	3.066	39.145	43.732	
	%	.	0,8	2,6	7,0	89,5	100,0	
II	N	1.612	1.291	1.133	1.326	27.134	32.496	
	%	5,0	4,0	3,5	4,1	83,5	100,0	
III	N	1.101	1.829	4.644	5.460	49.223	62.257	
	%	1,8	2,9	7,5	8,8	79,1	100,0	
IV	N	6.659	4.132	11.560	11.045	126.996	160.392	
	%	4,2	2,6	7,2	6,9	79,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres 25-44	V	N	1.677	347	1.486	1.793	32.128	37.432
		%	4,5	0,9	4,0	4,8	85,8	100,0
45-64	Total	N	9.870	3.543	10.672	21.350	256.932	302.368
		%	3,3	1,2	3,5	7,1	85,0	100,0
	I	N	554	222	1.233	3.358	32.539	37.907
		%	1,5	0,6	3,3	8,9	85,8	100,0
	II	N	.	.	777	1.626	21.016	23.419
		%	.	.	3,3	6,9	89,7	100,0
	III	N	2.723	994	1.837	3.004	57.763	66.322
		%	4,1	1,5	2,8	4,5	87,1	100,0
	IV	N	5.861	1.692	6.230	12.288	124.542	150.614
		%	3,9	1,1	4,1	8,2	82,7	100,0
	V	N	732	635	595	1.073	21.071	24.106
		%	3,0	2,6	2,5	4,5	87,4	100,0
65-74	Total	N	861	523	861	2.498	90.990	95.733
		%	0,9	0,5	0,9	2,6	95,0	100,0
	I	N	420	170	279	227	12.657	13.753
		%	3,1	1,2	2,0	1,6	92,0	100,0
	II	N	141	.	125	250	6.346	6.862
		%	2,1	.	1,8	3,6	92,5	100,0
	III	N	.	123	215	886	20.552	21.777
		%	.	0,6	1,0	4,1	94,4	100,0
	IV	N	300	230	241	847	46.134	47.753
		%	0,6	0,5	0,5	1,8	96,6	100,0
	V	N	.	.	.	288	5.300	5.588
		%	.	.	.	5,2	94,8	100,0
>=75	Total	N	.	.	352	1.703	83.498	85.553
		%	.	.	0,4	2,0	97,6	100,0
	I	N	.	.	.	143	3.520	3.663
		%	.	.	.	3,9	96,1	100,0
	II	N	.	.	.	340	4.100	4.440
		%	.	.	.	7,7	92,3	100,0
	III	N	21.169	21.169
		%	100,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Hombres >=75	IV	N	.	.	352	925	47.533	48.810	
		%	.	.	0,7	1,9	97,4	100,0	
	V	N	.	.	.	295	7.175	7.470	
		%	.	.	.	4,0	96,0	100,0	
Mujeres	Total	Total N	12.535	14.157	35.220	40.369	871.211	973.492	
		%	1,3	1,5	3,6	4,1	89,5	100,0	
	I	N	1.074	1.985	5.249	3.783	92.748	104.838	
		%	1,0	1,9	5,0	3,6	88,5	100,0	
	II	N	679	627	3.838	4.349	85.535	95.028	
		%	0,7	0,7	4,0	4,6	90,0	100,0	
	III	N	3.905	3.250	7.371	9.646	217.936	242.107	
		%	1,6	1,3	3,0	4,0	90,0	100,0	
	IV	N	6.034	4.970	13.991	16.668	318.778	360.441	
		%	1,7	1,4	3,9	4,6	88,4	100,0	
	V	N	843	3.326	4.772	5.923	156.214	171.077	
		%	0,5	1,9	2,8	3,5	91,3	100,0	
	15-24	Total	N	679	2.682	7.295	6.579	71.298	88.533
			%	0,8	3,0	8,2	7,4	80,5	100,0
		I	N	.	.	2.394	1.006	11.161	14.562
			%	.	.	16,4	6,9	76,6	100,0
		II	N	.	.	758	310	12.429	13.497
			%	.	.	5,6	2,3	92,1	100,0
		III	N	.	1.288	1.326	1.051	16.404	20.069
%			.	6,4	6,6	5,2	81,7	100,0	
IV		N	679	1.247	1.853	3.120	24.713	31.614	
		%	2,1	3,9	5,9	9,9	78,2	100,0	
V		N	.	147	963	1.092	6.591	8.792	
		%	.	1,7	10,9	12,4	75,0	100,0	
25-44	Total	N	6.967	6.927	16.059	17.691	272.685	320.330	
		%	2,2	2,2	5,0	5,5	85,1	100,0	
	I	N	776	1.121	2.203	1.510	39.476	45.086	
		%	1,7	2,5	4,9	3,3	87,6	100,0	
	II	N	401	422	2.196	3.055	31.149	37.223	
		%	1,1	1,1	5,9	8,2	83,7	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	1.701	1.555	3.215	2.798	72.761	82.029
			%	2,1	1,9	3,9	3,4	88,7	100,0
		IV	N	3.732	2.996	7.045	7.666	89.287	110.725
			%	3,4	2,7	6,4	6,9	80,6	100,0
		V	N	358	834	1.401	2.662	40.012	45.267
			%	0,8	1,8	3,1	5,9	88,4	100,0
	45-64	Total	N	4.537	4.051	10.522	12.258	282.231	313.598
			%	1,4	1,3	3,4	3,9	90,0	100,0
		I	N	297	864	469	1.025	29.460	32.116
			%	0,9	2,7	1,5	3,2	91,7	100,0
		II	N	279	205	883	810	24.616	26.792
			%	1,0	0,8	3,3	3,0	91,9	100,0
		III	N	1.984	150	2.389	4.969	79.148	88.641
			%	2,2	0,2	2,7	5,6	89,3	100,0
		IV	N	1.492	486	4.687	4.178	93.259	104.102
			%	1,4	0,5	4,5	4,0	89,6	100,0
		V	N	485	2.345	2.093	1.275	55.748	61.946
			%	0,8	3,8	3,4	2,1	90,0	100,0
	65-74	Total	N	132	365	273	1.447	107.553	109.770
			%	0,1	0,3	0,2	1,3	98,0	100,0
		I	N	.	.	182	.	7.017	7.199
			%	.	.	2,5	.	97,5	100,0
		II	N	7.225	7.225
			%	100,0	100,0
		III	N	.	257	90	290	22.262	22.899
			%	.	1,1	0,4	1,3	97,2	100,0
		IV	N	132	108	.	912	48.982	50.134
			%	0,3	0,2	.	1,8	97,7	100,0
		V	N	.	.	.	245	22.067	22.312
			%	.	.	.	1,1	98,9	100,0
	>=75	Total	N	220	132	1.071	2.394	137.444	141.261
			%	0,2	0,1	0,8	1,7	97,3	100,0
		I	N	.	.	.	241	5.634	5.875
			%	.	.	.	4,1	95,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Mujeres	>=75	II	N	.	.	.	174	10.117	10.292
			%	.	.	.	1,7	98,3	100,0
		III	N	220	.	351	537	27.360	28.468
			%	0,8	.	1,2	1,9	96,1	100,0
		IV	N	.	132	406	792	62.537	63.866
			%	.	0,2	0,6	1,2	97,9	100,0
	V	N	.	.	315	649	31.796	32.760	
		%	.	.	1,0	2,0	97,1	100,0	
	Total	Total	N	36.152	28.996	70.951	94.524	1.656.734	1.887.356
			%	1,9	1,5	3,8	5,0	87,8	100,0
	15-24	I	N	2.861	2.743	7.916	10.577	194.430	218.528
			%	1,3	1,3	3,6	4,8	89,0	100,0
		II	N	2.432	1.918	5.872	8.398	154.613	173.234
			%	1,4	1,1	3,4	4,8	89,3	100,0
		III	N	7.923	6.988	14.428	19.763	381.359	430.462
			%	1,8	1,6	3,4	4,6	88,6	100,0
		IV	N	19.394	12.213	35.587	46.251	697.302	810.747
			%	2,4	1,5	4,4	5,7	86,0	100,0
V		N	3.541	5.133	7.148	9.535	229.029	254.385	
		%	1,4	2,0	2,8	3,7	90,0	100,0	
Total		Total	N	2.516	5.489	11.163	12.492	150.774	182.434
			%	1,4	3,0	6,1	6,8	82,6	100,0
I		N	814	.	2.394	1.006	24.982	29.196	
		%	2,8	.	8,2	3,4	85,6	100,0	
II		N	.	.	758	816	22.911	24.485	
		%	.	.	3,1	3,3	93,6	100,0	
III		N	194	2.081	1.687	1.818	31.120	36.900	
		%	0,5	5,6	4,6	4,9	84,3	100,0	
IV	N	1.219	2.436	5.066	7.598	58.032	74.351		
	%	1,6	3,3	6,8	10,2	78,1	100,0		
V	N	289	971	1.258	1.254	13.730	17.503		
	%	1,7	5,6	7,2	7,2	78,4	100,0		
Total	Total	N	18.017	14.893	36.037	40.381	547.312	656.640	
		%	2,7	2,3	5,5	6,1	83,4	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	25-44	I	N	776	1.487	3.357	4.576	78.621	88.818
			%	0,9	1,7	3,8	5,2	88,5	100,0
		II	N	2.013	1.714	3.329	4.382	58.283	69.719
			%	2,9	2,5	4,8	6,3	83,6	100,0
		III	N	2.802	3.383	7.859	8.258	121.984	144.286
			%	1,9	2,3	5,4	5,7	84,5	100,0
		IV	N	10.391	7.128	18.605	18.711	216.283	271.117
			%	3,8	2,6	6,9	6,9	79,8	100,0
		V	N	2.035	1.181	2.888	4.454	72.140	82.699
			%	2,5	1,4	3,5	5,4	87,2	100,0
	45-64	Total	N	14.407	7.594	21.194	33.608	539.163	615.965
			%	2,3	1,2	3,4	5,5	87,5	100,0
		I	N	852	1.086	1.703	4.383	61.999	70.023
			%	1,2	1,6	2,4	6,3	88,5	100,0
		II	N	279	205	1.660	2.436	45.632	50.212
			%	0,6	0,4	3,3	4,9	90,9	100,0
		III	N	4.707	1.145	4.226	7.973	136.911	154.963
			%	3,0	0,7	2,7	5,1	88,4	100,0
		IV	N	7.352	2.179	10.918	16.466	217.801	254.716
			%	2,9	0,9	4,3	6,5	85,5	100,0
		V	N	1.217	2.980	2.687	2.348	76.820	86.052
			%	1,4	3,5	3,1	2,7	89,3	100,0
	65-74	Total	N	992	888	1.134	3.945	198.543	205.503
			%	0,5	0,4	0,6	1,9	96,6	100,0
		I	N	420	170	462	227	19.674	20.952
			%	2,0	0,8	2,2	1,1	93,9	100,0
		II	N	141	.	125	250	13.571	14.087
			%	1,0	.	0,9	1,8	96,3	100,0
		III	N	.	380	306	1.176	42.815	44.676
			%	.	0,8	0,7	2,6	95,8	100,0
		IV	N	432	339	241	1.759	95.116	97.887
			%	0,4	0,3	0,2	1,8	97,2	100,0
		V	N	.	.	.	533	27.368	27.901
			%	.	.	.	1,9	98,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	>=75	Total	N 220	132	1.423	4.098	220.942	226.814
			% 0,1	0,1	0,6	1,8	97,4	100,0
I		N	.	.	.	384	9.154	9.538
		%	.	.	.	4,0	96,0	100,0
II		N	.	.	.	514	14.217	14.731
		%	.	.	.	3,5	96,5	100,0
III		N	220	.	351	537	48.530	49.638
		%	0,4	.	0,7	1,1	97,8	100,0
IV		N	.	132	757	1.717	110.070	112.676
		%	.	0,1	0,7	1,5	97,7	100,0
V		N	.	.	315	945	38.971	40.231
		%	.	.	0,8	2,3	96,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres Total	Total	N	23.616	14.839	35.731	54.415	786.523	915.124
		%	2,6	1,6	3,9	5,9	85,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	6.018	3.198	6.318	7.131	187.934	210.600
		%	2,9	1,5	3,0	3,4	89,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	4.959	4.184	8.233	12.649	137.428	167.454
		%	3,0	2,5	4,9	7,6	82,1	100,0
	Secundaria, superior	N	10.853	4.559	16.828	22.417	306.013	360.670
		%	3,0	1,3	4,7	6,2	84,8	100,0
	Terciaria	N	1.786	2.897	4.351	12.218	155.148	176.400
		%	1,0	1,6	2,5	6,9	88,0	100,0
15-24	Total	N	1.836	2.807	3.868	6.173	79.774	94.458
		%	1,9	3,0	4,1	6,5	84,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	511	582	741	8.085	9.918
		%	.	5,2	5,9	7,5	81,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	539	1.202	1.014	2.074	26.299	31.129
		%	1,7	3,9	3,3	6,7	84,5	100,0
	Secundaria, superior	N	1.052	793	2.272	3.358	35.365	42.840
		%	2,5	1,9	5,3	7,8	82,6	100,0
	Terciaria	N	245	301	.	.	10.025	10.572
		%	2,3	2,9	.	.	94,8	100,0
25-44	Total	N	11.049	7.965	19.978	22.690	274.627	336.309
		%	3,3	2,4	5,9	6,7	81,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.280	1.721	2.959	755	30.062	37.776
		%	6,0	4,6	7,8	2,0	79,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.209	2.115	4.862	5.813	37.810	52.808
		%	4,2	4,0	9,2	11,0	71,6	100,0
	Secundaria, superior	N	5.873	2.154	10.127	8.894	137.227	164.274
		%	3,6	1,3	6,2	5,4	83,5	100,0
	Terciaria	N	688	1.976	2.030	7.229	69.528	81.451
		%	0,8	2,4	2,5	8,9	85,4	100,0
45-64	Total	N	9.870	3.543	10.672	21.350	257.220	302.655
		%	3,3	1,2	3,5	7,1	85,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.605	844	2.450	3.433	60.067	70.400
		%	5,1	1,2	3,5	4,9	85,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	1.903	868	2.091	4.762	43.620	53.244
			%	3,6	1,6	3,9	8,9	81,9	100,0
		Secundaria, superior	N	3.645	1.212	4.088	9.179	99.006	117.130
			%	3,1	1,0	3,5	7,8	84,5	100,0
		Terciaria	N	717	620	2.042	3.975	54.526	61.881
			%	1,2	1,0	3,3	6,4	88,1	100,0
	65-74	Total	N	861	523	861	2.498	90.990	95.733
			%	0,9	0,5	0,9	2,6	95,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	133	123	241	981	36.538	38.017
			%	0,4	0,3	0,6	2,6	96,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	308	.	.	.	15.984	16.291
			%	1,9	.	.	.	98,1	100,0
		Secundaria, superior	N	283	400	341	986	23.937	25.948
			%	1,1	1,5	1,3	3,8	92,3	100,0
		Terciaria	N	136	.	279	530	14.531	15.477
			%	0,9	.	1,8	3,4	93,9	100,0
	>=75	Total	N	.	.	352	1.703	83.913	85.968
			%	.	.	0,4	2,0	97,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	.	85	1.221	53.183	54.489	
		%	.	.	0,2	2,2	97,6	100,0	
	Secundaria, inferior	N	.	.	266	.	13.715	13.981	
		%	.	.	1,9	.	98,1	100,0	
	Secundaria, superior	N	10.478	10.478	
		%	100,0	100,0	
	Terciaria	N	.	.	.	483	6.537	7.020	
		%	.	.	.	6,9	93,1	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	12.535	14.157	35.220	40.577	873.394	975.882
			%	1,3	1,5	3,6	4,2	89,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.527	1.860	6.024	4.847	263.071	278.327
			%	0,9	0,7	2,2	1,7	94,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.869	2.800	6.088	7.814	150.195	169.766
			%	1,7	1,6	3,6	4,6	88,5	100,0
		Secundaria, superior	N	4.542	6.302	15.663	16.606	264.754	307.866
			%	1,5	2,0	5,1	5,4	86,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N	2.598	3.196	7.445	11.310	195.375	219.923
			%	1,2	1,5	3,4	5,1	88,8	100,0
	15-24	Total	N	679	2.682	7.295	6.786	72.057	89.499
			%	0,8	3,0	8,2	7,6	80,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	263	635	767	9.721	11.386
			%	.	2,3	5,6	6,7	85,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	512	.	1.121	415	14.714	16.763
			%	3,1	.	6,7	2,5	87,8	100,0
		Secundaria, superior	N	167	2.043	4.525	4.336	34.371	45.443
			%	0,4	4,5	10,0	9,5	75,6	100,0
		Terciaria	N	.	376	1.013	1.267	13.250	15.907
			%	.	2,4	6,4	8,0	83,3	100,0
	25-44	Total	N	6.967	6.927	16.059	17.691	273.180	320.826
				%	2,2	2,2	5,0	5,5	85,1
		Sin estudios, primaria	N	1.583	517	1.754	862	21.273	25.990
			%	6,1	2,0	6,7	3,3	81,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.355	1.330	2.839	2.722	30.691	38.937
			%	3,5	3,4	7,3	7,0	78,8	100,0
		Secundaria, superior	N	2.448	3.013	7.284	7.979	109.763	130.487
			%	1,9	2,3	5,6	6,1	84,1	100,0
		Terciaria	N	1.581	2.066	4.182	6.129	111.453	125.412
			%	1,3	1,6	3,3	4,9	88,9	100,0
	45-64	Total	N	4.537	4.051	10.522	12.258	282.402	313.769
				%	1,4	1,3	3,4	3,9	90,0
		Sin estudios, primaria	N	723	840	2.824	1.581	71.996	77.963
			%	0,9	1,1	3,6	2,0	92,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.002	1.213	1.962	3.423	54.135	61.735
			%	1,6	2,0	3,2	5,5	87,7	100,0
		Secundaria, superior	N	1.795	1.245	3.669	4.021	99.592	110.322
			%	1,6	1,1	3,3	3,6	90,3	100,0
		Terciaria	N	1.017	753	2.067	3.233	56.679	63.749
			%	1,6	1,2	3,2	5,1	88,9	100,0
	65-74	Total	N	132	365	273	1.447	107.708	109.925
				%	0,1	0,3	0,2	1,3	98,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	.	108	90	801	60.852	61.852	
			%	.	0,2	0,1	1,3	98,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	257	.	170	27.025	27.452	
			%	.	0,9	.	0,6	98,4	100,0	
		Secundaria, superior	N	132	.	.	270	11.492	11.893	
			%	1,1	.	.	2,3	96,6	100,0	
	Terciaria	N	.	.	182	206	8.339	8.727		
		%	.	.	2,1	2,4	95,6	100,0		
	>=75	Total	N	220	132	1.071	2.394	138.047	141.864	
			%	0,2	0,1	0,8	1,7	97,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	220	132	721	836	99.228	101.136	
			%	0,2	0,1	0,7	0,8	98,1	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	.	166	1.084	23.629	24.879	
			%	.	.	0,7	4,4	95,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	.	184	.	9.536	9.720	
			%	.	.	1,9	.	98,1	100,0	
		Terciaria	N	.	.	.	475	5.654	6.129	
			%	.	.	.	7,7	92,3	100,0	
Ambos		Total	Total	N	36.152	28.996	70.951	94.991	1.659.917	1.891.006
				%	1,9	1,5	3,8	5,0	87,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	8.545	5.058	12.342	11.977	451.005	488.927		
		%	1,7	1,0	2,5	2,4	92,2	100,0		
	Secundaria, inferior	N	7.828	6.984	14.322	20.464	287.623	337.220		
		%	2,3	2,1	4,2	6,1	85,3	100,0		
	Secundaria, superior	N	15.395	10.860	32.491	39.023	570.767	668.536		
		%	2,3	1,6	4,9	5,8	85,4	100,0		
	Terciaria	N	4.384	6.093	11.796	23.527	350.523	396.323		
		%	1,1	1,5	3,0	5,9	88,4	100,0		
	15-24	Total	N	2.516	5.489	11.163	12.959	151.830	183.958	
			%	1,4	3,0	6,1	7,0	82,5	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	.	774	1.217	1.508	17.806	21.304	
			%	.	3,6	5,7	7,1	83,6	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.052	1.202	2.135	2.490	41.013	47.891	
			%	2,2	2,5	4,5	5,2	85,6	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	1.219	2.836	6.798	7.695	69.736	88.283
			%	1,4	3,2	7,7	8,7	79,0	100,0
		Terciaria	N	245	677	1.013	1.267	23.275	26.479
			%	0,9	2,6	3,8	4,8	87,9	100,0
	25-44	Total	N	18.017	14.893	36.037	40.381	547.807	657.135
			%	2,7	2,3	5,5	6,1	83,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.863	2.238	4.713	1.616	51.335	63.765
			%	6,1	3,5	7,4	2,5	80,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.564	3.445	7.701	8.535	68.501	91.745
			%	3,9	3,8	8,4	9,3	74,7	100,0
		Secundaria, superior	N	8.321	5.167	17.411	16.872	246.989	294.762
			%	2,8	1,8	5,9	5,7	83,8	100,0
		Terciaria	N	2.269	4.043	6.212	13.358	180.981	206.862
			%	1,1	2,0	3,0	6,5	87,5	100,0
	45-64	Total	N	14.407	7.594	21.194	33.608	539.622	616.424
			%	2,3	1,2	3,4	5,5	87,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.328	1.683	5.274	5.014	132.062	148.363
			%	2,9	1,1	3,6	3,4	89,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.905	2.081	4.053	8.185	97.755	114.979
			%	2,5	1,8	3,5	7,1	85,0	100,0
		Secundaria, superior	N	5.440	2.457	7.757	13.200	198.599	227.452
			%	2,4	1,1	3,4	5,8	87,3	100,0
		Terciaria	N	1.734	1.373	4.109	7.208	111.205	125.630
			%	1,4	1,1	3,3	5,7	88,5	100,0
	65-74	Total	N	992	888	1.134	3.945	198.698	205.658
			%	0,5	0,4	0,6	1,9	96,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	133	232	332	1.783	97.390	99.869
			%	0,1	0,2	0,3	1,8	97,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	308	257	.	170	43.009	43.744
			%	0,7	0,6	.	0,4	98,3	100,0
		Secundaria, superior	N	415	400	341	1.256	35.429	37.841
			%	1,1	1,1	0,9	3,3	93,6	100,0
		Terciaria	N	136	.	462	736	22.870	24.204
			%	0,6	.	1,9	3,0	94,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	N	220	132	1.423	4.098	221.960	227.832
			%	0,1	0,1	0,6	1,8	97,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	220	132	806	2.056	152.411	155.625
			%	0,1	0,1	0,5	1,3	97,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	432	1.084	37.344	38.860
			%	.	.	1,1	2,8	96,1	100,0
		Secundaria, superior	N	.	.	184	.	20.013	20.198
			%	.	.	0,9	.	99,1	100,0
		Terciaria	N	.	.	.	957	12.191	13.149
			%	.	.	.	7,3	92,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 134. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

			No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	334.986	347.132	233.006	915.124
			%	36,6	37,9	25,5	100,0
		Araba	N	46.183	57.759	29.809	133.751
			%	34,5	43,2	22,3	100,0
		Gipuzkoa	N	101.989	112.175	79.647	293.812
			%	34,7	38,2	27,1	100,0
		Bizkaia	N	186.815	177.198	123.549	487.561
			%	38,3	36,3	25,3	100,0
	15-24	CAPV	N	54.668	23.417	16.373	94.458
			%	57,9	24,8	17,3	100,0
		Araba	N	7.795	4.640	2.435	14.869
			%	52,4	31,2	16,4	100,0
		Gipuzkoa	N	17.259	7.695	6.350	31.305
			%	55,1	24,6	20,3	100,0
		Bizkaia	N	29.614	11.081	7.589	48.284
			%	61,3	23,0	15,7	100,0
	25-44	CAPV	N	141.046	122.706	72.557	336.309
			%	41,9	36,5	21,6	100,0
		Araba	N	20.771	22.470	8.821	52.062
			%	39,9	43,2	16,9	100,0
		Gipuzkoa	N	42.823	37.505	26.462	106.790
			%	40,1	35,1	24,8	100,0
		Bizkaia	N	77.452	62.732	37.274	177.458
			%	43,6	35,4	21,0	100,0
	45-64	CAPV	N	80.831	122.261	99.563	302.655
			%	26,7	40,4	32,9	100,0
		Araba	N	10.489	18.012	14.250	42.751
			%	24,5	42,1	33,3	100,0
		Gipuzkoa	N	25.137	39.664	32.617	97.419
			%	25,8	40,7	33,5	100,0
		Bizkaia	N	45.205	64.585	52.695	162.485
			%	27,8	39,7	32,4	100,0
	65-74	CAPV	N	24.599	40.160	30.975	95.733
			%	25,7	41,9	32,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 134. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total	
Hombres 65-74	Araba	N		3.367	6.827	2.969	13.163	
		%		25,6	51,9	22,6	100,0	
	Gipuzkoa	N		7.022	15.176	9.932	32.130	
		%		21,9	47,2	30,9	100,0	
	Bizkaia	N		14.210	18.157	18.074	50.440	
		%		28,2	36,0	35,8	100,0	
	>=75	CAPV	N		33.842	38.588	13.538	85.968
			%		39,4	44,9	15,7	100,0
		Araba	N		3.760	5.809	1.335	10.905
			%		34,5	53,3	12,2	100,0
		Gipuzkoa	N		9.748	12.135	4.285	26.168
			%		37,3	46,4	16,4	100,0
Bizkaia		N		20.334	20.643	7.917	48.895	
		%		41,6	42,2	16,2	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	611.630	223.067	141.185	975.882
			%		62,7	22,9	14,5	100,0
		Araba	N		84.216	33.381	19.174	136.772
			%		61,6	24,4	14,0	100,0
	Gipuzkoa	N		188.701	76.638	47.347	312.686	
		%		60,3	24,5	15,1	100,0	
	Bizkaia	N		338.713	113.048	74.665	526.425	
		%		64,3	21,5	14,2	100,0	
	15-24	CAPV	N		57.024	16.427	16.049	89.499
			%		63,7	18,4	17,9	100,0
		Araba	N		7.475	2.979	2.756	13.210
			%		56,6	22,6	20,9	100,0
		Gipuzkoa	N		19.919	3.469	6.055	29.443
			%		67,7	11,8	20,6	100,0
	Bizkaia	N		29.630	9.978	7.238	46.846	
		%		63,2	21,3	15,4	100,0	
	25-44	CAPV	N		198.077	71.562	51.187	320.826
			%		61,7	22,3	16,0	100,0
Araba		N		27.069	12.249	8.550	47.869	
		%		56,5	25,6	17,9	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 134. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	62.735	21.132	18.038	101.905
			%	61,6	20,7	17,7	100,0
		Bizkaia	N	108.273	38.180	24.599	171.052
			%	63,3	22,3	14,4	100,0
	45-64	CAPV	N	171.555	84.811	57.403	313.769
			%	54,7	27,0	18,3	100,0
		Araba	N	25.027	13.032	6.204	44.263
			%	56,5	29,4	14,0	100,0
		Gipuzkoa	N	50.501	31.456	17.705	99.662
			%	50,7	31,6	17,8	100,0
		Bizkaia	N	96.027	40.322	33.494	169.843
			%	56,5	23,7	19,7	100,0
	65-74	CAPV	N	74.955	24.028	10.941	109.925
			%	68,2	21,9	10,0	100,0
		Araba	N	10.645	2.669	1.006	14.320
			%	74,3	18,6	7,0	100,0
		Gipuzkoa	N	23.053	9.651	3.416	36.120
			%	63,8	26,7	9,5	100,0
		Bizkaia	N	41.258	11.708	6.519	59.484
			%	69,4	19,7	11,0	100,0
	>=75	CAPV	N	110.020	26.240	5.604	141.864
			%	77,6	18,5	4,0	100,0
		Araba	N	14.001	2.451	657	17.110
			%	81,8	14,3	3,8	100,0
		Gipuzkoa	N	32.493	10.930	2.132	45.555
			%	71,3	24,0	4,7	100,0
		Bizkaia	N	63.525	12.860	2.815	79.200
			%	80,2	16,2	3,6	100,0
Ambos	Total	CAPV	N	946.616	570.199	374.191	1.891.006
			%	50,1	30,2	19,8	100,0
		Araba	N	130.399	91.140	48.983	270.523
			%	48,2	33,7	18,1	100,0
		Gipuzkoa	N	290.690	188.813	126.994	606.497
			%	47,9	31,1	20,9	100,0
		Bizkaia	N	525.527	290.246	198.214	1.013.987
			%				

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 134. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Ambos	Total	Bizkaia	%	51,8	28,6	19,5	100,0
	15-24	CAPV	N	111.692	39.844	32.422	183.958
			%	60,7	21,7	17,6	100,0
		Araba	N	15.270	7.619	5.191	28.079
			%	54,4	27,1	18,5	100,0
		Gipuzkoa	N	37.178	11.165	12.405	60.748
			%	61,2	18,4	20,4	100,0
		Bizkaia	N	59.244	21.060	14.826	95.130
			%	62,3	22,1	15,6	100,0
	25-44	CAPV	N	339.122	194.268	123.744	657.135
			%	51,6	29,6	18,8	100,0
		Araba	N	47.840	34.719	17.371	99.930
			%	47,9	34,7	17,4	100,0
		Gipuzkoa	N	105.557	58.637	44.500	208.695
			%	50,6	28,1	21,3	100,0
		Bizkaia	N	185.725	100.912	61.873	348.509
			%	53,3	29,0	17,8	100,0
	45-64	CAPV	N	252.386	207.072	156.966	616.424
			%	40,9	33,6	25,5	100,0
		Araba	N	35.516	31.044	20.454	87.015
			%	40,8	35,7	23,5	100,0
		Gipuzkoa	N	75.638	71.120	50.323	197.081
			%	38,4	36,1	25,5	100,0
		Bizkaia	N	141.232	104.907	86.189	332.328
			%	42,5	31,6	25,9	100,0
	65-74	CAPV	N	99.554	64.188	41.916	205.658
			%	48,4	31,2	20,4	100,0
		Araba	N	14.012	9.497	3.975	27.483
			%	51,0	34,6	14,5	100,0
		Gipuzkoa	N	30.076	24.826	13.349	68.251
			%	44,1	36,4	19,6	100,0
		Bizkaia	N	55.467	29.864	24.593	109.924
			%	50,5	27,2	22,4	100,0
	>=75	CAPV	N	143.862	64.828	19.142	227.832
			%	63,1	28,5	8,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 134. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Ambos	>=75	Araba	N	17.762	8.261	1.992	28.015
			%	63,4	29,5	7,1	100,0
		Gipuzkoa	N	42.241	23.065	6.417	71.723
			%	58,9	32,2	8,9	100,0
		Bizkaia	N	83.859	33.502	10.733	128.094
			%	65,5	26,2	8,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 135. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Hombres	Total	Total	N	334.726	346.844	232.293	913.863
			%	36,6	38,0	25,4	100,0
	I	Total	N	34.433	47.063	32.193	113.690
			%	30,3	41,4	28,3	100,0
	II	Total	N	29.536	26.722	21.948	78.206
			%	37,8	34,2	28,1	100,0
	III	Total	N	65.018	72.409	50.928	188.355
			%	34,5	38,4	27,0	100,0
	IV	Total	N	172.722	169.385	108.199	450.306
			%	38,4	37,6	24,0	100,0
	V	Total	N	33.017	31.265	19.025	83.307
			%	39,6	37,5	22,8	100,0
	15-24	Total	N	54.408	23.417	16.075	93.900
			%	57,9	24,9	17,1	100,0
	I	Total	N	7.932	4.776	1.926	14.634
			%	54,2	32,6	13,2	100,0
	II	Total	N	4.928	3.956	2.104	10.988
			%	44,8	36,0	19,1	100,0
	III	Total	N	10.904	3.448	2.478	16.830
			%	64,8	20,5	14,7	100,0
	IV	Total	N	27.233	8.795	6.709	42.737
			%	63,7	20,6	15,7	100,0
	V	Total	N	3.411	2.442	2.858	8.711
			%	39,2	28,0	32,8	100,0
	25-44	Total	N	141.046	122.706	72.557	336.309
			%	41,9	36,5	21,6	100,0
	I	Total	N	14.994	17.518	11.221	43.732
			%	34,3	40,1	25,7	100,0
	II	Total	N	14.183	10.258	8.056	32.496
			%	43,6	31,6	24,8	100,0
	III	Total	N	24.176	24.518	13.562	62.257
			%	38,8	39,4	21,8	100,0
	IV	Total	N	69.575	58.078	32.739	160.392
			%	43,4	36,2	20,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 135. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

		No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Hombres	25-44 V	N 18.118	12.334	6.980	37.432
		% 48,4	33,0	18,6	100,0
	45-64 Total	N 80.831	121.974	99.563	302.368
		% 26,7	40,3	32,9	100,0
	I	N 7.536	17.182	13.189	37.907
		% 19,9	45,3	34,8	100,0
	II	N 6.753	8.112	8.555	23.419
		% 28,8	34,6	36,5	100,0
	III	N 16.450	25.870	24.002	66.322
		% 24,8	39,0	36,2	100,0
	IV	N 43.262	60.212	47.140	150.614
		% 28,7	40,0	31,3	100,0
	V	N 6.831	10.599	6.676	24.106
		% 28,3	44,0	27,7	100,0
	65-74 Total	N 24.599	40.160	30.975	95.733
		% 25,7	41,9	32,4	100,0
	I	N 3.183	5.261	5.309	13.753
		% 23,1	38,3	38,6	100,0
	II	N 2.135	1.994	2.733	6.862
		% 31,1	29,1	39,8	100,0
	III	N 4.587	9.259	7.930	21.777
		% 21,1	42,5	36,4	100,0
	IV	N 12.899	20.927	13.926	47.753
		% 27,0	43,8	29,2	100,0
	V	N 1.794	2.718	1.076	5.588
		% 32,1	48,6	19,3	100,0
	>=75 Total	N 33.842	38.588	13.123	85.553
		% 39,6	45,1	15,3	100,0
	I	N 790	2.326	547	3.663
		% 21,6	63,5	14,9	100,0
	II	N 1.537	2.402	500	4.440
		% 34,6	54,1	11,3	100,0
	III	N 8.900	9.313	2.956	21.169
		% 42,0	44,0	14,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 135. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

			No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total	
Hombres >=75	IV	N	19.753	21.373	7.684	48.810	
		%	40,5	43,8	15,7	100,0	
	V	N	2.863	3.172	1.435	7.470	
		%	38,3	42,5	19,2	100,0	
Mujeres	Total	N	609.700	222.814	140.978	973.492	
		%	62,6	22,9	14,5	100,0	
	I	N	51.141	26.322	27.375	104.838	
		%	48,8	25,1	26,1	100,0	
	II	N	53.397	25.199	16.432	95.028	
		%	56,2	26,5	17,3	100,0	
	III	N	141.203	58.358	42.546	242.107	
		%	58,3	24,1	17,6	100,0	
	IV	N	236.798	81.713	41.931	360.441	
		%	65,7	22,7	11,6	100,0	
	V	N	127.161	31.221	12.695	171.077	
		%	74,3	18,2	7,4	100,0	
	15-24	Total	N	56.519	16.173	15.842	88.533
			%	63,8	18,3	17,9	100,0
	I	N	7.807	3.036	3.719	14.562	
		%	53,6	20,8	25,5	100,0	
	II	N	9.514	1.402	2.581	13.497	
		%	70,5	10,4	19,1	100,0	
	III	N	10.565	4.921	4.584	20.069	
		%	52,6	24,5	22,8	100,0	
IV	N	21.456	6.003	4.154	31.614		
	%	67,9	19,0	13,1	100,0		
V	N	7.177	811	804	8.792		
	%	81,6	9,2	9,1	100,0		
25-44	Total	N	197.582	71.562	51.187	320.330	
		%	61,7	22,3	16,0	100,0	
I	N	25.910	7.615	11.561	45.086		
	%	57,5	16,9	25,6	100,0		
II	N	20.931	10.670	5.622	37.223		
	%	56,2	28,7	15,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 135. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total	
Mujeres	25-44	III	N	51.770	16.857	13.403	82.029	
			%	63,1	20,5	16,3	100,0	
		IV	N	68.775	25.835	16.115	110.725	
			%	62,1	23,3	14,6	100,0	
		V	N	30.196	10.585	4.486	45.267	
			%	66,7	23,4	9,9	100,0	
	45-64	Total	N	171.384	84.811	57.403	313.598	
			%	54,7	27,0	18,3	100,0	
		I	N	10.669	11.227	10.220	32.116	
			%	33,2	35,0	31,8	100,0	
		II	N	11.656	8.249	6.887	26.792	
			%	43,5	30,8	25,7	100,0	
		III	N	44.827	23.937	19.877	88.641	
			%	50,6	27,0	22,4	100,0	
		IV	N	59.449	29.669	14.984	104.102	
			%	57,1	28,5	14,4	100,0	
		V	N	44.783	11.729	5.434	61.946	
			%	72,3	18,9	8,8	100,0	
		65-74	Total	N	74.800	24.028	10.941	109.770
				%	68,1	21,9	10,0	100,0
			I	N	3.777	2.285	1.137	7.199
				%	52,5	31,7	15,8	100,0
			II	N	4.587	1.792	846	7.225
				%	63,5	24,8	11,7	100,0
III			N	12.239	7.197	3.464	22.899	
			%	53,4	31,4	15,1	100,0	
IV			N	36.726	8.955	4.454	50.134	
			%	73,3	17,9	8,9	100,0	
V			N	17.472	3.799	1.041	22.312	
			%	78,3	17,0	4,7	100,0	
>=75	Total		N	109.416	26.240	5.604	141.261	
			%	77,5	18,6	4,0	100,0	
	I		N	2.978	2.159	738	5.875	
			%	50,7	36,7	12,6	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 135. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total	
Mujeres	>=75	II	N	6.710	3.086	496	10.292	
			%	65,2	30,0	4,8	100,0	
		III	N	21.803	5.447	1.218	28.468	
			%	76,6	19,1	4,3	100,0	
		IV	N	50.392	11.251	2.223	63.866	
			%	78,9	17,6	3,5	100,0	
	V	N	27.534	4.297	930	32.760		
		%	84,0	13,1	2,8	100,0		
	Total	Total N	944.427	569.658	373.271	1.887.356		
		%	50,0	30,2	19,8	100,0		
		I	N	85.575	73.385	59.568	218.528	
			%	39,2	33,6	27,3	100,0	
			II	N	82.933	51.921	38.380	173.234
				%	47,9	30,0	22,2	100,0
			III	N	206.221	130.767	93.474	430.462
				%	47,9	30,4	21,7	100,0
		IV	N	409.519	251.099	150.129	810.747	
			%	50,5	31,0	18,5	100,0	
V		N	160.179	62.486	31.720	254.385		
		%	63,0	24,6	12,5	100,0		
15-24		Total	N	110.927	39.590	31.917	182.434	
			%	60,8	21,7	17,5	100,0	
		I	N	15.739	7.812	5.645	29.196	
			%	53,9	26,8	19,3	100,0	
		II	N	14.442	5.358	4.685	24.485	
			%	59,0	21,9	19,1	100,0	
		III	N	21.469	8.369	7.062	36.900	
			%	58,2	22,7	19,1	100,0	
	IV	N	48.690	14.798	10.863	74.351		
		%	65,5	19,9	14,6	100,0		
	V	N	10.587	3.253	3.662	17.503		
		%	60,5	18,6	20,9	100,0		
Total	N	338.627	194.268	123.744	656.640			
	%	51,6	29,6	18,8	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 135. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

			No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Ambos	25-44 I	N	40.904	25.133	22.781	88.818
		%	46,1	28,3	25,6	100,0
	II	N	35.113	20.928	13.678	69.719
		%	50,4	30,0	19,6	100,0
	III	N	75.946	41.375	26.965	144.286
		%	52,6	28,7	18,7	100,0
	IV	N	138.350	83.913	48.854	271.117
		%	51,0	31,0	18,0	100,0
	V	N	48.314	22.919	11.466	82.699
		%	58,4	27,7	13,9	100,0
	45-64 Total	N	252.215	206.784	156.966	615.965
		%	40,9	33,6	25,5	100,0
	I	N	18.205	28.409	23.410	70.023
		%	26,0	40,6	33,4	100,0
	II	N	18.408	16.361	15.442	50.212
		%	36,7	32,6	30,8	100,0
	III	N	61.277	49.807	43.879	154.963
		%	39,5	32,1	28,3	100,0
	IV	N	102.711	89.881	62.124	254.716
		%	40,3	35,3	24,4	100,0
	V	N	51.614	22.328	12.110	86.052
		%	60,0	25,9	14,1	100,0
	65-74 Total	N	99.399	64.188	41.916	205.503
		%	48,4	31,2	20,4	100,0
	I	N	6.959	7.546	6.447	20.952
		%	33,2	36,0	30,8	100,0
	II	N	6.722	3.786	3.579	14.087
		%	47,7	26,9	25,4	100,0
	III	N	16.826	16.456	11.394	44.676
		%	37,7	36,8	25,5	100,0
	IV	N	49.625	29.882	18.380	97.887
		%	50,7	30,5	18,8	100,0
	V	N	19.266	6.517	2.117	27.901
		%	69,1	23,4	7,6	100,0
	>=75 Total	N	143.259	64.828	18.727	226.814

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 135. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Ambos	>=75	Total	%	63,2	28,6	8,3	100,0
		I	N	3.768	4.485	1.285	9.538
			%	39,5	47,0	13,5	100,0
		II	N	8.247	5.488	996	14.731
			%	56,0	37,3	6,8	100,0
		III	N	30.703	14.760	4.174	49.638
			%	61,9	29,7	8,4	100,0
		IV	N	70.144	32.625	9.907	112.676
			%	62,3	29,0	8,8	100,0
		V	N	30.396	7.469	2.365	40.231
			%	75,6	18,6	5,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 136. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

			No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Hombres Total	Total	N	334.986	347.132	233.006	915.124
		%	36,6	37,9	25,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	84.773	76.575	49.251	210.600
		%	40,3	36,4	23,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	71.435	60.943	35.076	167.454
		%	42,7	36,4	20,9	100,0
	Secundaria, superior	N	127.203	137.857	95.611	360.670
		%	35,3	38,2	26,5	100,0
	Terciaria	N	51.575	71.757	53.068	176.400
		%	29,2	40,7	30,1	100,0
15-24	Total	N	54.668	23.417	16.373	94.458
		%	57,9	24,8	17,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	8.327	1.346	245	9.918
		%	84,0	13,6	2,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	23.532	3.132	4.465	31.129
		%	75,6	10,1	14,3	100,0
	Secundaria, superior	N	18.214	15.807	8.819	42.840
		%	42,5	36,9	20,6	100,0
	Terciaria	N	4.595	3.131	2.845	10.572
		%	43,5	29,6	26,9	100,0
25-44	Total	N	141.046	122.706	72.557	336.309
		%	41,9	36,5	21,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	20.598	10.228	6.949	37.776
		%	54,5	27,1	18,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	24.578	18.909	9.322	52.808
		%	46,5	35,8	17,7	100,0
	Secundaria, superior	N	68.392	61.106	34.776	164.274
		%	41,6	37,2	21,2	100,0
	Terciaria	N	27.478	32.463	21.509	81.451
		%	33,7	39,9	26,4	100,0
45-64	Total	N	80.831	122.261	99.563	302.655
		%	26,7	40,4	32,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	21.987	24.943	23.470	70.400
		%	31,2	35,4	33,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 136. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total		
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	13.727	24.569	14.948	53.244		
			%	25,8	46,1	28,1	100,0		
		Secundaria, superior	N	30.579	47.057	39.495	117.130		
			%	26,1	40,2	33,7	100,0		
		Terciaria	N	14.538	25.693	21.650	61.881		
			%	23,5	41,5	35,0	100,0		
		65-74	Total	N	24.599	40.160	30.975	95.733	
				%	25,7	41,9	32,4	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	10.269	17.709	10.039	38.017	
				%	27,0	46,6	26,4	100,0	
			Secundaria, inferior	N	5.408	6.968	3.915	16.291	
				%	33,2	42,8	24,0	100,0	
			Secundaria, superior	N	5.960	9.449	10.539	25.948	
				%	23,0	36,4	40,6	100,0	
			Terciaria	N	2.962	6.034	6.481	15.477	
				%	19,1	39,0	41,9	100,0	
			>=75	Total	N	33.842	38.588	13.538	85.968
					%	39,4	44,9	15,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	23.592	22.350	8.547	54.489		
			%	43,3	41,0	15,7	100,0		
		Secundaria, inferior	N	4.190	7.365	2.425	13.981		
			%	30,0	52,7	17,3	100,0		
		Secundaria, superior	N	4.058	4.437	1.982	10.478		
			%	38,7	42,4	18,9	100,0		
		Terciaria	N	2.002	4.435	583	7.020		
			%	28,5	63,2	8,3	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	611.630	223.067	141.185	975.882		
			%	62,7	22,9	14,5	100,0		
			Sin estudios, primaria	N	210.784	48.092	19.452	278.327	
				%	75,7	17,3	7,0	100,0	
			Secundaria, inferior	N	110.640	39.970	19.157	169.766	
				%	65,2	23,5	11,3	100,0	
			Secundaria, superior	N	176.715	78.204	52.946	307.866	
				%	57,4	25,4	17,2	100,0	
			Terciaria	N	113.491	56.802	49.630	219.923	
				%					

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 136. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

			No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total	
Mujeres	Total	Terciaria	%	51,6	25,8	22,6	100,0
	15-24	Total	N	57.024	16.427	16.049	89.499
			%	63,7	18,4	17,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	10.706	439	241	11.386
			%	94,0	3,9	2,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	11.917	3.393	1.453	16.763
			%	71,1	20,2	8,7	100,0
		Secundaria, superior	N	26.402	10.082	8.959	45.443
			%	58,1	22,2	19,7	100,0
		Terciaria	N	7.998	2.513	5.396	15.907
			%	50,3	15,8	33,9	100,0
	25-44	Total	N	198.077	71.562	51.187	320.826
			%	61,7	22,3	16,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	17.906	4.657	3.426	25.990
			%	68,9	17,9	13,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	24.414	9.292	5.231	38.937
			%	62,7	23,9	13,4	100,0
		Secundaria, superior	N	83.953	28.629	17.905	130.487
			%	64,3	21,9	13,7	100,0
		Terciaria	N	71.803	28.985	24.624	125.412
			%	57,3	23,1	19,6	100,0
	45-64	Total	N	171.555	84.811	57.403	313.769
			%	54,7	27,0	18,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	53.971	17.299	6.693	77.963
			%	69,2	22,2	8,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	37.419	14.500	9.816	61.735
			%	60,6	23,5	15,9	100,0
		Secundaria, superior	N	54.689	32.458	23.175	110.322
			%	49,6	29,4	21,0	100,0
		Terciaria	N	25.476	20.554	17.719	63.749
			%	40,0	32,2	27,8	100,0
	65-74	Total	N	74.955	24.028	10.941	109.925
			%	68,2	21,9	10,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	45.575	10.443	5.834	61.852
			%	73,7	16,9	9,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 136. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total	
Mujeres	65-74	Secundaria, inferior	N	17.389	8.035	2.028	27.452	
			%	63,3	29,3	7,4	100,0	
		Secundaria, superior	N	7.020	3.251	1.622	11.893	
			%	59,0	27,3	13,6	100,0	
		Terciaria	N	4.971	2.298	1.457	8.727	
			%	57,0	26,3	16,7	100,0	
	>=75	Total	N	110.020	26.240	5.604	141.864	
			%	77,6	18,5	4,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	82.626	15.253	3.257	101.136	
			%	81,7	15,1	3,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	19.501	4.750	628	24.879	
			%	78,4	19,1	2,5	100,0	
	Secundaria, superior	N	4.650	3.785	1.285	9.720		
		%	47,8	38,9	13,2	100,0		
	Terciaria	N	3.243	2.452	434	6.129		
		%	52,9	40,0	7,1	100,0		
	Ambos	Total	Total	N	946.616	570.199	374.191	1.891.006
				%	50,1	30,2	19,8	100,0
Sin estudios, primaria		N	295.557	124.667	68.703	488.927		
		%	60,5	25,5	14,1	100,0		
Secundaria, inferior		N	182.076	100.912	54.232	337.220		
		%	54,0	29,9	16,1	100,0		
Secundaria, superior		N	303.918	216.061	148.557	668.536		
		%	45,5	32,3	22,2	100,0		
Terciaria		N	165.066	128.559	102.699	396.323		
		%	41,6	32,4	25,9	100,0		
15-24		Total	N	111.692	39.844	32.422	183.958	
			%	60,7	21,7	17,6	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	19.032	1.785	486	21.304	
			%	89,3	8,4	2,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	35.449	6.525	5.917	47.891	
			%	74,0	13,6	12,4	100,0	
Secundaria, superior		N	44.617	25.889	17.778	88.283		
		%	50,5	29,3	20,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 136. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Ambos	15-24	Terciaria	N	12.593	5.644	8.241	26.479
			%	47,6	21,3	31,1	100,0
	25-44	Total	N	339.122	194.268	123.744	657.135
			%	51,6	29,6	18,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	38.505	14.885	10.376	63.765
			%	60,4	23,3	16,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	48.992	28.200	14.553	91.745
			%	53,4	30,7	15,9	100,0
		Secundaria, superior	N	152.345	89.735	52.682	294.762
			%	51,7	30,4	17,9	100,0
		Terciaria	N	99.281	61.448	46.134	206.862
			%	48,0	29,7	22,3	100,0
	45-64	Total	N	252.386	207.072	156.966	616.424
			%	40,9	33,6	25,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	75.958	42.242	30.163	148.363
			%	51,2	28,5	20,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	51.146	39.069	24.765	114.979
			%	44,5	34,0	21,5	100,0
		Secundaria, superior	N	85.268	79.515	62.669	227.452
			%	37,5	35,0	27,6	100,0
		Terciaria	N	40.014	46.247	39.369	125.630
			%	31,9	36,8	31,3	100,0
	65-74	Total	N	99.554	64.188	41.916	205.658
			%	48,4	31,2	20,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	55.844	28.152	15.874	99.869
			%	55,9	28,2	15,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	22.797	15.003	5.943	43.744
			%	52,1	34,3	13,6	100,0
		Secundaria, superior	N	12.980	12.700	12.161	37.841
			%	34,3	33,6	32,1	100,0
		Terciaria	N	7.933	8.332	7.938	24.204
			%	32,8	34,4	32,8	100,0
	>=75	Total	N	143.862	64.828	19.142	227.832
			%	63,1	28,5	8,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 136. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Ambos	>=75	Sin estudios, primaria	N	106.218	37.603	11.804	155.625
			%	68,3	24,2	7,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	23.691	12.115	3.054	38.860
			%	61,0	31,2	7,9	100,0
		Secundaria, superior	N	8.708	8.222	3.267	20.198
			%	43,1	40,7	16,2	100,0
		Terciaria	N	5.245	6.887	1.017	13.149
			%	39,9	52,4	7,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 137. Proporción (%) de personas con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	25,5	22,3	27,1	25,3
	15-24	17,3	16,4	20,3	15,7
	25-44	21,6	16,9	24,8	21,0
	45-64	32,9	33,3	33,5	32,4
	65-74	32,4	22,6	30,9	35,8
	>=75	15,7	12,2	16,4	16,2
	Mujeres	Total	14,5	14,0	15,1
	15-24	17,9	20,9	20,6	15,4
	25-44	16,0	17,9	17,7	14,4
	45-64	18,3	14,0	17,8	19,7
	65-74	10,0	7,0	9,5	11,0
	>=75	4,0	3,8	4,7	3,6
Ambos sexos	Total	19,8	18,1	20,9	19,5
	15-24	17,6	18,5	20,4	15,6
	25-44	18,8	17,4	21,3	17,8
	45-64	25,5	23,5	25,5	25,9
	65-74	20,4	14,5	19,6	22,4
	>=75	8,4	7,1	8,9	8,4

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 138. Proporción (%) de personas con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	25,4	28,3	28,1	27,0	24,0	22,8
	15-24	17,1	13,2	19,1	14,7	15,7	32,8
	25-44	21,6	25,7	24,8	21,8	20,4	18,6
	45-64	32,9	34,8	36,5	36,2	31,3	27,7
	65-74	32,4	38,6	39,8	36,4	29,2	19,3
	>=75	15,3	14,9	11,3	14,0	15,7	19,2
	Mujeres	Total	14,5	26,1	17,3	17,6	11,6
	15-24	17,9	25,5	19,1	22,8	13,1	9,1
	25-44	16,0	25,6	15,1	16,3	14,6	9,9
	45-64	18,3	31,8	25,7	22,4	14,4	8,8
	65-74	10,0	15,8	11,7	15,1	8,9	4,7
	>=75	4,0	12,6	4,8	4,3	3,5	2,8
Ambos sexos	Total	19,8	27,3	22,2	21,7	18,5	12,5
	15-24	17,5	19,3	19,1	19,1	14,6	20,9
	25-44	18,8	25,6	19,6	18,7	18,0	13,9
	45-64	25,5	33,4	30,8	28,3	24,4	14,1
	65-74	20,4	30,8	25,4	25,5	18,8	7,6
	>=75	8,3	13,5	6,8	8,4	8,8	5,9

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 139. Proporción (%) de personas con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	25,5	23,4	20,9	26,5	30,1
	15-24	17,3	2,5	14,3	20,6	26,9
	25-44	21,6	18,4	17,7	21,2	26,4
	45-64	32,9	33,3	28,1	33,7	35,0
	65-74	32,4	26,4	24,0	40,6	41,9
	>=75	15,7	15,7	17,3	18,9	8,3
Mujeres	Total	14,5	7,0	11,3	17,2	22,6
	15-24	17,9	2,1	8,7	19,7	33,9
	25-44	16,0	13,2	13,4	13,7	19,6
	45-64	18,3	8,6	15,9	21,0	27,8
	65-74	10,0	9,4	7,4	13,6	16,7
	>=75	4,0	3,2	2,5	13,2	7,1
Ambos sexos	Total	19,8	14,1	16,1	22,2	25,9
	15-24	17,6	2,3	12,4	20,1	31,1
	25-44	18,8	16,3	15,9	17,9	22,3
	45-64	25,5	20,3	21,5	27,6	31,3
	65-74	20,4	15,9	13,6	32,1	32,8
	>=75	8,4	7,6	7,9	16,2	7,7

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 140. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

			Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total	
Hombres Total	CAPV	N	211.622	41.385	168.732	158.399	71.764	48.724	76.159	138.340	915.124	
		%	23,1	4,5	18,4	17,3	7,8	5,3	8,3	15,1	100,0	
	Araba	N	30.632	5.371	29.523	22.042	12.370	6.613	9.713	17.486	133.751	
		%	22,9	4,0	22,1	16,5	9,2	4,9	7,3	13,1	100,0	
	Gipuzkoa	N	74.408	12.011	62.039	43.365	19.131	15.439	18.912	48.508	293.812	
		%	25,3	4,1	21,1	14,8	6,5	5,3	6,4	16,5	100,0	
	Bizkaia	N	106.583	24.003	77.170	92.991	40.263	26.673	47.533	72.346	487.561	
		%	21,9	4,9	15,8	19,1	8,3	5,5	9,7	14,8	100,0	
	15-24	CAPV	N	890	894	15.094	22.912	11.552	7.957	11.096	24.062	94.458
			%	0,9	0,9	16,0	24,3	12,2	8,4	11,7	25,5	100,0
		Araba	N	289	164	3.423	3.199	2.737	207	2.048	2.803	14.869
			%	1,9	1,1	23,0	21,5	18,4	1,4	13,8	18,9	100,0
Gipuzkoa		N	601	304	4.444	8.696	2.847	3.325	3.397	7.691	31.305	
		%	1,9	1,0	14,2	27,8	9,1	10,6	10,9	24,6	100,0	
Bizkaia		N	.	426	7.227	11.017	5.969	4.426	5.651	13.569	48.284	
		%	.	0,9	15,0	22,8	12,4	9,2	11,7	28,1	100,0	
25-44		CAPV	N	22.039	12.235	79.409	81.581	36.469	23.085	36.037	45.455	336.309
			%	6,6	3,6	23,6	24,3	10,8	6,9	10,7	13,5	100,0
		Araba	N	3.260	1.733	14.461	11.837	7.006	3.434	3.706	6.626	52.062
			%	6,3	3,3	27,8	22,7	13,5	6,6	7,1	12,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 140. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Hombres 25-44	Gipuzkoa	N		9.084	2.695	31.595	20.593	10.937	8.421	9.756	13.709	106.790
		%		8,5	2,5	29,6	19,3	10,2	7,9	9,1	12,8	100,0
	Bizkaia	N		9.695	7.808	33.353	49.151	18.526	11.230	22.576	25.120	177.458
		%		5,5	4,4	18,8	27,7	10,4	6,3	12,7	14,2	100,0
45-64	CAPV	N		98.852	20.648	59.166	43.158	19.891	12.062	17.083	31.795	302.655
		%		32,7	6,8	19,5	14,3	6,6	4,0	5,6	10,5	100,0
	Araba	N		14.052	2.341	9.774	6.095	2.124	2.011	2.689	3.665	42.751
		%		32,9	5,5	22,9	14,3	5,0	4,7	6,3	8,6	100,0
	Gipuzkoa	N		35.150	7.164	19.079	10.889	4.302	2.589	2.386	15.860	97.419
		%		36,1	7,4	19,6	11,2	4,4	2,7	2,4	16,3	100,0
	Bizkaia	N		49.651	11.143	30.313	26.174	13.465	7.462	12.008	12.271	162.485
		%		30,6	6,9	18,7	16,1	8,3	4,6	7,4	7,6	100,0
65-74	CAPV	N		48.140	4.490	10.972	7.532	1.932	3.302	5.461	13.904	95.733
		%		50,3	4,7	11,5	7,9	2,0	3,4	5,7	14,5	100,0
	Araba	N		7.345	433	1.416	602	408	559	499	1.901	13.163
		%		55,8	3,3	10,8	4,6	3,1	4,2	3,8	14,4	100,0
	Gipuzkoa	N		16.632	1.004	5.460	2.012	357	663	1.788	4.215	32.130
		%		51,8	3,1	17,0	6,3	1,1	2,1	5,6	13,1	100,0
	Bizkaia	N		24.163	3.053	4.096	4.919	1.166	2.080	3.174	7.789	50.440
		%		47,9	6,1	8,1	9,8	2,3	4,1	6,3	15,4	100,0
>=75	CAPV	N		41.701	3.117	4.092	3.216	1.920	2.318	6.481	23.123	85.968

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 140. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

			Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total	
Hombres >=75	CAPV	%	48,5	3,6	4,8	3,7	2,2	2,7	7,5	26,9	100,0	
		N	5.686	700	449	310	95	402	772	2.492	10.905	
	Araba	%	52,1	6,4	4,1	2,8	0,9	3,7	7,1	22,8	100,0	
		N	12.941	844	1.460	1.176	688	441	1.585	7.034	26.168	
	Gipuzkoa	%	49,5	3,2	5,6	4,5	2,6	1,7	6,1	26,9	100,0	
		N	23.074	1.574	2.182	1.730	1.138	1.475	4.124	13.597	48.895	
	Bizkaia	%	47,2	3,2	4,5	3,5	2,3	3,0	8,4	27,8	100,0	
		N	101.771	21.706	91.600	149.175	76.872	60.338	136.059	338.361	975.882	
	Mujeres	Total	%	10,4	2,2	9,4	15,3	7,9	6,2	13,9	34,7	100,0
			N	12.467	3.802	15.184	21.102	9.414	8.788	18.272	47.742	136.772
		Araba	%	9,1	2,8	11,1	15,4	6,9	6,4	13,4	34,9	100,0
			N	37.659	8.214	32.359	45.752	22.548	19.992	40.870	105.291	312.686
Gipuzkoa		%	12,0	2,6	10,3	14,6	7,2	6,4	13,1	33,7	100,0	
		N	51.645	9.689	44.058	82.321	44.910	31.558	76.917	185.327	526.425	
Bizkaia		%	9,8	1,8	8,4	15,6	8,5	6,0	14,6	35,2	100,0	
		N	101.771	21.706	91.600	149.175	76.872	60.338	136.059	338.361	975.882	
15-24		CAPV	N	.	552	9.410	22.513	15.342	7.069	13.192	21.419	89.499
			%	.	0,6	10,5	25,2	17,1	7,9	14,7	23,9	100,0
		Araba	N	.	552	2.892	2.291	2.302	756	2.083	2.334	13.210
			%	.	4,2	21,9	17,3	17,4	5,7	15,8	17,7	100,0
	Gipuzkoa	N	.	.	2.336	7.188	4.477	2.347	4.414	8.682	29.443	
		%	.	.	7,9	24,4	15,2	8,0	15,0	29,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 140. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	15-24	Bizkaia	N	.	.	4.182	13.034	8.564	3.967	6.695	10.404	46.846
			%	.	.	8,9	27,8	18,3	8,5	14,3	22,2	100,0
	25-44	CAPV	N	7.703	7.538	37.990	69.518	33.556	28.718	54.179	81.623	320.826
%			2,4	2,3	11,8	21,7	10,5	9,0	16,9	25,4	100,0	
		Araba	N	1.928	1.123	6.175	11.574	3.081	4.905	8.210	10.873	47.869
%			4,0	2,3	12,9	24,2	6,4	10,2	17,2	22,7	100,0	
		Gipuzkoa	N	3.139	3.243	13.982	18.807	8.791	9.924	15.230	28.790	101.905
%			3,1	3,2	13,7	18,5	8,6	9,7	14,9	28,3	100,0	
		Bizkaia	N	2.635	3.172	17.833	39.138	21.685	13.889	30.739	41.960	171.052
%			1,5	1,9	10,4	22,9	12,7	8,1	18,0	24,5	100,0	
	45-64	CAPV	N	48.158	11.126	38.482	44.448	22.711	16.735	41.392	90.717	313.769
%				15,3	3,5	12,3	14,2	7,2	5,3	13,2	28,9	100,0
		Araba	N	5.887	1.717	5.308	6.324	3.933	2.290	4.842	13.961	44.263
%			13,3	3,9	12,0	14,3	8,9	5,2	10,9	31,5	100,0	
		Gipuzkoa	N	15.189	4.223	13.878	15.871	7.561	4.419	11.672	26.849	99.662
%			15,2	4,2	13,9	15,9	7,6	4,4	11,7	26,9	100,0	
		Bizkaia	N	27.082	5.185	19.296	22.253	11.217	10.026	24.878	49.907	169.843
%			15,9	3,1	11,4	13,1	6,6	5,9	14,6	29,4	100,0	
	65-74	CAPV	N	19.773	1.613	3.832	9.752	2.279	4.851	12.416	55.410	109.925
%				18,0	1,5	3,5	8,9	2,1	4,4	11,3	50,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 140. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	65-74	Araba	N	1.987	164	711	813	98	467	1.474	8.605	14.320
			%	13,9	1,1	5,0	5,7	0,7	3,3	10,3	60,1	100,0
		Gipuzkoa	N	9.080	317	1.138	2.532	1.044	1.821	3.666	16.522	36.120
			%	25,1	0,9	3,2	7,0	2,9	5,0	10,1	45,7	100,0
		Bizkaia	N	8.706	1.131	1.983	6.406	1.136	2.562	7.275	30.284	59.484
			%	14,6	1,9	3,3	10,8	1,9	4,3	12,2	50,9	100,0
	>=75	CAPV	N	26.137	877	1.887	2.944	2.984	2.965	14.880	89.191	141.864
			%	18,4	0,6	1,3	2,1	2,1	2,1	10,5	62,9	100,0
		Araba	N	2.665	246	98	100	.	370	1.662	11.970	17.110
			%	15,6	1,4	0,6	0,6	.	2,2	9,7	70,0	100,0
		Gipuzkoa	N	10.252	430	1.025	1.354	675	1.482	5.888	24.448	45.555
			%	22,5	0,9	2,3	3,0	1,5	3,3	12,9	53,7	100,0
Bizkaia	N	13.221	200	764	1.490	2.309	1.114	7.330	52.772	79.200		
	%	16,7	0,3	1,0	1,9	2,9	1,4	9,3	66,6	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	313.393	63.090	260.333	307.574	148.636	109.062	212.218	476.701	1.891.006
		%	16,6	3,3	13,8	16,3	7,9	5,8	11,2	25,2	100,0	
	Araba	N	43.099	9.173	44.707	43.144	21.784	15.401	27.985	65.229	270.523	
		%	15,9	3,4	16,5	15,9	8,1	5,7	10,3	24,1	100,0	
	Gipuzkoa	N	112.067	20.225	94.398	89.117	41.678	35.431	59.782	153.799	606.497	
		%	18,5	3,3	15,6	14,7	6,9	5,8	9,9	25,4	100,0	
Bizkaia	N	158.227	33.692	121.228	175.312	85.173	58.231	124.451	257.673	1.013.987		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 140. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Ambos	Total	Bizkaia	%	15,6	3,3	12,0	17,3	8,4	5,7	12,3	25,4	100,0
	15-24	CAPV	N	890	1.446	24.504	45.425	26.894	15.027	24.289	45.482	183.958
			%	0,5	0,8	13,3	24,7	14,6	8,2	13,2	24,7	100,0
		Araba	N	289	716	6.315	5.490	5.039	963	4.131	5.137	28.079
			%	1,0	2,5	22,5	19,6	17,9	3,4	14,7	18,3	100,0
		Gipuzkoa	N	601	304	6.780	15.884	7.323	5.672	7.811	16.373	60.748
			%	1,0	0,5	11,2	26,1	12,1	9,3	12,9	27,0	100,0
		Bizkaia	N	.	426	11.409	24.051	14.532	8.392	12.347	23.973	95.130
			%	.	0,4	12,0	25,3	15,3	8,8	13,0	25,2	100,0
	25-44	CAPV	N	29.741	19.774	117.398	151.099	70.025	51.803	90.216	127.078	657.135
			%	4,5	3,0	17,9	23,0	10,7	7,9	13,7	19,3	100,0
		Araba	N	5.188	2.856	20.636	23.411	10.086	8.339	11.916	17.499	99.930
			%	5,2	2,9	20,7	23,4	10,1	8,3	11,9	17,5	100,0
		Gipuzkoa	N	12.223	5.938	45.577	39.399	19.728	18.344	24.986	42.499	208.695
			%	5,9	2,8	21,8	18,9	9,5	8,8	12,0	20,4	100,0
		Bizkaia	N	12.330	10.980	51.185	88.289	40.211	25.120	53.314	67.080	348.509
			%	3,5	3,2	14,7	25,3	11,5	7,2	15,3	19,2	100,0
	45-64	CAPV	N	147.011	31.774	97.648	87.606	42.602	28.796	58.475	122.512	616.424
			%	23,8	5,2	15,8	14,2	6,9	4,7	9,5	19,9	100,0
		Araba	N	19.939	4.058	15.082	12.419	6.058	4.301	7.531	17.626	87.015
			%	22,9	4,7	17,3	14,3	7,0	4,9	8,7	20,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 140. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Ambos	45-64	Gipuzkoa	N	50.338	11.388	32.957	26.760	11.863	7.008	14.058	42.709	197.081
			%	25,5	5,8	16,7	13,6	6,0	3,6	7,1	21,7	100,0
		Bizkaia	N	76.733	16.328	49.608	48.427	24.681	17.487	36.886	62.178	332.328
			%	23,1	4,9	14,9	14,6	7,4	5,3	11,1	18,7	100,0
	65-74	CAPV	N	67.913	6.103	14.804	17.284	4.210	8.152	17.877	69.314	205.658
			%	33,0	3,0	7,2	8,4	2,0	4,0	8,7	33,7	100,0
		Araba	N	9.332	597	2.127	1.415	506	1.026	1.973	10.506	27.483
			%	34,0	2,2	7,7	5,2	1,8	3,7	7,2	38,2	100,0
		Gipuzkoa	N	25.711	1.321	6.598	4.544	1.401	2.484	5.454	20.736	68.251
			%	37,7	1,9	9,7	6,7	2,1	3,6	8,0	30,4	100,0
		Bizkaia	N	32.869	4.184	6.079	11.325	2.303	4.642	10.449	38.073	109.924
			%	29,9	3,8	5,5	10,3	2,1	4,2	9,5	34,6	100,0
	>=75	CAPV	N	67.838	3.994	5.979	6.159	4.904	5.284	21.361	112.314	227.832
			%	29,8	1,8	2,6	2,7	2,2	2,3	9,4	49,3	100,0
		Araba	N	8.350	946	547	409	95	772	2.434	14.462	28.015
			%	29,8	3,4	2,0	1,5	0,3	2,8	8,7	51,6	100,0
		Gipuzkoa	N	23.192	1.274	2.485	2.530	1.363	1.923	7.473	31.482	71.723
			%	32,3	1,8	3,5	3,5	1,9	2,7	10,4	43,9	100,0
		Bizkaia	N	36.295	1.774	2.946	3.220	3.446	2.589	11.454	66.370	128.094
			%	28,3	1,4	2,3	2,5	2,7	2,0	8,9	51,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 141. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

		Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total		
Hombres	Total	N	211.622	41.385	167.921	158.210	71.764	48.464	76.159	138.340	913.863	
		%	23,2	4,5	18,4	17,3	7,9	5,3	8,3	15,1	100,0	
	I	N	23.972	4.732	30.037	20.515	8.630	6.187	7.946	11.670	113.690	
		%	21,1	4,2	26,4	18,0	7,6	5,4	7,0	10,3	100,0	
	II	N	13.690	4.494	15.534	14.951	8.723	4.442	7.149	9.222	78.206	
		%	17,5	5,7	19,9	19,1	11,2	5,7	9,1	11,8	100,0	
	III	N	46.203	10.393	37.635	29.105	14.188	7.000	16.575	27.254	188.355	
		%	24,5	5,5	20,0	15,5	7,5	3,7	8,8	14,5	100,0	
	IV	N	110.227	19.188	69.735	78.434	36.558	27.907	38.356	69.900	450.306	
		%	24,5	4,3	15,5	17,4	8,1	6,2	8,5	15,5	100,0	
	V	N	17.529	2.577	14.979	15.205	3.664	2.927	6.132	20.295	83.307	
		%	21,0	3,1	18,0	18,3	4,4	3,5	7,4	24,4	100,0	
	15-24	Total	N	890	894	14.796	22.912	11.552	7.697	11.096	24.062	93.900
			%	0,9	1,0	15,8	24,4	12,3	8,2	11,8	25,6	100,0
		I	N	.	590	3.060	3.053	1.079	1.362	1.546	3.945	14.634
			%	.	4,0	20,9	20,9	7,4	9,3	10,6	27,0	100,0
		II	N	.	.	2.270	3.790	364	481	780	3.303	10.988
			%	.	.	20,7	34,5	3,3	4,4	7,1	30,1	100,0
		III	N	.	.	2.323	3.603	1.853	.	3.207	5.844	16.830
			%	.	.	13,8	21,4	11,0	.	19,1	34,7	100,0
		IV	N	601	304	6.120	8.478	7.218	5.854	4.954	9.207	42.737
			%	1,4	0,7	14,3	19,8	16,9	13,7	11,6	21,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 141. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

		Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Hombres 15-24 V	N	289	.	1.022	3.988	1.038	.	609	1.763	8.711
	%	3,3	.	11,7	45,8	11,9	.	7,0	20,2	100,0
25-44 Total	N	22.039	12.235	79.409	81.581	36.469	23.085	36.037	45.455	336.309
	%	6,6	3,6	23,6	24,3	10,8	6,9	10,7	13,5	100,0
I	N	2.165	1.552	13.934	11.087	5.440	2.210	4.216	3.128	43.732
	%	5,0	3,5	31,9	25,4	12,4	5,1	9,6	7,2	100,0
II	N	1.907	1.264	8.644	6.499	5.972	2.342	3.755	2.114	32.496
	%	5,9	3,9	26,6	20,0	18,4	7,2	11,6	6,5	100,0
III	N	3.837	1.445	16.882	15.916	7.437	3.063	5.747	7.929	62.257
	%	6,2	2,3	27,1	25,6	11,9	4,9	9,2	12,7	100,0
IV	N	11.633	6.876	30.562	41.746	16.489	12.544	18.273	22.269	160.392
	%	7,3	4,3	19,1	26,0	10,3	7,8	11,4	13,9	100,0
V	N	2.497	1.098	9.386	6.333	1.130	2.927	4.046	10.015	37.432
	%	6,7	2,9	25,1	16,9	3,0	7,8	10,8	26,8	100,0
45-64 Total	N	98.852	20.648	59.067	42.969	19.891	12.062	17.083	31.795	302.368
	%	32,7	6,8	19,5	14,2	6,6	4,0	5,6	10,5	100,0
I	N	13.610	1.595	10.268	4.897	1.776	1.518	1.766	2.475	37.907
	%	35,9	4,2	27,1	12,9	4,7	4,0	4,7	6,5	100,0
II	N	6.772	2.523	3.833	3.538	2.079	1.099	1.528	2.047	23.419
	%	28,9	10,8	16,4	15,1	8,9	4,7	6,5	8,7	100,0
III	N	20.397	6.821	14.981	7.673	4.071	2.502	4.623	5.254	66.322
	%	30,8	10,3	22,6	11,6	6,1	3,8	7,0	7,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 141. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Hombres 45-64	IV	N		49.747	8.601	26.027	22.978	10.542	6.943	8.047	17.731	150.614
		%		33,0	5,7	17,3	15,3	7,0	4,6	5,3	11,8	100,0
	V	N		8.327	1.108	3.958	3.882	1.424	.	1.119	4.288	24.106
		%		34,5	4,6	16,4	16,1	5,9	.	4,6	17,8	100,0
65-74	Total	N		48.140	4.490	10.972	7.532	1.932	3.302	5.461	13.904	95.733
		%		50,3	4,7	11,5	7,9	2,0	3,4	5,7	14,5	100,0
	I	N		5.665	799	2.628	1.478	163	1.097	419	1.505	13.753
		%		41,2	5,8	19,1	10,7	1,2	8,0	3,0	10,9	100,0
	II	N		3.261	433	460	573	309	520	507	800	6.862
		%		47,5	6,3	6,7	8,3	4,5	7,6	7,4	11,7	100,0
	III	N		11.521	1.120	3.219	1.330	401	146	1.398	2.642	21.777
		%		52,9	5,1	14,8	6,1	1,8	0,7	6,4	12,1	100,0
	IV	N		25.451	1.767	4.245	3.390	988	1.539	2.780	7.592	47.753
		%		53,3	3,7	8,9	7,1	2,1	3,2	5,8	15,9	100,0
	V	N		2.242	371	420	762	71	.	358	1.365	5.588
		%		40,1	6,6	7,5	13,6	1,3	.	6,4	24,4	100,0
>=75	Total	N		41.701	3.117	3.677	3.216	1.920	2.318	6.481	23.123	85.553
		%		48,7	3,6	4,3	3,8	2,2	2,7	7,6	27,0	100,0
	I	N		2.532	196	146	.	172	.	.	618	3.663
		%		69,1	5,3	4,0	.	4,7	.	.	16,9	100,0
	II	N		1.750	275	327	551	.	.	578	958	4.440
		%		39,4	6,2	7,4	12,4	.	.	13,0	21,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 141. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total	
Hombres >=75	III	N		10.449	1.006	230	584	427	1.290	1.600	5.584	21.169	
		%		49,4	4,8	1,1	2,8	2,0	6,1	7,6	26,4	100,0	
	IV	N		22.796	1.641	2.780	1.841	1.321	1.029	4.302	13.101	48.810	
		%		46,7	3,4	5,7	3,8	2,7	2,1	8,8	26,8	100,0	
	V	N		4.175	.	193	240	.	.	.	2.863	7.470	
		%		55,9	.	2,6	3,2	.	.	.	38,3	100,0	
Mujeres	Total	Total N		101.771	21.706	91.393	148.922	76.701	60.236	135.648	337.116	973.492	
		%		10,5	2,2	9,4	15,3	7,9	6,2	13,9	34,6	100,0	
	I	N		10.560	3.277	18.269	21.590	12.539	6.931	10.024	21.647	104.838	
		%		10,1	3,1	17,4	20,6	12,0	6,6	9,6	20,6	100,0	
	II	N		10.056	3.589	10.357	17.628	10.207	5.777	12.309	25.105	95.028	
		%		10,6	3,8	10,9	18,6	10,7	6,1	13,0	26,4	100,0	
	III	N		29.417	6.869	25.389	39.229	21.749	14.297	33.972	71.185	242.107	
		%		12,2	2,8	10,5	16,2	9,0	5,9	14,0	29,4	100,0	
	IV	N		36.814	5.596	28.718	52.516	23.054	23.143	55.090	135.511	360.441	
		%		10,2	1,6	8,0	14,6	6,4	6,4	15,3	37,6	100,0	
	V	N		14.924	2.373	8.660	17.959	9.153	10.087	24.254	83.668	171.077	
		%		8,7	1,4	5,1	10,5	5,3	5,9	14,2	48,9	100,0	
	15-24	Total	N		.	552	9.203	22.259	15.342	7.069	12.937	21.170	88.533
			%		.	0,6	10,4	25,1	17,3	8,0	14,6	23,9	100,0
		I	N		.	.	2.771	3.983	2.753	414	1.741	2.899	14.562
			%		.	.	19,0	27,4	18,9	2,8	12,0	19,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 141. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

			Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
15-24	II	N	.	.	2.006	1.977	2.325	738	3.051	3.401	13.497
		%	.	.	14,9	14,6	17,2	5,5	22,6	25,2	100,0
	III	N	.	.	2.131	7.374	1.518	1.425	3.076	4.546	20.069
		%	.	.	10,6	36,7	7,6	7,1	15,3	22,6	100,0
	IV	N	.	552	2.055	7.550	6.670	4.106	2.826	7.854	31.614
		%	.	1,7	6,5	23,9	21,1	13,0	8,9	24,8	100,0
V	N	.	.	241	1.374	2.076	386	2.243	2.471	8.792	
	%	.	.	2,7	15,6	23,6	4,4	25,5	28,1	100,0	
25-44	Total	N	7.703	7.538	37.990	69.518	33.556	28.718	54.179	81.128	320.330
		%	2,4	2,4	11,9	21,7	10,5	9,0	16,9	25,3	100,0
I	N	1.309	898	6.527	10.441	8.206	3.543	4.706	9.455	45.086	
	%	2,9	2,0	14,5	23,2	18,2	7,9	10,4	21,0	100,0	
II	N	429	1.692	4.513	9.658	4.603	2.619	4.936	8.772	37.223	
	%	1,2	4,5	12,1	25,9	12,4	7,0	13,3	23,6	100,0	
III	N	2.065	2.818	9.040	16.336	10.480	7.179	14.457	19.653	82.029	
	%	2,5	3,4	11,0	19,9	12,8	8,8	17,6	24,0	100,0	
IV	N	1.706	924	14.509	24.812	8.215	11.773	23.332	25.455	110.725	
	%	1,5	0,8	13,1	22,4	7,4	10,6	21,1	23,0	100,0	
V	N	2.193	1.206	3.400	8.271	2.052	3.604	6.747	17.793	45.267	
	%	4,8	2,7	7,5	18,3	4,5	8,0	14,9	39,3	100,0	
Total	N	48.158	11.126	38.482	44.448	22.540	16.735	41.392	90.717	313.598	
	%	15,4	3,5	12,3	14,2	7,2	5,3	13,2	28,9	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 141. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	45-64	I	N	5.853	1.996	8.664	4.935	1.412	2.271	2.384	4.602	32.116
			%	18,2	6,2	27,0	15,4	4,4	7,1	7,4	14,3	100,0
		II	N	5.103	1.746	3.233	5.055	2.773	1.552	3.150	4.181	26.792
			%	19,0	6,5	12,1	18,9	10,3	5,8	11,8	15,6	100,0
		III	N	15.230	3.417	12.355	12.811	9.028	4.843	10.240	20.716	88.641
			%	17,2	3,9	13,9	14,5	10,2	5,5	11,6	23,4	100,0
		IV	N	16.424	2.939	10.091	15.199	5.278	3.924	16.639	33.607	104.102
			%	15,8	2,8	9,7	14,6	5,1	3,8	16,0	32,3	100,0
		V	N	5.549	1.027	4.139	6.448	4.049	4.145	8.979	27.611	61.946
			%	9,0	1,7	6,7	10,4	6,5	6,7	14,5	44,6	100,0
	65-74	Total	N	19.773	1.613	3.832	9.752	2.279	4.851	12.261	55.410	109.770
			%	18,0	1,5	3,5	8,9	2,1	4,4	11,2	50,5	100,0
		I	N	1.320	384	306	1.413	168	542	966	2.100	7.199
			%	18,3	5,3	4,3	19,6	2,3	7,5	13,4	29,2	100,0
		II	N	1.867	.	104	667	.	868	294	3.425	7.225
			%	25,8	.	1,4	9,2	.	12,0	4,1	47,4	100,0
		III	N	6.408	319	1.392	2.542	541	444	2.709	8.545	22.899
			%	28,0	1,4	6,1	11,1	2,4	1,9	11,8	37,3	100,0
		IV	N	7.339	770	1.451	3.848	1.012	1.914	5.348	28.453	50.134
			%	14,6	1,5	2,9	7,7	2,0	3,8	10,7	56,8	100,0
		V	N	2.839	140	579	1.282	558	1.083	2.943	12.888	22.312
			%	12,7	0,6	2,6	5,7	2,5	4,9	13,2	57,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 141. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

			Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total	
Mujeres >=75	Total	N	26.137	877	1.887	2.944	2.984	2.863	14.880	88.690	141.261	
		%	18,5	0,6	1,3	2,1	2,1	2,0	10,5	62,8	100,0	
	I	N	2.079	.	.	818	.	161	227	2.590	5.875	
		%	35,4	.	.	13,9	.	2,7	3,9	44,1	100,0	
	II	N	2.658	151	502	271	506	.	878	5.326	10.292	
		%	25,8	1,5	4,9	2,6	4,9	.	8,5	51,8	100,0	
	III	N	5.713	315	472	165	182	406	3.491	17.725	28.468	
		%	20,1	1,1	1,7	0,6	0,6	1,4	12,3	62,3	100,0	
	IV	N	11.345	411	613	1.107	1.879	1.427	6.944	40.142	63.866	
		%	17,8	0,6	1,0	1,7	2,9	2,2	10,9	62,9	100,0	
	V	N	4.343	.	301	583	418	870	3.341	22.906	32.760	
		%	13,3	.	0,9	1,8	1,3	2,7	10,2	69,9	100,0	
	Ambos	Total	N	313.393	63.090	259.314	307.132	148.465	108.699	211.807	475.456	1.887.356
			%	16,6	3,3	13,7	16,3	7,9	5,8	11,2	25,2	100,0
I		N	34.533	8.010	48.305	42.106	21.169	13.118	17.971	33.317	218.528	
		%	15,8	3,7	22,1	19,3	9,7	6,0	8,2	15,2	100,0	
II		N	23.747	8.084	25.891	32.579	18.930	10.220	19.457	34.326	173.234	
		%	13,7	4,7	14,9	18,8	10,9	5,9	11,2	19,8	100,0	
III		N	75.620	17.262	63.025	68.334	35.937	21.298	50.547	98.439	430.462	
		%	17,6	4,0	14,6	15,9	8,3	4,9	11,7	22,9	100,0	
IV		N	147.041	24.784	98.453	130.950	59.612	51.050	93.446	205.411	810.747	
		%	18,1	3,1	12,1	16,2	7,4	6,3	11,5	25,3	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 141. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Ambos	Total	V	N	32.453	4.950	23.640	33.163	12.816	13.014	30.386	103.963	254.385
			%	12,8	1,9	9,3	13,0	5,0	5,1	11,9	40,9	100,0
	15-24	Total	N	890	1.446	23.999	45.172	26.894	14.767	24.033	45.233	182.434
				%	0,5	0,8	13,2	24,8	14,7	8,1	13,2	24,8
		I	N	.	590	5.831	7.036	3.831	1.777	3.287	6.843	29.196
				%	.	2,0	20,0	24,1	13,1	6,1	11,3	23,4
		II	N	.	.	4.276	5.767	2.689	1.219	3.831	6.703	24.485
				%	.	.	17,5	23,6	11,0	5,0	15,6	27,4
		III	N	.	.	4.454	10.977	3.371	1.425	6.283	10.390	36.900
				%	.	.	12,1	29,7	9,1	3,9	17,0	28,2
		IV	N	601	857	8.175	16.028	13.888	9.959	7.780	17.062	74.351
				%	0,8	1,2	11,0	21,6	18,7	13,4	10,5	22,9
		V	N	289	.	1.263	5.363	3.115	386	2.852	4.234	17.503
				%	1,7	.	7,2	30,6	17,8	2,2	16,3	24,2
	25-44	Total	N	29.741	19.774	117.398	151.099	70.025	51.803	90.216	126.583	656.640
					%	4,5	3,0	17,9	23,0	10,7	7,9	13,7
		I	N	3.474	2.451	20.461	21.528	13.646	5.753	8.922	12.583	88.818
				%	3,9	2,8	23,0	24,2	15,4	6,5	10,0	14,2
		II	N	2.336	2.956	13.156	16.157	10.575	4.961	8.692	10.886	69.719
				%	3,4	4,2	18,9	23,2	15,2	7,1	12,5	15,6
		III	N	5.902	4.263	25.923	32.252	17.917	10.242	20.205	27.582	144.286
				%	4,1	3,0	18,0	22,4	12,4	7,1	14,0	19,1

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 141. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Ambos	25-44	IV	N	13.339	7.799	45.071	66.558	24.704	24.317	41.605	47.723	271.117
			%	4,9	2,9	16,6	24,5	9,1	9,0	15,3	17,6	100,0
		V	N	4.690	2.305	12.787	14.604	3.183	6.531	10.793	27.808	82.699
			%	5,7	2,8	15,5	17,7	3,8	7,9	13,1	33,6	100,0
	45-64	Total	N	147.011	31.774	97.549	87.417	42.431	28.796	58.475	122.512	615.965
			%	23,9	5,2	15,8	14,2	6,9	4,7	9,5	19,9	100,0
		I	N	19.463	3.591	18.932	9.832	3.189	3.789	4.150	7.078	70.023
			%	27,8	5,1	27,0	14,0	4,6	5,4	5,9	10,1	100,0
		II	N	11.875	4.269	7.066	8.594	4.852	2.651	4.678	6.228	50.212
			%	23,6	8,5	14,1	17,1	9,7	5,3	9,3	12,4	100,0
		III	N	35.627	10.239	27.336	20.484	13.099	7.345	14.862	25.970	154.963
			%	23,0	6,6	17,6	13,2	8,5	4,7	9,6	16,8	100,0
		IV	N	66.171	11.540	36.118	38.177	15.820	10.867	24.686	51.338	254.716
			%	26,0	4,5	14,2	15,0	6,2	4,3	9,7	20,2	100,0
		V	N	13.875	2.135	8.097	10.330	5.472	4.145	10.098	31.899	86.052
			%	16,1	2,5	9,4	12,0	6,4	4,8	11,7	37,1	100,0
	65-74	Total	N	67.913	6.103	14.804	17.284	4.210	8.152	17.722	69.314	205.503
			%	33,0	3,0	7,2	8,4	2,0	4,0	8,6	33,7	100,0
		I	N	6.985	1.183	2.934	2.891	331	1.639	1.385	3.605	20.952
			%	33,3	5,6	14,0	13,8	1,6	7,8	6,6	17,2	100,0
		II	N	5.128	433	564	1.240	309	1.388	801	4.225	14.087
			%	36,4	3,1	4,0	8,8	2,2	9,9	5,7	30,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 141. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Ambos	65-74	III	N	17.929	1.439	4.611	3.871	942	590	4.107	11.187	44.676
			%	40,1	3,2	10,3	8,7	2,1	1,3	9,2	25,0	100,0
		IV	N	32.790	2.538	5.696	7.239	2.000	3.453	8.128	36.045	97.887
			%	33,5	2,6	5,8	7,4	2,0	3,5	8,3	36,8	100,0
		V	N	5.081	510	999	2.044	629	1.083	3.302	14.253	27.901
			%	18,2	1,8	3,6	7,3	2,3	3,9	11,8	51,1	100,0
	>=75	Total	N	67.838	3.994	5.564	6.159	4.904	5.181	21.361	111.814	226.814
			%	29,9	1,8	2,5	2,7	2,2	2,3	9,4	49,3	100,0
		I	N	4.610	196	146	818	172	161	227	3.208	9.538
			%	48,3	2,1	1,5	8,6	1,8	1,7	2,4	33,6	100,0
		II	N	4.408	426	829	821	506	.	1.456	6.285	14.731
			%	29,9	2,9	5,6	5,6	3,4	.	9,9	42,7	100,0
		III	N	16.162	1.321	702	750	608	1.695	5.091	23.309	49.638
			%	32,6	2,7	1,4	1,5	1,2	3,4	10,3	47,0	100,0
		IV	N	34.140	2.051	3.393	2.948	3.200	2.455	11.246	53.243	112.676
			%	30,3	1,8	3,0	2,6	2,8	2,2	10,0	47,3	100,0
		V	N	8.518	.	494	823	418	870	3.341	25.769	40.231
			%	21,2	.	1,2	2,0	1,0	2,2	8,3	64,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 142. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Hombres Total	Total	N	211.622	41.385	168.732	158.399	71.764	48.724	76.159	138.340	915.124
		%	23,1	4,5	18,4	17,3	7,8	5,3	8,3	15,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	72.449	7.569	22.634	23.174	10.696	7.679	18.392	48.007	210.600
		%	34,4	3,6	10,7	11,0	5,1	3,6	8,7	22,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	35.893	6.068	24.674	29.382	11.228	9.248	19.159	31.801	167.454
		%	21,4	3,6	14,7	17,5	6,7	5,5	11,4	19,0	100,0
	Secundaria, superior	N	67.554	17.140	75.007	73.767	32.835	25.782	25.091	43.495	360.670
		%	18,7	4,8	20,8	20,5	9,1	7,1	7,0	12,1	100,0
	Terciaria	N	35.726	10.607	46.417	32.075	17.005	6.016	13.517	15.037	176.400
		%	20,3	6,0	26,3	18,2	9,6	3,4	7,7	8,5	100,0
15-24	Total	N	890	894	15.094	22.912	11.552	7.957	11.096	24.062	94.458
		%	0,9	0,9	16,0	24,3	12,2	8,4	11,7	25,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	.	.	1.591	801	.	2.459	5.066	9.918
		%	.	.	.	16,0	8,1	.	24,8	51,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	601	164	1.576	5.256	3.871	2.048	5.735	11.878	31.129
		%	1,9	0,5	5,1	16,9	12,4	6,6	18,4	38,2	100,0
	Secundaria, superior	N	289	730	10.654	12.952	5.181	4.524	2.489	6.020	42.840
		%	0,7	1,7	24,9	30,2	12,1	10,6	5,8	14,1	100,0
	Terciaria	N	.	.	2.864	3.112	1.698	1.385	414	1.098	10.572
		%	.	.	27,1	29,4	16,1	13,1	3,9	10,4	100,0
25-44	Total	N	22.039	12.235	79.409	81.581	36.469	23.085	36.037	45.455	336.309

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 142. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total		
Hombres	25-44	Total	%	6,6	3,6	23,6	24,3	10,8	6,9	10,7	13,5	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	3.077	1.012	3.921	9.168	2.820	2.328	5.408	10.043	37.776	
			%	8,1	2,7	10,4	24,3	7,5	6,2	14,3	26,6	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.319	1.935	12.298	11.678	3.632	5.298	7.553	8.095	52.808	
			%	4,4	3,7	23,3	22,1	6,9	10,0	14,3	15,3	100,0	
		Secundaria, superior	N	11.322	5.327	38.345	40.889	19.365	12.359	15.167	21.501	164.274	
			%	6,9	3,2	23,3	24,9	11,8	7,5	9,2	13,1	100,0	
		Terciaria	N	5.320	3.962	24.844	19.846	10.652	3.100	7.909	5.816	81.451	
			%	6,5	4,9	30,5	24,4	13,1	3,8	9,7	7,1	100,0	
		45-64	Total	N	98.852	20.648	59.166	43.158	19.891	12.062	17.083	31.795	302.655
			%	32,7	6,8	19,5	14,3	6,6	4,0	5,6	10,5	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	26.815	3.699	10.772	7.127	4.912	2.641	3.598	10.836	70.400	
			%	38,1	5,3	15,3	10,1	7,0	3,8	5,1	15,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N	17.139	2.730	8.562	11.086	3.347	1.065	4.131	5.184	53.244	
			%	32,2	5,1	16,1	20,8	6,3	2,0	7,8	9,7	100,0	
		Secundaria, superior	N	35.747	9.349	24.129	17.326	7.739	7.153	5.645	10.041	117.130	
			%	30,5	8,0	20,6	14,8	6,6	6,1	4,8	8,6	100,0	
		Terciaria	N	19.152	4.870	15.703	7.618	3.893	1.203	3.709	5.734	61.881	
	%		30,9	7,9	25,4	12,3	6,3	1,9	6,0	9,3	100,0		
	65-74	Total	N	48.140	4.490	10.972	7.532	1.932	3.302	5.461	13.904	95.733	
		%	50,3	4,7	11,5	7,9	2,0	3,4	5,7	14,5	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 142. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total	
Hombres	65-74	Sin estudios, primaria	N	18.265	1.288	4.606	3.589	415	1.349	1.963	6.542	38.017
		%	48,0	3,4	12,1	9,4	1,1	3,5	5,2	17,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	7.841	551	1.679	813	377	612	922	3.498	16.291
		%	48,1	3,4	10,3	5,0	2,3	3,8	5,7	21,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	14.768	1.151	1.879	2.191	550	1.014	1.575	2.821	25.948
		%	56,9	4,4	7,2	8,4	2,1	3,9	6,1	10,9	100,0	
		Terciaria	N	7.266	1.501	2.809	940	590	328	1.001	1.043	15.477
		%	46,9	9,7	18,1	6,1	3,8	2,1	6,5	6,7	100,0	
	>=75	Total	N	41.701	3.117	4.092	3.216	1.920	2.318	6.481	23.123	85.968
		%	48,5	3,6	4,8	3,7	2,2	2,7	7,5	26,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	24.292	1.571	3.336	1.698	1.748	1.361	4.964	15.519	54.489
			%	44,6	2,9	6,1	3,1	3,2	2,5	9,1	28,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.994	689	559	549	.	225	819	3.146	13.981
			%	57,2	4,9	4,0	3,9	.	1,6	5,9	22,5	100,0
Secundaria, superior		N	5.428	583	.	410	.	732	214	3.112	10.478	
		%	51,8	5,6	.	3,9	.	7,0	2,0	29,7	100,0	
Terciaria		N	3.988	275	197	558	172	.	484	1.345	7.020	
		%	56,8	3,9	2,8	8,0	2,5	.	6,9	19,2	100,0	
Mujeres		Total	N	101.771	21.706	91.600	149.175	76.872	60.338	136.059	338.361	975.882
		%	10,4	2,2	9,4	15,3	7,9	6,2	13,9	34,7	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 142. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total	
Mujeres	Total	Sin estudios, primaria	N	35.983	4.195	10.541	16.825	11.548	11.685	29.063	158.486	278.327
		%		12,9	1,5	3,8	6,0	4,1	4,2	10,4	56,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	21.215	2.235	12.743	22.933	9.626	11.079	25.779	64.156	169.766
		%		12,5	1,3	7,5	13,5	5,7	6,5	15,2	37,8	100,0
		Secundaria, superior	N	27.606	6.526	35.771	61.249	30.491	23.416	49.250	73.559	307.866
		%		9,0	2,1	11,6	19,9	9,9	7,6	16,0	23,9	100,0
		Terciaria	N	16.968	8.749	32.546	48.168	25.207	14.158	31.966	42.160	219.923
		%		7,7	4,0	14,8	21,9	11,5	6,4	14,5	19,2	100,0
		15-24 Total	N	.	552	9.410	22.513	15.342	7.069	13.192	21.419	89.499
		%		.	0,6	10,5	25,2	17,1	7,9	14,7	23,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	241	439	590	900	1.505	7.710	11.386
		%		.	.	2,1	3,9	5,2	7,9	13,2	67,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	1.049	3.796	1.960	1.028	1.929	7.000	16.763
		%		.	.	6,3	22,6	11,7	6,1	11,5	41,8	100,0
		Secundaria, superior	N	.	422	4.738	13.881	9.504	4.399	6.907	5.592	45.443
		%		.	0,9	10,4	30,5	20,9	9,7	15,2	12,3	100,0
		Terciaria	N	.	130	3.382	4.397	3.288	741	2.852	1.116	15.907
		%		.	0,8	21,3	27,6	20,7	4,7	17,9	7,0	100,0
		25-44 Total	N	7.703	7.538	37.990	69.518	33.556	28.718	54.179	81.623	320.826
		%		2,4	2,3	11,8	21,7	10,5	9,0	16,9	25,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 142. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total	
25-44	Sin estudios, primaria	N	1.286	1.039	2.209	3.550	2.218	2.694	2.246	10.747	25.990	
		%	4,9	4,0	8,5	13,7	8,5	10,4	8,6	41,4	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.174	708	4.473	8.167	2.738	4.186	6.673	10.818	38.937	
		%	3,0	1,8	11,5	21,0	7,0	10,8	17,1	27,8	100,0	
	Secundaria, superior	N	3.051	1.522	15.772	26.189	11.995	13.378	24.722	33.859	130.487	
		%	2,3	1,2	12,1	20,1	9,2	10,3	18,9	25,9	100,0	
	Terciaria	N	2.192	4.269	15.536	31.613	16.606	8.460	20.537	26.199	125.412	
		%	1,7	3,4	12,4	25,2	13,2	6,7	16,4	20,9	100,0	
	45-64	Total	N	48.158	11.126	38.482	44.448	22.711	16.735	41.392	90.717	313.769
			%	15,3	3,5	12,3	14,2	7,2	5,3	13,2	28,9	100,0
Sin estudios, primaria		N	9.834	1.295	5.524	7.339	5.133	3.932	9.342	35.564	77.963	
		%	12,6	1,7	7,1	9,4	6,6	5,0	12,0	45,6	100,0	
Secundaria, inferior		N	9.281	1.387	5.742	7.906	4.102	4.048	9.177	20.092	61.735	
		%	15,0	2,2	9,3	12,8	6,6	6,6	14,9	32,5	100,0	
Secundaria, superior		N	18.595	4.094	14.111	18.832	8.483	4.519	15.435	26.251	110.322	
		%	16,9	3,7	12,8	17,1	7,7	4,1	14,0	23,8	100,0	
Terciaria		N	10.447	4.349	13.105	10.372	4.992	4.236	7.438	8.809	63.749	
		%	16,4	6,8	20,6	16,3	7,8	6,6	11,7	13,8	100,0	
65-74	Total	N	19.773	1.613	3.832	9.752	2.279	4.851	12.416	55.410	109.925	
		%	18,0	1,5	3,5	8,9	2,1	4,4	11,3	50,4	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 142. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total	
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	9.293	985	1.705	4.294	1.318	2.521	7.144	34.591	61.852
			%	15,0	1,6	2,8	6,9	2,1	4,1	11,6	55,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.237	140	1.380	2.307	292	1.167	3.098	12.832	27.452
			%	22,7	0,5	5,0	8,4	1,1	4,3	11,3	46,7	100,0
		Secundaria, superior	N	2.344	488	337	1.705	509	443	1.210	4.858	11.893
			%	19,7	4,1	2,8	14,3	4,3	3,7	10,2	40,8	100,0
	Terciaria	N	1.899	.	410	1.446	159	720	963	3.129	8.727	
		%	21,8	.	4,7	16,6	1,8	8,3	11,0	35,9	100,0	
	>=75	Total	N	26.137	877	1.887	2.944	2.984	2.965	14.880	89.191	141.864
			%	18,4	0,6	1,3	2,1	2,1	2,1	10,5	62,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	15.570	877	861	1.203	2.289	1.638	8.826	69.873	101.136
			%	15,4	0,9	0,9	1,2	2,3	1,6	8,7	69,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.522	.	99	757	534	651	4.903	13.413	24.879
			%	18,2	.	0,4	3,0	2,1	2,6	19,7	53,9	100,0
	Secundaria, superior	N	3.615	.	812	643	.	677	976	2.998	9.720	
		%	37,2	.	8,4	6,6	.	7,0	10,0	30,8	100,0	
	Terciaria	N	2.431	.	114	341	161	.	176	2.906	6.129	
		%	39,7	.	1,9	5,6	2,6	.	2,9	47,4	100,0	
Ambos	Total	N	313.393	63.090	260.333	307.574	148.636	109.062	212.218	476.701	1.891.006	
		%	16,6	3,3	13,8	16,3	7,9	5,8	11,2	25,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 142. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Ambos	Total	Sin estudios, primaria	N	108.432	11.765	33.174	39.999	22.244	19.364	47.455	206.493	488.927
			%	22,2	2,4	6,8	8,2	4,5	4,0	9,7	42,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	57.108	8.304	37.417	52.315	20.854	20.327	44.938	95.957	337.220
			%	16,9	2,5	11,1	15,5	6,2	6,0	13,3	28,5	100,0
		Secundaria, superior	N	95.159	23.665	110.778	135.016	63.326	49.197	74.341	117.054	668.536
			%	14,2	3,5	16,6	20,2	9,5	7,4	11,1	17,5	100,0
		Terciaria	N	52.694	19.356	78.963	80.244	42.212	20.174	45.483	57.197	396.323
			%	13,3	4,9	19,9	20,2	10,7	5,1	11,5	14,4	100,0
	15-24	Total	N	890	1.446	24.504	45.425	26.894	15.027	24.289	45.482	183.958
			%	0,5	0,8	13,3	24,7	14,6	8,2	13,2	24,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	241	2.031	1.391	900	3.964	12.777	21.304
			%	.	.	1,1	9,5	6,5	4,2	18,6	60,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	601	164	2.625	9.053	5.831	3.076	7.664	18.878	47.891
			%	1,3	0,3	5,5	18,9	12,2	6,4	16,0	39,4	100,0
		Secundaria, superior	N	289	1.152	15.392	26.833	14.685	8.923	9.396	11.612	88.283
			%	0,3	1,3	17,4	30,4	16,6	10,1	10,6	13,2	100,0
		Terciaria	N	.	130	6.246	7.509	4.987	2.127	3.266	2.215	26.479
			%	.	0,5	23,6	28,4	18,8	8,0	12,3	8,4	100,0
	25-44	Total	N	29.741	19.774	117.398	151.099	70.025	51.803	90.216	127.078	657.135
			%	4,5	3,0	17,9	23,0	10,7	7,9	13,7	19,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 142. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
25-44	Sin estudios, primaria	N	4.363	2.050	6.130	12.718	5.038	5.022	7.654	20.790	63.765
		%	6,8	3,2	9,6	19,9	7,9	7,9	12,0	32,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.493	2.644	16.772	19.845	6.370	9.484	14.226	18.913	91.745
		%	3,8	2,9	18,3	21,6	6,9	10,3	15,5	20,6	100,0
	Secundaria, superior	N	14.373	6.848	54.117	67.077	31.359	25.737	39.890	55.360	294.762
		%	4,9	2,3	18,4	22,8	10,6	8,7	13,5	18,8	100,0
	Terciaria	N	7.512	8.231	40.380	51.459	27.258	11.560	28.447	32.015	206.862
		%	3,6	4,0	19,5	24,9	13,2	5,6	13,8	15,5	100,0
45-64	Total	N	147.011	31.774	97.648	87.606	42.602	28.796	58.475	122.512	616.424
		%	23,8	5,2	15,8	14,2	6,9	4,7	9,5	19,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	36.650	4.993	16.296	14.466	10.045	6.573	12.940	46.400	148.363
		%	24,7	3,4	11,0	9,8	6,8	4,4	8,7	31,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	26.420	4.117	14.304	18.992	7.450	5.112	13.307	25.277	114.979
		%	23,0	3,6	12,4	16,5	6,5	4,4	11,6	22,0	100,0
	Secundaria, superior	N	54.342	13.444	38.241	36.158	16.222	11.672	21.081	36.293	227.452
		%	23,9	5,9	16,8	15,9	7,1	5,1	9,3	16,0	100,0
	Terciaria	N	29.599	9.219	28.807	17.990	8.885	5.439	11.147	14.543	125.630
		%	23,6	7,3	22,9	14,3	7,1	4,3	8,9	11,6	100,0
65-74	Total	N	67.913	6.103	14.804	17.284	4.210	8.152	17.877	69.314	205.658
		%	33,0	3,0	7,2	8,4	2,0	4,0	8,7	33,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 142. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Ambos	65-74	Sin estudios, primaria	N	27.558	2.273	6.311	7.883	1.733	3.869	9.108	41.133	99.869
			%	27,6	2,3	6,3	7,9	1,7	3,9	9,1	41,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	14.078	690	3.059	3.119	669	1.778	4.020	16.330	43.744
			%	32,2	1,6	7,0	7,1	1,5	4,1	9,2	37,3	100,0
		Secundaria, superior	N	17.112	1.638	2.215	3.895	1.059	1.457	2.785	7.679	37.841
			%	45,2	4,3	5,9	10,3	2,8	3,8	7,4	20,3	100,0
		Terciaria	N	9.165	1.501	3.219	2.386	749	1.048	1.964	4.172	24.204
			%	37,9	6,2	13,3	9,9	3,1	4,3	8,1	17,2	100,0
	>=75	Total	N	67.838	3.994	5.979	6.159	4.904	5.284	21.361	112.314	227.832
			%	29,8	1,8	2,6	2,7	2,2	2,3	9,4	49,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	39.862	2.448	4.197	2.901	4.036	2.999	13.790	85.393	155.625
			%	25,6	1,6	2,7	1,9	2,6	1,9	8,9	54,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	12.516	689	658	1.307	534	876	5.722	16.559	38.860
			%	32,2	1,8	1,7	3,4	1,4	2,3	14,7	42,6	100,0
		Secundaria, superior	N	9.043	583	812	1.052	.	1.408	1.190	6.110	20.198
			%	44,8	2,9	4,0	5,2	.	7,0	5,9	30,3	100,0
		Terciaria	N	6.418	275	311	899	333	.	660	4.252	13.149
			%	48,8	2,1	2,4	6,8	2,5	.	5,0	32,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 143. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y territorio histórico

			<15	16-18	19-20	>=21	Total
Hombres Total	CAPV	N	60.796	337.623	106.264	75.455	580.138
		%	10,5	58,2	18,3	13,0	100,0
	Araba	N	11.476	53.063	15.463	7.566	87.568
		%	13,1	60,6	17,7	8,6	100,0
	Gipuzkoa	N	19.563	110.423	32.582	29.255	191.822
		%	10,2	57,6	17,0	15,3	100,0
	Bizkaia	N	29.758	174.137	58.219	38.633	300.747
		%	9,9	57,9	19,4	12,8	100,0
15-24	CAPV	N	6.182	28.632	4.651	325	39.790
		%	15,5	72,0	11,7	0,8	100,0
	Araba	N	1.347	5.176	552	.	7.075
		%	19,0	73,2	7,8	.	100,0
	Gipuzkoa	N	2.972	9.302	1.771	.	14.045
		%	21,2	66,2	12,6	.	100,0
	Bizkaia	N	1.863	14.154	2.328	325	18.670
		%	10,0	75,8	12,5	1,7	100,0
25-44	CAPV	N	20.416	128.006	28.603	18.239	195.263
		%	10,5	65,6	14,6	9,3	100,0
	Araba	N	4.273	22.601	2.909	1.508	31.291
		%	13,7	72,2	9,3	4,8	100,0
	Gipuzkoa	N	5.664	38.200	10.150	9.952	63.967
		%	8,9	59,7	15,9	15,6	100,0
	Bizkaia	N	10.478	67.205	15.544	6.779	100.006
		%	10,5	67,2	15,5	6,8	100,0
45-64	CAPV	N	21.837	118.143	45.581	36.263	221.824
		%	9,8	53,3	20,5	16,3	100,0
	Araba	N	3.464	16.375	8.333	4.090	32.262
		%	10,7	50,8	25,8	12,7	100,0
	Gipuzkoa	N	7.214	39.784	12.098	13.185	72.282
		%	10,0	55,0	16,7	18,2	100,0
	Bizkaia	N	11.159	61.984	25.150	18.988	117.280
		%	9,5	52,9	21,4	16,2	100,0
65-74	CAPV	N	6.419	38.006	14.922	11.787	71.134
		%	9,0	53,4	21,0	16,6	100,0
	Araba	N	1.471	4.677	2.362	1.287	9.796
		%	15,0	47,7	24,1	13,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 143. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y territorio histórico

			<15	16-18	19-20	>=21	Total		
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	2.583	14.150	4.692	3.682	25.108	
			%	10,3	56,4	18,7	14,7	100,0	
		Bizkaia	N	2.365	19.179	7.868	6.818	36.230	
			%	6,5	52,9	21,7	18,8	100,0	
	>=75	CAPV	N	5.942	24.835	12.507	8.841	52.125	
			%	11,4	47,6	24,0	17,0	100,0	
		Araba	N	921	4.235	1.307	682	7.144	
			%	12,9	59,3	18,3	9,5	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.129	8.986	3.870	2.436	16.421	
			%	6,9	54,7	23,6	14,8	100,0	
		Bizkaia	N	3.892	11.615	7.330	5.723	28.560	
			%	13,6	40,7	25,7	20,0	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	30.285	154.346	79.870	99.752	364.253
				%	8,3	42,4	21,9	27,4	100,0
		Araba	N	3.219	28.958	9.869	10.510	52.555	
			%	6,1	55,1	18,8	20,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	11.527	49.327	29.357	33.774	123.985	
			%	9,3	39,8	23,7	27,2	100,0	
		Bizkaia	N	15.540	76.061	40.644	55.468	187.713	
			%	8,3	40,5	21,7	29,5	100,0	
	15-24	CAPV	N	5.948	21.483	4.427	617	32.476	
			%	18,3	66,2	13,6	1,9	100,0	
		Araba	N	307	4.747	682	.	5.735	
			%	5,3	82,8	11,9	.	100,0	
Gipuzkoa		N	2.987	5.331	1.206	.	9.525		
		%	31,4	56,0	12,7	.	100,0		
Bizkaia		N	2.654	11.406	2.539	617	17.216		
		%	15,4	66,3	14,8	3,6	100,0		
25-44		CAPV	N	15.174	65.278	23.916	18.380	122.749	
			%	12,4	53,2	19,5	15,0	100,0	
	Araba	N	1.491	12.057	3.218	4.034	20.800		
		%	7,2	58,0	15,5	19,4	100,0		
	Gipuzkoa	N	5.450	22.548	6.727	4.445	39.170		
		%	13,9	57,6	17,2	11,3	100,0		
Bizkaia	N	8.233	30.674	13.971	9.901	62.779			
	%	13,1	48,9	22,3	15,8	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 143. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				<15	16-18	19-20	>=21	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	5.319	54.383	33.372	49.140	142.214
			%	3,7	38,2	23,5	34,6	100,0
		Araba	N	929	10.253	3.899	4.156	19.236
			%	4,8	53,3	20,3	21,6	100,0
		Gipuzkoa	N	1.450	16.606	12.603	18.502	49.161
			%	2,9	33,8	25,6	37,6	100,0
	Bizkaia	N	2.941	27.524	16.870	26.482	73.816	
		%	4,0	37,3	22,9	35,9	100,0	
	65-74	CAPV	N	1.794	6.037	9.805	17.334	34.969
			%	5,1	17,3	28,0	49,6	100,0
		Araba	N	282	1.170	1.430	794	3.676
			%	7,7	31,8	38,9	21,6	100,0
		Gipuzkoa	N	582	1.568	4.846	6.071	13.067
			%	4,5	12,0	37,1	46,5	100,0
	Bizkaia	N	930	3.299	3.529	10.469	18.227	
		%	5,1	18,1	19,4	57,4	100,0	
	>=75	CAPV	N	2.050	7.164	8.350	14.280	31.845
			%	6,4	22,5	26,2	44,8	100,0
Araba		N	211	731	641	1.526	3.108	
		%	6,8	23,5	20,6	49,1	100,0	
Gipuzkoa		N	1.058	3.275	3.974	4.755	13.061	
		%	8,1	25,1	30,4	36,4	100,0	
Bizkaia	N	782	3.159	3.735	7.999	15.675		
	%	5,0	20,2	23,8	51,0	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	91.081	491.968	186.134	175.206	944.390
			%	9,6	52,1	19,7	18,6	100,0
		Araba	N	14.695	82.021	25.332	18.076	140.123
			%	10,5	58,5	18,1	12,9	100,0
		Gipuzkoa	N	31.089	159.750	61.939	63.029	315.807
			%	9,8	50,6	19,6	20,0	100,0
	Bizkaia	N	45.297	250.198	98.863	94.101	488.459	
		%	9,3	51,2	20,2	19,3	100,0	
	15-24	CAPV	N	12.130	50.116	9.078	942	72.266
			%	16,8	69,3	12,6	1,3	100,0
	Araba	N	1.654	9.923	1.233	.	12.810	
		%	12,9	77,5	9,6	.	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 143. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y territorio histórico

			<15	16-18	19-20	>=21	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N 5.959	14.633	2.978	.	23.570
			% 25,3	62,1	12,6	.	100,0
		Bizkaia	N 4.517	25.560	4.867	942	35.886
			% 12,6	71,2	13,6	2,6	100,0
	25-44	CAPV	N 35.590	193.284	52.519	36.619	318.012
			% 11,2	60,8	16,5	11,5	100,0
		Araba	N 5.764	34.657	6.127	5.542	52.090
			% 11,1	66,5	11,8	10,6	100,0
		Gipuzkoa	N 11.115	60.748	16.878	14.397	103.137
			% 10,8	58,9	16,4	14,0	100,0
		Bizkaia	N 18.711	97.879	29.514	16.680	162.785
			% 11,5	60,1	18,1	10,2	100,0
	45-64	CAPV	N 27.157	172.525	78.954	85.403	364.038
			% 7,5	47,4	21,7	23,5	100,0
		Araba	N 4.393	26.628	12.232	8.245	51.499
			% 8,5	51,7	23,8	16,0	100,0
		Gipuzkoa	N 8.664	56.390	24.702	31.687	121.443
			% 7,1	46,4	20,3	26,1	100,0
		Bizkaia	N 14.099	89.507	42.020	45.470	191.096
			% 7,4	46,8	22,0	23,8	100,0
	65-74	CAPV	N 8.213	44.044	24.727	29.121	106.104
			% 7,7	41,5	23,3	27,4	100,0
		Araba	N 1.753	5.847	3.791	2.081	13.472
			% 13,0	43,4	28,1	15,4	100,0
		Gipuzkoa	N 3.165	15.719	9.539	9.753	38.175
			% 8,3	41,2	25,0	25,5	100,0
		Bizkaia	N 3.295	22.478	11.397	17.287	54.457
			% 6,1	41,3	20,9	31,7	100,0
	>=75	CAPV	N 7.992	32.000	20.857	23.121	83.970
			% 9,5	38,1	24,8	27,5	100,0
		Araba	N 1.132	4.965	1.948	2.208	10.253
			% 11,0	48,4	19,0	21,5	100,0
		Gipuzkoa	N 2.186	12.261	7.844	7.191	29.482
			% 7,4	41,6	26,6	24,4	100,0
		Bizkaia	N 4.674	14.773	11.066	13.722	44.235
			% 10,6	33,4	25,0	31,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y clase social

		<15	16-18	19-20	>=21	Total
Hombres	Total	N 60.498	337.019	106.165	75.455	579.137
		% 10,4	58,2	18,3	13,0	100,0
	I	N 5.451	48.740	14.915	10.151	79.257
		% 6,9	61,5	18,8	12,8	100,0
	II	N 3.758	29.787	6.611	8.513	48.670
		% 7,7	61,2	13,6	17,5	100,0
	III	N 10.350	68.492	25.970	18.525	123.337
		% 8,4	55,5	21,1	15,0	100,0
	IV	N 34.746	157.265	51.993	33.580	277.584
		% 12,5	56,7	18,7	12,1	100,0
	V	N 6.193	32.736	6.676	4.685	50.290
		% 12,3	65,1	13,3	9,3	100,0
	15-24 Total	N 5.884	28.632	4.651	325	39.492
		% 14,9	72,5	11,8	0,8	100,0
	I	N 770	5.933	.	.	6.703
		% 11,5	88,5	.	.	100,0
	II	N 430	3.454	2.176	.	6.060
		% 7,1	57,0	35,9	.	100,0
	III	N 1.088	4.374	464	.	5.926
		% 18,4	73,8	7,8	.	100,0
	IV	N 2.845	11.264	1.070	325	15.504
		% 18,4	72,7	6,9	2,1	100,0
	V	N 752	3.607	941	.	5.300
		% 14,2	68,1	17,8	.	100,0
	25-44 Total	N 20.416	128.006	28.603	18.239	195.263
		% 10,5	65,6	14,6	9,3	100,0
	I	N 2.286	18.893	4.653	2.907	28.738
		% 8,0	65,7	16,2	10,1	100,0
	II	N 1.812	13.578	858	2.066	18.314
		% 9,9	74,1	4,7	11,3	100,0
	III	N 3.201	24.948	6.243	3.688	38.080
		% 8,4	65,5	16,4	9,7	100,0
	IV	N 11.619	56.855	14.650	7.693	90.817
		% 12,8	62,6	16,1	8,5	100,0
	V	N 1.498	13.732	2.199	1.885	19.314
		% 7,8	71,1	11,4	9,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y clase social

		<15	16-18	19-20	>=21	Total
Hombres 45-64	Total	N 21.837	117.954	45.482	36.263	221.537
		% 9,9	53,2	20,5	16,4	100,0
I	N	1.654	17.115	6.877	4.725	30.371
	%	5,4	56,4	22,6	15,6	100,0
II	N	1.294	9.884	1.687	3.801	16.667
	%	7,8	59,3	10,1	22,8	100,0
III	N	3.152	23.980	12.644	10.096	49.872
	%	6,3	48,1	25,4	20,2	100,0
IV	N	13.054	56.319	22.387	15.593	107.352
	%	12,2	52,5	20,9	14,5	100,0
V	N	2.684	10.655	1.887	2.048	17.274
	%	15,5	61,7	10,9	11,9	100,0
65-74	Total	N 6.419	38.006	14.922	11.787	71.134
		% 9,0	53,4	21,0	16,6	100,0
I	N	596	5.919	1.986	2.069	10.571
	%	5,6	56,0	18,8	19,6	100,0
II	N	222	1.527	900	2.077	4.727
	%	4,7	32,3	19,0	44,0	100,0
III	N	1.506	9.714	3.575	2.395	17.190
	%	8,8	56,5	20,8	13,9	100,0
IV	N	3.368	19.287	7.234	4.964	34.853
	%	9,7	55,3	20,8	14,2	100,0
V	N	727	1.559	1.227	281	3.794
	%	19,2	41,1	32,3	7,4	100,0
>=75	Total	N 5.942	24.421	12.507	8.841	51.710
		% 11,5	47,2	24,2	17,1	100,0
I	N	146	879	1.399	449	2.874
	%	5,1	30,6	48,7	15,6	100,0
II	N	.	1.343	991	569	2.903
	%	.	46,3	34,1	19,6	100,0
III	N	1.404	5.475	3.043	2.346	12.269
	%	11,4	44,6	24,8	19,1	100,0
IV	N	3.860	13.540	6.652	5.005	29.057
	%	13,3	46,6	22,9	17,2	100,0
V	N	531	3.183	422	472	4.608
	%	11,5	69,1	9,2	10,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y clase social

		<15	16-18	19-20	>=21	Total
Mujeres	Total	Total N 30.078	154.092	79.870	99.752	363.792
		% 8,3	42,4	22,0	27,4	100,0
	I	N 3.893	23.710	9.364	16.729	53.697
		% 7,3	44,2	17,4	31,2	100,0
	II	N 5.284	17.945	5.971	12.431	41.631
		% 12,7	43,1	14,3	29,9	100,0
	III	N 4.449	44.151	25.072	27.232	100.904
		% 4,4	43,8	24,8	27,0	100,0
	IV	N 13.236	51.735	28.929	29.744	123.644
		% 10,7	41,8	23,4	24,1	100,0
	V	N 3.217	16.550	10.533	13.616	43.916
		% 7,3	37,7	24,0	31,0	100,0
	15-24 Total	N 5.741	21.230	4.427	617	32.015
		% 17,9	66,3	13,8	1,9	100,0
	I	N 1.050	4.581	787	337	6.755
		% 15,5	67,8	11,6	5,0	100,0
	II	N 1.805	1.485	692	.	3.983
		% 45,3	37,3	17,4	.	100,0
	III	N 1.208	6.881	1.135	280	9.505
		% 12,7	72,4	11,9	2,9	100,0
	IV	N 1.677	7.293	1.187	.	10.157
		% 16,5	71,8	11,7	.	100,0
	V	N .	989	626	.	1.615
		% .	61,2	38,8	.	100,0
	25-44 Total	N 15.174	65.278	23.916	18.380	122.749
		% 12,4	53,2	19,5	15,0	100,0
	I	N 1.970	12.027	3.229	1.950	19.176
		% 10,3	62,7	16,8	10,2	100,0
	II	N 2.133	9.774	2.364	2.022	16.292
		% 13,1	60,0	14,5	12,4	100,0
	III	N 1.942	16.685	6.504	5.128	30.259
		% 6,4	55,1	21,5	16,9	100,0
	IV	N 7.586	19.489	8.954	5.922	41.951
		% 18,1	46,5	21,3	14,1	100,0
	V	N 1.543	7.304	2.866	3.359	15.071
		% 10,2	48,5	19,0	22,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y clase social

			<15	16-18	19-20	>=21	Total
Mujeres	45-64	Total	N 5.319	54.383	33.372	49.140	142.214
			% 3,7	38,2	23,5	34,6	100,0
	I	N	601	6.672	4.428	9.746	21.447
		%	2,8	31,1	20,6	45,4	100,0
	II	N	766	5.172	1.170	8.028	15.137
		%	5,1	34,2	7,7	53,0	100,0
	III	N	805	16.674	12.221	14.113	43.814
		%	1,8	38,1	27,9	32,2	100,0
	IV	N	2.084	19.888	10.603	12.078	44.653
		%	4,7	44,5	23,7	27,0	100,0
	V	N	1.063	5.976	4.950	5.174	17.163
		%	6,2	34,8	28,8	30,1	100,0
	65-74	Total	N 1.794	6.037	9.805	17.334	34.969
			% 5,1	17,3	28,0	49,6	100,0
	I	N	106	257	510	2.549	3.422
		%	3,1	7,5	14,9	74,5	100,0
	II	N	317	464	1.142	715	2.638
		%	12,0	17,6	43,3	27,1	100,0
	III	N	494	2.340	2.844	4.982	10.661
		%	4,6	22,0	26,7	46,7	100,0
	IV	N	877	2.237	4.406	5.889	13.409
		%	6,5	16,7	32,9	43,9	100,0
	V	N	.	739	903	3.198	4.840
		%	.	15,3	18,6	66,1	100,0
	>=75	Total	N 2.050	7.164	8.350	14.280	31.845
			% 6,4	22,5	26,2	44,8	100,0
	I	N	166	174	410	2.147	2.897
		%	5,7	6,0	14,2	74,1	100,0
	II	N	263	1.050	603	1.666	3.582
		%	7,3	29,3	16,8	46,5	100,0
	III	N	.	1.570	2.368	2.728	6.665
		%	.	23,6	35,5	40,9	100,0
	IV	N	1.012	2.828	3.780	5.855	13.474
		%	7,5	21,0	28,1	43,5	100,0
	V	N	610	1.542	1.189	1.885	5.226
		%	11,7	29,5	22,8	36,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y clase social

		<15	16-18	19-20	>=21	Total
Ambos	Total	Total N 90.576	491.111	186.035	175.206	942.929
		% 9,6	52,1	19,7	18,6	100,0
	I	N 9.344	72.450	24.279	26.880	132.953
		% 7,0	54,5	18,3	20,2	100,0
	II	N 9.042	47.732	12.583	20.944	90.301
		% 10,0	52,9	13,9	23,2	100,0
	III	N 14.799	112.642	51.042	45.757	224.241
		% 6,6	50,2	22,8	20,4	100,0
	IV	N 47.982	209.000	80.922	63.324	401.228
		% 12,0	52,1	20,2	15,8	100,0
	V	N 9.409	49.286	17.210	18.301	94.206
		% 10,0	52,3	18,3	19,4	100,0
	15-24 Total	N 11.625	49.862	9.078	942	71.507
		% 16,3	69,7	12,7	1,3	100,0
	I	N 1.820	10.514	787	337	13.457
		% 13,5	78,1	5,8	2,5	100,0
	II	N 2.236	4.939	2.868	.	10.043
		% 22,3	49,2	28,6	.	100,0
	III	N 2.296	11.255	1.600	280	15.431
		% 14,9	72,9	10,4	1,8	100,0
	IV	N 4.522	18.557	2.256	325	25.661
		% 17,6	72,3	8,8	1,3	100,0
	V	N 752	4.596	1.567	.	6.915
		% 10,9	66,5	22,7	.	100,0
	25-44 Total	N 35.590	193.284	52.519	36.619	318.012
		% 11,2	60,8	16,5	11,5	100,0
	I	N 4.256	30.920	7.881	4.857	47.914
		% 8,9	64,5	16,4	10,1	100,0
	II	N 3.945	23.352	3.222	4.088	34.606
		% 11,4	67,5	9,3	11,8	100,0
	III	N 5.143	41.633	12.747	8.816	68.340
		% 7,5	60,9	18,7	12,9	100,0
	IV	N 19.205	76.344	23.604	13.615	132.768
		% 14,5	57,5	17,8	10,3	100,0
	V	N 3.042	21.035	5.065	5.243	34.385
		% 8,8	61,2	14,7	15,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y clase social

			<15	16-18	19-20	>=21	Total
Ambos	45-64	Total	N 27.157	172.337	78.855	85.403	363.751
			% 7,5	47,4	21,7	23,5	100,0
	I	N	2.254	23.788	11.305	14.472	51.818
		%	4,4	45,9	21,8	27,9	100,0
	II	N	2.060	15.056	2.858	11.829	31.803
		%	6,5	47,3	9,0	37,2	100,0
	III	N	3.957	40.654	24.866	24.209	93.686
		%	4,2	43,4	26,5	25,8	100,0
	IV	N	15.138	76.207	32.989	27.671	152.005
		%	10,0	50,1	21,7	18,2	100,0
	V	N	3.748	16.631	6.837	7.222	34.438
		%	10,9	48,3	19,9	21,0	100,0
	65-74	Total	N 8.213	44.044	24.727	29.121	106.104
		%	7,7	41,5	23,3	27,4	100,0
	I	N	702	6.176	2.497	4.618	13.993
		%	5,0	44,1	17,8	33,0	100,0
	II	N	539	1.992	2.042	2.792	7.365
		%	7,3	27,0	27,7	37,9	100,0
	III	N	2.000	12.054	6.419	7.378	27.850
		%	7,2	43,3	23,0	26,5	100,0
	IV	N	4.245	21.524	11.640	10.853	48.262
		%	8,8	44,6	24,1	22,5	100,0
	V	N	727	2.298	2.129	3.480	8.634
		%	8,4	26,6	24,7	40,3	100,0
	>=75	Total	N 7.992	31.585	20.857	23.121	83.555
		%	9,6	37,8	25,0	27,7	100,0
	I	N	312	1.053	1.809	2.596	5.770
		%	5,4	18,2	31,4	45,0	100,0
	II	N	263	2.394	1.593	2.235	6.484
		%	4,0	36,9	24,6	34,5	100,0
	III	N	1.404	7.046	5.410	5.074	18.934
		%	7,4	37,2	28,6	26,8	100,0
	IV	N	4.872	16.368	10.432	10.860	42.532
		%	11,5	38,5	24,5	25,5	100,0
	V	N	1.141	4.725	1.611	2.357	9.834
		%	11,6	48,0	16,4	24,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 145. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

		<15	16-18	19-20	>=21	Total
Hombres Total	Total	N 60.796	337.623	106.264	75.455	580.138
		% 10,5	58,2	18,3	13,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N 13.281	67.498	25.410	19.637	125.826
		% 10,6	53,6	20,2	15,6	100,0
	Secundaria, inferior	N 14.494	59.440	13.031	9.053	96.018
		% 15,1	61,9	13,6	9,4	100,0
	Secundaria, superior	N 24.804	135.134	46.176	27.353	233.467
		% 10,6	57,9	19,8	11,7	100,0
	Terciaria	N 8.217	75.550	21.647	19.411	124.825
		% 6,6	60,5	17,3	15,6	100,0
15-24	Total	N 6.182	28.632	4.651	325	39.790
		% 15,5	72,0	11,7	0,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N 261	1.331	.	.	1.591
		% 16,4	83,6	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N 1.850	5.246	501	.	7.597
		% 24,4	69,1	6,6	.	100,0
	Secundaria, superior	N 4.071	17.427	2.802	325	24.626
		% 16,5	70,8	11,4	1,3	100,0
	Terciaria	N .	4.629	1.348	.	5.976
		% .	77,5	22,5	.	100,0
25-44	Total	N 20.416	128.006	28.603	18.239	195.263
		% 10,5	65,6	14,6	9,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N 1.216	11.739	1.202	3.020	17.177
		% 7,1	68,3	7,0	17,6	100,0
	Secundaria, inferior	N 4.115	18.202	3.205	2.710	28.231
		% 14,6	64,5	11,4	9,6	100,0
	Secundaria, superior	N 10.137	60.929	17.391	7.426	95.883
		% 10,6	63,5	18,1	7,7	100,0
	Terciaria	N 4.948	37.137	6.805	5.083	53.973
		% 9,2	68,8	12,6	9,4	100,0
45-64	Total	N 21.837	118.143	45.581	36.263	221.824
		% 9,8	53,3	20,5	16,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N 4.760	25.203	10.846	7.605	48.413
		% 9,8	52,1	22,4	15,7	100,0
	Secundaria, inferior	N 5.988	22.638	6.758	4.133	39.517
		% 15,2	57,3	17,1	10,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 145. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

			<15	16-18	19-20	>=21	Total
Hombres 45-64	Secundaria, superior	N	8.587	44.013	18.974	14.978	86.551
		%	9,9	50,9	21,9	17,3	100,0
	Terciaria	N	2.503	26.289	9.004	9.547	47.343
		%	5,3	55,5	19,0	20,2	100,0
65-74	Total	N	6.419	38.006	14.922	11.787	71.134
		%	9,0	53,4	21,0	16,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.886	14.845	5.776	4.241	27.748
		%	10,4	53,5	20,8	15,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.165	7.079	1.634	1.005	10.883
		%	10,7	65,0	15,0	9,2	100,0
	Secundaria, superior	N	1.803	10.153	4.931	3.101	19.988
		%	9,0	50,8	24,7	15,5	100,0
	Terciaria	N	564	5.930	2.580	3.441	12.515
		%	4,5	47,4	20,6	27,5	100,0
>=75	Total	N	5.942	24.835	12.507	8.841	52.125
		%	11,4	47,6	24,0	17,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.158	14.381	7.586	4.771	30.897
		%	13,5	46,5	24,6	15,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.376	6.276	933	1.206	9.791
		%	14,1	64,1	9,5	12,3	100,0
	Secundaria, superior	N	206	2.613	2.078	1.523	6.420
		%	3,2	40,7	32,4	23,7	100,0
	Terciaria	N	202	1.565	1.910	1.341	5.018
		%	4,0	31,2	38,1	26,7	100,0
Total	Total	N	30.285	154.346	79.870	99.752	364.253
		%	8,3	42,4	21,9	27,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.599	20.023	19.231	23.692	67.544
		%	6,8	29,6	28,5	35,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	4.711	22.850	14.651	16.913	59.126
		%	8,0	38,6	24,8	28,6	100,0
	Secundaria, superior	N	13.314	60.760	25.775	31.302	131.151
		%	10,2	46,3	19,7	23,9	100,0
	Terciaria	N	7.662	50.713	20.213	27.844	106.432
		%	7,2	47,6	19,0	26,2	100,0
	Total	N	5.948	21.483	4.427	617	32.476
		%	18,3	66,2	13,6	1,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 145. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

			<15	16-18	19-20	>=21	Total
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N 439	241	.	.	680
			% 64,6	35,4	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N 1.177	3.446	223	.	4.846
			% 24,3	71,1	4,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N 3.204	12.927	2.629	280	19.041
			% 16,8	67,9	13,8	1,5	100,0
		Terciaria	N 1.128	4.869	1.575	337	7.909
			% 14,3	61,6	19,9	4,3	100,0
	25-44	Total	N 15.174	65.278	23.916	18.380	122.749
			% 12,4	53,2	19,5	15,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N .	3.826	2.350	1.908	8.083
			% .	47,3	29,1	23,6	100,0
		Secundaria, inferior	N 1.439	8.031	3.107	1.945	14.523
			% 9,9	55,3	21,4	13,4	100,0
		Secundaria, superior	N 8.782	22.076	8.398	7.278	46.534
			% 18,9	47,4	18,0	15,6	100,0
		Terciaria	N 4.954	31.346	10.061	7.249	53.609
			% 9,2	58,5	18,8	13,5	100,0
	45-64	Total	N 5.319	54.383	33.372	49.140	142.214
			% 3,7	38,2	23,5	34,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N 1.305	8.615	6.526	7.545	23.992
			% 5,4	35,9	27,2	31,4	100,0
		Secundaria, inferior	N 1.604	9.192	7.623	5.897	24.316
			% 6,6	37,8	31,4	24,3	100,0
		Secundaria, superior	N 1.222	22.883	12.532	18.996	55.633
			% 2,2	41,1	22,5	34,1	100,0
		Terciaria	N 1.188	13.692	6.690	16.702	38.273
			% 3,1	35,8	17,5	43,6	100,0
	65-74	Total	N 1.794	6.037	9.805	17.334	34.969
			% 5,1	17,3	28,0	49,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N 1.498	3.102	4.287	7.390	16.277
			% 9,2	19,1	26,3	45,4	100,0
		Secundaria, inferior	N 79	1.389	3.035	5.560	10.063
			% 0,8	13,8	30,2	55,2	100,0
		Secundaria, superior	N 106	1.231	1.100	2.436	4.873
			% 2,2	25,3	22,6	50,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 145. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				<15	16-18	19-20	>=21	Total
Mujeres	65-74	Terciaria	N	110	315	1.383	1.948	3.756
			%	2,9	8,4	36,8	51,9	100,0
	>=75	Total	N	2.050	7.164	8.350	14.280	31.845
			%	6,4	22,5	26,2	44,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.356	4.239	6.068	6.848	18.511
			%	7,3	22,9	32,8	37,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	413	792	662	3.511	5.378
			%	7,7	14,7	12,3	65,3	100,0
		Secundaria, superior	N	.	1.643	1.115	2.312	5.070
			%	.	32,4	22,0	45,6	100,0
		Terciaria	N	282	490	505	1.609	2.886
			%	9,8	17,0	17,5	55,8	100,0
Ambos	Total	Total	N	91.081	491.968	186.134	175.206	944.390
			%	9,6	52,1	19,7	18,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	17.880	87.520	44.642	43.329	193.370
			%	9,2	45,3	23,1	22,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	19.205	82.291	27.682	25.967	155.145
			%	12,4	53,0	17,8	16,7	100,0
		Secundaria, superior	N	38.118	195.894	71.950	58.655	364.618
			%	10,5	53,7	19,7	16,1	100,0
		Terciaria	N	15.878	126.263	41.860	47.255	231.257
			%	6,9	54,6	18,1	20,4	100,0
	15-24	Total	N	12.130	50.116	9.078	942	72.266
			%	16,8	69,3	12,6	1,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	700	1.571	.	.	2.272
			%	30,8	69,2	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.027	8.691	724	.	12.442
			%	24,3	69,9	5,8	.	100,0
		Secundaria, superior	N	7.276	30.355	5.432	605	43.667
			%	16,7	69,5	12,4	1,4	100,0
	Terciaria	N	1.128	9.498	2.923	337	13.885	
		%	8,1	68,4	21,0	2,4	100,0	
25-44	Total	N	35.590	193.284	52.519	36.619	318.012	
		%	11,2	60,8	16,5	11,5	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.216	15.564	3.552	4.928	25.261	
		%	4,8	61,6	14,1	19,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 145. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

			<15	16-18	19-20	>=21	Total	
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	5.553	26.233	6.312	4.655	42.753
			%	13,0	61,4	14,8	10,9	100,0
		Secundaria, superior	N	18.919	83.004	25.789	14.705	142.417
			%	13,3	58,3	18,1	10,3	100,0
		Terciaria	N	9.901	68.483	16.866	12.332	107.582
			%	9,2	63,7	15,7	11,5	100,0
	45-64	Total	N	27.157	172.525	78.954	85.403	364.038
			%	7,5	47,4	21,7	23,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.065	33.818	17.372	15.150	72.405
			%	8,4	46,7	24,0	20,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.592	31.830	14.381	10.031	63.833
			%	11,9	49,9	22,5	15,7	100,0
		Secundaria, superior	N	9.808	66.896	31.506	33.974	142.184
			%	6,9	47,0	22,2	23,9	100,0
		Terciaria	N	3.691	39.982	15.694	26.248	85.616
			%	4,3	46,7	18,3	30,7	100,0
	65-74	Total	N	8.213	44.044	24.727	29.121	106.104
			%	7,7	41,5	23,3	27,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.384	17.947	10.063	11.632	44.026
			%	10,0	40,8	22,9	26,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.245	8.468	4.669	6.565	20.947
			%	5,9	40,4	22,3	31,3	100,0
		Secundaria, superior	N	1.910	11.383	6.031	5.537	24.861
			%	7,7	45,8	24,3	22,3	100,0
		Terciaria	N	674	6.245	3.963	5.388	16.271
			%	4,1	38,4	24,4	33,1	100,0
	>=75	Total	N	7.992	32.000	20.857	23.121	83.970
			%	9,5	38,1	24,8	27,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.514	18.620	13.654	11.620	49.408
			%	11,2	37,7	27,6	23,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.789	7.068	1.595	4.717	15.169
			%	11,8	46,6	10,5	31,1	100,0
		Secundaria, superior	N	206	4.256	3.192	3.835	11.489
			%	1,8	37,0	27,8	33,4	100,0
		Terciaria	N	484	2.055	2.415	2.950	7.904
			%	6,1	26,0	30,6	37,3	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 146. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	18,0	26,2	9,0	0,0	26,0
		Araba	16,6	18,9	9,0	0,0	23,0
		Gipuzkoa	19,2	25,7	10,0	0,0	28,0
		Bizkaia	17,6	29,4	7,0	0,0	26,0
	15-24	CAPV	7,6	18,6	0,0	0,0	9,0
		Araba	9,2	18,8	0,0	0,0	9,0
		Gipuzkoa	7,3	14,1	0,0	0,0	10,0
		Bizkaia	7,3	22,0	0,0	0,0	9,0
	25-44	CAPV	11,9	23,3	4,0	0,0	16,0
		Araba	11,4	17,4	6,0	0,0	16,0
		Gipuzkoa	13,3	23,2	6,0	0,0	18,0
		Bizkaia	11,2	25,8	3,0	0,0	12,0
	45-64	CAPV	24,9	29,1	18,0	0,0	36,0
		Araba	23,9	22,0	17,0	1,0	36,0
		Gipuzkoa	26,3	28,8	18,0	0,0	36,0
		Bizkaia	24,3	32,4	17,0	0,0	36,0
	65-74	CAPV	27,4	24,3	18,0	0,0	39,0
		Araba	20,8	12,6	18,0	0,0	36,0
		Gipuzkoa	28,3	24,3	21,0	4,0	40,0
		Bizkaia	28,5	28,2	18,0	0,0	42,0
>=75	CAPV	18,2	21,1	18,0	0,0	26,0	
	Araba	17,6	13,3	18,0	0,0	26,0	
	Gipuzkoa	19,8	20,6	18,0	0,0	28,0	
	Bizkaia	17,5	24,0	14,0	0,0	26,0	
Mujeres	Total	CAPV	6,7	12,8	0,0	0,0	9,0
		Araba	6,4	10,7	0,0	0,0	9,0
		Gipuzkoa	7,2	11,8	0,0	0,0	12,0
		Bizkaia	6,5	14,5	0,0	0,0	7,0
	15-24	CAPV	4,7	11,2	0,0	0,0	5,0
		Araba	5,4	7,4	0,0	0,0	9,0
		Gipuzkoa	4,1	8,9	0,0	0,0	4,0
		Bizkaia	4,8	14,0	0,0	0,0	3,0
	25-44	CAPV	5,4	14,0	0,0	0,0	7,0
		Araba	7,4	17,0	0,0	0,0	9,0
		Gipuzkoa	5,9	13,0	0,0	0,0	9,0
		Bizkaia	4,6	12,8	0,0	0,0	5,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 146. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	45-64	CAPV	9,5	14,0	0,0	0,0	15,0
		Araba	7,1	8,5	0,0	0,0	11,0
		Gipuzkoa	9,7	12,6	0,0	0,0	18,0
		Bizkaia	9,9	17,1	0,0	0,0	18,0
	65-74	CAPV	6,9	12,1	0,0	0,0	10,0
		Araba	5,0	7,3	0,0	0,0	1,0
		Gipuzkoa	8,1	11,7	0,0	0,0	18,0
		Bizkaia	6,7	13,7	0,0	0,0	5,0
	>=75	CAPV	4,5	8,6	0,0	0,0	0,0
		Araba	3,8	6,2	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	5,7	8,8	0,0	0,0	10,0
		Bizkaia	4,0	9,2	0,0	0,0	0,0
Ambos sexos	Total	CAPV	12,1	20,9	0,0	0,0	18,0
		Araba	11,4	15,7	3,0	0,0	18,0
		Gipuzkoa	13,0	20,3	3,0	0,0	18,0
		Bizkaia	11,8	23,4	0,0	0,0	18,0
	15-24	CAPV	6,2	15,4	0,0	0,0	7,0
		Araba	7,4	14,5	0,0	0,0	9,0
		Gipuzkoa	5,8	11,9	0,0	0,0	7,0
		Bizkaia	6,1	18,2	0,0	0,0	6,0
	25-44	CAPV	8,7	19,6	0,0	0,0	11,0
		Araba	9,4	17,3	3,0	0,0	13,0
		Gipuzkoa	9,7	19,5	0,0	0,0	14,0
		Bizkaia	7,9	20,8	0,0	0,0	9,0
	45-64	CAPV	17,0	23,4	8,0	0,0	25,0
		Araba	15,3	17,4	6,0	0,0	21,0
		Gipuzkoa	17,9	22,8	9,0	0,0	26,0
		Bizkaia	17,0	26,4	6,0	0,0	24,0
	65-74	CAPV	16,4	20,7	3,0	0,0	23,0
		Araba	12,6	11,7	0,0	0,0	21,0
		Gipuzkoa	17,6	20,4	6,0	0,0	24,0
		Bizkaia	16,7	23,8	0,0	0,0	26,0
>=75	CAPV	9,7	15,7	0,0	0,0	18,0	
	Araba	9,2	10,7	0,0	0,0	18,0	
	Gipuzkoa	10,8	15,1	0,0	0,0	18,0	
	Bizkaia	9,1	17,9	0,0	0,0	18,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 147. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Hombres	Total	Total	18,0	26,2	9,0	0,0	26,0	
		I	18,8	25,5	10,0	0,0	26,0	
		II	16,4	25,4	7,0	0,0	25,0	
		III	20,1	27,8	10,0	0,0	28,0	
		IV	17,4	25,2	8,0	0,0	26,0	
		V	16,8	29,1	6,0	0,0	23,0	
		15-24	Total	7,6	18,7	0,0	0,0	9,0
			I	8,8	23,8	0,0	0,0	10,0
			II	6,9	11,9	3,0	0,0	11,0
			III	5,1	10,5	0,0	0,0	9,0
			IV	6,4	15,6	0,0	0,0	6,0
			V	17,5	33,3	6,0	0,0	24,0
		25-44	Total	11,9	23,3	4,0	0,0	16,0
			I	13,0	21,0	6,0	0,0	18,0
			II	10,1	18,1	4,0	0,0	15,0
			III	12,9	24,8	4,0	0,0	14,0
			IV	11,8	23,4	3,0	0,0	16,0
			V	11,1	26,5	3,0	0,0	12,0
		45-64	Total	24,9	29,1	18,0	0,0	36,0
			I	26,4	28,8	18,0	5,0	36,0
			II	25,6	29,2	14,0	0,0	43,0
			III	27,7	30,5	19,0	3,0	40,0
			IV	23,4	27,9	17,0	0,0	36,0
			V	24,0	32,9	12,0	0,0	36,0
		65-74	Total	27,4	24,3	18,0	0,0	39,0
			I	26,3	22,4	18,0	5,0	36,0
			II	31,0	29,6	26,0	0,0	45,0
			III	31,2	26,1	21,0	5,0	49,0
			IV	26,1	23,1	18,0	0,0	36,0
			V	21,2	23,9	10,0	0,0	36,0
	>=75	Total	18,1	21,1	18,0	0,0	26,0	
		I	21,7	13,7	18,0	18,0	36,0	
		II	15,2	16,3	12,0	0,0	21,0	
		III	18,4	23,9	18,0	0,0	28,0	
		IV	18,0	20,7	18,0	0,0	26,0	
		V	18,2	20,4	18,0	0,0	18,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 147. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Mujeres	Total	Total	6,7	12,8	0,0	9,0	
		I	10,0	16,7	3,0	15,0	
		II	7,4	14,2	0,0	11,0	
		III	7,8	13,1	0,0	12,0	
		IV	5,8	11,7	0,0	6,0	
		V	4,5	11,1	0,0	1,0	
		15-24	Total	4,6	10,8	0,0	5,0
			I	7,9	15,3	0,0	9,0
			II	5,9	15,4	0,0	5,0
			III	4,9	8,5	0,0	6,0
			IV	3,1	7,9	0,0	3,0
			V	1,5	4,9	0,0	0,0
		25-44	Total	5,4	14,0	0,0	7,0
			I	6,4	14,7	0,0	9,0
			II	5,5	16,5	0,0	7,0
			III	5,9	13,5	0,0	8,0
			IV	4,8	12,5	0,0	6,0
			V	5,1	15,2	0,0	5,0
		45-64	Total	9,5	14,0	0,0	15,0
			I	16,3	18,7	9,0	26,0
			II	11,1	13,6	3,0	18,0
			III	10,8	15,0	0,0	18,0
			IV	8,4	12,7	0,0	15,0
			V	5,0	10,4	0,0	3,0
		65-74	Total	6,9	12,1	0,0	10,0
			I	8,8	12,6	0,0	18,0
			II	7,6	10,9	0,0	18,0
			III	9,7	11,0	0,0	18,0
			IV	6,0	12,5	0,0	1,0
		V	5,2	12,2	0,0	0,0	
	>=75	Total	4,5	8,6	0,0	0,0	
		I	9,7	11,7	0,0	18,0	
		II	6,8	9,9	0,0	18,0	
		III	4,6	8,2	0,0	0,0	
		IV	4,3	8,5	0,0	0,0	
		V	3,3	7,8	0,0	0,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 147. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Ambos sexos	Total	12,1	20,9	0,0	0,0	18,0	
	I	14,6	22,3	6,0	0,0	21,0	
	II	11,5	20,3	3,0	0,0	17,0	
	III	13,2	21,5	3,0	0,0	18,0	
	IV	12,2	20,8	0,0	0,0	18,0	
	V	8,6	18,9	0,0	0,0	10,0	
	15-24	Total	6,1	15,3	0,0	0,0	7,0
	I	8,4	19,8	0,0	0,0	10,0	
	II	6,3	14,0	0,0	0,0	9,0	
	III	5,0	9,4	0,0	0,0	7,0	
	IV	5,0	12,7	0,0	0,0	4,0	
V	9,5	25,5	0,0	0,0	8,0		
25-44	Total	8,7	19,6	0,0	0,0	11,0	
I	9,6	18,5	3,0	0,0	13,0		
II	7,7	17,4	0,0	0,0	10,0		
III	8,9	19,5	0,0	0,0	11,0		
IV	8,9	20,1	0,0	0,0	12,0		
V	7,8	21,2	0,0	0,0	9,0		
45-64	Total	17,1	23,4	8,0	0,0	25,0	
I	21,8	24,8	15,0	0,0	32,0		
II	17,8	23,1	9,0	0,0	28,0		
III	18,0	23,8	9,0	0,0	26,0		
IV	17,3	23,6	8,0	0,0	25,0		
V	10,4	20,2	0,0	0,0	11,0		
65-74	Total	16,4	20,7	3,0	0,0	23,0	
I	20,3	21,3	15,0	0,0	27,0		
II	19,0	24,1	3,0	0,0	36,0		
III	20,2	21,8	12,0	0,0	36,0		
IV	15,8	20,4	0,0	0,0	21,0		
V	8,4	16,0	0,0	0,0	10,0		
>=75	Total	9,7	15,7	0,0	0,0	18,0	
I	14,3	13,4	15,0	0,0	21,0		
II	9,3	12,6	0,0	0,0	18,0		
III	10,5	17,7	0,0	0,0	18,0		
IV	10,2	16,2	0,0	0,0	18,0		
V	6,1	12,3	0,0	0,0	0,0		

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 148. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Hombres	Total	Total	18,0	26,2	9,0	0,0	26,0
		Sin estudios, primaria	19,2	24,3	9,0	0,0	32,0
		Secundaria, inferior	15,4	26,0	5,0	0,0	19,0
		Secundaria, superior	17,9	27,1	9,0	0,0	26,0
		Terciaria	19,2	27,0	11,0	0,0	28,0
	15-24	Total	7,6	18,6	0,0	0,0	9,0
		Sin estudios, primaria	1,3	4,9	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	5,9	19,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	9,9	19,8	4,0	0,0	12,0
		Terciaria	9,1	19,2	3,0	0,0	11,0
	25-44	Total	11,9	23,3	4,0	0,0	16,0
		Sin estudios, primaria	10,3	22,6	0,0	0,0	15,0
		Secundaria, inferior	10,2	24,5	3,0	0,0	12,0
		Secundaria, superior	12,3	23,9	6,0	0,0	15,0
		Terciaria	13,0	21,4	6,0	0,0	18,0
	45-64	Total	24,9	29,1	18,0	0,0	36,0
		Sin estudios, primaria	25,7	29,6	18,0	0,0	38,0
		Secundaria, inferior	23,2	30,5	16,0	0,0	31,0
		Secundaria, superior	24,9	28,4	18,0	0,0	36,0
		Terciaria	25,4	28,6	18,0	3,0	36,0
	65-74	Total	27,4	24,3	18,0	0,0	39,0
		Sin estudios, primaria	22,9	19,1	18,0	0,0	36,0
		Secundaria, inferior	22,8	21,6	18,0	0,0	30,0
		Secundaria, superior	32,8	26,8	26,0	5,0	51,0
		Terciaria	34,1	31,9	22,0	5,0	49,0
	>=75	Total	18,2	21,1	18,0	0,0	26,0
		Sin estudios, primaria	17,5	20,2	10,0	0,0	28,0
		Secundaria, inferior	18,2	18,1	18,0	0,0	21,0
		Secundaria, superior	22,1	30,1	18,0	0,0	33,0
		Terciaria	18,1	16,5	18,0	0,0	21,0
Total	Total	6,7	12,8	0,0	0,0	9,0	
	Sin estudios, primaria	5,2	11,3	0,0	0,0	0,0	
	Secundaria, inferior	6,1	12,1	0,0	0,0	7,0	
	Secundaria, superior	7,0	12,8	0,0	0,0	10,0	
	Terciaria	8,5	15,6	0,0	0,0	12,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 148. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Mujeres	15-24	Total	4,7	11,2	0,0	0,0	5,0
		Sin estudios, primaria	0,7	3,6	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	1,9	5,1	0,0	0,0	3,0
		Secundaria, superior	5,4	13,1	0,0	0,0	6,0
		Terciaria	8,4	12,3	0,0	0,0	16,0
	25-44	Total	5,4	14,0	0,0	0,0	7,0
		Sin estudios, primaria	6,4	16,8	0,0	0,0	6,0
		Secundaria, inferior	5,8	19,0	0,0	0,0	4,0
		Secundaria, superior	4,6	10,2	0,0	0,0	6,0
		Terciaria	5,9	15,1	0,0	0,0	8,0
	45-64	Total	9,5	14,0	0,0	0,0	15,0
		Sin estudios, primaria	6,4	12,3	0,0	0,0	7,0
		Secundaria, inferior	7,8	12,2	0,0	0,0	11,0
		Secundaria, superior	10,1	14,1	1,0	0,0	18,0
		Terciaria	13,6	16,7	6,0	0,0	21,0
	65-74	Total	6,9	12,1	0,0	0,0	10,0
		Sin estudios, primaria	6,5	12,9	0,0	0,0	3,0
		Secundaria, inferior	7,0	10,4	0,0	0,0	15,0
		Secundaria, superior	7,4	10,5	0,0	0,0	15,0
		Terciaria	8,5	12,3	0,0	0,0	18,0
>=75	Total	4,5	8,6	0,0	0,0	0,0	
	Sin estudios, primaria	3,7	8,1	0,0	0,0	0,0	
	Secundaria, inferior	3,9	7,5	0,0	0,0	0,0	
	Secundaria, superior	11,0	12,0	5,0	0,0	18,0	
	Terciaria	9,0	9,9	0,0	0,0	18,0	
Ambos sexos	Total	Total	12,1	20,9	0,0	0,0	18,0
		Sin estudios, primaria	11,2	18,9	0,0	0,0	18,0
		Secundaria, inferior	10,7	20,2	0,0	0,0	18,0
		Secundaria, superior	12,9	22,2	3,0	0,0	18,0
		Terciaria	13,3	22,2	5,0	0,0	18,0
	15-24	Total	6,2	15,4	0,0	0,0	7,0
		Sin estudios, primaria	1,0	4,2	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	4,5	15,2	0,0	0,0	3,0
		Secundaria, superior	7,6	16,7	0,0	0,0	10,0
		Terciaria	8,6	15,1	3,0	0,0	13,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 148. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos 25-44	Total	8,7	19,6	0,0	0,0	11,0
	Sin estudios, primaria	8,7	20,4	0,0	0,0	8,0
	Secundaria, inferior	8,3	22,4	0,0	0,0	9,0
	Secundaria, superior	8,9	19,5	0,0	0,0	12,0
	Terciaria	8,7	18,3	2,0	0,0	11,0
45-64	Total	17,0	23,4	8,0	0,0	25,0
	Sin estudios, primaria	15,6	23,5	0,0	0,0	23,0
	Secundaria, inferior	15,0	23,1	5,0	0,0	20,0
	Secundaria, superior	17,7	23,3	9,0	0,0	26,0
	Terciaria	19,4	23,7	12,0	0,0	28,0
65-74	Total	16,4	20,7	3,0	0,0	23,0
	Sin estudios, primaria	12,7	16,9	0,0	0,0	18,0
	Secundaria, inferior	12,9	17,1	0,0	0,0	18,0
	Secundaria, superior	24,8	25,1	18,0	0,0	36,0
	Terciaria	24,9	28,8	16,0	0,0	36,0
>=75	Total	9,7	15,7	0,0	0,0	18,0
	Sin estudios, primaria	8,5	14,8	0,0	0,0	18,0
	Secundaria, inferior	9,1	13,7	0,0	0,0	18,0
	Secundaria, superior	16,8	23,6	8,0	0,0	21,0
	Terciaria	13,8	14,2	18,0	0,0	18,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 149. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Hombres	Total	CAPV	N	12.612	133.201	434.324	580.138
			%	2,2	23,0	74,9	100,0
		Araba	N	1.866	15.414	70.288	87.568
			%	2,1	17,6	80,3	100,0
		Gipuzkoa	N	3.257	37.642	150.923	191.822
			%	1,7	19,6	78,7	100,0
		Bizkaia	N	7.488	80.145	213.113	300.747
			%	2,5	26,6	70,9	100,0
	15-24	CAPV	N	4.206	5.580	30.004	39.790
			%	10,6	14,0	75,4	100,0
		Araba	N	357	1.273	5.445	7.075
			%	5,0	18,0	77,0	100,0
		Gipuzkoa	N	974	2.102	10.970	14.045
			%	6,9	15,0	78,1	100,0
		Bizkaia	N	2.875	2.206	13.589	18.670
			%	15,4	11,8	72,8	100,0
	25-44	CAPV	N	5.589	51.972	137.703	195.263
			%	2,9	26,6	70,5	100,0
		Araba	N	958	6.649	23.684	31.291
			%	3,1	21,2	75,7	100,0
		Gipuzkoa	N	1.360	11.855	50.752	63.967
			%	2,1	18,5	79,3	100,0
		Bizkaia	N	3.271	33.468	63.266	100.006
			%	3,3	33,5	63,3	100,0
	45-64	CAPV	N	2.136	48.173	171.515	221.824
			%	1,0	21,7	77,3	100,0
		Araba	N	467	4.584	27.211	32.262
			%	1,4	14,2	84,3	100,0
		Gipuzkoa	N	513	14.892	56.877	72.282
			%	0,7	20,6	78,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 149. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total	
Hombres	45-64	Bizkaia	N	1.156	28.697	87.428	117.280	
			%	1,0	24,5	74,5	100,0	
	65-74	CAPV	N	339	16.134	54.661	71.134	
			%	0,5	22,7	76,8	100,0	
		Araba	N	.	1.218	8.578	9.796	
			%	.	12,4	87,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	153	6.118	18.838	25.108	
			%	0,6	24,4	75,0	100,0	
	Bizkaia	N	186	8.799	27.245	36.230		
		%	0,5	24,3	75,2	100,0		
	>=75	CAPV	N	343	11.342	40.441	52.125	
			%	0,7	21,8	77,6	100,0	
		Araba	N	84	1.690	5.370	7.144	
			%	1,2	23,7	75,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	259	2.676	13.486	16.421	
			%	1,6	16,3	82,1	100,0	
		Bizkaia	N	.	6.975	21.585	28.560	
			%	.	24,4	75,6	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	13.392	66.654	284.207	364.253
				%	3,7	18,3	78,0	100,0
	Araba	N	791	8.967	42.797	52.555		
		%	1,5	17,1	81,4	100,0		
	Gipuzkoa	N	2.894	20.807	100.284	123.985		
		%	2,3	16,8	80,9	100,0		
	Bizkaia	N	9.707	36.880	141.126	187.713		
		%	5,2	19,6	75,2	100,0		
	15-24	CAPV	N	2.140	9.301	21.035	32.476	
			%	6,6	28,6	64,8	100,0	
		Araba	N	293	688	4.754	5.735	
			%	5,1	12,0	82,9	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 149. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total	
Mujeres	15-24	Gipuzkoa	N	270	3.922	5.333	9.525	
			%	2,8	41,2	56,0	100,0	
		Bizkaia	N	1.577	4.691	10.948	17.216	
	%		9,2	27,2	63,6	100,0		
		25-44	CAPV	N	5.957	33.174	83.618	122.749
	%			4,9	27,0	68,1	100,0	
		Araba	N	498	5.272	15.030	20.800	
	%		2,4	25,3	72,3	100,0		
		Gipuzkoa	N	919	9.897	28.354	39.170	
	%		2,3	25,3	72,4	100,0		
		Bizkaia	N	4.540	18.005	40.235	62.779	
	%		7,2	28,7	64,1	100,0		
		45-64	CAPV	N	4.669	16.944	120.601	142.214
	%			3,3	11,9	84,8	100,0	
		Araba	N	.	2.521	16.715	19.236	
	%		.	13,1	86,9	100,0		
		Gipuzkoa	N	1.705	5.615	41.841	49.161	
	%		3,5	11,4	85,1	100,0		
		Bizkaia	N	2.964	8.808	62.044	73.816	
	%		4,0	11,9	84,1	100,0		
		65-74	CAPV	N	280	4.285	30.405	34.969
	%			0,8	12,3	86,9	100,0	
		Araba	N	.	387	3.289	3.676	
	%		.	10,5	89,5	100,0		
	Gipuzkoa	N	.	618	12.449	13.067		
%		.	4,7	95,3	100,0			
	Bizkaia	N	280	3.281	14.666	18.227		
%		1,5	18,0	80,5	100,0			
	>=75	CAPV	N	347	2.950	28.548	31.845	
%			1,1	9,3	89,6	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 149. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total	
Mujeres	>=75	Araba	N	.	100	3.009	3.108	
			%	.	3,2	96,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	.	755	12.307	13.061	
			%	.	5,8	94,2	100,0	
		Bizkaia	N	347	2.096	13.233	15.675	
			%	2,2	13,4	84,4	100,0	
	Ambos	Total	CAPV	N	26.004	199.855	718.531	944.390
				%	2,8	21,2	76,1	100,0
		Araba	N	2.657	24.381	113.085	140.123	
			%	1,9	17,4	80,7	100,0	
		Gipuzkoa	N	6.151	58.449	251.207	315.807	
			%	1,9	18,5	79,5	100,0	
		Bizkaia	N	17.195	117.025	354.239	488.459	
			%	3,5	24,0	72,5	100,0	
		15-24	CAPV	N	6.346	14.881	51.039	72.266
				%	8,8	20,6	70,6	100,0
		Araba	N	650	1.960	10.199	12.810	
			%	5,1	15,3	79,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.243	6.023	16.303	23.570	
			%	5,3	25,6	69,2	100,0	
		Bizkaia	N	4.452	6.897	24.537	35.886	
			%	12,4	19,2	68,4	100,0	
	25-44	CAPV	N	11.545	85.146	221.321	318.012	
			%	3,6	26,8	69,6	100,0	
	Araba	N	1.455	11.921	38.714	52.090		
		%	2,8	22,9	74,3	100,0		
	Gipuzkoa	N	2.279	21.752	79.106	103.137		
		%	2,2	21,1	76,7	100,0		
	Bizkaia	N	7.811	51.473	103.501	162.785		
		%	4,8	31,6	63,6	100,0		
	45-64	CAPV	N	6.805	65.117	292.116	364.038	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 149. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Ambos	45-64	CAPV	%	1,9	17,9	80,2	100,0
		Araba	N	467	7.105	43.926	51.499
			%	0,9	13,8	85,3	100,0
		Gipuzkoa	N	2.218	20.507	98.718	121.443
			%	1,8	16,9	81,3	100,0
		Bizkaia	N	4.120	37.505	149.472	191.096
	%		2,2	19,6	78,2	100,0	
	65-74	CAPV	N	619	20.419	85.066	106.104
		%	0,6	19,2	80,2	100,0	
		Araba	N	.	1.604	11.868	13.472
			%	.	11,9	88,1	100,0
		Gipuzkoa	N	153	6.735	31.287	38.175
			%	0,4	17,6	82,0	100,0
	Bizkaia	N	466	12.079	41.911	54.457	
		%	0,9	22,2	77,0	100,0	
	>=75	CAPV	N	689	14.292	68.989	83.970
		%	0,8	17,0	82,2	100,0	
		Araba	N	84	1.790	8.379	10.253
%			0,8	17,5	81,7	100,0	
Gipuzkoa		N	259	3.431	25.792	29.482	
		%	0,9	11,6	87,5	100,0	
Bizkaia	N	347	9.071	34.818	44.235		
	%	0,8	20,5	78,7	100,0		

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 150. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Hombres	Total	Total	N	12.314	133.013	433.810	579.137
			%	2,1	23,0	74,9	100,0
		I	N	2.071	13.492	63.694	79.257
			%	2,6	17,0	80,4	100,0
		II	N	1.956	9.349	37.364	48.670
			%	4,0	19,2	76,8	100,0
		III	N	4.046	29.082	90.209	123.337
			%	3,3	23,6	73,1	100,0
		IV	N	4.136	68.545	204.903	277.584
			%	1,5	24,7	73,8	100,0
		V	N	104	12.545	37.641	50.290
			%	0,2	24,9	74,8	100,0
	15-24	Total	N	3.908	5.580	30.004	39.492
			%	9,9	14,1	76,0	100,0
		I	N	896	.	5.806	6.703
			%	13,4	.	86,6	100,0
		II	N	268	810	4.982	6.060
			%	4,4	13,4	82,2	100,0
		III	N	1.121	528	4.277	5.926
			%	18,9	8,9	72,2	100,0
		IV	N	1.623	2.400	11.481	15.504
			%	10,5	15,5	74,1	100,0
		V	N	.	1.842	3.458	5.300
			%	.	34,8	65,2	100,0
	25-44	Total	N	5.589	51.972	137.703	195.263
			%	2,9	26,6	70,5	100,0
		I	N	494	6.254	21.990	28.738
			%	1,7	21,8	76,5	100,0
		II	N	1.558	4.223	12.533	18.314
			%	8,5	23,1	68,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 150. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Hombres	25-44	III	N	2.474	10.518	25.089	38.080
			%	6,5	27,6	65,9	100,0
		IV	N	1.062	25.793	63.962	90.817
			%	1,2	28,4	70,4	100,0
		V	N	.	5.186	14.128	19.314
			%	.	26,9	73,1	100,0
	45-64	Total	N	2.136	47.984	171.416	221.537
			%	1,0	21,7	77,4	100,0
		I	N	680	4.396	25.295	30.371
			%	2,2	14,5	83,3	100,0
		II	N	131	2.374	14.162	16.667
			%	0,8	14,2	85,0	100,0
		III	N	265	11.304	38.303	49.872
			%	0,5	22,7	76,8	100,0
		IV	N	955	25.859	80.538	107.352
			%	0,9	24,1	75,0	100,0
		V	N	104	4.052	13.118	17.274
			%	0,6	23,5	75,9	100,0
65-74	Total	N	339	16.134	54.661	71.134	
		%	0,5	22,7	76,8	100,0	
	I	N	.	2.065	8.506	10.571	
		%	.	19,5	80,5	100,0	
	II	N	.	1.381	3.346	4.727	
		%	.	29,2	70,8	100,0	
	III	N	186	3.572	13.431	17.190	
		%	1,1	20,8	78,1	100,0	
	IV	N	153	8.746	25.955	34.853	
		%	0,4	25,1	74,5	100,0	
	V	N	.	371	3.423	3.794	
		%	.	9,8	90,2	100,0	
>=75	Total	N	343	11.342	40.026	51.710	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 150. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total	
Hombres >=75	Total	%		0,7	21,9	77,4	100,0	
	I	N		.	777	2.096	2.874	
		%		.	27,1	72,9	100,0	
	II	N		.	562	2.341	2.903	
		%		.	19,4	80,6	100,0	
	III	N		.	3.161	9.108	12.269	
		%		.	25,8	74,2	100,0	
	IV	N		343	5.748	22.967	29.057	
		%		1,2	19,8	79,0	100,0	
	V	N		.	1.094	3.514	4.608	
%			.	23,7	76,3	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	13.392	66.447	283.953	363.792	
			%	3,7	18,3	78,1	100,0	
	I	Total	N	3.091	12.634	37.972	53.697	
			%	5,8	23,5	70,7	100,0	
	II	Total	N	892	9.023	31.715	41.631	
			%	2,1	21,7	76,2	100,0	
	III	Total	N	2.808	17.443	80.654	100.904	
			%	2,8	17,3	79,9	100,0	
	IV	Total	N	5.134	21.713	96.797	123.644	
			%	4,2	17,6	78,3	100,0	
	V	Total	N	1.467	5.633	36.815	43.916	
			%	3,3	12,8	83,8	100,0	
	15-24	Total	N	2.140	9.094	20.781	32.015	
			%	6,7	28,4	64,9	100,0	
		I	Total	N	876	2.735	3.143	6.755
				%	13,0	40,5	46,5	100,0
		II	Total	N	270	1.070	2.643	3.983
				%	6,8	26,9	66,4	100,0
III	Total	N	463	1.446	7.596	9.505		
	%		4,9	15,2	79,9	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 150. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	15-24	IV	N	385	3.510	6.262	10.157
			%	3,8	34,6	61,7	100,0
		V	N	147	332	1.137	1.615
	%		9,1	20,6	70,4	100,0	
		25-44	Total N	5.957	33.174	83.618	122.749
	%		4,9	27,0	68,1	100,0	
		I	N	382	6.532	12.262	19.176
	%		2,0	34,1	63,9	100,0	
		II	N	197	4.822	11.274	16.292
	%		1,2	29,6	69,2	100,0	
		III	N	1.258	9.512	19.489	30.259
	%		4,2	31,4	64,4	100,0	
		IV	N	3.137	9.372	29.441	41.951
	%		7,5	22,3	70,2	100,0	
		V	N	983	2.936	11.153	15.071
	%		6,5	19,5	74,0	100,0	
		45-64	Total N	4.669	16.944	120.601	142.214
	%		3,3	11,9	84,8	100,0	
		I	N	1.833	2.407	17.207	21.447
	%		8,5	11,2	80,2	100,0	
		II	N	426	1.914	12.797	15.137
	%		2,8	12,6	84,5	100,0	
		III	N	920	4.138	38.756	43.814
	%		2,1	9,4	88,5	100,0	
	IV	N	1.152	6.796	36.705	44.653	
%		2,6	15,2	82,2	100,0		
	V	N	338	1.690	15.135	17.163	
%		2,0	9,8	88,2	100,0		
	65-74	Total N	280	4.285	30.405	34.969	
%		0,8	12,3	86,9	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 150. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total	
Mujeres	65-74	I	N	.	694	2.729	3.422	
			%	.	20,3	79,7	100,0	
		II	N	.	512	2.125	2.638	
			%	.	19,4	80,6	100,0	
		III	N	.	1.643	9.017	10.661	
			%	.	15,4	84,6	100,0	
		IV	N	280	1.079	12.050	13.409	
			%	2,1	8,0	89,9	100,0	
		V	N	.	356	4.484	4.840	
			%	.	7,4	92,6	100,0	
		>=75	Total	N	347	2.950	28.548	31.845
			%		1,1	9,3	89,6	100,0
		I	N	.	266	2.631	2.897	
			%	.	9,2	90,8	100,0	
	II	N	.	706	2.876	3.582		
		%	.	19,7	80,3	100,0		
	III	N	166	704	5.795	6.665		
		%	2,5	10,6	86,9	100,0		
	IV	N	180	956	12.338	13.474		
		%	1,3	7,1	91,6	100,0		
	V	N	.	319	4.907	5.226		
		%	.	6,1	93,9	100,0		
Ambos	Total	Total	N	25.706	199.459	717.763	942.929	
		%	2,7	21,2	76,1	100,0		
	I	N	5.162	26.126	101.666	132.953		
		%	3,9	19,7	76,5	100,0		
	II	N	2.849	18.373	69.080	90.301		
		%	3,2	20,3	76,5	100,0		
	III	N	6.854	46.524	170.862	224.241		
		%	3,1	20,7	76,2	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 150. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Ambos	Total	IV	N	9.270	90.259	301.699	401.228
			%	2,3	22,5	75,2	100,0
		V	N	1.572	18.178	74.457	94.206
			%	1,7	19,3	79,0	100,0
	15-24	Total	N	6.048	14.673	50.786	71.507
			%	8,5	20,5	71,0	100,0
		I	N	1.772	2.735	8.950	13.457
			%	13,2	20,3	66,5	100,0
		II	N	537	1.881	7.625	10.043
			%	5,4	18,7	75,9	100,0
		III	N	1.584	1.973	11.873	15.431
			%	10,3	12,8	76,9	100,0
		IV	N	2.008	5.910	17.743	25.661
			%	7,8	23,0	69,1	100,0
		V	N	147	2.174	4.595	6.915
			%	2,1	31,4	66,4	100,0
	25-44	Total	N	11.545	85.146	221.321	318.012
			%	3,6	26,8	69,6	100,0
		I	N	876	12.785	34.252	47.914
			%	1,8	26,7	71,5	100,0
		II	N	1.755	9.044	23.807	34.606
			%	5,1	26,1	68,8	100,0
		III	N	3.733	20.030	44.577	68.340
			%	5,5	29,3	65,2	100,0
		IV	N	4.199	35.165	93.404	132.768
			%	3,2	26,5	70,4	100,0
		V	N	983	8.122	25.281	34.385
			%	2,9	23,6	73,5	100,0
	45-64	Total	N	6.805	64.928	292.017	363.751
			%	1,9	17,8	80,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 150. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

			Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total	
Ambos	45-64	I	N	2.513	6.803	42.502	51.818
			%	4,8	13,1	82,0	100,0
		II	N	556	4.287	26.959	31.803
			%	1,7	13,5	84,8	100,0
		III	N	1.186	15.441	77.059	93.686
			%	1,3	16,5	82,3	100,0
		IV	N	2.108	32.654	117.243	152.005
			%	1,4	21,5	77,1	100,0
		V	N	442	5.743	28.253	34.438
			%	1,3	16,7	82,0	100,0
	65-74	Total	N	619	20.419	85.066	106.104
			%	0,6	19,2	80,2	100,0
		I	N	.	2.758	11.235	13.993
			%	.	19,7	80,3	100,0
		II	N	.	1.893	5.472	7.365
			%	.	25,7	74,3	100,0
		III	N	186	5.215	22.448	27.850
			%	0,7	18,7	80,6	100,0
		IV	N	432	9.825	38.004	48.262
			%	0,9	20,4	78,7	100,0
		V	N	.	727	7.907	8.634
			%	.	8,4	91,6	100,0
	>=75	Total	N	689	14.292	68.574	83.555
			%	0,8	17,1	82,1	100,0
		I	N	.	1.043	4.727	5.770
			%	.	18,1	81,9	100,0
		II	N	.	1.267	5.217	6.484
			%	.	19,5	80,5	100,0
		III	N	166	3.864	14.904	18.934
			%	0,9	20,4	78,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 150. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Ambos	>=75	IV	N	523	6.704	35.305	42.532
			%	1,2	15,8	83,0	100,0
	V	N	.	1.413	8.421	9.834	
		%	.	14,4	85,6	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 151. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

			Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Hombres Total	Total	N	12.612	133.201	434.324	580.138
		%	2,2	23,0	74,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	466	26.591	98.769	125.826
		%	0,4	21,1	78,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.141	22.679	71.198	96.018
		%	2,2	23,6	74,2	100,0
	Secundaria, superior	N	6.851	56.969	169.647	233.467
		%	2,9	24,4	72,7	100,0
	Terciaria	N	3.154	26.961	94.710	124.825
		%	2,5	21,6	75,9	100,0
15-24	Total	N	4.206	5.580	30.004	39.790
		%	10,6	14,0	75,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	245	1.346	1.591
		%	.	15,4	84,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.787	1.619	4.191	7.597
		%	23,5	21,3	55,2	100,0
	Secundaria, superior	N	2.013	2.613	20.000	24.626
		%	8,2	10,6	81,2	100,0
	Terciaria	N	406	1.103	4.468	5.976
		%	6,8	18,5	74,8	100,0
25-44	Total	N	5.589	51.972	137.703	195.263
		%	2,9	26,6	70,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	3.773	13.404	17.177
		%	.	22,0	78,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	7.727	20.504	28.231
		%	.	27,4	72,6	100,0
	Secundaria, superior	N	3.911	25.462	66.509	95.883
		%	4,1	26,6	69,4	100,0
	Terciaria	N	1.678	15.010	37.285	53.973
		%	3,1	27,8	69,1	100,0
45-64	Total	N	2.136	48.173	171.515	221.824

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

598

Tabla 151. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

			Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Hombres	45-64 Total	%	1,0	21,7	77,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	382	11.395	36.636	48.413
		%	0,8	23,5	75,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	208	8.944	30.365	39.517
		%	0,5	22,6	76,8	100,0
	Secundaria, superior	N	475	19.824	66.252	86.551
		%	0,5	22,9	76,5	100,0
	Terciaria	N	1.070	8.010	38.263	47.343
		%	2,3	16,9	80,8	100,0
	65-74 Total	N	339	16.134	54.661	71.134
		%	0,5	22,7	76,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	5.143	22.605	27.748
		%	.	18,5	81,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	2.176	8.707	10.883
		%	.	20,0	80,0	100,0
	Secundaria, superior	N	339	6.931	12.718	19.988
		%	1,7	34,7	63,6	100,0
	Terciaria	N	.	1.884	10.631	12.515
	%	.	15,1	84,9	100,0	
>=75 Total	N	343	11.342	40.441	52.125	
	%	0,7	21,8	77,6	100,0	
Sin estudios, primaria	N	84	6.035	24.778	30.897	
	%	0,3	19,5	80,2	100,0	
Secundaria, inferior	N	146	2.213	7.432	9.791	
	%	1,5	22,6	75,9	100,0	
Secundaria, superior	N	113	2.139	4.168	6.420	
	%	1,8	33,3	64,9	100,0	
Terciaria	N	.	955	4.063	5.018	
	%	.	19,0	81,0	100,0	
Mujeres Total	Total	N	13.392	66.654	284.207	364.253
		%	3,7	18,3	78,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 151. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	Total	Sin estudios, primaria	N	792	8.452	58.301	67.544
			%	1,2	12,5	86,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.392	6.589	51.145	59.126
			%	2,4	11,1	86,5	100,0
		Secundaria, superior	N	4.034	26.791	100.325	131.151
			%	3,1	20,4	76,5	100,0
		Terciaria	N	7.175	24.822	74.435	106.432
			%	6,7	23,3	69,9	100,0
		15-24 Total	N	2.140	9.301	21.035	32.476
			%	6,6	28,6	64,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	186	495	680
			%	.	27,3	72,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	502	.	4.343	4.846
			%	10,4	.	89,6	100,0
		Secundaria, superior	N	741	5.613	12.686	19.041
			%	3,9	29,5	66,6	100,0
		Terciaria	N	896	3.502	3.511	7.909
			%	11,3	44,3	44,4	100,0
		25-44 Total	N	5.957	33.174	83.618	122.749
			%	4,9	27,0	68,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	792	1.701	5.591	8.083
			%	9,8	21,0	69,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	263	1.616	12.644	14.523
			%	1,8	11,1	87,1	100,0
	Secundaria, superior	N	2.074	13.584	30.876	46.534	
		%	4,5	29,2	66,4	100,0	
	Terciaria	N	2.828	16.273	34.507	53.609	
		%	5,3	30,4	64,4	100,0	
	45-64 Total	N	4.669	16.944	120.601	142.214	
		%	3,3	11,9	84,8	100,0	

(continuación)

Tabla 151. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	45-64	Sin estudios, primaria	N	.	3.309	20.683	23.992
			%	.	13,8	86,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	3.617	20.699	24.316
			%	.	14,9	85,1	100,0
		Secundaria, superior	N	1.219	6.215	48.199	55.633
			%	2,2	11,2	86,6	100,0
	Terciaria	N	3.450	3.803	31.019	38.273	
		%	9,0	9,9	81,0	100,0	
	65-74	Total	N	280	4.285	30.405	34.969
			%	0,8	12,3	86,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.386	14.891	16.277
			%	.	8,5	91,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	280	1.209	8.574	10.063
			%	2,8	12,0	85,2	100,0
		Secundaria, superior	N	.	712	4.161	4.873
			%	.	14,6	85,4	100,0
		Terciaria	N	.	977	2.778	3.756
			%	.	26,0	74,0	100,0
	>=75	Total	N	347	2.950	28.548	31.845
			%	1,1	9,3	89,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	1.871	16.640	18.511	
		%	.	10,1	89,9	100,0	
	Secundaria, inferior	N	347	147	4.885	5.378	
		%	6,4	2,7	90,8	100,0	
	Secundaria, superior	N	.	667	4.403	5.070	
		%	.	13,1	86,9	100,0	
	Terciaria	N	.	266	2.620	2.886	
		%	.	9,2	90,8	100,0	
Ambos Total	Total	N	26.004	199.855	718.531	944.390	
		%	2,8	21,2	76,1	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 151. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Ambos	Total	Sin estudios, primaria	N	1.258	35.043	157.069	193.370
			%	0,7	18,1	81,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.533	29.268	122.344	155.145
			%	2,3	18,9	78,9	100,0
		Secundaria, superior	N	10.885	83.761	269.972	364.618
			%	3,0	23,0	74,0	100,0
		Terciaria	N	10.329	51.783	169.146	231.257
			%	4,5	22,4	73,1	100,0
	15-24 Total		N	6.346	14.881	51.039	72.266
			%	8,8	20,6	70,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	431	1.841	2.272
			%	.	19,0	81,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.289	1.619	8.534	12.442
			%	18,4	13,0	68,6	100,0
		Secundaria, superior	N	2.754	8.227	32.686	43.667
			%	6,3	18,8	74,9	100,0
		Terciaria	N	1.302	4.605	7.979	13.885
			%	9,4	33,2	57,5	100,0
	25-44 Total		N	11.545	85.146	221.321	318.012
			%	3,6	26,8	69,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	792	5.473	18.995	25.261
			%	3,1	21,7	75,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	263	9.343	33.147	42.753
			%	0,6	21,9	77,5	100,0
		Secundaria, superior	N	5.984	39.047	97.385	142.417
			%	4,2	27,4	68,4	100,0
		Terciaria	N	4.506	31.283	71.793	107.582
			%	4,2	29,1	66,7	100,0
	45-64 Total		N	6.805	65.117	292.116	364.038
			%	1,9	17,9	80,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 151. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Ambos	45-64 Sin estudios, primaria	N		382	14.704	57.319	72.405
		%		0,5	20,3	79,2	100,0
	Secundaria, inferior	N		208	12.561	51.064	63.833
		%		0,3	19,7	80,0	100,0
	Secundaria, superior	N		1.694	26.039	114.451	142.184
		%		1,2	18,3	80,5	100,0
	Terciaria	N		4.521	11.813	69.282	85.616
		%		5,3	13,8	80,9	100,0
	65-74 Total	N		619	20.419	85.066	106.104
		%		0,6	19,2	80,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N		.	6.529	37.496	44.026
		%		.	14,8	85,2	100,0
Secundaria, inferior	N		280	3.385	17.282	20.947	
	%		1,3	16,2	82,5	100,0	
Secundaria, superior	N		339	7.644	16.878	24.861	
	%		1,4	30,7	67,9	100,0	
Terciaria	N		.	2.861	13.410	16.271	
	%		.	17,6	82,4	100,0	
>=75 Total	N		689	14.292	68.989	83.970	
	%		0,8	17,0	82,2	100,0	
Sin estudios, primaria	N		84	7.906	41.418	49.408	
	%		0,2	16,0	83,8	100,0	
Secundaria, inferior	N		492	2.360	12.316	15.169	
	%		3,2	15,6	81,2	100,0	
Secundaria, superior	N		113	2.805	8.571	11.489	
	%		1,0	24,4	74,6	100,0	
Terciaria	N		.	1.221	6.683	7.904	
	%		.	15,4	84,6	100,0	

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 152. Proporción (%) de personas sospechosas de alcoholismo (test de CAGE ≥ 2) por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	8,4	5,8	7,8	9,4
	15-24	4,2	3,6	3,1	5,1
	25-44	9,5	6,9	7,4	11,5
	45-64	10,1	7,5	10,3	10,7
	65-74	5,6	1,6	7,1	5,7
	≥ 75	5,4	1,7	7,0	5,3
	Mujeres	Total	3,0	2,3	3,6
	15-24	4,2	6,7	5,5	2,7
	25-44	4,5	2,3	5,0	4,9
	45-64	2,9	2,3	4,0	2,5
	65-74	1,3	0,0	0,8	1,8
	≥ 75	0,3	0,7	0,4	0,2
Ambos sexos	Total	5,6	4,0	5,6	6,0
	15-24	4,2	5,0	4,3	3,9
	25-44	7,1	4,7	6,2	8,3
	45-64	6,5	4,9	7,1	6,5
	65-74	3,3	0,8	3,8	3,6
	≥ 75	2,2	1,1	2,8	2,2

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 153. Proporción (%) de personas sospechosas de alcoholismo (test de CAGE ≥ 2) por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	8,4	7,3	6,2	7,9	9,3	8,0
	15-24	4,2	2,1	3,9	6,1	4,4	3,4
	25-44	9,5	9,4	7,3	7,9	10,7	9,5
	45-64	10,1	8,4	6,2	8,6	11,9	9,7
	65-74	5,6	5,0	6,0	6,7	5,5	3,3
	≥ 75	5,4	0,0	5,2	8,3	4,8	3,7
	Mujeres	Total	3,0	4,0	3,9	2,8	3,1
	15-24	4,2	2,0	5,5	2,6	7,0	0,0
	25-44	4,5	4,6	3,2	4,1	4,6	6,2
	45-64	3,0	5,7	5,9	2,7	2,6	1,3
	65-74	1,3	0,0	2,6	2,2	1,4	0,0
	≥ 75	0,3	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0
Ambos sexos	Total	5,6	5,7	4,9	5,1	6,5	4,0
	15-24	4,2	2,0	4,8	4,2	5,5	1,7
	25-44	7,1	6,9	5,1	5,7	8,2	7,7
	45-64	6,5	7,2	6,0	5,2	8,1	3,7
	65-74	3,3	3,3	4,2	4,4	3,4	0,7
	≥ 75	2,2	0,0	1,6	3,8	2,4	0,7

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 154. Proporción (%) de personas sospechosas de alcoholismo (test de CAGE ≥ 2) por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	8,4	8,2	9,0	8,2	8,3
	15-24	4,2	0,0	5,4	4,4	3,8
	25-44	9,5	13,5	10,9	8,3	9,3
	45-64	10,1	9,7	11,7	10,2	8,9
	65-74	5,6	4,5	5,8	7,2	5,4
	≥ 75	5,4	6,4	2,8	3,3	5,9
Mujeres	Total	3,0	2,2	1,9	3,4	4,3
	15-24	4,2	0,0	2,6	5,7	4,5
	25-44	4,5	11,6	3,6	3,0	4,9
	45-64	2,9	2,3	1,9	3,5	3,9
	65-74	1,3	1,2	1,2	1,6	1,5
	≥ 75	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0
Ambos sexos	Total	5,6	4,7	5,4	6,0	6,1
	15-24	4,2	0,0	4,4	5,1	4,3
	25-44	7,1	12,7	7,8	6,0	6,6
	45-64	6,5	5,8	6,4	6,9	6,4
	65-74	3,3	2,5	2,9	5,4	4,0
	≥ 75	2,2	2,5	1,0	1,7	3,1

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 155. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

			Menos de								
			No bebe	Nunca	1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total		
Hombres	Total	CAPV	N	334.986	316.518	150.787	50.623	49.975	12.235	915.124	
			%	36,6	34,6	16,5	5,5	5,5	1,3	100,0	
		Araba	N	46.183	47.663	24.263	8.210	6.830	603	133.751	
			%	34,5	35,6	18,1	6,1	5,1	0,5	100,0	
		Gipuzkoa	N	101.989	110.406	46.119	16.996	15.540	2.762	293.812	
			%	34,7	37,6	15,7	5,8	5,3	0,9	100,0	
		Bizkaia	N	186.815	158.449	80.405	25.417	27.605	8.870	487.561	
			%	38,3	32,5	16,5	5,2	5,7	1,8	100,0	
	15-24	CAPV	N	54.668	12.378	10.879	8.885	7.648	.	94.458	
			%	57,9	13,1	11,5	9,4	8,1	.	100,0	
			Araba	N	7.795	2.432	2.190	1.395	1.058	.	14.869
				%	52,4	16,4	14,7	9,4	7,1	.	100,0
		Gipuzkoa	N	17.259	5.090	3.542	3.264	2.150	.	31.305	
			%	55,1	16,3	11,3	10,4	6,9	.	100,0	
		Bizkaia	N	29.614	4.856	5.147	4.226	4.441	.	48.284	
			%	61,3	10,1	10,7	8,8	9,2	.	100,0	
25-44		CAPV	N	141.046	75.736	74.273	24.161	19.825	1.268	336.309	
			%	41,9	22,5	22,1	7,2	5,9	0,4	100,0	
			Araba	N	20.771	11.636	12.011	4.810	2.834	.	52.062
				%	39,9	22,4	23,1	9,2	5,4	.	100,0
		Gipuzkoa	N	42.823	28.568	19.973	9.292	6.133	.	106.790	
			%	40,1	26,8	18,7	8,7	5,7	.	100,0	
		Bizkaia	N	77.452	35.531	42.289	10.059	10.859	1.268	177.458	
			%	43,6	20,0	23,8	5,7	6,1	0,7	100,0	
	45-64	CAPV	N	80.831	128.824	52.147	14.920	18.064	7.869	302.655	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 155. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

			No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total		
Hombres	45-64	CAPV	%	26,7	42,6	17,2	4,9	6,0	2,6	100,0	
		Araba	N	10.489	19.094	8.122	1.925	2.698	423	42.751	
			%	24,5	44,7	19,0	4,5	6,3	1,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	25.137	42.867	17.998	3.857	5.891	1.668	97.419	
			%	25,8	44,0	18,5	4,0	6,0	1,7	100,0	
		Bizkaia	N	45.205	66.863	26.027	9.138	9.475	5.778	162.485	
			%	27,8	41,2	16,0	5,6	5,8	3,6	100,0	
		65-74	CAPV	N	24.599	54.315	9.190	2.155	3.577	1.897	95.733
			%	25,7	56,7	9,6	2,3	3,7	2,0	100,0	
		Araba	N	3.367	8.574	980	80	162	.	13.163	
			%	25,6	65,1	7,4	0,6	1,2	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	7.022	19.386	3.388	304	1.146	883	32.130	
	%		21,9	60,3	10,5	0,9	3,6	2,7	100,0		
	Bizkaia	N	14.210	26.354	4.821	1.772	2.269	1.014	50.440		
		%	28,2	52,2	9,6	3,5	4,5	2,0	100,0		
	>=75	CAPV	N	33.842	45.266	4.298	501	860	1.201	85.968	
		%	39,4	52,7	5,0	0,6	1,0	1,4	100,0		
	Araba	N	3.760	5.927	959	.	78	180	10.905		
		%	34,5	54,4	8,8	.	0,7	1,7	100,0		
	Gipuzkoa	N	9.748	14.493	1.217	279	220	211	26.168		
		%	37,3	55,4	4,6	1,1	0,8	0,8	100,0		
	Bizkaia	N	20.334	24.845	2.122	222	561	810	48.895		
		%	41,6	50,8	4,3	0,5	1,1	1,7	100,0		
Mujeres Total	CAPV	N	611.630	241.907	69.933	28.475	21.596	2.061	975.602		
		%	62,7	24,8	7,2	2,9	2,2	0,2	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 155. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	Total	Araba	N	84.216	29.627	14.362	5.249	2.884	433	136.772
			%	61,6	21,7	10,5	3,8	2,1	0,3	100,0
		Gipuzkoa	N	188.701	86.359	17.973	11.709	6.864	1.080	312.686
			%	60,3	27,6	5,7	3,7	2,2	0,3	100,0
		Bizkaia	N	338.713	125.921	37.598	11.517	11.848	548	526.145
			%	64,4	23,9	7,1	2,2	2,3	0,1	100,0
	15-24	CAPV	N	57.024	13.753	10.306	4.648	3.489	.	89.219
			%	63,9	15,4	11,6	5,2	3,9	.	100,0
		Araba	N	7.475	2.266	2.190	1.084	196	.	13.210
			%	56,6	17,2	16,6	8,2	1,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	19.919	4.133	2.018	1.880	1.493	.	29.443
			%	67,7	14,0	6,9	6,4	5,1	.	100,0
		Bizkaia	N	29.630	7.354	6.098	1.684	1.800	.	46.566
			%	63,6	15,8	13,1	3,6	3,9	.	100,0
	25-44	CAPV	N	198.077	61.909	35.583	15.893	8.309	1.055	320.826
			%	61,7	19,3	11,1	5,0	2,6	0,3	100,0
		Araba	N	27.069	7.305	8.260	3.356	1.878	.	47.869
			%	56,5	15,3	17,3	7,0	3,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	62.735	18.666	10.198	6.814	2.985	507	101.905
			%	61,6	18,3	10,0	6,7	2,9	0,5	100,0
		Bizkaia	N	108.273	35.937	17.125	5.722	3.446	548	171.052
			%	63,3	21,0	10,0	3,3	2,0	0,3	100,0
	45-64	CAPV	N	171.555	104.657	21.280	7.055	8.516	706	313.769
			%	54,7	33,4	6,8	2,2	2,7	0,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 155. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	45-64	Araba	N	25.027	13.580	3.724	690	810	433	44.263
			%	56,5	30,7	8,4	1,6	1,8	1,0	100,0
		Gipuzkoa	N	50.501	38.978	4.987	2.661	2.262	273	99.662
			%	50,7	39,1	5,0	2,7	2,3	0,3	100,0
	Bizkaia	N	96.027	52.099	12.569	3.704	5.444	.	169.843	
		%	56,5	30,7	7,4	2,2	3,2	.	100,0	
	65-74	CAPV	N	74.955	31.051	2.479	880	441	118	109.925
			%	68,2	28,2	2,3	0,8	0,4	0,1	100,0
		Araba	N	10.645	3.477	79	119	.	.	14.320
			%	74,3	24,3	0,6	0,8	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	23.053	11.702	770	354	124	118	36.120
			%	63,8	32,4	2,1	1,0	0,3	0,3	100,0
Bizkaia		N	41.258	15.872	1.630	407	318	.	59.484	
		%	69,4	26,7	2,7	0,7	0,5	.	100,0	
>=75	CAPV	N	110.020	30.537	284	.	841	182	141.864	
		%	77,6	21,5	0,2	.	0,6	0,1	100,0	
	Araba	N	14.001	2.999	109	.	.	.	17.110	
		%	81,8	17,5	0,6	.	.	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	32.493	12.879	.	.	.	182	45.555	
		%	71,3	28,3	.	.	.	0,4	100,0	
	Bizkaia	N	63.525	14.659	175	.	841	.	79.200	
		%	80,2	18,5	0,2	.	1,1	.	100,0	
Ambos Total	CAPV	N	946.616	558.425	220.720	79.098	71.571	14.296	1.890.726	
		%	50,1	29,5	11,7	4,2	3,8	0,8	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 155. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

			Menos de							
			No bebe	Nunca	1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total	
Ambos	Total	Araba	N	130.399	77.290	38.625	13.459	9.713	1.036	270.523
			%	48,2	28,6	14,3	5,0	3,6	0,4	100,0
		Gipuzkoa	N	290.690	196.765	64.092	28.705	22.404	3.842	606.497
			%	47,9	32,4	10,6	4,7	3,7	0,6	100,0
		Bizkaia	N	525.527	284.370	118.004	36.935	39.453	9.418	1.013.706
			%	51,8	28,1	11,6	3,6	3,9	0,9	100,0
	15-24	CAPV	N	111.692	26.131	21.185	13.532	11.137	.	183.677
			%	60,8	14,2	11,5	7,4	6,1	.	100,0
		Araba	N	15.270	4.698	4.380	2.478	1.253	.	28.079
			%	54,4	16,7	15,6	8,8	4,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	37.178	9.223	5.560	5.144	3.643	.	60.748
			%	61,2	15,2	9,2	8,5	6,0	.	100,0
		Bizkaia	N	59.244	12.210	11.245	5.910	6.241	.	94.850
			%	62,5	12,9	11,9	6,2	6,6	.	100,0
	25-44	CAPV	N	339.122	137.645	109.856	40.054	28.135	2.323	657.135
			%	51,6	20,9	16,7	6,1	4,3	0,4	100,0
		Araba	N	47.840	18.941	20.270	8.167	4.712	.	99.930
			%	47,9	19,0	20,3	8,2	4,7	.	100,0
		Gipuzkoa	N	105.557	47.235	30.171	16.106	9.118	507	208.695
			%	50,6	22,6	14,5	7,7	4,4	0,2	100,0
		Bizkaia	N	185.725	71.468	59.414	15.781	14.305	1.816	348.509
			%	53,3	20,5	17,0	4,5	4,1	0,5	100,0
	45-64	CAPV	N	252.386	233.481	73.427	21.975	26.580	8.575	616.424
			%	40,9	37,9	11,9	3,6	4,3	1,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 155. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Ambos	45-64	Araba	N	35.516	32.673	11.846	2.615	3.508	856	87.015
			%	40,8	37,5	13,6	3,0	4,0	1,0	100,0
		Gipuzkoa	N	75.638	81.846	22.985	6.518	8.153	1.941	197.081
			%	38,4	41,5	11,7	3,3	4,1	1,0	100,0
		Bizkaia	N	141.232	118.962	38.596	12.842	14.919	5.778	332.328
			%	42,5	35,8	11,6	3,9	4,5	1,7	100,0
	65-74	CAPV	N	99.554	85.365	11.669	3.035	4.019	2.015	205.658
			%	48,4	41,5	5,7	1,5	2,0	1,0	100,0
		Araba	N	14.012	12.051	1.060	199	162	.	27.483
			%	51,0	43,8	3,9	0,7	0,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	30.076	31.088	4.158	658	1.270	1.001	68.251
			%	44,1	45,6	6,1	1,0	1,9	1,5	100,0
		Bizkaia	N	55.467	42.226	6.451	2.179	2.587	1.014	109.924
			%	50,5	38,4	5,9	2,0	2,4	0,9	100,0
	>=75	CAPV	N	143.862	75.803	4.583	501	1.700	1.383	227.832
			%	63,1	33,3	2,0	0,2	0,7	0,6	100,0
		Araba	N	17.762	8.926	1.069	.	78	180	28.015
			%	63,4	31,9	3,8	.	0,3	0,6	100,0
		Gipuzkoa	N	42.241	27.373	1.217	279	220	393	71.723
			%	58,9	38,2	1,7	0,4	0,3	0,5	100,0
		Bizkaia	N	83.859	39.504	2.297	222	1.402	810	128.094
			%	65,5	30,8	1,8	0,2	1,1	0,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

				Menos de						
		No bebe	Nunca	1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total		
Hombres	Total	Total	N	334.726	315.816	150.489	50.623	49.975	12.235	913.863
			%	36,6	34,6	16,5	5,5	5,5	1,3	100,0
		I	N	34.433	40.595	20.392	10.468	6.359	1.443	113.690
			%	30,3	35,7	17,9	9,2	5,6	1,3	100,0
		II	N	29.536	21.901	18.202	4.008	3.720	838	78.206
			%	37,8	28,0	23,3	5,1	4,8	1,1	100,0
		III	N	65.018	63.124	37.278	9.310	11.569	2.056	188.355
			%	34,5	33,5	19,8	4,9	6,1	1,1	100,0
		IV	N	172.722	161.355	62.523	22.732	24.200	6.773	450.306
			%	38,4	35,8	13,9	5,0	5,4	1,5	100,0
	V	N	33.017	28.841	12.093	4.103	4.127	1.126	83.307	
		%	39,6	34,6	14,5	4,9	5,0	1,4	100,0	
	15-24	Total	N	54.408	12.378	10.581	8.885	7.648	.	93.900
			%	57,9	13,2	11,3	9,5	8,1	.	100,0
		I	N	7.932	3.016	546	1.710	1.431	.	14.634
			%	54,2	20,6	3,7	11,7	9,8	.	100,0
		II	N	4.928	1.121	2.886	1.377	675	.	10.988
			%	44,8	10,2	26,3	12,5	6,1	.	100,0
		III	N	10.904	1.584	1.723	425	2.194	.	16.830
			%	64,8	9,4	10,2	2,5	13,0	.	100,0
		IV	N	27.233	5.179	4.549	4.329	1.447	.	42.737
			%	63,7	12,1	10,6	10,1	3,4	.	100,0
		V	N	3.411	1.478	877	1.045	1.901	.	8.711
			%	39,2	17,0	10,1	12,0	21,8	.	100,0
	25-44	Total	N	141.046	75.736	74.273	24.161	19.825	1.268	336.309

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

		No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
25-44	Total	% 41,9	22,5	22,1	7,2	5,9	0,4	100,0
	I	N 14.994	8.680	11.718	5.236	3.105	.	43.732
		% 34,3	19,8	26,8	12,0	7,1	.	100,0
	II	N 14.183	5.576	9.943	1.508	1.286	.	32.496
		% 43,6	17,2	30,6	4,6	4,0	.	100,0
	III	N 24.176	13.468	16.362	5.066	3.184	.	62.257
		% 38,8	21,6	26,3	8,1	5,1	.	100,0
	IV	N 69.575	39.073	29.335	10.257	11.243	908	160.392
		% 43,4	24,4	18,3	6,4	7,0	0,6	100,0
	V	N 18.118	8.939	6.915	2.094	1.007	360	37.432
		% 48,4	23,9	18,5	5,6	2,7	1,0	100,0
45-64	Total	N 80.831	128.536	52.147	14.920	18.064	7.869	302.368
		% 26,7	42,5	17,2	4,9	6,0	2,6	100,0
	I	N 7.536	19.044	6.077	2.823	1.128	1.300	37.907
		% 19,9	50,2	16,0	7,4	3,0	3,4	100,0
	II	N 6.753	9.722	4.181	652	1.496	616	23.419
		% 28,8	41,5	17,9	2,8	6,4	2,6	100,0
	III	N 16.450	25.602	15.311	3.074	4.701	1.184	66.322
		% 24,8	38,6	23,1	4,6	7,1	1,8	100,0
	IV	N 43.262	63.597	22.413	7.485	9.655	4.201	150.614
		% 28,7	42,2	14,9	5,0	6,4	2,8	100,0
	V	N 6.831	10.571	4.165	885	1.084	569	24.106
		% 28,3	43,9	17,3	3,7	4,5	2,4	100,0
65-74	Total	N 24.599	54.315	9.190	2.155	3.577	1.897	95.733
		% 25,7	56,7	9,6	2,3	3,7	2,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

		No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Hombres 65-74	I	N 3.183	7.432	1.743	700	695	.	13.753
		% 23,1	54,0	12,7	5,1	5,1	.	100,0
	II	N 2.135	3.021	750	471	263	222	6.862
		% 31,1	44,0	10,9	6,9	3,8	3,2	100,0
	III	N 4.587	12.519	2.245	523	1.125	777	21.777
		% 21,1	57,5	10,3	2,4	5,2	3,6	100,0
	IV	N 12.899	27.828	4.388	382	1.358	898	47.753
		% 27,0	58,3	9,2	0,8	2,8	1,9	100,0
	V	N 1.794	3.514	65	80	136	.	5.588
		% 32,1	62,9	1,2	1,4	2,4	.	100,0
>=75	Total	N 33.842	44.851	4.298	501	860	1.201	85.553
	% 39,6	52,4	5,0	0,6	1,0	1,4	100,0	
Mujeres	I	N 790	2.422	309	.	.	143	3.663
		% 21,6	66,1	8,4	.	.	3,9	100,0
	II	N 1.537	2.461	442	.	.	.	4.440
		% 34,6	55,4	10,0	.	.	.	100,0
	III	N 8.900	9.951	1.638	222	364	95	21.169
		% 42,0	47,0	7,7	1,0	1,7	0,4	100,0
	IV	N 19.753	25.678	1.838	279	496	766	48.810
		% 40,5	52,6	3,8	0,6	1,0	1,6	100,0
	V	N 2.863	4.339	72	.	.	197	7.470
		% 38,3	58,1	1,0	.	.	2,6	100,0
Mujeres Total	Total	N 609.700	241.653	69.933	28.268	21.596	2.061	973.212
	% 62,6	24,8	7,2	2,9	2,2	0,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	Total	I	N	51.141	30.282	13.996	3.933	5.223	263	104.838
			%	48,8	28,9	13,3	3,8	5,0	0,3	100,0
		II	N	53.397	26.006	8.236	4.063	3.209	117	95.028
			%	56,2	27,4	8,7	4,3	3,4	0,1	100,0
		III	N	141.203	64.868	19.741	10.210	5.371	434	241.827
			%	58,4	26,8	8,2	4,2	2,2	0,2	100,0
		IV	N	236.798	87.007	23.300	6.223	6.153	962	360.441
			%	65,7	24,1	6,5	1,7	1,7	0,3	100,0
		V	N	127.161	33.490	4.660	3.840	1.641	285	171.077
			%	74,3	19,6	2,7	2,2	1,0	0,2	100,0
	15-24	Total	N	56.519	13.499	10.306	4.440	3.489	.	88.253
			%	64,0	15,3	11,7	5,0	4,0	.	100,0
		I	N	7.807	3.001	1.279	1.078	1.397	.	14.562
			%	53,6	20,6	8,8	7,4	9,6	.	100,0
		II	N	9.514	1.444	1.075	559	904	.	13.497
			%	70,5	10,7	8,0	4,1	6,7	.	100,0
		III	N	10.565	3.542	2.447	2.048	1.188	.	19.789
			%	53,4	17,9	12,4	10,3	6,0	.	100,0
		IV	N	21.456	4.763	5.264	130	.	.	31.614
			%	67,9	15,1	16,7	0,4	.	.	100,0
		V	N	7.177	749	241	625	.	.	8.792
			%	81,6	8,5	2,7	7,1	.	.	100,0
	25-44	Total	N	197.582	61.909	35.583	15.893	8.309	1.055	320.330
			%	61,7	19,3	11,1	5,0	2,6	0,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

			No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total	
Mujeres	25-44	I	N	25.910	6.780	7.084	2.145	2.903	263	45.086
			%	57,5	15,0	15,7	4,8	6,4	0,6	100,0
		II	N	20.931	8.260	4.723	2.497	813	.	37.223
			%	56,2	22,2	12,7	6,7	2,2	.	100,0
		III	N	51.770	14.744	9.737	5.428	352	.	82.029
			%	63,1	18,0	11,9	6,6	0,4	.	100,0
	IV	N	68.775	22.099	11.983	4.151	3.211	507	110.725	
		%	62,1	20,0	10,8	3,7	2,9	0,5	100,0	
	V	N	30.196	10.027	2.056	1.672	1.032	285	45.267	
		%	66,7	22,1	4,5	3,7	2,3	0,6	100,0	
	45-64	Total	N	171.384	104.657	21.280	7.055	8.516	706	313.598
			%	54,7	33,4	6,8	2,2	2,7	0,2	100,0
	65-74	I	N	10.669	14.983	5.045	710	708	.	32.116
			%	33,2	46,7	15,7	2,2	2,2	.	100,0
		II	N	11.656	10.434	2.438	1.007	1.140	117	26.792
			%	43,5	38,9	9,1	3,8	4,3	0,4	100,0
		III	N	44.827	31.251	6.641	2.367	3.240	316	88.641
			%	50,6	35,3	7,5	2,7	3,7	0,4	100,0
		IV	N	59.449	34.547	5.101	1.790	2.942	273	104.102
			%	57,1	33,2	4,9	1,7	2,8	0,3	100,0
		V	N	44.783	13.441	2.055	1.181	486	.	61.946
			%	72,3	21,7	3,3	1,9	0,8	.	100,0
	65-74	Total	N	74.800	31.051	2.479	880	441	118	109.770
			%	68,1	28,3	2,3	0,8	0,4	0,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

				Menos de					
		No bebe	Nunca	1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total	
Mujeres	65-74 I	N	3.777	2.835	587	.	.	.	7.199
		%	52,5	39,4	8,2	.	.	.	100,0
	II	N	4.587	2.638	7.225
		%	63,5	36,5	100,0
	III	N	12.239	9.050	808	367	318	118	22.899
		%	53,4	39,5	3,5	1,6	1,4	0,5	100,0
	IV	N	36.726	12.481	777	150	.	.	50.134
		%	73,3	24,9	1,6	0,3	.	.	100,0
	V	N	17.472	4.047	307	362	124	.	22.312
		%	78,3	18,1	1,4	1,6	0,6	.	100,0
>=75 Total	N	109.416	30.537	284	.	841	182	141.261	
	%	77,5	21,6	0,2	.	0,6	0,1	100,0	
I	N	2.978	2.682	.	.	215	.	5.875	
	%	50,7	45,7	.	.	3,7	.	100,0	
II	N	6.710	3.230	.	.	352	.	10.292	
	%	65,2	31,4	.	.	3,4	.	100,0	
III	N	21.803	6.282	109	.	274	.	28.468	
	%	76,6	22,1	0,4	.	1,0	.	100,0	
IV	N	50.392	13.117	175	.	.	182	63.866	
	%	78,9	20,5	0,3	.	.	0,3	100,0	
V	N	27.534	5.226	32.760	
	%	84,0	16,0	100,0	
Ambos Total	Total N	944.427	557.469	220.422	78.891	71.571	14.296	1.887.075	
	%	50,0	29,5	11,7	4,2	3,8	0,8	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total	
Ambos	Total	I	N	85.575	70.877	34.388	14.402	11.581	1.706	218.528	
			%	39,2	32,4	15,7	6,6	5,3	0,8	100,0	
		II	N	82.933	47.907	26.439	8.071	6.929	955	173.234	
			%	47,9	27,7	15,3	4,7	4,0	0,6	100,0	
		III	N	206.221	127.992	57.019	19.520	16.941	2.489	430.182	
			%	47,9	29,8	13,3	4,5	3,9	0,6	100,0	
		IV	N	409.519	248.362	85.823	28.955	30.352	7.735	810.747	
			%	50,5	30,6	10,6	3,6	3,7	1,0	100,0	
		V	N	160.179	62.331	16.753	7.943	5.768	1.411	254.385	
			%	63,0	24,5	6,6	3,1	2,3	0,6	100,0	
	15-24 Total	N	110.927	25.877	20.887	13.325	11.137	.	.	182.154	
		%	60,9	14,2	11,5	7,3	6,1	.	.	100,0	
		I	N	15.739	6.017	1.825	2.787	2.828	.	.	29.196
			%	53,9	20,6	6,3	9,5	9,7	.	.	100,0
		II	N	14.442	2.566	3.961	1.936	1.579	.	.	24.485
			%	59,0	10,5	16,2	7,9	6,5	.	.	100,0
		III	N	21.469	5.126	4.170	2.472	3.382	.	.	36.619
			%	58,6	14,0	11,4	6,8	9,2	.	.	100,0
		IV	N	48.690	9.942	9.813	4.459	1.447	.	.	74.351
			%	65,5	13,4	13,2	6,0	1,9	.	.	100,0
		V	N	10.587	2.227	1.118	1.670	1.901	.	.	17.503
			%	60,5	12,7	6,4	9,5	10,9	.	.	100,0
	25-44 Total	N	338.627	137.645	109.856	40.054	28.135	2.323	.	656.640	
		%	51,6	21,0	16,7	6,1	4,3	0,4	.	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

			No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total	
Ambos	25-44	I	N	40.904	15.461	18.802	7.381	6.007	263	88.818
			%	46,1	17,4	21,2	8,3	6,8	0,3	100,0
		II	N	35.113	13.836	14.667	4.005	2.099	.	69.719
			%	50,4	19,8	21,0	5,7	3,0	.	100,0
		III	N	75.946	28.211	26.098	10.494	3.536	.	144.286
			%	52,6	19,6	18,1	7,3	2,5	.	100,0
		IV	N	138.350	61.172	41.318	14.409	14.454	1.415	271.117
			%	51,0	22,6	15,2	5,3	5,3	0,5	100,0
		V	N	48.314	18.965	8.971	3.765	2.038	645	82.699
			%	58,4	22,9	10,8	4,6	2,5	0,8	100,0
	45-64	Total	N	252.215	233.193	73.427	21.975	26.580	8.575	615.965
			%	40,9	37,9	11,9	3,6	4,3	1,4	100,0
		I	N	18.205	34.028	11.122	3.533	1.836	1.300	70.023
			%	26,0	48,6	15,9	5,0	2,6	1,9	100,0
		II	N	18.408	20.156	6.619	1.660	2.636	733	50.212
			%	36,7	40,1	13,2	3,3	5,3	1,5	100,0
		III	N	61.277	56.853	21.952	5.441	7.941	1.499	154.963
			%	39,5	36,7	14,2	3,5	5,1	1,0	100,0
		IV	N	102.711	98.144	27.514	9.276	12.597	4.474	254.716
			%	40,3	38,5	10,8	3,6	4,9	1,8	100,0
		V	N	51.614	24.013	6.221	2.066	1.569	569	86.052
			%	60,0	27,9	7,2	2,4	1,8	0,7	100,0
	65-74	Total	N	99.399	85.365	11.669	3.035	4.019	2.015	205.503
			%	48,4	41,5	5,7	1,5	2,0	1,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

			No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total	
Ambos	65-74	I	N	6.959	10.268	2.330	700	695	.	20.952
		%		33,2	49,0	11,1	3,3	3,3	.	100,0
		II	N	6.722	5.659	750	471	263	222	14.087
		%		47,7	40,2	5,3	3,3	1,9	1,6	100,0
		III	N	16.826	21.569	3.052	890	1.443	896	44.676
		%		37,7	48,3	6,8	2,0	3,2	2,0	100,0
		IV	N	49.625	40.309	5.165	532	1.358	898	97.887
		%		50,7	41,2	5,3	0,5	1,4	0,9	100,0
		V	N	19.266	7.561	372	442	259	.	27.901
		%		69,1	27,1	1,3	1,6	0,9	.	100,0
	>=75	Total	N	143.259	75.388	4.583	501	1.700	1.383	226.814
		%		63,2	33,2	2,0	0,2	0,7	0,6	100,0
		I	N	3.768	5.104	309	.	215	143	9.538
		%		39,5	53,5	3,2	.	2,2	1,5	100,0
		II	N	8.247	5.691	442	.	352	.	14.731
		%		56,0	38,6	3,0	.	2,4	.	100,0
		III	N	30.703	16.232	1.747	222	639	95	49.638
		%		61,9	32,7	3,5	0,4	1,3	0,2	100,0
		IV	N	70.144	38.795	2.013	279	496	948	112.676
		%		62,3	34,4	1,8	0,2	0,4	0,8	100,0
		V	N	30.396	9.565	72	.	.	197	40.231
		%		75,6	23,8	0,2	.	.	0,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

		No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Hombres Total	Total	N 334.986	316.518	150.787	50.623	49.975	12.235	915.124
		% 36,6	34,6	16,5	5,5	5,5	1,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N 84.773	93.487	18.987	3.892	5.975	3.484	210.600
		% 40,3	44,4	9,0	1,8	2,8	1,7	100,0
	Secundaria, inferior	N 71.435	54.337	23.727	5.790	10.023	2.141	167.454
		% 42,7	32,4	14,2	3,5	6,0	1,3	100,0
	Secundaria, superior	N 127.203	110.406	67.147	27.387	23.443	5.085	360.670
		% 35,3	30,6	18,6	7,6	6,5	1,4	100,0
	Terciaria	N 51.575	58.288	40.926	13.553	10.534	1.524	176.400
		% 29,2	33,0	23,2	7,7	6,0	0,9	100,0
15-24	Total	N 54.668	12.378	10.879	8.885	7.648	.	94.458
		% 57,9	13,1	11,5	9,4	8,1	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N 8.327	1.081	.	511	.	.	9.918
		% 84,0	10,9	.	5,2	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N 23.532	2.365	1.566	2.140	1.526	.	31.129
		% 75,6	7,6	5,0	6,9	4,9	.	100,0
	Secundaria, superior	N 18.214	6.683	7.898	5.241	4.805	.	42.840
		% 42,5	15,6	18,4	12,2	11,2	.	100,0
	Terciaria	N 4.595	2.250	1.416	994	1.317	.	10.572
		% 43,5	21,3	13,4	9,4	12,5	.	100,0
25-44	Total	N 141.046	75.736	74.273	24.161	19.825	1.268	336.309
		% 41,9	22,5	22,1	7,2	5,9	0,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N 20.598	10.487	3.355	997	1.979	360	37.776
		% 54,5	27,8	8,9	2,6	5,2	1,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Hombres 25-44	Secundaria, inferior	N	24.578	11.240	11.780	2.016	3.195	.	52.808	
		%	46,5	21,3	22,3	3,8	6,1	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	68.392	39.327	32.393	13.392	9.862	908	164.274	
		%	41,6	23,9	19,7	8,2	6,0	0,6	100,0	
	Terciaria	N	27.478	14.682	26.745	7.756	4.790	.	81.451	
		%	33,7	18,0	32,8	9,5	5,9	.	100,0	
45-64	Total	N	80.831	128.824	52.147	14.920	18.064	7.869	302.655	
		%	26,7	42,6	17,2	4,9	6,0	2,6	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	21.987	31.283	10.489	1.803	2.700	2.137	70.400	
		%	31,2	44,4	14,9	2,6	3,8	3,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	13.727	24.562	7.869	1.468	4.188	1.431	53.244	
		%	25,8	46,1	14,8	2,8	7,9	2,7	100,0	
	Secundaria, superior	N	30.579	45.517	22.736	7.517	7.544	3.237	117.130	
		%	26,1	38,9	19,4	6,4	6,4	2,8	100,0	
	Terciaria	N	14.538	27.461	11.054	4.132	3.631	1.064	61.881	
		%	23,5	44,4	17,9	6,7	5,9	1,7	100,0	
	65-74	Total	N	24.599	54.315	9.190	2.155	3.577	1.897	95.733
			%	25,7	56,7	9,6	2,3	3,7	2,0	100,0
Sin estudios, primaria		N	10.269	23.476	2.945	80	950	298	38.017	
		%	27,0	61,8	7,7	0,2	2,5	0,8	100,0	
Secundaria, inferior		N	5.408	7.646	1.929	167	704	437	16.291	
		%	33,2	46,9	11,8	1,0	4,3	2,7	100,0	
Secundaria, superior		N	5.960	13.636	3.046	1.237	1.128	940	25.948	
		%	23,0	52,6	11,7	4,8	4,3	3,6	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

			No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total		
Hombres	65-74	Terciaria	N	2.962	9.556	1.270	672	795	222	15.477	
			%	19,1	61,7	8,2	4,3	5,1	1,4	100,0	
	>=75	Total	N	33.842	45.266	4.298	501	860	1.201	85.968	
			%	39,4	52,7	5,0	0,6	1,0	1,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	23.592	27.161	2.199	501	346	690	54.489	
			%	43,3	49,8	4,0	0,9	0,6	1,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	4.190	8.524	584	.	410	273	13.981	
			%	30,0	61,0	4,2	.	2,9	2,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	4.058	5.242	1.074	.	104	.	10.478	
			%	38,7	50,0	10,2	.	1,0	.	100,0	
		Terciaria	N	2.002	4.339	442	.	.	238	7.020	
			%	28,5	61,8	6,3	.	.	3,4	100,0	
	Mujeres	Total	Total	N	611.630	241.907	69.933	28.475	21.596	2.061	975.602
				%	62,7	24,8	7,2	2,9	2,2	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	210.784	55.254	4.546	4.283	2.369	1.092	278.327	
			%	75,7	19,9	1,6	1,5	0,9	0,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N	110.640	47.532	6.148	2.771	2.674	.	169.766	
			%	65,2	28,0	3,6	1,6	1,6	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	176.715	82.495	29.066	10.435	8.285	589	307.586	
			%	57,5	26,8	9,4	3,4	2,7	0,2	100,0	
		Terciaria	N	113.491	56.625	30.173	10.986	8.268	380	219.923	
			%	51,6	25,7	13,7	5,0	3,8	0,2	100,0	
15-24		Total	N	57.024	13.753	10.306	4.648	3.489	.	89.219	
			%	63,9	15,4	11,6	5,2	3,9	.	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	10.706	439	241	.	.	.	11.386
			%	94,0	3,9	2,1	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	11.917	3.768	330	498	250	.	16.763
			%	71,1	22,5	2,0	3,0	1,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N	26.402	8.207	6.464	2.672	1.419	.	45.163
			%	58,5	18,2	14,3	5,9	3,1	.	100,0
		Terciaria	N	7.998	1.338	3.272	1.478	1.821	.	15.907
			%	50,3	8,4	20,6	9,3	11,4	.	100,0
	25-44	Total	N	198.077	61.909	35.583	15.893	8.309	1.055	320.826
			%	61,7	19,3	11,1	5,0	2,6	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	17.906	2.459	2.322	2.079	431	792	25.990
			%	68,9	9,5	8,9	8,0	1,7	3,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	24.414	10.975	1.412	725	1.411	.	38.937
			%	62,7	28,2	3,6	1,9	3,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N	83.953	24.874	13.170	6.048	2.443	.	130.487
			%	64,3	19,1	10,1	4,6	1,9	.	100,0
		Terciaria	N	71.803	23.601	18.679	7.041	4.024	263	125.412
			%	57,3	18,8	14,9	5,6	3,2	0,2	100,0
	45-64	Total	N	171.555	104.657	21.280	7.055	8.516	706	313.769
			%	54,7	33,4	6,8	2,2	2,7	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	53.971	19.530	1.385	1.691	1.387	.	77.963
			%	69,2	25,0	1,8	2,2	1,8	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	37.419	19.340	3.132	1.181	662	.	61.735
			%	60,6	31,3	5,1	1,9	1,1	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	45-64	Secundaria, superior	N	54.689	39.862	9.258	1.715	4.210	589	110.322
			%	49,6	36,1	8,4	1,6	3,8	0,5	100,0
		Terciaria	N	25.476	25.925	7.505	2.468	2.258	117	63.749
			%	40,0	40,7	11,8	3,9	3,5	0,2	100,0
	65-74	Total	N	74.955	31.051	2.479	880	441	118	109.925
			%	68,2	28,2	2,3	0,8	0,4	0,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	45.575	14.772	598	513	276	118	61.852
			%	73,7	23,9	1,0	0,8	0,4	0,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	17.389	8.531	1.165	367	.	.	27.452
			%	63,3	31,1	4,2	1,3	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	7.020	4.873	11.893
			%	59,0	41,0	100,0
		Terciaria	N	4.971	2.875	716	.	165	.	8.727
			%	57,0	32,9	8,2	.	1,9	.	100,0
	>=75	Total	N	110.020	30.537	284	.	841	182	141.864
			%	77,6	21,5	0,2	.	0,6	0,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	82.626	18.054	.	.	274	182	101.136
			%	81,7	17,9	.	.	0,3	0,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	19.501	4.918	109	.	352	.	24.879
			%	78,4	19,8	0,4	.	1,4	.	100,0
		Secundaria, superior	N	4.650	4.680	175	.	215	.	9.720
			%	47,8	48,1	1,8	.	2,2	.	100,0
		Terciaria	N	3.243	2.886	6.129
			%	52,9	47,1	100,0
Ambos	Total	Total	N	946.616	558.425	220.720	79.098	71.571	14.296	1.890.726

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				Menos de						
		No bebe	Nunca	1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total		
Ambos	Total	Total	%	50,1	29,5	11,7	4,2	3,8	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	295.557	148.741	23.533	8.175	8.344	4.577	488.927
			%	60,5	30,4	4,8	1,7	1,7	0,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	182.076	101.870	29.875	8.561	12.697	2.141	337.220
			%	54,0	30,2	8,9	2,5	3,8	0,6	100,0
		Secundaria, superior	N	303.918	192.901	96.213	37.822	31.728	5.674	668.256
			%	45,5	28,9	14,4	5,7	4,7	0,8	100,0
		Terciaria	N	165.066	114.913	71.099	24.540	18.801	1.905	396.323
			%	41,6	29,0	17,9	6,2	4,7	0,5	100,0
	15-24	Total	N	111.692	26.131	21.185	13.532	11.137	.	183.677
			%	60,8	14,2	11,5	7,4	6,1	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	19.032	1.520	241	511	.	.	21.304
			%	89,3	7,1	1,1	2,4	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	35.449	6.133	1.895	2.637	1.776	.	47.891
			%	74,0	12,8	4,0	5,5	3,7	.	100,0
		Secundaria, superior	N	44.617	14.889	14.361	7.913	6.223	.	88.003
			%	50,7	16,9	16,3	9,0	7,1	.	100,0
		Terciaria	N	12.593	3.588	4.687	2.472	3.138	.	26.479
			%	47,6	13,6	17,7	9,3	11,9	.	100,0
	25-44	Total	N	339.122	137.645	109.856	40.054	28.135	2.323	657.135
			%	51,6	20,9	16,7	6,1	4,3	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	38.505	12.946	5.677	3.076	2.410	1.151	63.765
			%	60,4	20,3	8,9	4,8	3,8	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	48.992	22.215	13.192	2.741	4.606	.	91.745
			%	53,4	24,2	14,4	3,0	5,0	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

			Menos de							
			No bebe	Nunca	1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total	
Ambos	25-44	Secundaria, superior	N 152.345	64.201	45.563	19.440	12.305	908	294.762	
			% 51,7	21,8	15,5	6,6	4,2	0,3	100,0	
		Terciaria	N 99.281	38.283	45.425	14.797	8.814	263	206.862	
			% 48,0	18,5	22,0	7,2	4,3	0,1	100,0	
	45-64	Total	N 252.386	233.481	73.427	21.975	26.580	8.575	616.424	
			% 40,9	37,9	11,9	3,6	4,3	1,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N 75.958	50.813	11.873	3.494	4.087	2.137	148.363	
			% 51,2	34,2	8,0	2,4	2,8	1,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N 51.146	43.902	11.001	2.649	4.850	1.431	114.979	
			% 44,5	38,2	9,6	2,3	4,2	1,2	100,0	
		Secundaria, superior	N 85.268	85.379	31.994	9.232	11.753	3.826	227.452	
			% 37,5	37,5	14,1	4,1	5,2	1,7	100,0	
		Terciaria	N 40.014	53.386	18.559	6.600	5.889	1.181	125.630	
			% 31,9	42,5	14,8	5,3	4,7	0,9	100,0	
	65-74	Total	N 99.554	85.365	11.669	3.035	4.019	2.015	205.658	
			% 48,4	41,5	5,7	1,5	2,0	1,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N 55.844	38.248	3.543	592	1.226	416	99.869	
			% 55,9	38,3	3,5	0,6	1,2	0,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N 22.797	16.177	3.094	534	704	437	43.744	
			% 52,1	37,0	7,1	1,2	1,6	1,0	100,0	
		Secundaria, superior	N 12.980	18.509	3.046	1.237	1.128	940	37.841	
			% 34,3	48,9	8,0	3,3	3,0	2,5	100,0	
		Terciaria	N 7.933	12.431	1.986	672	960	222	24.204	
			% 32,8	51,4	8,2	2,8	4,0	0,9	100,0	
	>=75	Total	N 143.862	75.803	4.583	501	1.700	1.383	227.832	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

			Menos de							
			No bebe	Nunca	1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total	
Ambos	>=75	Total	%	63,1	33,3	2,0	0,2	0,7	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	106.218	45.214	2.199	501	621	872	155.625
			%	68,3	29,1	1,4	0,3	0,4	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	23.691	13.442	693	.	761	273	38.860
			%	61,0	34,6	1,8	.	2,0	0,7	100,0
		Secundaria, superior	N	8.708	9.922	1.249	.	318	.	20.198
			%	43,1	49,1	6,2	.	1,6	.	100,0
		Terciaria	N	5.245	7.224	442	.	.	238	13.149
			%	39,9	54,9	3,4	.	.	1,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 158. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	12,3	11,7	12,0	12,7
	15-24	17,5	16,5	17,3	18,0
	25-44	13,5	14,7	14,4	12,5
	45-64	13,5	11,8	11,7	15,0
	65-74	8,0	1,8	7,3	10,0
	>=75	3,0	2,4	2,7	3,3
	Mujeres	Total	5,3	6,3	6,3
	15-24	9,1	9,7	11,5	7,5
	25-44	7,9	10,9	10,1	5,7
	45-64	5,2	4,4	5,2	5,4
	65-74	1,3	0,8	1,6	1,2
	>=75	0,7	0,0	0,4	1,1
Ambos sexos	Total	8,7	8,9	9,1	8,5
	15-24	13,4	13,3	14,5	12,8
	25-44	10,7	12,9	12,3	9,2
	45-64	9,3	8,0	8,4	10,1
	65-74	4,4	1,3	4,3	5,3
	>=75	1,6	0,9	1,2	1,9

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 159. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	12,3	16,1	11,0	12,2	11,9	11,2
	15-24	17,6	21,5	18,7	15,6	13,5	33,8
	25-44	13,5	19,1	8,6	13,3	14,0	9,2
	45-64	13,5	13,9	11,8	13,5	14,2	10,5
	65-74	8,0	10,1	13,9	11,1	5,5	3,9
	>=75	3,0	3,9	0,0	3,2	3,2	2,6
	Mujeres	Total	5,3	9,0	7,8	6,6	3,7
	15-24	9,0	17,0	10,8	16,3	0,4	7,1
	25-44	7,9	11,8	8,9	7,0	7,1	6,6
	45-64	5,2	4,4	8,5	6,7	4,8	2,7
	65-74	1,3	0,0	0,0	3,5	0,3	2,2
	>=75	0,7	3,7	3,4	1,0	0,3	0,0
Ambos sexos	Total	8,7	12,7	9,2	9,1	8,3	5,9
	15-24	13,4	19,2	14,4	16,0	7,9	20,4
	25-44	10,7	15,4	8,8	9,7	11,2	7,8
	45-64	9,3	9,5	10,0	9,6	10,3	4,9
	65-74	4,4	6,7	6,8	7,2	2,8	2,5
	>=75	1,6	3,7	2,4	1,9	1,5	0,5

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 160. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	12,3	6,3	10,7	15,5	14,5
	15-24	17,5	5,2	11,8	23,4	21,9
	25-44	13,5	8,8	9,9	14,7	15,4
	45-64	13,5	9,4	13,3	15,6	14,3
	65-74	8,0	3,5	8,0	12,7	10,9
	>=75	3,0	2,8	4,9	1,0	3,4
Mujeres	Total	5,3	2,8	3,2	6,3	8,9
	15-24	9,1	0,0	4,5	9,1	20,7
	25-44	7,9	12,7	5,5	6,5	9,0
	45-64	5,2	3,9	3,0	5,9	7,6
	65-74	1,3	1,5	1,3	0,0	1,9
	>=75	0,7	0,5	1,4	2,2	0,0
Ambos sexos	Total	8,7	4,3	6,9	11,3	11,4
	15-24	13,4	2,4	9,2	16,1	21,2
	25-44	10,7	10,4	8,0	11,1	11,5
	45-64	9,3	6,6	7,8	10,9	10,9
	65-74	4,4	2,2	3,8	8,7	7,7
	>=75	1,6	1,3	2,7	1,6	1,8

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 161. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	26,1	4,1	25,6	23,5	28,1
		Araba	25,8	3,2	25,3	23,4	27,8
		Gipuzkoa	26,0	3,6	25,6	23,5	28,0
		Bizkaia	26,2	4,8	25,6	23,4	28,2
	15-24	CAPV	23,0	3,4	22,8	21,1	24,3
		Araba	22,2	1,9	22,3	20,7	23,3
		Gipuzkoa	23,0	3,4	22,9	21,4	24,2
		Bizkaia	23,3	4,0	22,9	21,2	24,7
	25-44	CAPV	25,6	4,6	25,1	23,1	27,4
		Araba	25,8	4,1	25,1	23,4	27,5
		Gipuzkoa	25,2	4,0	25,1	22,9	26,5
		Bizkaia	25,7	5,2	25,1	23,1	27,8
	45-64	CAPV	27,0	4,1	26,2	24,4	28,7
		Araba	26,5	2,6	26,1	24,3	28,4
		Gipuzkoa	27,0	3,1	26,7	24,5	29,0
		Bizkaia	27,1	5,3	26,1	24,3	28,7
	65-74	CAPV	27,4	2,8	27,1	25,0	29,3
		Araba	27,1	2,1	26,6	24,6	29,0
		Gipuzkoa	27,5	2,7	27,3	25,2	29,4
		Bizkaia	27,5	3,1	27,1	25,0	29,3
>=75	CAPV	26,8	3,2	26,2	24,3	28,8	
	Araba	26,5	2,4	26,0	24,4	28,6	
	Gipuzkoa	27,4	3,1	27,2	24,9	29,7	
	Bizkaia	26,5	3,4	26,0	24,0	28,7	
Mujeres	Total	CAPV	24,9	4,5	24,2	21,6	27,3
		Araba	24,9	3,5	24,2	21,9	27,1
		Gipuzkoa	24,8	4,3	24,2	21,5	27,2
		Bizkaia	25,0	5,0	24,2	21,7	27,3
	15-24	CAPV	22,0	3,6	21,3	19,8	23,2
		Araba	21,8	3,2	21,3	19,6	22,7
		Gipuzkoa	21,8	2,8	21,5	19,7	23,6
		Bizkaia	22,1	4,4	21,2	19,9	23,1
	25-44	CAPV	23,9	5,3	23,0	21,1	25,7
		Araba	23,9	3,9	23,0	21,2	25,5
		Gipuzkoa	24,0	6,0	22,8	20,8	25,6
		Bizkaia	23,9	5,5	23,1	21,3	25,9

(continuación)

Tabla 161. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	45-64	CAPV	25,5	4,1	24,5	22,5	27,6
		Araba	25,7	3,3	24,9	22,5	27,8
		Gipuzkoa	25,1	3,7	24,4	22,3	27,3
		Bizkaia	25,6	4,7	24,6	22,5	28,0
	65-74	CAPV	26,6	3,6	26,2	23,8	29,1
		Araba	27,0	2,8	26,6	24,6	29,4
		Gipuzkoa	26,2	3,3	25,9	23,7	28,4
		Bizkaia	26,8	4,1	26,6	23,8	29,3
	>=75	CAPV	26,4	3,8	26,0	23,4	29,0
		Araba	26,0	2,7	25,4	23,5	27,5
		Gipuzkoa	26,4	3,4	26,2	23,4	29,0
		Bizkaia	26,5	4,5	26,1	23,4	29,1
Ambos sexos	Total	CAPV	25,5	4,3	24,9	22,5	27,7
		Araba	25,3	3,4	24,8	22,5	27,5
		Gipuzkoa	25,4	4,0	24,9	22,5	27,7
		Bizkaia	25,6	5,0	25,0	22,6	27,8
	15-24	CAPV	22,5	3,6	22,0	20,4	24,0
		Araba	22,0	2,6	21,9	20,5	23,1
		Gipuzkoa	22,4	3,2	22,0	20,3	24,1
		Bizkaia	22,7	4,3	22,1	20,4	24,2
	25-44	CAPV	24,8	5,1	24,2	22,0	26,6
		Araba	24,9	4,1	24,2	22,1	26,9
		Gipuzkoa	24,6	5,1	24,2	21,8	26,3
		Bizkaia	24,8	5,5	24,2	21,9	26,9
	45-64	CAPV	26,2	4,2	25,6	23,4	28,4
		Araba	26,1	3,0	25,6	23,5	28,1
		Gipuzkoa	26,0	3,5	25,6	23,4	28,4
		Bizkaia	26,3	5,1	25,6	23,4	28,4
	65-74	CAPV	27,0	3,2	26,7	24,5	29,2
		Araba	27,0	2,5	26,6	24,6	29,3
		Gipuzkoa	26,8	3,0	26,7	24,5	29,0
		Bizkaia	27,1	3,7	26,8	24,4	29,3
	>=75	CAPV	26,5	3,6	26,1	23,8	29,0
		Araba	26,2	2,6	25,5	23,9	28,0
		Gipuzkoa	26,8	3,3	26,6	24,0	29,1
		Bizkaia	26,5	4,1	26,1	23,6	29,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 162. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Hombres	Total	Total	26,1	4,1	25,6	23,5	28,1	
		I	25,6	3,7	25,4	23,4	27,5	
		II	25,4	3,8	25,0	22,9	27,1	
		III	26,2	4,6	25,4	23,6	28,1	
		IV	26,2	3,9	25,8	23,6	28,4	
		V	26,1	4,6	25,5	23,4	28,1	
		15-24	Total	23,0	3,4	22,8	21,1	24,2
			I	22,9	3,4	22,5	21,0	24,1
			II	22,8	3,3	22,6	20,8	24,7
			III	22,4	2,9	22,0	21,0	23,1
			IV	23,3	3,7	22,9	21,5	24,5
			V	23,3	3,0	23,7	21,6	24,8
		25-44	Total	25,6	4,6	25,1	23,1	27,4
			I	25,3	4,2	25,0	23,1	27,1
			II	25,2	4,4	24,5	22,9	26,4
			III	25,6	4,3	25,0	23,6	27,0
			IV	25,7	4,5	25,2	23,0	27,7
			V	25,6	5,7	24,8	22,5	27,7
		45-64	Total	27,0	4,1	26,2	24,4	28,7
			I	26,7	3,4	26,2	24,4	28,4
			II	26,4	3,6	25,7	24,1	27,8
			III	27,3	5,7	26,4	24,6	28,7
			IV	26,9	3,5	26,4	24,4	29,0
			V	27,2	4,1	26,3	24,5	29,3
		65-74	Total	27,4	2,8	27,1	25,0	29,3
			I	26,5	2,1	26,4	24,6	28,1
			II	27,3	2,5	27,2	24,9	29,4
			III	27,4	2,6	27,0	25,0	29,4
			IV	27,7	3,0	27,4	25,3	29,4
			V	27,5	2,8	26,6	25,2	29,1
	>=75	Total	26,8	3,2	26,2	24,3	29,0	
		I	25,5	2,8	25,1	23,4	26,4	
		II	25,7	2,4	25,6	23,7	26,7	
		III	26,2	2,8	25,7	23,7	28,4	
		IV	27,1	3,3	26,6	24,7	29,4	
		V	27,3	3,7	27,1	25,4	29,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 162. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Mujeres	Total	Total	24,9	4,5	24,2	21,6	27,3
		I	23,4	4,1	22,6	20,8	25,4
		II	23,8	4,2	23,0	21,0	25,8
		III	24,4	4,0	23,8	21,5	26,4
		IV	25,5	4,5	24,8	22,0	28,0
		V	26,0	4,7	25,0	22,8	28,5
	15-24	Total	22,0	3,6	21,3	19,8	23,2
		I	21,3	3,0	21,1	19,6	22,8
		II	22,1	3,4	21,5	19,6	24,2
		III	21,6	2,4	21,3	20,0	23,1
		IV	22,1	3,5	21,3	19,8	23,6
		V	23,4	6,7	21,4	19,7	24,9
	25-44	Total	23,9	5,3	23,0	21,1	25,8
		I	23,5	5,1	22,3	21,0	25,5
		II	22,9	4,7	22,0	20,6	24,5
		III	23,4	5,0	22,7	21,0	24,9
		IV	24,6	5,8	23,4	21,3	26,9
		V	24,7	5,2	23,5	22,2	26,4
	45-64	Total	25,4	4,1	24,5	22,5	27,6
		I	23,6	3,3	23,1	21,4	25,1
		II	24,6	3,7	24,1	22,3	26,4
		III	25,0	3,5	24,4	22,3	27,1
		IV	26,0	4,3	25,2	22,9	28,4
		V	26,4	4,7	25,2	23,1	29,0
	65-74	Total	26,6	3,6	26,2	23,8	29,1
		I	25,4	4,1	26,1	21,5	28,9
		II	24,9	3,2	25,0	22,0	27,2
		III	26,5	3,4	25,8	23,6	29,3
		IV	27,1	3,5	26,7	24,4	29,3
		V	26,7	4,0	26,0	24,0	28,4
>=75	Total	26,4	3,8	26,0	23,4	29,0	
	I	24,0	3,1	24,6	21,7	26,7	
	II	26,4	3,8	26,0	23,1	29,0	
	III	25,6	3,4	25,5	22,8	28,1	
	IV	26,6	3,9	26,1	23,8	29,1	
	V	27,3	4,0	27,1	23,6	30,4	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 162. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75			
Ambos sexos	Total	Total	25,5	4,3	24,9	22,5	27,7		
		I	24,5	4,0	24,2	21,8	26,7		
		II	24,5	4,1	24,1	21,8	26,4		
		III	25,2	4,4	24,6	22,3	27,3		
		IV	25,9	4,2	25,4	22,9	28,3		
		V	26,0	4,7	25,2	22,9	28,4		
		15-24	Total	22,5	3,6	22,0	20,4	24,0	
			I	22,1	3,3	21,5	20,1	23,5	
			II	22,4	3,4	21,9	20,6	24,2	
			III	22,0	2,7	21,5	20,4	23,1	
			IV	22,8	3,7	22,4	20,5	24,2	
			V	23,4	5,1	22,9	20,3	24,9	
			25-44	Total	24,8	5,1	24,2	22,0	26,6
			I	24,4	4,8	24,1	21,7	26,1	
			II	24,0	4,8	23,4	21,3	25,8	
			III	24,3	4,9	23,9	21,6	26,1	
			IV	25,2	5,1	24,7	22,3	27,3	
			V	25,1	5,5	23,9	22,3	27,4	
			45-64	Total	26,2	4,2	25,6	23,4	28,4
			I	25,3	3,7	24,7	22,8	27,4	
			II	25,5	3,7	25,0	22,9	27,5	
			III	26,0	4,6	25,3	23,1	28,1	
			IV	26,6	3,9	26,0	23,9	28,7	
			V	26,6	4,5	25,6	23,4	29,1	
			65-74	Total	27,0	3,2	26,7	24,5	29,2
		I	26,2	2,9	26,3	24,2	28,1		
		II	26,1	3,1	26,3	23,5	28,7		
		III	26,9	3,0	26,7	24,5	29,4		
		IV	27,4	3,2	27,1	24,7	29,4		
		V	26,9	3,8	26,3	24,2	28,7		
		>=75	Total	26,5	3,6	26,1	23,8	29,0	
		I	24,6	3,0	24,9	22,0	26,7		
		II	26,2	3,4	26,0	23,2	28,8		
		III	25,8	3,2	25,6	23,4	28,3		
		IV	26,8	3,7	26,4	24,1	29,3		
		V	27,3	3,9	27,1	24,0	30,0		

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 163. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Hombres	Total	Total	26,1	4,1	25,6	23,5	28,1
		Sin estudios, primaria	26,9	3,9	26,4	24,2	29,1
		Secundaria, inferior	25,9	4,3	25,4	22,9	28,3
		Secundaria, superior	25,9	4,3	25,5	23,4	27,8
		Terciaria	25,4	3,4	25,0	23,3	27,1
	15-24	Total	23,0	3,4	22,8	21,1	24,3
		Sin estudios, primaria	21,5	3,3	21,5	18,9	23,4
		Secundaria, inferior	22,6	3,1	22,6	21,0	23,9
		Secundaria, superior	23,6	3,7	23,1	21,5	24,7
		Terciaria	23,2	2,9	22,9	21,3	24,5
	25-44	Total	25,6	4,6	25,1	23,1	27,4
		Sin estudios, primaria	26,7	6,9	25,0	23,1	28,1
		Secundaria, inferior	25,6	5,0	25,2	22,7	27,7
		Secundaria, superior	25,6	4,2	25,4	23,3	27,5
		Terciaria	24,8	3,5	24,6	22,9	26,1
	45-64	Total	27,0	4,1	26,2	24,4	28,7
		Sin estudios, primaria	27,3	3,4	26,8	24,8	29,4
		Secundaria, inferior	27,3	4,0	26,7	24,2	29,2
		Secundaria, superior	26,9	4,8	26,1	24,4	28,7
		Terciaria	26,4	3,5	25,8	24,1	27,8
65-74	Total	27,4	2,8	27,1	25,0	29,3	
	Sin estudios, primaria	27,8	2,9	27,3	25,5	29,4	
	Secundaria, inferior	27,8	3,0	27,4	25,6	29,4	
	Secundaria, superior	26,9	2,6	26,9	24,4	29,3	
	Terciaria	26,8	2,2	26,5	24,7	28,4	
>=75	Total	26,8	3,2	26,2	24,3	28,8	
	Sin estudios, primaria	26,9	3,2	26,4	24,5	29,1	
	Secundaria, inferior	27,2	3,5	26,7	24,8	28,8	
	Secundaria, superior	26,8	2,2	26,4	24,9	29,1	
	Terciaria	24,7	2,7	24,7	22,8	26,3	
Mujeres	Total	Total	24,9	4,5	24,2	21,6	27,3
		Sin estudios, primaria	26,5	4,4	25,9	23,3	29,1
		Secundaria, inferior	25,6	4,2	25,1	22,5	28,1
		Secundaria, superior	24,2	4,5	23,4	21,3	26,2
		Terciaria	23,4	3,9	22,7	21,0	25,4

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 163. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	15-24	Total	22,0	3,6	21,3	19,8	23,2
		Sin estudios, primaria	20,9	3,3	19,9	18,7	23,5
		Secundaria, inferior	22,3	3,8	21,3	19,9	23,6
		Secundaria, superior	22,0	3,9	21,3	20,0	22,9
		Terciaria	22,4	2,6	22,5	20,3	23,9
	25-44	Total	23,9	5,3	23,0	21,1	25,7
		Sin estudios, primaria	24,5	6,1	22,9	21,2	26,4
		Secundaria, inferior	25,7	6,7	24,7	21,7	28,9
		Secundaria, superior	24,0	5,2	23,2	21,3	25,7
		Terciaria	23,2	4,6	22,2	20,8	25,1
	45-64	Total	25,5	4,1	24,5	22,5	27,6
		Sin estudios, primaria	27,0	4,6	26,0	23,6	29,4
		Secundaria, inferior	25,7	3,5	25,2	23,0	27,8
		Secundaria, superior	25,1	4,1	24,4	22,0	27,3
		Terciaria	24,0	3,3	23,2	21,6	25,7
	65-74	Total	26,6	3,6	26,2	23,8	29,1
		Sin estudios, primaria	27,1	3,8	26,8	24,2	29,4
		Secundaria, inferior	26,6	2,9	26,2	24,3	28,5
		Secundaria, superior	26,2	3,5	24,9	23,6	29,3
		Terciaria	24,0	3,6	23,5	20,6	27,5
>=75	Total	26,4	3,8	26,0	23,4	29,0	
	Sin estudios, primaria	26,8	3,9	26,5	23,8	29,4	
	Secundaria, inferior	26,2	3,6	25,7	23,1	28,6	
	Secundaria, superior	24,9	3,3	24,6	22,0	26,9	
	Terciaria	24,1	3,3	23,6	22,0	25,4	
Ambos sexos	Total	Total	25,5	4,3	24,9	22,5	27,7
		Sin estudios, primaria	26,7	4,2	26,2	23,7	29,1
		Secundaria, inferior	25,8	4,2	25,2	22,7	28,3
		Secundaria, superior	25,1	4,5	24,6	22,3	27,3
		Terciaria	24,3	3,9	24,0	21,8	26,2
	15-24	Total	22,5	3,6	22,0	20,4	24,0
		Sin estudios, primaria	21,2	3,3	20,8	18,8	23,4
		Secundaria, inferior	22,5	3,4	22,1	20,4	23,7
		Secundaria, superior	22,8	3,9	22,0	20,5	24,2
		Terciaria	22,7	2,7	22,7	21,0	24,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 163. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

	Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos 25-44 Total	24,8	5,1	24,2	22,0	26,6
Sin estudios, primaria	25,8	6,7	24,2	22,3	27,8
Secundaria, inferior	25,7	5,8	24,9	22,2	28,0
Secundaria, superior	24,9	4,8	24,4	22,3	26,8
Terciaria	23,8	4,3	23,4	21,5	25,7
45-64 Total	26,2	4,2	25,6	23,4	28,4
Sin estudios, primaria	27,2	4,1	26,3	24,2	29,4
Secundaria, inferior	26,4	3,8	25,9	23,4	28,7
Secundaria, superior	26,0	4,5	25,4	23,4	28,0
Terciaria	25,2	3,6	24,7	22,7	27,1
65-74 Total	27,0	3,2	26,7	24,5	29,2
Sin estudios, primaria	27,4	3,4	27,1	24,8	29,4
Secundaria, inferior	27,1	3,0	26,7	24,7	29,0
Secundaria, superior	26,7	2,9	26,4	24,1	29,3
Terciaria	25,8	3,0	25,8	23,6	28,1
>=75 Total	26,5	3,6	26,1	23,8	29,0
Sin estudios, primaria	26,8	3,7	26,4	24,0	29,4
Secundaria, inferior	26,5	3,6	26,0	23,5	28,8
Secundaria, superior	25,8	2,9	26,0	23,7	28,3
Terciaria	24,4	3,0	24,2	22,2	26,2

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 164. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico

			Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Hombres Total	CAPV	N	6.101	388.304	393.393	127.325	915.124
		%	0,7	42,4	43,0	13,9	100,0
	Araba	N	334	61.794	53.662	17.962	133.751
		%	0,2	46,2	40,1	13,4	100,0
	Gipuzkoa	N	2.677	122.038	130.324	38.774	293.812
		%	0,9	41,5	44,4	13,2	100,0
	Bizkaia	N	3.091	204.473	209.408	70.590	487.561
		%	0,6	41,9	43,0	14,5	100,0
15-24	CAPV	N	3.415	74.003	13.346	3.694	94.458
		%	3,6	78,3	14,1	3,9	100,0
	Araba	N	155	14.046	461	207	14.869
		%	1,0	94,5	3,1	1,4	100,0
	Gipuzkoa	N	1.789	23.777	4.164	1.574	31.305
		%	5,7	76,0	13,3	5,0	100,0
	Bizkaia	N	1.471	36.180	8.721	1.912	48.284
		%	3,0	74,9	18,1	4,0	100,0
25-44	CAPV	N	881	163.469	134.288	37.671	336.309
		%	0,3	48,6	39,9	11,2	100,0
	Araba	N	.	24.953	19.235	7.873	52.062
		%	.	47,9	36,9	15,1	100,0
	Gipuzkoa	N	393	52.752	45.970	7.675	106.790
		%	0,4	49,4	43,0	7,2	100,0
	Bizkaia	N	488	85.764	69.083	22.123	177.458
		%	0,3	48,3	38,9	12,5	100,0
45-64	CAPV	N	850	99.673	150.417	51.716	302.655
		%	0,3	32,9	49,7	17,1	100,0
	Araba	N	.	14.650	22.471	5.630	42.751
		%	.	34,3	52,6	13,2	100,0
	Gipuzkoa	N	262	31.890	48.254	17.012	97.419
		%	0,3	32,7	49,5	17,5	100,0
	Bizkaia	N	589	53.132	79.692	29.073	162.485
		%	0,4	32,7	49,0	17,9	100,0
65-74	CAPV	N	274	23.392	53.471	18.597	95.733
		%	0,3	24,4	55,9	19,4	100,0
	Araba	N	.	4.249	6.607	2.307	13.163
		%	.	32,3	50,2	17,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 164. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico

			Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total		
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	125	6.776	19.025	6.203	32.130	
			%	0,4	21,1	59,2	19,3	100,0	
		Bizkaia	N	149	12.366	27.839	10.086	50.440	
			%	0,3	24,5	55,2	20,0	100,0	
	>=75	CAPV	N	681	27.767	41.871	15.648	85.968	
			%	0,8	32,3	48,7	18,2	100,0	
		Araba	N	179	3.895	4.887	1.944	10.905	
			%	1,6	35,7	44,8	17,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	109	6.841	12.910	6.309	26.168	
			%	0,4	26,1	49,3	24,1	100,0	
		Bizkaia	N	394	17.031	24.074	7.396	48.895	
			%	0,8	34,8	49,2	15,1	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	29.257	549.073	274.812	122.740	975.882
				%	3,0	56,3	28,2	12,6	100,0
		Araba	N	2.964	79.790	36.887	17.131	136.772	
			%	2,2	58,3	27,0	12,5	100,0	
		Gipuzkoa	N	11.886	177.355	85.341	38.103	312.686	
			%	3,8	56,7	27,3	12,2	100,0	
		Bizkaia	N	14.407	291.928	152.584	67.506	526.425	
			%	2,7	55,5	29,0	12,8	100,0	
	15-24	CAPV	N	6.223	72.566	7.240	3.470	89.499	
			%	7,0	81,1	8,1	3,9	100,0	
		Araba	N	1.236	10.348	1.192	434	13.210	
			%	9,4	78,3	9,0	3,3	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.668	24.601	3.009	166	29.443	
			%	5,7	83,6	10,2	0,6	100,0	
		Bizkaia	N	3.318	37.618	3.039	2.870	46.846	
			%	7,1	80,3	6,5	6,1	100,0	
		25-44	CAPV	N	13.738	211.812	67.159	28.117	320.826
				%	4,3	66,0	20,9	8,8	100,0
Araba	N		1.361	33.166	9.461	3.880	47.869		
	%		2,8	69,3	19,8	8,1	100,0		
Gipuzkoa	N		6.861	65.808	18.713	10.523	101.905		
	%		6,7	64,6	18,4	10,3	100,0		
Bizkaia	N		5.516	112.838	38.984	13.714	171.052		
	%		3,2	66,0	22,8	8,0	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 164. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total	
Mujeres	45-64	CAPV	N	4.091	169.108	98.082	42.487	313.769	
			%	1,3	53,9	31,3	13,5	100,0	
	Araba		N	225	23.314	13.769	6.956	44.263	
			%	0,5	52,7	31,1	15,7	100,0	
	Gipuzkoa		N	1.841	55.984	28.910	12.928	99.662	
			%	1,8	56,2	29,0	13,0	100,0	
	Bizkaia		N	2.026	89.811	55.403	22.603	169.843	
			%	1,2	52,9	32,6	13,3	100,0	
	65-74	CAPV		N	1.303	41.456	45.907	21.260	109.925
				%	1,2	37,7	41,8	19,3	100,0
		Araba		N	.	5.105	5.981	3.235	14.320
				%	.	35,6	41,8	22,6	100,0
Gipuzkoa			N	825	13.904	15.958	5.433	36.120	
			%	2,3	38,5	44,2	15,0	100,0	
Bizkaia			N	477	22.447	23.968	12.592	59.484	
			%	0,8	37,7	40,3	21,2	100,0	
>=75		CAPV		N	3.902	54.131	56.424	27.407	141.864
				%	2,8	38,2	39,8	19,3	100,0
		Araba		N	142	7.857	6.484	2.626	17.110
				%	0,8	45,9	37,9	15,4	100,0
	Gipuzkoa		N	691	17.059	18.751	9.053	45.555	
			%	1,5	37,4	41,2	19,9	100,0	
	Bizkaia		N	3.069	29.215	31.189	15.727	79.200	
			%	3,9	36,9	39,4	19,9	100,0	
	Ambos	Total	CAPV	N	35.359	937.377	668.205	250.066	1.891.006
				%	1,9	49,6	35,3	13,2	100,0
		Araba		N	3.298	141.583	90.548	35.093	270.523
				%	1,2	52,3	33,5	13,0	100,0
Gipuzkoa			N	14.563	299.393	215.665	76.877	606.497	
			%	2,4	49,4	35,6	12,7	100,0	
Bizkaia			N	17.498	496.401	361.992	138.096	1.013.987	
			%	1,7	49,0	35,7	13,6	100,0	
15-24		CAPV		N	9.638	146.569	20.586	7.164	183.958
				%	5,2	79,7	11,2	3,9	100,0
		Araba		N	1.392	24.394	1.653	641	28.079
				%	5,0	86,9	5,9	2,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 164. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico

			Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total	
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	3.457	48.378	7.173	1.741	60.748
			%	5,7	79,6	11,8	2,9	100,0
		Bizkaia	N	4.789	73.797	11.761	4.783	95.130
			%	5,0	77,6	12,4	5,0	100,0
	25-44	CAPV	N	14.619	375.281	201.446	65.788	657.135
				%	2,2	57,1	30,7	10,0
		Araba	N	1.361	58.119	28.697	11.754	99.930
			%	1,4	58,2	28,7	11,8	100,0
		Gipuzkoa	N	7.253	118.560	64.683	18.198	208.695
			%	3,5	56,8	31,0	8,7	100,0
		Bizkaia	N	6.005	198.602	108.067	35.836	348.509
			%	1,7	57,0	31,0	10,3	100,0
	45-64	CAPV	N	4.942	268.781	248.499	94.203	616.424
				%	0,8	43,6	40,3	15,3
		Araba	N	225	37.964	36.240	12.586	87.015
			%	0,3	43,6	41,6	14,5	100,0
		Gipuzkoa	N	2.102	87.874	77.164	29.940	197.081
			%	1,1	44,6	39,2	15,2	100,0
		Bizkaia	N	2.615	142.943	135.095	51.676	332.328
			%	0,8	43,0	40,7	15,5	100,0
	65-74	CAPV	N	1.577	64.847	99.378	39.856	205.658
				%	0,8	31,5	48,3	19,4
		Araba	N	.	9.354	12.588	5.542	27.483
			%	.	34,0	45,8	20,2	100,0
		Gipuzkoa	N	951	20.680	34.984	11.636	68.251
			%	1,4	30,3	51,3	17,0	100,0
		Bizkaia	N	626	34.813	51.806	22.678	109.924
			%	0,6	31,7	47,1	20,6	100,0
	>=75	CAPV	N	4.583	81.899	98.296	43.055	227.832
				%	2,0	35,9	43,1	18,9
		Araba	N	321	11.752	11.371	4.570	28.015
			%	1,1	42,0	40,6	16,3	100,0
		Gipuzkoa	N	800	23.900	31.662	15.362	71.723
			%	1,1	33,3	44,1	21,4	100,0
		Bizkaia	N	3.463	46.246	55.263	23.123	128.094
			%	2,7	36,1	43,1	18,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 165. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total		
Hombres	Total	N	6.101	387.907	392.718	127.137	913.863	
		%	0,7	42,4	43,0	13,9	100,0	
	I	N	368	53.221	50.007	10.094	113.690	
		%	0,3	46,8	44,0	8,9	100,0	
	II	N	316	38.706	31.510	7.674	78.206	
		%	0,4	49,5	40,3	9,8	100,0	
	III	N	496	81.478	79.517	26.864	188.355	
		%	0,3	43,3	42,2	14,3	100,0	
	IV	N	4.144	178.863	196.378	70.921	450.306	
		%	0,9	39,7	43,6	15,7	100,0	
	V	N	778	35.640	35.306	11.584	83.307	
		%	0,9	42,8	42,4	13,9	100,0	
	15-24	Total	N	3.415	73.705	13.086	3.694	93.900
			%	3,6	78,5	13,9	3,9	100,0
		I	N	368	11.593	1.988	686	14.634
			%	2,5	79,2	13,6	4,7	100,0
		II	N	.	8.576	2.412	.	10.988
			%	.	78,0	22,0	.	100,0
		III	N	293	15.309	598	631	16.830
			%	1,7	91,0	3,6	3,7	100,0
		IV	N	2.238	32.169	5.952	2.377	42.737
			%	5,2	75,3	13,9	5,6	100,0
		V	N	516	6.059	2.136	.	8.711
			%	5,9	69,6	24,5	.	100,0
	25-44	Total	N	881	163.469	134.288	37.671	336.309
			%	0,3	48,6	39,9	11,2	100,0
		I	N	.	21.684	19.307	2.741	43.732
			%	.	49,6	44,1	6,3	100,0
		II	N	.	17.854	12.107	2.535	32.496
			%	.	54,9	37,3	7,8	100,0
		III	N	.	30.699	25.226	6.331	62.257
			%	.	49,3	40,5	10,2	100,0
		IV	N	881	73.882	64.759	20.870	160.392
			%	0,5	46,1	40,4	13,0	100,0
		V	N	.	19.350	12.888	5.193	37.432
			%	.	51,7	34,4	13,9	100,0
	45-64	Total	N	850	99.574	150.417	51.527	302.368

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 165. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total			
Hombres	45-64	Total	%	0,3	32,9	49,7	17,0	100,0	
	I	N	.	14.286	18.735	4.885	37.907		
			%	.	37,7	49,4	12,9	100,0	
	II	N	316	8.722	11.057	3.325	23.419		
			%	1,3	37,2	47,2	14,2	100,0	
	III	N	.	21.017	32.877	12.428	66.322		
			%	.	31,7	49,6	18,7	100,0	
	IV	N	273	48.237	75.484	26.620	150.614		
			%	0,2	32,0	50,1	17,7	100,0	
	V	N	262	7.311	12.265	4.268	24.106		
			%	1,1	30,3	50,9	17,7	100,0	
	65-74	Total	N	274	23.392	53.471	18.597	95.733	
			%	0,3	24,4	55,9	19,4	100,0	
	I	N	.	3.862	8.472	1.419	13.753		
			%	.	28,1	61,6	10,3	100,0	
	II	N	.	1.735	3.717	1.411	6.862		
			%	.	25,3	54,2	20,6	100,0	
	III	N	.	5.810	11.377	4.590	21.777		
			%	.	26,7	52,2	21,1	100,0	
	IV	N	274	10.664	26.447	10.368	47.753		
		%	0,6	22,3	55,4	21,7	100,0		
V	N	.	1.321	3.458	809	5.588			
		%	.	23,6	61,9	14,5	100,0		
>=75	Total	N	681	27.767	41.457	15.648	85.553		
		%	0,8	32,5	48,5	18,3	100,0		
I	N	.	1.796	1.506	362	3.663			
		%	.	49,0	41,1	9,9	100,0		
II	N	.	1.820	2.217	403	4.440			
		%	.	41,0	49,9	9,1	100,0		
III	N	203	8.643	9.439	2.884	21.169			
		%	1,0	40,8	44,6	13,6	100,0		
IV	N	478	13.910	23.736	10.686	48.810			
		%	1,0	28,5	48,6	21,9	100,0		
V	N	.	1.598	4.559	1.314	7.470			
		%	.	21,4	61,0	17,6	100,0		
Mujeres total	Total	N	29.257	547.110	274.656	122.469	973.492		
		%	3,0	56,2	28,2	12,6	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 165. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Mujeres	Total	I	N	4.802	71.790	22.108	6.138	104.838
			%	4,6	68,5	21,1	5,9	100,0
		II	N	3.885	62.604	21.443	7.095	95.028
			%	4,1	65,9	22,6	7,5	100,0
		III	N	7.066	149.766	63.556	21.720	242.107
			%	2,9	61,9	26,3	9,0	100,0
		IV	N	10.274	180.192	112.101	57.875	360.441
			%	2,9	50,0	31,1	16,1	100,0
		V	N	3.230	82.758	55.449	29.641	171.077
			%	1,9	48,4	32,4	17,3	100,0
	15-24	Total	N	6.223	71.600	7.240	3.470	88.533
			%	7,0	80,9	8,2	3,9	100,0
		I	N	1.332	12.475	341	414	14.562
			%	9,1	85,7	2,3	2,8	100,0
		II	N	614	11.317	1.127	438	13.497
			%	4,5	83,9	8,4	3,2	100,0
		III	N	1.255	17.439	1.375	.	20.069
			%	6,3	86,9	6,9	.	100,0
		IV	N	2.382	24.236	3.119	1.878	31.614
			%	7,5	76,7	9,9	5,9	100,0
		V	N	640	6.133	1.278	740	8.792
			%	7,3	69,8	14,5	8,4	100,0
	25-44	Total	N	13.738	211.317	67.159	28.117	320.330
			%	4,3	66,0	21,0	8,8	100,0
		I	N	2.324	30.158	9.483	3.120	45.086
			%	5,2	66,9	21,0	6,9	100,0
		II	N	1.806	27.691	6.233	1.493	37.223
			%	4,9	74,4	16,7	4,0	100,0
		III	N	4.034	58.723	15.356	3.916	82.029
			%	4,9	71,6	18,7	4,8	100,0
		IV	N	4.874	65.392	25.559	14.901	110.725
			%	4,4	59,1	23,1	13,5	100,0
		V	N	700	29.352	10.528	4.687	45.267
			%	1,5	64,8	23,3	10,4	100,0
	45-64	Total	N	4.091	169.108	98.082	42.316	313.598
			%	1,3	53,9	31,3	13,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 165. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total	
Mujeres	45-64	I	N	538	23.337	6.431	1.810	32.116	
			%	1,7	72,7	20,0	5,6	100,0	
		II	N	883	15.957	7.695	2.257	26.792	
			%	3,3	59,6	28,7	8,4	100,0	
		III	N	517	51.707	27.394	9.023	88.641	
			%	0,6	58,3	30,9	10,2	100,0	
	IV	N	864	49.759	36.150	17.329	104.102		
		%	0,8	47,8	34,7	16,6	100,0		
	V	N	1.289	28.348	20.411	11.898	61.946		
		%	2,1	45,8	33,0	19,2	100,0		
	65-74	Total	N	1.303	41.456	45.751	21.260	109.770	
			%	1,2	37,8	41,7	19,4	100,0	
		I	N	258	3.030	3.118	793	7.199	
			%	3,6	42,1	43,3	11,0	100,0	
		II	N	258	3.424	2.796	748	7.225	
			%	3,6	47,4	38,7	10,3	100,0	
		III	N	486	9.409	7.906	5.099	22.899	
			%	2,1	41,1	34,5	22,3	100,0	
		IV	N	185	17.288	21.777	10.885	50.134	
			%	0,4	34,5	43,4	21,7	100,0	
		V	N	117	8.305	10.155	3.735	22.312	
			%	0,5	37,2	45,5	16,7	100,0	
		>=75	Total	N	3.902	53.629	56.424	27.306	141.261
				%	2,8	38,0	39,9	19,3	100,0
I			N	350	2.790	2.734	.	5.875	
			%	6,0	47,5	46,5	.	100,0	
II			N	325	4.215	3.592	2.160	10.292	
			%	3,2	41,0	34,9	21,0	100,0	
III			N	774	12.487	11.525	3.682	28.468	
			%	2,7	43,9	40,5	12,9	100,0	
IV			N	1.969	23.518	25.496	12.883	63.866	
			%	3,1	36,8	39,9	20,2	100,0	
V			N	484	10.619	13.077	8.581	32.760	
			%	1,5	32,4	39,9	26,2	100,0	
Ambos Total	Total		N	35.359	935.017	667.375	249.605	1.887.356	
			%	1,9	49,5	35,4	13,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 165. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Ambos	Total	I	N	5.170	125.011	72.115	16.232	218.528
			%	2,4	57,2	33,0	7,4	100,0
		II	N	4.201	101.310	52.953	14.770	173.234
			%	2,4	58,5	30,6	8,5	100,0
		III	N	7.562	231.244	143.073	48.584	430.462
			%	1,8	53,7	33,2	11,3	100,0
		IV	N	14.418	359.055	308.479	128.796	810.747
			%	1,8	44,3	38,0	15,9	100,0
		V	N	4.008	118.397	90.755	41.225	254.385
			%	1,6	46,5	35,7	16,2	100,0
	15-24 Total	N	9.638	145.306	20.326	7.164	182.434	
		%	5,3	79,6	11,1	3,9	100,0	
	I	N	1.700	24.067	2.328	1.101	29.196	
		%	5,8	82,4	8,0	3,8	100,0	
	II	N	614	19.893	3.540	438	24.485	
		%	2,5	81,2	14,5	1,8	100,0	
	III	N	1.548	32.748	1.973	631	36.900	
		%	4,2	88,7	5,3	1,7	100,0	
	IV	N	4.620	56.405	9.071	4.255	74.351	
		%	6,2	75,9	12,2	5,7	100,0	
	V	N	1.156	12.192	3.414	740	17.503	
		%	6,6	69,7	19,5	4,2	100,0	
	25-44 Total	N	14.619	374.786	201.446	65.788	656.640	
		%	2,2	57,1	30,7	10,0	100,0	
	I	N	2.324	51.842	28.790	5.862	88.818	
		%	2,6	58,4	32,4	6,6	100,0	
	II	N	1.806	45.545	18.340	4.028	69.719	
		%	2,6	65,3	26,3	5,8	100,0	
	III	N	4.034	89.422	40.582	10.248	144.286	
		%	2,8	62,0	28,1	7,1	100,0	
	IV	N	5.755	139.274	90.318	35.771	271.117	
		%	2,1	51,4	33,3	13,2	100,0	
	V	N	700	48.702	23.416	9.880	82.699	
		%	0,8	58,9	28,3	11,9	100,0	
	45-64 Total	N	4.942	268.682	248.499	93.843	615.965	
		%	0,8	43,6	40,3	15,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 165. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Ambos	45-64	I	N	538	37.623	25.167	6.695	70.023
			%	0,8	53,7	35,9	9,6	100,0
		II	N	1.199	24.679	18.752	5.582	50.212
			%	2,4	49,2	37,3	11,1	100,0
		III	N	517	72.724	60.270	21.451	154.963
			%	0,3	46,9	38,9	13,8	100,0
		IV	N	1.137	97.996	111.634	43.949	254.716
			%	0,4	38,5	43,8	17,3	100,0
		V	N	1.550	35.659	32.676	16.167	86.052
			%	1,8	41,4	38,0	18,8	100,0
	65-74	Total	N	1.577	64.847	99.222	39.856	205.503
				%	0,8	31,6	48,3	19,4
		I	N	258	6.892	11.590	2.213	20.952
			%	1,2	32,9	55,3	10,6	100,0
		II	N	258	5.158	6.513	2.159	14.087
			%	1,8	36,6	46,2	15,3	100,0
		III	N	486	15.219	19.283	9.689	44.676
			%	1,1	34,1	43,2	21,7	100,0
		IV	N	459	27.952	48.224	21.253	97.887
			%	0,5	28,6	49,3	21,7	100,0
		V	N	117	9.626	13.614	4.544	27.901
			%	0,4	34,5	48,8	16,3	100,0
	>=75	Total	N	4.583	81.396	97.881	42.954	226.814
				%	2,0	35,9	43,2	18,9
		I	N	350	4.586	4.240	362	9.538
			%	3,7	48,1	44,5	3,8	100,0
		II	N	325	6.035	5.809	2.563	14.731
			%	2,2	41,0	39,4	17,4	100,0
		III	N	977	21.130	20.965	6.566	49.638
			%	2,0	42,6	42,2	13,2	100,0
		IV	N	2.447	37.428	49.232	23.569	112.676
			%	2,2	33,2	43,7	20,9	100,0
		V	N	484	12.217	17.635	9.894	40.231
			%	1,2	30,4	43,8	24,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 166. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

			Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Hombres	Total	N	6.101	388.304	393.393	127.325	915.124
		%	0,7	42,4	43,0	13,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.480	71.421	94.523	42.176	210.600
		%	1,2	33,9	44,9	20,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.327	76.176	65.708	24.243	167.454
		%	0,8	45,5	39,2	14,5	100,0
	Secundaria, superior	N	1.689	153.424	159.300	46.257	360.670
		%	0,5	42,5	44,2	12,8	100,0
	Terciaria	N	605	87.283	73.862	14.650	176.400
		%	0,3	49,5	41,9	8,3	100,0
15-24	Total	N	3.415	74.003	13.346	3.694	94.458
		%	3,6	78,3	14,1	3,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.721	7.521	675	.	9.918
		%	17,4	75,8	6,8	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	964	25.818	3.607	739	31.129
		%	3,1	82,9	11,6	2,4	100,0
	Secundaria, superior	N	535	32.643	6.707	2.955	42.840
		%	1,2	76,2	15,7	6,9	100,0
	Terciaria	N	195	8.020	2.357	.	10.572
		%	1,8	75,9	22,3	.	100,0
25-44	Total	N	881	163.469	134.288	37.671	336.309
		%	0,3	48,6	39,9	11,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	19.046	11.135	7.594	37.776
		%	.	50,4	29,5	20,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	26.034	19.749	7.025	52.808
		%	.	49,3	37,4	13,3	100,0
	Secundaria, superior	N	881	72.119	72.690	18.584	164.274
		%	0,5	43,9	44,2	11,3	100,0
	Terciaria	N	.	46.269	30.714	4.468	81.451
		%	.	56,8	37,7	5,5	100,0
45-64	Total	N	850	99.673	150.417	51.716	302.655
		%	0,3	32,9	49,7	17,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	20.708	34.943	14.749	70.400
		%	.	29,4	49,6	21,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	262	16.774	25.831	10.378	53.244
		%	0,5	31,5	48,5	19,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 166. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	273	37.445	60.554	18.858	117.130
			%	0,2	32,0	51,7	16,1	100,0
		Terciaria	N	316	24.746	29.088	7.731	61.881
			%	0,5	40,0	47,0	12,5	100,0
	65-74	Total	N	274	23.392	53.471	18.597	95.733
			%	0,3	24,4	55,9	19,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	274	7.442	21.875	8.426	38.017
			%	0,7	19,6	57,5	22,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	3.360	9.244	3.688	16.291
			%	.	20,6	56,7	22,6	100,0
		Secundaria, superior	N	.	8.327	13.168	4.453	25.948
			%	.	32,1	50,7	17,2	100,0
		Terciaria	N	.	4.264	9.184	2.029	15.477
			%	.	27,5	59,3	13,1	100,0
	>=75	Total	N	681	27.767	41.871	15.648	85.968
			%	0,8	32,3	48,7	18,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	485	16.704	25.894	11.406	54.489
			%	0,9	30,7	47,5	20,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	101	4.190	7.276	2.413	13.981
			%	0,7	30,0	52,0	17,3	100,0
		Secundaria, superior	N	.	2.890	6.181	1.407	10.478
			%	.	27,6	59,0	13,4	100,0
		Terciaria	N	95	3.983	2.520	422	7.020
			%	1,3	56,7	35,9	6,0	100,0
Mujeres	Total	Total	N	29.257	549.073	274.812	122.740	975.882
		%	3,0	56,3	28,2	12,6	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	6.599	114.409	101.896	55.423	278.327
			%	2,4	41,1	36,6	19,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.919	80.685	58.257	26.905	169.766
			%	2,3	47,5	34,3	15,8	100,0
		Secundaria, superior	N	10.583	200.039	66.897	30.347	307.866
			%	3,4	65,0	21,7	9,9	100,0
		Terciaria	N	8.156	153.940	47.761	10.066	219.923
			%	3,7	70,0	21,7	4,6	100,0
	Total	N	6.223	72.566	7.240	3.470	89.499	
		%	7,0	81,1	8,1	3,9	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 166. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

			Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total		
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	2.210	8.081	1.096	.	11.386	
			%	19,4	71,0	9,6	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	848	13.658	1.187	1.070	16.763	
			%	5,1	81,5	7,1	6,4	100,0	
		Secundaria, superior	N	2.892	37.248	3.033	2.270	45.443	
			%	6,4	82,0	6,7	5,0	100,0	
	Terciaria	N	273	13.579	1.924	130	15.907		
		%	1,7	85,4	12,1	0,8	100,0		
	25-44	Total	N	13.738	211.812	67.159	28.117	320.826	
			%	4,3	66,0	20,9	8,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	833	17.128	5.157	2.872	25.990	
			%	3,2	65,9	19,8	11,1	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.845	18.982	9.875	8.235	38.937	
			%	4,7	48,8	25,4	21,2	100,0	
		Secundaria, superior	N	5.484	87.655	24.757	12.591	130.487	
			%	4,2	67,2	19,0	9,6	100,0	
		Terciaria	N	5.576	88.047	27.370	4.419	125.412	
			%	4,4	70,2	21,8	3,5	100,0	
		45-64	Total	N	4.091	169.108	98.082	42.487	313.769
				%	1,3	53,9	31,3	13,5	100,0
	Sin estudios, primaria		N	763	32.415	28.144	16.642	77.963	
			%	1,0	41,6	36,1	21,3	100,0	
	Secundaria, inferior		N	456	29.244	23.634	8.400	61.735	
			%	0,7	47,4	38,3	13,6	100,0	
Secundaria, superior	N		1.758	63.498	32.431	12.634	110.322		
	%		1,6	57,6	29,4	11,5	100,0		
Terciaria	N		1.114	43.950	13.872	4.812	63.749		
	%		1,7	68,9	21,8	7,5	100,0		
65-74	Total		N	1.303	41.456	45.907	21.260	109.925	
			%	1,2	37,7	41,8	19,3	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	117	21.320	26.667	13.749	61.852		
		%	0,2	34,5	43,1	22,2	100,0		
	Secundaria, inferior	N	292	8.856	13.348	4.956	27.452		
		%	1,1	32,3	48,6	18,1	100,0		
	Secundaria, superior	N	185	6.451	3.077	2.180	11.893		
		%	1,6	54,2	25,9	18,3	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 166. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N	708	4.829	2.815	374	8.727	
			%	8,1	55,3	32,3	4,3	100,0	
	>=75	Total	N	3.902	54.131	56.424	27.407	141.864	
			%	2,8	38,2	39,8	19,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.677	35.466	40.833	22.161	101.136	
			%	2,6	35,1	40,4	21,9	100,0	
		Secundaria, inferior	N	477	9.945	10.214	4.243	24.879	
			%	1,9	40,0	41,1	17,1	100,0	
		Secundaria, superior	N	263	5.187	3.598	671	9.720	
			%	2,7	53,4	37,0	6,9	100,0	
		Terciaria	N	485	3.534	1.779	331	6.129	
			%	7,9	57,7	29,0	5,4	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	35.359	937.377	668.205	250.066	1.891.006
				%	1,9	49,6	35,3	13,2	100,0
			Sin estudios, primaria	N	9.080	185.830	196.419	97.598	488.927
				%	1,9	38,0	40,2	20,0	100,0
			Secundaria, inferior	N	5.246	156.861	123.965	51.148	337.220
				%	1,6	46,5	36,8	15,2	100,0
		Secundaria, superior	N	12.272	353.463	226.197	76.604	668.536	
			%	1,8	52,9	33,8	11,5	100,0	
		Terciaria	N	8.761	241.223	121.623	24.716	396.323	
			%	2,2	60,9	30,7	6,2	100,0	
		15-24	Total	N	9.638	146.569	20.586	7.164	183.958
				%	5,2	79,7	11,2	3,9	100,0
			Sin estudios, primaria	N	3.931	15.602	1.771	.	21.304
				%	18,5	73,2	8,3	.	100,0
			Secundaria, inferior	N	1.812	39.476	4.794	1.809	47.891
				%	3,8	82,4	10,0	3,8	100,0
			Secundaria, superior	N	3.427	69.891	9.740	5.225	88.283
				%	3,9	79,2	11,0	5,9	100,0
		Terciaria	N	468	21.600	4.281	130	26.479	
			%	1,8	81,6	16,2	0,5	100,0	
	25-44	Total	N	14.619	375.281	201.446	65.788	657.135	
			%	2,2	57,1	30,7	10,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	833	36.174	16.292	10.466	63.765	
			%	1,3	56,7	25,5	16,4	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 166. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	1.845	45.016	29.624	15.260	91.745
			%	2,0	49,1	32,3	16,6	100,0
		Secundaria, superior	N	6.365	159.775	97.447	31.175	294.762
			%	2,2	54,2	33,1	10,6	100,0
		Terciaria	N	5.576	134.317	58.084	8.886	206.862
			%	2,7	64,9	28,1	4,3	100,0
	45-64	Total	N	4.942	268.781	248.499	94.203	616.424
			%	0,8	43,6	40,3	15,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	763	53.123	63.087	31.390	148.363
			%	0,5	35,8	42,5	21,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	718	46.018	49.466	18.777	114.979
			%	0,6	40,0	43,0	16,3	100,0
		Secundaria, superior	N	2.031	100.943	92.985	31.492	227.452
			%	0,9	44,4	40,9	13,8	100,0
		Terciaria	N	1.430	68.697	42.961	12.543	125.630
			%	1,1	54,7	34,2	10,0	100,0
	65-74	Total	N	1.577	64.847	99.378	39.856	205.658
			%	0,8	31,5	48,3	19,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	391	28.762	48.542	22.175	99.869
			%	0,4	28,8	48,6	22,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	292	12.215	22.591	8.645	43.744
			%	0,7	27,9	51,6	19,8	100,0
		Secundaria, superior	N	185	14.778	16.245	6.633	37.841
			%	0,5	39,1	42,9	17,5	100,0
		Terciaria	N	708	9.093	11.999	2.404	24.204
			%	2,9	37,6	49,6	9,9	100,0
	>=75	Total	N	4.583	81.899	98.296	43.055	227.832
			%	2,0	35,9	43,1	18,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.162	52.169	66.727	33.567	155.625
			%	2,0	33,5	42,9	21,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	578	14.135	17.490	6.657	38.860
			%	1,5	36,4	45,0	17,1	100,0
		Secundaria, superior	N	263	8.077	9.780	2.078	20.198
			%	1,3	40,0	48,4	10,3	100,0
		Terciaria	N	580	7.517	4.299	753	13.149
			%	4,4	57,2	32,7	5,7	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 167. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y territorio histórico

			Excesivo	Normal	Escaso	Total
Hombres Total	CAPV	N	304.290	577.134	33.699	915.124
		%	33,3	63,1	3,7	100,0
	Araba	N	40.923	88.211	4.617	133.751
		%	30,6	66,0	3,5	100,0
	Gipuzkoa	N	92.868	190.799	10.145	293.812
		%	31,6	64,9	3,5	100,0
	Bizkaia	N	170.500	298.124	18.938	487.561
		%	35,0	61,1	3,9	100,0
15-24	CAPV	N	12.752	74.759	6.947	94.458
		%	13,5	79,1	7,4	100,0
	Araba	N	317	13.208	1.345	14.869
		%	2,1	88,8	9,0	100,0
	Gipuzkoa	N	3.645	25.063	2.596	31.305
		%	11,6	80,1	8,3	100,0
	Bizkaia	N	8.790	36.488	3.006	48.284
		%	18,2	75,6	6,2	100,0
25-44	CAPV	N	96.069	227.875	12.365	336.309
		%	28,6	67,8	3,7	100,0
	Araba	N	15.525	34.849	1.687	52.062
		%	29,8	66,9	3,2	100,0
	Gipuzkoa	N	26.456	76.884	3.449	106.790
		%	24,8	72,0	3,2	100,0
	Bizkaia	N	54.088	116.141	7.228	177.458
		%	30,5	65,4	4,1	100,0
45-64	CAPV	N	126.389	168.623	7.644	302.655
		%	41,8	55,7	2,5	100,0
	Araba	N	16.711	25.255	786	42.751
		%	39,1	59,1	1,8	100,0
	Gipuzkoa	N	39.473	55.194	2.752	97.419
		%	40,5	56,7	2,8	100,0
	Bizkaia	N	70.205	88.174	4.105	162.485
		%	43,2	54,3	2,5	100,0
65-74	CAPV	N	44.085	49.461	2.188	95.733
		%	46,0	51,7	2,3	100,0
	Araba	N	5.202	7.530	431	13.163
		%	39,5	57,2	3,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 167. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y territorio histórico

			Excesivo	Normal	Escaso	Total		
Hombres 65-74	Gipuzkoa	N	14.658	16.932	540	32.130		
		%	45,6	52,7	1,7	100,0		
	Bizkaia	N	24.225	24.998	1.217	50.440		
		%	48,0	49,6	2,4	100,0		
	>=75	CAPV	N	24.996	56.416	4.556	85.968	
			%	29,1	65,6	5,3	100,0	
		Araba	N	3.169	7.368	368	10.905	
			%	29,1	67,6	3,4	100,0	
		Gipuzkoa	N	8.636	16.726	806	26.168	
			%	33,0	63,9	3,1	100,0	
		Bizkaia	N	13.191	32.322	3.381	48.895	
			%	27,0	66,1	6,9	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	364.389	577.465	34.029	975.882
			%	37,3	59,2	3,5	100,0	
		Araba	N	47.867	85.160	3.744	136.772	
			%	35,0	62,3	2,7	100,0	
	Gipuzkoa	N	112.911	187.884	11.890	312.686		
		%	36,1	60,1	3,8	100,0		
	Bizkaia	N	203.610	304.421	18.394	526.425		
		%	38,7	57,8	3,5	100,0		
	15-24	CAPV	N	19.267	66.853	3.379	89.499	
			%	21,5	74,7	3,8	100,0	
		Araba	N	2.324	9.807	1.079	13.210	
			%	17,6	74,2	8,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	7.407	21.577	459	29.443	
			%	25,2	73,3	1,6	100,0	
		Bizkaia	N	9.536	35.468	1.841	46.846	
			%	20,4	75,7	3,9	100,0	
		25-44	CAPV	N	106.918	202.621	11.286	320.826
				%	33,3	63,2	3,5	100,0
Araba			N	14.203	32.234	1.431	47.869	
			%	29,7	67,3	3,0	100,0	
Gipuzkoa	N		33.865	62.828	5.212	101.905		
	%		33,2	61,7	5,1	100,0		
Bizkaia	N		58.850	107.558	4.644	171.052		
	%		34,4	62,9	2,7	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 167. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y territorio histórico

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	130.512	174.471	8.786	313.769
			%	41,6	55,6	2,8	100,0
		Araba	N	18.248	25.677	338	44.263
			%	41,2	58,0	0,8	100,0
		Gipuzkoa	N	38.345	58.180	3.137	99.662
			%	38,5	58,4	3,1	100,0
	Bizkaia	N	73.919	90.613	5.311	169.843	
		%	43,5	53,4	3,1	100,0	
	65-74	CAPV	N	54.650	53.128	2.147	109.925
			%	49,7	48,3	2,0	100,0
		Araba	N	7.235	6.908	177	14.320
			%	50,5	48,2	1,2	100,0
		Gipuzkoa	N	16.479	18.678	963	36.120
			%	45,6	51,7	2,7	100,0
	Bizkaia	N	30.935	27.542	1.007	59.484	
		%	52,0	46,3	1,7	100,0	
	>=75	CAPV	N	53.042	80.393	8.430	141.864
			%	37,4	56,7	5,9	100,0
Araba		N	5.857	10.533	720	17.110	
		%	34,2	61,6	4,2	100,0	
Gipuzkoa		N	16.815	26.620	2.120	45.555	
		%	36,9	58,4	4,7	100,0	
Bizkaia	N	30.370	43.240	5.590	79.200		
	%	38,3	54,6	7,1	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	668.679	1.154.599	67.728	1.891.006
			%	35,4	61,1	3,6	100,0
	Araba	N	88.791	173.371	8.361	270.523	
		%	32,8	64,1	3,1	100,0	
	Gipuzkoa	N	205.779	378.683	22.035	606.497	
		%	33,9	62,4	3,6	100,0	
	Bizkaia	N	374.110	602.545	37.332	1.013.987	
		%	36,9	59,4	3,7	100,0	
	15-24	CAPV	N	32.019	141.612	10.326	183.958
			%	17,4	77,0	5,6	100,0
		Araba	N	2.641	23.015	2.423	28.079
			%	9,4	82,0	8,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 167. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y territorio histórico

			Excesivo	Normal	Escaso	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N 11.052	46.641	3.055	60.748
			% 18,2	76,8	5,0	100,0
		Bizkaia	N 18.326	71.956	4.848	95.130
			% 19,3	75,6	5,1	100,0
	25-44	CAPV	N 202.988	430.496	23.651	657.135
			% 30,9	65,5	3,6	100,0
		Araba	N 29.728	67.084	3.119	99.930
			% 29,7	67,1	3,1	100,0
		Gipuzkoa	N 60.321	139.713	8.661	208.695
			% 28,9	66,9	4,2	100,0
		Bizkaia	N 112.939	223.699	11.872	348.509
			% 32,4	64,2	3,4	100,0
	45-64	CAPV	N 256.900	343.094	16.430	616.424
			% 41,7	55,7	2,7	100,0
		Araba	N 34.959	50.932	1.124	87.015
			% 40,2	58,5	1,3	100,0
		Gipuzkoa	N 77.818	113.374	5.889	197.081
			% 39,5	57,5	3,0	100,0
		Bizkaia	N 144.124	178.787	9.417	332.328
			% 43,4	53,8	2,8	100,0
	65-74	CAPV	N 98.735	102.589	4.335	205.658
			% 48,0	49,9	2,1	100,0
		Araba	N 12.438	14.439	607	27.483
			% 45,3	52,5	2,2	100,0
		Gipuzkoa	N 31.137	35.610	1.504	68.251
			% 45,6	52,2	2,2	100,0
		Bizkaia	N 55.160	52.540	2.224	109.924
			% 50,2	47,8	2,0	100,0
	>=75	CAPV	N 78.037	136.809	12.986	227.832
			% 34,3	60,0	5,7	100,0
		Araba	N 9.026	17.901	1.088	28.015
			% 32,2	63,9	3,9	100,0
		Gipuzkoa	N 25.451	43.346	2.926	71.723
			% 35,5	60,4	4,1	100,0
		Bizkaia	N 43.561	75.562	8.972	128.094
			% 34,0	59,0	7,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 168. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y clase social

			Excesivo	Normal	Escaso	Total
Hombres	Total	Total N	304.102	576.062	33.699	913.863
		%	33,3	63,0	3,7	100,0
	I	N	38.100	70.644	4.946	113.690
		%	33,5	62,1	4,4	100,0
	II	N	25.033	49.665	3.508	78.206
		%	32,0	63,5	4,5	100,0
	III	N	58.022	125.181	5.151	188.355
		%	30,8	66,5	2,7	100,0
	IV	N	158.599	276.705	15.002	450.306
		%	35,2	61,4	3,3	100,0
	V	N	24.347	53.867	5.093	83.307
		%	29,2	64,7	6,1	100,0
	15-24	Total N	12.752	74.201	6.947	93.900
		%	13,6	79,0	7,4	100,0
	I	N	1.815	10.872	1.947	14.634
		%	12,4	74,3	13,3	100,0
	II	N	1.393	8.073	1.522	10.988
		%	12,7	73,5	13,9	100,0
	III	N	1.011	14.975	844	16.830
		%	6,0	89,0	5,0	100,0
	IV	N	7.933	32.561	2.244	42.737
		%	18,6	76,2	5,2	100,0
	V	N	600	7.720	390	8.711
		%	6,9	88,6	4,5	100,0
	25-44	Total N	96.069	227.875	12.365	336.309
		%	28,6	67,8	3,7	100,0
	I	N	14.600	27.330	1.802	43.732
		%	33,4	62,5	4,1	100,0
	II	N	9.319	22.366	812	32.496
		%	28,7	68,8	2,5	100,0
	III	N	15.800	44.937	1.519	62.257
		%	25,4	72,2	2,4	100,0
	IV	N	45.948	109.036	5.408	160.392
		%	28,6	68,0	3,4	100,0
	V	N	10.403	24.206	2.824	37.432
		%	27,8	64,7	7,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 168. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y clase social

		Excesivo	Normal	Escaso	Total		
Hombres	45-64	Total	N 126.200	168.524	7.644	302.368	
			% 41,7	55,7	2,5	100,0	
	I	N	15.167	22.278	463	37.907	
		%	40,0	58,8	1,2	100,0	
	II	N	9.322	14.098	.	23.419	
		%	39,8	60,2	.	100,0	
	III	N	27.490	37.695	1.138	66.322	
		%	41,4	56,8	1,7	100,0	
	IV	N	66.181	79.910	4.523	150.614	
		%	43,9	53,1	3,0	100,0	
	V	N	8.041	14.544	1.521	24.106	
		%	33,4	60,3	6,3	100,0	
	65-74	Total	N	44.085	49.461	2.188	95.733
			%	46,0	51,7	2,3	100,0
		I	N	5.919	7.834	.	13.753
			%	43,0	57,0	.	100,0
		II	N	4.020	2.366	477	6.862
			%	58,6	34,5	6,9	100,0
III		N	9.029	12.256	492	21.777	
		%	41,5	56,3	2,3	100,0	
IV		N	22.980	23.553	1.219	47.753	
		%	48,1	49,3	2,6	100,0	
V		N	2.138	3.451	.	5.588	
		%	38,3	61,7	.	100,0	
>=75		Total	N	24.996	56.001	4.556	85.553
			%	29,2	65,5	5,3	100,0
		I	N	600	2.330	733	3.663
			%	16,4	63,6	20,0	100,0
		II	N	980	2.763	697	4.440
			%	22,1	62,2	15,7	100,0
	III	N	4.693	15.318	1.159	21.169	
		%	22,2	72,4	5,5	100,0	
	IV	N	15.557	31.645	1.608	48.810	
		%	31,9	64,8	3,3	100,0	
	V	N	3.166	3.946	359	7.470	
		%	42,4	52,8	4,8	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 168. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y clase social

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Mujeres	Total	Total	N	363.847	575.817	33.828	973.492
			%	37,4	59,1	3,5	100,0
	I	Total	N	32.145	68.085	4.608	104.838
		%	30,7	64,9	4,4	100,0	
	II	Total	N	28.505	62.372	4.151	95.028
		%	30,0	65,6	4,4	100,0	
	III	Total	N	85.320	148.917	7.870	242.107
		%	35,2	61,5	3,3	100,0	
	IV	Total	N	143.848	204.902	11.692	360.441
		%	39,9	56,8	3,2	100,0	
	V	Total	N	74.030	91.540	5.508	171.077
		%	43,3	53,5	3,2	100,0	
	15-24	Total	N	19.267	65.887	3.379	88.533
		%	21,8	74,4	3,8	100,0	
	I	Total	N	2.581	10.781	1.200	14.562
		%	17,7	74,0	8,2	100,0	
	II	Total	N	2.656	10.268	573	13.497
		%	19,7	76,1	4,2	100,0	
	III	Total	N	3.066	16.540	464	20.069
		%	15,3	82,4	2,3	100,0	
	IV	Total	N	8.335	22.472	807	31.614
		%	26,4	71,1	2,6	100,0	
	V	Total	N	2.629	5.827	335	8.792
		%	29,9	66,3	3,8	100,0	
	25-44	Total	N	106.649	202.395	11.286	320.330
		%	33,3	63,2	3,5	100,0	
	I	Total	N	12.505	31.568	1.013	45.086
		%	27,7	70,0	2,2	100,0	
	II	Total	N	8.813	26.440	1.970	37.223
		%	23,7	71,0	5,3	100,0	
	III	Total	N	25.904	53.582	2.544	82.029
		%	31,6	65,3	3,1	100,0	
	IV	Total	N	40.755	65.783	4.187	110.725
		%	36,8	59,4	3,8	100,0	
	V	Total	N	18.671	25.023	1.573	45.267
		%	41,2	55,3	3,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 168. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y clase social

			Excesivo	Normal	Escaso	Total		
Mujeres	45-64	Total	N 130.341	174.471	8.786	313.598		
			% 41,6	55,6	2,8	100,0		
	I	N	10.355	20.122	1.640	32.116		
		%	32,2	62,7	5,1	100,0		
	II	N	9.206	16.236	1.350	26.792		
		%	34,4	60,6	5,0	100,0		
	III	N	35.189	51.536	1.916	88.641		
		%	39,7	58,1	2,2	100,0		
	IV	N	45.422	56.351	2.329	104.102		
		%	43,6	54,1	2,2	100,0		
	V	N	30.169	30.225	1.551	61.946		
		%	48,7	48,8	2,5	100,0		
		65-74	Total	N 54.650	52.973	2.147	109.770	
				% 49,8	48,3	2,0	100,0	
		I	N	4.351	2.590	258	7.199	
			%	60,4	36,0	3,6	100,0	
		II	N	2.774	4.193	258	7.225	
			%	38,4	58,0	3,6	100,0	
		III	N	11.636	10.304	960	22.899	
			%	50,8	45,0	4,2	100,0	
		IV	N	25.461	24.319	355	50.134	
			%	50,8	48,5	0,7	100,0	
		V	N	10.428	11.567	317	22.312	
			%	46,7	51,8	1,4	100,0	
			>=75	Total	N 52.941	80.090	8.230	141.261
					% 37,5	56,7	5,8	100,0
			I	N	2.353	3.024	499	5.875
%				40,0	51,5	8,5	100,0	
II			N	5.056	5.236	.	10.292	
			%	49,1	50,9	.	100,0	
III			N	9.526	16.956	1.986	28.468	
			%	33,5	59,6	7,0	100,0	
IV			N	23.875	35.977	4.014	63.866	
			%	37,4	56,3	6,3	100,0	
V			N	12.131	18.898	1.731	32.760	
			%	37,0	57,7	5,3	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 168. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y clase social

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Ambos	Total	Total	N	667.949	1.151.879	67.528	1.887.356
			%	35,4	61,0	3,6	100,0
	I	N		70.245	138.729	9.554	218.528
			%	32,1	63,5	4,4	100,0
	II	N		53.538	112.038	7.659	173.234
			%	30,9	64,7	4,4	100,0
	III	N		143.342	274.098	13.021	430.462
			%	33,3	63,7	3,0	100,0
	IV	N		302.447	481.607	26.693	810.747
			%	37,3	59,4	3,3	100,0
	V	N		98.377	145.407	10.601	254.385
			%	38,7	57,2	4,2	100,0
	15-24	Total	N	32.019	140.089	10.326	182.434
			%	17,6	76,8	5,7	100,0
	I	N		4.396	21.653	3.147	29.196
			%	15,1	74,2	10,8	100,0
	II	N		4.050	18.340	2.095	24.485
			%	16,5	74,9	8,6	100,0
	III	N		4.077	31.515	1.308	36.900
			%	11,0	85,4	3,5	100,0
	IV	N		16.268	55.032	3.051	74.351
			%	21,9	74,0	4,1	100,0
	V	N		3.230	13.547	726	17.503
			%	18,5	77,4	4,1	100,0
	25-44	Total	N	202.718	430.270	23.651	656.640
			%	30,9	65,5	3,6	100,0
	I	N		27.105	58.898	2.815	88.818
			%	30,5	66,3	3,2	100,0
	II	N		18.131	48.806	2.782	69.719
			%	26,0	70,0	4,0	100,0
	III	N		41.704	98.519	4.064	144.286
			%	28,9	68,3	2,8	100,0
	IV	N		86.704	174.819	9.594	271.117
			%	32,0	64,5	3,5	100,0
	V	N		29.074	49.229	4.396	82.699
			%	35,2	59,5	5,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 168. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y clase social

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Ambos	45-64	Total	N	256.541	342.995	16.430	615.965
			%	41,6	55,7	2,7	100,0
	I	N		25.522	42.399	2.102	70.023
		%		36,4	60,6	3,0	100,0
	II	N		18.528	30.334	1.350	50.212
		%		36,9	60,4	2,7	100,0
	III	N		62.678	89.231	3.054	154.963
		%		40,4	57,6	2,0	100,0
	IV	N		111.603	136.261	6.851	254.716
		%		43,8	53,5	2,7	100,0
	V	N		38.210	44.770	3.072	86.052
		%		44,4	52,0	3,6	100,0
	65-74	Total	N	98.735	102.434	4.335	205.503
		%		48,0	49,8	2,1	100,0
	I	N		10.270	10.425	258	20.952
		%		49,0	49,8	1,2	100,0
	II	N		6.794	6.559	734	14.087
		%		48,2	46,6	5,2	100,0
	III	N		20.664	22.560	1.452	44.676
		%		46,3	50,5	3,2	100,0
	IV	N		48.440	47.872	1.575	97.887
		%		49,5	48,9	1,6	100,0
	V	N		12.566	15.018	317	27.901
		%		45,0	53,8	1,1	100,0
	>=75	Total	N	77.936	136.092	12.786	226.814
		%		34,4	60,0	5,6	100,0
	I	N		2.953	5.354	1.232	9.538
		%		31,0	56,1	12,9	100,0
	II	N		6.035	7.999	697	14.731
		%		41,0	54,3	4,7	100,0
	III	N		14.219	32.274	3.145	49.638
		%		28,6	65,0	6,3	100,0
	IV	N		39.432	67.622	5.622	112.676
		%		35,0	60,0	5,0	100,0
	V	N		15.297	22.844	2.090	40.231
		%		38,0	56,8	5,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 169. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excesivo	Normal	Escaso	Total
Hombres Total	Total	N	304.290	577.134	33.699	915.124
		%	33,3	63,1	3,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	77.674	125.455	7.471	210.600
		%	36,9	59,6	3,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	53.171	104.530	9.754	167.454
		%	31,8	62,4	5,8	100,0
	Secundaria, superior	N	121.249	229.332	10.089	360.670
		%	33,6	63,6	2,8	100,0
	Terciaria	N	52.196	117.818	6.386	176.400
		%	29,6	66,8	3,6	100,0
15-24	Total	N	12.752	74.759	6.947	94.458
		%	13,5	79,1	7,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	733	7.714	1.471	9.918
		%	7,4	77,8	14,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.884	26.438	1.806	31.129
		%	9,3	84,9	5,8	100,0
	Secundaria, superior	N	7.961	32.873	2.006	42.840
		%	18,6	76,7	4,7	100,0
	Terciaria	N	1.173	7.735	1.663	10.572
		%	11,1	73,2	15,7	100,0
25-44	Total	N	96.069	227.875	12.365	336.309
		%	28,6	67,8	3,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	11.960	24.497	1.319	37.776
		%	31,7	64,8	3,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	14.614	33.912	4.283	52.808
		%	27,7	64,2	8,1	100,0
	Secundaria, superior	N	50.266	110.090	3.918	164.274
		%	30,6	67,0	2,4	100,0
	Terciaria	N	19.230	59.376	2.845	81.451
		%	23,6	72,9	3,5	100,0
45-64	Total	N	126.389	168.623	7.644	302.655
		%	41,8	55,7	2,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	30.747	37.531	2.122	70.400
		%	43,7	53,3	3,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	23.319	27.836	2.090	53.244
		%	43,8	52,3	3,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 169. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excesivo	Normal	Escaso	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	48.776	65.385	2.969	117.130	
			%	41,6	55,8	2,5	100,0	
		Terciaria	N	23.547	37.871	463	61.881	
	%		38,1	61,2	0,7	100,0		
		65-74	Total	N	44.085	49.461	2.188	95.733
			%	46,0	51,7	2,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	17.765	19.503	749	38.017	
	%		46,7	51,3	2,0	100,0		
		Secundaria, inferior	N	7.951	7.381	959	16.291	
	%		48,8	45,3	5,9	100,0		
		Secundaria, superior	N	11.090	14.378	480	25.948	
	%		42,7	55,4	1,9	100,0		
		Terciaria	N	7.278	8.199	.	15.477	
	%		47,0	53,0	.	100,0		
		>=75	Total	N	24.996	56.416	4.556	85.968
			%	29,1	65,6	5,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	16.468	36.210	1.810	54.489	
	%		30,2	66,5	3,3	100,0		
		Secundaria, inferior	N	4.403	8.963	615	13.981	
	%		31,5	64,1	4,4	100,0		
		Secundaria, superior	N	3.156	6.607	715	10.478	
	%		30,1	63,1	6,8	100,0		
		Terciaria	N	968	4.636	1.416	7.020	
	%		13,8	66,0	20,2	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	364.389	577.465	34.029	975.882	
		%	37,3	59,2	3,5	100,0		
		Sin estudios, primaria	N	119.439	148.516	10.373	278.327	
	%		42,9	53,4	3,7	100,0		
		Secundaria, inferior	N	71.328	92.204	6.234	169.766	
	%		42,0	54,3	3,7	100,0		
		Secundaria, superior	N	105.086	192.671	10.109	307.866	
	%		34,1	62,6	3,3	100,0		
		Terciaria	N	68.536	144.075	7.312	219.923	
	%		31,2	65,5	3,3	100,0		
		15-24	Total	N	19.267	66.853	3.379	89.499
	%		21,5	74,7	3,8	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 169. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	2.642	7.649	1.094	11.386
			%	23,2	67,2	9,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.252	11.501	1.010	16.763
			%	25,4	68,6	6,0	100,0
		Secundaria, superior	N	9.546	34.623	1.274	45.443
			%	21,0	76,2	2,8	100,0
		Terciaria	N	2.828	13.079	.	15.907
			%	17,8	82,2	.	100,0
	25-44	Total	N	106.918	202.621	11.286	320.826
			%	33,3	63,2	3,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.606	15.938	1.445	25.990
			%	33,1	61,3	5,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	16.415	21.020	1.501	38.937
			%	42,2	54,0	3,9	100,0
		Secundaria, superior	N	43.003	84.025	3.459	130.487
			%	33,0	64,4	2,7	100,0
		Terciaria	N	38.893	81.637	4.881	125.412
			%	31,0	65,1	3,9	100,0
	45-64	Total	N	130.512	174.471	8.786	313.769
			%	41,6	55,6	2,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	37.777	39.418	769	77.963
			%	48,5	50,6	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	27.356	33.106	1.272	61.735
			%	44,3	53,6	2,1	100,0
		Secundaria, superior	N	43.632	61.762	4.928	110.322
			%	39,5	56,0	4,5	100,0
		Terciaria	N	21.747	40.185	1.816	63.749
			%	34,1	63,0	2,8	100,0
	65-74	Total	N	54.650	53.128	2.147	109.925
			%	49,7	48,3	2,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	31.315	29.553	984	61.852
			%	50,6	47,8	1,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	14.078	12.911	463	27.452
			%	51,3	47,0	1,7	100,0
		Secundaria, superior	N	6.144	5.564	185	11.893
			%	51,7	46,8	1,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 169. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excesivo	Normal	Escaso	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N	3.113	5.099	515	8.727	
			%	35,7	58,4	5,9	100,0	
	>=75	Total	N	53.042	80.393	8.430	141.864	
			%	37,4	56,7	5,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	39.098	55.957	6.081	101.136	
			%	38,7	55,3	6,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	9.227	13.665	1.987	24.879	
			%	37,1	54,9	8,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	2.761	6.696	263	9.720	
			%	28,4	68,9	2,7	100,0	
		Terciaria	N	1.955	4.074	100	6.129	
			%	31,9	66,5	1,6	100,0	
Ambos	Total	Total	N	668.679	1.154.599	67.728	1.891.006	
			%	35,4	61,1	3,6	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	197.113	273.970	17.844	488.927	
			%	40,3	56,0	3,6	100,0	
		Secundaria, inferior	N	124.499	196.734	15.987	337.220	
			%	36,9	58,3	4,7	100,0	
		Secundaria, superior	N	226.335	422.003	20.198	668.536	
			%	33,9	63,1	3,0	100,0	
		Terciaria	N	120.732	261.893	13.699	396.323	
			%	30,5	66,1	3,5	100,0	
		15-24	Total	N	32.019	141.612	10.326	183.958
				%	17,4	77,0	5,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.376	15.363	2.566	21.304	
			%	15,8	72,1	12,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	7.136	37.939	2.817	47.891	
			%	14,9	79,2	5,9	100,0	
		Secundaria, superior	N	17.507	67.496	3.280	88.283	
			%	19,8	76,5	3,7	100,0	
		Terciaria	N	4.001	20.815	1.663	26.479	
			%	15,1	78,6	6,3	100,0	
	25-44	Total	N	202.988	430.496	23.651	657.135	
			%	30,9	65,5	3,6	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	20.567	40.435	2.764	63.765	
			%	32,3	63,4	4,3	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 169. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	31.029	54.932	5.785	91.745
			%	33,8	59,9	6,3	100,0
		Secundaria, superior	N	93.269	194.116	7.377	294.762
			%	31,6	65,9	2,5	100,0
		Terciaria	N	58.123	141.013	7.726	206.862
			%	28,1	68,2	3,7	100,0
	45-64	Total	N	256.900	343.094	16.430	616.424
			%	41,7	55,7	2,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	68.523	76.949	2.891	148.363
			%	46,2	51,9	1,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	50.675	60.942	3.362	114.979
			%	44,1	53,0	2,9	100,0
		Secundaria, superior	N	92.408	127.147	7.898	227.452
			%	40,6	55,9	3,5	100,0
		Terciaria	N	45.294	78.056	2.279	125.630
			%	36,1	62,1	1,8	100,0
	65-74	Total	N	98.735	102.589	4.335	205.658
			%	48,0	49,9	2,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	49.081	49.056	1.733	99.869
			%	49,1	49,1	1,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	22.029	20.293	1.422	43.744
			%	50,4	46,4	3,3	100,0
		Secundaria, superior	N	17.234	19.942	665	37.841
			%	45,5	52,7	1,8	100,0
		Terciaria	N	10.391	13.298	515	24.204
			%	42,9	54,9	2,1	100,0
	>=75	Total	N	78.037	136.809	12.986	227.832
			%	34,3	60,0	5,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	55.567	92.167	7.891	155.625
			%	35,7	59,2	5,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.630	22.629	2.602	38.860
			%	35,1	58,2	6,7	100,0
		Secundaria, superior	N	5.917	13.303	978	20.198
			%	29,3	65,9	4,8	100,0
		Terciaria	N	2.923	8.710	1.515	13.149
			%	22,2	66,2	11,5	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 170. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y territorio histórico

				Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total
Hombres	Total	CAPV	N	490.540	380.355	44.229	915.124
			%	53,6	41,6	4,8	100,0
		Araba	N	78.333	48.514	6.904	133.751
			%	58,6	36,3	5,2	100,0
		Gipuzkoa	N	160.349	120.967	12.496	293.812
			%	54,6	41,2	4,3	100,0
		Bizkaia	N	251.858	210.875	24.829	487.561
			%	51,7	43,3	5,1	100,0
	15-24	CAPV	N	61.708	21.395	11.355	94.458
			%	65,3	22,7	12,0	100,0
		Araba	N	12.098	887	1.884	14.869
			%	81,4	6,0	12,7	100,0
		Gipuzkoa	N	19.816	7.722	3.767	31.305
			%	63,3	24,7	12,0	100,0
	Bizkaia	N	29.794	12.786	5.705	48.284	
		%	61,7	26,5	11,8	100,0	
	25-44	CAPV	N	192.121	126.358	17.830	336.309
			%	57,1	37,6	5,3	100,0
		Araba	N	28.381	20.765	2.916	52.062
			%	54,5	39,9	5,6	100,0
		Gipuzkoa	N	63.025	38.254	5.510	106.790
			%	59,0	35,8	5,2	100,0
	Bizkaia	N	100.715	67.339	9.404	177.458	
		%	56,8	37,9	5,3	100,0	
45-64	CAPV	N	140.894	154.050	7.712	302.655	
		%	46,6	50,9	2,5	100,0	
	Araba	N	22.371	19.203	1.178	42.751	
		%	52,3	44,9	2,8	100,0	
	Gipuzkoa	N	45.772	49.764	1.883	97.419	
		%	47,0	51,1	1,9	100,0	
Bizkaia	N	72.751	85.083	4.651	162.485		
	%	44,8	52,4	2,9	100,0		
65-74	CAPV	N	43.056	50.403	2.275	95.733	
		%	45,0	52,6	2,4	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 170. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y territorio histórico

			Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total		
Hombres 65-74	Araba	N	7.765	4.868	530	13.163		
		%	59,0	37,0	4,0	100,0		
	Gipuzkoa	N	15.868	15.871	391	32.130		
		%	49,4	49,4	1,2	100,0		
	Bizkaia	N	19.423	29.664	1.353	50.440		
		%	38,5	58,8	2,7	100,0		
	>=75	CAPV	N	52.761	28.150	5.057	85.968	
			%	61,4	32,7	5,9	100,0	
		Araba	N	7.718	2.791	395	10.905	
			%	70,8	25,6	3,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	15.867	9.356	945	26.168	
			%	60,6	35,8	3,6	100,0	
Bizkaia		N	29.176	16.003	3.716	48.895		
		%	59,7	32,7	7,6	100,0		
Mujeres		Total	CAPV	N	434.106	510.745	31.031	975.882
			%	44,5	52,3	3,2	100,0	
		Araba	N	72.861	62.243	1.668	136.772	
			%	53,3	45,5	1,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	138.601	163.106	10.979	312.686		
		%	44,3	52,2	3,5	100,0		
	Bizkaia	N	222.645	285.396	18.384	526.425		
		%	42,3	54,2	3,5	100,0		
	15-24	CAPV	N	49.338	36.695	3.466	89.499	
			%	55,1	41,0	3,9	100,0	
		Araba	N	9.066	3.617	526	13.210	
			%	68,6	27,4	4,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	14.709	14.194	540	29.443	
			%	50,0	48,2	1,8	100,0	
	Bizkaia	N	25.563	18.883	2.400	46.846		
		%	54,6	40,3	5,1	100,0		
	25-44	CAPV	N	138.794	172.404	9.627	320.826	
			%	43,3	53,7	3,0	100,0	
Araba		N	25.619	21.977	272	47.869		
		%	53,5	45,9	0,6	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 170. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y territorio histórico

				Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total	
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	41.918	55.327	4.661	101.905	
			%	41,1	54,3	4,6	100,0	
		Bizkaia	N	71.257	95.100	4.695	171.052	
			%	41,7	55,6	2,7	100,0	
		45-64	CAPV	N	124.008	181.591	8.170	313.769
				%	39,5	57,9	2,6	100,0
	Araba		N	21.122	22.910	230	44.263	
			%	47,7	51,8	0,5	100,0	
	Gipuzkoa		N	41.288	55.794	2.580	99.662	
			%	41,4	56,0	2,6	100,0	
	Bizkaia	N	61.597	102.887	5.360	169.843		
		%	36,3	60,6	3,2	100,0		
	65-74	CAPV	N	45.029	62.244	2.652	109.925	
			%	41,0	56,6	2,4	100,0	
		Araba	N	6.722	7.421	177	14.320	
			%	46,9	51,8	1,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	15.312	19.607	1.202	36.120	
			%	42,4	54,3	3,3	100,0	
		Bizkaia	N	22.994	35.216	1.274	59.484	
			%	38,7	59,2	2,1	100,0	
		>=75	CAPV	N	76.938	57.812	7.115	141.864
				%	54,2	40,8	5,0	100,0
			Araba	N	10.330	6.317	463	17.110
				%	60,4	36,9	2,7	100,0
Gipuzkoa	N		25.374	18.184	1.996	45.555		
	%		55,7	39,9	4,4	100,0		
Bizkaia	N	41.234	33.311	4.655	79.200			
	%	52,1	42,1	5,9	100,0			
Ambos	Total	CAPV	N	924.646	891.101	75.259	1.891.006	
			%	48,9	47,1	4,0	100,0	
	Araba	N	151.194	110.757	8.572	270.523		
		%	55,9	40,9	3,2	100,0		
	Gipuzkoa	N	298.950	284.072	23.475	606.497		
		%	49,3	46,8	3,9	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 170. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y territorio histórico

				Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total	
Ambos	Total	Bizkaia	N	474.503	496.271	43.213	1.013.987	
			%	46,8	48,9	4,3	100,0	
	15-24	CAPV	N	111.046	58.090	14.821	183.958	
			%	60,4	31,6	8,1	100,0	
	Araba	N	21.165	4.505	2.410	28.079		
		%	75,4	16,0	8,6	100,0		
	Gipuzkoa	N	34.525	21.916	4.307	60.748		
		%	56,8	36,1	7,1	100,0		
	Bizkaia	N	55.357	31.669	8.105	95.130		
		%	58,2	33,3	8,5	100,0		
		25-44	CAPV	N	330.915	298.762	27.457	657.135
				%	50,4	45,5	4,2	100,0
		Araba	N	54.001	42.742	3.188	99.930	
			%	54,0	42,8	3,2	100,0	
Gipuzkoa		N	104.943	93.581	10.171	208.695		
		%	50,3	44,8	4,9	100,0		
Bizkaia		N	171.972	162.439	14.099	348.509		
		%	49,3	46,6	4,0	100,0		
		45-64	CAPV	N	264.902	335.640	15.882	616.424
				%	43,0	54,4	2,6	100,0
		Araba	N	43.493	42.113	1.409	87.015	
			%	50,0	48,4	1,6	100,0	
	Gipuzkoa	N	87.061	105.557	4.463	197.081		
		%	44,2	53,6	2,3	100,0		
	Bizkaia	N	134.348	187.970	10.010	332.328		
		%	40,4	56,6	3,0	100,0		
		65-74	CAPV	N	88.085	112.646	4.927	205.658
				%	42,8	54,8	2,4	100,0
		Araba	N	14.487	12.289	707	27.483	
			%	52,7	44,7	2,6	100,0	
Gipuzkoa		N	31.180	35.477	1.593	68.251		
		%	45,7	52,0	2,3	100,0		
Bizkaia		N	42.417	64.880	2.627	109.924		
		%	38,6	59,0	2,4	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 170. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y territorio histórico

				Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total
Ambos	>=75	CAPV	N	129.699	85.962	12.172	227.832
			%	56,9	37,7	5,3	100,0
		Araba	N	18.048	9.108	858	28.015
			%	64,4	32,5	3,1	100,0
		Gipuzkoa	N	41.241	27.540	2.942	71.723
			%	57,5	38,4	4,1	100,0
		Bizkaia	N	70.409	49.314	8.371	128.094
			%	55,0	38,5	6,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 171. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y clase social

			Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total	
Hombres	Total	Total	N	489.728	379.906	44.229	913.863
			%	53,6	41,6	4,8	100,0
	I	N	59.113	50.216	4.360	113.690	
		%	52,0	44,2	3,8	100,0	
	II	N	38.290	34.485	5.431	78.206	
		%	49,0	44,1	6,9	100,0	
	III	N	101.917	78.359	8.079	188.355	
		%	54,1	41,6	4,3	100,0	
	IV	N	244.762	185.872	19.672	450.306	
		%	54,4	41,3	4,4	100,0	
	V	N	45.647	30.973	6.688	83.307	
		%	54,8	37,2	8,0	100,0	
	15-24	Total	N	61.410	21.135	11.355	93.900
			%	65,4	22,5	12,1	100,0
	I	N	8.552	4.455	1.627	14.634	
		%	58,4	30,4	11,1	100,0	
	II	N	5.908	2.315	2.765	10.988	
		%	53,8	21,1	25,2	100,0	
	III	N	13.038	2.367	1.425	16.830	
		%	77,5	14,1	8,5	100,0	
	IV	N	28.017	10.438	4.282	42.737	
		%	65,6	24,4	10,0	100,0	
	V	N	5.894	1.560	1.257	8.711	
		%	67,7	17,9	14,4	100,0	
	25-44	Total	N	192.121	126.358	17.830	336.309
			%	57,1	37,6	5,3	100,0
	I	N	23.889	18.274	1.569	43.732	
		%	54,6	41,8	3,6	100,0	
	II	N	16.967	14.037	1.492	32.496	
		%	52,2	43,2	4,6	100,0	
	III	N	34.752	23.764	3.740	62.257	
		%	55,8	38,2	6,0	100,0	
	IV	N	95.655	57.898	6.839	160.392	
		%	59,6	36,1	4,3	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 171. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y clase social

			Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total	
Hombres	25-44	V	N	20.857	12.385	4.190	37.432
			%	55,7	33,1	11,2	100,0
	45-64	Total	N	140.795	153.861	7.712	302.368
			%	46,6	50,9	2,6	100,0
		I	N	17.549	19.640	718	37.907
			%	46,3	51,8	1,9	100,0
		II	N	11.175	12.244	.	23.419
			%	47,7	52,3	.	100,0
		III	N	30.472	34.859	991	66.322
			%	45,9	52,6	1,5	100,0
		IV	N	69.144	76.211	5.260	150.614
			%	45,9	50,6	3,5	100,0
		V	N	12.456	10.907	743	24.106
			%	51,7	45,2	3,1	100,0
	65-74	Total	N	43.056	50.403	2.275	95.733
			%	45,0	52,6	2,4	100,0
		I	N	7.036	6.717	.	13.753
			%	51,2	48,8	.	100,0
		II	N	1.881	4.504	477	6.862
			%	27,4	65,6	6,9	100,0
		III	N	9.920	11.301	556	21.777
			%	45,6	51,9	2,6	100,0
		IV	N	21.750	24.761	1.242	47.753
			%	45,5	51,9	2,6	100,0
		V	N	2.469	3.119	.	5.588
			%	44,2	55,8	.	100,0
	>=75	Total	N	52.346	28.150	5.057	85.553
			%	61,2	32,9	5,9	100,0
		I	N	2.087	1.129	447	3.663
			%	57,0	30,8	12,2	100,0
		II	N	2.358	1.385	697	4.440
			%	53,1	31,2	15,7	100,0
		III	N	13.734	6.068	1.367	21.169
			%	64,9	28,7	6,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 171. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y clase social

			Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total	
Hombres	>=75	IV	N	30.195	16.566	2.049	48.810
			%	61,9	33,9	4,2	100,0
	V	N	3.971	3.002	497	7.470	
		%	53,2	40,2	6,7	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	432.465	509.997	31.031	973.492
			%	44,4	52,4	3,2	100,0
	I	N	50.558	50.422	3.857	104.838	
		%	48,2	48,1	3,7	100,0	
	II	N	47.113	45.335	2.580	95.028	
		%	49,6	47,7	2,7	100,0	
	III	N	106.796	128.264	7.047	242.107	
		%	44,1	53,0	2,9	100,0	
	IV	N	156.067	192.245	12.130	360.441	
		%	43,3	53,3	3,4	100,0	
	V	N	71.931	93.730	5.416	171.077	
		%	42,0	54,8	3,2	100,0	
	15-24	Total	N	48.580	36.488	3.466	88.533
			%	54,9	41,2	3,9	100,0
	I	N	8.988	5.113	461	14.562	
		%	61,7	35,1	3,2	100,0	
	II	N	8.044	5.221	232	13.497	
		%	59,6	38,7	1,7	100,0	
	III	N	11.380	7.581	1.108	20.069	
		%	56,7	37,8	5,5	100,0	
IV	N	15.976	14.308	1.329	31.614		
	%	50,5	45,3	4,2	100,0		
V	N	4.191	4.265	335	8.792		
	%	47,7	48,5	3,8	100,0		
25-44	Total	N	138.568	172.135	9.627	320.330	
		%	43,3	53,7	3,0	100,0	
I	N	21.356	22.243	1.486	45.086		
	%	47,4	49,3	3,3	100,0		
II	N	18.472	17.507	1.245	37.223		
	%	49,6	47,0	3,3	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 171. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y clase social

				Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total
Mujeres	25-44	III	N	33.871	46.141	2.018	82.029
			%	41,3	56,2	2,5	100,0
		IV	N	47.255	60.010	3.460	110.725
			%	42,7	54,2	3,1	100,0
		V	N	17.614	26.234	1.419	45.267
			%	38,9	58,0	3,1	100,0
	45-64	Total	N	124.008	181.420	8.170	313.598
			%	39,5	57,9	2,6	100,0
	I	N	13.898	17.064	1.154	32.116	
			%	43,3	53,1	3,6	100,0
	II	N	12.001	13.945	846	26.792	
			%	44,8	52,0	3,2	100,0
	III	N	35.704	50.997	1.940	88.641	
			%	40,3	57,5	2,2	100,0
	IV	N	39.997	61.592	2.513	104.102	
			%	38,4	59,2	2,4	100,0
	V	N	22.407	37.821	1.718	61.946	
			%	36,2	61,1	2,8	100,0
	65-74	Total	N	44.873	62.244	2.652	109.770
			%	40,9	56,7	2,4	100,0
	I	N	2.889	4.052	258	7.199	
			%	40,1	56,3	3,6	100,0
	II	N	3.389	3.579	258	7.225	
			%	46,9	49,5	3,6	100,0
III	N	8.437	13.642	820	22.899		
		%	36,8	59,6	3,6	100,0	
IV	N	19.718	29.880	536	50.134		
		%	39,3	59,6	1,1	100,0	
V	N	10.441	11.091	781	22.312		
		%	46,8	49,7	3,5	100,0	
>=75	Total	N	76.436	57.711	7.115	141.261	
		%	54,1	40,9	5,0	100,0	
I	N	3.426	1.950	499	5.875		
		%	58,3	33,2	8,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 171. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y clase social

				Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total	
Mujeres	>=75	II	N	5.207	5.084	.	10.292	
			%	50,6	49,4	.	100,0	
		III	N	17.404	9.904	1.160	28.468	
			%	61,1	34,8	4,1	100,0	
		IV	N	33.120	26.454	4.292	63.866	
			%	51,9	41,4	6,7	100,0	
		V	N	17.278	14.319	1.164	32.760	
			%	52,7	43,7	3,6	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	922.193	889.903	75.259	1.887.356
				%	48,9	47,2	4,0	100,0
	I	N	N	109.672	100.639	8.217	218.528	
			%	50,2	46,1	3,8	100,0	
	II	N	N	85.402	79.821	8.011	173.234	
			%	49,3	46,1	4,6	100,0	
	III	N	N	208.712	206.624	15.126	430.462	
			%	48,5	48,0	3,5	100,0	
	IV	N	N	400.829	378.117	31.801	810.747	
			%	49,4	46,6	3,9	100,0	
	V	N	N	117.578	124.703	12.104	254.385	
			%	46,2	49,0	4,8	100,0	
	15-24	Total	N	N	109.990	57.623	14.821	182.434
				%	60,3	31,6	8,1	100,0
	I	N	N	17.540	9.568	2.088	29.196	
			%	60,1	32,8	7,2	100,0	
	II	N	N	13.952	7.536	2.997	24.485	
			%	57,0	30,8	12,2	100,0	
	III	N	N	24.419	9.948	2.533	36.900	
			%	66,2	27,0	6,9	100,0	
IV	N	N	43.994	24.746	5.611	74.351		
		%	59,2	33,3	7,5	100,0		
V	N	N	10.085	5.825	1.593	17.503		
		%	57,6	33,3	9,1	100,0		
25-44	Total	N	N	330.690	298.492	27.457	656.640	
			%	50,4	45,5	4,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 171. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y clase social

				Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total
Ambos	25-44	I	N	45.246	40.518	3.054	88.818
			%	50,9	45,6	3,4	100,0
		II	N	35.439	31.543	2.737	69.719
			%	50,8	45,2	3,9	100,0
		III	N	68.623	69.905	5.758	144.286
			%	47,6	48,4	4,0	100,0
		IV	N	142.910	117.908	10.299	271.117
			%	52,7	43,5	3,8	100,0
		V	N	38.471	38.619	5.608	82.699
			%	46,5	46,7	6,8	100,0
	45-64	Total	N	264.803	335.281	15.882	615.965
			%	43,0	54,4	2,6	100,0
		I	N	31.447	36.704	1.872	70.023
			%	44,9	52,4	2,7	100,0
		II	N	23.176	26.190	846	50.212
			%	46,2	52,2	1,7	100,0
		III	N	66.176	85.856	2.931	154.963
			%	42,7	55,4	1,9	100,0
		IV	N	109.141	137.802	7.772	254.716
			%	42,8	54,1	3,1	100,0
		V	N	34.863	48.728	2.461	86.052
			%	40,5	56,6	2,9	100,0
	65-74	Total	N	87.930	112.646	4.927	205.503
			%	42,8	54,8	2,4	100,0
		I	N	9.925	10.770	258	20.952
			%	47,4	51,4	1,2	100,0
		II	N	5.270	8.083	734	14.087
			%	37,4	57,4	5,2	100,0
		III	N	18.357	24.943	1.377	44.676
			%	41,1	55,8	3,1	100,0
		IV	N	41.468	54.641	1.778	97.887
			%	42,4	55,8	1,8	100,0
		V	N	12.910	14.210	781	27.901
			%	46,3	50,9	2,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 171. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y clase social

			Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total	
Ambos	>=75	Total	N	128.781	85.861	12.172	226.814
			%	56,8	37,9	5,4	100,0
	I	N	5.514	3.079	945	9.538	
		%	57,8	32,3	9,9	100,0	
	II	N	7.565	6.469	697	14.731	
		%	51,4	43,9	4,7	100,0	
	III	N	31.138	15.972	2.527	49.638	
		%	62,7	32,2	5,1	100,0	
	IV	N	63.315	43.020	6.341	112.676	
		%	56,2	38,2	5,6	100,0	
	V	N	21.249	17.320	1.661	40.231	
		%	52,8	43,1	4,1	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 172. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y nivel de estudios*

			Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total	
Hombres	Total	Total	N	490.540	380.355	44.229	915.124
			%	53,6	41,6	4,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	112.063	89.510	9.026	210.600	
		%	53,2	42,5	4,3	100,0	
	Secundaria, inferior	N	87.200	67.304	12.949	167.454	
		%	52,1	40,2	7,7	100,0	
	Secundaria, superior	N	195.831	149.983	14.855	360.670	
		%	54,3	41,6	4,1	100,0	
	Terciaria	N	95.445	73.558	7.398	176.400	
		%	54,1	41,7	4,2	100,0	
15-24	Total	N	61.708	21.395	11.355	94.458	
		%	65,3	22,7	12,0	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	7.213	984	1.721	9.918	
		%	72,7	9,9	17,4	100,0	
	Secundaria, inferior	N	20.300	6.268	4.560	31.129	
		%	65,2	20,1	14,6	100,0	
	Secundaria, superior	N	27.095	11.761	3.984	42.840	
		%	63,2	27,5	9,3	100,0	
	Terciaria	N	7.099	2.383	1.090	10.572	
		%	67,2	22,5	10,3	100,0	
25-44	Total	N	192.121	126.358	17.830	336.309	
		%	57,1	37,6	5,3	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	21.591	14.204	1.981	37.776	
		%	57,2	37,6	5,2	100,0	
	Secundaria, inferior	N	30.613	17.910	4.285	52.808	
		%	58,0	33,9	8,1	100,0	
	Secundaria, superior	N	93.815	63.450	7.009	164.274	
		%	57,1	38,6	4,3	100,0	
	Terciaria	N	46.102	30.793	4.555	81.451	
		%	56,6	37,8	5,6	100,0	
45-64	Total	N	140.894	154.050	7.712	302.655	
		%	46,6	50,9	2,5	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	32.278	35.990	2.132	70.400	
		%	45,8	51,1	3,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 172. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y nivel de estudios*

			Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total		
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	20.864	29.973	2.408	53.244	
			%	39,2	56,3	4,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	56.837	57.840	2.454	117.130	
			%	48,5	49,4	2,1	100,0	
		Terciaria	N	30.916	30.247	718	61.881	
			%	50,0	48,9	1,2	100,0	
		65-74	Total	N	43.056	50.403	2.275	95.733
			%	45,0	52,6	2,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	16.611	20.716	691	38.017	
			%	43,7	54,5	1,8	100,0	
		Secundaria, inferior	N	7.092	8.309	890	16.291	
			%	43,5	51,0	5,5	100,0	
	Secundaria, superior	N	12.366	12.888	693	25.948		
		%	47,7	49,7	2,7	100,0		
	Terciaria	N	6.987	8.490	.	15.477		
		%	45,1	54,9	.	100,0		
	>=75	Total	N	52.761	28.150	5.057	85.968	
		%	61,4	32,7	5,9	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	34.370	17.617	2.501	54.489		
		%	63,1	32,3	4,6	100,0		
	Secundaria, inferior	N	8.331	4.844	806	13.981		
		%	59,6	34,6	5,8	100,0		
	Secundaria, superior	N	5.718	4.045	715	10.478		
		%	54,6	38,6	6,8	100,0		
	Terciaria	N	4.341	1.644	1.035	7.020		
		%	61,8	23,4	14,7	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	434.106	510.745	31.031	975.882	
			%	44,5	52,3	3,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	127.375	141.812	9.140	278.327	
			%	45,8	51,0	3,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	72.963	90.851	5.953	169.766	
			%	43,0	53,5	3,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	134.047	165.099	8.720	307.866	
			%	43,5	53,6	2,8	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 172. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y nivel de estudios*

				Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N	99.721	112.984	7.217	219.923
			%	45,3	51,4	3,3	100,0
	15-24	Total	N	49.338	36.695	3.466	89.499
			%	55,1	41,0	3,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.679	4.195	512	11.386
			%	58,7	36,8	4,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.938	6.297	1.527	16.763
			%	53,3	37,6	9,1	100,0
		Secundaria, superior	N	24.009	20.413	1.021	45.443
			%	52,8	44,9	2,2	100,0
		Terciaria	N	9.711	5.790	406	15.907
			%	61,1	36,4	2,6	100,0
	25-44	Total	N	138.794	172.404	9.627	320.826
			%	43,3	53,7	3,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	12.914	11.646	1.430	25.990
			%	49,7	44,8	5,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	15.879	22.657	401	38.937
			%	40,8	58,2	1,0	100,0
		Secundaria, superior	N	55.804	71.853	2.831	130.487
			%	42,8	55,1	2,2	100,0
		Terciaria	N	54.196	66.249	4.966	125.412
			%	43,2	52,8	4,0	100,0
	45-64	Total	N	124.008	181.591	8.170	313.769
			%	39,5	57,9	2,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	27.989	48.899	1.075	77.963
			%	35,9	62,7	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	25.791	34.600	1.344	61.735
			%	41,8	56,0	2,2	100,0
	Secundaria, superior	N	43.328	62.574	4.420	110.322	
		%	39,3	56,7	4,0	100,0	
	Terciaria	N	26.899	35.519	1.331	63.749	
		%	42,2	55,7	2,1	100,0	
65-74	Total	N	45.029	62.244	2.652	109.925	
		%	41,0	56,6	2,4	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 172. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y nivel de estudios*

				Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	25.580	34.882	1.390	61.852
			%	41,4	56,4	2,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	10.249	16.642	562	27.452
			%	37,3	60,6	2,0	100,0
		Secundaria, superior	N	4.459	7.249	185	11.893
			%	37,5	60,9	1,6	100,0
	Terciaria	N	4.741	3.471	515	8.727	
		%	54,3	39,8	5,9	100,0	
	>=75	Total	N	76.938	57.812	7.115	141.864
			%	54,2	40,8	5,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	54.213	42.191	4.733	101.136
			%	53,6	41,7	4,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	12.105	10.655	2.119	24.879
			%	48,7	42,8	8,5	100,0
	Secundaria, superior	N	6.447	3.010	263	9.720	
		%	66,3	31,0	2,7	100,0	
	Terciaria	N	4.174	1.955	.	6.129	
		%	68,1	31,9	.	100,0	
Ambos	Total	Total	N	924.646	891.101	75.259	1.891.006
			%	48,9	47,1	4,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	239.438	231.322	18.167	488.927	
		%	49,0	47,3	3,7	100,0	
	Secundaria, inferior	N	160.163	158.155	18.902	337.220	
		%	47,5	46,9	5,6	100,0	
	Secundaria, superior	N	329.879	315.082	23.576	668.536	
		%	49,3	47,1	3,5	100,0	
	Terciaria	N	195.166	186.542	14.615	396.323	
		%	49,2	47,1	3,7	100,0	
	15-24	Total	N	111.046	58.090	14.821	183.958
			%	60,4	31,6	8,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	13.892	5.178	2.234	21.304
			%	65,2	24,3	10,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	29.238	12.566	6.087	47.891	
		%	61,1	26,2	12,7	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 172. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y nivel de estudios*

				Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	51.105	32.174	5.005	88.283
			%	57,9	36,4	5,7	100,0
		Terciaria	N	16.811	8.173	1.495	26.479
			%	63,5	30,9	5,6	100,0
	25-44	Total	N	330.915	298.762	27.457	657.135
			%	50,4	45,5	4,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	34.505	25.849	3.411	63.765
			%	54,1	40,5	5,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	46.493	40.567	4.686	91.745
			%	50,7	44,2	5,1	100,0
		Secundaria, superior	N	149.619	135.303	9.840	294.762
			%	50,8	45,9	3,3	100,0
		Terciaria	N	100.299	97.043	9.521	206.862
			%	48,5	46,9	4,6	100,0
	45-64	Total	N	264.902	335.640	15.882	616.424
			%	43,0	54,4	2,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	60.268	84.889	3.207	148.363
			%	40,6	57,2	2,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	46.655	64.572	3.752	114.979
			%	40,6	56,2	3,3	100,0
		Secundaria, superior	N	100.164	120.413	6.874	227.452
			%	44,0	52,9	3,0	100,0
		Terciaria	N	57.815	65.766	2.049	125.630
			%	46,0	52,3	1,6	100,0
	65-74	Total	N	88.085	112.646	4.927	205.658
			%	42,8	54,8	2,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	42.191	55.598	2.081	99.869
			%	42,2	55,7	2,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	17.341	24.951	1.452	43.744
			%	39,6	57,0	3,3	100,0
		Secundaria, superior	N	16.826	20.137	878	37.841
			%	44,5	53,2	2,3	100,0
		Terciaria	N	11.728	11.961	515	24.204
			%	48,5	49,4	2,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 172. Distribución de la población según su satisfacción con el peso actual por sexo, edad y nivel de estudios*

				Estoy satisfecho/a con mi peso actual	Me gustaría perder peso	Me gustaría ganar peso	Total
Ambos	>=75	Total	N	129.699	85.962	12.172	227.832
			%	56,9	37,7	5,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	88.583	59.808	7.234	155.625
			%	56,9	38,4	4,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	20.437	15.499	2.925	38.860
			%	52,6	39,9	7,5	100,0
		Secundaria, superior	N	12.165	7.055	978	20.198
			%	60,2	34,9	4,8	100,0
		Terciaria	N	8.514	3.600	1.035	13.149
			%	64,8	27,4	7,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 173. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y territorio histórico

				Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total
Hombres	Total	CAPV	N	383.568	355.250	108.774	67.533	915.124
			%	41,9	38,8	11,9	7,4	100,0
	Araba	N	56.494	58.406	12.033	6.817	133.751	
		%	42,2	43,7	9,0	5,1	100,0	
	Gipuzkoa	N	109.806	114.958	42.474	26.573	293.812	
		%	37,4	39,1	14,5	9,0	100,0	
	Bizkaia	N	217.267	181.885	54.266	34.142	487.561	
		%	44,6	37,3	11,1	7,0	100,0	
	15-24	CAPV	N	64.244	22.154	5.691	2.369	94.458
			%	68,0	23,5	6,0	2,5	100,0
	Araba	N	11.571	2.279	517	502	14.869	
		%	77,8	15,3	3,5	3,4	100,0	
	Gipuzkoa	N	19.233	7.421	3.174	1.477	31.305	
		%	61,4	23,7	10,1	4,7	100,0	
	Bizkaia	N	33.441	12.454	1.999	390	48.284	
		%	69,3	25,8	4,1	0,8	100,0	
	25-44	CAPV	N	113.670	136.133	46.757	39.749	336.309
			%	33,8	40,5	13,9	11,8	100,0
	Araba	N	17.922	25.278	4.624	4.238	52.062	
		%	34,4	48,6	8,9	8,1	100,0	
	Gipuzkoa	N	32.434	41.826	18.245	14.284	106.790	
		%	30,4	39,2	17,1	13,4	100,0	
	Bizkaia	N	63.314	69.029	23.888	21.227	177.458	
		%	35,7	38,9	13,5	12,0	100,0	
45-64	CAPV	N	113.260	119.602	45.910	23.883	302.655	
		%	37,4	39,5	15,2	7,9	100,0	
Araba	N	15.570	19.170	6.082	1.929	42.751		
	%	36,4	44,8	14,2	4,5	100,0		
Gipuzkoa	N	31.467	38.490	17.333	10.129	97.419		
	%	32,3	39,5	17,8	10,4	100,0		
Bizkaia	N	66.223	61.942	22.495	11.825	162.485		
	%	40,8	38,1	13,8	7,3	100,0		
65-74	CAPV	N	41.211	47.432	6.690	401	95.733	
		%	43,0	49,5	7,0	0,4	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 173. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y territorio histórico

			Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total		
Hombres	65-74	Araba	N	5.200	7.112	702	149	13.163	
			%	39,5	54,0	5,3	1,1	100,0	
		Gipuzkoa	N	12.370	17.389	2.260	111	32.130	
			%	38,5	54,1	7,0	0,3	100,0	
		Bizkaia	N	23.640	22.931	3.728	141	50.440	
			%	46,9	45,5	7,4	0,3	100,0	
	>=75	CAPV	N	51.183	29.929	3.725	1.131	85.968	
			%	59,5	34,8	4,3	1,3	100,0	
			Araba	N	6.231	4.566	108	.	10.905
				%	57,1	41,9	1,0	.	100,0
			Gipuzkoa	N	14.303	9.833	1.461	572	26.168
				%	54,7	37,6	5,6	2,2	100,0
		Bizkaia	N	30.649	15.530	2.156	559	48.895	
			%	62,7	31,8	4,4	1,1	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	401.624	455.397	93.578	25.283	975.882
				%	41,2	46,7	9,6	2,6	100,0
			Araba	N	60.211	67.104	7.408	2.050	136.772
				%	44,0	49,1	5,4	1,5	100,0
		Gipuzkoa	N	116.486	146.751	40.225	9.222	312.686	
			%	37,3	46,9	12,9	2,9	100,0	
		Bizkaia	N	224.927	241.542	45.945	14.011	526.425	
			%	42,7	45,9	8,7	2,7	100,0	
	15-24	CAPV	N	61.741	22.627	4.755	377	89.499	
			%	69,0	25,3	5,3	0,4	100,0	
			Araba	N	9.442	3.405	363	.	13.210
				%	71,5	25,8	2,7	.	100,0
			Gipuzkoa	N	20.279	5.827	3.337	.	29.443
				%	68,9	19,8	11,3	.	100,0
		Bizkaia	N	32.020	13.394	1.054	377	46.846	
			%	68,4	28,6	2,3	0,8	100,0	
	25-44	CAPV	N	113.794	154.379	39.193	13.459	320.826	
			%	35,5	48,1	12,2	4,2	100,0	
		Araba	N	18.139	26.039	2.641	1.049	47.869	
			%	37,9	54,4	5,5	2,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 173. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y territorio histórico

				Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	31.722	47.310	17.720	5.154	101.905
			%	31,1	46,4	17,4	5,1	100,0
		Bizkaia	N	63.933	81.030	18.833	7.256	171.052
			%	37,4	47,4	11,0	4,2	100,0
	45-64	CAPV	N	97.868	169.890	34.565	11.446	313.769
			%	31,2	54,1	11,0	3,6	100,0
		Araba	N	17.000	22.933	3.330	1.000	44.263
			%	38,4	51,8	7,5	2,3	100,0
		Gipuzkoa	N	24.403	58.111	13.079	4.068	99.662
			%	24,5	58,3	13,1	4,1	100,0
		Bizkaia	N	56.465	88.846	18.155	6.378	169.843
			%	33,2	52,3	10,7	3,8	100,0
	65-74	CAPV	N	38.920	60.367	10.637	.	109.925
			%	35,4	54,9	9,7	.	100,0
		Araba	N	4.942	8.582	796	.	14.320
			%	34,5	59,9	5,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	11.024	20.613	4.483	.	36.120
			%	30,5	57,1	12,4	.	100,0
	Bizkaia	N	22.954	31.172	5.359	.	59.484	
		%	38,6	52,4	9,0	.	100,0	
>=75	CAPV	N	89.301	48.135	4.429	.	141.864	
		%	62,9	33,9	3,1	.	100,0	
	Araba	N	10.687	6.145	278	.	17.110	
		%	62,5	35,9	1,6	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	29.059	14.890	1.606	.	45.555	
		%	63,8	32,7	3,5	.	100,0	
	Bizkaia	N	49.556	27.100	2.544	.	79.200	
		%	62,6	34,2	3,2	.	100,0	
Ambos	Total	CAPV	N	785.192	810.647	202.352	92.815	1.891.006
			%	41,5	42,9	10,7	4,9	100,0
		Araba	N	116.705	125.510	19.441	8.867	270.523
			%	43,1	46,4	7,2	3,3	100,0
		Gipuzkoa	N	226.292	261.710	82.700	35.795	606.497
			%	37,3	43,2	13,6	5,9	100,0
		Bizkaia	N	442.195	423.427	100.211	48.154	1.013.987

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 173. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y territorio histórico

		Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total		
Ambos	Total	Bizkaia	%	43,6	41,8	9,9	4,7	100,0
	15-24	CAPV	N	125.985	44.781	10.445	2.746	183.958
			%	68,5	24,3	5,7	1,5	100,0
		Araba	N	21.013	5.684	880	502	28.079
			%	74,8	20,2	3,1	1,8	100,0
		Gipuzkoa	N	39.511	13.248	6.512	1.477	60.748
			%	65,0	21,8	10,7	2,4	100,0
		Bizkaia	N	65.461	25.848	3.054	768	95.130
			%	68,8	27,2	3,2	0,8	100,0
	25-44	CAPV	N	227.464	290.512	85.950	53.208	657.135
			%	34,6	44,2	13,1	8,1	100,0
		Araba	N	36.061	51.317	7.265	5.288	99.930
			%	36,1	51,4	7,3	5,3	100,0
		Gipuzkoa	N	64.155	89.136	35.965	19.438	208.695
			%	30,7	42,7	17,2	9,3	100,0
		Bizkaia	N	127.247	150.059	42.720	28.483	348.509
			%	36,5	43,1	12,3	8,2	100,0
	45-64	CAPV	N	211.128	289.492	80.475	35.329	616.424
			%	34,3	47,0	13,1	5,7	100,0
		Araba	N	32.570	42.103	9.413	2.929	87.015
			%	37,4	48,4	10,8	3,4	100,0
		Gipuzkoa	N	55.870	96.601	30.413	14.197	197.081
			%	28,3	49,0	15,4	7,2	100,0
		Bizkaia	N	122.688	150.788	40.650	18.203	332.328
			%	36,9	45,4	12,2	5,5	100,0
	65-74	CAPV	N	80.131	107.799	17.327	401	205.658
			%	39,0	52,4	8,4	0,2	100,0
		Araba	N	10.143	15.694	1.498	149	27.483
			%	36,9	57,1	5,4	0,5	100,0
		Gipuzkoa	N	23.394	38.002	6.743	111	68.251
			%	34,3	55,7	9,9	0,2	100,0
		Bizkaia	N	46.594	54.102	9.087	141	109.924
			%	42,4	49,2	8,3	0,1	100,0
	>=75	CAPV	N	140.484	78.063	8.154	1.131	227.832
			%	61,7	34,3	3,6	0,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 173. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y territorio histórico

				Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total
Ambos	>=75	Araba	N	16.918	10.711	386	.	28.015
			%	60,4	38,2	1,4	.	100,0
	Gipuzkoa	N	43.361	24.723	3.067	572	71.723	
		%	60,5	34,5	4,3	0,8	100,0	
	Bizkaia	N	80.205	42.629	4.701	559	128.094	
		%	62,6	33,3	3,7	0,4	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 174. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y clase social

		Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total		
Hombres	Total	N	382.911	354.835	108.774	67.344	913.863	
		%	41,9	38,8	11,9	7,4	100,0	
	I	N	70.469	37.893	4.455	873	113.690	
		%	62,0	33,3	3,9	0,8	100,0	
	II	N	43.729	29.047	3.804	1.626	78.206	
		%	55,9	37,1	4,9	2,1	100,0	
	III	N	90.326	63.859	22.273	11.897	188.355	
		%	48,0	33,9	11,8	6,3	100,0	
	IV	N	152.357	189.876	65.011	43.063	450.306	
		%	33,8	42,2	14,4	9,6	100,0	
	V	N	26.030	34.160	13.231	9.886	83.307	
		%	31,2	41,0	15,9	11,9	100,0	
	15-24	Total	N	63.686	22.154	5.691	2.369	93.900
			%	67,8	23,6	6,1	2,5	100,0
	I	N	12.711	1.760	164	.	14.634	
		%	86,9	12,0	1,1	.	100,0	
	II	N	9.186	1.382	207	212	10.988	
		%	83,6	12,6	1,9	1,9	100,0	
	III	N	12.849	3.596	386	.	16.830	
		%	76,3	21,4	2,3	.	100,0	
	IV	N	25.013	12.361	3.682	1.681	42.737	
		%	58,5	28,9	8,6	3,9	100,0	
	V	N	3.927	3.056	1.253	475	8.711	
		%	45,1	35,1	14,4	5,5	100,0	
	25-44	Total	N	113.670	136.133	46.757	39.749	336.309
			%	33,8	40,5	13,9	11,8	100,0
	I	N	28.104	13.975	1.446	208	43.732	
		%	64,3	32,0	3,3	0,5	100,0	
	II	N	17.971	12.812	1.273	441	32.496	
		%	55,3	39,4	3,9	1,4	100,0	
	III	N	26.922	20.217	8.527	6.590	62.257	
		%	43,2	32,5	13,7	10,6	100,0	
	IV	N	31.949	73.222	28.347	26.875	160.392	
		%	19,9	45,7	17,7	16,8	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 174. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y clase social

			Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total
Hombres 25-44	V	N	8.723	15.907	7.165	5.636	37.432
		%	23,3	42,5	19,1	15,1	100,0
45-64	Total	N	113.161	119.602	45.910	23.694	302.368
		%	37,4	39,6	15,2	7,8	100,0
I	N		21.667	13.693	2.153	394	37.907
		%	57,2	36,1	5,7	1,0	100,0
II	N		9.526	10.950	2.111	832	23.419
		%	40,7	46,8	9,0	3,6	100,0
III	N		29.985	20.722	10.556	5.058	66.322
		%	45,2	31,2	15,9	7,6	100,0
IV	N		46.270	63.472	27.088	13.784	150.614
		%	30,7	42,1	18,0	9,2	100,0
V	N		5.713	10.765	4.002	3.626	24.106
		%	23,7	44,7	16,6	15,0	100,0
65-74	Total	N	41.211	47.432	6.690	401	95.733
		%	43,0	49,5	7,0	0,4	100,0
I	N		6.242	6.818	693	.	13.753
		%	45,4	49,6	5,0	.	100,0
II	N		2.989	3.520	213	141	6.862
		%	43,5	51,3	3,1	2,1	100,0
III	N		8.282	11.616	1.879	.	21.777
		%	38,0	53,3	8,6	.	100,0
IV	N		20.479	23.733	3.429	111	47.753
		%	42,9	49,7	7,2	0,2	100,0
V	N		3.220	1.745	475	149	5.588
		%	57,6	31,2	8,5	2,7	100,0
>=75	Total	N	51.183	29.514	3.725	1.131	85.553
		%	59,8	34,5	4,4	1,3	100,0
I	N		1.744	1.648	.	271	3.663
		%	47,6	45,0	.	7,4	100,0
II	N		4.057	383	.	.	4.440
		%	91,4	8,6	.	.	100,0
III	N		12.289	7.707	925	249	21.169
		%	58,0	36,4	4,4	1,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 174. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y clase social

			Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total	
Hombres >=75	IV	N	28.646	17.088	2.465	611	48.810	
		%	58,7	35,0	5,0	1,3	100,0	
	V	N	4.447	2.688	336	.	7.470	
		%	59,5	36,0	4,5	.	100,0	
Mujeres Total	Total	N	400.921	453.711	93.578	25.283	973.492	
		%	41,2	46,6	9,6	2,6	100,0	
	I	N	61.345	37.196	5.278	1.019	104.838	
		%	58,5	35,5	5,0	1,0	100,0	
	II	N	36.374	47.497	9.521	1.636	95.028	
		%	38,3	50,0	10,0	1,7	100,0	
	III	N	129.071	95.294	15.798	1.944	242.107	
		%	53,3	39,4	6,5	0,8	100,0	
	IV	N	121.140	182.490	39.840	16.972	360.441	
		%	33,6	50,6	11,1	4,7	100,0	
	V	N	52.990	91.234	23.141	3.712	171.077	
		%	31,0	53,3	13,5	2,2	100,0	
	15-24 Total	Total	N	61.238	22.164	4.755	377	88.533
			%	69,2	25,0	5,4	0,4	100,0
	I	N	11.825	2.399	338	.	14.562	
		%	81,2	16,5	2,3	.	100,0	
	II	N	9.162	3.350	985	.	13.497	
		%	67,9	24,8	7,3	.	100,0	
	III	N	14.317	4.909	844	.	20.069	
		%	71,3	24,5	4,2	.	100,0	
	IV	N	20.881	8.154	2.202	377	31.614	
		%	66,0	25,8	7,0	1,2	100,0	
V	N	5.053	3.352	386	.	8.792		
	%	57,5	38,1	4,4	.	100,0		
25-44 Total	Total	N	113.794	153.884	39.193	13.459	320.330	
		%	35,5	48,0	12,2	4,2	100,0	
I	N	28.637	14.294	1.375	781	45.086		
	%	63,5	31,7	3,0	1,7	100,0		
II	N	11.114	19.233	5.774	1.101	37.223		
	%	29,9	51,7	15,5	3,0	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 174. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y clase social

				Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total
Mujeres	25-44	III	N	46.137	29.084	6.079	729	82.029
			%	56,2	35,5	7,4	0,9	100,0
		IV	N	21.021	63.332	16.925	9.448	110.725
			%	19,0	57,2	15,3	8,5	100,0
		V	N	6.885	27.941	9.040	1.400	45.267
			%	15,2	61,7	20,0	3,1	100,0
	45-64	Total	N	97.868	169.719	34.565	11.446	313.598
			%	31,2	54,1	11,0	3,6	100,0
		I	N	15.056	14.613	2.210	238	32.116
			%	46,9	45,5	6,9	0,7	100,0
		II	N	7.845	16.012	2.401	535	26.792
			%	29,3	59,8	9,0	2,0	100,0
		III	N	41.639	39.416	6.371	1.215	88.641
			%	47,0	44,5	7,2	1,4	100,0
		IV	N	21.403	62.323	13.229	7.147	104.102
			%	20,6	59,9	12,7	6,9	100,0
		V	N	11.926	37.355	10.354	2.311	61.946
			%	19,3	60,3	16,7	3,7	100,0
	65-74	Total	N	38.920	60.212	10.637	.	109.770
			%	35,5	54,9	9,7	.	100,0
		I	N	2.059	3.945	1.195	.	7.199
			%	28,6	54,8	16,6	.	100,0
		II	N	2.500	4.725	.	.	7.225
			%	34,6	65,4	.	.	100,0
		III	N	7.941	12.729	2.229	.	22.899
			%	34,7	55,6	9,7	.	100,0
		IV	N	18.392	26.734	5.008	.	50.134
			%	36,7	53,3	10,0	.	100,0
		V	N	8.029	12.079	2.205	.	22.312
			%	36,0	54,1	9,9	.	100,0
	>=75	Total	N	89.100	47.732	4.429	.	141.261
			%	63,1	33,8	3,1	.	100,0
		I	N	3.769	1.945	161	.	5.875
			%	64,1	33,1	2,7	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 174. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y clase social

				Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total	
Mujeres	>=75	II	N	5.753	4.177	362	.	10.292	
			%	55,9	40,6	3,5	.	100,0	
		III	N	19.039	9.156	274	.	28.468	
			%	66,9	32,2	1,0	.	100,0	
		IV	N	39.443	21.946	2.476	.	63.866	
			%	61,8	34,4	3,9	.	100,0	
	V	N	21.097	10.507	1.156	.	32.760		
		%	64,4	32,1	3,5	.	100,0		
	Ambos	Total	Total	N	783.832	808.545	202.352	92.627	1.887.356
				%	41,5	42,8	10,7	4,9	100,0
		I	N	N	131.813	75.089	9.734	1.892	218.528
				%	60,3	34,4	4,5	0,9	100,0
II		N	N	80.103	76.544	13.325	3.262	173.234	
			%	46,2	44,2	7,7	1,9	100,0	
III		N	N	219.398	159.153	38.071	13.841	430.462	
			%	51,0	37,0	8,8	3,2	100,0	
IV		N	N	273.497	372.365	104.851	60.034	810.747	
			%	33,7	45,9	12,9	7,4	100,0	
V		N	N	79.021	125.395	36.372	13.598	254.385	
			%	31,1	49,3	14,3	5,3	100,0	
15-24		Total	Total	N	124.924	44.318	10.445	2.746	182.434
				%	68,5	24,3	5,7	1,5	100,0
		I	N	N	24.536	4.159	501	.	29.196
				%	84,0	14,2	1,7	.	100,0
		II	N	N	18.348	4.732	1.192	212	24.485
				%	74,9	19,3	4,9	0,9	100,0
	III	N	N	27.166	8.505	1.230	.	36.900	
			%	73,6	23,0	3,3	.	100,0	
	IV	N	N	45.894	20.514	5.884	2.059	74.351	
			%	61,7	27,6	7,9	2,8	100,0	
	V	N	N	8.980	6.408	1.639	475	17.503	
			%	51,3	36,6	9,4	2,7	100,0	
	25-44	Total	Total	N	227.464	290.017	85.950	53.208	656.640
				%	34,6	44,2	13,1	8,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 174. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y clase social

				Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total
Ambos	25-44	I	N	56.741	28.268	2.820	988	88.818
			%	63,9	31,8	3,2	1,1	100,0
		II	N	29.086	32.045	7.046	1.542	69.719
			%	41,7	46,0	10,1	2,2	100,0
		III	N	73.059	49.302	14.606	7.319	144.286
			%	50,6	34,2	10,1	5,1	100,0
		IV	N	52.970	136.554	45.272	36.322	271.117
			%	19,5	50,4	16,7	13,4	100,0
		V	N	15.608	43.848	16.206	7.036	82.699
			%	18,9	53,0	19,6	8,5	100,0
	45-64	Total	N	211.029	289.321	80.475	35.140	615.965
			%	34,3	47,0	13,1	5,7	100,0
		I	N	36.723	28.305	4.363	633	70.023
			%	52,4	40,4	6,2	0,9	100,0
		II	N	17.371	26.962	4.512	1.367	50.212
			%	34,6	53,7	9,0	2,7	100,0
		III	N	71.624	60.139	16.928	6.272	154.963
			%	46,2	38,8	10,9	4,0	100,0
		IV	N	67.672	125.795	40.317	20.931	254.716
			%	26,6	49,4	15,8	8,2	100,0
		V	N	17.639	48.120	14.356	5.937	86.052
			%	20,5	55,9	16,7	6,9	100,0
	65-74	Total	N	80.131	107.644	17.327	401	205.503
			%	39,0	52,4	8,4	0,2	100,0
		I	N	8.301	10.763	1.888	.	20.952
			%	39,6	51,4	9,0	.	100,0
		II	N	5.488	8.245	213	141	14.087
			%	39,0	58,5	1,5	1,0	100,0
		III	N	16.222	24.345	4.108	.	44.676
			%	36,3	54,5	9,2	.	100,0
		IV	N	38.871	50.467	8.437	111	97.887
			%	39,7	51,6	8,6	0,1	100,0
		V	N	11.248	13.823	2.680	149	27.901
			%	40,3	49,5	9,6	0,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 174. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y clase social

				Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total
Ambos	>=75	Total	N	140.283	77.246	8.154	1.131	226.814
			%	61,8	34,1	3,6	0,5	100,0
		I	N	5.513	3.593	161	271	9.538
			%	57,8	37,7	1,7	2,8	100,0
		II	N	9.809	4.560	362	.	14.731
			%	66,6	31,0	2,5	.	100,0
		III	N	31.327	16.863	1.199	249	49.638
			%	63,1	34,0	2,4	0,5	100,0
		IV	N	68.090	39.035	4.941	611	112.676
			%	60,4	34,6	4,4	0,5	100,0
		V	N	25.544	13.195	1.492	.	40.231
			%	63,5	32,8	3,7	.	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 175. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y nivel de estudios*

			Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total
Hombres	Total	N	383.568	355.250	108.774	67.533	915.124
		%	41,9	38,8	11,9	7,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	84.360	84.620	27.568	14.051	210.600
		%	40,1	40,2	13,1	6,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	69.364	57.614	22.547	17.928	167.454
		%	41,4	34,4	13,5	10,7	100,0
	Secundaria, superior	N	126.586	152.475	48.393	33.217	360.670
		%	35,1	42,3	13,4	9,2	100,0
	Terciaria	N	103.258	60.540	10.266	2.336	176.400
		%	58,5	34,3	5,8	1,3	100,0
	15-24 Total	N	64.244	22.154	5.691	2.369	94.458
		%	68,0	23,5	6,0	2,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	6.619	2.709	590	.	9.918
		%	66,7	27,3	5,9	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	23.364	5.056	2.209	500	31.129
		%	75,1	16,2	7,1	1,6	100,0
	Secundaria, superior	N	26.413	12.277	2.502	1.648	42.840
		%	61,7	28,7	5,8	3,8	100,0
	Terciaria	N	7.849	2.112	390	221	10.572
		%	74,2	20,0	3,7	2,1	100,0
	25-44 Total	N	113.670	136.133	46.757	39.749	336.309
		%	33,8	40,5	13,9	11,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	8.648	17.251	6.024	5.853	37.776
		%	22,9	45,7	15,9	15,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	12.004	19.478	11.173	10.152	52.808
		%	22,7	36,9	21,2	19,2	100,0
	Secundaria, superior	N	42.947	73.698	24.384	23.246	164.274
		%	26,1	44,9	14,8	14,2	100,0
	Terciaria	N	50.071	25.706	5.176	498	81.451
		%	61,5	31,6	6,4	0,6	100,0
	45-64 Total	N	113.260	119.602	45.910	23.883	302.655
		%	37,4	39,5	15,2	7,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	20.053	27.924	15.345	7.078	70.400
		%	28,5	39,7	21,8	10,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 175. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y nivel de estudios*

			Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	19.214	19.576	7.319	7.136	53.244
			%	36,1	36,8	13,7	13,4	100,0
		Secundaria, superior	N	39.834	49.523	19.450	8.323	117.130
			%	34,0	42,3	16,6	7,1	100,0
		Terciaria	N	34.160	22.579	3.797	1.346	61.881
			%	55,2	36,5	6,1	2,2	100,0
	65-74	Total	N	41.211	47.432	6.690	401	95.733
			%	43,0	49,5	7,0	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	17.115	17.685	2.957	260	38.017
			%	45,0	46,5	7,8	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.458	8.632	1.061	141	16.291
			%	39,6	53,0	6,5	0,9	100,0
		Secundaria, superior	N	10.253	13.765	1.930	.	25.948
			%	39,5	53,0	7,4	.	100,0
		Terciaria	N	7.385	7.350	742	.	15.477
			%	47,7	47,5	4,8	.	100,0
	>=75	Total	N	51.183	29.929	3.725	1.131	85.968
			%	59,5	34,8	4,3	1,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	31.925	19.051	2.652	860	54.489	
		%	58,6	35,0	4,9	1,6	100,0	
	Secundaria, inferior	N	8.324	4.873	785	.	13.981	
		%	59,5	34,9	5,6	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	7.140	3.211	127	.	10.478	
		%	68,1	30,6	1,2	.	100,0	
	Terciaria	N	3.793	2.794	161	271	7.020	
		%	54,0	39,8	2,3	3,9	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	401.624	455.397	93.578	25.283	975.882
			%	41,2	46,7	9,6	2,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	121.187	133.973	19.974	3.194	278.327
			%	43,5	48,1	7,2	1,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	57.618	90.049	17.229	4.870	169.766
			%	33,9	53,0	10,1	2,9	100,0
		Secundaria, superior	N	110.623	144.211	38.804	14.229	307.866
			%	35,9	46,8	12,6	4,6	100,0
		Terciaria	N	112.196	87.165	17.571	2.990	219.923

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 175. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y nivel de estudios*

		Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total	
Mujeres	Total	%	51,0	39,6	8,0	1,4	100,0
	15-24 Total	N	61.741	22.627	4.755	377	89.499
		%	69,0	25,3	5,3	0,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	8.938	1.919	529	.	11.386
		%	78,5	16,9	4,6	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	12.013	3.924	826	.	16.763
		%	71,7	23,4	4,9	.	100,0
	Secundaria, superior	N	30.969	11.620	2.477	377	45.443
		%	68,1	25,6	5,5	0,8	100,0
	Terciaria	N	9.821	5.163	923	.	15.907
		%	61,7	32,5	5,8	.	100,0
	25-44 Total	N	113.794	154.379	39.193	13.459	320.826
		%	35,5	48,1	12,2	4,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	7.219	15.030	2.842	900	25.990
		%	27,8	57,8	10,9	3,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	5.308	26.581	4.058	2.990	38.937
		%	13,6	68,3	10,4	7,7	100,0
	Secundaria, superior	N	34.630	67.729	21.069	7.059	130.487
		%	26,5	51,9	16,1	5,4	100,0
	Terciaria	N	66.637	45.040	11.224	2.511	125.412
		%	53,1	35,9	8,9	2,0	100,0
	45-64 Total	N	97.868	169.890	34.565	11.446	313.769
		%	31,2	54,1	11,0	3,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	20.074	48.005	7.590	2.294	77.963
		%	25,7	61,6	9,7	2,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	14.237	36.388	9.229	1.881	61.735
		%	23,1	58,9	14,9	3,0	100,0
	Secundaria, superior	N	35.422	54.936	13.172	6.792	110.322
	%	32,1	49,8	11,9	6,2	100,0	
Terciaria	N	28.135	30.561	4.574	479	63.749	
	%	44,1	47,9	7,2	0,8	100,0	
65-74 Total	N	38.920	60.367	10.637	.	109.925	
	%	35,4	54,9	9,7	.	100,0	
Sin estudios, primaria	N	22.569	33.757	5.527	.	61.852	
	%	36,5	54,6	8,9	.	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 175. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y nivel de estudios*

				Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total	
Mujeres	65-74	Secundaria, inferior	N	9.886	15.020	2.547	.	27.452	
			%	36,0	54,7	9,3	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	3.493	6.574	1.827	.	11.893	
			%	29,4	55,3	15,4	.	100,0	
		Terciaria	N	2.973	5.017	737	.	8.727	
			%	34,1	57,5	8,4	.	100,0	
	>=75	Total	N	89.301	48.135	4.429	.	141.864	
			%	62,9	33,9	3,1	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	62.387	35.262	3.487	.	101.136	
			%	61,7	34,9	3,4	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	16.174	8.136	569	.	24.879	
			%	65,0	32,7	2,3	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	6.109	3.352	259	.	9.720		
		%	62,8	34,5	2,7	.	100,0		
	Terciaria	N	4.631	1.384	114	.	6.129		
		%	75,6	22,6	1,9	.	100,0		
	Ambos	Total	Total	N	785.192	810.647	202.352	92.815	1.891.006
				%	41,5	42,9	10,7	4,9	100,0
Sin estudios, primaria		N	205.547	218.593	47.542	17.245	488.927		
		%	42,0	44,7	9,7	3,5	100,0		
Secundaria, inferior		N	126.982	147.663	39.776	22.799	337.220		
		%	37,7	43,8	11,8	6,8	100,0		
Secundaria, superior		N	237.209	296.685	87.197	47.445	668.536		
		%	35,5	44,4	13,0	7,1	100,0		
Terciaria		N	215.454	147.705	27.837	5.326	396.323		
		%	54,4	37,3	7,0	1,3	100,0		
15-24		Total	N	125.985	44.781	10.445	2.746	183.958	
			%	68,5	24,3	5,7	1,5	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	15.557	4.628	1.118	.	21.304	
			%	73,0	21,7	5,2	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	35.376	8.980	3.035	500	47.891	
			%	73,9	18,8	6,3	1,0	100,0	
Secundaria, superior		N	57.381	23.897	4.979	2.026	88.283		
		%	65,0	27,1	5,6	2,3	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 175. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y nivel de estudios*

				Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total
Ambos	15-24	Terciaria	N	17.670	7.275	1.313	221	26.479
			%	66,7	27,5	5,0	0,8	100,0
	25-44	Total	N	227.464	290.512	85.950	53.208	657.135
			%	34,6	44,2	13,1	8,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	15.867	32.281	8.866	6.752	63.765
			%	24,9	50,6	13,9	10,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	17.313	46.059	15.232	13.142	91.745
			%	18,9	50,2	16,6	14,3	100,0
		Secundaria, superior	N	77.577	141.426	45.453	30.305	294.762
			%	26,3	48,0	15,4	10,3	100,0
		Terciaria	N	116.707	70.746	16.400	3.009	206.862
			%	56,4	34,2	7,9	1,5	100,0
45-64	Total		N	211.128	289.492	80.475	35.329	616.424
			%	34,3	47,0	13,1	5,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	40.127	75.928	22.935	9.373	148.363
			%	27,0	51,2	15,5	6,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	33.451	55.964	16.548	9.016	114.979
			%	29,1	48,7	14,4	7,8	100,0
		Secundaria, superior	N	75.256	104.459	32.622	15.115	227.452
			%	33,1	45,9	14,3	6,6	100,0
		Terciaria	N	62.294	53.140	8.371	1.825	125.630
			%	49,6	42,3	6,7	1,5	100,0
65-74	Total		N	80.131	107.799	17.327	401	205.658
			%	39,0	52,4	8,4	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	39.684	51.442	8.484	260	99.869
			%	39,7	51,5	8,5	0,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	16.344	23.651	3.608	141	43.744
			%	37,4	54,1	8,2	0,3	100,0
		Secundaria, superior	N	13.746	20.339	3.756	.	37.841
			%	36,3	53,7	9,9	.	100,0
		Terciaria	N	10.359	12.366	1.479	.	24.204
			%	42,8	51,1	6,1	.	100,0
>=75	Total		N	140.484	78.063	8.154	1.131	227.832
			%	61,7	34,3	3,6	0,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 175. Distribución de la población según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y nivel de estudios*

		Habitualmente sentado/a	Trabajo de pie	Transporto cargas ligeras	Transporto cargas pesadas	Total	
Ambos	>=75 Sin estudios, primaria	N	94.312	54.313	6.140	860	155.625
		%	60,6	34,9	3,9	0,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	24.498	13.009	1.354	.	38.860
		%	63,0	33,5	3,5	.	100,0
	Secundaria, superior	N	13.249	6.563	385	.	20.198
		%	65,6	32,5	1,9	.	100,0
	Terciaria	N	8.424	4.178	275	271	13.149
		%	64,1	31,8	2,1	2,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 176. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y territorio histórico

			Baja	Moderada	Alta	Total
Hombres Total	CAPV	N	240.316	353.645	321.163	915.124
		%	26,3	38,6	35,1	100,0
	Araba	N	31.816	62.386	39.549	133.751
		%	23,8	46,6	29,6	100,0
	Gipuzkoa	N	73.768	109.841	110.202	293.812
		%	25,1	37,4	37,5	100,0
	Bizkaia	N	134.731	181.417	171.413	487.561
		%	27,6	37,2	35,2	100,0
15-24	CAPV	N	17.129	26.632	50.698	94.458
		%	18,1	28,2	53,7	100,0
	Araba	N	2.203	4.167	8.499	14.869
		%	14,8	28,0	57,2	100,0
	Gipuzkoa	N	4.740	7.411	19.153	31.305
		%	15,1	23,7	61,2	100,0
	Bizkaia	N	10.185	15.053	23.046	48.284
		%	21,1	31,2	47,7	100,0
25-44	CAPV	N	87.466	112.846	135.997	336.309
		%	26,0	33,6	40,4	100,0
	Araba	N	13.268	23.062	15.732	52.062
		%	25,5	44,3	30,2	100,0
	Gipuzkoa	N	29.578	33.822	43.390	106.790
		%	27,7	31,7	40,6	100,0
	Bizkaia	N	44.620	55.963	76.874	177.458
		%	25,1	31,5	43,3	100,0
45-64	CAPV	N	84.855	119.359	98.441	302.655
		%	28,0	39,4	32,5	100,0
	Araba	N	11.169	19.887	11.696	42.751
		%	26,1	46,5	27,4	100,0
	Gipuzkoa	N	25.142	36.382	35.895	97.419
		%	25,8	37,3	36,8	100,0
	Bizkaia	N	48.544	63.091	50.850	162.485
		%	29,9	38,8	31,3	100,0
65-74	CAPV	N	19.916	50.484	25.333	95.733
		%	20,8	52,7	26,5	100,0
	Araba	N	2.724	7.741	2.698	13.163
		%	20,7	58,8	20,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 176. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y territorio histórico

				Baja	Moderada	Alta	Total		
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	5.789	16.374	9.968	32.130		
			%	18,0	51,0	31,0	100,0		
		Bizkaia	N	11.403	26.370	12.667	50.440		
			%	22,6	52,3	25,1	100,0		
	>=75	CAPV	N	30.949	44.323	10.695	85.968		
			%	36,0	51,6	12,4	100,0		
			Araba	N	2.451	7.530	923	10.905	
				%	22,5	69,1	8,5	100,0	
			Gipuzkoa	N	8.519	15.853	1.796	26.168	
				%	32,6	60,6	6,9	100,0	
			Bizkaia	N	19.979	20.940	7.975	48.895	
				%	40,9	42,8	16,3	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	339.301	444.248	192.333	975.882	
				%	34,8	45,5	19,7	100,0	
				Araba	N	37.098	72.466	27.208	136.772
					%	27,1	53,0	19,9	100,0
			Gipuzkoa	N	101.868	144.729	66.088	312.686	
				%	32,6	46,3	21,1	100,0	
			Bizkaia	N	200.335	227.053	99.037	526.425	
				%	38,1	43,1	18,8	100,0	
			15-24	CAPV	N	23.933	39.462	26.105	89.499
					%	26,7	44,1	29,2	100,0
				Araba	N	3.209	5.912	4.089	13.210
					%	24,3	44,8	31,0	100,0
				Gipuzkoa	N	7.367	12.308	9.768	29.443
					%	25,0	41,8	33,2	100,0
				Bizkaia	N	13.356	21.242	12.248	46.846
					%	28,5	45,3	26,1	100,0
			25-44	CAPV	N	101.111	138.342	81.372	320.826
					%	31,5	43,1	25,4	100,0
		Araba	N	13.596	22.341	11.931	47.869		
			%	28,4	46,7	24,9	100,0		
		Gipuzkoa	N	32.250	43.364	26.291	101.905		
			%	31,6	42,6	25,8	100,0		
		Bizkaia	N	55.265	72.637	43.150	171.052		
			%	32,3	42,5	25,2	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 176. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y territorio histórico

				Baja	Moderada	Alta	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	102.190	148.989	62.589	313.769
			%	32,6	47,5	19,9	100,0
		Araba	N	9.640	26.261	8.363	44.263
			%	21,8	59,3	18,9	100,0
		Gipuzkoa	N	29.377	47.370	22.915	99.662
			%	29,5	47,5	23,0	100,0
	Bizkaia	N	63.173	75.359	31.311	169.843	
		%	37,2	44,4	18,4	100,0	
	65-74	CAPV	N	34.301	60.982	14.642	109.925
			%	31,2	55,5	13,3	100,0
		Araba	N	3.264	8.978	2.078	14.320
			%	22,8	62,7	14,5	100,0
		Gipuzkoa	N	9.505	21.596	5.019	36.120
			%	26,3	59,8	13,9	100,0
	Bizkaia	N	21.532	30.408	7.545	59.484	
		%	36,2	51,1	12,7	100,0	
	>=75	CAPV	N	77.766	56.473	7.625	141.864
			%	54,8	39,8	5,4	100,0
Araba		N	7.388	8.974	748	17.110	
		%	43,2	52,5	4,4	100,0	
Gipuzkoa		N	23.369	20.092	2.093	45.555	
		%	51,3	44,1	4,6	100,0	
Bizkaia	N	47.010	27.407	4.784	79.200		
	%	59,4	34,6	6,0	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	579.617	797.893	513.497	1.891.006
			%	30,7	42,2	27,2	100,0
	Araba	N	68.913	134.852	66.757	270.523	
		%	25,5	49,8	24,7	100,0	
	Gipuzkoa	N	175.637	254.571	176.290	606.497	
		%	29,0	42,0	29,1	100,0	
	Bizkaia	N	335.067	408.470	270.450	1.013.987	
		%	33,0	40,3	26,7	100,0	
	15-24	CAPV	N	41.061	66.093	76.803	183.958
			%	22,3	35,9	41,8	100,0
		Araba	N	5.413	10.079	12.588	28.079
			%	19,3	35,9	44,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 176. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y territorio histórico

			Baja	Moderada	Alta	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N 12.107	19.719	28.921	60.748
			% 19,9	32,5	47,6	100,0
		Bizkaia	N 23.541	36.295	35.293	95.130
			% 24,7	38,2	37,1	100,0
	25-44	CAPV	N 188.577	251.188	217.369	657.135
			% 28,7	38,2	33,1	100,0
		Araba	N 26.864	45.403	27.664	99.930
			% 26,9	45,4	27,7	100,0
		Gipuzkoa	N 61.828	77.185	69.681	208.695
			% 29,6	37,0	33,4	100,0
		Bizkaia	N 99.885	128.600	120.024	348.509
			% 28,7	36,9	34,4	100,0
	45-64	CAPV	N 187.045	268.348	161.031	616.424
			% 30,3	43,5	26,1	100,0
		Araba	N 20.809	46.147	20.059	87.015
			% 23,9	53,0	23,1	100,0
		Gipuzkoa	N 54.519	83.751	58.811	197.081
			% 27,7	42,5	29,8	100,0
		Bizkaia	N 111.717	138.450	82.161	332.328
			% 33,6	41,7	24,7	100,0
	65-74	CAPV	N 54.217	111.466	39.975	205.658
			% 26,4	54,2	19,4	100,0
		Araba	N 5.988	16.719	4.776	27.483
			% 21,8	60,8	17,4	100,0
		Gipuzkoa	N 15.294	37.969	14.987	68.251
			% 22,4	55,6	22,0	100,0
		Bizkaia	N 32.935	56.778	20.212	109.924
			% 30,0	51,7	18,4	100,0
	>=75	CAPV	N 108.716	100.797	18.320	227.832
			% 47,7	44,2	8,0	100,0
		Araba	N 9.839	16.504	1.671	28.015
			% 35,1	58,9	6,0	100,0
		Gipuzkoa	N 31.888	35.945	3.890	71.723
			% 44,5	50,1	5,4	100,0
		Bizkaia	N 66.989	48.347	12.759	128.094
			% 52,3	37,7	10,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 177. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y clase social

			Baja	Moderada	Alta	Total
Hombres	Total	Total N	239.901	353.347	320.616	913.863
		%	26,3	38,7	35,1	100,0
	I	N	23.372	47.643	42.675	113.690
		%	20,6	41,9	37,5	100,0
	II	N	18.279	35.368	24.559	78.206
		%	23,4	45,2	31,4	100,0
	III	N	44.448	76.729	67.178	188.355
		%	23,6	40,7	35,7	100,0
	IV	N	133.122	161.175	156.008	450.306
		%	29,6	35,8	34,6	100,0
	V	N	20.680	32.432	30.196	83.307
		%	24,8	38,9	36,2	100,0
	15-24	Total N	17.129	26.334	50.438	93.900
		%	18,2	28,0	53,7	100,0
	I	N	3.117	3.954	7.563	14.634
		%	21,3	27,0	51,7	100,0
	II	N	507	5.305	5.176	10.988
		%	4,6	48,3	47,1	100,0
	III	N	2.529	3.670	10.631	16.830
		%	15,0	21,8	63,2	100,0
	IV	N	10.554	9.340	22.843	42.737
		%	24,7	21,9	53,5	100,0
	V	N	422	4.065	4.225	8.711
		%	4,8	46,7	48,5	100,0
	25-44	Total N	87.466	112.846	135.997	336.309
		%	26,0	33,6	40,4	100,0
	I	N	8.857	18.030	16.845	43.732
		%	20,3	41,2	38,5	100,0
	II	N	8.198	15.131	9.167	32.496
		%	25,2	46,6	28,2	100,0
	III	N	16.500	21.149	24.607	62.257
		%	26,5	34,0	39,5	100,0
	IV	N	45.553	45.875	68.964	160.392
		%	28,4	28,6	43,0	100,0
	V	N	8.357	12.661	16.413	37.432
		%	22,3	33,8	43,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 177. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y clase social

			Baja	Moderada	Alta	Total
Hombres 45-64	Total	N	84.855	119.359	98.154	302.368
		%	28,1	39,5	32,5	100,0
I	N	9.171	16.759	11.976	37.907	
	%	24,2	44,2	31,6	100,0	
II	N	6.363	8.477	8.580	23.419	
	%	27,2	36,2	36,6	100,0	
III	N	14.032	29.193	23.097	66.322	
	%	21,2	44,0	34,8	100,0	
IV	N	47.452	55.912	47.250	150.614	
	%	31,5	37,1	31,4	100,0	
V	N	7.836	9.019	7.251	24.106	
	%	32,5	37,4	30,1	100,0	
65-74	Total	N	19.916	50.484	25.333	95.733
		%	20,8	52,7	26,5	100,0
I	N	1.530	6.547	5.676	13.753	
	%	11,1	47,6	41,3	100,0	
II	N	950	4.403	1.509	6.862	
	%	13,8	64,2	22,0	100,0	
III	N	4.594	10.703	6.480	21.777	
	%	21,1	49,1	29,8	100,0	
IV	N	11.377	25.689	10.687	47.753	
	%	23,8	53,8	22,4	100,0	
V	N	1.465	3.143	980	5.588	
	%	26,2	56,2	17,5	100,0	
>=75	Total	N	30.535	44.323	10.695	85.553
		%	35,7	51,8	12,5	100,0
I	N	698	2.352	613	3.663	
	%	19,0	64,2	16,7	100,0	
II	N	2.261	2.052	127	4.440	
	%	50,9	46,2	2,9	100,0	
III	N	6.792	12.015	2.363	21.169	
	%	32,1	56,8	11,2	100,0	
IV	N	18.184	24.360	6.265	48.810	
	%	37,3	49,9	12,8	100,0	
V	N	2.599	3.544	1.327	7.470	
	%	34,8	47,4	17,8	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 177. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y clase social

			Baja	Moderada	Alta	Total
Mujeres	Total	Total	N 338.394	442.972	192.126	973.492
			% 34,8	45,5	19,7	100,0
		I	N 28.345	49.369	27.125	104.838
			% 27,0	47,1	25,9	100,0
		II	N 27.691	44.301	23.036	95.028
			% 29,1	46,6	24,2	100,0
		III	N 86.890	113.854	41.363	242.107
			% 35,9	47,0	17,1	100,0
		IV	N 131.827	158.750	69.864	360.441
			% 36,6	44,0	19,4	100,0
		V	N 63.642	76.697	30.738	171.077
			% 37,2	44,8	18,0	100,0
	15-24	Total	N 23.430	39.206	25.898	88.533
			% 26,5	44,3	29,3	100,0
		I	N 4.218	5.968	4.375	14.562
			% 29,0	41,0	30,0	100,0
		II	N 1.866	6.219	5.411	13.497
			% 13,8	46,1	40,1	100,0
		III	N 7.074	9.481	3.515	20.069
			% 35,2	47,2	17,5	100,0
		IV	N 7.373	14.245	9.996	31.614
			% 23,3	45,1	31,6	100,0
		V	N 2.898	3.293	2.601	8.792
			% 33,0	37,5	29,6	100,0
	25-44	Total	N 101.111	137.847	81.372	320.330
			% 31,6	43,0	25,4	100,0
		I	N 11.552	21.298	12.236	45.086
			% 25,6	47,2	27,1	100,0
		II	N 11.149	14.420	11.654	37.223
			% 30,0	38,7	31,3	100,0
		III	N 25.615	38.779	17.635	82.029
			% 31,2	47,3	21,5	100,0
		IV	N 38.631	44.053	28.041	110.725
			% 34,9	39,8	25,3	100,0
		V	N 14.164	19.296	11.807	45.267
			% 31,3	42,6	26,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 177. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y clase social

			Baja	Moderada	Alta	Total	
Mujeres	45-64	Total	N 102.190	148.818	62.589	313.598	
			%	32,6	47,5	20,0	100,0
		I	N 7.477	16.762	7.877	32.116	
			%	23,3	52,2	24,5	100,0
		II	N 8.008	14.261	4.523	26.792	
			%	29,9	53,2	16,9	100,0
		III	N 30.031	42.383	16.227	88.641	
			%	33,9	47,8	18,3	100,0
		IV	N 35.714	46.453	21.935	104.102	
			%	34,3	44,6	21,1	100,0
		V	N 20.960	28.959	12.028	61.946	
			%	33,8	46,7	19,4	100,0
	65-74	Total	N 34.301	60.826	14.642	109.770	
			%	31,2	55,4	13,3	100,0
		I	N 1.910	3.443	1.846	7.199	
			%	26,5	47,8	25,6	100,0
		II	N 1.879	4.826	519	7.225	
			%	26,0	66,8	7,2	100,0
		III	N 7.394	12.741	2.764	22.899	
			%	32,3	55,6	12,1	100,0
		IV	N 15.049	28.773	6.312	50.134	
			%	30,0	57,4	12,6	100,0
		V	N 8.068	11.043	3.200	22.312	
			%	36,2	49,5	14,3	100,0
	>=75	Total	N 77.362	56.274	7.625	141.261	
			%	54,8	39,8	5,4	100,0
		I	N 3.187	1.897	790	5.875	
			%	54,3	32,3	13,5	100,0
		II	N 4.788	4.575	929	10.292	
			%	46,5	44,4	9,0	100,0
		III	N 16.776	10.470	1.222	28.468	
			%	58,9	36,8	4,3	100,0
		IV	N 35.060	25.226	3.580	63.866	
			%	54,9	39,5	5,6	100,0
		V	N 17.551	14.106	1.103	32.760	
			%	53,6	43,1	3,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 177. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y clase social

			Baja	Moderada	Alta	Total
Ambos	Total	Total	N 578.295	796.319	512.742	1.887.356
			% 30,6	42,2	27,2	100,0
	I	N	51.717	97.011	69.799	218.528
		%	23,7	44,4	31,9	100,0
	II	N	45.970	79.669	47.595	173.234
		%	26,5	46,0	27,5	100,0
	III	N	131.338	190.583	108.541	430.462
		%	30,5	44,3	25,2	100,0
	IV	N	264.949	319.926	225.873	810.747
		%	32,7	39,5	27,9	100,0
	V	N	84.322	109.129	60.934	254.385
		%	33,1	42,9	24,0	100,0
	15-24	Total	N 40.558	65.540	76.335	182.434
		%	22,2	35,9	41,8	100,0
	I	N	7.335	9.923	11.938	29.196
		%	25,1	34,0	40,9	100,0
	II	N	2.373	11.524	10.588	24.485
		%	9,7	47,1	43,2	100,0
	III	N	9.603	13.151	14.145	36.900
		%	26,0	35,6	38,3	100,0
	IV	N	17.927	23.585	32.839	74.351
		%	24,1	31,7	44,2	100,0
	V	N	3.320	7.358	6.825	17.503
		%	19,0	42,0	39,0	100,0
	25-44	Total	N 188.577	250.693	217.369	656.640
		%	28,7	38,2	33,1	100,0
	I	N	20.408	39.328	29.081	88.818
		%	23,0	44,3	32,7	100,0
	II	N	19.347	29.552	20.821	69.719
		%	27,7	42,4	29,9	100,0
	III	N	42.115	59.928	42.243	144.286
		%	29,2	41,5	29,3	100,0
	IV	N	84.185	89.928	97.005	271.117
		%	31,1	33,2	35,8	100,0
	V	N	22.522	31.957	28.220	82.699
		%	27,2	38,6	34,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 177. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y clase social

				Baja	Moderada	Alta	Total
Ambos	45-64	Total	N	187.045	268.177	160.743	615.965
			%	30,4	43,5	26,1	100,0
	I	N	16.648	33.522	19.853	70.023	
		%	23,8	47,9	28,4	100,0	
	II	N	14.371	22.738	13.103	50.212	
		%	28,6	45,3	26,1	100,0	
	III	N	44.063	71.576	39.323	154.963	
		%	28,4	46,2	25,4	100,0	
	IV	N	83.166	102.365	69.185	254.716	
		%	32,7	40,2	27,2	100,0	
	V	N	28.796	37.978	19.279	86.052	
		%	33,5	44,1	22,4	100,0	
	65-74	Total	N	54.217	111.311	39.975	205.503
		%	26,4	54,2	19,5	100,0	
	I	N	3.440	9.989	7.523	20.952	
		%	16,4	47,7	35,9	100,0	
	II	N	2.829	9.230	2.028	14.087	
		%	20,1	65,5	14,4	100,0	
	III	N	11.988	23.443	9.245	44.676	
		%	26,8	52,5	20,7	100,0	
	IV	N	26.426	54.462	16.999	97.887	
		%	27,0	55,6	17,4	100,0	
	V	N	9.534	14.186	4.181	27.901	
		%	34,2	50,8	15,0	100,0	
	>=75	Total	N	107.897	100.597	18.320	226.814
		%	47,6	44,4	8,1	100,0	
	I	N	3.885	4.250	1.404	9.538	
		%	40,7	44,6	14,7	100,0	
	II	N	7.049	6.626	1.056	14.731	
		%	47,9	45,0	7,2	100,0	
	III	N	23.568	22.485	3.585	49.638	
		%	47,5	45,3	7,2	100,0	
	IV	N	53.244	49.586	9.846	112.676	
		%	47,3	44,0	8,7	100,0	
	V	N	20.151	17.650	2.430	40.231	
		%	50,1	43,9	6,0	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 178. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y nivel de estudios*

			Baja	Moderada	Alta	Total
Hombres Total	Total	N	240.316	353.645	321.163	915.124
		%	26,3	38,6	35,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	65.455	88.872	56.273	210.600
		%	31,1	42,2	26,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	45.011	60.281	62.162	167.454
		%	26,9	36,0	37,1	100,0
	Secundaria, superior	N	90.769	134.521	135.381	360.670
		%	25,2	37,3	37,5	100,0
	Terciaria	N	39.081	69.971	67.348	176.400
		%	22,2	39,7	38,2	100,0
15-24	Total	N	17.129	26.632	50.698	94.458
		%	18,1	28,2	53,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.109	2.037	5.772	9.918
		%	21,3	20,5	58,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	5.678	9.067	16.383	31.129
		%	18,2	29,1	52,6	100,0
	Secundaria, superior	N	7.838	12.861	22.141	42.840
		%	18,3	30,0	51,7	100,0
	Terciaria	N	1.504	2.666	6.402	10.572
		%	14,2	25,2	60,6	100,0
25-44	Total	N	87.466	112.846	135.997	336.309
		%	26,0	33,6	40,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	10.461	12.828	14.487	37.776
		%	27,7	34,0	38,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	16.607	13.513	22.688	52.808
		%	31,4	25,6	43,0	100,0
	Secundaria, superior	N	40.232	57.280	66.762	164.274
		%	24,5	34,9	40,6	100,0
	Terciaria	N	20.167	29.225	32.058	81.451
		%	24,8	35,9	39,4	100,0
45-64	Total	N	84.855	119.359	98.441	302.655
		%	28,0	39,4	32,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	22.091	28.739	19.571	70.400
		%	31,4	40,8	27,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	15.143	20.355	17.747	53.244
		%	28,4	38,2	33,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 178. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y nivel de estudios*

				Baja	Moderada	Alta	Total
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	34.056	44.195	38.879	117.130
			%	29,1	37,7	33,2	100,0
		Terciaria	N	13.565	26.071	22.245	61.881
			%	21,9	42,1	35,9	100,0
	65-74	Total	N	19.916	50.484	25.333	95.733
			%	20,8	52,7	26,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.961	19.248	9.808	38.017
			%	23,6	50,6	25,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.038	8.716	3.537	16.291
			%	24,8	53,5	21,7	100,0
		Secundaria, superior	N	4.940	14.173	6.835	25.948
			%	19,0	54,6	26,3	100,0
		Terciaria	N	1.978	8.346	5.153	15.477
			%	12,8	53,9	33,3	100,0
	>=75	Total	N	30.949	44.323	10.695	85.968
			%	36,0	51,6	12,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	21.834	26.020	6.635	54.489
			%	40,1	47,8	12,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.546	8.630	1.806	13.981
			%	25,4	61,7	12,9	100,0
		Secundaria, superior	N	3.703	6.011	764	10.478
			%	35,3	57,4	7,3	100,0
		Terciaria	N	1.867	3.663	1.491	7.020
			%	26,6	52,2	21,2	100,0
Mujeres	Total	Total	N	339.301	444.248	192.333	975.882
			%	34,8	45,5	19,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	113.329	132.096	32.903	278.327
			%	40,7	47,5	11,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	60.714	77.759	31.293	169.766
			%	35,8	45,8	18,4	100,0
		Secundaria, superior	N	101.128	135.039	71.699	307.866
			%	32,8	43,9	23,3	100,0
		Terciaria	N	64.130	99.355	56.438	219.923
			%	29,2	45,2	25,7	100,0
	Total	Total	N	23.933	39.462	26.105	89.499
			%	26,7	44,1	29,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 178. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y nivel de estudios*

				Baja	Moderada	Alta	Total
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	666	7.018	3.703	11.386
			%	5,8	61,6	32,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.555	7.055	4.153	16.763
			%	33,1	42,1	24,8	100,0
		Secundaria, superior	N	12.900	20.436	12.108	45.443
			%	28,4	45,0	26,6	100,0
		Terciaria	N	4.812	4.953	6.142	15.907
			%	30,3	31,1	38,6	100,0
	25-44	Total	N	101.111	138.342	81.372	320.826
			%	31,5	43,1	25,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.710	12.566	4.713	25.990
			%	33,5	48,4	18,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.442	14.631	10.863	38.937
			%	34,5	37,6	27,9	100,0
		Secundaria, superior	N	41.777	56.507	32.203	130.487
			%	32,0	43,3	24,7	100,0
		Terciaria	N	37.181	54.637	33.593	125.412
			%	29,6	43,6	26,8	100,0
	45-64	Total	N	102.190	148.989	62.589	313.769
			%	32,6	47,5	19,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	26.089	40.162	11.711	77.963
			%	33,5	51,5	15,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	21.446	28.349	11.940	61.735
			%	34,7	45,9	19,3	100,0
		Secundaria, superior	N	37.073	48.897	24.353	110.322
			%	33,6	44,3	22,1	100,0
		Terciaria	N	17.582	31.581	14.586	63.749
			%	27,6	49,5	22,9	100,0
	65-74	Total	N	34.301	60.982	14.642	109.925
			%	31,2	55,5	13,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	20.302	33.153	8.397	61.852
			%	32,8	53,6	13,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.676	15.846	2.930	27.452
			%	31,6	57,7	10,7	100,0
		Secundaria, superior	N	3.729	6.175	1.990	11.893
			%	31,4	51,9	16,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 178. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y nivel de estudios*

				Baja	Moderada	Alta	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N	1.593	5.808	1.325	8.727	
			%	18,3	66,6	15,2	100,0	
	>=75	Total	N	77.766	56.473	7.625	141.864	
			%	54,8	39,8	5,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	57.561	39.196	4.379	101.136	
			%	56,9	38,8	4,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	11.595	11.877	1.407	24.879	
			%	46,6	47,7	5,7	100,0	
		Secundaria, superior	N	5.650	3.024	1.046	9.720	
			%	58,1	31,1	10,8	100,0	
		Terciaria	N	2.961	2.376	793	6.129	
			%	48,3	38,8	12,9	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	579.617	797.893	513.497	1.891.006
				%	30,7	42,2	27,2	100,0
			Sin estudios, primaria	N	178.784	220.968	89.176	488.927
				%	36,6	45,2	18,2	100,0
			Secundaria, inferior	N	105.726	138.040	93.455	337.220
				%	31,4	40,9	27,7	100,0
		Secundaria, superior	N	191.897	269.560	207.080	668.536	
			%	28,7	40,3	31,0	100,0	
		Terciaria	N	103.211	169.326	123.786	396.323	
			%	26,0	42,7	31,2	100,0	
15-24		Total	N	41.061	66.093	76.803	183.958	
			%	22,3	35,9	41,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.774	9.055	9.475	21.304	
			%	13,0	42,5	44,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	11.233	16.122	20.536	47.891	
			%	23,5	33,7	42,9	100,0	
		Secundaria, superior	N	20.738	33.297	34.248	88.283	
			%	23,5	37,7	38,8	100,0	
	Terciaria	N	6.317	7.619	12.543	26.479		
		%	23,9	28,8	47,4	100,0		
25-44	Total	N	188.577	251.188	217.369	657.135		
		%	28,7	38,2	33,1	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	19.171	25.394	19.201	63.765		
		%	30,1	39,8	30,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 178. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y nivel de estudios*

				Baja	Moderada	Alta	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	30.049	28.145	33.552	91.745
			%	32,8	30,7	36,6	100,0
		Secundaria, superior	N	82.009	113.787	98.966	294.762
			%	27,8	38,6	33,6	100,0
		Terciaria	N	57.349	83.863	65.651	206.862
			%	27,7	40,5	31,7	100,0
	45-64	Total	N	187.045	268.348	161.031	616.424
			%	30,3	43,5	26,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	48.180	68.901	31.282	148.363
			%	32,5	46,4	21,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	36.589	48.704	29.686	114.979
			%	31,8	42,4	25,8	100,0
		Secundaria, superior	N	71.129	93.092	63.231	227.452
			%	31,3	40,9	27,8	100,0
		Terciaria	N	31.147	57.652	36.831	125.630
			%	24,8	45,9	29,3	100,0
	65-74	Total	N	54.217	111.466	39.975	205.658
			%	26,4	54,2	19,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	29.263	52.402	18.205	99.869
			%	29,3	52,5	18,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	12.714	24.562	6.468	43.744
			%	29,1	56,1	14,8	100,0
		Secundaria, superior	N	8.668	20.348	8.825	37.841
			%	22,9	53,8	23,3	100,0
		Terciaria	N	3.571	14.155	6.478	24.204
			%	14,8	58,5	26,8	100,0
	>=75	Total	N	108.716	100.797	18.320	227.832
			%	47,7	44,2	8,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	79.395	65.216	11.014	155.625
			%	51,0	41,9	7,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	15.141	20.507	3.213	38.860
			%	39,0	52,8	8,3	100,0
		Secundaria, superior	N	9.353	9.035	1.810	20.198
			%	46,3	44,7	9,0	100,0
		Terciaria	N	4.827	6.038	2.283	13.149
			%	36,7	45,9	17,4	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 179. Proporción (%) de personas que realizan actividad física saludable por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	73,7	76,2	74,9	72,4
	15-24	81,9	85,2	84,9	78,9
	25-44	74,0	74,5	72,3	74,9
	45-64	72,0	73,9	74,2	70,1
	65-74	79,2	79,3	82,0	77,4
	>=75	64,0	77,5	67,4	59,1
	Mujeres	Total	65,2	72,9	67,4
	15-24	73,3	75,7	75,0	71,5
	25-44	68,5	71,6	68,4	67,7
	45-64	67,4	78,2	70,5	62,8
	65-74	68,8	77,2	73,7	63,8
	>=75	45,2	56,8	48,7	40,6
Ambos sexos	Total	69,3	74,5	71,0	67,0
	15-24	77,7	80,7	80,1	75,3
	25-44	71,3	73,1	70,4	71,3
	45-64	69,7	76,1	72,3	66,4
	65-74	73,6	78,2	77,6	70,0
	>=75	52,3	64,9	55,5	47,7

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 180. Proporción (%) de personas que realiza actividad física saludable por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	73,7	79,4	76,6	76,4	70,4	75,2
	15-24	81,8	78,7	95,4	85,0	75,3	95,2
	25-44	74,0	79,7	74,8	73,5	71,6	77,7
	45-64	71,9	75,8	72,8	78,8	68,5	67,5
	65-74	79,2	88,9	86,2	78,9	76,2	73,8
	>=75	64,3	81,0	49,1	67,9	62,7	65,2
	Mujeres	Total	65,2	73,0	70,9	64,1	63,4
	15-24	73,5	71,0	86,2	64,8	76,7	67,0
	25-44	68,4	74,4	70,0	68,8	65,1	68,7
	45-64	67,4	76,7	70,1	66,1	65,7	66,2
	65-74	68,8	73,5	74,0	67,7	70,0	63,8
	>=75	45,2	45,7	53,5	41,1	45,1	46,4
Ambos sexos	Total	69,4	76,3	73,5	69,5	67,3	66,9
	15-24	77,8	74,9	90,3	74,0	75,9	81,0
	25-44	71,3	77,0	72,3	70,8	68,9	72,8
	45-64	69,6	76,2	71,4	71,6	67,3	66,5
	65-74	73,6	83,6	79,9	73,2	73,0	65,8
	>=75	52,4	59,3	52,1	52,5	52,7	49,9

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 181. Proporción (%) de personas que realiza actividad física saludable por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	73,7	68,9	73,1	74,8	77,8
	15-24	81,9	78,7	81,8	81,7	85,8
	25-44	74,0	72,3	68,6	75,5	75,2
	45-64	72,0	68,6	71,6	70,9	78,1
	65-74	79,2	76,4	75,2	81,0	87,2
	>=75	64,0	59,9	74,6	64,7	73,4
Mujeres	Total	65,2	59,3	64,2	67,2	70,8
	15-24	73,3	94,2	66,9	71,6	69,7
	25-44	68,5	66,5	65,5	68,0	70,4
	45-64	67,4	66,5	65,3	66,4	72,4
	65-74	68,8	67,2	68,4	68,6	81,7
	>=75	45,2	43,1	53,4	41,9	51,7
Ambos sexos	Total	69,3	63,4	68,6	71,3	74,0
	15-24	77,7	87,0	76,5	76,5	76,1
	25-44	71,3	69,9	67,2	72,2	72,3
	45-64	69,7	67,5	68,2	68,7	75,2
	65-74	73,6	70,7	70,9	77,1	85,2
	>=75	52,3	49,0	61,0	53,7	63,3

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 182. Proporción (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	44,5	50,5	44,9	42,6
	15-24	56,4	54,8	62,3	53,1
	25-44	35,7	41,8	37,2	33,0
	45-64	41,2	47,0	39,2	40,8
	65-74	62,4	77,1	64,0	57,5
	>=75	57,5	67,3	52,8	57,9
	Mujeres	Total	36,3	41,3	39,4
	15-24	34,8	36,0	40,6	30,7
	25-44	25,9	26,6	27,9	24,5
	45-64	38,2	44,3	41,8	34,5
	65-74	55,1	65,6	60,7	49,1
	>=75	42,2	58,2	41,9	39,0
Ambos sexos	Total	40,3	45,8	42,0	37,8
	15-24	45,9	45,9	51,8	42,1
	25-44	30,9	34,5	32,7	28,8
	45-64	39,7	45,6	40,5	37,6
	65-74	58,5	71,1	62,3	53,0
	>=75	48,0	61,7	45,9	46,2

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 183. Proporción (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	44,5	42,6	44,0	46,0	44,3	44,7
	15-24	56,4	48,9	59,8	71,7	54,8	43,2
	25-44	35,7	30,4	38,1	32,3	36,6	41,7
	45-64	41,2	43,3	40,7	42,6	40,1	41,1
	65-74	62,4	66,1	50,2	63,7	63,8	50,9
	>=75	57,3	68,7	55,5	58,6	54,4	68,3
	Mujeres	Total	36,3	34,5	37,1	31,8	39,3
	15-24	34,9	41,7	41,6	22,9	37,3	31,9
	25-44	25,8	26,3	33,8	20,5	27,7	23,9
	45-64	38,2	36,5	32,6	36,8	41,0	38,7
	65-74	55,2	51,1	54,8	50,6	58,5	53,7
	>=75	42,1	49,2	42,5	40,1	42,4	41,7
Ambos sexos	Total	40,3	38,7	40,2	38,0	42,1	39,5
	15-24	46,0	45,3	49,7	45,1	47,4	37,5
	25-44	30,9	28,3	35,8	25,6	33,0	32,0
	45-64	39,6	40,2	36,4	39,2	40,5	39,4
	65-74	58,5	60,9	52,5	57,0	61,1	53,1
	>=75	47,8	56,7	46,4	48,0	47,6	46,6

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 184. Proporción (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	44,5	48,2	47,1	43,0	40,6
	15-24	56,4	61,8	58,4	56,6	44,7
	25-44	35,7	35,4	37,6	37,8	30,5
	45-64	41,2	42,0	40,5	38,6	45,5
	65-74	62,4	61,3	62,8	65,6	59,4
	>=75	57,5	53,4	65,0	62,6	67,3
Mujeres	Total	36,3	45,1	41,8	30,1	29,8
	15-24	34,8	39,7	44,7	31,3	30,6
	25-44	25,9	37,8	24,3	23,9	26,0
	45-64	38,2	44,7	44,0	33,9	32,1
	65-74	55,1	55,7	58,2	45,4	54,1
	>=75	42,2	41,3	43,8	45,0	46,6
Ambos sexos	Total	40,3	46,4	44,5	37,1	34,6
	15-24	45,9	50,0	53,6	43,6	36,2
	25-44	30,9	36,4	32,0	31,6	27,7
	45-64	39,7	43,4	42,4	36,4	38,7
	65-74	58,5	57,8	59,9	59,2	57,5
	>=75	48,0	45,5	51,5	54,1	57,7

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 185. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

			Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Hombres Total	CAPV	N	231.567	71.684	159.231	5.173	12.259	28.021	507.935
		%	45,6	14,1	31,3	1,0	2,4	5,5	100,0
	Araba	N	35.107	7.125	21.778	67	390	1.800	66.265
		%	53,0	10,8	32,9	0,1	0,6	2,7	100,0
	Gipuzkoa	N	68.227	27.862	50.510	1.417	4.931	9.038	161.986
		%	42,1	17,2	31,2	0,9	3,0	5,6	100,0
	Bizkaia	N	128.233	36.697	86.944	3.689	6.938	17.184	279.684
		%	45,8	13,1	31,1	1,3	2,5	6,1	100,0
15-24	CAPV	N	17.048	1.188	15.449	.	2.397	5.093	41.174
		%	41,4	2,9	37,5	.	5,8	12,4	100,0
	Araba	N	3.968	339	2.016	.	203	194	6.721
		%	59,0	5,0	30,0	.	3,0	2,9	100,0
	Gipuzkoa	N	4.760	250	3.354	.	1.010	2.419	11.793
		%	40,4	2,1	28,4	.	8,6	20,5	100,0
	Bizkaia	N	8.320	598	10.080	.	1.183	2.480	22.660
		%	36,7	2,6	44,5	.	5,2	10,9	100,0
25-44	CAPV	N	120.523	11.858	62.794	2.123	7.438	11.434	216.169
		%	55,8	5,5	29,0	1,0	3,4	5,3	100,0
	Araba	N	15.988	2.538	10.945	.	.	814	30.285
		%	52,8	8,4	36,1	.	.	2,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 185. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

			Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Hombres 25-44	Gipuzkoa	N	35.972	4.170	19.557	481	3.306	3.533	67.019
		%	53,7	6,2	29,2	0,7	4,9	5,3	100,0
	Bizkaia	N	68.563	5.149	32.292	1.642	4.132	7.087	118.866
		%	57,7	4,3	27,2	1,4	3,5	6,0	100,0
45-64	CAPV	N	86.044	23.737	57.737	1.837	1.524	7.199	178.079
		%	48,3	13,3	32,4	1,0	0,9	4,0	100,0
	Araba	N	13.512	1.539	6.782	.	186	652	22.670
		%	59,6	6,8	29,9	.	0,8	2,9	100,0
	Gipuzkoa	N	25.261	9.117	21.825	702	448	1.907	59.260
		%	42,6	15,4	36,8	1,2	0,8	3,2	100,0
	Bizkaia	N	47.271	13.082	29.130	1.135	890	4.641	96.149
		%	49,2	13,6	30,3	1,2	0,9	4,8	100,0
65-74	CAPV	N	3.527	11.310	17.106	924	727	2.415	36.010
		%	9,8	31,4	47,5	2,6	2,0	6,7	100,0
	Araba	N	994	893	996	67	.	70	3.020
		%	32,9	29,6	33,0	2,2	.	2,3	100,0
	Gipuzkoa	N	1.008	5.312	4.087	234	167	747	11.554
		%	8,7	46,0	35,4	2,0	1,4	6,5	100,0
	Bizkaia	N	1.526	5.105	12.023	623	560	1.599	21.436
		%	7,1	23,8	56,1	2,9	2,6	7,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 185. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

			Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total		
Hombres >=75	CAPV	N	4.425	23.591	6.146	288	172	1.881	36.504		
		%	12,1	64,6	16,8	0,8	0,5	5,2	100,0		
	Araba	N	646	1.815	1.039	.	.	70	3.571		
		%	18,1	50,8	29,1	.	.	2,0	100,0		
	Gipuzkoa	N	1.226	9.014	1.687	.	.	432	12.360		
		%	9,9	72,9	13,7	.	.	3,5	100,0		
	Bizkaia	N	2.553	12.762	3.419	288	172	1.379	20.573		
		%	12,4	62,0	16,6	1,4	0,8	6,7	100,0		
	Mujeres	Total	CAPV	N	267.785	103.424	201.370	8.316	11.139	29.346	621.380
			%	43,1	16,6	32,4	1,3	1,8	4,7	100,0	
Araba		N	38.228	9.517	27.186	918	1.585	2.905	80.339		
		%	47,6	11,8	33,8	1,1	2,0	3,6	100,0		
Gipuzkoa		N	85.754	31.305	55.181	3.613	2.626	11.119	189.599		
		%	45,2	16,5	29,1	1,9	1,4	5,9	100,0		
Bizkaia		N	143.803	62.602	119.004	3.785	6.928	15.321	351.443		
		%	40,9	17,8	33,9	1,1	2,0	4,4	100,0		
15-24		CAPV	N	25.209	595	26.318	1.504	2.034	2.735	58.395	
			%	43,2	1,0	45,1	2,6	3,5	4,7	100,0	
	Araba	N	3.146	.	4.635	302	375	.	8.458		
		%	37,2	.	54,8	3,6	4,4	.	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 185. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

			Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total	
Mujeres	15-24	Gipuzkoa	N	8.524	244	7.489	333	253	634	17.478
			%	48,8	1,4	42,8	1,9	1,4	3,6	100,0
		Bizkaia	N	13.539	350	14.194	868	1.406	2.101	32.459
			%	41,7	1,1	43,7	2,7	4,3	6,5	100,0
	25-44	CAPV	N	137.467	4.548	78.141	2.541	4.050	11.056	237.803
			%	57,8	1,9	32,9	1,1	1,7	4,6	100,0
		Araba	N	21.488	423	10.568	.	1.035	1.641	35.155
			%	61,1	1,2	30,1	.	2,9	4,7	100,0
		Gipuzkoa	N	44.550	2.030	19.492	2.541	1.665	3.164	73.441
			%	60,7	2,8	26,5	3,5	2,3	4,3	100,0
		Bizkaia	N	71.430	2.095	48.080	.	1.351	6.251	129.207
			%	55,3	1,6	37,2	.	1,0	4,8	100,0
	45-64	CAPV	N	89.647	21.984	68.290	2.693	3.950	7.283	193.848
			%	46,2	11,3	35,2	1,4	2,0	3,8	100,0
		Araba	N	12.059	2.546	8.775	276	176	813	24.645
			%	48,9	10,3	35,6	1,1	0,7	3,3	100,0
		Gipuzkoa	N	26.747	5.675	20.219	739	481	4.161	58.022
			%	46,1	9,8	34,8	1,3	0,8	7,2	100,0
		Bizkaia	N	50.841	13.763	39.296	1.678	3.293	2.309	111.180
			%	45,7	12,4	35,3	1,5	3,0	2,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 185. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

			Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total	
Mujeres	65-74	CAPV	N	8.755	18.043	18.483	754	753	2.586	49.374
			%	17,7	36,5	37,4	1,5	1,5	5,2	100,0
		Araba	N	1.171	2.327	1.268	166	.	.	4.933
			%	23,7	47,2	25,7	3,4	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	3.259	4.709	5.260	.	226	736	14.191
			%	23,0	33,2	37,1	.	1,6	5,2	100,0
	Bizkaia	N	4.325	11.006	11.955	588	526	1.850	30.251	
		%	14,3	36,4	39,5	1,9	1,7	6,1	100,0	
	>=75	CAPV	N	6.706	58.255	10.138	824	352	5.687	81.960
			%	8,2	71,1	12,4	1,0	0,4	6,9	100,0
		Araba	N	364	4.220	1.939	173	.	451	7.148
			%	5,1	59,0	27,1	2,4	.	6,3	100,0
Gipuzkoa		N	2.674	18.648	2.720	.	.	2.424	26.466	
		%	10,1	70,5	10,3	.	.	9,2	100,0	
Bizkaia	N	3.668	35.387	5.479	651	352	2.811	48.347		
	%	7,6	73,2	11,3	1,3	0,7	5,8	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	499.352	175.108	360.601	13.489	23.398	57.368	1.129.316
			%	44,2	15,5	31,9	1,2	2,1	5,1	100,0
	Araba	N	73.335	16.641	48.963	985	1.975	4.705	146.605	
		%	50,0	11,4	33,4	0,7	1,3	3,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 185. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Ambos	Total	Gipuzkoa	N	153.981	59.168	105.691	5.031	7.557	20.157	351.584
			%	43,8	16,8	30,1	1,4	2,1	5,7	100,0
		Bizkaia	N	272.036	99.299	205.947	7.473	13.866	32.506	631.127
			%	43,1	15,7	32,6	1,2	2,2	5,2	100,0
	15-24	CAPV	N	42.257	1.782	41.767	1.504	4.431	7.828	99.569
				%	42,4	1,8	41,9	1,5	4,5	7,9
		Araba	N	7.114	339	6.651	302	578	194	15.179
			%	46,9	2,2	43,8	2,0	3,8	1,3	100,0
		Gipuzkoa	N	13.284	494	10.843	333	1.264	3.053	29.271
			%	45,4	1,7	37,0	1,1	4,3	10,4	100,0
		Bizkaia	N	21.859	949	24.274	868	2.589	4.580	55.119
			%	39,7	1,7	44,0	1,6	4,7	8,3	100,0
	25-44	CAPV	N	257.991	16.405	140.935	4.664	11.488	22.489	453.972
				%	56,8	3,6	31,0	1,0	2,5	5,0
		Araba	N	37.476	2.962	21.513	.	1.035	2.455	65.440
			%	57,3	4,5	32,9	.	1,6	3,8	100,0
		Gipuzkoa	N	80.522	6.199	39.049	3.022	4.970	6.697	140.460
			%	57,3	4,4	27,8	2,2	3,5	4,8	100,0
		Bizkaia	N	139.993	7.244	80.372	1.642	5.483	13.337	248.072
			%	56,4	2,9	32,4	0,7	2,2	5,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 185. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Ambos	45-64	CAPV	N	175.691	45.721	126.027	4.531	5.474	14.482	371.927
			%	47,2	12,3	33,9	1,2	1,5	3,9	100,0
		Araba	N	25.571	4.085	15.557	276	362	1.465	47.315
			%	54,0	8,6	32,9	0,6	0,8	3,1	100,0
		Gipuzkoa	N	52.008	14.791	42.044	1.441	930	6.067	117.282
			%	44,3	12,6	35,8	1,2	0,8	5,2	100,0
		Bizkaia	N	98.112	26.845	68.426	2.813	4.183	6.949	207.329
			%	47,3	12,9	33,0	1,4	2,0	3,4	100,0
	65-74	CAPV	N	12.282	29.353	35.589	1.678	1.480	5.002	85.385
				%	14,4	34,4	41,7	2,0	1,7	5,9
		Araba	N	2.165	3.220	2.264	233	.	70	7.952
			%	27,2	40,5	28,5	2,9	.	0,9	100,0
		Gipuzkoa	N	4.267	10.021	9.347	234	393	1.483	25.746
			%	16,6	38,9	36,3	0,9	1,5	5,8	100,0
		Bizkaia	N	5.851	16.112	23.978	1.211	1.087	3.449	51.687
			%	11,3	31,2	46,4	2,3	2,1	6,7	100,0
	>=75	CAPV	N	11.132	81.846	16.283	1.112	524	7.567	118.464
				%	9,4	69,1	13,7	0,9	0,4	6,4
		Araba	N	1.010	6.035	2.979	173	.	521	10.718
			%	9,4	56,3	27,8	1,6	.	4,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 185. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

			Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total	
Ambos	>=75	Gipuzkoa	N	3.900	27.661	4.407	.	.	2.857	38.825
			%	10,0	71,2	11,4	.	.	7,4	100,0
	Bizkaia	N	6.221	48.149	8.897	939	524	4.190	68.920	
		%	9,0	69,9	12,9	1,4	0,8	6,1	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

		Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Hombres	Total	N 231.118	71.684	159.231	5.173	12.259	28.021	507.487
		% 45,5	14,1	31,4	1,0	2,4	5,5	100,0
	I	N 36.425	3.563	20.434	461	651	3.703	65.237
		% 55,8	5,5	31,3	0,7	1,0	5,7	100,0
	II	N 19.827	4.688	16.803	524	453	1.504	43.799
		% 45,3	10,7	38,4	1,2	1,0	3,4	100,0
	III	N 49.124	12.826	32.862	921	1.607	4.342	101.683
		% 48,3	12,6	32,3	0,9	1,6	4,3	100,0
	IV	N 110.707	45.084	72.629	2.617	6.098	13.552	250.687
		% 44,2	18,0	29,0	1,0	2,4	5,4	100,0
	V	N 15.035	5.522	16.504	650	3.449	4.920	46.081
		% 32,6	12,0	35,8	1,4	7,5	10,7	100,0
	15-24 Total	N 16.787	1.188	15.449	.	2.397	5.093	40.914
		% 41,0	2,9	37,8	.	5,9	12,4	100,0
	I	N 4.079	207	2.530	.	322	339	7.478
		% 54,6	2,8	33,8	.	4,3	4,5	100,0
	II	N 3.032	598	789	.	.	.	4.419
		% 68,6	13,5	17,9	.	.	.	100,0
	III	N 2.183	.	2.186	.	.	393	4.762
		% 45,8	.	45,9	.	.	8,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

		Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total		
Hombres	15-24	IV	N	6.240	250	7.938	.	1.486	3.396	19.310
			%	32,3	1,3	41,1	.	7,7	17,6	100,0
		V	N	1.253	132	2.006	.	590	964	4.945
			%	25,3	2,7	40,6	.	11,9	19,5	100,0
	25-44	Total	N	120.523	11.858	62.794	2.123	7.438	11.434	216.169
			%	55,8	5,5	29,0	1,0	3,4	5,3	100,0
		I	N	18.013	217	10.334	.	.	1.884	30.449
			%	59,2	0,7	33,9	.	.	6,2	100,0
		II	N	10.575	254	8.481	.	.	796	20.106
			%	52,6	1,3	42,2	.	.	4,0	100,0
		III	N	26.338	1.960	10.147	546	1.327	1.847	42.165
			%	62,5	4,6	24,1	1,3	3,1	4,4	100,0
		IV	N	58.744	8.085	25.043	1.095	3.825	4.830	101.623
			%	57,8	8,0	24,6	1,1	3,8	4,8	100,0
		V	N	6.853	1.341	8.788	481	2.286	2.077	21.825
			%	31,4	6,1	40,3	2,2	10,5	9,5	100,0
	45-64	Total	N	85.855	23.737	57.737	1.837	1.524	7.199	177.890
			%	48,3	13,3	32,5	1,0	0,9	4,0	100,0
		I	N	13.491	1.278	5.276	461	186	804	21.497
			%	62,8	5,9	24,5	2,1	0,9	3,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Hombres 45-64	II	N		5.696	1.613	5.611	524	316	119	13.879
			%	41,0	11,6	40,4	3,8	2,3	0,9	100,0
	III	N		18.054	3.777	14.489	168	.	1.598	38.087
			%	47,4	9,9	38,0	0,4	.	4,2	100,0
	IV	N		42.212	15.483	28.014	515	448	3.557	90.230
			%	46,8	17,2	31,0	0,6	0,5	3,9	100,0
	V	N		6.402	1.585	4.347	169	574	1.120	14.198
			%	45,1	11,2	30,6	1,2	4,0	7,9	100,0
65-74	Total	N		3.527	11.310	17.106	924	727	2.415	36.010
			%	9,8	31,4	47,5	2,6	2,0	6,7	100,0
	I	N		466	1.505	2.150	.	144	404	4.669
			%	10,0	32,2	46,1	.	3,1	8,6	100,0
	II	N		286	952	1.922	.	137	122	3.418
			%	8,4	27,8	56,2	.	4,0	3,6	100,0
	III	N		1.057	2.560	3.606	206	280	203	7.911
			%	13,4	32,4	45,6	2,6	3,5	2,6	100,0
	IV	N		1.437	5.755	8.261	718	167	928	17.266
			%	8,3	33,3	47,8	4,2	1,0	5,4	100,0
	V	N		281	538	1.166	.	.	760	2.746
			%	10,2	19,6	42,5	.	.	27,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

		Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total		
Hombres >=75	Total	N	4.425	23.591	6.146	288	172	1.881	36.504	
		%	12,1	64,6	16,8	0,8	0,5	5,2	100,0	
	I	N	375	356	143	.	.	271	1.145	
		%	32,7	31,1	12,5	.	.	23,7	100,0	
	II	N	238	1.271	.	.	.	468	1.977	
		%	12,0	64,3	.	.	.	23,7	100,0	
	III	N	1.492	4.529	2.435	.	.	301	8.757	
		%	17,0	51,7	27,8	.	.	3,4	100,0	
	IV	N	2.075	15.509	3.371	288	172	840	22.256	
		%	9,3	69,7	15,1	1,3	0,8	3,8	100,0	
V	N	245	1.925	197	.	.	.	2.367		
	%	10,4	81,3	8,3	.	.	.	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	267.006	103.323	201.008	8.316	11.139	29.346	620.138
			%	43,1	16,7	32,4	1,3	1,8	4,7	100,0
	I	N	38.067	4.023	22.864	1.534	414	1.719	68.620	
		%	55,5	5,9	33,3	2,2	0,6	2,5	100,0	
	II	N	28.957	7.963	16.682	1.369	1.485	3.310	59.766	
		%	48,5	13,3	27,9	2,3	2,5	5,5	100,0	
	III	N	74.548	22.348	56.592	907	2.177	8.533	165.105	
		%	45,2	13,5	34,3	0,5	1,3	5,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Mujeres	Total	IV	N	87.593	43.800	68.175	3.333	4.610	11.307	218.819
			%	40,0	20,0	31,2	1,5	2,1	5,2	100,0
		V	N	37.841	25.189	36.694	1.173	2.453	4.477	107.828
			%	35,1	23,4	34,0	1,1	2,3	4,2	100,0
	15-24	Total	N	24.700	595	26.111	1.504	2.034	2.735	57.678
			%	42,8	1,0	45,3	2,6	3,5	4,7	100,0
		I	N	4.670	.	3.217	605	.	.	8.492
			%	55,0	.	37,9	7,1	.	.	100,0
		II	N	3.587	.	3.168	166	438	529	7.888
			%	45,5	.	40,2	2,1	5,6	6,7	100,0
		III	N	6.027	595	6.540	167	659	1.491	15.479
			%	38,9	3,8	42,3	1,1	4,3	9,6	100,0
		IV	N	6.915	.	10.699	565	937	715	19.831
			%	34,9	.	54,0	2,9	4,7	3,6	100,0
		V	N	3.502	.	2.487	.	.	.	5.989
			%	58,5	.	41,5	.	.	.	100,0
	25-44	Total	N	137.198	4.548	78.141	2.541	4.050	11.056	237.534
			%	57,8	1,9	32,9	1,1	1,7	4,7	100,0
		I	N	20.480	616	11.190	321	.	626	33.233
			%	61,6	1,9	33,7	1,0	.	1,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Mujeres	25-44	II	N	14.472	413	6.071	1.203	581	1.905	24.645
			%	58,7	1,7	24,6	4,9	2,4	7,7	100,0
		III	N	37.869	1.304	22.730	.	448	2.834	65.186
			%	58,1	2,0	34,9	.	0,7	4,3	100,0
		IV	N	47.760	838	23.868	1.018	2.295	4.259	80.037
			%	59,7	1,0	29,8	1,3	2,9	5,3	100,0
		V	N	16.617	1.377	14.282	.	726	1.432	34.433
			%	48,3	4,0	41,5	.	2,1	4,2	100,0
	45-64	Total	N	89.647	21.984	68.290	2.693	3.950	7.283	193.848
			%	46,2	11,3	35,2	1,4	2,0	3,8	100,0
		I	N	11.852	.	6.997	298	414	837	20.397
			%	58,1	.	34,3	1,5	2,0	4,1	100,0
		II	N	9.880	1.779	5.842	.	.	552	18.053
			%	54,7	9,9	32,4	.	.	3,1	100,0
		III	N	27.010	6.384	19.387	187	679	2.412	56.059
			%	48,2	11,4	34,6	0,3	1,2	4,3	100,0
		IV	N	26.004	8.404	21.844	1.036	1.378	2.704	61.370
			%	42,4	13,7	35,6	1,7	2,2	4,4	100,0
		V	N	14.901	5.416	14.221	1.173	1.479	778	37.968
			%	39,2	14,3	37,5	3,1	3,9	2,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

		Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado		Porque me lo impiden mis problemas de salud		Porque no dispongo de un lugar adecuado		Por falta de recursos económicos		Por otras razones		Total	
Mujeres	65-74	Total	N	8.755	18.043	18.328	754	753	2.586			49.219	
			%	17,8	36,7	37,2	1,5	1,5	5,3			100,0	
		I	N	729	1.200	1.021	310	.	257			3.517	
			%	20,7	34,1	29,0	8,8	.	7,3			100,0	
		II	N	624	1.504	701	.	114	325			3.267	
			%	19,1	46,0	21,4	.	3,5	9,9			100,0	
		III	N	2.111	2.364	5.866	82	390	506			11.319	
			%	18,7	20,9	51,8	0,7	3,4	4,5			100,0	
		IV	N	3.717	8.831	6.612	362	.	1.261			20.783	
			%	17,9	42,5	31,8	1,7	.	6,1			100,0	
		V	N	1.574	4.144	4.128	.	248	238			10.333	
			%	15,2	40,1	40,0	.	2,4	2,3			100,0	
	>=75	Total	N	6.706	58.154	10.138	824	352	5.687			81.859	
				%	8,2	71,0	12,4	1,0	0,4	6,9			100,0
		I	N	336	2.207	439	.	.	.			2.982	
			%	11,3	74,0	14,7	.	.	.			100,0	
		II	N	394	4.267	901	.	352	.			5.913	
			%	6,7	72,2	15,2	.	5,9	.			100,0	
		III	N	1.531	11.702	2.070	470	.	1.289			17.062	
			%	9,0	68,6	12,1	2,8	.	7,6			100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Mujeres	>=75	IV	N	3.197	25.726	5.152	353	.	2.368	36.797
			%	8,7	69,9	14,0	1,0	.	6,4	100,0
	V	N	1.248	14.252	1.576	.	.	2.029	19.105	
		%	6,5	74,6	8,2	.	.	10,6	100,0	
Ambos	Total	Total	N	498.124	175.007	360.239	13.489	23.398	57.368	1.127.625
			%	44,2	15,5	31,9	1,2	2,1	5,1	100,0
	I	N	74.491	7.586	43.297	1.996	1.065	5.421	133.857	
		%	55,6	5,7	32,3	1,5	0,8	4,1	100,0	
	II	N	48.784	12.651	33.485	1.893	1.938	4.814	103.565	
		%	47,1	12,2	32,3	1,8	1,9	4,6	100,0	
	III	N	123.673	35.175	89.454	1.827	3.784	12.875	266.788	
		%	46,4	13,2	33,5	0,7	1,4	4,8	100,0	
	IV	N	198.300	88.884	140.804	5.950	10.708	24.859	469.506	
		%	42,2	18,9	30,0	1,3	2,3	5,3	100,0	
	V	N	52.876	30.711	53.198	1.823	5.902	9.398	153.908	
		%	34,4	20,0	34,6	1,2	3,8	6,1	100,0	
	15-24	Total	N	41.487	1.782	41.560	1.504	4.431	7.828	98.592
			%	42,1	1,8	42,2	1,5	4,5	7,9	100,0
I		N	8.749	207	5.747	605	322	339	15.970	
		%	54,8	1,3	36,0	3,8	2,0	2,1	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Ambos	15-24	II	N	6.619	598	3.957	166	438	529	12.307
			%	53,8	4,9	32,2	1,4	3,6	4,3	100,0
		III	N	8.210	595	8.726	167	659	1.884	20.241
			%	40,6	2,9	43,1	0,8	3,3	9,3	100,0
		IV	N	13.155	250	18.637	565	2.423	4.112	39.142
			%	33,6	0,6	47,6	1,4	6,2	10,5	100,0
		V	N	4.755	132	4.493	.	590	964	10.933
			%	43,5	1,2	41,1	.	5,4	8,8	100,0
	25-44	Total	N	257.721	16.405	140.935	4.664	11.488	22.489	453.703
			%	56,8	3,6	31,1	1,0	2,5	5,0	100,0
		I	N	38.493	834	21.524	321	.	2.510	63.682
			%	60,4	1,3	33,8	0,5	.	3,9	100,0
		II	N	25.047	667	14.553	1.203	581	2.701	44.751
			%	56,0	1,5	32,5	2,7	1,3	6,0	100,0
		III	N	64.208	3.264	32.877	546	1.775	4.681	107.351
			%	59,8	3,0	30,6	0,5	1,7	4,4	100,0
		IV	N	106.503	8.924	48.911	2.113	6.120	9.089	181.661
			%	58,6	4,9	26,9	1,2	3,4	5,0	100,0
		V	N	23.470	2.717	23.070	481	3.011	3.508	56.258
			%	41,7	4,8	41,0	0,9	5,4	6,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Ambos	45-64	Total	N	175.502	45.721	126.027	4.531	5.474	14.482	371.738
			%	47,2	12,3	33,9	1,2	1,5	3,9	100,0
		I	N	25.343	1.278	12.273	759	600	1.641	41.893
			%	60,5	3,1	29,3	1,8	1,4	3,9	100,0
		II	N	15.577	3.392	11.453	524	316	671	31.932
			%	48,8	10,6	35,9	1,6	1,0	2,1	100,0
		III	N	45.064	10.161	33.876	355	679	4.010	94.146
			%	47,9	10,8	36,0	0,4	0,7	4,3	100,0
		IV	N	68.217	23.888	49.858	1.550	1.826	6.261	151.600
			%	45,0	15,8	32,9	1,0	1,2	4,1	100,0
		V	N	21.303	7.002	18.568	1.342	2.053	1.899	52.166
			%	40,8	13,4	35,6	2,6	3,9	3,6	100,0
	65-74	Total	N	12.282	29.353	35.434	1.678	1.480	5.002	85.229
			%	14,4	34,4	41,6	2,0	1,7	5,9	100,0
		I	N	1.195	2.705	3.171	310	144	660	8.186
			%	14,6	33,0	38,7	3,8	1,8	8,1	100,0
		II	N	910	2.456	2.622	.	251	446	6.685
			%	13,6	36,7	39,2	.	3,8	6,7	100,0
		III	N	3.168	4.923	9.472	288	670	709	19.230
			%	16,5	25,6	49,3	1,5	3,5	3,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Ambos	65-74	IV	N	5.153	14.587	14.874	1.080	167	2.189	38.049
			%	13,5	38,3	39,1	2,8	0,4	5,8	100,0
	V	N	1.855	4.683	5.295	.	248	998	13.079	
		%	14,2	35,8	40,5	.	1,9	7,6	100,0	
	>=75	Total	N	11.132	81.745	16.283	1.112	524	7.567	118.363
			%	9,4	69,1	13,8	0,9	0,4	6,4	100,0
	I	N	711	2.563	582	.	.	271	4.127	
		%	17,2	62,1	14,1	.	.	6,6	100,0	
	II	N	632	5.538	901	.	352	468	7.890	
		%	8,0	70,2	11,4	.	4,5	5,9	100,0	
	III	N	3.023	16.231	4.504	470	.	1.591	25.819	
		%	11,7	62,9	17,4	1,8	.	6,2	100,0	
	IV	N	5.272	41.236	8.523	642	172	3.208	59.054	
		%	8,9	69,8	14,4	1,1	0,3	5,4	100,0	
	V	N	1.493	16.177	1.773	.	.	2.029	21.472	
		%	7,0	75,3	8,3	.	.	9,4	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

			Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Hombres Total	Total	N	231.567	71.684	159.231	5.173	12.259	28.021	507.935
		%	45,6	14,1	31,3	1,0	2,4	5,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	31.802	31.798	36.195	708	2.625	6.007	109.135
		%	29,1	29,1	33,2	0,6	2,4	5,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	39.198	14.090	25.518	1.051	3.969	4.703	88.528
		%	44,3	15,9	28,8	1,2	4,5	5,3	100,0
	Secundaria, superior	N	105.003	19.335	64.076	2.176	3.982	10.911	205.483
		%	51,1	9,4	31,2	1,1	1,9	5,3	100,0
	Terciaria	N	55.564	6.461	33.443	1.239	1.683	6.401	104.790
		%	53,0	6,2	31,9	1,2	1,6	6,1	100,0
15-24 Total	Total	N	17.048	1.188	15.449	.	2.397	5.093	41.174
		%	41,4	2,9	37,5	.	5,8	12,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	409	.	2.017	.	250	1.110	3.787
		%	10,8	.	53,3	.	6,6	29,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	4.889	339	4.511	.	1.722	1.502	12.964
		%	37,7	2,6	34,8	.	13,3	11,6	100,0
	Secundaria, superior	N	9.007	250	7.275	.	.	2.048	18.580
		%	48,5	1,3	39,2	.	.	11,0	100,0
	Terciaria	N	2.742	598	1.647	.	424	432	5.844
		%	46,9	10,2	28,2	.	7,3	7,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

		Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Hombres 25-44 Total	N	120.523	11.858	62.794	2.123	7.438	11.434	216.169
	%	55,8	5,5	29,0	1,0	3,4	5,3	100,0
Sin estudios, primaria	N	10.806	1.926	8.491	.	1.954	1.222	24.399
	%	44,3	7,9	34,8	.	8,0	5,0	100,0
Secundaria, inferior	N	19.698	2.549	6.691	.	2.079	1.921	32.938
	%	59,8	7,7	20,3	.	6,3	5,8	100,0
Secundaria, superior	N	57.986	5.765	29.170	1.577	2.927	4.764	102.190
	%	56,7	5,6	28,5	1,5	2,9	4,7	100,0
Terciaria	N	32.033	1.617	18.442	546	477	3.526	56.641
	%	56,6	2,9	32,6	1,0	0,8	6,2	100,0
45-64 Total	N	86.044	23.737	57.737	1.837	1.524	7.199	178.079
	%	48,3	13,3	32,4	1,0	0,9	4,0	100,0
Sin estudios, primaria	N	16.113	8.155	14.772	.	248	1.529	40.817
	%	39,5	20,0	36,2	.	0,6	3,7	100,0
Secundaria, inferior	N	13.590	5.081	11.005	955	.	1.042	31.674
	%	42,9	16,0	34,7	3,0	.	3,3	100,0
Secundaria, superior	N	36.742	8.824	22.019	190	774	3.314	71.864
	%	51,1	12,3	30,6	0,3	1,1	4,6	100,0
Terciaria	N	19.598	1.677	9.941	692	502	1.314	33.724
	%	58,1	5,0	29,5	2,1	1,5	3,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

		Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Hombres 65-74	Total	N 3.527	11.310	17.106	924	727	2.415	36.010
		% 9,8	31,4	47,5	2,6	2,0	6,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N 1.439	4.991	6.750	420	.	1.132	14.731
		% 9,8	33,9	45,8	2,8	.	7,7	100,0
	Secundaria, inferior	N 833	2.110	2.618	95	167	237	6.060
		% 13,7	34,8	43,2	1,6	2,8	3,9	100,0
	Secundaria, superior	N 588	2.705	4.468	409	281	480	8.931
		% 6,6	30,3	50,0	4,6	3,1	5,4	100,0
	Terciaria	N 667	1.504	3.270	.	280	567	6.287
		% 10,6	23,9	52,0	.	4,5	9,0	100,0
>=75	Total	N 4.425	23.591	6.146	288	172	1.881	36.504
		% 12,1	64,6	16,8	0,8	0,5	5,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N 3.035	16.726	4.165	288	172	1.015	25.401
		% 11,9	65,8	16,4	1,1	0,7	4,0	100,0
	Secundaria, inferior	N 187	4.011	694	.	.	.	4.892
		% 3,8	82,0	14,2	.	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N 680	1.790	1.143	.	.	304	3.918
		% 17,4	45,7	29,2	.	.	7,8	100,0
	Terciaria	N 524	1.064	143	.	.	562	2.293
		% 22,8	46,4	6,2	.	.	24,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

			Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total
Mujeres	Total	Total	N 267.785	103.424	201.370	8.316	11.139	29.346	621.380
			% 43,1	16,6	32,4	1,3	1,8	4,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N 38.884	62.855	38.302	2.962	2.330	7.566	152.899
			% 25,4	41,1	25,1	1,9	1,5	4,9	100,0
		Secundaria, inferior	N 37.212	17.938	36.254	347	2.452	4.574	98.778
			% 37,7	18,2	36,7	0,4	2,5	4,6	100,0
		Secundaria, superior	N 106.471	15.240	74.226	2.795	4.682	11.858	215.273
			% 49,5	7,1	34,5	1,3	2,2	5,5	100,0
		Terciaria	N 85.218	7.391	52.587	2.211	1.675	5.348	154.430
			% 55,2	4,8	34,1	1,4	1,1	3,5	100,0
	15-24	Total	N 25.209	595	26.318	1.504	2.034	2.735	58.395
			% 43,2	1,0	45,1	2,6	3,5	4,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N 4.399	.	1.275	565	.	630	6.869
			% 64,0	.	18,6	8,2	.	9,2	100,0
		Secundaria, inferior	N 3.578	350	4.486	167	692	.	9.274
			% 38,6	3,8	48,4	1,8	7,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N 12.753	244	14.871	423	1.147	1.770	31.207
			% 40,9	0,8	47,7	1,4	3,7	5,7	100,0
		Terciaria	N 4.480	.	5.686	348	196	335	11.045
			% 40,6	.	51,5	3,2	1,8	3,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

		Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total	
Mujeres	25-44 Total	N	137.467	4.548	78.141	2.541	4.050	11.056	237.803
		%	57,8	1,9	32,9	1,1	1,7	4,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	8.724	605	5.812	.	507	515	16.163
		%	54,0	3,7	36,0	.	3,1	3,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	13.305	744	13.194	.	263	1.953	29.460
		%	45,2	2,5	44,8	.	0,9	6,6	100,0
	Secundaria, superior	N	61.920	1.523	27.735	963	2.057	5.143	99.340
		%	62,3	1,5	27,9	1,0	2,1	5,2	100,0
	Terciaria	N	53.519	1.676	31.399	1.578	1.224	3.445	92.842
		%	57,6	1,8	33,8	1,7	1,3	3,7	100,0
	45-64 Total	N	89.647	21.984	68.290	2.693	3.950	7.283	193.848
		%	46,2	11,3	35,2	1,4	2,0	3,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	15.655	8.487	15.296	1.173	1.687	799	43.098
		%	36,3	19,7	35,5	2,7	3,9	1,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	16.681	3.859	11.936	.	785	1.334	34.595
		%	48,2	11,2	34,5	.	2,3	3,9	100,0
	Secundaria, superior	N	30.886	8.114	27.142	1.235	1.478	4.029	72.885
		%	42,4	11,1	37,2	1,7	2,0	5,5	100,0
Terciaria	N	26.425	1.524	13.917	284	.	1.120	43.270	
	%	61,1	3,5	32,2	0,7	.	2,6	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

			Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total	
Mujeres	65-74	Total	N	8.755	18.043	18.483	754	753	2.586	49.374
			%	17,7	36,5	37,4	1,5	1,5	5,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.431	11.196	8.857	754	136	1.025	27.400
			%	19,8	40,9	32,3	2,8	0,5	3,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.831	3.182	5.316	.	360	789	11.478
			%	16,0	27,7	46,3	.	3,1	6,9	100,0
		Secundaria, superior	N	698	1.971	3.158	.	.	666	6.493
			%	10,7	30,4	48,6	.	.	10,3	100,0
		Terciaria	N	795	1.693	1.153	.	256	106	4.003
			%	19,9	42,3	28,8	.	6,4	2,7	100,0
	>=75	Total	N	6.706	58.255	10.138	824	352	5.687	81.960
			%	8,2	71,1	12,4	1,0	0,4	6,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.675	42.567	7.062	469	.	4.596	59.369
			%	7,9	71,7	11,9	0,8	.	7,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.817	9.802	1.322	180	352	498	13.972
			%	13,0	70,2	9,5	1,3	2,5	3,6	100,0
		Secundaria, superior	N	215	3.388	1.321	174	.	251	5.348
			%	4,0	63,3	24,7	3,3	.	4,7	100,0
		Terciaria	N	.	2.497	433	.	.	341	3.271
			%	.	76,3	13,2	.	.	10,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

			Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total	
Ambos	Total	Total	N	499.352	175.108	360.601	13.489	23.398	57.368	1.129.316
			%	44,2	15,5	31,9	1,2	2,1	5,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	70.686	94.653	74.496	3.670	4.954	13.573	262.033
			%	27,0	36,1	28,4	1,4	1,9	5,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	76.410	32.028	61.773	1.398	6.421	9.277	187.307
			%	40,8	17,1	33,0	0,7	3,4	5,0	100,0
		Secundaria, superior	N	211.474	34.575	138.302	4.971	8.664	22.769	420.756
			%	50,3	8,2	32,9	1,2	2,1	5,4	100,0
		Terciaria	N	140.782	13.851	86.030	3.450	3.358	11.748	259.220
			%	54,3	5,3	33,2	1,3	1,3	4,5	100,0
	15-24	Total	N	42.257	1.782	41.767	1.504	4.431	7.828	99.569
			%	42,4	1,8	41,9	1,5	4,5	7,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.808	.	3.292	565	250	1.740	10.655
			%	45,1	.	30,9	5,3	2,3	16,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.467	690	8.998	167	2.414	1.502	22.238
			%	38,1	3,1	40,5	0,8	10,9	6,8	100,0
		Secundaria, superior	N	21.760	494	22.145	423	1.147	3.817	49.787
			%	43,7	1,0	44,5	0,8	2,3	7,7	100,0
		Terciaria	N	7.222	598	7.332	348	620	768	16.889
			%	42,8	3,5	43,4	2,1	3,7	4,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

			Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total	
Ambos	25-44	Total	N	257.991	16.405	140.935	4.664	11.488	22.489	453.972
			%	56,8	3,6	31,0	1,0	2,5	5,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	19.530	2.531	14.303	.	2.461	1.737	40.562
			%	48,1	6,2	35,3	.	6,1	4,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	33.003	3.293	19.885	.	2.342	3.874	62.398
			%	52,9	5,3	31,9	.	3,8	6,2	100,0
		Secundaria, superior	N	119.906	7.288	56.905	2.539	4.984	9.907	201.530
			%	59,5	3,6	28,2	1,3	2,5	4,9	100,0
		Terciaria	N	85.551	3.293	49.841	2.125	1.700	6.972	149.483
			%	57,2	2,2	33,3	1,4	1,1	4,7	100,0
	45-64	Total	N	175.691	45.721	126.027	4.531	5.474	14.482	371.927
			%	47,2	12,3	33,9	1,2	1,5	3,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	31.769	16.641	30.068	1.173	1.935	2.328	83.915
			%	37,9	19,8	35,8	1,4	2,3	2,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	30.271	8.940	22.940	955	785	2.377	66.269
			%	45,7	13,5	34,6	1,4	1,2	3,6	100,0
		Secundaria, superior	N	67.628	16.939	49.161	1.425	2.252	7.343	144.749
			%	46,7	11,7	34,0	1,0	1,6	5,1	100,0
		Terciaria	N	46.023	3.201	23.858	977	502	2.434	76.994
			%	59,8	4,2	31,0	1,3	0,7	3,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

			Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Por otras razones	Total	
Ambos	65-74	Total	N	12.282	29.353	35.589	1.678	1.480	5.002	85.385
			%	14,4	34,4	41,7	2,0	1,7	5,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.870	16.187	15.607	1.174	136	2.157	42.131
			%	16,3	38,4	37,0	2,8	0,3	5,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.665	5.292	7.934	95	527	1.026	17.539
			%	15,2	30,2	45,2	0,5	3,0	5,8	100,0
		Secundaria, superior	N	1.286	4.676	7.626	409	281	1.146	15.425
			%	8,3	30,3	49,4	2,7	1,8	7,4	100,0
		Terciaria	N	1.462	3.197	4.422	.	536	673	10.290
			%	14,2	31,1	43,0	.	5,2	6,5	100,0
	>=75	Total	N	11.132	81.846	16.283	1.112	524	7.567	118.464
			%	9,4	69,1	13,7	0,9	0,4	6,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.709	59.293	11.227	757	172	5.611	84.770
			%	9,1	69,9	13,2	0,9	0,2	6,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.004	13.813	2.016	180	352	498	18.863
			%	10,6	73,2	10,7	1,0	1,9	2,6	100,0
		Secundaria, superior	N	895	5.178	2.464	174	.	555	9.266
			%	9,7	55,9	26,6	1,9	.	6,0	100,0
		Terciaria	N	524	3.562	576	.	.	902	5.564
			%	9,4	64,0	10,4	.	.	16,2	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 188. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y territorio histórico

				Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total
Hombres	Total	CAPV	N	74.801	146.983	98.162	323.634	271.544	915.124
			%	8,2	16,1	10,7	35,4	29,7	100,0
		Araba	N	6.618	20.248	14.152	48.431	44.301	133.751
			%	4,9	15,1	10,6	36,2	33,1	100,0
		Gipuzkoa	N	25.439	44.449	28.274	103.098	92.552	293.812
			%	8,7	15,1	9,6	35,1	31,5	100,0
		Bizkaia	N	42.745	82.286	55.735	172.105	134.690	487.561
			%	8,8	16,9	11,4	35,3	27,6	100,0
	15-24	CAPV	N	2.146	11.860	9.714	44.320	26.418	94.458
			%	2,3	12,6	10,3	46,9	28,0	100,0
		Araba	N	353	2.069	1.270	6.331	4.846	14.869
			%	2,4	13,9	8,5	42,6	32,6	100,0
		Gipuzkoa	N	605	3.535	3.665	13.470	10.030	31.305
			%	1,9	11,3	11,7	43,0	32,0	100,0
		Bizkaia	N	1.188	6.256	4.778	24.520	11.543	48.284
			%	2,5	13,0	9,9	50,8	23,9	100,0
	25-44	CAPV	N	23.762	64.962	44.751	137.650	65.185	336.309
			%	7,1	19,3	13,3	40,9	19,4	100,0
		Araba	N	3.057	8.155	7.785	21.381	11.684	52.062
			%	5,9	15,7	15,0	41,1	22,4	100,0
		Gipuzkoa	N	8.898	20.870	11.288	46.545	19.189	106.790
			%	8,3	19,5	10,6	43,6	18,0	100,0
		Bizkaia	N	11.807	35.936	25.679	69.724	34.312	177.458
			%	6,7	20,3	14,5	39,3	19,3	100,0
	45-64	CAPV	N	25.948	53.043	36.458	102.507	84.700	302.655
			%	8,6	17,5	12,0	33,9	28,0	100,0
		Araba	N	1.409	8.399	4.295	14.997	13.652	42.751
			%	3,3	19,6	10,0	35,1	31,9	100,0
		Gipuzkoa	N	8.442	16.132	11.224	31.962	29.659	97.419
			%	8,7	16,6	11,5	32,8	30,4	100,0
		Bizkaia	N	16.097	28.513	20.939	55.547	41.388	162.485
			%	9,9	17,5	12,9	34,2	25,5	100,0
	65-74	CAPV	N	6.324	8.353	5.038	22.743	53.277	95.733
			%	6,6	8,7	5,3	23,8	55,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 188. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y territorio histórico

			Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total		
Hombres 65-74	Araba	N	677	861	588	3.513	7.524	13.163		
		%	5,1	6,5	4,5	26,7	57,2	100,0		
	Gipuzkoa	N	2.561	1.586	1.726	6.284	19.973	32.130		
		%	8,0	4,9	5,4	19,6	62,2	100,0		
	Bizkaia	N	3.086	5.905	2.723	12.946	25.780	50.440		
		%	6,1	11,7	5,4	25,7	51,1	100,0		
	>=75	CAPV	N	16.622	8.766	2.201	16.415	41.964	85.968	
			%	19,3	10,2	2,6	19,1	48,8	100,0	
		Araba	N	1.122	764	215	2.208	6.596	10.905	
			%	10,3	7,0	2,0	20,2	60,5	100,0	
		Gipuzkoa	N	4.933	2.326	370	4.838	13.701	26.168	
			%	18,9	8,9	1,4	18,5	52,4	100,0	
Bizkaia		N	10.567	5.676	1.616	9.369	21.667	48.895		
		%	21,6	11,6	3,3	19,2	44,3	100,0		
Mujeres		Total	CAPV	N	121.590	190.079	94.094	304.630	265.490	975.882
			%	12,5	19,5	9,6	31,2	27,2	100,0	
		Araba	N	10.209	24.813	12.518	45.207	44.024	136.772	
			%	7,5	18,1	9,2	33,1	32,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	36.197	51.317	29.735	102.262	93.175	312.686		
		%	11,6	16,4	9,5	32,7	29,8	100,0		
	Bizkaia	N	75.185	113.949	51.840	157.160	128.291	526.425		
		%	14,3	21,6	9,8	29,9	24,4	100,0		
	15-24	CAPV	N	5.735	21.884	11.887	34.575	15.418	89.499	
			%	6,4	24,5	13,3	38,6	17,2	100,0	
		Araba	N	163	2.149	2.815	5.285	2.797	13.210	
			%	1,2	16,3	21,3	40,0	21,2	100,0	
Gipuzkoa		N	2.032	6.072	3.609	11.919	5.811	29.443		
		%	6,9	20,6	12,3	40,5	19,7	100,0		
Bizkaia		N	3.539	13.663	5.463	17.371	6.810	46.846		
		%	7,6	29,2	11,7	37,1	14,5	100,0		
25-44		CAPV	N	28.821	77.824	39.710	108.276	66.194	320.826	
			%	9,0	24,3	12,4	33,7	20,6	100,0	
		Araba	N	3.238	12.153	4.942	17.712	9.824	47.869	
			%	6,8	25,4	10,3	37,0	20,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 188. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y territorio histórico

				Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total	
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	11.436	18.943	12.695	36.076	22.756	101.905	
			%	11,2	18,6	12,5	35,4	22,3	100,0	
		Bizkaia	N	14.148	46.729	22.074	54.488	33.614	171.052	
			%	8,3	27,3	12,9	31,9	19,7	100,0	
		45-64	CAPV	N	31.710	56.974	28.928	105.472	90.684	313.769
				%	10,1	18,2	9,2	33,6	28,9	100,0
	Araba		N	1.985	6.998	2.873	14.552	17.855	44.263	
			%	4,5	15,8	6,5	32,9	40,3	100,0	
	Gipuzkoa		N	7.986	16.868	10.225	36.131	28.452	99.662	
			%	8,0	16,9	10,3	36,3	28,5	100,0	
	Bizkaia	N	21.739	33.108	15.831	54.789	44.377	169.843		
		%	12,8	19,5	9,3	32,3	26,1	100,0		
	65-74	CAPV	N	13.394	12.715	6.250	29.632	47.934	109.925	
			%	12,2	11,6	5,7	27,0	43,6	100,0	
		Araba	N	1.461	1.027	1.047	3.939	6.845	14.320	
			%	10,2	7,2	7,3	27,5	47,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	2.413	3.710	1.555	8.583	19.859	36.120	
			%	6,7	10,3	4,3	23,8	55,0	100,0	
	Bizkaia	N	9.519	7.978	3.648	17.109	21.230	59.484		
		%	16,0	13,4	6,1	28,8	35,7	100,0		
	>=75	CAPV	N	41.930	20.682	7.318	26.675	45.260	141.864	
			%	29,6	14,6	5,2	18,8	31,9	100,0	
		Araba	N	3.361	2.487	841	3.719	6.702	17.110	
			%	19,6	14,5	4,9	21,7	39,2	100,0	
Gipuzkoa		N	12.330	5.724	1.651	9.553	16.297	45.555		
		%	27,1	12,6	3,6	21,0	35,8	100,0		
Bizkaia	N	26.240	12.471	4.825	13.403	22.261	79.200			
	%	33,1	15,7	6,1	16,9	28,1	100,0			
Ambos	Total	CAPV	N	196.392	337.062	192.256	628.264	537.033	1.891.006	
		%	10,4	17,8	10,2	33,2	28,4	100,0		
	Araba	N	16.827	45.061	26.671	93.638	88.325	270.523		
		%	6,2	16,7	9,9	34,6	32,6	100,0		
	Gipuzkoa	N	61.635	95.766	58.009	205.360	185.727	606.497		
		%	10,2	15,8	9,6	33,9	30,6	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 188. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y territorio histórico

			Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total
Ambos	Total	Bizkaia	N 117.929	196.234	107.576	329.265	262.982	1.013.987
			% 11,6	19,4	10,6	32,5	25,9	100,0
	15-24	CAPV	N 7.880	33.744	21.601	78.895	41.837	183.958
			% 4,3	18,3	11,7	42,9	22,7	100,0
		Araba	N 517	4.218	4.085	11.616	7.643	28.079
			% 1,8	15,0	14,5	41,4	27,2	100,0
		Gipuzkoa	N 2.637	9.607	7.274	25.389	15.841	60.748
			% 4,3	15,8	12,0	41,8	26,1	100,0
		Bizkaia	N 4.727	19.918	10.241	41.891	18.353	95.130
			% 5,0	20,9	10,8	44,0	19,3	100,0
	25-44	CAPV	N 52.583	142.786	84.461	245.926	131.379	657.135
			% 8,0	21,7	12,9	37,4	20,0	100,0
		Araba	N 6.295	20.308	12.727	39.093	21.508	99.930
			% 6,3	20,3	12,7	39,1	21,5	100,0
		Gipuzkoa	N 20.334	39.813	23.982	82.620	41.945	208.695
			% 9,7	19,1	11,5	39,6	20,1	100,0
		Bizkaia	N 25.954	82.665	47.752	124.212	67.926	348.509
			% 7,4	23,7	13,7	35,6	19,5	100,0
	45-64	CAPV	N 57.658	110.017	65.386	207.979	175.383	616.424
			% 9,4	17,8	10,6	33,7	28,5	100,0
		Araba	N 3.394	15.396	7.168	29.549	31.507	87.015
			% 3,9	17,7	8,2	34,0	36,2	100,0
		Gipuzkoa	N 16.428	33.000	21.449	68.093	58.111	197.081
			% 8,3	16,7	10,9	34,6	29,5	100,0
		Bizkaia	N 37.836	61.621	36.770	110.336	85.765	332.328
			% 11,4	18,5	11,1	33,2	25,8	100,0
	65-74	CAPV	N 19.717	21.068	11.288	52.375	101.210	205.658
			% 9,6	10,2	5,5	25,5	49,2	100,0
		Araba	N 2.138	1.889	1.635	7.453	14.369	27.483
			% 7,8	6,9	5,9	27,1	52,3	100,0
		Gipuzkoa	N 4.974	5.296	3.282	14.867	39.832	68.251
			% 7,3	7,8	4,8	21,8	58,4	100,0
		Bizkaia	N 12.605	13.883	6.371	30.055	47.010	109.924
			% 11,5	12,6	5,8	27,3	42,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 188. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y territorio histórico

				Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total
Ambos	>=75	CAPV	N	58.553	29.448	9.519	43.089	87.224	227.832
			%	25,7	12,9	4,2	18,9	38,3	100,0
		Araba	N	4.484	3.250	1.056	5.927	13.298	28.015
			%	16,0	11,6	3,8	21,2	47,5	100,0
		Gipuzkoa	N	17.263	8.050	2.022	14.391	29.998	71.723
			%	24,1	11,2	2,8	20,1	41,8	100,0
		Bizkaia	N	36.807	18.148	6.441	22.771	43.928	128.094
			%	28,7	14,2	5,0	17,8	34,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 189. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y clase social

		Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total
Hombres	Total	N 74.387	146.723	98.162	323.148	271.445	913.863
		% 8,1	16,1	10,7	35,4	29,7	100,0
	I	N 5.186	12.562	12.852	46.601	36.489	113.690
		% 4,6	11,0	11,3	41,0	32,1	100,0
	II	N 4.579	13.495	7.468	32.447	20.218	78.206
		% 5,9	17,3	9,5	41,5	25,9	100,0
	III	N 14.977	26.589	17.985	70.490	58.313	188.355
		% 8,0	14,1	9,5	37,4	31,0	100,0
	IV	N 40.377	80.056	50.545	145.863	133.465	450.306
		% 9,0	17,8	11,2	32,4	29,6	100,0
	V	N 9.268	14.022	9.311	27.747	22.960	83.307
		% 11,1	16,8	11,2	33,3	27,6	100,0
	15-24 Total	N 2.146	11.600	9.714	44.022	26.418	93.900
		% 2,3	12,4	10,3	46,9	28,1	100,0
	I	N 212	853	1.267	7.666	4.635	14.634
		% 1,5	5,8	8,7	52,4	31,7	100,0
	II	N 507	1.574	364	5.442	3.101	10.988
		% 4,6	14,3	3,3	49,5	28,2	100,0
	III	N 532	1.223	565	9.836	4.675	16.830
		% 3,2	7,3	3,4	58,4	27,8	100,0
	IV	N 894	6.343	5.793	18.522	11.185	42.737
		% 2,1	14,8	13,6	43,3	26,2	100,0
	V	N .	1.607	1.725	2.556	2.823	8.711
		% .	18,5	19,8	29,3	32,4	100,0
	25-44 Total	N 23.762	64.962	44.751	137.650	65.185	336.309
		% 7,1	19,3	13,3	40,9	19,4	100,0
	I	N 1.360	7.190	6.565	19.510	9.107	43.732
		% 3,1	16,4	15,0	44,6	20,8	100,0
	II	N 693	7.262	4.618	14.185	5.738	32.496
		% 2,1	22,3	14,2	43,7	17,7	100,0
	III	N 4.971	11.215	7.607	24.252	14.212	62.257
		% 8,0	18,0	12,2	39,0	22,8	100,0
	IV	N 12.151	32.874	22.029	64.238	29.099	160.392
		% 7,6	20,5	13,7	40,1	18,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 189. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y clase social

			Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total
Hombres 25-44 V	N		4.586	6.421	3.932	15.464	7.028	37.432
	%		12,3	17,2	10,5	41,3	18,8	100,0
45-64 Total	N		25.948	53.043	36.458	102.318	84.601	302.368
	%		8,6	17,5	12,1	33,8	28,0	100,0
I	N		2.896	3.337	4.287	16.465	10.921	37.907
	%		7,6	8,8	11,3	43,4	28,8	100,0
II	N		1.802	2.743	1.987	10.943	5.944	23.419
	%		7,7	11,7	8,5	46,7	25,4	100,0
III	N		5.271	11.685	8.204	25.843	15.319	66.322
	%		7,9	17,6	12,4	39,0	23,1	100,0
IV	N		12.994	31.352	19.093	42.599	44.577	150.614
	%		8,6	20,8	12,7	28,3	29,6	100,0
V	N		2.985	3.927	2.887	6.469	7.838	24.106
	%		12,4	16,3	12,0	26,8	32,5	100,0
65-74 Total	N		6.324	8.353	5.038	22.743	53.277	95.733
	%		6,6	8,7	5,3	23,8	55,7	100,0
I	N		499	1.182	475	2.445	9.152	13.753
	%		3,6	8,6	3,5	17,8	66,5	100,0
II	N		649	701	378	1.490	3.644	6.862
	%		9,5	10,2	5,5	21,7	53,1	100,0
III	N		1.141	691	961	6.082	12.901	21.777
	%		5,2	3,2	4,4	27,9	59,2	100,0
IV	N		3.513	4.642	2.948	11.178	25.472	47.753
	%		7,4	9,7	6,2	23,4	53,3	100,0
V	N		522	1.136	275	1.548	2.108	5.588
	%		9,3	20,3	4,9	27,7	37,7	100,0
>=75 Total	N		16.208	8.766	2.201	16.415	41.964	85.553
	%		18,9	10,2	2,6	19,2	49,0	100,0
I	N		219	.	258	514	2.673	3.663
	%		6,0	.	7,0	14,0	73,0	100,0
II	N		928	1.214	120	387	1.791	4.440
	%		20,9	27,3	2,7	8,7	40,3	100,0
III	N		3.062	1.776	648	4.477	11.205	21.169
	%		14,5	8,4	3,1	21,2	52,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 189. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y clase social

			Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total
Hombres >=75	IV	N	10.824	4.845	683	9.326	23.132	48.810
		%	22,2	9,9	1,4	19,1	47,4	100,0
	V	N	1.175	931	492	1.710	3.163	7.470
		%	15,7	12,5	6,6	22,9	42,3	100,0
Mujeres Total	Total	N	121.341	189.708	94.094	303.998	264.351	973.492
		%	12,5	19,5	9,7	31,2	27,2	100,0
	I	N	6.680	16.483	11.404	41.615	28.657	104.838
		%	6,4	15,7	10,9	39,7	27,3	100,0
	II	N	7.699	19.489	8.514	36.727	22.599	95.028
		%	8,1	20,5	9,0	38,6	23,8	100,0
	III	N	29.997	47.291	28.531	80.958	55.330	242.107
		%	12,4	19,5	11,8	33,4	22,9	100,0
	IV	N	49.034	73.300	32.636	103.224	102.247	360.441
		%	13,6	20,3	9,1	28,6	28,4	100,0
	V	N	27.931	33.146	13.008	41.475	55.518	171.077
		%	16,3	19,4	7,6	24,2	32,5	100,0
15-24	Total	N	5.485	21.884	11.887	34.114	15.163	88.533
		%	6,2	24,7	13,4	38,5	17,1	100,0
	I	N	967	2.703	1.028	7.329	2.535	14.562
		%	6,6	18,6	7,1	50,3	17,4	100,0
	II	N	261	3.021	1.900	5.783	2.531	13.497
		%	1,9	22,4	14,1	42,8	18,8	100,0
	III	N	2.021	5.581	2.571	6.684	3.212	20.069
		%	10,1	27,8	12,8	33,3	16,0	100,0
	IV	N	1.799	8.345	4.945	10.558	5.966	31.614
		%	5,7	26,4	15,6	33,4	18,9	100,0
	V	N	437	2.234	1.443	3.760	919	8.792
		%	5,0	25,4	16,4	42,8	10,4	100,0
25-44	Total	N	28.821	77.555	39.710	108.276	65.969	320.330
		%	9,0	24,2	12,4	33,8	20,6	100,0
	I	N	1.567	8.814	6.172	19.450	9.083	45.086
		%	3,5	19,5	13,7	43,1	20,1	100,0
	II	N	2.206	9.531	3.054	14.630	7.803	37.223
		%	5,9	25,6	8,2	39,3	21,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 189. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y clase social

				Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total
Mujeres	25-44	III	N	7.760	20.724	13.346	28.278	11.922	82.029
			%	9,5	25,3	16,3	34,5	14,5	100,0
		IV	N	12.190	28.306	12.615	34.933	22.681	110.725
			%	11,0	25,6	11,4	31,5	20,5	100,0
		V	N	5.098	10.180	4.524	10.986	14.479	45.267
			%	11,3	22,5	10,0	24,3	32,0	100,0
	45-64	Total	N	31.710	56.974	28.928	105.301	90.684	313.598
			%	10,1	18,2	9,2	33,6	28,9	100,0
		I	N	1.774	3.197	3.726	12.301	11.118	32.116
			%	5,5	10,0	11,6	38,3	34,6	100,0
		II	N	3.551	4.337	2.716	11.879	4.310	26.792
			%	13,3	16,2	10,1	44,3	16,1	100,0
		III	N	8.452	15.275	8.638	34.011	22.265	88.641
			%	9,5	17,2	9,7	38,4	25,1	100,0
		IV	N	10.139	20.398	9.317	30.905	33.342	104.102
			%	9,7	19,6	9,0	29,7	32,0	100,0
		V	N	7.794	13.767	4.531	16.205	19.648	61.946
			%	12,6	22,2	7,3	26,2	31,7	100,0
	65-74	Total	N	13.394	12.715	6.250	29.632	47.778	109.770
			%	12,2	11,6	5,7	27,0	43,5	100,0
		I	N	727	990	124	1.811	3.547	7.199
			%	10,1	13,7	1,7	25,2	49,3	100,0
		II	N	519	917	133	1.724	3.931	7.225
			%	7,2	12,7	1,8	23,9	54,4	100,0
		III	N	2.390	2.380	2.109	6.621	9.399	22.899
			%	10,4	10,4	9,2	28,9	41,0	100,0
		IV	N	6.281	5.466	2.910	14.394	21.083	50.134
			%	12,5	10,9	5,8	28,7	42,1	100,0
		V	N	3.476	2.962	974	5.081	9.819	22.312
			%	15,6	13,3	4,4	22,8	44,0	100,0
	>=75	Total	N	41.930	20.581	7.318	26.675	44.758	141.261
			%	29,7	14,6	5,2	18,9	31,7	100,0
		I	N	1.645	779	353	724	2.373	5.875
			%	28,0	13,3	6,0	12,3	40,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 189. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y clase social

			Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total	
Mujeres >=75	II	N	1.162	1.683	712	2.711	4.024	10.292	
		%	11,3	16,4	6,9	26,3	39,1	100,0	
	III	N	9.373	3.331	1.868	5.364	8.532	28.468	
		%	32,9	11,7	6,6	18,8	30,0	100,0	
	IV	N	18.624	10.786	2.848	12.433	19.175	63.866	
		%	29,2	16,9	4,5	19,5	30,0	100,0	
	V	N	11.126	4.002	1.535	5.443	10.653	32.760	
		%	34,0	12,2	4,7	16,6	32,5	100,0	
	Ambos	Total	N	195.728	336.431	192.256	627.146	535.795	1.887.356
			%	10,4	17,8	10,2	33,2	28,4	100,0
		I	N	11.866	29.044	24.256	88.216	65.146	218.528
			%	5,4	13,3	11,1	40,4	29,8	100,0
II		N	12.278	32.983	15.982	69.174	42.817	173.234	
		%	7,1	19,0	9,2	39,9	24,7	100,0	
III		N	44.974	73.881	46.517	151.447	113.643	430.462	
		%	10,4	17,2	10,8	35,2	26,4	100,0	
IV		N	89.411	153.355	83.182	249.087	235.712	810.747	
		%	11,0	18,9	10,3	30,7	29,1	100,0	
V		N	37.199	47.168	22.319	69.222	78.478	254.385	
		%	14,6	18,5	8,8	27,2	30,8	100,0	
15-24		Total	N	7.631	33.484	21.601	78.137	41.581	182.434
			%	4,2	18,4	11,8	42,8	22,8	100,0
		I	N	1.179	3.556	2.296	14.996	7.170	29.196
			%	4,0	12,2	7,9	51,4	24,6	100,0
		II	N	768	4.595	2.264	11.225	5.632	24.485
			%	3,1	18,8	9,2	45,8	23,0	100,0
	III	N	2.553	6.804	3.136	16.520	7.887	36.900	
		%	6,9	18,4	8,5	44,8	21,4	100,0	
	IV	N	2.694	14.688	10.738	29.080	17.151	74.351	
		%	3,6	19,8	14,4	39,1	23,1	100,0	
	V	N	437	3.841	3.167	6.316	3.741	17.503	
		%	2,5	21,9	18,1	36,1	21,4	100,0	
25-44	Total	N	52.583	142.516	84.461	245.926	131.154	656.640	
		%	8,0	21,7	12,9	37,5	20,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 189. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y clase social

			Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total
Ambos	25-44	I	N 2.927	16.004	12.737	38.960	18.191	88.818
			% 3,3	18,0	14,3	43,9	20,5	100,0
		II	N 2.899	16.793	7.672	28.815	13.541	69.719
			% 4,2	24,1	11,0	41,3	19,4	100,0
		III	N 12.731	31.939	20.952	52.529	26.134	144.286
			% 8,8	22,1	14,5	36,4	18,1	100,0
		IV	N 24.342	61.180	34.644	99.172	51.781	271.117
			% 9,0	22,6	12,8	36,6	19,1	100,0
		V	N 9.684	16.601	8.456	26.450	21.508	82.699
			% 11,7	20,1	10,2	32,0	26,0	100,0
	45-64	Total	N 57.658	110.017	65.386	207.619	175.284	615.965
			% 9,4	17,9	10,6	33,7	28,5	100,0
		I	N 4.671	6.534	8.013	28.766	22.039	70.023
			% 6,7	9,3	11,4	41,1	31,5	100,0
		II	N 5.353	7.080	4.702	22.822	10.254	50.212
			% 10,7	14,1	9,4	45,5	20,4	100,0
		III	N 13.722	26.959	16.842	59.854	37.584	154.963
			% 8,9	17,4	10,9	38,6	24,3	100,0
		IV	N 23.133	51.749	28.410	73.504	77.920	254.716
			% 9,1	20,3	11,2	28,9	30,6	100,0
		V	N 10.779	17.694	7.418	22.674	27.487	86.052
			% 12,5	20,6	8,6	26,3	31,9	100,0
	65-74	Total	N 19.717	21.068	11.288	52.375	101.055	205.503
			% 9,6	10,3	5,5	25,5	49,2	100,0
		I	N 1.226	2.172	599	4.257	12.699	20.952
			% 5,9	10,4	2,9	20,3	60,6	100,0
		II	N 1.168	1.619	511	3.214	7.575	14.087
			% 8,3	11,5	3,6	22,8	53,8	100,0
		III	N 3.532	3.072	3.070	12.703	22.300	44.676
			% 7,9	6,9	6,9	28,4	49,9	100,0
		IV	N 9.794	10.108	5.859	25.572	46.555	97.887
			% 10,0	10,3	6,0	26,1	47,6	100,0
		V	N 3.998	4.098	1.250	6.629	11.926	27.901
			% 14,3	14,7	4,5	23,8	42,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 189. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y clase social

			Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total
Ambos	>=75	Total	N 58.138	29.347	9.519	43.089	86.721	226.814
			% 25,6	12,9	4,2	19,0	38,2	100,0
	I	Total	N 1.864	779	611	1.238	5.047	9.538
			% 19,5	8,2	6,4	13,0	52,9	100,0
	II	Total	N 2.089	2.896	833	3.098	5.815	14.731
			% 14,2	19,7	5,7	21,0	39,5	100,0
	III	Total	N 12.436	5.107	2.517	9.841	19.737	49.638
			% 25,1	10,3	5,1	19,8	39,8	100,0
	IV	Total	N 29.449	15.631	3.531	21.759	42.306	112.676
			% 26,1	13,9	3,1	19,3	37,5	100,0
	V	Total	N 12.301	4.934	2.028	7.153	13.816	40.231
			% 30,6	12,3	5,0	17,8	34,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 190. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y nivel de estudios*

			Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total
Hombres Total	Total	N	74.801	146.983	98.162	323.634	271.544	915.124
		%	8,2	16,1	10,7	35,4	29,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	31.050	35.332	17.163	54.946	72.109	210.600
		%	14,7	16,8	8,1	26,1	34,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	12.554	25.059	19.644	58.193	52.004	167.454
		%	7,5	15,0	11,7	34,8	31,1	100,0
	Secundaria, superior	N	22.781	63.685	44.657	130.641	98.907	360.670
		%	6,3	17,7	12,4	36,2	27,4	100,0
	Terciaria	N	8.417	22.907	16.698	79.854	48.524	176.400
		%	4,8	13,0	9,5	45,3	27,5	100,0
15-24 Total	Total	N	2.146	11.860	9.714	44.320	26.418	94.458
		%	2,3	12,6	10,3	46,9	28,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	343	1.667	835	4.413	2.660	9.918
		%	3,5	16,8	8,4	44,5	26,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	666	4.135	2.697	16.481	7.149	31.129
		%	2,1	13,3	8,7	52,9	23,0	100,0
	Secundaria, superior	N	1.137	6.058	5.574	17.323	12.749	42.840
		%	2,7	14,1	13,0	40,4	29,8	100,0
	Terciaria	N	.	.	609	6.103	3.860	10.572
		%	.	.	5,8	57,7	36,5	100,0
25-44 Total	Total	N	23.762	64.962	44.751	137.650	65.185	336.309
		%	7,1	19,3	13,3	40,9	19,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	5.392	8.015	5.627	13.902	4.840	37.776
		%	14,3	21,2	14,9	36,8	12,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.867	9.406	9.516	19.002	11.017	52.808
		%	7,3	17,8	18,0	36,0	20,9	100,0
	Secundaria, superior	N	11.252	32.131	20.059	65.173	35.660	164.274
		%	6,8	19,6	12,2	39,7	21,7	100,0
	Terciaria	N	3.251	15.409	9.549	39.573	13.668	81.451
		%	4,0	18,9	11,7	48,6	16,8	100,0
45-64 Total	Total	N	25.948	53.043	36.458	102.507	84.700	302.655
		%	8,6	17,5	12,0	33,9	28,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	9.584	14.851	7.487	18.972	19.506	70.400
		%	13,6	21,1	10,6	26,9	27,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 190. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y nivel de estudios*

			Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	4.977	9.917	5.744	15.741	16.866	53.244
			%	9,3	18,6	10,8	29,6	31,7	100,0
		Secundaria, superior	N	7.916	22.112	17.160	38.635	31.307	117.130
			%	6,8	18,9	14,7	33,0	26,7	100,0
		Terciaria	N	3.470	6.163	6.067	29.159	17.021	61.881
			%	5,6	10,0	9,8	47,1	27,5	100,0
	65-74	Total	N	6.324	8.353	5.038	22.743	53.277	95.733
			%	6,6	8,7	5,3	23,8	55,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.430	4.653	2.008	7.329	20.596	38.017
			%	9,0	12,2	5,3	19,3	54,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	988	589	1.548	4.411	8.755	16.291
			%	6,1	3,6	9,5	27,1	53,7	100,0
		Secundaria, superior	N	1.048	2.187	1.009	7.530	14.174	25.948
			%	4,0	8,4	3,9	29,0	54,6	100,0
		Terciaria	N	857	924	472	3.472	9.752	15.477
			%	5,5	6,0	3,1	22,4	63,0	100,0
	>=75	Total	N	16.622	8.766	2.201	16.415	41.964	85.968
			%	19,3	10,2	2,6	19,1	48,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	12.301	6.145	1.206	10.330	24.507	54.489	
		%	22,6	11,3	2,2	19,0	45,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	2.055	1.012	140	2.558	8.216	13.981	
		%	14,7	7,2	1,0	18,3	58,8	100,0	
	Secundaria, superior	N	1.427	1.197	856	1.980	5.018	10.478	
		%	13,6	11,4	8,2	18,9	47,9	100,0	
	Terciaria	N	839	411	.	1.547	4.223	7.020	
		%	12,0	5,9	.	22,0	60,2	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	121.590	190.079	94.094	304.630	265.490	975.882
		%	12,5	19,5	9,6	31,2	27,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	58.247	44.710	16.599	64.951	93.820	278.327
			%	20,9	16,1	6,0	23,3	33,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	19.525	33.075	11.721	49.701	55.745	169.766
			%	11,5	19,5	6,9	29,3	32,8	100,0
		Secundaria, superior	N	29.277	67.281	39.963	107.436	63.908	307.866
			%	9,5	21,9	13,0	34,9	20,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 190. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y nivel de estudios*

			Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N 14.541	45.012	25.811	82.542	52.017	219.923
			% 6,6	20,5	11,7	37,5	23,7	100,0
	15-24	Total	N 5.735	21.884	11.887	34.575	15.418	89.499
			% 6,4	24,5	13,3	38,6	17,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N 502	1.950	1.507	5.320	2.107	11.386
			% 4,4	17,1	13,2	46,7	18,5	100,0
		Secundaria, inferior	N 2.153	3.211	2.057	5.733	3.609	16.763
			% 12,8	19,2	12,3	34,2	21,5	100,0
		Secundaria, superior	N 2.102	13.434	6.162	17.039	6.706	45.443
			% 4,6	29,6	13,6	37,5	14,8	100,0
		Terciaria	N 977	3.289	2.162	6.483	2.996	15.907
			% 6,1	20,7	13,6	40,8	18,8	100,0
	25-44	Total	N 28.821	77.824	39.710	108.276	66.194	320.826
			% 9,0	24,3	12,4	33,7	20,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N 2.305	7.284	1.734	6.428	8.238	25.990
			% 8,9	28,0	6,7	24,7	31,7	100,0
		Secundaria, inferior	N 3.906	9.878	2.028	10.833	12.292	38.937
			% 10,0	25,4	5,2	27,8	31,6	100,0
		Secundaria, superior	N 15.061	30.593	19.599	44.105	21.131	130.487
			% 11,5	23,4	15,0	33,8	16,2	100,0
		Terciaria	N 7.550	30.068	16.350	46.910	24.534	125.412
			% 6,0	24,0	13,0	37,4	19,6	100,0
	45-64	Total	N 31.710	56.974	28.928	105.472	90.684	313.769
			% 10,1	18,2	9,2	33,6	28,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N 11.692	15.261	5.173	18.978	26.860	77.963
			% 15,0	19,6	6,6	24,3	34,5	100,0
		Secundaria, inferior	N 5.838	11.796	4.532	20.356	19.213	61.735
			% 9,5	19,1	7,3	33,0	31,1	100,0
		Secundaria, superior	N 9.628	20.092	12.047	40.332	28.223	110.322
			% 8,7	18,2	10,9	36,6	25,6	100,0
		Terciaria	N 4.552	9.825	7.176	25.807	16.388	63.749
			% 7,1	15,4	11,3	40,5	25,7	100,0
	65-74	Total	N 13.394	12.715	6.250	29.632	47.934	109.925
			% 12,2	11,6	5,7	27,0	43,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 190. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y nivel de estudios*

				Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total	
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	11.472	6.001	2.971	16.110	25.298	61.852	
			%	18,5	9,7	4,8	26,0	40,9	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.240	4.005	1.470	8.445	12.291	27.452	
			%	4,5	14,6	5,4	30,8	44,8	100,0	
		Secundaria, superior	N	448	1.811	1.686	2.770	5.179	11.893	
			%	3,8	15,2	14,2	23,3	43,5	100,0	
	Terciaria	N	234	898	124	2.306	5.165	8.727		
		%	2,7	10,3	1,4	26,4	59,2	100,0		
	>=75	Total	N	41.930	20.682	7.318	26.675	45.260	141.864	
			%	29,6	14,6	5,2	18,8	31,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	32.276	14.214	5.214	18.115	31.317	101.136	
			%	31,9	14,1	5,2	17,9	31,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	6.388	4.185	1.634	4.333	8.340	24.879	
			%	25,7	16,8	6,6	17,4	33,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	2.039	1.352	470	3.190	2.669	9.720	
			%	21,0	13,9	4,8	32,8	27,5	100,0	
		Terciaria	N	1.228	931	.	1.036	2.934	6.129	
			%	20,0	15,2	.	16,9	47,9	100,0	
Ambos		Total	Total	N	196.392	337.062	192.256	628.264	537.033	1.891.006
			%	10,4	17,8	10,2	33,2	28,4	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	89.297	80.042	33.762	119.898	165.929	488.927		
		%	18,3	16,4	6,9	24,5	33,9	100,0		
	Secundaria, inferior	N	32.078	58.134	31.365	107.894	107.749	337.220		
		%	9,5	17,2	9,3	32,0	32,0	100,0		
	Secundaria, superior	N	52.058	130.967	84.620	238.077	162.815	668.536		
		%	7,8	19,6	12,7	35,6	24,4	100,0		
	Terciaria	N	22.959	67.919	42.509	162.396	100.540	396.323		
		%	5,8	17,1	10,7	41,0	25,4	100,0		
	15-24	Total	N	7.880	33.744	21.601	78.895	41.837	183.958	
			%	4,3	18,3	11,7	42,9	22,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	845	3.618	2.342	9.733	4.767	21.304	
			%	4,0	17,0	11,0	45,7	22,4	100,0	
	Secundaria, inferior	N	2.819	7.345	4.754	22.214	10.759	47.891		
		%	5,9	15,3	9,9	46,4	22,5	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 190. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y nivel de estudios*

				Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	3.239	19.492	11.736	34.362	19.455	88.283
			%	3,7	22,1	13,3	38,9	22,0	100,0
		Terciaria	N	977	3.289	2.770	12.586	6.856	26.479
			%	3,7	12,4	10,5	47,5	25,9	100,0
	25-44	Total	N	52.583	142.786	84.461	245.926	131.379	657.135
			%	8,0	21,7	12,9	37,4	20,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.697	15.300	7.361	20.330	13.078	63.765
			%	12,1	24,0	11,5	31,9	20,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.773	19.285	11.544	29.835	23.309	91.745
			%	8,5	21,0	12,6	32,5	25,4	100,0
		Secundaria, superior	N	26.312	62.724	39.657	109.278	56.791	294.762
			%	8,9	21,3	13,5	37,1	19,3	100,0
		Terciaria	N	10.801	45.478	25.899	86.483	38.202	206.862
			%	5,2	22,0	12,5	41,8	18,5	100,0
	45-64	Total	N	57.658	110.017	65.386	207.979	175.383	616.424
			%	9,4	17,8	10,6	33,7	28,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	21.276	30.111	12.659	37.950	46.366	148.363
			%	14,3	20,3	8,5	25,6	31,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	10.815	21.713	10.276	36.097	36.078	114.979
			%	9,4	18,9	8,9	31,4	31,4	100,0
		Secundaria, superior	N	17.544	42.204	29.207	78.967	59.530	227.452
			%	7,7	18,6	12,8	34,7	26,2	100,0
		Terciaria	N	8.023	15.988	13.244	54.966	33.409	125.630
			%	6,4	12,7	10,5	43,8	26,6	100,0
	65-74	Total	N	19.717	21.068	11.288	52.375	101.210	205.658
			%	9,6	10,2	5,5	25,5	49,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	14.902	10.654	4.979	23.440	45.894	99.869
			%	14,9	10,7	5,0	23,5	46,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.228	4.594	3.019	12.856	21.047	43.744
			%	5,1	10,5	6,9	29,4	48,1	100,0
		Secundaria, superior	N	1.496	3.998	2.694	10.300	19.352	37.841
			%	4,0	10,6	7,1	27,2	51,1	100,0
		Terciaria	N	1.091	1.821	596	5.778	14.917	24.204
			%	4,5	7,5	2,5	23,9	61,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 190. Distribución de la población según la frecuencia con que realizan ejercicio físico en su tiempo libre por sexo, edad y nivel de estudios*

				Nunca	En raras ocasiones	Varias veces al mes	Varias veces a la semana	A diario	Total
Ambos	>=75	Total	N	58.553	29.448	9.519	43.089	87.224	227.832
			%	25,7	12,9	4,2	18,9	38,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	44.576	20.359	6.420	28.445	55.824	155.625
			%	28,6	13,1	4,1	18,3	35,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.443	5.197	1.773	6.891	16.556	38.860
			%	21,7	13,4	4,6	17,7	42,6	100,0
		Secundaria, superior	N	3.467	2.549	1.325	5.170	7.687	20.198
			%	17,2	12,6	6,6	25,6	38,1	100,0
		Terciaria	N	2.067	1.342	.	2.583	7.157	13.149
			%	15,7	10,2	.	19,6	54,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 191. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Hombres Total	CAPV	N	137.113	14.078	356.005	89.743	15.641	302.543	915.124
		%	15,0	1,5	38,9	9,8	1,7	33,1	100,0
	Araba	N	20.302	6.575	55.196	10.895	1.952	38.831	133.751
		%	15,2	4,9	41,3	8,1	1,5	29,0	100,0
	Gipuzkoa	N	38.800	5.692	127.309	20.775	5.559	95.677	293.812
		%	13,2	1,9	43,3	7,1	1,9	32,6	100,0
	Bizkaia	N	78.011	1.811	173.500	58.074	8.130	168.035	487.561
		%	16,0	0,4	35,6	11,9	1,7	34,5	100,0
15-24	CAPV	N	30.030	4.287	20.398	27.084	1.960	10.700	94.458
		%	31,8	4,5	21,6	28,7	2,1	11,3	100,0
	Araba	N	4.841	2.306	2.095	4.676	293	659	14.869
		%	32,6	15,5	14,1	31,4	2,0	4,4	100,0
	Gipuzkoa	N	5.655	1.240	9.804	8.382	1.053	5.171	31.305
		%	18,1	4,0	31,3	26,8	3,4	16,5	100,0
	Bizkaia	N	19.534	741	8.500	14.026	613	4.870	48.284
		%	40,5	1,5	17,6	29,0	1,3	10,1	100,0
25-44	CAPV	N	49.416	6.067	184.244	36.892	8.480	51.210	336.309
		%	14,7	1,8	54,8	11,0	2,5	15,2	100,0
	Araba	N	6.304	2.762	30.666	3.910	1.059	7.361	52.062
		%	12,1	5,3	58,9	7,5	2,0	14,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 191. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Hombres 25-44	Gipuzkoa	N	16.941	2.504	63.417	5.574	2.765	15.588	106.790
		%	15,9	2,3	59,4	5,2	2,6	14,6	100,0
	Bizkaia	N	26.171	800	90.162	27.408	4.656	28.261	177.458
		%	14,7	0,5	50,8	15,4	2,6	15,9	100,0
45-64	CAPV	N	49.416	3.725	145.801	23.596	4.776	75.342	302.655
		%	16,3	1,2	48,2	7,8	1,6	24,9	100,0
	Araba	N	8.416	1.507	22.075	2.172	599	7.982	42.751
		%	19,7	3,5	51,6	5,1	1,4	18,7	100,0
	Gipuzkoa	N	13.207	1.948	51.191	5.628	1.740	23.705	97.419
		%	13,6	2,0	52,5	5,8	1,8	24,3	100,0
	Bizkaia	N	27.794	270	72.535	15.795	2.436	43.655	162.485
		%	17,1	0,2	44,6	9,7	1,5	26,9	100,0
65-74	CAPV	N	5.563	.	4.268	1.002	425	84.476	95.733
		%	5,8	.	4,5	1,0	0,4	88,2	100,0
	Araba	N	657	.	360	137	.	12.009	13.163
		%	5,0	.	2,7	1,0	.	91,2	100,0
	Gipuzkoa	N	1.824	.	2.506	301	.	27.499	32.130
		%	5,7	.	7,8	0,9	.	85,6	100,0
	Bizkaia	N	3.082	.	1.402	564	425	44.967	50.440
		%	6,1	.	2,8	1,1	0,8	89,2	100,0
>=75	CAPV	N	2.688	.	1.294	1.170	.	80.816	85.968

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 191. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total	
Hombres >=75	CAPV	%	3,1	.	1,5	1,4	.	94,0	100,0	
	Araba	N	84	10.820	10.905	
		%	0,8	99,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	1.173	.	392	890	.	23.713	26.168	
		%	4,5	.	1,5	3,4	.	90,6	100,0	
	Bizkaia	N	1.431	.	901	280	.	46.282	48.895	
	%	2,9	.	1,8	0,6	.	94,7	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	213.436	9.343	167.315	151.994	18.029	415.766	975.882
		%	21,9	1,0	17,1	15,6	1,8	42,6	100,0	
	Araba	N	33.641	3.824	26.706	15.470	1.905	55.224	136.772	
		%	24,6	2,8	19,5	11,3	1,4	40,4	100,0	
	Gipuzkoa	N	72.344	3.116	61.906	38.388	6.053	130.879	312.686	
		%	23,1	1,0	19,8	12,3	1,9	41,9	100,0	
	Bizkaia	N	107.450	2.402	78.703	98.136	10.071	229.663	526.425	
		%	20,4	0,5	15,0	18,6	1,9	43,6	100,0	
	15-24	CAPV	N	30.110	2.885	12.957	31.470	4.503	7.574	89.499
		%	33,6	3,2	14,5	35,2	5,0	8,5	100,0	
	Araba	N	4.100	1.506	2.335	3.555	1.095	619	13.210	
		%	31,0	11,4	17,7	26,9	8,3	4,7	100,0	
Gipuzkoa	N	10.777	802	3.990	8.910	1.926	3.038	29.443		
	%	36,6	2,7	13,6	30,3	6,5	10,3	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 191. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
15-24 Bizkaia	N		15.232	577	6.633	19.005	1.482	3.916	46.846
	%		32,5	1,2	14,2	40,6	3,2	8,4	100,0
25-44 CAPV	N		86.520	3.673	96.161	73.856	7.526	53.090	320.826
	%		27,0	1,1	30,0	23,0	2,3	16,5	100,0
Araba	N		14.234	1.464	15.723	7.788	130	8.529	47.869
	%		29,7	3,1	32,8	16,3	0,3	17,8	100,0
Gipuzkoa	N		29.212	1.208	37.956	16.356	1.843	15.330	101.905
	%		28,7	1,2	37,2	16,1	1,8	15,0	100,0
Bizkaia	N		43.073	1.001	42.482	49.712	5.552	29.231	171.052
	%		25,2	0,6	24,8	29,1	3,2	17,1	100,0
45-64 CAPV	N		80.228	2.637	57.030	44.813	5.895	123.167	313.769
	%		25,6	0,8	18,2	14,3	1,9	39,3	100,0
Araba	N		13.688	854	8.553	4.012	681	16.475	44.263
	%		30,9	1,9	19,3	9,1	1,5	37,2	100,0
Gipuzkoa	N		26.703	959	19.607	12.322	2.284	37.787	99.662
	%		26,8	1,0	19,7	12,4	2,3	37,9	100,0
Bizkaia	N		39.837	824	28.869	28.479	2.930	68.904	169.843
	%		23,5	0,5	17,0	16,8	1,7	40,6	100,0
65-74 CAPV	N		10.545	.	936	1.166	106	97.172	109.925
	%		9,6	.	0,9	1,1	0,1	88,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 191. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Mujeres	65-74	Araba	N	1.350	.	95	.	.	12.875	14.320
			%	9,4	.	0,7	.	.	89,9	100,0
		Gipuzkoa	N	3.208	.	122	226	.	32.564	36.120
			%	8,9	.	0,3	0,6	.	90,2	100,0
		Bizkaia	N	5.987	.	719	940	106	51.733	59.484
			%	10,1	.	1,2	1,6	0,2	87,0	100,0
	>=75	CAPV	N	6.034	147	231	689	.	134.764	141.864
			%	4,3	0,1	0,2	0,5	.	95,0	100,0
		Araba	N	269	.	.	115	.	16.726	17.110
			%	1,6	.	.	0,7	.	97,8	100,0
		Gipuzkoa	N	2.444	147	231	573	.	42.159	45.555
			%	5,4	0,3	0,5	1,3	.	92,5	100,0
Bizkaia	N	3.321	75.879	79.200		
	%	4,2	95,8	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	350.549	23.421	523.320	241.738	33.670	718.309	1.891.006
			%	18,5	1,2	27,7	12,8	1,8	38,0	100,0
		Araba	N	53.943	10.399	81.902	26.365	3.858	94.055	270.523
			%	19,9	3,8	30,3	9,7	1,4	34,8	100,0
		Gipuzkoa	N	111.144	8.808	189.216	59.163	11.611	226.555	606.497
			%	18,3	1,5	31,2	9,8	1,9	37,4	100,0
		Bizkaia	N	185.461	4.214	252.202	156.210	18.201	397.699	1.013.987
			%							

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 191. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Ambos	Total	Bizkaia	%	18,3	0,4	24,9	15,4	1,8	39,2	100,0
	15-24	CAPV	N	60.140	7.172	33.356	58.554	6.463	18.274	183.958
			%	32,7	3,9	18,1	31,8	3,5	9,9	100,0
		Araba	N	8.941	3.812	4.430	8.230	1.388	1.278	28.079
			%	31,8	13,6	15,8	29,3	4,9	4,6	100,0
		Gipuzkoa	N	16.432	2.042	13.794	17.293	2.979	8.209	60.748
			%	27,0	3,4	22,7	28,5	4,9	13,5	100,0
		Bizkaia	N	34.767	1.318	15.132	33.031	2.095	8.786	95.130
			%	36,5	1,4	15,9	34,7	2,2	9,2	100,0
	25-44	CAPV	N	135.935	9.740	280.405	110.748	16.006	104.300	657.135
			%	20,7	1,5	42,7	16,9	2,4	15,9	100,0
		Araba	N	20.538	4.226	46.389	11.698	1.190	15.890	99.930
			%	20,6	4,2	46,4	11,7	1,2	15,9	100,0
		Gipuzkoa	N	46.153	3.712	101.373	21.930	4.609	30.918	208.695
			%	22,1	1,8	48,6	10,5	2,2	14,8	100,0
		Bizkaia	N	69.244	1.801	132.643	77.121	10.208	57.492	348.509
			%	19,9	0,5	38,1	22,1	2,9	16,5	100,0
	45-64	CAPV	N	129.644	6.362	202.831	68.409	10.670	198.509	616.424
			%	21,0	1,0	32,9	11,1	1,7	32,2	100,0
		Araba	N	22.104	2.361	30.628	6.185	1.280	24.457	87.015
			%	25,4	2,7	35,2	7,1	1,5	28,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 191. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Ambos	45-64	Gipuzkoa	N	39.910	2.907	70.798	17.950	4.024	61.493	197.081
			%	20,3	1,5	35,9	9,1	2,0	31,2	100,0
		Bizkaia	N	67.630	1.094	101.404	44.274	5.367	112.559	332.328
			%	20,4	0,3	30,5	13,3	1,6	33,9	100,0
	65-74	CAPV	N	16.108	.	5.204	2.168	531	181.648	205.658
			%	7,8	.	2,5	1,1	0,3	88,3	100,0
		Araba	N	2.007	.	455	137	.	24.884	27.483
	%		7,3	.	1,7	0,5	.	90,5	100,0	
		Gipuzkoa	N	5.032	.	2.628	527	.	60.064	68.251
	%		7,4	.	3,8	0,8	.	88,0	100,0	
		Bizkaia	N	9.068	.	2.121	1.504	531	96.700	109.924
	%		8,2	.	1,9	1,4	0,5	88,0	100,0	
	>=75	CAPV	N	8.722	147	1.525	1.859	.	215.580	227.832
			%	3,8	0,1	0,7	0,8	.	94,6	100,0
		Araba	N	353	.	.	115	.	27.546	28.015
	%		1,3	.	.	0,4	.	98,3	100,0	
		Gipuzkoa	N	3.617	147	623	1.463	.	65.873	71.723
	%		5,0	0,2	0,9	2,0	.	91,8	100,0	
		Bizkaia	N	4.752	.	901	280	.	122.161	128.094
	%		3,7	.	0,7	0,2	.	95,4	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 192. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Hombres	Total	Total	N 137.113	14.078	355.816	89.743	15.641	301.471	913.863
			% 15,0	1,5	38,9	9,8	1,7	33,0	100,0
	I	Total	N 22.017	2.682	50.736	13.777	1.978	22.500	113.690
			% 19,4	2,4	44,6	12,1	1,7	19,8	100,0
	II	Total	N 11.392	1.269	31.531	9.117	2.170	22.725	78.206
			% 14,6	1,6	40,3	11,7	2,8	29,1	100,0
	III	Total	N 33.830	2.325	70.866	17.540	4.030	59.763	188.355
			% 18,0	1,2	37,6	9,3	2,1	31,7	100,0
	IV	Total	N 57.085	6.200	176.945	39.974	6.733	163.369	450.306
			% 12,7	1,4	39,3	8,9	1,5	36,3	100,0
	V	Total	N 12.790	1.602	25.738	9.335	729	33.114	83.307
			% 15,4	1,9	30,9	11,2	0,9	39,7	100,0
	15-24	Total	N 30.030	4.287	20.398	27.084	1.960	10.142	93.900
			% 32,0	4,6	21,7	28,8	2,1	10,8	100,0
	I	Total	N 6.585	591	3.613	3.845	.	.	14.634
			% 45,0	4,0	24,7	26,3	.	.	100,0
	II	Total	N 4.577	612	1.313	4.065	148	274	10.988
			% 41,7	5,6	11,9	37,0	1,3	2,5	100,0
	III	Total	N 5.987	628	3.903	3.564	1.267	1.481	16.830
			% 35,6	3,7	23,2	21,2	7,5	8,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 192. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Hombres	15-24	IV	N	11.173	2.261	8.527	14.042	545	6.190	42.737
			%	26,1	5,3	20,0	32,9	1,3	14,5	100,0
		V	N	1.708	195	3.044	1.567	.	2.197	8.711
			%	19,6	2,2	34,9	18,0	.	25,2	100,0
	25-44	Total	N	49.416	6.067	184.244	36.892	8.480	51.210	336.309
			%	14,7	1,8	54,8	11,0	2,5	15,2	100,0
		I	N	6.542	1.701	25.343	6.140	715	3.291	43.732
			%	15,0	3,9	58,0	14,0	1,6	7,5	100,0
		II	N	2.459	176	19.888	3.325	2.023	4.625	32.496
			%	7,6	0,5	61,2	10,2	6,2	14,2	100,0
		III	N	12.344	652	33.204	7.307	2.302	6.447	62.257
			%	19,8	1,0	53,3	11,7	3,7	10,4	100,0
		IV	N	22.716	2.556	92.467	14.493	3.017	25.143	160.392
			%	14,2	1,6	57,7	9,0	1,9	15,7	100,0
		V	N	5.354	980	13.343	5.627	425	11.703	37.432
			%	14,3	2,6	35,6	15,0	1,1	31,3	100,0
	45-64	Total	N	49.416	3.725	145.612	23.596	4.776	75.243	302.368
			%	16,3	1,2	48,2	7,8	1,6	24,9	100,0
		I	N	7.926	390	20.136	3.547	1.149	4.759	37.907
			%	20,9	1,0	53,1	9,4	3,0	12,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 192. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total	
Hombres	45-64	II	N	3.952	481	9.447	1.558	.	7.981	23.419
		%	16,9	2,1	40,3	6,7	.	34,1	100,0	
		III	N	13.872	1.044	33.374	5.685	462	11.885	66.322
		%	20,9	1,6	50,3	8,6	0,7	17,9	100,0	
		IV	N	18.753	1.382	73.900	10.800	2.861	42.917	150.614
		%	12,5	0,9	49,1	7,2	1,9	28,5	100,0	
		V	N	4.914	427	8.754	2.005	304	7.701	24.106
		%	20,4	1,8	36,3	8,3	1,3	31,9	100,0	
	65-74	Total	N	5.563	.	4.268	1.002	425	84.476	95.733
		%	5,8	.	4,5	1,0	0,4	88,2	100,0	
	I	N	964	.	1.501	244	114	10.930	13.753	
	%	7,0	.	10,9	1,8	0,8	79,5	100,0		
	II	N	404	.	883	.	.	5.575	6.862	
	%	5,9	.	12,9	.	.	81,2	100,0		
	III	N	975	.	385	485	.	19.932	21.777	
	%	4,5	.	1,8	2,2	.	91,5	100,0		
	IV	N	2.853	.	901	137	311	43.551	47.753	
	%	6,0	.	1,9	0,3	0,7	91,2	100,0		
	V	N	368	.	597	136	.	4.488	5.588	
	%	6,6	.	10,7	2,4	.	80,3	100,0		
>=75		Total	N	2.688	.	1.294	1.170	.	80.401	85.553

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 192. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

		Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total		
Hombres >=75	Total	%	3,1	.	1,5	1,4	.	94,0	100,0	
	I	N	.	.	143	.	.	3.520	3.663	
		%	.	.	3,9	.	.	96,1	100,0	
	II	N	.	.	.	169	.	4.270	4.440	
		%	.	.	.	3,8	.	96,2	100,0	
	III	N	652	.	.	499	.	20.019	21.169	
		%	3,1	.	.	2,4	.	94,6	100,0	
	IV	N	1.590	.	1.151	502	.	45.568	48.810	
		%	3,3	.	2,4	1,0	.	93,4	100,0	
	V	N	446	7.024	7.470	
%		6,0	94,0	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	212.911	9.343	167.315	151.533	18.029	414.362	973.492
		%		21,9	1,0	17,2	15,6	1,9	42,6	100,0
	I	N	23.198	1.675	30.304	21.582	3.923	24.157	104.838	
		%	22,1	1,6	28,9	20,6	3,7	23,0	100,0	
	II	N	23.990	1.678	22.986	16.730	3.896	25.749	95.028	
		%	25,2	1,8	24,2	17,6	4,1	27,1	100,0	
	III	N	52.086	2.319	51.670	36.512	3.962	95.558	242.107	
		%	21,5	1,0	21,3	15,1	1,6	39,5	100,0	
	IV	N	74.830	3.308	43.646	49.244	5.073	184.340	360.441	
		%	20,8	0,9	12,1	13,7	1,4	51,1	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 192. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Mujeres	Total	V	N	38.807	363	18.710	27.466	1.174	84.558	171.077
			%	22,7	0,2	10,9	16,1	0,7	49,4	100,0
	15-24	Total	N	29.854	2.885	12.957	31.010	4.503	7.324	88.533
			%	33,7	3,3	14,6	35,0	5,1	8,3	100,0
		I	N	5.040	392	2.371	6.252	261	246	14.562
			%	34,6	2,7	16,3	42,9	1,8	1,7	100,0
		II	N	6.559	506	1.765	2.517	809	1.340	13.497
			%	48,6	3,7	13,1	18,7	6,0	9,9	100,0
		III	N	5.721	802	3.969	7.951	571	1.057	20.069
			%	28,5	4,0	19,8	39,6	2,8	5,3	100,0
		IV	N	9.792	1.039	4.175	11.356	2.475	2.777	31.614
			%	31,0	3,3	13,2	35,9	7,8	8,8	100,0
		V	N	2.742	147	678	2.934	386	1.905	8.792
			%	31,2	1,7	7,7	33,4	4,4	21,7	100,0
	25-44	Total	N	86.250	3.673	96.161	73.856	7.526	52.864	320.330
			%	26,9	1,1	30,0	23,1	2,3	16,5	100,0
		I	N	9.690	625	17.355	11.020	1.842	4.554	45.086
			%	21,5	1,4	38,5	24,4	4,1	10,1	100,0
		II	N	7.565	814	14.619	8.461	2.357	3.407	37.223
			%	20,3	2,2	39,3	22,7	6,3	9,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 192. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
25-44	III	N	18.336	876	27.819	18.741	1.502	14.755	82.029
		%	22,4	1,1	33,9	22,8	1,8	18,0	100,0
	IV	N	35.063	1.142	25.764	24.444	1.473	22.840	110.725
		%	31,7	1,0	23,3	22,1	1,3	20,6	100,0
	V	N	15.596	217	10.603	11.190	352	7.309	45.267
		%	34,5	0,5	23,4	24,7	0,8	16,1	100,0
45-64	Total	N	80.228	2.637	57.030	44.813	5.895	122.996	313.598
		%	25,6	0,8	18,2	14,3	1,9	39,2	100,0
	I	N	7.920	658	10.483	4.127	1.820	7.108	32.116
		%	24,7	2,1	32,6	12,9	5,7	22,1	100,0
	II	N	8.754	358	6.444	5.269	730	5.237	26.792
		%	32,7	1,3	24,1	19,7	2,7	19,5	100,0
	III	N	24.472	641	19.748	9.496	1.783	32.501	88.641
		%	27,6	0,7	22,3	10,7	2,0	36,7	100,0
	IV	N	23.042	980	13.295	12.578	1.125	53.081	104.102
		%	22,1	0,9	12,8	12,1	1,1	51,0	100,0
	V	N	16.040	.	7.060	13.342	436	25.070	61.946
		%	25,9	.	11,4	21,5	0,7	40,5	100,0
65-74	Total	N	10.545	.	936	1.166	106	97.017	109.770
		%	9,6	.	0,9	1,1	0,1	88,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 192. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Mujeres	65-74	I	N	386	.	95	182	.	6.535	7.199
			%	5,4	.	1,3	2,5	.	90,8	100,0
		II	N	737	.	157	482	.	5.848	7.225
			%	10,2	.	2,2	6,7	.	80,9	100,0
		III	N	1.886	.	133	209	106	20.565	22.899
			%	8,2	.	0,6	0,9	0,5	89,8	100,0
		IV	N	5.431	.	280	293	.	44.130	50.134
			%	10,8	.	0,6	0,6	.	88,0	100,0
		V	N	2.104	.	270	.	.	19.938	22.312
			%	9,4	.	1,2	.	.	89,4	100,0
	>=75	Total	N	6.034	147	231	689	.	134.161	141.261
			%	4,3	0,1	0,2	0,5	.	95,0	100,0
		I	N	161	5.714	5.875
			%	2,7	97,3	100,0
II		N	375	9.916	10.292	
		%	3,6	96,4	100,0	
III		N	1.672	.	.	115	.	26.681	28.468	
		%	5,9	.	.	0,4	.	93,7	100,0	
IV		N	1.501	147	132	573	.	61.513	63.866	
		%	2,4	0,2	0,2	0,9	.	96,3	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 192. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Mujeres	>=75	V	N	2.325	.	99	.	.	30.336	32.760
			%	7,1	.	0,3	.	.	92,6	100,0
Ambos	Total	Total	N	350.024	23.421	523.131	241.277	33.670	715.833	1.887.356
			%	18,5	1,2	27,7	12,8	1,8	37,9	100,0
		I	N	45.214	4.357	81.040	35.359	5.901	46.657	218.528
			%	20,7	2,0	37,1	16,2	2,7	21,4	100,0
		II	N	35.382	2.947	54.517	25.847	6.067	48.474	173.234
			%	20,4	1,7	31,5	14,9	3,5	28,0	100,0
		III	N	85.916	4.644	122.536	54.052	7.993	155.322	430.462
			%	20,0	1,1	28,5	12,6	1,9	36,1	100,0
		IV	N	131.915	9.508	220.591	89.218	11.806	347.709	810.747
			%	16,3	1,2	27,2	11,0	1,5	42,9	100,0
		V	N	51.597	1.965	44.448	36.801	1.903	117.671	254.385
			%	20,3	0,8	17,5	14,5	0,7	46,3	100,0
	15-24	Total	N	59.884	7.172	33.356	58.093	6.463	17.466	182.434
			%	32,8	3,9	18,3	31,8	3,5	9,6	100,0
		I	N	11.625	983	5.983	10.098	261	246	29.196
			%	39,8	3,4	20,5	34,6	0,9	0,8	100,0
		II	N	11.135	1.117	3.078	6.582	957	1.614	24.485
			%	45,5	4,6	12,6	26,9	3,9	6,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 192. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total	
15-24	III	N	11.708	1.430	7.871	11.515	1.838	2.538	36.900	
		%	31,7	3,9	21,3	31,2	5,0	6,9	100,0	
	IV	N	20.965	3.300	12.702	25.397	3.019	8.967	74.351	
		%	28,2	4,4	17,1	34,2	4,1	12,1	100,0	
	V	N	4.451	341	3.721	4.501	386	4.102	17.503	
		%	25,4	1,9	21,3	25,7	2,2	23,4	100,0	
25-44	Total	N	135.666	9.740	280.405	110.748	16.006	104.074	656.640	
		%	20,7	1,5	42,7	16,9	2,4	15,8	100,0	
	I	N	16.232	2.326	42.698	17.160	2.556	7.845	88.818	
		%	18,3	2,6	48,1	19,3	2,9	8,8	100,0	
	II	N	10.024	990	34.507	11.787	4.379	8.032	69.719	
		%	14,4	1,4	49,5	16,9	6,3	11,5	100,0	
	III	N	30.681	1.528	61.023	26.048	3.804	21.202	144.286	
		%	21,3	1,1	42,3	18,1	2,6	14,7	100,0	
	IV	N	57.779	3.698	118.231	38.937	4.489	47.983	271.117	
		%	21,3	1,4	43,6	14,4	1,7	17,7	100,0	
	V	N	20.950	1.197	23.946	16.817	777	19.012	82.699	
		%	25,3	1,4	29,0	20,3	0,9	23,0	100,0	
	45-64	Total	N	129.644	6.362	202.642	68.409	10.670	198.239	615.965
			%	21,0	1,0	32,9	11,1	1,7	32,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 192. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Ambos	45-64	I	N	15.845	1.048	30.619	7.675	2.969	11.867	70.023
			%	22,6	1,5	43,7	11,0	4,2	16,9	100,0
		II	N	12.706	839	15.891	6.827	730	13.217	50.212
			%	25,3	1,7	31,6	13,6	1,5	26,3	100,0
		III	N	38.343	1.685	53.123	15.181	2.245	44.386	154.963
			%	24,7	1,1	34,3	9,8	1,4	28,6	100,0
		IV	N	41.795	2.362	87.195	23.379	3.987	95.998	254.716
			%	16,4	0,9	34,2	9,2	1,6	37,7	100,0
		V	N	20.954	427	15.814	15.347	740	32.771	86.052
			%	24,3	0,5	18,4	17,8	0,9	38,1	100,0
	65-74	Total	N	16.108	.	5.204	2.168	531	181.493	205.503
			%	7,8	.	2,5	1,1	0,3	88,3	100,0
		I	N	1.350	.	1.596	426	114	17.465	20.952
			%	6,4	.	7,6	2,0	0,5	83,4	100,0
		II	N	1.141	.	1.041	482	.	11.423	14.087
			%	8,1	.	7,4	3,4	.	81,1	100,0
		III	N	2.860	.	519	694	106	40.497	44.676
			%	6,4	.	1,2	1,6	0,2	90,6	100,0
		IV	N	8.284	.	1.181	430	311	87.681	97.887
			%	8,5	.	1,2	0,4	0,3	89,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 192. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total	
Ambos	65-74	V	N	2.472	.	867	136	.	24.427	27.901
		%	8,9	.	3,1	0,5	.	87,5	100,0	
	>=75	Total	N	8.722	147	1.525	1.859	.	214.561	226.814
		%	3,8	0,1	0,7	0,8	.	94,6	100,0	
	I	N	161	.	143	.	.	9.234	9.538	
		%	1,7	.	1,5	.	.	96,8	100,0	
	II	N	375	.	.	169	.	14.186	14.731	
		%	2,5	.	.	1,1	.	96,3	100,0	
	III	N	2.324	.	.	614	.	46.700	49.638	
		%	4,7	.	.	1,2	.	94,1	100,0	
	IV	N	3.091	147	1.282	1.075	.	107.080	112.676	
		%	2,7	0,1	1,1	1,0	.	95,0	100,0	
	V	N	2.771	.	99	.	.	37.361	40.231	
		%	6,9	.	0,2	.	.	92,9	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 193. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Hombres Total	Total	N	137.113	14.078	356.005	89.743	15.641	302.543	915.124
		%	15,0	1,5	38,9	9,8	1,7	33,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	22.700	759	48.716	11.146	2.180	125.098	210.600
		%	10,8	0,4	23,1	5,3	1,0	59,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	31.365	1.562	49.171	20.750	2.290	62.315	167.454
		%	18,7	0,9	29,4	12,4	1,4	37,2	100,0
	Secundaria, superior	N	54.961	7.342	174.223	35.443	7.006	81.696	360.670
		%	15,2	2,0	48,3	9,8	1,9	22,7	100,0
	Terciaria	N	28.087	4.415	83.894	22.405	4.165	33.434	176.400
		%	15,9	2,5	47,6	12,7	2,4	19,0	100,0
15-24	Total	N	30.030	4.287	20.398	27.084	1.960	10.700	94.458
		%	31,8	4,5	21,6	28,7	2,1	11,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.452	245	1.193	2.668	.	1.360	9.918
		%	44,9	2,5	12,0	26,9	.	13,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	13.486	929	3.252	8.187	611	4.664	31.129
		%	43,3	3,0	10,4	26,3	2,0	15,0	100,0
	Secundaria, superior	N	9.985	2.697	12.824	12.533	1.349	3.452	42.840
		%	23,3	6,3	29,9	29,3	3,1	8,1	100,0
	Terciaria	N	2.108	415	3.129	3.696	.	1.224	10.572
		%	19,9	3,9	29,6	35,0	.	11,6	100,0
25-44	Total	N	49.416	6.067	184.244	36.892	8.480	51.210	336.309

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 193. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total		
Hombres	25-44	Total	%	14,7	1,8	54,8	11,0	2,5	15,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	6.282	.	15.059	4.472	1.038	10.924	37.776	
			%	16,6	.	39,9	11,8	2,7	28,9	100,0	
		Secundaria, inferior	N	8.593	307	23.155	8.368	601	11.785	52.808	
			%	16,3	0,6	43,8	15,8	1,1	22,3	100,0	
		Secundaria, superior	N	23.502	2.904	99.008	12.781	4.099	21.980	164.274	
			%	14,3	1,8	60,3	7,8	2,5	13,4	100,0	
		Terciaria	N	11.038	2.856	47.024	11.271	2.742	6.521	81.451	
			%	13,6	3,5	57,7	13,8	3,4	8,0	100,0	
		45-64	Total	N	49.416	3.725	145.801	23.596	4.776	75.342	302.655
			%	16,3	1,2	48,2	7,8	1,6	24,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	8.316	513	30.668	3.830	831	26.241	70.400	
			%	11,8	0,7	43,6	5,4	1,2	37,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	8.530	327	21.571	3.446	1.078	18.294	53.244	
			%	16,0	0,6	40,5	6,5	2,0	34,4	100,0	
		Secundaria, superior	N	18.667	1.740	61.490	9.441	1.558	24.234	117.130	
			%	15,9	1,5	52,5	8,1	1,3	20,7	100,0	
		Terciaria	N	13.904	1.144	32.073	6.879	1.308	6.573	61.881	
		%	22,5	1,8	51,8	11,1	2,1	10,6	100,0		
	65-74	Total	N	5.563	.	4.268	1.002	425	84.476	95.733	
		%	5,8	.	4,5	1,0	0,4	88,2	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 193. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

		Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Hombres 65-74	Sin estudios, primaria	N 1.811	.	1.079	176	311	34.640	38.017
		% 4,8	.	2,8	0,5	0,8	91,1	100,0
	Secundaria, inferior	N 672	.	762	136	.	14.722	16.291
		% 4,1	.	4,7	0,8	.	90,4	100,0
	Secundaria, superior	N 2.042	.	901	131	.	22.874	25.948
		% 7,9	.	3,5	0,5	.	88,2	100,0
	Terciaria	N 1.038	.	1.526	560	114	12.239	15.477
		% 6,7	.	9,9	3,6	0,7	79,1	100,0
	>=75 Total	N 2.688	.	1.294	1.170	.	80.816	85.968
		% 3,1	.	1,5	1,4	.	94,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N 1.838	.	718	.	.	51.932	54.489
		% 3,4	.	1,3	.	.	95,3	100,0
	Secundaria, inferior	N 84	.	433	613	.	12.851	13.981
		% 0,6	.	3,1	4,4	.	91,9	100,0
Secundaria, superior	N 765	.	.	557	.	9.156	10.478	
	% 7,3	.	.	5,3	.	87,4	100,0	
Terciaria	N .	.	143	.	.	6.877	7.020	
	% .	.	2,0	.	.	98,0	100,0	
Mujeres Total	Total	N 213.436	9.343	167.315	151.994	18.029	415.766	975.882
		% 21,9	1,0	17,1	15,6	1,8	42,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 193. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Mujeres	Total	Sin estudios, primaria	N 36.090	350	14.839	19.758	1.136	206.154	278.327
			% 13,0	0,1	5,3	7,1	0,4	74,1	100,0
		Secundaria, inferior	N 35.269	1.710	17.200	21.889	1.314	92.385	169.766
			% 20,8	1,0	10,1	12,9	0,8	54,4	100,0
		Secundaria, superior	N 88.625	2.958	68.513	59.447	5.669	82.654	307.866
			% 28,8	1,0	22,3	19,3	1,8	26,8	100,0
		Terciaria	N 53.452	4.325	66.763	50.900	9.909	34.574	219.923
			% 24,3	2,0	30,4	23,1	4,5	15,7	100,0
	15-24	Total	N 30.110	2.885	12.957	31.470	4.503	7.574	89.499
			% 33,6	3,2	14,5	35,2	5,0	8,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N 5.203	.	1.392	3.837	163	791	11.386
			% 45,7	.	12,2	33,7	1,4	6,9	100,0
		Secundaria, inferior	N 6.076	846	2.141	4.311	1.108	2.280	16.763
			% 36,2	5,0	12,8	25,7	6,6	13,6	100,0
		Secundaria, superior	N 13.652	987	6.169	18.638	2.676	3.321	45.443
			% 30,0	2,2	13,6	41,0	5,9	7,3	100,0
		Terciaria	N 5.178	1.051	3.256	4.685	555	1.181	15.907
			% 32,6	6,6	20,5	29,5	3,5	7,4	100,0
	25-44	Total	N 86.520	3.673	96.161	73.856	7.526	53.090	320.826
			% 27,0	1,1	30,0	23,0	2,3	16,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 193. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Mujeres	25-44	Sin estudios, primaria	N 5.403	.	6.387	4.854	.	9.345	25.990
			% 20,8	.	24,6	18,7	.	36,0	100,0
		Secundaria, inferior	N 12.082	650	8.383	7.387	.	10.436	38.937
			% 31,0	1,7	21,5	19,0	.	26,8	100,0
		Secundaria, superior	N 40.725	1.375	38.579	26.939	1.851	21.018	130.487
			% 31,2	1,1	29,6	20,6	1,4	16,1	100,0
		Terciaria	N 28.309	1.649	42.812	34.675	5.675	12.291	125.412
			% 22,6	1,3	34,1	27,6	4,5	9,8	100,0
	45-64	Total	N 80.228	2.637	57.030	44.813	5.895	123.167	313.769
			% 25,6	0,8	18,2	14,3	1,9	39,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N 15.998	203	6.402	10.558	973	43.829	77.963
			% 20,5	0,3	8,2	13,5	1,2	56,2	100,0
		Secundaria, inferior	N 13.874	214	6.554	9.764	101	31.228	61.735
			% 22,5	0,3	10,6	15,8	0,2	50,6	100,0
		Secundaria, superior	N 32.015	596	23.632	13.456	1.142	39.480	110.322
			% 29,0	0,5	21,4	12,2	1,0	35,8	100,0
		Terciaria	N 18.340	1.624	20.442	11.034	3.679	8.630	63.749
			% 28,8	2,5	32,1	17,3	5,8	13,5	100,0
	65-74	Total	N 10.545	.	936	1.166	106	97.172	109.925
			% 9,6	.	0,9	1,1	0,1	88,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 193. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total	
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N 5.202	.	427	293	.	55.931	61.852	
			% 8,4	.	0,7	0,5	.	90,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N 2.603	.	122	182	106	24.439	27.452	
			% 9,5	.	0,4	0,7	0,4	89,0	100,0	
		Secundaria, superior	N 1.349	.	133	185	.	10.226	11.893	
			% 11,3	.	1,1	1,6	.	86,0	100,0	
		Terciaria	N 1.391	.	254	506	.	6.576	8.727	
			% 15,9	.	2,9	5,8	.	75,4	100,0	
		>=75	Total	N 6.034	147	231	689	.	134.764	141.864
				% 4,3	0,1	0,2	0,5	.	95,0	100,0
			Sin estudios, primaria	N 4.284	147	231	216	.	96.259	101.136
				% 4,2	0,1	0,2	0,2	.	95,2	100,0
			Secundaria, inferior	N 633	.	.	244	.	24.002	24.879
				% 2,5	.	.	1,0	.	96,5	100,0
			Secundaria, superior	N 884	.	.	228	.	8.608	9.720
				% 9,1	.	.	2,3	.	88,6	100,0
			Terciaria	N 233	5.896	6.129
				% 3,8	96,2	100,0
Ambos	Total	Total	N 350.549	23.421	523.320	241.738	33.670	718.309	1.891.006	
			% 18,5	1,2	27,7	12,8	1,8	38,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 193. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

		Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Ambos	Total	N 58.790	1.109	63.555	30.905	3.316	331.253	488.927
		% 12,0	0,2	13,0	6,3	0,7	67,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N 66.634	3.272	66.371	42.639	3.605	154.700	337.220
		% 19,8	1,0	19,7	12,6	1,1	45,9	100,0
	Secundaria, inferior	N 143.586	10.300	242.736	94.889	12.675	164.350	668.536
		% 21,5	1,5	36,3	14,2	1,9	24,6	100,0
	Secundaria, superior	N 81.539	8.740	150.658	73.304	14.074	68.008	396.323
		% 20,6	2,2	38,0	18,5	3,6	17,2	100,0
	Terciaria	N 60.140	7.172	33.356	58.554	6.463	18.274	183.958
		% 32,7	3,9	18,1	31,8	3,5	9,9	100,0
	15-24 Total	N 9.655	245	2.585	6.505	163	2.151	21.304
		% 45,3	1,2	12,1	30,5	0,8	10,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N 19.562	1.775	5.393	12.498	1.719	6.944	47.891
		% 40,8	3,7	11,3	26,1	3,6	14,5	100,0
	Secundaria, inferior	N 23.636	3.685	18.993	31.171	4.025	6.773	88.283
		% 26,8	4,2	21,5	35,3	4,6	7,7	100,0
	Secundaria, superior	N 7.286	1.467	6.384	8.380	555	2.406	26.479
		% 27,5	5,5	24,1	31,6	2,1	9,1	100,0
	Terciaria	N 135.935	9.740	280.405	110.748	16.006	104.300	657.135
		% 20,7	1,5	42,7	16,9	2,4	15,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 193. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Ambos	25-44	Sin estudios, primaria	N 11.686	.	21.445	9.327	1.038	20.270	63.765
			% 18,3	.	33,6	14,6	1,6	31,8	100,0
		Secundaria, inferior	N 20.675	956	31.537	15.755	601	22.220	91.745
			% 22,5	1,0	34,4	17,2	0,7	24,2	100,0
		Secundaria, superior	N 64.227	4.279	137.587	39.720	5.950	42.998	294.762
			% 21,8	1,5	46,7	13,5	2,0	14,6	100,0
		Terciaria	N 39.348	4.505	89.836	45.946	8.417	18.811	206.862
			% 19,0	2,2	43,4	22,2	4,1	9,1	100,0
	45-64	Total	N 129.644	6.362	202.831	68.409	10.670	198.509	616.424
			% 21,0	1,0	32,9	11,1	1,7	32,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N 24.314	716	37.070	14.388	1.804	70.070	148.363
			% 16,4	0,5	25,0	9,7	1,2	47,2	100,0
		Secundaria, inferior	N 22.404	541	28.124	13.210	1.179	49.521	114.979
			% 19,5	0,5	24,5	11,5	1,0	43,1	100,0
		Secundaria, superior	N 50.682	2.336	85.122	22.897	2.700	63.714	227.452
			% 22,3	1,0	37,4	10,1	1,2	28,0	100,0
		Terciaria	N 32.243	2.768	52.514	17.913	4.987	15.203	125.630
			% 25,7	2,2	41,8	14,3	4,0	12,1	100,0
	65-74	Total	N 16.108	.	5.204	2.168	531	181.648	205.658
			% 7,8	.	2,5	1,1	0,3	88,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 193. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

			Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No realiza estos trayectos	Total
Ambos	65-74	Sin estudios, primaria	N 7.013	.	1.506	469	311	90.571	99.869
			% 7,0	.	1,5	0,5	0,3	90,7	100,0
		Secundaria, inferior	N 3.275	.	883	318	106	39.161	43.744
			% 7,5	.	2,0	0,7	0,2	89,5	100,0
		Secundaria, superior	N 3.391	.	1.034	316	.	33.100	37.841
			% 9,0	.	2,7	0,8	.	87,5	100,0
		Terciaria	N 2.429	.	1.780	1.065	114	18.815	24.204
			% 10,0	.	7,4	4,4	0,5	77,7	100,0
	>=75	Total	N 8.722	147	1.525	1.859	.	215.580	227.832
			% 3,8	0,1	0,7	0,8	.	94,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N 6.122	147	949	216	.	148.191	155.625
			% 3,9	0,1	0,6	0,1	.	95,2	100,0
		Secundaria, inferior	N 718	.	433	857	.	36.853	38.860
			% 1,8	.	1,1	2,2	.	94,8	100,0
		Secundaria, superior	N 1.649	.	.	785	.	17.764	20.198
			% 8,2	.	.	3,9	.	87,9	100,0
		Terciaria	N 233	.	143	.	.	12.772	13.149
			% 1,8	.	1,1	.	.	97,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 194. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,5	0,9	8,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	7,7	1,1	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,7	1,3	8,0	7,0	8,0
	15-24	CAPV	8,1	1,1	8,0	8,0	9,0
		Araba	7,9	0,9	8,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	8,2	1,0	8,0	8,0	9,0
		Bizkaia	8,2	1,3	8,0	8,0	9,0
	25-44	CAPV	7,5	1,2	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,3	0,9	7,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,6	1,3	8,0	7,0	8,0
	45-64	CAPV	7,4	1,1	7,0	7,0	8,0
		Araba	7,3	0,8	7,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	7,4	1,0	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,5	1,2	8,0	7,0	8,0
	65-74	CAPV	7,8	1,1	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,5	0,9	7,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	7,9	1,1	8,0	7,0	9,0
		Bizkaia	7,8	1,1	8,0	7,0	8,0
>=75	CAPV	8,0	1,4	8,0	7,0	9,0	
	Araba	7,8	1,1	8,0	7,0	9,0	
	Gipuzkoa	8,3	1,1	8,0	7,0	9,0	
	Bizkaia	8,0	1,6	8,0	7,0	9,0	
Mujeres	Total	CAPV	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,5	1,0	8,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,6	1,3	8,0	7,0	8,0
	15-24	CAPV	8,1	1,2	8,0	7,0	9,0
		Araba	8,1	1,1	8,0	7,0	9,0
		Gipuzkoa	8,2	1,1	8,0	7,0	9,0
		Bizkaia	8,1	1,3	8,0	7,0	9,0
	25-44	CAPV	7,7	1,2	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,6	1,0	8,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	7,7	1,1	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,8	1,4	8,0	7,0	8,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 194. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	45-64	CAPV	7,4	0,9	7,0	7,0	8,0
		Araba	7,2	0,8	7,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	7,4	0,9	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,4	1,1	7,0	7,0	8,0
	65-74	CAPV	7,3	1,1	7,0	7,0	8,0
		Araba	7,0	0,9	7,0	6,0	8,0
		Gipuzkoa	7,3	1,0	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,4	1,2	7,0	7,0	8,0
	>=75	CAPV	7,8	1,4	8,0	7,0	9,0
		Araba	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	8,0	1,3	8,0	7,0	9,0
		Bizkaia	7,7	1,6	8,0	6,0	8,0
Ambos sexos	Total	CAPV	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,5	0,9	8,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	7,7	1,1	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,6	1,3	8,0	7,0	8,0
	15-24	CAPV	8,1	1,1	8,0	7,0	9,0
		Araba	8,0	1,0	8,0	7,0	9,0
		Gipuzkoa	8,2	1,1	8,0	8,0	9,0
		Bizkaia	8,1	1,3	8,0	7,0	9,0
	25-44	CAPV	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,4	1,0	8,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,7	1,4	8,0	7,0	8,0
	45-64	CAPV	7,4	1,0	7,0	7,0	8,0
		Araba	7,3	0,8	7,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	7,4	0,9	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,4	1,2	7,0	7,0	8,0
	65-74	CAPV	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,2	0,9	7,0	6,0	8,0
		Gipuzkoa	7,6	1,0	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
>=75	CAPV	7,9	1,4	8,0	7,0	9,0	
	Araba	7,7	1,1	8,0	7,0	8,0	
	Gipuzkoa	8,1	1,3	8,0	7,0	9,0	
	Bizkaia	7,8	1,6	8,0	7,0	9,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 195. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Hombres	Total	Total	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0	
		I	7,5	1,0	8,0	7,0	8,0	
		II	7,6	1,0	8,0	7,0	8,0	
		III	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0	
		IV	7,7	1,2	8,0	7,0	8,0	
		V	7,6	1,3	8,0	7,0	8,0	
		15-24	Total	8,2	1,1	8,0	8,0	9,0
			I	7,9	0,9	8,0	8,0	8,0
			II	7,9	1,0	8,0	7,0	8,0
			III	8,1	1,1	8,0	8,0	9,0
			IV	8,3	1,1	8,0	8,0	9,0
			V	8,2	1,3	8,0	7,0	9,0
		25-44	Total	7,5	1,2	8,0	7,0	8,0
			I	7,4	1,0	7,0	7,0	8,0
			II	7,5	1,1	7,0	7,0	8,0
			III	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
			IV	7,6	1,3	8,0	7,0	8,0
			V	7,7	1,4	8,0	7,0	8,0
		45-64	Total	7,4	1,1	7,0	7,0	8,0
			I	7,4	0,9	7,0	7,0	8,0
			II	7,6	0,9	8,0	7,0	8,0
			III	7,5	1,0	7,0	7,0	8,0
			IV	7,4	1,1	8,0	7,0	8,0
			V	7,2	1,1	8,0	7,0	8,0
		65-74	Total	7,8	1,1	8,0	7,0	8,0
			I	7,7	1,0	8,0	7,0	8,0
			II	7,9	0,9	8,0	7,0	8,0
			III	7,6	1,2	7,0	6,0	8,0
			IV	7,8	1,1	8,0	7,0	8,0
		V	8,1	1,0	8,0	7,0	9,0	
	>=75	Total	8,1	1,4	8,0	7,0	9,0	
		I	7,7	1,1	8,0	7,0	8,0	
		II	7,7	1,4	8,0	6,0	9,0	
		III	8,2	1,2	8,0	7,0	9,0	
		IV	8,1	1,4	8,0	7,0	9,0	
		V	7,6	1,4	8,0	7,0	9,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 195. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Mujeres	Total	Total	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0	
		I	7,7	1,0	8,0	7,0	8,0	
		II	7,7	1,1	8,0	7,0	8,0	
		III	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0	
		IV	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0	
		V	7,6	1,3	8,0	7,0	8,0	
		15-24	Total	8,1	1,2	8,0	7,0	9,0
			I	8,0	1,0	8,0	7,0	9,0
			II	8,0	1,0	8,0	7,0	8,0
			III	8,2	1,2	8,0	8,0	9,0
			IV	8,1	1,2	8,0	7,0	9,0
			V	8,3	1,8	8,0	7,0	10,0
		25-44	Total	7,7	1,2	8,0	7,0	8,0
			I	7,6	1,0	8,0	7,0	8,0
			II	7,7	1,0	8,0	7,0	8,0
			III	7,7	1,1	8,0	7,0	8,0
			IV	7,7	1,3	8,0	7,0	8,0
			V	7,7	1,6	8,0	7,0	8,0
		45-64	Total	7,4	0,9	7,0	7,0	8,0
			I	7,4	0,8	7,0	7,0	8,0
			II	7,4	1,0	7,0	7,0	8,0
			III	7,4	0,9	7,0	7,0	8,0
			IV	7,4	1,0	8,0	7,0	8,0
			V	7,2	1,0	7,0	6,0	8,0
		65-74	Total	7,3	1,1	7,0	7,0	8,0
			I	7,9	1,5	8,0	7,0	8,0
			II	7,4	1,0	8,0	7,0	8,0
			III	7,3	1,1	8,0	6,0	8,0
			IV	7,2	1,0	7,0	6,0	8,0
		V	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0	
	>=75	Total	7,8	1,4	8,0	7,0	9,0	
		I	8,3	1,2	8,0	8,0	9,0	
		II	7,9	1,5	8,0	7,0	9,0	
		III	7,8	1,6	8,0	7,0	9,0	
		IV	7,6	1,3	8,0	6,0	8,0	
		V	8,0	1,5	8,0	7,0	9,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 195. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Ambos sexos	Total	Total	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0	
		I	7,6	1,0	8,0	7,0	8,0	
		II	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0	
		III	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0	
		IV	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0	
		V	7,6	1,3	8,0	7,0	8,0	
		15-24	Total	8,1	1,2	8,0	7,0	9,0
			I	7,9	1,0	8,0	7,0	8,0
			II	7,9	1,0	8,0	7,0	8,0
			III	8,2	1,1	8,0	8,0	9,0
			IV	8,2	1,2	8,0	8,0	9,0
			V	8,3	1,6	8,0	7,0	10,0
		25-44	Total	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
			I	7,5	1,0	8,0	7,0	8,0
			II	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0
			III	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0
			IV	7,6	1,3	8,0	7,0	8,0
			V	7,7	1,6	8,0	7,0	8,0
		45-64	Total	7,4	1,0	7,0	7,0	8,0
			I	7,4	0,9	7,0	7,0	8,0
			II	7,5	1,0	8,0	7,0	8,0
			III	7,4	0,9	7,0	7,0	8,0
			IV	7,4	1,0	8,0	7,0	8,0
			V	7,2	1,1	7,0	6,0	8,0
		65-74	Total	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
		I	7,8	1,1	8,0	7,0	8,0	
		II	7,7	1,0	8,0	7,0	8,0	
		III	7,5	1,2	8,0	6,0	8,0	
		IV	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0	
		V	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0	
	>=75	Total	7,9	1,4	8,0	7,0	9,0	
		I	8,0	1,2	8,0	7,0	8,0	
		II	7,9	1,5	8,0	7,0	9,0	
		III	8,0	1,4	8,0	7,0	9,0	
		IV	7,8	1,4	8,0	7,0	9,0	
		V	7,9	1,5	8,0	7,0	9,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 196. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Hombres	Total	Total	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0	
		Sin estudios, primaria	7,8	1,3	8,0	7,0	8,0	
		Secundaria, inferior	7,7	1,3	8,0	7,0	8,0	
		Secundaria, superior	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0	
		Terciaria	7,5	1,0	8,0	7,0	8,0	
		15-24	Total	8,1	1,1	8,0	8,0	9,0
			Sin estudios, primaria	8,7	1,3	9,0	8,0	10,0
			Secundaria, inferior	8,3	1,1	8,0	8,0	9,0
			Secundaria, superior	8,0	1,1	8,0	7,0	9,0
			Terciaria	8,1	0,9	8,0	8,0	8,0
		25-44	Total	7,5	1,2	8,0	7,0	8,0
			Sin estudios, primaria	7,7	1,4	8,0	7,0	8,0
			Secundaria, inferior	7,5	1,3	8,0	7,0	8,0
			Secundaria, superior	7,5	1,2	8,0	7,0	8,0
			Terciaria	7,5	1,0	8,0	7,0	8,0
		45-64	Total	7,4	1,1	7,0	7,0	8,0
			Sin estudios, primaria	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
			Secundaria, inferior	7,4	1,2	8,0	7,0	8,0
			Secundaria, superior	7,4	1,0	7,0	7,0	8,0
			Terciaria	7,4	0,9	7,0	7,0	8,0
		65-74	Total	7,8	1,1	8,0	7,0	8,0
			Sin estudios, primaria	7,9	1,1	8,0	7,0	9,0
			Secundaria, inferior	7,8	1,1	8,0	7,0	9,0
		Secundaria, superior	7,7	1,0	8,0	7,0	8,0	
		Terciaria	7,7	1,0	8,0	7,0	8,0	
	>=75	Total	8,0	1,4	8,0	7,0	9,0	
		Sin estudios, primaria	8,0	1,4	8,0	7,0	9,0	
		Secundaria, inferior	8,3	1,2	8,0	7,0	9,0	
		Secundaria, superior	8,2	1,3	8,0	7,0	9,0	
		Terciaria	7,7	1,2	8,0	7,0	9,0	
Mujeres	Total	Total	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0	
		Sin estudios, primaria	7,5	1,3	8,0	7,0	8,0	
		Secundaria, inferior	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0	
		Secundaria, superior	7,7	1,1	8,0	7,0	8,0	
		Terciaria	7,6	1,0	8,0	7,0	8,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 196. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Mujeres	15-24	Total	8,1	1,2	8,0	7,0	9,0
		Sin estudios, primaria	8,2	1,2	8,0	8,0	9,0
		Secundaria, inferior	8,1	1,3	8,0	7,0	9,0
		Secundaria, superior	8,2	1,2	8,0	7,0	9,0
		Terciaria	7,9	1,1	8,0	7,0	8,0
	25-44	Total	7,7	1,2	8,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,7	1,5	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,7	1,6	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, superior	7,7	1,2	8,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,7	1,1	8,0	7,0	8,0
	45-64	Total	7,4	0,9	7,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,3	1,0	7,0	7,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,3	1,0	7,0	7,0	8,0
		Secundaria, superior	7,5	0,9	8,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,2	0,9	7,0	7,0	8,0
	65-74	Total	7,3	1,1	7,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,3	1,1	7,0	6,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,4	1,1	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, superior	7,0	1,0	7,0	6,0	8,0
		Terciaria	7,8	0,8	8,0	7,0	8,0
>=75	Total	7,8	1,4	8,0	7,0	9,0	
	Sin estudios, primaria	7,7	1,4	8,0	7,0	8,0	
	Secundaria, inferior	8,0	1,4	8,0	7,0	9,0	
	Secundaria, superior	7,8	1,4	8,0	7,0	8,0	
	Terciaria	7,9	1,4	8,0	7,0	9,0	
Ambos sexos	Total	Total	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,6	1,3	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,7	1,2	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, superior	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,6	1,0	8,0	7,0	8,0
	15-24	Total	8,1	1,1	8,0	7,0	9,0
		Sin estudios, primaria	8,4	1,3	8,0	8,0	9,0
		Secundaria, inferior	8,2	1,2	8,0	8,0	9,0
		Secundaria, superior	8,1	1,1	8,0	7,0	9,0
		Terciaria	8,0	1,0	8,0	7,0	8,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 196. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

	Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos 25-44 Total	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
Sin estudios, primaria	7,7	1,4	8,0	7,0	8,0
Secundaria, inferior	7,6	1,5	8,0	7,0	8,0
Secundaria, superior	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
Terciaria	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0
45-64 Total	7,4	1,0	7,0	7,0	8,0
Sin estudios, primaria	7,4	1,1	8,0	7,0	8,0
Secundaria, inferior	7,4	1,1	7,0	7,0	8,0
Secundaria, superior	7,5	1,0	8,0	7,0	8,0
Terciaria	7,3	0,9	7,0	7,0	8,0
65-74 Total	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
Sin estudios, primaria	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
Secundaria, inferior	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
Secundaria, superior	7,5	1,0	8,0	7,0	8,0
Terciaria	7,8	0,9	8,0	7,0	8,0
>=75 Total	7,9	1,4	8,0	7,0	9,0
Sin estudios, primaria	7,8	1,4	8,0	7,0	9,0
Secundaria, inferior	8,1	1,3	8,0	7,0	9,0
Secundaria, superior	8,0	1,3	8,0	7,0	9,0
Terciaria	7,8	1,3	8,0	7,0	9,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 197. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico

		<5 horas			5-6 horas	>=7 horas	Total
Hombres	Total	CAPV	N	2.776	126.644	785.703	915.124
			%	0,3	13,8	85,9	100,0
		Araba	N	104	23.133	110.514	133.751
			%	0,1	17,3	82,6	100,0
		Gipuzkoa	N	908	35.906	256.998	293.812
			%	0,3	12,2	87,5	100,0
		Bizkaia	N	1.764	67.606	418.192	487.561
			%	0,4	13,9	85,8	100,0
	15-24	CAPV	N	.	3.129	91.330	94.458
			%	.	3,3	96,7	100,0
		Araba	N	.	501	14.369	14.869
			%	.	3,4	96,6	100,0
		Gipuzkoa	N	.	1.027	30.278	31.305
			%	.	3,3	96,7	100,0
		Bizkaia	N	.	1.601	46.683	48.284
			%	.	3,3	96,7	100,0
	25-44	CAPV	N	302	45.234	290.774	336.309
			%	0,1	13,5	86,5	100,0
		Araba	N	.	9.607	42.455	52.062
			%	.	18,5	81,5	100,0
		Gipuzkoa	N	302	13.054	93.434	106.790
			%	0,3	12,2	87,5	100,0
		Bizkaia	N	.	22.573	154.884	177.458
			%	.	12,7	87,3	100,0
	45-64	CAPV	N	1.606	50.687	250.362	302.655
			%	0,5	16,7	82,7	100,0
		Araba	N	104	7.731	34.916	42.751
			%	0,2	18,1	81,7	100,0
		Gipuzkoa	N	451	15.903	81.065	97.419
			%	0,5	16,3	83,2	100,0
		Bizkaia	N	1.051	27.053	134.381	162.485
			%	0,6	16,6	82,7	100,0
	65-74	CAPV	N	382	14.365	80.986	95.733
			%	0,4	15,0	84,6	100,0
		Araba	N	.	3.130	10.034	13.163
			%	.	23,8	76,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 197. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total	
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	155	3.430	28.544	32.130	
			%	0,5	10,7	88,8	100,0	
		Bizkaia	N	227	7.805	42.408	50.440	
			%	0,4	15,5	84,1	100,0	
	>=75	CAPV	N	486	13.230	72.252	85.968	
			%	0,6	15,4	84,0	100,0	
		Araba	N	.	2.164	8.740	10.905	
			%	.	19,8	80,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	.	2.492	23.677	26.168	
			%	.	9,5	90,5	100,0	
		Bizkaia	N	486	8.574	39.834	48.895	
			%	1,0	17,5	81,5	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	2.490	157.254	816.138	975.882
				%	0,3	16,1	83,6	100,0
		Araba	N	549	27.129	109.094	136.772	
			%	0,4	19,8	79,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	483	46.645	265.558	312.686	
			%	0,2	14,9	84,9	100,0	
		Bizkaia	N	1.459	83.481	441.485	526.425	
			%	0,3	15,9	83,9	100,0	
	15-24	CAPV	N	.	3.940	85.559	89.499	
			%	.	4,4	95,6	100,0	
		Araba	N	.	663	12.547	13.210	
			%	.	5,0	95,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	.	1.344	28.100	29.443	
			%	.	4,6	95,4	100,0	
	Bizkaia	N	.	1.934	44.912	46.846		
		%	.	4,1	95,9	100,0		
	25-44	CAPV	N	259	34.287	286.280	320.826	
			%	0,1	10,7	89,2	100,0	
Araba		N	.	7.151	40.718	47.869		
		%	.	14,9	85,1	100,0		
Gipuzkoa		N	.	11.280	90.625	101.905		
		%	.	11,1	88,9	100,0		
Bizkaia	N	259	15.856	154.937	171.052			
	%	0,2	9,3	90,6	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 197. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	424	60.522	252.823	313.769
			%	0,1	19,3	80,6	100,0
		Araba	N	256	10.287	33.720	44.263
			%	0,6	23,2	76,2	100,0
		Gipuzkoa	N	.	17.149	82.513	99.662
			%	.	17,2	82,8	100,0
	Bizkaia	N	168	33.085	136.590	169.843	
		%	0,1	19,5	80,4	100,0	
	65-74	CAPV	N	962	26.473	82.491	109.925
			%	0,9	24,1	75,0	100,0
		Araba	N	95	5.137	9.088	14.320
			%	0,7	35,9	63,5	100,0
		Gipuzkoa	N	.	8.730	27.390	36.120
			%	.	24,2	75,8	100,0
	Bizkaia	N	867	12.605	46.013	59.484	
		%	1,5	21,2	77,4	100,0	
	>=75	CAPV	N	846	32.033	108.985	141.864
			%	0,6	22,6	76,8	100,0
Araba		N	198	3.891	13.021	17.110	
		%	1,2	22,7	76,1	100,0	
Gipuzkoa		N	483	8.141	36.931	45.555	
		%	1,1	17,9	81,1	100,0	
Bizkaia	N	166	20.001	59.033	79.200		
	%	0,2	25,3	74,5	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	5.267	283.899	1.601.841	1.891.006
		%	0,3	15,0	84,7	100,0	
	Araba	N	653	50.262	219.608	270.523	
		%	0,2	18,6	81,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	1.391	82.550	522.556	606.497	
		%	0,2	13,6	86,2	100,0	
	Bizkaia	N	3.223	151.087	859.677	1.013.987	
		%	0,3	14,9	84,8	100,0	
	15-24	CAPV	N	.	7.069	176.889	183.958
			%	.	3,8	96,2	100,0
		Araba	N	.	1.163	26.916	28.079
			%	.	4,1	95,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 197. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico

			<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total	
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	.	2.371	58.378	60.748
			%	.	3,9	96,1	100,0
		Bizkaia	N	.	3.535	91.596	95.130
			%	.	3,7	96,3	100,0
	25-44	CAPV	N	560	79.520	577.054	657.135
			%	0,1	12,1	87,8	100,0
		Araba	N	.	16.757	83.173	99.930
			%	.	16,8	83,2	100,0
		Gipuzkoa	N	302	24.334	184.059	208.695
			%	0,1	11,7	88,2	100,0
		Bizkaia	N	259	38.430	309.821	348.509
			%	0,1	11,0	88,9	100,0
	45-64	CAPV	N	2.030	111.209	503.184	616.424
			%	0,3	18,0	81,6	100,0
		Araba	N	360	18.019	68.636	87.015
			%	0,4	20,7	78,9	100,0
		Gipuzkoa	N	451	33.052	163.578	197.081
			%	0,2	16,8	83,0	100,0
		Bizkaia	N	1.219	60.138	270.971	332.328
			%	0,4	18,1	81,5	100,0
	65-74	CAPV	N	1.344	40.837	163.477	205.658
			%	0,7	19,9	79,5	100,0
		Araba	N	95	8.267	19.121	27.483
			%	0,3	30,1	69,6	100,0
		Gipuzkoa	N	155	12.161	55.934	68.251
			%	0,2	17,8	82,0	100,0
		Bizkaia	N	1.093	20.409	88.421	109.924
			%	1,0	18,6	80,4	100,0
	>=75	CAPV	N	1.332	45.263	181.237	227.832
			%	0,6	19,9	79,5	100,0
		Araba	N	198	6.055	21.762	28.015
			%	0,7	21,6	77,7	100,0
		Gipuzkoa	N	483	10.633	60.607	71.723
			%	0,7	14,8	84,5	100,0
		Bizkaia	N	652	28.575	98.867	128.094
			%	0,5	22,3	77,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 198. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y clase social

		<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total	
Hombres	Total	Total N	2.776	125.942	785.145	913.863
		%	0,3	13,8	85,9	100,0
	I	N	.	14.529	99.161	113.690
		%	.	12,8	87,2	100,0
	II	N	.	9.163	69.043	78.206
		%	.	11,7	88,3	100,0
	III	N	672	23.748	163.935	188.355
		%	0,4	12,6	87,0	100,0
	IV	N	1.420	65.154	383.732	450.306
		%	0,3	14,5	85,2	100,0
	V	N	684	13.347	69.276	83.307
		%	0,8	16,0	83,2	100,0
	15-24	Total N	.	3.129	90.772	93.900
		%	.	3,3	96,7	100,0
	I	N	.	779	13.855	14.634
		%	.	5,3	94,7	100,0
	II	N	.	162	10.826	10.988
		%	.	1,5	98,5	100,0
	III	N	.	749	16.081	16.830
		%	.	4,5	95,5	100,0
	IV	N	.	842	41.895	42.737
		%	.	2,0	98,0	100,0
	V	N	.	596	8.115	8.711
		%	.	6,8	93,2	100,0
	25-44	Total N	302	45.234	290.774	336.309
		%	0,1	13,5	86,5	100,0
	I	N	.	5.399	38.334	43.732
		%	.	12,3	87,7	100,0
	II	N	.	4.773	27.724	32.496
		%	.	14,7	85,3	100,0
	III	N	302	6.245	55.710	62.257
		%	0,5	10,0	89,5	100,0
	IV	N	.	23.197	137.195	160.392
		%	.	14,5	85,5	100,0
	V	N	.	5.620	31.812	37.432
		%	.	15,0	85,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 198. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y clase social

		<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total		
Hombres	45-64	Total	N	1.606	50.400	250.362	302.368
			%	0,5	16,7	82,8	100,0
	I	N	.	5.878	32.029	37.907	
		%	.	15,5	84,5	100,0	
	II	N	.	2.381	21.038	23.419	
		%	.	10,2	89,8	100,0	
	III	N	143	8.943	57.235	66.322	
		%	0,2	13,5	86,3	100,0	
	IV	N	1.265	27.628	121.721	150.614	
		%	0,8	18,3	80,8	100,0	
	V	N	198	5.569	18.339	24.106	
		%	0,8	23,1	76,1	100,0	
	65-74	Total	N	382	14.365	80.986	95.733
			%	0,4	15,0	84,6	100,0
	I	N	.	2.020	11.733	13.753	
		%	.	14,7	85,3	100,0	
	II	N	.	340	6.523	6.862	
		%	.	5,0	95,0	100,0	
	III	N	227	5.313	16.237	21.777	
		%	1,0	24,4	74,6	100,0	
	IV	N	155	6.242	41.356	47.753	
		%	0,3	13,1	86,6	100,0	
	V	N	.	450	5.138	5.588	
		%	.	8,1	91,9	100,0	
	>=75	Total	N	486	12.815	72.252	85.553
			%	0,6	15,0	84,5	100,0
	I	N	.	454	3.210	3.663	
		%	.	12,4	87,6	100,0	
	II	N	.	1.507	2.932	4.440	
		%	.	33,9	66,1	100,0	
	III	N	.	2.497	18.673	21.169	
		%	.	11,8	88,2	100,0	
	IV	N	.	7.245	41.565	48.810	
		%	.	14,8	85,2	100,0	
	V	N	486	1.112	5.872	7.470	
		%	6,5	14,9	78,6	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 198. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y clase social

			<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total	
Mujeres	Total	Total	N	2.490	156.900	814.102	973.492
			%	0,3	16,1	83,6	100,0
	I	N	.	10.332	94.506	104.838	
		%	.	9,9	90,1	100,0	
	II	N	166	10.926	83.937	95.028	
		%	0,2	11,5	88,3	100,0	
	III	N	816	34.287	207.004	242.107	
		%	0,3	14,2	85,5	100,0	
	IV	N	843	63.411	296.187	360.441	
		%	0,2	17,6	82,2	100,0	
	V	N	666	37.944	132.467	171.077	
		%	0,4	22,2	77,4	100,0	
	15-24	Total	N	.	3.940	84.593	88.533
		%	.	4,5	95,5	100,0	
	I	N	.	246	14.316	14.562	
		%	.	1,7	98,3	100,0	
	II	N	.	280	13.216	13.497	
		%	.	2,1	97,9	100,0	
	III	N	.	341	19.729	20.069	
		%	.	1,7	98,3	100,0	
	IV	N	.	1.878	29.735	31.614	
		%	.	5,9	94,1	100,0	
	V	N	.	1.195	7.597	8.792	
		%	.	13,6	86,4	100,0	
	25-44	Total	N	259	34.287	285.785	320.330
		%	0,1	10,7	89,2	100,0	
	I	N	.	4.605	40.481	45.086	
		%	.	10,2	89,8	100,0	
	II	N	.	2.591	34.632	37.223	
		%	.	7,0	93,0	100,0	
	III	N	.	6.868	75.161	82.029	
		%	.	8,4	91,6	100,0	
	IV	N	.	11.889	98.836	110.725	
		%	.	10,7	89,3	100,0	
	V	N	259	8.333	36.675	45.267	
		%	0,6	18,4	81,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 198. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y clase social

		<5 horas			5-6 horas	>=7 horas	Total
Mujeres	45-64	Total	N	424	60.522	252.652	313.598
			%	0,1	19,3	80,6	100,0
	I	N	.	3.874	28.242	32.116	
		%	.	12,1	87,9	100,0	
	II	N	.	4.861	21.931	26.792	
		%	.	18,1	81,9	100,0	
	III	N	168	15.012	73.461	88.641	
		%	0,2	16,9	82,9	100,0	
	IV	N	181	19.311	84.609	104.102	
		%	0,2	18,6	81,3	100,0	
	V	N	75	17.463	44.409	61.946	
		%	0,1	28,2	71,7	100,0	
	65-74	Total	N	962	26.317	82.491	109.770
		%	0,9	24,0	75,1	100,0	
	I	N	.	1.028	6.171	7.199	
		%	.	14,3	85,7	100,0	
	II	N	.	1.237	5.988	7.225	
		%	.	17,1	82,9	100,0	
	III	N	165	5.688	17.047	22.899	
		%	0,7	24,8	74,4	100,0	
	IV	N	564	13.477	36.094	50.134	
		%	1,1	26,9	72,0	100,0	
	V	N	233	4.888	17.191	22.312	
		%	1,0	21,9	77,0	100,0	
	>=75	Total	N	846	31.834	108.581	141.261
		%	0,6	22,5	76,9	100,0	
	I	N	.	579	5.296	5.875	
		%	.	9,9	90,1	100,0	
	II	N	166	1.956	8.170	10.292	
		%	1,6	19,0	79,4	100,0	
	III	N	483	6.379	21.607	28.468	
		%	1,7	22,4	75,9	100,0	
	IV	N	98	16.855	46.913	63.866	
		%	0,2	26,4	73,5	100,0	
	V	N	100	6.065	26.596	32.760	
		%	0,3	18,5	81,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 198. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y clase social

		<5 horas			5-6 horas	>=7 horas	Total
Ambos	Total	Total	N	5.267	282.842	1.599.247	1.887.356
			%	0,3	15,0	84,7	100,0
	I	N		.	24.861	193.667	218.528
			%	.	11,4	88,6	100,0
	II	N		166	20.089	152.980	173.234
			%	0,1	11,6	88,3	100,0
	III	N		1.487	58.036	370.939	430.462
			%	0,3	13,5	86,2	100,0
	IV	N		2.263	128.565	679.919	810.747
			%	0,3	15,9	83,9	100,0
	V	N		1.350	51.291	201.743	254.385
			%	0,5	20,2	79,3	100,0
	15-24	Total	N	.	7.069	175.365	182.434
			%	.	3,9	96,1	100,0
	I	N		.	1.024	28.172	29.196
			%	.	3,5	96,5	100,0
	II	N		.	443	24.042	24.485
			%	.	1,8	98,2	100,0
	III	N		.	1.090	35.810	36.900
			%	.	3,0	97,0	100,0
	IV	N		.	2.721	71.630	74.351
			%	.	3,7	96,3	100,0
	V	N		.	1.791	15.712	17.503
			%	.	10,2	89,8	100,0
	25-44	Total	N	560	79.520	576.559	656.640
			%	0,1	12,1	87,8	100,0
	I	N		.	10.004	78.815	88.818
			%	.	11,3	88,7	100,0
	II	N		.	7.364	62.355	69.719
			%	.	10,6	89,4	100,0
	III	N		302	13.114	130.871	144.286
			%	0,2	9,1	90,7	100,0
	IV	N		.	35.086	236.031	271.117
			%	.	12,9	87,1	100,0
	V	N		259	13.953	68.487	82.699
			%	0,3	16,9	82,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 198. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y clase social

		<5 horas			5-6 horas	>=7 horas	Total
Ambos	45-64	Total	N	2.030	110.922	503.013	615.965
			%	0,3	18,0	81,7	100,0
	I	N		.	9.753	60.271	70.023
			%	.	13,9	86,1	100,0
	II	N		.	7.242	42.970	50.212
			%	.	14,4	85,6	100,0
	III	N		311	23.956	130.696	154.963
			%	0,2	15,5	84,3	100,0
	IV	N		1.446	46.939	206.330	254.716
			%	0,6	18,4	81,0	100,0
	V	N		273	23.032	62.747	86.052
			%	0,3	26,8	72,9	100,0
	65-74	Total	N	1.344	40.682	163.477	205.503
			%	0,7	19,8	79,5	100,0
	I	N		.	3.048	17.904	20.952
			%	.	14,5	85,5	100,0
	II	N		.	1.577	12.511	14.087
			%	.	11,2	88,8	100,0
	III	N		392	11.001	33.283	44.676
			%	0,9	24,6	74,5	100,0
	IV	N		719	19.718	77.449	97.887
			%	0,7	20,1	79,1	100,0
	V	N		233	5.338	22.329	27.901
			%	0,8	19,1	80,0	100,0
	>=75	Total	N	1.332	44.649	180.833	226.814
			%	0,6	19,7	79,7	100,0
	I	N		.	1.033	8.505	9.538
			%	.	10,8	89,2	100,0
	II	N		166	3.463	11.102	14.731
			%	1,1	23,5	75,4	100,0
	III	N		483	8.875	40.280	49.638
			%	1,0	17,9	81,1	100,0
	IV	N		98	24.100	88.478	112.676
			%	0,1	21,4	78,5	100,0
	V	N		586	7.177	32.468	40.231
			%	1,5	17,8	80,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 199. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

			<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Hombres Total	Total	N	2.776	126.644	785.703	915.124
		%	0,3	13,8	85,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.215	32.298	177.086	210.600
		%	0,6	15,3	84,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	736	24.666	142.053	167.454
		%	0,4	14,7	84,8	100,0
	Secundaria, superior	N	825	51.815	308.030	360.670
		%	0,2	14,4	85,4	100,0
	Terciaria	N	.	17.866	158.534	176.400
		%	.	10,1	89,9	100,0
15-24 Total	Total	N	.	3.129	91.330	94.458
		%	.	3,3	96,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	200	9.718	9.918
		%	.	2,0	98,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	687	30.442	31.129
		%	.	2,2	97,8	100,0
	Secundaria, superior	N	.	2.242	40.599	42.840
		%	.	5,2	94,8	100,0
	Terciaria	N	.	.	10.572	10.572
		%	.	.	100,0	100,0
25-44 Total	Total	N	302	45.234	290.774	336.309
		%	0,1	13,5	86,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	4.587	33.189	37.776
		%	.	12,1	87,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	8.616	44.193	52.808
		%	.	16,3	83,7	100,0
	Secundaria, superior	N	302	24.884	139.089	164.274
		%	0,2	15,1	84,7	100,0
	Terciaria	N	.	7.147	74.304	81.451
		%	.	8,8	91,2	100,0
45-64 Total	Total	N	1.606	50.687	250.362	302.655
		%	0,5	16,7	82,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	729	12.344	57.327	70.400
		%	1,0	17,5	81,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	353	11.085	41.806	53.244
		%	0,7	20,8	78,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 199. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	524	19.889	96.717	117.130	
			%	0,4	17,0	82,6	100,0	
		Terciaria	N	.	7.369	54.512	61.881	
	%		.	11,9	88,1	100,0		
		65-74	Total	N	382	14.365	80.986	95.733
			%	0,4	15,0	84,6	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	.	5.064	32.953	38.017	
			%	.	13,3	86,7	100,0	
		Secundaria, inferior	N	382	3.058	12.851	16.291	
			%	2,3	18,8	78,9	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	4.061	21.887	25.948	
			%	.	15,7	84,3	100,0	
		Terciaria	N	.	2.181	13.296	15.477	
			%	.	14,1	85,9	100,0	
		>=75	Total	N	486	13.230	72.252	85.968
			%	0,6	15,4	84,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	486	10.103	43.900	54.489	
			%	0,9	18,5	80,6	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	1.220	12.762	13.981	
			%	.	8,7	91,3	100,0	
	Secundaria, superior	N	.	739	9.739	10.478		
		%	.	7,0	93,0	100,0		
	Terciaria	N	.	1.169	5.851	7.020		
		%	.	16,6	83,4	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	2.490	157.254	816.138	975.882	
		%	0,3	16,1	83,6	100,0		
		Sin estudios, primaria	N	1.584	64.237	212.507	278.327	
	%		0,6	23,1	76,4	100,0		
		Secundaria, inferior	N	408	31.550	137.808	169.766	
	%		0,2	18,6	81,2	100,0		
		Secundaria, superior	N	498	36.312	271.055	307.866	
	%		0,2	11,8	88,0	100,0		
		Terciaria	N	.	25.155	194.768	219.923	
	%		.	11,4	88,6	100,0		
	15-24	Total	N	.	3.940	85.559	89.499	
%		.	4,4	95,6	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 199. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

			<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total	
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	.	914	10.472	11.386
			%	.	8,0	92,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	1.295	15.468	16.763
			%	.	7,7	92,3	100,0
		Secundaria, superior	N	.	1.064	44.379	45.443
			%	.	2,3	97,7	100,0
		Terciaria	N	.	667	15.240	15.907
			%	.	4,2	95,8	100,0
	25-44	Total	N	259	34.287	286.280	320.826
			%	0,1	10,7	89,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	4.081	21.909	25.990
			%	.	15,7	84,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	6.979	31.958	38.937
			%	.	17,9	82,1	100,0
		Secundaria, superior	N	259	12.850	117.379	130.487
			%	0,2	9,8	90,0	100,0
		Terciaria	N	.	10.377	115.035	125.412
			%	.	8,3	91,7	100,0
	45-64	Total	N	424	60.522	252.823	313.769
			%	0,1	19,3	80,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	243	18.936	58.785	77.963
			%	0,3	24,3	75,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	107	12.750	48.877	61.735
			%	0,2	20,7	79,2	100,0
		Secundaria, superior	N	74	16.809	93.439	110.322
			%	0,1	15,2	84,7	100,0
		Terciaria	N	.	12.027	51.722	63.749
			%	.	18,9	81,1	100,0
	65-74	Total	N	962	26.473	82.491	109.925
			%	0,9	24,1	75,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	661	15.782	45.410	61.852
			%	1,1	25,5	73,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	301	5.734	21.417	27.452
			%	1,1	20,9	78,0	100,0
		Secundaria, superior	N	.	4.257	7.636	11.893
			%	.	35,8	64,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 199. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

			<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total		
Mujeres	65-74	Terciaria	N	.	699	8.027	8.727	
			%	.	8,0	92,0	100,0	
	>=75	Total	N	846	32.033	108.985	141.864	
			%	0,6	22,6	76,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	680	24.524	75.932	101.136	
			%	0,7	24,2	75,1	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	4.792	20.087	24.879	
			%	.	19,3	80,7	100,0	
		Secundaria, superior	N	166	1.332	8.222	9.720	
			%	1,7	13,7	84,6	100,0	
		Terciaria	N	.	1.385	4.744	6.129	
			%	.	22,6	77,4	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	5.267	283.899	1.601.841	1.891.006
				%	0,3	15,0	84,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.799	96.535	389.593	488.927	
			%	0,6	19,7	79,7	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.144	56.216	279.860	337.220	
			%	0,3	16,7	83,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.324	88.127	579.086	668.536	
			%	0,2	13,2	86,6	100,0	
		Terciaria	N	.	43.020	353.303	396.323	
			%	.	10,9	89,1	100,0	
15-24		Total	N	.	7.069	176.889	183.958	
			%	.	3,8	96,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	.	1.114	20.190	21.304	
			%	.	5,2	94,8	100,0	
	Secundaria, inferior	N	.	1.982	45.910	47.891		
		%	.	4,1	95,9	100,0		
	Secundaria, superior	N	.	3.306	84.978	88.283		
		%	.	3,7	96,3	100,0		
	Terciaria	N	.	667	25.812	26.479		
		%	.	2,5	97,5	100,0		
25-44	Total	N	560	79.520	577.054	657.135		
		%	0,1	12,1	87,8	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	.	8.668	55.097	63.765		
		%	.	13,6	86,4	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 199. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

			<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total	
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	.	15.595	76.150	91.745
			%	.	17,0	83,0	100,0
		Secundaria, superior	N	560	37.734	256.467	294.762
			%	0,2	12,8	87,0	100,0
		Terciaria	N	.	17.523	189.339	206.862
			%	.	8,5	91,5	100,0
	45-64	Total	N	2.030	111.209	503.184	616.424
			%	0,3	18,0	81,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	972	31.280	116.112	148.363
			%	0,7	21,1	78,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	461	23.835	90.683	114.979
			%	0,4	20,7	78,9	100,0
		Secundaria, superior	N	598	36.698	190.156	227.452
			%	0,3	16,1	83,6	100,0
		Terciaria	N	.	19.396	106.233	125.630
			%	.	15,4	84,6	100,0
	65-74	Total	N	1.344	40.837	163.477	205.658
			%	0,7	19,9	79,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	661	20.846	78.363	99.869
			%	0,7	20,9	78,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	683	8.793	34.268	43.744
			%	1,6	20,1	78,3	100,0
		Secundaria, superior	N	.	8.318	29.523	37.841
			%	.	22,0	78,0	100,0
		Terciaria	N	.	2.880	21.323	24.204
			%	.	11,9	88,1	100,0
	>=75	Total	N	1.332	45.263	181.237	227.832
			%	0,6	19,9	79,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.166	34.627	119.831	155.625
			%	0,7	22,3	77,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	6.012	32.849	38.860
			%	.	15,5	84,5	100,0
		Secundaria, superior	N	166	2.071	17.961	20.198
			%	0,8	10,3	88,9	100,0
		Terciaria	N	.	2.553	10.595	13.149
			%	.	19,4	80,6	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 200. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	558.951	174.672	90.880	48.770	41.851	915.124
			%	61,1	19,1	9,9	5,3	4,6	100,0
		Araba	N	91.908	17.079	13.346	7.055	4.363	133.751
			%	68,7	12,8	10,0	5,3	3,3	100,0
		Gipuzkoa	N	174.591	58.146	30.874	15.729	14.472	293.812
			%	59,4	19,8	10,5	5,4	4,9	100,0
		Bizkaia	N	292.453	99.447	46.661	25.986	23.016	487.561
			%	60,0	20,4	9,6	5,3	4,7	100,0
	15-24	CAPV	N	45.028	24.670	11.935	7.616	5.209	94.458
			%	47,7	26,1	12,6	8,1	5,5	100,0
		Araba	N	7.893	2.214	1.833	1.777	1.153	14.869
			%	53,1	14,9	12,3	11,9	7,8	100,0
		Gipuzkoa	N	16.581	6.708	2.734	2.593	2.689	31.305
			%	53,0	21,4	8,7	8,3	8,6	100,0
		Bizkaia	N	20.554	15.748	7.369	3.246	1.368	48.284
			%	42,6	32,6	15,3	6,7	2,8	100,0
	25-44	CAPV	N	172.731	69.890	45.594	24.729	23.367	336.309
			%	51,4	20,8	13,6	7,4	6,9	100,0
		Araba	N	32.328	7.266	7.310	2.908	2.249	52.062
			%	62,1	14,0	14,0	5,6	4,3	100,0
		Gipuzkoa	N	51.395	21.544	17.955	8.900	6.996	106.790
			%	48,1	20,2	16,8	8,3	6,6	100,0
		Bizkaia	N	89.007	41.080	20.328	12.920	14.122	177.458
			%	50,2	23,1	11,5	7,3	8,0	100,0
	45-64	CAPV	N	191.559	59.441	27.206	14.403	10.046	302.655
			%	63,3	19,6	9,0	4,8	3,3	100,0
		Araba	N	30.397	6.432	3.331	1.983	609	42.751
			%	71,1	15,0	7,8	4,6	1,4	100,0
		Gipuzkoa	N	57.868	23.519	8.751	3.523	3.759	97.419
			%	59,4	24,1	9,0	3,6	3,9	100,0
		Bizkaia	N	103.294	29.491	15.124	8.897	5.678	162.485
			%	63,6	18,1	9,3	5,5	3,5	100,0
	65-74	CAPV	N	78.143	11.025	3.933	1.032	1.601	95.733
			%	81,6	11,5	4,1	1,1	1,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 200. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres 65-74	Araba	N	11.752	586	528	217	80	13.163	
		%	89,3	4,5	4,0	1,7	0,6	100,0	
	Gipuzkoa	N	25.281	4.539	1.069	432	810	32.130	
		%	78,7	14,1	3,3	1,3	2,5	100,0	
	Bizkaia	N	41.110	5.900	2.336	383	711	50.440	
		%	81,5	11,7	4,6	0,8	1,4	100,0	
	>=75	CAPV	N	71.490	9.646	2.212	991	1.628	85.968
			%	83,2	11,2	2,6	1,2	1,9	100,0
		Araba	N	9.538	580	344	170	273	10.905
			%	87,5	5,3	3,2	1,6	2,5	100,0
		Gipuzkoa	N	23.466	1.837	365	281	219	26.168
			%	89,7	7,0	1,4	1,1	0,8	100,0
Bizkaia		N	38.486	7.228	1.504	540	1.136	48.895	
		%	78,7	14,8	3,1	1,1	2,3	100,0	
Mujeres Total		CAPV	N	683.786	154.525	65.835	48.002	23.734	975.882
			%	70,1	15,8	6,7	4,9	2,4	100,0
		Araba	N	98.188	19.066	10.994	6.164	2.360	136.772
			%	71,8	13,9	8,0	4,5	1,7	100,0
	Gipuzkoa	N	217.391	51.420	19.945	16.125	7.805	312.686	
		%	69,5	16,4	6,4	5,2	2,5	100,0	
	Bizkaia	N	368.207	84.039	34.896	25.713	13.570	526.425	
		%	69,9	16,0	6,6	4,9	2,6	100,0	
	15-24	CAPV	N	44.726	19.203	13.465	8.711	3.394	89.499
			%	50,0	21,5	15,0	9,7	3,8	100,0
		Araba	N	7.122	3.204	1.889	995	.	13.210
			%	53,9	24,3	14,3	7,5	.	100,0
Gipuzkoa		N	16.078	4.246	4.744	2.899	1.476	29.443	
		%	54,6	14,4	16,1	9,8	5,0	100,0	
Bizkaia		N	21.526	11.752	6.832	4.817	1.918	46.846	
		%	46,0	25,1	14,6	10,3	4,1	100,0	
25-44		CAPV	N	188.484	63.656	30.877	25.731	12.077	320.826
			%	58,7	19,8	9,6	8,0	3,8	100,0
		Araba	N	27.919	8.656	5.884	3.698	1.712	47.869
			%	58,3	18,1	12,3	7,7	3,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 200. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	59.288	23.005	8.408	7.754	3.450	101.905	
			%	58,2	22,6	8,3	7,6	3,4	100,0	
		Bizkaia	N	101.277	31.995	16.584	14.280	6.916	171.052	
			%	59,2	18,7	9,7	8,3	4,0	100,0	
	45-64	CAPV	N	233.083	46.862	15.785	11.827	6.212	313.769	
			%	74,3	14,9	5,0	3,8	2,0	100,0	
		Araba	N	34.882	5.240	2.465	1.297	379	44.263	
			%	78,8	11,8	5,6	2,9	0,9	100,0	
		Gipuzkoa	N	72.784	14.893	5.200	4.469	2.316	99.662	
			%	73,0	14,9	5,2	4,5	2,3	100,0	
		Bizkaia	N	125.417	26.728	8.120	6.060	3.517	169.843	
			%	73,8	15,7	4,8	3,6	2,1	100,0	
		65-74	CAPV	N	93.780	11.265	2.890	715	1.275	109.925
				%	85,3	10,2	2,6	0,7	1,2	100,0
			Araba	N	12.869	759	348	174	170	14.320
				%	89,9	5,3	2,4	1,2	1,2	100,0
	Gipuzkoa		N	29.366	5.093	903	356	403	36.120	
			%	81,3	14,1	2,5	1,0	1,1	100,0	
	Bizkaia		N	51.545	5.412	1.639	185	703	59.484	
			%	86,7	9,1	2,8	0,3	1,2	100,0	
	>=75	CAPV	N	123.713	13.540	2.817	1.019	776	141.864	
			%	87,2	9,5	2,0	0,7	0,5	100,0	
		Araba	N	15.397	1.206	407	.	100	17.110	
			%	90,0	7,0	2,4	.	0,6	100,0	
Gipuzkoa		N	39.875	4.182	690	647	160	45.555		
		%	87,5	9,2	1,5	1,4	0,4	100,0		
Bizkaia		N	68.440	8.151	1.721	371	516	79.200		
		%	86,4	10,3	2,2	0,5	0,7	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	1.242.737	329.197	156.715	96.772	65.585	1.891.006	
			%	65,7	17,4	8,3	5,1	3,5	100,0	
	Araba	N	190.096	36.144	24.339	13.220	6.723	270.523		
		%	70,3	13,4	9,0	4,9	2,5	100,0		
	Gipuzkoa	N	391.981	109.566	50.819	31.854	22.277	606.497		
		%	64,6	18,1	8,4	5,3	3,7	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 200. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	Total	Bizkaia	N	660.660	183.486	81.556	51.699	36.586	1.013.987
			%	65,2	18,1	8,0	5,1	3,6	100,0
	15-24	CAPV	N	89.754	43.873	25.401	16.326	8.603	183.958
			%	48,8	23,8	13,8	8,9	4,7	100,0
		Araba	N	15.015	5.419	3.722	2.772	1.153	28.079
			%	53,5	19,3	13,3	9,9	4,1	100,0
		Gipuzkoa	N	32.659	10.954	7.478	5.492	4.164	60.748
			%	53,8	18,0	12,3	9,0	6,9	100,0
		Bizkaia	N	42.081	27.500	14.201	8.062	3.286	95.130
			%	44,2	28,9	14,9	8,5	3,5	100,0
	25-44	CAPV	N	361.214	133.546	76.470	50.460	35.444	657.135
			%	55,0	20,3	11,6	7,7	5,4	100,0
		Araba	N	60.247	15.922	13.195	6.606	3.960	99.930
			%	60,3	15,9	13,2	6,6	4,0	100,0
		Gipuzkoa	N	110.683	44.549	26.363	16.654	10.446	208.695
			%	53,0	21,3	12,6	8,0	5,0	100,0
		Bizkaia	N	190.285	73.075	36.912	27.200	21.038	348.509
			%	54,6	21,0	10,6	7,8	6,0	100,0
	45-64	CAPV	N	424.642	106.303	42.991	26.229	16.258	616.424
			%	68,9	17,2	7,0	4,3	2,6	100,0
		Araba	N	65.279	11.672	5.796	3.281	988	87.015
			%	75,0	13,4	6,7	3,8	1,1	100,0
		Gipuzkoa	N	130.652	38.412	13.951	7.992	6.074	197.081
			%	66,3	19,5	7,1	4,1	3,1	100,0
		Bizkaia	N	228.712	56.219	23.244	14.957	9.196	332.328
			%	68,8	16,9	7,0	4,5	2,8	100,0
	65-74	CAPV	N	171.923	22.290	6.823	1.747	2.876	205.658
			%	83,6	10,8	3,3	0,8	1,4	100,0
		Araba	N	24.621	1.345	877	392	249	27.483
			%	89,6	4,9	3,2	1,4	0,9	100,0
		Gipuzkoa	N	54.646	9.632	1.972	787	1.212	68.251
			%	80,1	14,1	2,9	1,2	1,8	100,0
		Bizkaia	N	92.656	11.312	3.974	568	1.414	109.924
			%	84,3	10,3	3,6	0,5	1,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 200. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	CAPV	N	195.203	23.185	5.030	2.010	2.404	227.832
			%	85,7	10,2	2,2	0,9	1,1	100,0
		Araba	N	24.935	1.786	750	170	373	28.015
			%	89,0	6,4	2,7	0,6	1,3	100,0
		Gipuzkoa	N	63.342	6.019	1.054	928	379	71.723
			%	88,3	8,4	1,5	1,3	0,5	100,0
		Bizkaia	N	106.927	15.380	3.225	912	1.652	128.094
			%	83,5	12,0	2,5	0,7	1,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 201. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	Total	Total	N	A diario					
			N	557.951	174.412	90.880	48.770	41.851	913.863
			%	61,1	19,1	9,9	5,3	4,6	100,0
	I		N	73.657	19.848	12.287	4.351	3.546	113.690
			%	64,8	17,5	10,8	3,8	3,1	100,0
	II		N	44.539	21.174	5.524	4.229	2.739	78.206
			%	57,0	27,1	7,1	5,4	3,5	100,0
	III		N	115.147	30.058	19.102	13.626	10.422	188.355
			%	61,1	16,0	10,1	7,2	5,5	100,0
	IV		N	277.163	86.280	44.789	21.795	20.278	450.306
			%	61,5	19,2	9,9	4,8	4,5	100,0
	V		N	47.445	17.051	9.178	4.768	4.865	83.307
			%	57,0	20,5	11,0	5,7	5,8	100,0
	15-24 Total		N	44.730	24.410	11.935	7.616	5.209	93.900
			%	47,6	26,0	12,7	8,1	5,5	100,0
	I		N	9.320	2.614	1.380	767	553	14.634
			%	63,7	17,9	9,4	5,2	3,8	100,0
	II		N	6.318	3.010	.	968	693	10.988
			%	57,5	27,4	.	8,8	6,3	100,0
	III		N	7.706	3.283	2.459	1.711	1.671	16.830
			%	45,8	19,5	14,6	10,2	9,9	100,0
	IV		N	18.741	11.683	7.166	3.418	1.728	42.737
			%	43,9	27,3	16,8	8,0	4,0	100,0
	V		N	2.644	3.820	930	752	565	8.711
			%	30,4	43,9	10,7	8,6	6,5	100,0
	25-44 Total		N	172.731	69.890	45.594	24.729	23.367	336.309
			%	51,4	20,8	13,6	7,4	6,9	100,0
	I		N	24.988	8.687	5.546	2.474	2.037	43.732
			%	57,1	19,9	12,7	5,7	4,7	100,0
	II		N	15.112	10.730	3.895	1.760	998	32.496
			%	46,5	33,0	12,0	5,4	3,1	100,0
	III		N	30.381	11.305	8.551	6.435	5.584	62.257
			%	48,8	18,2	13,7	10,3	9,0	100,0
	IV		N	82.377	33.899	20.784	10.929	12.403	160.392
			%	51,4	21,1	13,0	6,8	7,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 201. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres 25-44 V	N		19.871	5.269	6.817	3.130	2.344	37.432
	%		53,1	14,1	18,2	8,4	6,3	100,0
45-64 Total	N		191.271	59.441	27.206	14.403	10.046	302.368
	%		63,3	19,7	9,0	4,8	3,3	100,0
I	N		25.817	6.783	4.155	537	616	37.907
	%		68,1	17,9	11,0	1,4	1,6	100,0
II	N		14.799	5.508	894	1.422	797	23.419
	%		63,2	23,5	3,8	6,1	3,4	100,0
III	N		41.500	10.633	6.418	4.911	2.859	66.322
	%		62,6	16,0	9,7	7,4	4,3	100,0
IV	N		95.085	29.833	14.667	6.646	4.383	150.614
	%		63,1	19,8	9,7	4,4	2,9	100,0
V	N		14.071	6.685	1.072	887	1.391	24.106
	%		58,4	27,7	4,4	3,7	5,8	100,0
65-74 Total	N		78.143	11.025	3.933	1.032	1.601	95.733
	%		81,6	11,5	4,1	1,1	1,7	100,0
I	N		10.403	1.765	671	573	341	13.753
	%		75,6	12,8	4,9	4,2	2,5	100,0
II	N		5.134	948	450	80	250	6.862
	%		74,8	13,8	6,6	1,2	3,6	100,0
III	N		18.151	2.386	1.126	.	114	21.777
	%		83,4	11,0	5,2	.	0,5	100,0
IV	N		39.814	5.416	1.328	379	816	47.753
	%		83,4	11,3	2,8	0,8	1,7	100,0
V	N		4.640	509	359	.	80	5.588
	%		83,0	9,1	6,4	.	1,4	100,0
>=75 Total	N		71.076	9.646	2.212	991	1.628	85.553
	%		83,1	11,3	2,6	1,2	1,9	100,0
I	N		3.128	.	535	.	.	3.663
	%		85,4	.	14,6	.	.	100,0
II	N		3.176	978	285	.	.	4.440
	%		71,5	22,0	6,4	.	.	100,0
III	N		17.409	2.451	548	568	194	21.169
	%		82,2	11,6	2,6	2,7	0,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 201. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres >=75	IV	N	41.145	5.449	844	422	948	48.810
		%	84,3	11,2	1,7	0,9	1,9	100,0
	V	N	6.217	767	.	.	486	7.470
		%	83,2	10,3	.	.	6,5	100,0
Mujeres Total	Total	N	682.128	154.062	65.565	48.002	23.734	973.492
		%	70,1	15,8	6,7	4,9	2,4	100,0
	I	N	73.315	18.225	7.533	3.487	2.278	104.838
		%	69,9	17,4	7,2	3,3	2,2	100,0
	II	N	64.775	17.155	5.987	4.974	2.137	95.028
		%	68,2	18,1	6,3	5,2	2,2	100,0
	III	N	164.077	40.187	18.343	13.175	6.325	242.107
		%	67,8	16,6	7,6	5,4	2,6	100,0
	IV	N	255.707	54.031	24.077	17.340	9.287	360.441
		%	70,9	15,0	6,7	4,8	2,6	100,0
	V	N	124.254	24.465	9.624	9.027	3.708	171.077
		%	72,6	14,3	5,6	5,3	2,2	100,0
15-24	Total	N	44.223	18.740	13.465	8.711	3.394	88.533
		%	50,0	21,2	15,2	9,8	3,8	100,0
	I	N	8.716	3.891	976	730	249	14.562
		%	59,9	26,7	6,7	5,0	1,7	100,0
	II	N	6.552	2.338	2.665	1.015	927	13.497
		%	48,5	17,3	19,7	7,5	6,9	100,0
	III	N	8.955	5.163	2.792	2.492	667	20.069
		%	44,6	25,7	13,9	12,4	3,3	100,0
	IV	N	16.191	5.351	5.353	3.391	1.328	31.614
		%	51,2	16,9	16,9	10,7	4,2	100,0
	V	N	3.809	1.997	1.680	1.083	223	8.792
		%	43,3	22,7	19,1	12,3	2,5	100,0
25-44	Total	N	188.258	63.656	30.607	25.731	12.077	320.330
		%	58,8	19,9	9,6	8,0	3,8	100,0
	I	N	28.592	8.418	4.478	2.632	966	45.086
		%	63,4	18,7	9,9	5,8	2,1	100,0
	II	N	25.929	7.199	1.038	2.190	866	37.223
		%	69,7	19,3	2,8	5,9	2,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 201. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	43.035	19.189	9.980	6.705	3.120	82.029
			%	52,5	23,4	12,2	8,2	3,8	100,0
		IV	N	64.241	20.171	10.959	10.416	4.939	110.725
			%	58,0	18,2	9,9	9,4	4,5	100,0
		V	N	26.461	8.679	4.152	3.787	2.187	45.267
			%	58,5	19,2	9,2	8,4	4,8	100,0
	45-64	Total	N	232.912	46.862	15.785	11.827	6.212	313.598
			%	74,3	14,9	5,0	3,8	2,0	100,0
	I	N	24.361	4.605	1.963	125	1.063	32.116	
		%	75,9	14,3	6,1	0,4	3,3	100,0	
	II	N	18.643	4.734	1.303	1.768	345	26.792	
		%	69,6	17,7	4,9	6,6	1,3	100,0	
	III	N	66.987	12.100	3.989	3.508	2.056	88.641	
		%	75,6	13,7	4,5	4,0	2,3	100,0	
	IV	N	76.511	16.512	5.845	2.973	2.262	104.102	
		%	73,5	15,9	5,6	2,9	2,2	100,0	
	V	N	46.411	8.911	2.684	3.453	487	61.946	
		%	74,9	14,4	4,3	5,6	0,8	100,0	
	65-74	Total	N	93.624	11.265	2.890	715	1.275	109.770
			%	85,3	10,3	2,6	0,7	1,2	100,0
	I	N	6.644	555	.	.	.	7.199	
		%	92,3	7,7	.	.	.	100,0	
	II	N	5.558	1.376	291	.	.	7.225	
		%	76,9	19,0	4,0	.	.	100,0	
III	N	19.673	1.536	1.035	174	482	22.899		
	%	85,9	6,7	4,5	0,8	2,1	100,0		
IV	N	41.950	6.109	1.173	317	585	50.134		
	%	83,7	12,2	2,3	0,6	1,2	100,0		
V	N	19.800	1.689	391	224	208	22.312		
	%	88,7	7,6	1,8	1,0	0,9	100,0		
>=75	Total	N	123.110	13.540	2.817	1.019	776	141.261	
		%	87,2	9,6	2,0	0,7	0,5	100,0	
I	N	5.003	756	117	.	.	5.875		
	%	85,2	12,9	2,0	.	.	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 201. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	>=75	II	N	8.093	1.508	690	.	.	10.292	
			%	78,6	14,7	6,7	.	.	100,0	
		III	N	25.427	2.199	548	295	.	28.468	
			%	89,3	7,7	1,9	1,0	.	100,0	
		IV	N	56.814	5.888	747	244	174	63.866	
			%	89,0	9,2	1,2	0,4	0,3	100,0	
		V	N	27.773	3.189	716	480	602	32.760	
			%	84,8	9,7	2,2	1,5	1,8	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	1.240.079	328.474	156.445	96.772	65.585	1.887.356
				%	65,7	17,4	8,3	5,1	3,5	100,0
	I	N	146.972	38.073	19.821	7.838	5.824	218.528		
		%	67,3	17,4	9,1	3,6	2,7	100,0		
	II	N	109.314	38.329	11.512	9.203	4.876	173.234		
		%	63,1	22,1	6,6	5,3	2,8	100,0		
	III	N	279.225	70.245	37.445	26.801	16.747	430.462		
		%	64,9	16,3	8,7	6,2	3,9	100,0		
	IV	N	532.870	140.311	68.867	39.135	29.565	810.747		
		%	65,7	17,3	8,5	4,8	3,6	100,0		
	V	N	171.699	41.516	18.802	13.795	8.573	254.385		
		%	67,5	16,3	7,4	5,4	3,4	100,0		
	15-24	Total	N	88.954	43.150	25.401	16.326	8.603	182.434	
			%	48,8	23,7	13,9	8,9	4,7	100,0	
	I	N	18.036	6.504	2.356	1.497	802	29.196		
		%	61,8	22,3	8,1	5,1	2,7	100,0		
	II	N	12.870	5.348	2.665	1.983	1.620	24.485		
		%	52,6	21,8	10,9	8,1	6,6	100,0		
	III	N	16.662	8.446	5.251	4.203	2.338	36.900		
		%	45,2	22,9	14,2	11,4	6,3	100,0		
	IV	N	34.933	17.034	12.520	6.809	3.055	74.351		
		%	47,0	22,9	16,8	9,2	4,1	100,0		
	V	N	6.453	5.817	2.610	1.835	788	17.503		
		%	36,9	33,2	14,9	10,5	4,5	100,0		
	25-44	Total	N	360.989	133.546	76.201	50.460	35.444	656.640	
			%	55,0	20,3	11,6	7,7	5,4	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 201. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	25-44	I	N	53.580	17.105	10.024	5.106	3.003	88.818
			%	60,3	19,3	11,3	5,7	3,4	100,0
		II	N	41.042	17.929	4.934	3.950	1.864	69.719
			%	58,9	25,7	7,1	5,7	2,7	100,0
		III	N	73.416	30.494	18.531	13.141	8.704	144.286
			%	50,9	21,1	12,8	9,1	6,0	100,0
		IV	N	146.618	54.070	31.743	21.345	17.342	271.117
			%	54,1	19,9	11,7	7,9	6,4	100,0
		V	N	46.333	13.948	10.969	6.917	4.531	82.699
			%	56,0	16,9	13,3	8,4	5,5	100,0
45-64 Total			N	424.183	106.303	42.991	26.229	16.258	615.965
			%	68,9	17,3	7,0	4,3	2,6	100,0
		I	N	50.177	11.388	6.118	662	1.678	70.023
			%	71,7	16,3	8,7	0,9	2,4	100,0
		II	N	33.442	10.241	2.197	3.190	1.141	50.212
			%	66,6	20,4	4,4	6,4	2,3	100,0
		III	N	108.486	22.733	10.408	8.420	4.915	154.963
			%	70,0	14,7	6,7	5,4	3,2	100,0
		IV	N	171.595	46.345	20.512	9.618	6.645	254.716
			%	67,4	18,2	8,1	3,8	2,6	100,0
		V	N	60.482	15.596	3.756	4.339	1.878	86.052
			%	70,3	18,1	4,4	5,0	2,2	100,0
65-74 Total			N	171.767	22.290	6.823	1.747	2.876	205.503
			%	83,6	10,8	3,3	0,9	1,4	100,0
		I	N	17.047	2.320	671	573	341	20.952
			%	81,4	11,1	3,2	2,7	1,6	100,0
		II	N	10.692	2.324	741	80	250	14.087
			%	75,9	16,5	5,3	0,6	1,8	100,0
		III	N	37.824	3.922	2.161	174	596	44.676
			%	84,7	8,8	4,8	0,4	1,3	100,0
		IV	N	81.765	11.525	2.500	696	1.401	97.887
			%	83,5	11,8	2,6	0,7	1,4	100,0
		V	N	24.440	2.198	750	224	288	27.901
			%	87,6	7,9	2,7	0,8	1,0	100,0
>=75 Total			N	194.185	23.185	5.030	2.010	2.404	226.814

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 201. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	Total	%	85,6	10,2	2,2	0,9	1,1	100,0
		I	N	8.131	756	652	.	.	9.538
			%	85,2	7,9	6,8	.	.	100,0
		II	N	11.269	2.486	975	.	.	14.731
			%	76,5	16,9	6,6	.	.	100,0
		III	N	42.836	4.649	1.095	863	194	49.638
			%	86,3	9,4	2,2	1,7	0,4	100,0
		IV	N	97.959	11.337	1.591	667	1.122	112.676
			%	86,9	10,1	1,4	0,6	1,0	100,0
		V	N	33.990	3.957	716	480	1.088	40.231
			%	84,5	9,8	1,8	1,2	2,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

835

Tabla 202. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres Total	Total	N	558.951	174.672	90.880	48.770	41.851	915.124
		%	61,1	19,1	9,9	5,3	4,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	146.895	32.699	17.769	6.315	6.922	210.600
		%	69,8	15,5	8,4	3,0	3,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	98.119	36.781	16.416	6.897	9.242	167.454
		%	58,6	22,0	9,8	4,1	5,5	100,0
	Secundaria, superior	N	206.763	68.535	37.902	27.461	20.009	360.670
		%	57,3	19,0	10,5	7,6	5,5	100,0
	Terciaria	N	107.174	36.658	18.794	8.096	5.678	176.400
		%	60,8	20,8	10,7	4,6	3,2	100,0
15-24	Total	N	45.028	24.670	11.935	7.616	5.209	94.458
		%	47,7	26,1	12,6	8,1	5,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.973	1.890	2.466	1.324	265	9.918
		%	40,1	19,1	24,9	13,3	2,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	15.032	9.120	3.640	1.453	1.884	31.129
		%	48,3	29,3	11,7	4,7	6,1	100,0
	Secundaria, superior	N	19.947	11.344	5.119	3.702	2.729	42.840
		%	46,6	26,5	11,9	8,6	6,4	100,0
	Terciaria	N	6.076	2.316	710	1.137	331	10.572
		%	57,5	21,9	6,7	10,8	3,1	100,0
25-44	Total	N	172.731	69.890	45.594	24.729	23.367	336.309
		%	51,4	20,8	13,6	7,4	6,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	20.755	5.714	7.446	865	2.996	37.776
		%	54,9	15,1	19,7	2,3	7,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	22.245	15.670	6.746	4.150	3.997	52.808
		%	42,1	29,7	12,8	7,9	7,6	100,0
	Secundaria, superior	N	85.467	29.346	20.501	15.745	13.216	164.274
		%	52,0	17,9	12,5	9,6	8,0	100,0
	Terciaria	N	44.263	19.161	10.901	3.969	3.158	81.451
		%	54,3	23,5	13,4	4,9	3,9	100,0
45-64	Total	N	191.559	59.441	27.206	14.403	10.046	302.655
		%	63,3	19,6	9,0	4,8	3,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	44.610	15.749	5.419	3.058	1.564	70.400
		%	63,4	22,4	7,7	4,3	2,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 202. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	35.608	8.357	5.083	1.178	3.018	53.244	
			%	66,9	15,7	9,5	2,2	5,7	100,0	
		Secundaria, superior	N	71.897	23.554	10.369	7.580	3.730	117.130	
			%	61,4	20,1	8,9	6,5	3,2	100,0	
		Terciaria	N	39.444	11.780	6.335	2.587	1.734	61.881	
			%	63,7	19,0	10,2	4,2	2,8	100,0	
		65-74	Total	N	78.143	11.025	3.933	1.032	1.601	95.733
			%	81,6	11,5	4,1	1,1	1,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	31.894	3.700	1.608	263	553	38.017	
			%	83,9	9,7	4,2	0,7	1,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	13.382	1.901	549	116	343	16.291	
			%	82,1	11,7	3,4	0,7	2,1	100,0	
		Secundaria, superior	N	21.598	2.921	928	250	250	25.948	
			%	83,2	11,3	3,6	1,0	1,0	100,0	
		Terciaria	N	11.269	2.503	848	403	455	15.477	
			%	72,8	16,2	5,5	2,6	2,9	100,0	
		>=75	Total	N	71.490	9.646	2.212	991	1.628	85.968
			%	83,2	11,2	2,6	1,2	1,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	45.663	5.646	830	806	1.544	54.489	
			%	83,8	10,4	1,5	1,5	2,8	100,0	
	Secundaria, inferior	N	11.852	1.732	398	.	.	13.981		
		%	84,8	12,4	2,8	.	.	100,0		
	Secundaria, superior	N	7.854	1.370	985	185	84	10.478		
		%	75,0	13,1	9,4	1,8	0,8	100,0		
	Terciaria	N	6.121	898	.	.	.	7.020		
		%	87,2	12,8	.	.	.	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	683.786	154.525	65.835	48.002	23.734	975.882	
			%	70,1	15,8	6,7	4,9	2,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	223.110	31.968	13.458	7.321	2.470	278.327	
			%	80,2	11,5	4,8	2,6	0,9	100,0	
		Secundaria, inferior	N	123.576	24.080	10.840	6.970	4.300	169.766	
			%	72,8	14,2	6,4	4,1	2,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	190.474	61.539	24.303	21.117	10.434	307.866	
			%	61,9	20,0	7,9	6,9	3,4	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 202. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N	146.626	36.938	17.233	12.594	6.530	219.923
			%	66,7	16,8	7,8	5,7	3,0	100,0
	15-24	Total	N	44.726	19.203	13.465	8.711	3.394	89.499
			%	50,0	21,5	15,0	9,7	3,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.609	1.429	3.693	1.655	.	11.386
			%	40,5	12,5	32,4	14,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.145	3.305	2.155	2.034	1.124	16.763
			%	48,6	19,7	12,9	12,1	6,7	100,0
		Secundaria, superior	N	23.035	10.792	6.145	4.128	1.344	45.443
			%	50,7	23,7	13,5	9,1	3,0	100,0
		Terciaria	N	8.937	3.677	1.473	894	927	15.907
			%	56,2	23,1	9,3	5,6	5,8	100,0
	25-44	Total	N	188.484	63.656	30.877	25.731	12.077	320.826
			%	58,7	19,8	9,6	8,0	3,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	15.737	4.582	3.118	2.552	.	25.990
			%	60,6	17,6	12,0	9,8	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	22.896	7.106	4.254	2.652	2.028	38.937
			%	58,8	18,3	10,9	6,8	5,2	100,0
		Secundaria, superior	N	71.948	29.548	11.524	11.217	6.250	130.487
			%	55,1	22,6	8,8	8,6	4,8	100,0
		Terciaria	N	77.902	22.419	11.981	9.310	3.799	125.412
			%	62,1	17,9	9,6	7,4	3,0	100,0
	45-64	Total	N	233.083	46.862	15.785	11.827	6.212	313.769
			%	74,3	14,9	5,0	3,8	2,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	60.200	11.165	3.092	2.313	1.194	77.963
			%	77,2	14,3	4,0	3,0	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	47.867	8.686	2.970	1.668	544	61.735
			%	77,5	14,1	4,8	2,7	0,9	100,0
		Secundaria, superior	N	78.216	17.772	6.208	5.455	2.670	110.322
			%	70,9	16,1	5,6	4,9	2,4	100,0
		Terciaria	N	46.800	9.239	3.516	2.390	1.804	63.749
			%	73,4	14,5	5,5	3,7	2,8	100,0
	65-74	Total	N	93.780	11.265	2.890	715	1.275	109.925
			%	85,3	10,2	2,6	0,7	1,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 202. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	53.761	5.861	1.332	398	500	61.852
			%	86,9	9,5	2,2	0,6	0,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	23.300	2.679	867	.	606	27.452
			%	84,9	9,8	3,2	.	2,2	100,0
		Secundaria, superior	N	9.434	1.547	426	317	170	11.893
			%	79,3	13,0	3,6	2,7	1,4	100,0
	Terciaria	N	7.284	1.178	265	.	.	8.727	
		%	83,5	13,5	3,0	.	.	100,0	
	>=75	Total	N	123.713	13.540	2.817	1.019	776	141.864
			%	87,2	9,5	2,0	0,7	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	88.803	8.931	2.224	403	776	101.136
			%	87,8	8,8	2,2	0,4	0,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	21.367	2.303	593	616	.	24.879
			%	85,9	9,3	2,4	2,5	.	100,0
	Secundaria, superior	N	7.840	1.880	.	.	.	9.720	
		%	80,7	19,3	.	.	.	100,0	
	Terciaria	N	5.703	426	.	.	.	6.129	
		%	93,1	6,9	.	.	.	100,0	
Ambos	Total	Total	N	1.242.737	329.197	156.715	96.772	65.585	1.891.006
			%	65,7	17,4	8,3	5,1	3,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	370.005	64.666	31.227	13.636	9.392	488.927	
		%	75,7	13,2	6,4	2,8	1,9	100,0	
	Secundaria, inferior	N	221.695	60.860	27.256	13.867	13.542	337.220	
		%	65,7	18,0	8,1	4,1	4,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	397.237	130.074	62.204	48.578	30.443	668.536	
		%	59,4	19,5	9,3	7,3	4,6	100,0	
	Terciaria	N	253.800	73.597	36.027	20.691	12.208	396.323	
		%	64,0	18,6	9,1	5,2	3,1	100,0	
	15-24	Total	N	89.754	43.873	25.401	16.326	8.603	183.958
			%	48,8	23,8	13,8	8,9	4,7	100,0
Sin estudios, primaria		N	8.582	3.319	6.159	2.979	265	21.304	
		%	40,3	15,6	28,9	14,0	1,2	100,0	
Secundaria, inferior	N	23.177	12.425	5.795	3.487	3.007	47.891		
	%	48,4	25,9	12,1	7,3	6,3	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 202. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	42.982	22.136	11.264	7.830	4.072	88.283
			%	48,7	25,1	12,8	8,9	4,6	100,0
		Terciaria	N	15.014	5.993	2.183	2.031	1.258	26.479
			%	56,7	22,6	8,2	7,7	4,8	100,0
	25-44	Total	N	361.214	133.546	76.470	50.460	35.444	657.135
			%	55,0	20,3	11,6	7,7	5,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	36.493	10.296	10.564	3.417	2.996	63.765
			%	57,2	16,1	16,6	5,4	4,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	45.142	22.776	11.000	6.803	6.025	91.745
			%	49,2	24,8	12,0	7,4	6,6	100,0
		Secundaria, superior	N	157.415	58.894	32.025	26.961	19.466	294.762
			%	53,4	20,0	10,9	9,1	6,6	100,0
		Terciaria	N	122.165	41.580	22.881	13.279	6.957	206.862
			%	59,1	20,1	11,1	6,4	3,4	100,0
	45-64	Total	N	424.642	106.303	42.991	26.229	16.258	616.424
			%	68,9	17,2	7,0	4,3	2,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	104.809	26.914	8.510	5.371	2.758	148.363
			%	70,6	18,1	5,7	3,6	1,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	83.475	17.044	8.053	2.846	3.561	114.979
			%	72,6	14,8	7,0	2,5	3,1	100,0
		Secundaria, superior	N	150.114	41.327	16.577	13.035	6.400	227.452
			%	66,0	18,2	7,3	5,7	2,8	100,0
		Terciaria	N	86.244	21.019	9.851	4.978	3.538	125.630
			%	68,6	16,7	7,8	4,0	2,8	100,0
	65-74	Total	N	171.923	22.290	6.823	1.747	2.876	205.658
			%	83,6	10,8	3,3	0,8	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	85.655	9.561	2.940	661	1.053	99.869
			%	85,8	9,6	2,9	0,7	1,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	36.682	4.580	1.417	116	949	43.744
			%	83,9	10,5	3,2	0,3	2,2	100,0
		Secundaria, superior	N	31.032	4.468	1.354	567	420	37.841
			%	82,0	11,8	3,6	1,5	1,1	100,0
		Terciaria	N	18.553	3.681	1.112	403	455	24.204
			%	76,7	15,2	4,6	1,7	1,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 202. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	N	195.203	23.185	5.030	2.010	2.404	227.832
			%	85,7	10,2	2,2	0,9	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	134.466	14.577	3.054	1.209	2.320	155.625
			%	86,4	9,4	2,0	0,8	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	33.219	4.035	991	616	.	38.860
			%	85,5	10,4	2,6	1,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N	15.694	3.249	985	185	84	20.198
			%	77,7	16,1	4,9	0,9	0,4	100,0
		Terciaria	N	11.824	1.324	.	.	.	13.149
			%	89,9	10,1	.	.	.	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 203. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	Total	CAPV	N	69.699	486.898	307.815	42.838	7.875	915.124
			%	7,6	53,2	33,6	4,7	0,9	100,0
		Araba	N	16.609	80.304	32.632	3.408	798	133.751
			%	12,4	60,0	24,4	2,5	0,6	100,0
		Gipuzkoa	N	15.591	147.244	109.014	18.496	3.466	293.812
			%	5,3	50,1	37,1	6,3	1,2	100,0
		Bizkaia	N	37.498	259.351	166.169	20.933	3.610	487.561
			%	7,7	53,2	34,1	4,3	0,7	100,0
	15-24	CAPV	N	13.196	57.681	20.544	2.308	729	94.458
			%	14,0	61,1	21,7	2,4	0,8	100,0
		Araba	N	3.515	9.785	1.569	.	.	14.869
			%	23,6	65,8	10,6	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.285	18.774	7.878	1.638	729	31.305
			%	7,3	60,0	25,2	5,2	2,3	100,0
		Bizkaia	N	7.395	29.121	11.098	670	.	48.284
			%	15,3	60,3	23,0	1,4	.	100,0
	25-44	CAPV	N	32.675	195.258	96.813	10.178	1.385	336.309
			%	9,7	58,1	28,8	3,0	0,4	100,0
		Araba	N	7.983	31.723	10.589	1.535	231	52.062
			%	15,3	60,9	20,3	2,9	0,4	100,0
		Gipuzkoa	N	7.294	58.042	36.286	4.442	726	106.790
			%	6,8	54,4	34,0	4,2	0,7	100,0
		Bizkaia	N	17.398	105.493	49.938	4.200	429	177.458
			%	9,8	59,4	28,1	2,4	0,2	100,0
	45-64	CAPV	N	15.647	157.421	111.150	15.587	2.850	302.655
			%	5,2	52,0	36,7	5,2	0,9	100,0
		Araba	N	2.859	26.151	12.177	998	567	42.751
			%	6,7	61,2	28,5	2,3	1,3	100,0
		Gipuzkoa	N	3.281	47.508	38.937	6.243	1.449	97.419
			%	3,4	48,8	40,0	6,4	1,5	100,0
		Bizkaia	N	9.506	83.762	60.036	8.347	834	162.485
			%	5,9	51,6	36,9	5,1	0,5	100,0
	65-74	CAPV	N	4.896	41.064	42.007	6.981	784	95.733
			%	5,1	42,9	43,9	7,3	0,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 203. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Hombres	65-74	Araba	N	1.661	7.331	3.878	293	.	13.163	
			%	12,6	55,7	29,5	2,2	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.745	12.752	14.397	3.114	122	32.130	
			%	5,4	39,7	44,8	9,7	0,4	100,0	
		Bizkaia	N	1.490	20.982	23.732	3.574	663	50.440	
			%	3,0	41,6	47,1	7,1	1,3	100,0	
	>=75	CAPV		N	3.284	35.474	37.300	7.783	2.126	85.968
				%	3,8	41,3	43,4	9,1	2,5	100,0
		Araba		N	590	5.314	4.419	582	.	10.905
				%	5,4	48,7	40,5	5,3	.	100,0
		Gipuzkoa		N	985	10.168	11.516	3.059	441	26.168
				%	3,8	38,9	44,0	11,7	1,7	100,0
Bizkaia			N	1.709	19.993	21.365	4.142	1.685	48.895	
			%	3,5	40,9	43,7	8,5	3,4	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	55.051	465.996	365.054	68.095	21.687	975.882
				%	5,6	47,8	37,4	7,0	2,2	100,0
		Araba		N	12.230	73.894	41.689	6.134	2.825	136.772
				%	8,9	54,0	30,5	4,5	2,1	100,0
	Gipuzkoa		N	15.442	140.525	118.034	30.181	8.505	312.686	
			%	4,9	44,9	37,7	9,7	2,7	100,0	
	Bizkaia		N	27.379	251.577	205.331	31.780	10.357	526.425	
			%	5,2	47,8	39,0	6,0	2,0	100,0	
	15-24	CAPV		N	8.682	48.620	28.495	2.883	819	89.499
				%	9,7	54,3	31,8	3,2	0,9	100,0
		Araba		N	1.900	6.947	3.852	179	332	13.210
				%	14,4	52,6	29,2	1,4	2,5	100,0
Gipuzkoa			N	1.518	15.005	11.098	1.545	277	29.443	
			%	5,2	51,0	37,7	5,2	0,9	100,0	
Bizkaia			N	5.264	26.667	13.546	1.159	210	46.846	
			%	11,2	56,9	28,9	2,5	0,4	100,0	
25-44		CAPV		N	26.548	167.454	103.730	16.813	6.280	320.826
				%	8,3	52,2	32,3	5,2	2,0	100,0
		Araba		N	6.029	27.375	11.870	1.819	775	47.869
				%	12,6	57,2	24,8	3,8	1,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 203. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	7.263	48.677	35.823	6.561	3.580	101.905	
			%	7,1	47,8	35,2	6,4	3,5	100,0	
		Bizkaia	N	13.256	91.402	56.037	8.432	1.925	171.052	
			%	7,7	53,4	32,8	4,9	1,1	100,0	
	45-64	CAPV	N	11.618	152.785	118.785	21.893	8.688	313.769	
			%	3,7	48,7	37,9	7,0	2,8	100,0	
		Araba	N	2.451	25.325	13.692	1.984	811	44.263	
			%	5,5	57,2	30,9	4,5	1,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	2.949	45.544	36.313	11.632	3.223	99.662	
			%	3,0	45,7	36,4	11,7	3,2	100,0	
		Bizkaia	N	6.218	81.915	68.780	8.277	4.654	169.843	
			%	3,7	48,2	40,5	4,9	2,7	100,0	
	65-74	CAPV	N	4.040	46.778	48.503	8.311	2.291	109.925	
			%	3,7	42,6	44,1	7,6	2,1	100,0	
		Araba	N	777	7.516	4.876	731	420	14.320	
			%	5,4	52,5	34,0	5,1	2,9	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.199	14.215	16.759	3.101	846	36.120	
			%	3,3	39,4	46,4	8,6	2,3	100,0	
		Bizkaia	N	2.065	25.047	26.868	4.479	1.025	59.484	
			%	3,5	42,1	45,2	7,5	1,7	100,0	
		>=75	CAPV	N	4.163	50.359	65.540	18.195	3.608	141.864
				%	2,9	35,5	46,2	12,8	2,5	100,0
			Araba	N	1.073	6.730	7.400	1.420	486	17.110
				%	6,3	39,3	43,3	8,3	2,8	100,0
Gipuzkoa	N		2.512	17.083	18.040	7.341	578	45.555		
	%		5,5	37,5	39,6	16,1	1,3	100,0		
Bizkaia	N		577	26.546	40.100	9.434	2.543	79.200		
	%		0,7	33,5	50,6	11,9	3,2	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	124.750	952.894	672.869	110.933	29.561	1.891.006	
		%	6,6	50,4	35,6	5,9	1,6	100,0		
	Araba	N	28.839	154.197	74.321	9.542	3.623	270.523		
		%	10,7	57,0	27,5	3,5	1,3	100,0		
	Gipuzkoa	N	31.033	287.769	227.048	48.677	11.971	606.497		
		%	5,1	47,4	37,4	8,0	2,0	100,0		
	Bizkaia	N	64.877	510.928	371.500	52.714	13.967	1.013.987		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 203. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
		A diario								
Ambos	Total	Bizkaia	%	6,4	50,4	36,6	5,2	1,4	100,0	
	15-24	CAPV	N	21.878	106.301	49.040	5.191	1.548	183.958	
			%	11,9	57,8	26,7	2,8	0,8	100,0	
		Araba	N	5.415	16.732	5.420	179	332	28.079	
			%	19,3	59,6	19,3	0,6	1,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	3.803	33.780	18.976	3.183	1.006	60.748	
			%	6,3	55,6	31,2	5,2	1,7	100,0	
		Bizkaia	N	12.660	55.789	24.643	1.829	210	95.130	
			%	13,3	58,6	25,9	1,9	0,2	100,0	
		25-44	CAPV	N	59.223	362.712	200.543	26.991	7.665	657.135
			%	9,0	55,2	30,5	4,1	1,2	100,0	
		Araba	N	14.013	59.098	22.459	3.355	1.006	99.930	
			%	14,0	59,1	22,5	3,4	1,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	14.557	106.719	72.109	11.003	4.306	208.695	
			%	7,0	51,1	34,6	5,3	2,1	100,0	
		Bizkaia	N	30.653	196.895	105.975	12.633	2.353	348.509	
			%	8,8	56,5	30,4	3,6	0,7	100,0	
		45-64	CAPV	N	27.265	310.205	229.935	37.481	11.538	616.424
			%	4,4	50,3	37,3	6,1	1,9	100,0	
		Araba	N	5.310	51.476	25.868	2.982	1.378	87.015	
			%	6,1	59,2	29,7	3,4	1,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	6.231	93.052	75.250	17.875	4.672	197.081	
			%	3,2	47,2	38,2	9,1	2,4	100,0	
		Bizkaia	N	15.724	165.677	128.816	16.623	5.488	332.328	
			%	4,7	49,9	38,8	5,0	1,7	100,0	
		65-74	CAPV	N	8.937	87.843	90.511	15.293	3.075	205.658
			%	4,3	42,7	44,0	7,4	1,5	100,0	
		Araba	N	2.438	14.847	8.754	1.024	420	27.483	
		%	8,9	54,0	31,9	3,7	1,5	100,0		
	Gipuzkoa	N	2.944	26.967	31.156	6.215	968	68.251		
		%	4,3	39,5	45,7	9,1	1,4	100,0		
	Bizkaia	N	3.554	46.029	50.600	8.053	1.688	109.924		
		%	3,2	41,9	46,0	7,3	1,5	100,0		
	>=75	CAPV	N	7.447	85.833	102.841	25.978	5.734	227.832	
		%	3,3	37,7	45,1	11,4	2,5	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 203. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	Araba	N	1.663	12.044	11.820	2.001	486	28.015
			%	5,9	43,0	42,2	7,1	1,7	100,0
	Gipuzkoa	N	3.497	27.251	29.556	10.400	1.019	71.723	
		%	4,9	38,0	41,2	14,5	1,4	100,0	
	Bizkaia	N	2.286	46.538	61.466	13.576	4.229	128.094	
		%	1,8	36,3	48,0	10,6	3,3	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 204. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
		A diario						
Hombres Total	Total	N	69.438	486.196	307.517	42.838	7.875	913.863
		%	7,6	53,2	33,7	4,7	0,9	100,0
I	N	5.367	58.686	42.303	5.966	1.368	113.690	
	%	4,7	51,6	37,2	5,2	1,2	100,0	
II	N	6.266	41.320	25.386	4.997	237	78.206	
	%	8,0	52,8	32,5	6,4	0,3	100,0	
III	N	14.148	98.985	65.570	7.921	1.730	188.355	
	%	7,5	52,6	34,8	4,2	0,9	100,0	
IV	N	33.422	243.712	148.721	21.459	2.993	450.306	
	%	7,4	54,1	33,0	4,8	0,7	100,0	
V	N	10.236	43.492	25.537	2.496	1.547	83.307	
	%	12,3	52,2	30,7	3,0	1,9	100,0	
15-24 Total	N	12.936	57.681	20.246	2.308	729	93.900	
	%	13,8	61,4	21,6	2,5	0,8	100,0	
I	N	1.207	8.825	4.603	.	.	14.634	
	%	8,2	60,3	31,5	.	.	100,0	
II	N	1.333	7.353	2.302	.	.	10.988	
	%	12,1	66,9	20,9	.	.	100,0	
III	N	2.859	10.371	3.026	304	270	16.830	
	%	17,0	61,6	18,0	1,8	1,6	100,0	
IV	N	5.977	26.590	8.268	1.738	164	42.737	
	%	14,0	62,2	19,3	4,1	0,4	100,0	
V	N	1.560	4.542	2.048	265	295	8.711	
	%	17,9	52,1	23,5	3,0	3,4	100,0	
25-44 Total	N	32.675	195.258	96.813	10.178	1.385	336.309	
	%	9,7	58,1	28,8	3,0	0,4	100,0	
I	N	2.980	25.445	13.090	1.986	231	43.732	
	%	6,8	58,2	29,9	4,5	0,5	100,0	
II	N	3.507	19.828	7.454	1.708	.	32.496	
	%	10,8	61,0	22,9	5,3	.	100,0	
III	N	5.697	37.753	17.411	1.397	.	62.257	
	%	9,2	60,6	28,0	2,2	.	100,0	
IV	N	15.208	91.697	48.199	4.134	1.154	160.392	
	%	9,5	57,2	30,1	2,6	0,7	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 204. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres 25-44 V	N		5.284	20.535	10.660	952	.	37.432
	%		14,1	54,9	28,5	2,5	.	100,0
45-64 Total	N		15.647	157.133	111.150	15.587	2.850	302.368
	%		5,2	52,0	36,8	5,2	0,9	100,0
I	N		609	19.261	14.980	2.034	1.022	37.907
	%		1,6	50,8	39,5	5,4	2,7	100,0
II	N		1.117	10.356	10.366	1.344	237	23.419
	%		4,8	44,2	44,3	5,7	1,0	100,0
III	N		3.155	33.341	26.243	2.678	905	66.322
	%		4,8	50,3	39,6	4,0	1,4	100,0
IV	N		7.793	80.780	52.781	8.808	452	150.614
	%		5,2	53,6	35,0	5,8	0,3	100,0
V	N		2.973	13.396	6.779	723	235	24.106
	%		12,3	55,6	28,1	3,0	1,0	100,0
65-74 Total	N		4.896	41.064	42.007	6.981	784	95.733
	%		5,1	42,9	43,9	7,3	0,8	100,0
I	N		502	4.261	7.474	1.402	115	13.753
	%		3,6	31,0	54,3	10,2	0,8	100,0
II	N		309	2.324	2.893	1.336	.	6.862
	%		4,5	33,9	42,2	19,5	.	100,0
III	N		1.257	8.942	9.878	1.291	408	21.777
	%		5,8	41,1	45,4	5,9	1,9	100,0
IV	N		2.552	22.876	19.257	2.806	261	47.753
	%		5,3	47,9	40,3	5,9	0,5	100,0
V	N		276	2.661	2.505	147	.	5.588
	%		4,9	47,6	44,8	2,6	.	100,0
>=75 Total	N		3.284	35.059	37.300	7.783	2.126	85.553
	%		3,8	41,0	43,6	9,1	2,5	100,0
I	N		69	895	2.155	544	.	3.663
	%		1,9	24,4	58,8	14,9	.	100,0
II	N		.	1.460	2.371	609	.	4.440
	%		.	32,9	53,4	13,7	.	100,0
III	N		1.180	8.579	9.012	2.250	147	21.169
	%		5,6	40,5	42,6	10,6	0,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 204. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres >=75	IV	N	1.892	21.769	20.216	3.971	961	48.810	
		%	3,9	44,6	41,4	8,1	2,0	100,0	
	V	N	142	2.357	3.545	409	1.017	7.470	
		%	1,9	31,6	47,5	5,5	13,6	100,0	
Mujeres	Total	Total N	54.442	465.515	363.753	68.095	21.687	973.492	
		%	5,6	47,8	37,4	7,0	2,2	100,0	
	I	N	6.497	48.856	37.797	7.623	4.064	104.838	
		%	6,2	46,6	36,1	7,3	3,9	100,0	
	II	N	4.201	47.194	35.782	5.164	2.688	95.028	
		%	4,4	49,7	37,7	5,4	2,8	100,0	
	III	N	14.887	114.641	89.956	17.546	5.077	242.107	
		%	6,1	47,4	37,2	7,2	2,1	100,0	
	IV	N	19.049	175.094	134.733	26.032	5.534	360.441	
		%	5,3	48,6	37,4	7,2	1,5	100,0	
	V	N	9.808	79.731	65.485	11.730	4.324	171.077	
		%	5,7	46,6	38,3	6,9	2,5	100,0	
	15-24	Total	N	8.173	48.620	28.039	2.883	819	88.533
			%	9,2	54,9	31,7	3,3	0,9	100,0
	I	N	1.235	8.765	4.053	509	.	14.562	
		%	8,5	60,2	27,8	3,5	.	100,0	
	II	N	1.795	6.356	5.346	.	.	13.497	
		%	13,3	47,1	39,6	.	.	100,0	
	III	N	1.864	10.051	6.944	1.001	210	20.069	
		%	9,3	50,1	34,6	5,0	1,0	100,0	
IV	N	2.719	18.002	8.910	1.373	609	31.614		
	%	8,6	56,9	28,2	4,3	1,9	100,0		
V	N	560	5.447	2.785	.	.	8.792		
	%	6,4	62,0	31,7	.	.	100,0		
25-44	Total	N	26.548	167.229	103.460	16.813	6.280	320.330	
		%	8,3	52,2	32,3	5,2	2,0	100,0	
I	N	4.818	18.389	16.916	3.457	1.506	45.086		
	%	10,7	40,8	37,5	7,7	3,3	100,0		
II	N	1.627	19.454	13.479	1.517	1.146	37.223		
	%	4,4	52,3	36,2	4,1	3,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 204. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	6.210	41.092	28.756	4.021	1.951	82.029
			%	7,6	50,1	35,1	4,9	2,4	100,0
		IV	N	9.142	64.683	31.328	4.564	1.009	110.725
			%	8,3	58,4	28,3	4,1	0,9	100,0
		V	N	4.751	23.611	12.981	3.255	668	45.267
			%	10,5	52,2	28,7	7,2	1,5	100,0
	45-64	Total	N	11.618	152.785	118.614	21.893	8.688	313.598
			%	3,7	48,7	37,8	7,0	2,8	100,0
	I	N	303	16.098	11.151	2.450	2.114	32.116	
		%	0,9	50,1	34,7	7,6	6,6	100,0	
	II	N	274	13.889	10.237	1.195	1.197	26.792	
		%	1,0	51,8	38,2	4,5	4,5	100,0	
	III	N	4.971	41.936	32.284	7.814	1.636	88.641	
		%	5,6	47,3	36,4	8,8	1,8	100,0	
	IV	N	3.892	50.043	40.863	7.441	1.863	104.102	
		%	3,7	48,1	39,3	7,1	1,8	100,0	
	V	N	2.178	30.818	24.078	2.994	1.878	61.946	
		%	3,5	49,7	38,9	4,8	3,0	100,0	
	65-74	Total	N	4.040	46.623	48.503	8.311	2.291	109.770
			%	3,7	42,5	44,2	7,6	2,1	100,0
	I	N	140	3.221	3.106	487	245	7.199	
		%	1,9	44,7	43,1	6,8	3,4	100,0	
	II	N	310	2.932	3.109	873	.	7.225	
		%	4,3	40,6	43,0	12,1	.	100,0	
III	N	613	9.479	10.546	1.770	492	22.899		
	%	2,7	41,4	46,1	7,7	2,1	100,0		
IV	N	1.570	20.702	23.063	4.019	780	50.134		
	%	3,1	41,3	46,0	8,0	1,6	100,0		
V	N	1.407	10.289	8.679	1.162	774	22.312		
	%	6,3	46,1	38,9	5,2	3,5	100,0		
>=75	Total	N	4.063	50.259	65.136	18.195	3.608	141.261	
		%	2,9	35,6	46,1	12,9	2,6	100,0	
I	N	.	2.383	2.571	721	199	5.875		
	%	.	40,6	43,8	12,3	3,4	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 204. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	>=75	II	N	196	4.563	3.609	1.578	345	10.292	
			%	1,9	44,3	35,1	15,3	3,4	100,0	
		III	N	1.230	12.084	11.426	2.941	788	28.468	
			%	4,3	42,4	40,1	10,3	2,8	100,0	
		IV	N	1.726	21.663	30.569	8.635	1.272	63.866	
			%	2,7	33,9	47,9	13,5	2,0	100,0	
		V	N	912	9.566	16.961	4.319	1.003	32.760	
			%	2,8	29,2	51,8	13,2	3,1	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	123.880	951.711	671.270	110.933	29.561	1.887.356
				%	6,6	50,4	35,6	5,9	1,6	100,0
		I	N	11.864	107.543	80.100	13.589	5.432	218.528	
			%	5,4	49,2	36,7	6,2	2,5	100,0	
		II	N	10.467	88.514	61.168	10.161	2.925	173.234	
			%	6,0	51,1	35,3	5,9	1,7	100,0	
		III	N	29.035	213.626	155.526	25.467	6.807	430.462	
			%	6,7	49,6	36,1	5,9	1,6	100,0	
		IV	N	52.471	418.805	283.454	47.490	8.526	810.747	
			%	6,5	51,7	35,0	5,9	1,1	100,0	
		V	N	20.044	123.222	91.022	14.226	5.871	254.385	
			%	7,9	48,4	35,8	5,6	2,3	100,0	
		15-24	Total	N	21.109	106.301	48.285	5.191	1.548	182.434
				%	11,6	58,3	26,5	2,8	0,8	100,0
			I	N	2.442	17.589	8.656	509	.	29.196
				%	8,4	60,2	29,6	1,7	.	100,0
			II	N	3.128	13.708	7.648	.	.	24.485
				%	12,8	56,0	31,2	.	.	100,0
		III	N	4.723	20.421	9.970	1.305	480	36.900	
			%	12,8	55,3	27,0	3,5	1,3	100,0	
		IV	N	8.695	44.592	17.178	3.112	773	74.351	
			%	11,7	60,0	23,1	4,2	1,0	100,0	
		V	N	2.120	9.989	4.834	265	295	17.503	
			%	12,1	57,1	27,6	1,5	1,7	100,0	
		25-44	Total	N	59.223	362.486	200.274	26.991	7.665	656.640
				%	9,0	55,2	30,5	4,1	1,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 204. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	25-44	I	N	7.798	43.834	30.006	5.443	1.736	88.818
			%	8,8	49,4	33,8	6,1	2,0	100,0
		II	N	5.133	39.282	20.933	3.225	1.146	69.719
			%	7,4	56,3	30,0	4,6	1,6	100,0
		III	N	11.906	78.845	46.167	5.417	1.951	144.286
			%	8,3	54,6	32,0	3,8	1,4	100,0
		IV	N	24.350	156.380	79.526	8.698	2.163	271.117
			%	9,0	57,7	29,3	3,2	0,8	100,0
		V	N	10.036	44.146	23.641	4.207	668	82.699
			%	12,1	53,4	28,6	5,1	0,8	100,0
	45-64	Total	N	27.265	309.918	229.764	37.481	11.538	615.965
			%	4,4	50,3	37,3	6,1	1,9	100,0
		I	N	912	35.360	26.131	4.484	3.137	70.023
			%	1,3	50,5	37,3	6,4	4,5	100,0
		II	N	1.390	24.245	20.604	2.540	1.433	50.212
			%	2,8	48,3	41,0	5,1	2,9	100,0
		III	N	8.126	75.276	58.527	10.492	2.541	154.963
			%	5,2	48,6	37,8	6,8	1,6	100,0
		IV	N	11.685	130.823	93.645	16.249	2.314	254.716
			%	4,6	51,4	36,8	6,4	0,9	100,0
		V	N	5.151	44.214	30.857	3.716	2.113	86.052
			%	6,0	51,4	35,9	4,3	2,5	100,0
	65-74	Total	N	8.937	87.687	90.511	15.293	3.075	205.503
			%	4,3	42,7	44,0	7,4	1,5	100,0
		I	N	642	7.482	10.580	1.889	360	20.952
			%	3,1	35,7	50,5	9,0	1,7	100,0
		II	N	619	5.256	6.003	2.209	.	14.087
			%	4,4	37,3	42,6	15,7	.	100,0
		III	N	1.870	18.421	20.424	3.062	900	44.676
			%	4,2	41,2	45,7	6,9	2,0	100,0
		IV	N	4.122	43.578	42.320	6.825	1.042	97.887
			%	4,2	44,5	43,2	7,0	1,1	100,0
		V	N	1.683	12.951	11.184	1.309	774	27.901
			%	6,0	46,4	40,1	4,7	2,8	100,0
	>=75	Total	N	7.347	85.319	102.437	25.978	5.734	226.814

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 204. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	%	3,2	37,6	45,2	11,5	2,5	100,0
		I	N	69	3.278	4.727	1.265	199	9.538
			%	0,7	34,4	49,6	13,3	2,1	100,0
		II	N	196	6.023	5.981	2.187	345	14.731
			%	1,3	40,9	40,6	14,8	2,3	100,0
		III	N	2.410	20.663	20.438	5.191	935	49.638
			%	4,9	41,6	41,2	10,5	1,9	100,0
		IV	N	3.618	43.432	50.785	12.606	2.234	112.676
			%	3,2	38,5	45,1	11,2	2,0	100,0
		V	N	1.054	11.922	20.506	4.728	2.020	40.231
			%	2,6	29,6	51,0	11,8	5,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

853

Tabla 205. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres Total	Total	N	69.699	486.898	307.815	42.838	7.875	915.124
		%	7,6	53,2	33,6	4,7	0,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	14.261	111.818	69.582	12.630	2.309	210.600
		%	6,8	53,1	33,0	6,0	1,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	14.245	89.119	56.717	6.914	460	167.454
		%	8,5	53,2	33,9	4,1	0,3	100,0
	Secundaria, superior	N	28.516	193.464	120.414	15.138	3.137	360.670
		%	7,9	53,6	33,4	4,2	0,9	100,0
	Terciaria	N	12.676	92.497	61.102	8.156	1.969	176.400
		%	7,2	52,4	34,6	4,6	1,1	100,0
	15-24 Total	N	13.196	57.681	20.544	2.308	729	94.458
		%	14,0	61,1	21,7	2,4	0,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.112	6.582	1.794	265	164	9.918
		%	11,2	66,4	18,1	2,7	1,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	6.252	17.601	6.364	912	.	31.129
		%	20,1	56,5	20,4	2,9	.	100,0
	Secundaria, superior	N	4.172	27.196	9.776	1.131	565	42.840
		%	9,7	63,5	22,8	2,6	1,3	100,0
	Terciaria	N	1.660	6.302	2.610	.	.	10.572
		%	15,7	59,6	24,7	.	.	100,0
	25-44 Total	N	32.675	195.258	96.813	10.178	1.385	336.309
		%	9,7	58,1	28,8	3,0	0,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.056	20.376	12.450	894	.	37.776
		%	10,7	53,9	33,0	2,4	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	4.587	31.589	14.717	1.915	.	52.808
		%	8,7	59,8	27,9	3,6	.	100,0
	Secundaria, superior	N	16.548	92.863	48.316	5.163	1.385	164.274
		%	10,1	56,5	29,4	3,1	0,8	100,0
	Terciaria	N	7.485	50.429	21.331	2.206	.	81.451
		%	9,2	61,9	26,2	2,7	.	100,0
	45-64 Total	N	15.647	157.421	111.150	15.587	2.850	302.655
		%	5,2	52,0	36,7	5,2	0,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.480	42.686	19.571	4.116	546	70.400
		%	4,9	60,6	27,8	5,8	0,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 205. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	2.795	27.765	19.915	2.511	259	53.244
			%	5,2	52,1	37,4	4,7	0,5	100,0
		Secundaria, superior	N	6.623	58.492	46.090	5.237	688	117.130
			%	5,7	49,9	39,3	4,5	0,6	100,0
		Terciaria	N	2.749	28.478	25.573	3.724	1.357	61.881
			%	4,4	46,0	41,3	6,0	2,2	100,0
		65-74 Total	N	4.896	41.064	42.007	6.981	784	95.733
			%	5,1	42,9	43,9	7,3	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.816	18.653	13.497	2.790	261	38.017
			%	7,4	49,1	35,5	7,3	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	420	6.130	8.732	1.011	.	16.291
			%	2,6	37,6	53,6	6,2	.	100,0
		Secundaria, superior	N	946	11.590	11.370	1.772	269	25.948
			%	3,6	44,7	43,8	6,8	1,0	100,0
		Terciaria	N	714	4.691	8.408	1.409	254	15.477
			%	4,6	30,3	54,3	9,1	1,6	100,0
		>=75 Total	N	3.284	35.474	37.300	7.783	2.126	85.968
			%	3,8	41,3	43,4	9,1	2,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.797	23.521	22.270	4.564	1.337	54.489	
		%	5,1	43,2	40,9	8,4	2,5	100,0	
	Secundaria, inferior	N	191	6.035	6.990	565	200	13.981	
		%	1,4	43,2	50,0	4,0	1,4	100,0	
	Secundaria, superior	N	227	3.323	4.862	1.836	230	10.478	
		%	2,2	31,7	46,4	17,5	2,2	100,0	
	Terciaria	N	69	2.596	3.179	817	359	7.020	
		%	1,0	37,0	45,3	11,6	5,1	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	55.051	465.996	365.054	68.095	21.687	975.882
			%	5,6	47,8	37,4	7,0	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	10.874	122.403	112.628	24.558	7.863	278.327
			%	3,9	44,0	40,5	8,8	2,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.785	74.880	72.391	12.353	2.358	169.766
			%	4,6	44,1	42,6	7,3	1,4	100,0
		Secundaria, superior	N	23.367	160.697	100.296	17.498	6.008	307.866
			%	7,6	52,2	32,6	5,7	2,0	100,0
		Terciaria	N	13.025	108.016	79.739	13.687	5.457	219.923

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 205. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	%	5,9	49,1	36,3	6,2	2,5	100,0
	15-24	Total	N	8.682	48.620	28.495	2.883	819	89.499
			%	9,7	54,3	31,8	3,2	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	797	7.224	3.365	.	.	11.386
			%	7,0	63,4	29,6	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.173	7.996	5.745	647	202	16.763
			%	13,0	47,7	34,3	3,9	1,2	100,0
		Secundaria, superior	N	4.187	25.426	12.976	2.236	618	45.443
			%	9,2	56,0	28,6	4,9	1,4	100,0
		Terciaria	N	1.525	7.973	6.408	.	.	15.907
			%	9,6	50,1	40,3	.	.	100,0
	25-44	Total	N	26.548	167.454	103.730	16.813	6.280	320.826
			%	8,3	52,2	32,3	5,2	2,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.097	16.453	5.543	2.510	386	25.990
			%	4,2	63,3	21,3	9,7	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.156	20.432	13.548	2.288	513	38.937
			%	5,5	52,5	34,8	5,9	1,3	100,0
		Secundaria, superior	N	13.409	71.410	37.327	5.555	2.787	130.487
			%	10,3	54,7	28,6	4,3	2,1	100,0
		Terciaria	N	9.887	59.159	47.312	6.460	2.595	125.412
			%	7,9	47,2	37,7	5,2	2,1	100,0
	45-64	Total	N	11.618	152.785	118.785	21.893	8.688	313.769
			%	3,7	48,7	37,9	7,0	2,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.626	36.574	31.400	4.955	2.408	77.963
			%	3,4	46,9	40,3	6,4	3,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.403	28.913	25.664	3.802	953	61.735
			%	3,9	46,8	41,6	6,2	1,5	100,0
		Secundaria, superior	N	5.269	53.759	41.537	7.293	2.464	110.322
			%	4,8	48,7	37,7	6,6	2,2	100,0
		Terciaria	N	1.320	33.539	20.185	5.843	2.862	63.749
			%	2,1	52,6	31,7	9,2	4,5	100,0
	65-74	Total	N	4.040	46.778	48.503	8.311	2.291	109.925
			%	3,7	42,6	44,1	7,6	2,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.769	27.062	26.279	4.114	1.628	61.852
			%	4,5	43,8	42,5	6,7	2,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

856

Tabla 205. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Mujeres	65-74	Secundaria, inferior	N	954	8.692	14.814	2.469	524	27.452		
			%	3,5	31,7	54,0	9,0	1,9	100,0		
		Secundaria, superior	N	112	6.804	3.934	904	139	11.893		
			%	0,9	57,2	33,1	7,6	1,2	100,0		
		Terciaria	N	206	4.221	3.476	824	.	8.727		
			%	2,4	48,4	39,8	9,4	.	100,0		
	>=75	Total	N	4.163	50.359	65.540	18.195	3.608	141.864		
			%	2,9	35,5	46,2	12,8	2,5	100,0		
	Ambos	Total	Sin estudios, primaria	N	3.586	35.090	46.040	12.979	3.442	101.136	
				%	3,5	34,7	45,5	12,8	3,4	100,0	
			Secundaria, inferior	N	99	8.848	12.619	3.147	166	24.879	
				%	0,4	35,6	50,7	12,6	0,7	100,0	
			Secundaria, superior	N	390	3.297	4.523	1.510	.	9.720	
				%	4,0	33,9	46,5	15,5	.	100,0	
		Terciaria	N	87	3.124	2.358	559	.	6.129		
			%	1,4	51,0	38,5	9,1	.	100,0		
		15-24	Total	Sin estudios, primaria	N	124.750	952.894	672.869	110.933	29.561	1.891.006
					%	6,6	50,4	35,6	5,9	1,6	100,0
Secundaria, inferior				N	25.135	234.221	182.210	37.188	10.172	488.927	
				%	5,1	47,9	37,3	7,6	2,1	100,0	
Secundaria, superior	N			22.030	163.999	129.107	19.266	2.818	337.220		
	%			6,5	48,6	38,3	5,7	0,8	100,0		
Terciaria	N		51.883	354.161	220.711	32.636	9.145	668.536			
	%		7,8	53,0	33,0	4,9	1,4	100,0			
15-24	Total		N	25.701	200.513	140.841	21.843	7.426	396.323		
			%	6,5	50,6	35,5	5,5	1,9	100,0		
	Sin estudios, primaria		N	21.878	106.301	49.040	5.191	1.548	183.958		
			%	11,9	57,8	26,7	2,8	0,8	100,0		
	Secundaria, inferior	N	1.909	13.807	5.159	265	164	21.304			
		%	9,0	64,8	24,2	1,2	0,8	100,0			
Secundaria, superior	N	8.425	25.597	12.109	1.559	202	47.891				
	%	17,6	53,4	25,3	3,3	0,4	100,0				
Secundaria, superior	N	8.359	52.622	22.753	3.367	1.183	88.283				
	%	9,5	59,6	25,8	3,8	1,3	100,0				

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

857

Tabla 205. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	15-24	Terciaria	N	3.185	14.275	9.019	.	.	26.479
			%	12,0	53,9	34,1	.	.	100,0
	25-44	Total	N	59.223	362.712	200.543	26.991	7.665	657.135
			%	9,0	55,2	30,5	4,1	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.153	36.829	17.993	3.405	386	63.765
			%	8,1	57,8	28,2	5,3	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.743	52.021	28.264	4.203	513	91.745
			%	7,3	56,7	30,8	4,6	0,6	100,0
		Secundaria, superior	N	29.956	164.273	85.643	10.717	4.172	294.762
			%	10,2	55,7	29,1	3,6	1,4	100,0
		Terciaria	N	17.371	109.588	68.643	8.666	2.595	206.862
			%	8,4	53,0	33,2	4,2	1,3	100,0
	45-64	Total	N	27.265	310.205	229.935	37.481	11.538	616.424
			%	4,4	50,3	37,3	6,1	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.106	79.260	50.972	9.071	2.954	148.363
			%	4,1	53,4	34,4	6,1	2,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.198	56.677	45.579	6.313	1.213	114.979
			%	4,5	49,3	39,6	5,5	1,1	100,0
		Secundaria, superior	N	11.892	112.251	87.626	12.530	3.152	227.452
			%	5,2	49,4	38,5	5,5	1,4	100,0
		Terciaria	N	4.069	62.017	45.758	9.567	4.219	125.630
			%	3,2	49,4	36,4	7,6	3,4	100,0
	65-74	Total	N	8.937	87.843	90.511	15.293	3.075	205.658
			%	4,3	42,7	44,0	7,4	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.585	45.715	39.776	6.904	1.889	99.869
			%	5,6	45,8	39,8	6,9	1,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.373	14.821	23.546	3.479	524	43.744
			%	3,1	33,9	53,8	8,0	1,2	100,0
		Secundaria, superior	N	1.058	18.394	15.304	2.676	408	37.841
			%	2,8	48,6	40,4	7,1	1,1	100,0
		Terciaria	N	920	8.912	11.884	2.233	254	24.204
			%	3,8	36,8	49,1	9,2	1,0	100,0
	>=75	Total	N	7.447	85.833	102.841	25.978	5.734	227.832
			%	3,3	37,7	45,1	11,4	2,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 205. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	Sin estudios, primaria	N	6.382	58.611	68.310	17.543	4.779	155.625
			%	4,1	37,7	43,9	11,3	3,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	290	14.882	19.609	3.712	366	38.860
			%	0,7	38,3	50,5	9,6	0,9	100,0
		Secundaria, superior	N	618	6.620	9.385	3.346	230	20.198
			%	3,1	32,8	46,5	16,6	1,1	100,0
		Terciaria	N	156	5.721	5.537	1.376	359	13.149
			%	1,2	43,5	42,1	10,5	2,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 206. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y territorio histórico

Hombres	Total	CAPV	N	A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
			N	19.998	328.226	444.918	101.379	20.602	915.124
			%	2,2	35,9	48,6	11,1	2,3	100,0
		Araba	N	4.381	48.209	64.518	14.970	1.672	133.751
			%	3,3	36,0	48,2	11,2	1,3	100,0
		Gipuzkoa	N	6.207	96.645	157.107	28.860	4.992	293.812
			%	2,1	32,9	53,5	9,8	1,7	100,0
		Bizkaia	N	9.411	183.371	223.293	57.549	13.938	487.561
			%	1,9	37,6	45,8	11,8	2,9	100,0
	15-24	CAPV	N	900	25.938	46.519	15.853	5.249	94.458
			%	1,0	27,5	49,2	16,8	5,6	100,0
		Araba	N	.	4.346	7.855	1.989	679	14.869
			%	.	29,2	52,8	13,4	4,6	100,0
		Gipuzkoa	N	164	8.700	15.285	6.406	750	31.305
			%	0,5	27,8	48,8	20,5	2,4	100,0
		Bizkaia	N	736	12.891	23.379	7.457	3.821	48.284
			%	1,5	26,7	48,4	15,4	7,9	100,0
	25-44	CAPV	N	4.331	94.699	174.859	50.794	11.626	336.309
			%	1,3	28,2	52,0	15,1	3,5	100,0
		Araba	N	1.598	12.963	26.252	10.617	632	52.062
			%	3,1	24,9	50,4	20,4	1,2	100,0
		Gipuzkoa	N	1.764	25.936	63.735	12.370	2.985	106.790
			%	1,7	24,3	59,7	11,6	2,8	100,0
		Bizkaia	N	969	55.801	84.872	27.808	8.008	177.458
			%	0,5	31,4	47,8	15,7	4,5	100,0
	45-64	CAPV	N	6.473	113.880	152.403	27.980	1.919	302.655
			%	2,1	37,6	50,4	9,2	0,6	100,0
		Araba	N	1.367	17.306	21.788	1.929	362	42.751
			%	3,2	40,5	51,0	4,5	0,8	100,0
		Gipuzkoa	N	1.442	31.759	55.805	7.437	976	97.419
			%	1,5	32,6	57,3	7,6	1,0	100,0
		Bizkaia	N	3.664	64.815	74.811	18.614	581	162.485
			%	2,3	39,9	46,0	11,5	0,4	100,0
	65-74	CAPV	N	3.038	51.409	37.753	3.211	322	95.733
			%	3,2	53,7	39,4	3,4	0,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 206. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres 65-74	Araba	N	406	7.614	4.708	435	.	13.163	
		%	3,1	57,8	35,8	3,3	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	1.450	16.403	12.810	1.300	167	32.130	
		%	4,5	51,1	39,9	4,0	0,5	100,0	
	Bizkaia	N	1.182	27.392	20.235	1.475	155	50.440	
		%	2,3	54,3	40,1	2,9	0,3	100,0	
	>=75	CAPV	N	5.256	42.300	33.384	3.541	1.486	85.968
			%	6,1	49,2	38,8	4,1	1,7	100,0
		Araba	N	1.009	5.980	3.915	.	.	10.905
			%	9,3	54,8	35,9	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.387	13.847	9.472	1.348	114	26.168
			%	5,3	52,9	36,2	5,2	0,4	100,0
	Bizkaia	N	2.861	22.472	19.996	2.194	1.372	48.895	
		%	5,9	46,0	40,9	4,5	2,8	100,0	
Mujeres	Total	CAPV	N	32.692	398.342	436.151	87.412	21.285	975.882
			%	3,4	40,8	44,7	9,0	2,2	100,0
		Araba	N	6.620	59.901	56.874	11.167	2.210	136.772
			%	4,8	43,8	41,6	8,2	1,6	100,0
		Gipuzkoa	N	10.957	112.686	153.288	29.694	6.061	312.686
			%	3,5	36,0	49,0	9,5	1,9	100,0
		Bizkaia	N	15.115	225.756	225.990	46.551	13.014	526.425
			%	2,9	42,9	42,9	8,8	2,5	100,0
	15-24	CAPV	N	500	22.921	46.187	15.856	4.035	89.499
			%	0,6	25,6	51,6	17,7	4,5	100,0
		Araba	N	163	4.136	6.474	1.582	855	13.210
			%	1,2	31,3	49,0	12,0	6,5	100,0
		Gipuzkoa	N	.	6.959	18.806	3.172	507	29.443
			%	.	23,6	63,9	10,8	1,7	100,0
		Bizkaia	N	336	11.826	20.907	11.102	2.674	46.846
			%	0,7	25,2	44,6	23,7	5,7	100,0
	25-44	CAPV	N	5.186	102.549	162.560	38.769	11.761	320.826
			%	1,6	32,0	50,7	12,1	3,7	100,0
	Araba	N	892	17.100	22.486	6.478	912	47.869	
		%	1,9	35,7	47,0	13,5	1,9	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 206. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	1.917	28.477	52.855	14.674	3.982	101.905	
			%	1,9	27,9	51,9	14,4	3,9	100,0	
		Bizkaia	N	2.377	56.973	87.219	17.616	6.866	171.052	
			%	1,4	33,3	51,0	10,3	4,0	100,0	
	45-64	CAPV	N	12.543	144.832	132.121	21.338	2.934	313.769	
			%	4,0	46,2	42,1	6,8	0,9	100,0	
		Araba	N	2.464	21.276	18.279	1.893	351	44.263	
			%	5,6	48,1	41,3	4,3	0,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	3.562	40.413	46.805	7.907	975	99.662	
			%	3,6	40,6	47,0	7,9	1,0	100,0	
		Bizkaia	N	6.517	83.142	67.037	11.538	1.609	169.843	
			%	3,8	49,0	39,5	6,8	0,9	100,0	
		65-74	CAPV	N	4.490	58.185	41.605	4.757	888	109.925
				%	4,1	52,9	37,8	4,3	0,8	100,0
			Araba	N	960	8.415	3.871	982	92	14.320
				%	6,7	58,8	27,0	6,9	0,6	100,0
	Gipuzkoa		N	1.834	17.702	15.139	1.446	.	36.120	
			%	5,1	49,0	41,9	4,0	.	100,0	
	Bizkaia		N	1.695	32.068	22.595	2.330	795	59.484	
			%	2,8	53,9	38,0	3,9	1,3	100,0	
	>=75	CAPV	N	9.973	69.855	53.678	6.691	1.667	141.864	
			%	7,0	49,2	37,8	4,7	1,2	100,0	
		Araba	N	2.140	8.974	5.763	232	.	17.110	
			%	12,5	52,5	33,7	1,4	.	100,0	
Gipuzkoa		N	3.644	19.134	19.684	2.495	598	45.555		
		%	8,0	42,0	43,2	5,5	1,3	100,0		
Bizkaia		N	4.189	41.747	28.231	3.964	1.070	79.200		
		%	5,3	52,7	35,6	5,0	1,4	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	52.690	726.568	881.069	188.791	41.888	1.891.006	
		%	2,8	38,4	46,6	10,0	2,2	100,0		
	Araba	N	11.000	108.110	121.392	26.138	3.883	270.523		
		%	4,1	40,0	44,9	9,7	1,4	100,0		
	Gipuzkoa	N	17.164	209.331	310.395	58.554	11.053	606.497		
		%	2,8	34,5	51,2	9,7	1,8	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 206. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	Total	Bizkaia	N	24.526	409.127	449.282	104.099	26.952	1.013.987
			%	2,4	40,3	44,3	10,3	2,7	100,0
15-24	CAPV	N	1.400	48.859	92.706	31.709	9.284	183.958	
		%	0,8	26,6	50,4	17,2	5,0	100,0	
	Araba	N	163	8.482	14.329	3.571	1.533	28.079	
		%	0,6	30,2	51,0	12,7	5,5	100,0	
	Gipuzkoa	N	164	15.660	34.091	9.578	1.256	60.748	
		%	0,3	25,8	56,1	15,8	2,1	100,0	
	Bizkaia	N	1.072	24.718	44.286	18.560	6.494	95.130	
		%	1,1	26,0	46,6	19,5	6,8	100,0	
	25-44	CAPV	N	9.517	197.249	337.420	89.563	23.387	657.135
			%	1,4	30,0	51,3	13,6	3,6	100,0
		Araba	N	2.490	30.062	48.739	17.095	1.545	99.930
			%	2,5	30,1	48,8	17,1	1,5	100,0
Gipuzkoa		N	3.681	54.413	116.590	27.044	6.968	208.695	
		%	1,8	26,1	55,9	13,0	3,3	100,0	
Bizkaia		N	3.346	112.774	172.091	45.424	14.875	348.509	
		%	1,0	32,4	49,4	13,0	4,3	100,0	
45-64		CAPV	N	19.016	258.712	284.524	49.318	4.854	616.424
			%	3,1	42,0	46,2	8,0	0,8	100,0
		Araba	N	3.831	38.582	40.067	3.822	712	87.015
			%	4,4	44,3	46,0	4,4	0,8	100,0
	Gipuzkoa	N	5.004	72.172	102.610	15.344	1.951	197.081	
		%	2,5	36,6	52,1	7,8	1,0	100,0	
	Bizkaia	N	10.181	147.957	141.847	30.153	2.190	332.328	
		%	3,1	44,5	42,7	9,1	0,7	100,0	
	65-74	CAPV	N	7.528	109.594	79.358	7.968	1.210	205.658
			%	3,7	53,3	38,6	3,9	0,6	100,0
		Araba	N	1.367	16.029	8.579	1.417	92	27.483
			%	5,0	58,3	31,2	5,2	0,3	100,0
Gipuzkoa		N	3.284	34.105	27.949	2.745	167	68.251	
		%	4,8	50,0	41,0	4,0	0,2	100,0	
Bizkaia		N	2.878	59.460	42.831	3.805	951	109.924	
		%	2,6	54,1	39,0	3,5	0,9	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 206. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	CAPV	N	15.230	112.155	87.061	10.233	3.154	227.832
			%	6,7	49,2	38,2	4,5	1,4	100,0
		Araba	N	3.149	14.955	9.678	232	.	28.015
			%	11,2	53,4	34,5	0,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	5.031	32.981	29.156	3.843	712	71.723
			%	7,0	46,0	40,7	5,4	1,0	100,0
		Bizkaia	N	7.049	64.219	48.227	6.157	2.442	128.094
			%	5,5	50,1	37,6	4,8	1,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 207. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
		A diario								
Hombres	Total	Total	N	19.998	327.938	444.243	101.379	20.305	913.863	
			%	2,2	35,9	48,6	11,1	2,2	100,0	
		I	N	2.402	45.881	53.499	11.054	854	113.690	
			%	2,1	40,4	47,1	9,7	0,8	100,0	
		II	N	1.394	27.449	39.447	8.782	1.133	78.206	
			%	1,8	35,1	50,4	11,2	1,4	100,0	
		III	N	4.358	74.231	88.245	18.560	2.960	188.355	
			%	2,3	39,4	46,9	9,9	1,6	100,0	
		IV	N	9.537	155.436	225.839	49.308	10.186	450.306	
			%	2,1	34,5	50,2	10,9	2,3	100,0	
		V	N	2.307	24.941	37.213	13.675	5.171	83.307	
			%	2,8	29,9	44,7	16,4	6,2	100,0	
		15-24	Total	N	900	25.938	46.259	15.853	4.951	93.900
				%	1,0	27,6	49,3	16,9	5,3	100,0
			I	N	.	5.148	6.915	2.572	.	14.634
				%	.	35,2	47,2	17,6	.	100,0
			II	N	.	2.896	5.904	1.763	425	10.988
				%	.	26,4	53,7	16,0	3,9	100,0
		III	N	736	3.927	9.721	1.316	1.131	16.830	
			%	4,4	23,3	57,8	7,8	6,7	100,0	
		IV	N	164	11.513	20.082	9.048	1.930	42.737	
			%	0,4	26,9	47,0	21,2	4,5	100,0	
		V	N	.	2.454	3.638	1.154	1.464	8.711	
			%	.	28,2	41,8	13,3	16,8	100,0	
	25-44	Total	N	4.331	94.699	174.859	50.794	11.626	336.309	
			%	1,3	28,2	52,0	15,1	3,5	100,0	
		I	N	712	14.323	22.725	5.433	538	43.732	
			%	1,6	32,8	52,0	12,4	1,2	100,0	
		II	N	.	8.424	18.314	5.051	708	32.496	
			%	.	25,9	56,4	15,5	2,2	100,0	
		III	N	1.291	23.233	27.334	9.615	784	62.257	
			%	2,1	37,3	43,9	15,4	1,3	100,0	
		IV	N	1.780	39.820	90.033	22.385	6.375	160.392	
			%	1,1	24,8	56,1	14,0	4,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 207. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres 25-44 V	N		548	8.899	16.454	8.311	3.220	37.432
	%		1,5	23,8	44,0	22,2	8,6	100,0
45-64 Total	N		6.473	113.593	152.403	27.980	1.919	302.368
	%		2,1	37,6	50,4	9,3	0,6	100,0
I	N		1.123	16.634	17.386	2.449	316	37.907
	%		3,0	43,9	45,9	6,5	0,8	100,0
II	N		886	9.756	11.165	1.612	.	23.419
	%		3,8	41,7	47,7	6,9	.	100,0
III	N		483	23.767	35.275	6.242	555	66.322
	%		0,7	35,8	53,2	9,4	0,8	100,0
IV	N		3.430	55.450	76.648	14.036	1.049	150.614
	%		2,3	36,8	50,9	9,3	0,7	100,0
V	N		550	7.985	11.928	3.642	.	24.106
	%		2,3	33,1	49,5	15,1	.	100,0
65-74 Total	N		3.038	51.409	37.753	3.211	322	95.733
	%		3,2	53,7	39,4	3,4	0,3	100,0
I	N		567	6.997	5.847	342	.	13.753
	%		4,1	50,9	42,5	2,5	.	100,0
II	N		210	4.101	2.196	356	.	6.862
	%		3,1	59,8	32,0	5,2	.	100,0
III	N		481	12.239	8.527	530	.	21.777
	%		2,2	56,2	39,2	2,4	.	100,0
IV	N		1.633	25.228	18.738	1.832	322	47.753
	%		3,4	52,8	39,2	3,8	0,7	100,0
V	N		147	2.845	2.446	151	.	5.588
	%		2,6	50,9	43,8	2,7	.	100,0
>=75 Total	N		5.256	42.300	32.969	3.541	1.486	85.553
	%		6,1	49,4	38,5	4,1	1,7	100,0
I	N		.	2.780	626	258	.	3.663
	%		.	75,9	17,1	7,0	.	100,0
II	N		298	2.273	1.869	.	.	4.440
	%		6,7	51,2	42,1	.	.	100,0
III	N		1.367	11.065	7.389	858	490	21.169
	%		6,5	52,3	34,9	4,1	2,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 207. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres >=75	IV	N	2.529	23.425	20.338	2.008	510	48.810	
		%	5,2	48,0	41,7	4,1	1,0	100,0	
	V	N	1.062	2.757	2.747	418	486	7.470	
		%	14,2	36,9	36,8	5,6	6,5	100,0	
Mujeres	Total	Total N	32.592	397.232	434.971	87.412	21.285	973.492	
		%	3,3	40,8	44,7	9,0	2,2	100,0	
	I	N	1.380	42.230	47.839	11.787	1.602	104.838	
		%	1,3	40,3	45,6	11,2	1,5	100,0	
	II	N	2.251	41.321	44.748	5.373	1.335	95.028	
		%	2,4	43,5	47,1	5,7	1,4	100,0	
	III	N	8.925	90.661	114.260	23.547	4.714	242.107	
		%	3,7	37,4	47,2	9,7	1,9	100,0	
	IV	N	12.818	148.475	159.506	31.039	8.603	360.441	
		%	3,6	41,2	44,3	8,6	2,4	100,0	
	V	N	7.218	74.545	68.619	15.665	5.031	171.077	
		%	4,2	43,6	40,1	9,2	2,9	100,0	
	15-24	Total	N	500	22.666	45.477	15.856	4.035	88.533
			%	0,6	25,6	51,4	17,9	4,6	100,0
		I	N	163	3.805	8.568	1.479	546	14.562
			%	1,1	26,1	58,8	10,2	3,7	100,0
		II	N	336	5.310	6.623	974	254	13.497
			%	2,5	39,3	49,1	7,2	1,9	100,0
		III	N	.	3.520	11.197	4.917	435	20.069
			%	.	17,5	55,8	24,5	2,2	100,0
IV		N	.	7.038	15.753	6.358	2.465	31.614	
		%	.	22,3	49,8	20,1	7,8	100,0	
V		N	.	2.993	3.336	2.127	335	8.792	
		%	.	34,0	37,9	24,2	3,8	100,0	
25-44		Total	N	5.186	102.324	162.291	38.769	11.761	320.330
			%	1,6	31,9	50,7	12,1	3,7	100,0
	I	N	409	14.423	23.422	6.523	309	45.086	
		%	0,9	32,0	51,9	14,5	0,7	100,0	
	II	N	293	14.088	19.616	2.313	913	37.223	
		%	0,8	37,8	52,7	6,2	2,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 207. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	2.041	21.191	45.655	10.154	2.989	82.029
			%	2,5	25,8	55,7	12,4	3,6	100,0
		IV	N	2.145	35.642	54.507	13.445	4.986	110.725
			%	1,9	32,2	49,2	12,1	4,5	100,0
		V	N	299	16.980	19.091	6.333	2.564	45.267
			%	0,7	37,5	42,2	14,0	5,7	100,0
	45-64	Total	N	12.543	144.661	132.121	21.338	2.934	313.598
			%	4,0	46,1	42,1	6,8	0,9	100,0
		I	N	713	16.806	11.173	3.018	408	32.116
			%	2,2	52,3	34,8	9,4	1,3	100,0
		II	N	280	12.387	12.450	1.507	169	26.792
			%	1,0	46,2	46,5	5,6	0,6	100,0
		III	N	4.460	39.291	39.020	4.907	962	88.641
			%	5,0	44,3	44,0	5,5	1,1	100,0
		IV	N	4.355	45.223	46.920	7.430	174	104.102
			%	4,2	43,4	45,1	7,1	0,2	100,0
		V	N	2.736	30.954	22.558	4.477	1.222	61.946
			%	4,4	50,0	36,4	7,2	2,0	100,0
	65-74	Total	N	4.490	58.030	41.605	4.757	888	109.770
			%	4,1	52,9	37,9	4,3	0,8	100,0
		I	N	95	3.464	2.919	382	339	7.199
			%	1,3	48,1	40,5	5,3	4,7	100,0
		II	N	604	5.322	1.188	110	.	7.225
			%	8,4	73,7	16,4	1,5	.	100,0
		III	N	682	11.477	8.688	1.893	159	22.899
			%	3,0	50,1	37,9	8,3	0,7	100,0
		IV	N	1.996	27.142	19.456	1.435	106	50.134
			%	4,0	54,1	38,8	2,9	0,2	100,0
		V	N	1.112	10.625	9.354	938	283	22.312
			%	5,0	47,6	41,9	4,2	1,3	100,0
	>=75	Total	N	9.874	69.552	53.477	6.691	1.667	141.261
			%	7,0	49,2	37,9	4,7	1,2	100,0
		I	N	.	3.732	1.757	386	.	5.875
			%	.	63,5	29,9	6,6	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 207. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	>=75	II	N	738	4.214	4.871	468	.	10.292
			%	7,2	40,9	47,3	4,6	.	100,0
		III	N	1.743	15.183	9.698	1.675	169	28.468
			%	6,1	53,3	34,1	5,9	0,6	100,0
		IV	N	4.322	33.430	22.870	2.371	872	63.866
			%	6,8	52,3	35,8	3,7	1,4	100,0
	V	N	3.071	12.993	14.280	1.790	626	32.760	
		%	9,4	39,7	43,6	5,5	1,9	100,0	
	Ambos	Total	Total N	52.591	725.170	879.214	188.791	41.590	1.887.356
			%	2,8	38,4	46,6	10,0	2,2	100,0
		I	N	3.782	88.111	101.338	22.841	2.456	218.528
			%	1,7	40,3	46,4	10,5	1,1	100,0
II		N	3.646	68.770	84.195	14.155	2.469	173.234	
		%	2,1	39,7	48,6	8,2	1,4	100,0	
III		N	13.284	164.892	202.505	42.107	7.674	430.462	
		%	3,1	38,3	47,0	9,8	1,8	100,0	
IV		N	22.355	303.911	385.345	80.347	18.789	810.747	
		%	2,8	37,5	47,5	9,9	2,3	100,0	
V		N	9.525	99.486	105.832	29.340	10.202	254.385	
		%	3,7	39,1	41,6	11,5	4,0	100,0	
15-24		Total	N	1.400	48.604	91.736	31.709	8.986	182.434
			%	0,8	26,6	50,3	17,4	4,9	100,0
		I	N	163	8.953	15.483	4.051	546	29.196
			%	0,6	30,7	53,0	13,9	1,9	100,0
		II	N	336	8.206	12.526	2.737	679	24.485
			%	1,4	33,5	51,2	11,2	2,8	100,0
	III	N	736	7.447	20.918	6.233	1.566	36.900	
		%	2,0	20,2	56,7	16,9	4,2	100,0	
	IV	N	164	18.551	35.835	15.406	4.395	74.351	
		%	0,2	25,0	48,2	20,7	5,9	100,0	
	V	N	.	5.447	6.974	3.282	1.800	17.503	
		%	.	31,1	39,8	18,7	10,3	100,0	
	25-44	Total	N	9.517	197.023	337.150	89.563	23.387	656.640
			%	1,4	30,0	51,3	13,6	3,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 207. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	25-44	I	N	1.121	28.747	46.147	11.956	848	88.818
			%	1,3	32,4	52,0	13,5	1,0	100,0
		II	N	293	22.512	37.929	7.364	1.621	69.719
			%	0,4	32,3	54,4	10,6	2,3	100,0
		III	N	3.331	44.423	72.989	19.769	3.773	144.286
			%	2,3	30,8	50,6	13,7	2,6	100,0
		IV	N	3.925	75.462	144.540	35.830	11.360	271.117
			%	1,4	27,8	53,3	13,2	4,2	100,0
		V	N	847	25.879	35.544	14.644	5.785	82.699
			%	1,0	31,3	43,0	17,7	7,0	100,0
	45-64	Total	N	19.016	258.253	284.524	49.318	4.854	615.965
			%	3,1	41,9	46,2	8,0	0,8	100,0
		I	N	1.836	33.439	28.559	5.466	723	70.023
			%	2,6	47,8	40,8	7,8	1,0	100,0
		II	N	1.166	22.143	23.615	3.119	169	50.212
			%	2,3	44,1	47,0	6,2	0,3	100,0
		III	N	4.943	63.058	74.296	11.149	1.516	154.963
			%	3,2	40,7	47,9	7,2	1,0	100,0
		IV	N	7.785	100.673	123.568	21.466	1.223	254.716
			%	3,1	39,5	48,5	8,4	0,5	100,0
		V	N	3.286	38.939	34.486	8.118	1.222	86.052
			%	3,8	45,3	40,1	9,4	1,4	100,0
	65-74	Total	N	7.528	109.439	79.358	7.968	1.210	205.503
			%	3,7	53,3	38,6	3,9	0,6	100,0
		I	N	662	10.460	8.766	724	339	20.952
			%	3,2	49,9	41,8	3,5	1,6	100,0
		II	N	815	9.423	3.384	466	.	14.087
			%	5,8	66,9	24,0	3,3	.	100,0
		III	N	1.163	23.716	17.215	2.423	159	44.676
			%	2,6	53,1	38,5	5,4	0,4	100,0
		IV	N	3.630	52.370	38.193	3.267	428	97.887
			%	3,7	53,5	39,0	3,3	0,4	100,0
		V	N	1.259	13.470	11.800	1.089	283	27.901
			%	4,5	48,3	42,3	3,9	1,0	100,0
	>=75	Total	N	15.130	111.852	86.446	10.233	3.154	226.814

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 207. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	%	6,7	49,3	38,1	4,5	1,4	100,0
		I	N	.	6.512	2.383	644	.	9.538
			%	.	68,3	25,0	6,7	.	100,0
		II	N	1.036	6.487	6.740	468	.	14.731
			%	7,0	44,0	45,8	3,2	.	100,0
		III	N	3.110	26.248	17.087	2.533	660	49.638
			%	6,3	52,9	34,4	5,1	1,3	100,0
		IV	N	6.852	56.855	43.208	4.379	1.382	112.676
			%	6,1	50,5	38,3	3,9	1,2	100,0
		V	N	4.133	15.750	17.028	2.208	1.112	40.231
			%	10,3	39,1	42,3	5,5	2,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 208. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	Total	N	19.998	328.226	444.918	101.379	20.602	915.124
		%	2,2	35,9	48,6	11,1	2,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	6.024	85.908	95.249	20.195	3.223	210.600
		%	2,9	40,8	45,2	9,6	1,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.584	55.342	83.011	19.643	5.874	167.454
		%	2,1	33,0	49,6	11,7	3,5	100,0
	Secundaria, superior	N	6.768	122.008	179.251	43.554	9.089	360.670
		%	1,9	33,8	49,7	12,1	2,5	100,0
	Terciaria	N	3.622	64.968	87.407	17.987	2.416	176.400
		%	2,1	36,8	49,6	10,2	1,4	100,0
	15-24 Total	N	900	25.938	46.519	15.853	5.249	94.458
		%	1,0	27,5	49,2	16,8	5,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	164	2.908	5.644	261	941	9.918
		%	1,7	29,3	56,9	2,6	9,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	521	7.637	14.960	6.096	1.915	31.129
		%	1,7	24,5	48,1	19,6	6,2	100,0
	Secundaria, superior	N	215	13.289	20.067	7.460	1.810	42.840
		%	0,5	31,0	46,8	17,4	4,2	100,0
	Terciaria	N	.	2.105	5.848	2.037	583	10.572
		%	.	19,9	55,3	19,3	5,5	100,0
	25-44 Total	N	4.331	94.699	174.859	50.794	11.626	336.309
		%	1,3	28,2	52,0	15,1	3,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	197	10.142	18.524	8.050	862	37.776
		%	0,5	26,8	49,0	21,3	2,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	532	11.946	29.380	7.504	3.446	52.808
		%	1,0	22,6	55,6	14,2	6,5	100,0
	Secundaria, superior	N	2.498	48.930	81.733	24.779	6.335	164.274
		%	1,5	29,8	49,8	15,1	3,9	100,0
	Terciaria	N	1.103	23.681	45.222	10.461	983	81.451
		%	1,4	29,1	55,5	12,8	1,2	100,0
	45-64 Total	N	6.473	113.880	152.403	27.980	1.919	302.655
		%	2,1	37,6	50,4	9,2	0,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.132	26.632	35.045	7.314	277	70.400
		%	1,6	37,8	49,8	10,4	0,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 208. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	1.108	20.283	26.922	4.932	.	53.244
			%	2,1	38,1	50,6	9,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.802	40.754	62.160	10.471	944	117.130
			%	2,4	34,8	53,1	8,9	0,8	100,0
		Terciaria	N	1.431	26.211	28.277	5.263	699	61.881
			%	2,3	42,4	45,7	8,5	1,1	100,0
	65-74	Total	N	3.038	51.409	37.753	3.211	322	95.733
			%	3,2	53,7	39,4	3,4	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.288	21.883	13.189	1.657	.	38.017
			%	3,4	57,6	34,7	4,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	595	6.552	7.850	972	322	16.291
			%	3,7	40,2	48,2	6,0	2,0	100,0
		Secundaria, superior	N	628	13.880	11.084	355	.	25.948
			%	2,4	53,5	42,7	1,4	.	100,0
		Terciaria	N	527	9.093	5.631	226	.	15.477
			%	3,4	58,8	36,4	1,5	.	100,0
	>=75	Total	N	5.256	42.300	33.384	3.541	1.486	85.968
			%	6,1	49,2	38,8	4,1	1,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.243	24.343	22.847	2.913	1.144	54.489	
		%	6,0	44,7	41,9	5,3	2,1	100,0	
	Secundaria, inferior	N	827	8.924	3.900	139	191	13.981	
		%	5,9	63,8	27,9	1,0	1,4	100,0	
	Secundaria, superior	N	626	5.155	4.207	490	.	10.478	
		%	6,0	49,2	40,2	4,7	.	100,0	
	Terciaria	N	561	3.878	2.429	.	151	7.020	
		%	8,0	55,2	34,6	.	2,2	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	32.692	398.342	436.151	87.412	21.285	975.882
		%	3,4	40,8	44,7	9,0	2,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	12.946	135.660	109.617	15.931	4.173	278.327
			%	4,7	48,7	39,4	5,7	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.973	67.326	74.193	15.237	4.037	169.766
			%	5,3	39,7	43,7	9,0	2,4	100,0
		Secundaria, superior	N	7.919	115.814	140.668	34.065	9.400	307.866
			%	2,6	37,6	45,7	11,1	3,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 208. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N	2.853	79.542	111.674	22.179	3.675	219.923
			%	1,3	36,2	50,8	10,1	1,7	100,0
	15-24	Total	N	500	22.921	46.187	15.856	4.035	89.499
			%	0,6	25,6	51,6	17,7	4,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	4.121	5.726	983	556	11.386
			%	.	36,2	50,3	8,6	4,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	163	3.846	7.815	3.937	1.002	16.763
			%	1,0	22,9	46,6	23,5	6,0	100,0
		Secundaria, superior	N	336	11.428	21.427	10.059	2.193	45.443
			%	0,7	25,1	47,2	22,1	4,8	100,0
		Terciaria	N	.	3.526	11.219	877	284	15.907
			%	.	22,2	70,5	5,5	1,8	100,0
	25-44	Total	N	5.186	102.549	162.560	38.769	11.761	320.826
			%	1,6	32,0	50,7	12,1	3,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	434	11.238	9.555	3.295	1.467	25.990
			%	1,7	43,2	36,8	12,7	5,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.419	11.195	19.416	4.990	1.917	38.937
			%	3,6	28,8	49,9	12,8	4,9	100,0
		Secundaria, superior	N	2.039	42.864	64.009	15.270	6.305	130.487
			%	1,6	32,8	49,1	11,7	4,8	100,0
		Terciaria	N	1.294	37.252	69.581	15.214	2.072	125.412
			%	1,0	29,7	55,5	12,1	1,7	100,0
	45-64	Total	N	12.543	144.832	132.121	21.338	2.934	313.769
			%	4,0	46,2	42,1	6,8	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.902	38.310	31.612	4.569	570	77.963
			%	3,7	49,1	40,5	5,9	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.696	27.255	26.373	3.760	652	61.735
			%	6,0	44,1	42,7	6,1	1,1	100,0
		Secundaria, superior	N	4.886	49.707	47.563	7.264	902	110.322
			%	4,4	45,1	43,1	6,6	0,8	100,0
		Terciaria	N	1.060	29.560	26.574	5.745	811	63.749
			%	1,7	46,4	41,7	9,0	1,3	100,0
	65-74	Total	N	4.490	58.185	41.605	4.757	888	109.925
			%	4,1	52,9	37,8	4,3	0,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 208. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	2.930	33.433	23.084	2.206	199	61.852
			%	4,7	54,1	37,3	3,6	0,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	948	12.181	12.085	1.890	350	27.452
	%		3,5	44,4	44,0	6,9	1,3	100,0	
		Secundaria, superior	N	112	6.564	4.666	551	.	11.893
	%		0,9	55,2	39,2	4,6	.	100,0	
		Terciaria	N	500	6.008	1.770	110	339	8.727
	%		5,7	68,8	20,3	1,3	3,9	100,0	
		>=75 Total	N	9.973	69.855	53.678	6.691	1.667	141.864
	%		7,0	49,2	37,8	4,7	1,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	6.680	48.559	39.639	4.877	1.381	101.136
	%		6,6	48,0	39,2	4,8	1,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.748	12.849	8.505	661	117	24.879
	%		11,0	51,6	34,2	2,7	0,5	100,0	
	Secundaria, superior	N	546	5.251	3.003	920	.	9.720	
%		5,6	54,0	30,9	9,5	.	100,0		
	Terciaria	N	.	3.195	2.531	233	169	6.129	
%		.	52,1	41,3	3,8	2,8	100,0		
Ambos	Total	Total	N	52.690	726.568	881.069	188.791	41.888	1.891.006
			%	2,8	38,4	46,6	10,0	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	18.971	221.569	204.866	36.126	7.396	488.927
	%		3,9	45,3	41,9	7,4	1,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	12.557	122.668	157.204	34.880	9.911	337.220
	%		3,7	36,4	46,6	10,3	2,9	100,0	
		Secundaria, superior	N	14.688	237.822	319.918	77.619	18.489	668.536
	%		2,2	35,6	47,9	11,6	2,8	100,0	
		Terciaria	N	6.475	144.510	199.081	40.166	6.092	396.323
	%		1,6	36,5	50,2	10,1	1,5	100,0	
		15-24 Total	N	1.400	48.859	92.706	31.709	9.284	183.958
	%		0,8	26,6	50,4	17,2	5,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	164	7.029	11.370	1.244	1.497	21.304
	%		0,8	33,0	53,4	5,8	7,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	685	11.483	22.775	10.032	2.916	47.891	
%		1,4	24,0	47,6	20,9	6,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 208. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	551	24.716	41.494	17.518	4.004	88.283
			%	0,6	28,0	47,0	19,8	4,5	100,0
		Terciaria	N	.	5.631	17.067	2.914	867	26.479
			%	.	21,3	64,5	11,0	3,3	100,0
	25-44	Total	N	9.517	197.249	337.420	89.563	23.387	657.135
			%	1,4	30,0	51,3	13,6	3,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	631	21.381	28.079	11.346	2.328	63.765
			%	1,0	33,5	44,0	17,8	3,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.951	23.141	48.796	12.494	5.363	91.745
			%	2,1	25,2	53,2	13,6	5,8	100,0
		Secundaria, superior	N	4.537	91.794	145.742	40.049	12.640	294.762
			%	1,5	31,1	49,4	13,6	4,3	100,0
		Terciaria	N	2.397	60.933	114.803	25.674	3.055	206.862
			%	1,2	29,5	55,5	12,4	1,5	100,0
	45-64	Total	N	19.016	258.712	284.524	49.318	4.854	616.424
			%	3,1	42,0	46,2	8,0	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.034	64.942	66.657	11.883	847	148.363
			%	2,7	43,8	44,9	8,0	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.804	47.537	53.294	8.692	652	114.979
			%	4,2	41,3	46,4	7,6	0,6	100,0
		Secundaria, superior	N	7.687	90.462	109.722	17.735	1.845	227.452
			%	3,4	39,8	48,2	7,8	0,8	100,0
		Terciaria	N	2.490	55.771	54.851	11.008	1.510	125.630
			%	2,0	44,4	43,7	8,8	1,2	100,0
	65-74	Total	N	7.528	109.594	79.358	7.968	1.210	205.658
			%	3,7	53,3	38,6	3,9	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.219	55.316	36.273	3.863	199	99.869
			%	4,2	55,4	36,3	3,9	0,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.543	18.733	19.934	2.862	672	43.744
			%	3,5	42,8	45,6	6,5	1,5	100,0
		Secundaria, superior	N	740	20.444	15.750	907	.	37.841
			%	2,0	54,0	41,6	2,4	.	100,0
		Terciaria	N	1.027	15.101	7.401	336	339	24.204
			%	4,2	62,4	30,6	1,4	1,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 208. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y nivel de estudios*

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	N	15.230	112.155	87.061	10.233	3.154	227.832
			%	6,7	49,2	38,2	4,5	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	9.923	72.901	62.486	7.790	2.525	155.625
			%	6,4	46,8	40,2	5,0	1,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.574	21.774	12.405	800	308	38.860
			%	9,2	56,0	31,9	2,1	0,8	100,0
		Secundaria, superior	N	1.172	10.406	7.210	1.410	.	20.198
			%	5,8	51,5	35,7	7,0	.	100,0
		Terciaria	N	561	7.073	4.960	233	321	13.149
			%	4,3	53,8	37,7	1,8	2,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 209. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	51.784	369.374	415.940	73.482	4.544	915.124
			%	5,7	40,4	45,5	8,0	0,5	100,0
		Araba	N	7.163	39.783	73.386	13.287	131	133.751
			%	5,4	29,7	54,9	9,9	0,1	100,0
		Gipuzkoa	N	16.891	134.622	125.236	15.467	1.596	293.812
			%	5,7	45,8	42,6	5,3	0,5	100,0
		Bizkaia	N	27.730	194.969	217.318	44.728	2.817	487.561
			%	5,7	40,0	44,6	9,2	0,6	100,0
	15-24	CAPV	N	6.027	44.798	39.549	3.603	482	94.458
			%	6,4	47,4	41,9	3,8	0,5	100,0
		Araba	N	1.159	5.076	8.279	355	.	14.869
			%	7,8	34,1	55,7	2,4	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.171	17.468	10.891	1.504	270	31.305
			%	3,7	55,8	34,8	4,8	0,9	100,0
		Bizkaia	N	3.697	22.253	20.379	1.744	211	48.284
			%	7,7	46,1	42,2	3,6	0,4	100,0
	25-44	CAPV	N	18.297	147.904	148.735	20.151	1.223	336.309
			%	5,4	44,0	44,2	6,0	0,4	100,0
		Araba	N	3.062	14.008	29.983	5.009	.	52.062
			%	5,9	26,9	57,6	9,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	4.423	54.752	43.224	4.084	307	106.790
			%	4,1	51,3	40,5	3,8	0,3	100,0
		Bizkaia	N	10.812	79.144	75.528	11.058	916	177.458
			%	6,1	44,6	42,6	6,2	0,5	100,0
	45-64	CAPV	N	13.636	111.941	147.299	28.883	896	302.655
			%	4,5	37,0	48,7	9,5	0,3	100,0
		Araba	N	1.561	12.974	22.730	5.355	131	42.751
			%	3,7	30,3	53,2	12,5	0,3	100,0
		Gipuzkoa	N	6.334	39.481	45.920	5.449	235	97.419
			%	6,5	40,5	47,1	5,6	0,2	100,0
		Bizkaia	N	5.741	59.486	78.649	18.079	530	162.485
			%	3,5	36,6	48,4	11,1	0,3	100,0
	65-74	CAPV	N	6.226	34.943	43.871	10.055	638	95.733
			%	6,5	36,5	45,8	10,5	0,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 209. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	65-74	Araba	N	964	2.944	7.945	1.310	.	13.163
			%	7,3	22,4	60,4	10,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.324	14.013	13.188	2.225	380	32.130
			%	7,2	43,6	41,0	6,9	1,2	100,0
		Bizkaia	N	2.938	17.986	22.737	6.520	258	50.440
			%	5,8	35,7	45,1	12,9	0,5	100,0
	>=75	CAPV	N	7.597	29.788	36.487	10.790	1.305	85.968
			%	8,8	34,7	42,4	12,6	1,5	100,0
		Araba	N	416	4.782	4.449	1.258	.	10.905
			%	3,8	43,9	40,8	11,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.639	8.907	12.013	2.205	404	26.168
			%	10,1	34,0	45,9	8,4	1,5	100,0
Bizkaia	N	4.542	16.099	20.025	7.327	901	48.895		
	%	9,3	32,9	41,0	15,0	1,8	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	45.942	369.729	452.491	98.720	9.001	975.882
			%	4,7	37,9	46,4	10,1	0,9	100,0
	Araba	N	3.593	44.335	71.741	15.629	1.474	136.772	
		%	2,6	32,4	52,5	11,4	1,1	100,0	
	Gipuzkoa	N	16.918	129.891	141.786	20.564	3.526	312.686	
		%	5,4	41,5	45,3	6,6	1,1	100,0	
	Bizkaia	N	25.431	195.503	238.963	62.527	4.001	526.425	
		%	4,8	37,1	45,4	11,9	0,8	100,0	
	15-24	CAPV	N	4.077	38.446	40.629	5.830	517	89.499
			%	4,6	43,0	45,4	6,5	0,6	100,0
		Araba	N	1.159	3.635	7.002	1.414	.	13.210
			%	8,8	27,5	53,0	10,7	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.172	14.321	12.707	727	517	29.443
			%	4,0	48,6	43,2	2,5	1,8	100,0
	Bizkaia	N	1.747	20.490	20.920	3.690	.	46.846	
		%	3,7	43,7	44,7	7,9	.	100,0	
	25-44	CAPV	N	10.681	131.177	151.299	26.228	1.441	320.826
			%	3,3	40,9	47,2	8,2	0,4	100,0
Araba		N	1.064	15.954	25.038	5.096	717	47.869	
		%	2,2	33,3	52,3	10,6	1,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 209. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	4.516	47.582	44.975	4.833	.	101.905	
			%	4,4	46,7	44,1	4,7	.	100,0	
		Bizkaia	N	5.101	67.642	81.286	16.299	724	171.052	
	%		3,0	39,5	47,5	9,5	0,4	100,0		
		45-64	CAPV	N	14.153	111.988	148.910	35.841	2.876	313.769
	%			4,5	35,7	47,5	11,4	0,9	100,0	
		Araba	N	259	12.048	26.041	5.455	460	44.263	
	%		0,6	27,2	58,8	12,3	1,0	100,0		
		Gipuzkoa	N	4.627	39.471	46.330	8.199	1.036	99.662	
	%		4,6	39,6	46,5	8,2	1,0	100,0		
		Bizkaia	N	9.267	60.469	76.540	22.187	1.381	169.843	
	%		5,5	35,6	45,1	13,1	0,8	100,0		
		65-74	CAPV	N	6.990	39.999	48.113	13.210	1.612	109.925
	%			6,4	36,4	43,8	12,0	1,5	100,0	
		Araba	N	568	5.611	6.421	1.556	163	14.320	
	%		4,0	39,2	44,8	10,9	1,1	100,0		
		Gipuzkoa	N	2.520	13.379	16.495	2.981	746	36.120	
	%		7,0	37,0	45,7	8,3	2,1	100,0		
		Bizkaia	N	3.902	21.008	25.198	8.673	703	59.484	
	%		6,6	35,3	42,4	14,6	1,2	100,0		
		>=75	CAPV	N	10.041	48.119	63.539	17.611	2.555	141.864
	%			7,1	33,9	44,8	12,4	1,8	100,0	
		Araba	N	544	7.087	7.239	2.108	133	17.110	
	%		3,2	41,4	42,3	12,3	0,8	100,0		
	Gipuzkoa	N	4.083	15.139	21.280	3.825	1.228	45.555		
%		9,0	33,2	46,7	8,4	2,7	100,0			
	Bizkaia	N	5.414	25.894	35.020	11.679	1.194	79.200		
%		6,8	32,7	44,2	14,7	1,5	100,0			
Ambos	Total	CAPV	N	97.727	739.102	868.431	172.202	13.545	1.891.006	
			%	5,2	39,1	45,9	9,1	0,7	100,0	
		Araba	N	10.756	84.118	145.128	28.916	1.604	270.523	
	%		4,0	31,1	53,6	10,7	0,6	100,0		
		Gipuzkoa	N	33.810	264.512	267.022	36.031	5.122	606.497	
	%		5,6	43,6	44,0	5,9	0,8	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 209. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	Total	Bizkaia	N	53.161	390.472	456.281	107.255	6.818	1.013.987
			%	5,2	38,5	45,0	10,6	0,7	100,0
	15-24	CAPV	N	10.104	83.243	80.178	9.433	998	183.958
			%	5,5	45,3	43,6	5,1	0,5	100,0
		Araba	N	2.318	8.712	15.281	1.769	.	28.079
			%	8,3	31,0	54,4	6,3	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.343	31.789	23.598	2.231	787	60.748
			%	3,9	52,3	38,8	3,7	1,3	100,0
		Bizkaia	N	5.444	42.743	41.299	5.433	211	95.130
			%	5,7	44,9	43,4	5,7	0,2	100,0
	25-44	CAPV	N	28.977	279.081	300.033	46.378	2.664	657.135
			%	4,4	42,5	45,7	7,1	0,4	100,0
		Araba	N	4.126	29.961	55.021	10.105	717	99.930
			%	4,1	30,0	55,1	10,1	0,7	100,0
		Gipuzkoa	N	8.939	102.334	88.198	8.916	307	208.695
			%	4,3	49,0	42,3	4,3	0,1	100,0
		Bizkaia	N	15.912	146.786	156.814	27.357	1.640	348.509
			%	4,6	42,1	45,0	7,8	0,5	100,0
	45-64	CAPV	N	27.790	223.928	296.209	64.724	3.772	616.424
			%	4,5	36,3	48,1	10,5	0,6	100,0
		Araba	N	1.820	25.022	48.772	10.810	591	87.015
			%	2,1	28,8	56,0	12,4	0,7	100,0
		Gipuzkoa	N	10.962	78.951	92.249	13.648	1.271	197.081
			%	5,6	40,1	46,8	6,9	0,6	100,0
		Bizkaia	N	15.008	119.955	155.188	40.266	1.911	332.328
			%	4,5	36,1	46,7	12,1	0,6	100,0
	65-74	CAPV	N	13.217	74.942	91.984	23.265	2.250	205.658
			%	6,4	36,4	44,7	11,3	1,1	100,0
		Araba	N	1.533	8.555	14.366	2.866	163	27.483
			%	5,6	31,1	52,3	10,4	0,6	100,0
		Gipuzkoa	N	4.843	27.392	29.683	5.207	1.125	68.251
			%	7,1	40,1	43,5	7,6	1,6	100,0
		Bizkaia	N	6.840	38.995	47.935	15.193	962	109.924
			%	6,2	35,5	43,6	13,8	0,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 209. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	CAPV	N	17.639	77.908	100.026	28.401	3.859	227.832
			%	7,7	34,2	43,9	12,5	1,7	100,0
		Araba	N	960	11.869	11.687	3.366	133	28.015
			%	3,4	42,4	41,7	12,0	0,5	100,0
		Gipuzkoa	N	6.723	24.046	33.293	6.029	1.632	71.723
			%	9,4	33,5	46,4	8,4	2,3	100,0
	Bizkaia	N	9.956	41.993	55.045	19.006	2.095	128.094	
		%	7,8	32,8	43,0	14,8	1,6	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres Total	Total	N	51.524	368.770	415.543	73.482	4.544	913.863
		%	5,6	40,4	45,5	8,0	0,5	100,0
I	Total	N	4.447	45.612	56.128	6.741	762	113.690
		%	3,9	40,1	49,4	5,9	0,7	100,0
II	Total	N	2.258	31.509	39.036	4.825	577	78.206
		%	2,9	40,3	49,9	6,2	0,7	100,0
III	Total	N	9.269	75.934	86.685	15.581	885	188.355
		%	4,9	40,3	46,0	8,3	0,5	100,0
IV	Total	N	29.330	183.129	198.400	38.039	1.408	450.306
		%	6,5	40,7	44,1	8,4	0,3	100,0
V	Total	N	6.220	32.586	35.294	8.296	911	83.307
		%	7,5	39,1	42,4	10,0	1,1	100,0
15-24	Total	N	5.767	44.798	39.251	3.603	482	93.900
		%	6,1	47,7	41,8	3,8	0,5	100,0
I	Total	N	218	6.634	7.442	339	.	14.634
		%	1,5	45,3	50,9	2,3	.	100,0
II	Total	N	268	4.139	5.821	760	.	10.988
		%	2,4	37,7	53,0	6,9	.	100,0
III	Total	N	1.640	8.462	5.805	442	482	16.830
		%	9,7	50,3	34,5	2,6	2,9	100,0
IV	Total	N	1.870	22.011	17.310	1.547	.	42.737
		%	4,4	51,5	40,5	3,6	.	100,0
V	Total	N	1.771	3.551	2.874	515	.	8.711
		%	20,3	40,8	33,0	5,9	.	100,0
25-44	Total	N	18.297	147.904	148.735	20.151	1.223	336.309
		%	5,4	44,0	44,2	6,0	0,4	100,0
I	Total	N	2.023	18.171	21.230	1.807	501	43.732
		%	4,6	41,5	48,5	4,1	1,1	100,0
II	Total	N	700	16.625	13.593	1.162	415	32.496
		%	2,2	51,2	41,8	3,6	1,3	100,0
III	Total	N	1.938	26.152	30.435	3.731	.	62.257
		%	3,1	42,0	48,9	6,0	.	100,0
IV	Total	N	10.869	70.956	67.080	11.486	.	160.392
		%	6,8	44,2	41,8	7,2	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	25-44	V	N	2.766	15.999	16.396	1.963	307	37.432
			%	7,4	42,7	43,8	5,2	0,8	100,0
	45-64	Total	N	13.636	111.752	147.200	28.883	896	302.368
			%	4,5	37,0	48,7	9,6	0,3	100,0
		I	N	888	14.300	19.526	3.193	.	37.907
			%	2,3	37,7	51,5	8,4	.	100,0
		II	N	944	7.101	13.401	1.811	162	23.419
			%	4,0	30,3	57,2	7,7	0,7	100,0
		III	N	3.122	26.318	30.008	6.873	.	66.322
			%	4,7	39,7	45,2	10,4	.	100,0
		IV	N	7.472	55.453	73.012	14.061	616	150.614
			%	5,0	36,8	48,5	9,3	0,4	100,0
		V	N	1.211	8.580	11.252	2.945	118	24.106
			%	5,0	35,6	46,7	12,2	0,5	100,0
	65-74	Total	N	6.226	34.943	43.871	10.055	638	95.733
			%	6,5	36,5	45,8	10,5	0,7	100,0
		I	N	721	5.604	6.171	996	261	13.753
			%	5,2	40,7	44,9	7,2	1,9	100,0
		II	N	.	2.865	3.026	971	.	6.862
			%	.	41,8	44,1	14,2	.	100,0
		III	N	1.273	8.185	10.812	1.507	.	21.777
			%	5,8	37,6	49,6	6,9	.	100,0
		IV	N	4.131	16.655	21.205	5.386	377	47.753
			%	8,7	34,9	44,4	11,3	0,8	100,0
		V	N	102	1.634	2.657	1.195	.	5.588
			%	1,8	29,2	47,6	21,4	.	100,0
	>=75	Total	N	7.597	29.374	36.487	10.790	1.305	85.553
			%	8,9	34,3	42,6	12,6	1,5	100,0
		I	N	597	903	1.759	405	.	3.663
			%	16,3	24,6	48,0	11,1	.	100,0
		II	N	346	778	3.195	120	.	4.440
			%	7,8	17,5	72,0	2,7	.	100,0
		III	N	1.295	6.817	9.626	3.028	404	21.169
			%	6,1	32,2	45,5	14,3	1,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	>=75	IV	N	4.989	18.055	19.792	5.559	415	48.810
			%	10,2	37,0	40,5	11,4	0,8	100,0
	V	N	371	2.821	2.115	1.678	486	7.470	
		%	5,0	37,8	28,3	22,5	6,5	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	45.687	368.864	452.164	97.776	9.001	973.492
			%	4,7	37,9	46,4	10,0	0,9	100,0
	I	N	2.685	38.669	52.759	9.941	784	104.838	
		%	2,6	36,9	50,3	9,5	0,7	100,0	
	II	N	2.735	37.945	45.294	8.116	938	95.028	
		%	2,9	39,9	47,7	8,5	1,0	100,0	
	III	N	12.097	89.140	114.488	24.173	2.209	242.107	
		%	5,0	36,8	47,3	10,0	0,9	100,0	
	IV	N	20.572	138.463	164.285	33.542	3.579	360.441	
		%	5,7	38,4	45,6	9,3	1,0	100,0	
	V	N	7.598	64.646	75.339	22.004	1.491	171.077	
		%	4,4	37,8	44,0	12,9	0,9	100,0	
	15-24	Total	N	3.822	38.239	40.629	5.327	517	88.533
			%	4,3	43,2	45,9	6,0	0,6	100,0
	I	N	464	5.890	6.860	1.347	.	14.562	
		%	3,2	40,5	47,1	9,3	.	100,0	
	II	N	.	6.835	6.208	227	227	13.497	
		%	.	50,6	46,0	1,7	1,7	100,0	
	III	N	774	6.095	12.502	700	.	20.069	
		%	3,9	30,4	62,3	3,5	.	100,0	
	IV	N	2.584	14.414	11.966	2.360	290	31.614	
		%	8,2	45,6	37,9	7,5	0,9	100,0	
	V	N	.	5.005	3.094	693	.	8.792	
		%	.	56,9	35,2	7,9	.	100,0	
	25-44	Total	N	10.681	131.177	151.073	25.958	1.441	320.330
			%	3,3	41,0	47,2	8,1	0,4	100,0
	I	N	802	19.151	21.894	3.239	.	45.086	
		%	1,8	42,5	48,6	7,2	.	100,0	
	II	N	267	17.656	16.665	2.636	.	37.223	
		%	0,7	47,4	44,8	7,1	.	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	3.552	35.529	36.405	6.543	.	82.029
			%	4,3	43,3	44,4	8,0	.	100,0
		IV	N	4.519	41.775	53.501	9.489	1.441	110.725
			%	4,1	37,7	48,3	8,6	1,3	100,0
		V	N	1.541	17.065	22.608	4.052	.	45.267
			%	3,4	37,7	49,9	9,0	.	100,0
	45-64	Total	N	14.153	111.988	148.910	35.670	2.876	313.598
			%	4,5	35,7	47,5	11,4	0,9	100,0
		I	N	1.018	9.880	16.853	3.935	430	32.116
			%	3,2	30,8	52,5	12,3	1,3	100,0
		II	N	1.596	7.244	13.784	3.542	626	26.792
			%	6,0	27,0	51,4	13,2	2,3	100,0
		III	N	4.078	31.231	42.992	9.321	1.019	88.641
			%	4,6	35,2	48,5	10,5	1,1	100,0
		IV	N	4.432	38.956	50.562	9.679	473	104.102
			%	4,3	37,4	48,6	9,3	0,5	100,0
		V	N	3.030	24.677	24.719	9.193	328	61.946
			%	4,9	39,8	39,9	14,8	0,5	100,0
	65-74	Total	N	6.990	39.844	48.113	13.210	1.612	109.770
			%	6,4	36,3	43,8	12,0	1,5	100,0
		I	N	95	1.353	4.287	1.110	353	7.199
			%	1,3	18,8	59,6	15,4	4,9	100,0
		II	N	425	2.540	3.702	474	85	7.225
			%	5,9	35,2	51,2	6,6	1,2	100,0
		III	N	1.225	7.916	10.922	2.494	343	22.899
			%	5,3	34,6	47,7	10,9	1,5	100,0
		IV	N	3.810	21.399	18.557	6.053	315	50.134
			%	7,6	42,7	37,0	12,1	0,6	100,0
		V	N	1.436	6.636	10.645	3.079	517	22.312
			%	6,4	29,7	47,7	13,8	2,3	100,0
	>=75	Total	N	10.041	47.617	63.438	17.611	2.555	141.261
			%	7,1	33,7	44,9	12,5	1,8	100,0
		I	N	305	2.394	2.866	310	.	5.875
			%	5,2	40,8	48,8	5,3	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	>=75	II	N	448	3.671	4.936	1.237	.	10.292	
			%	4,4	35,7	48,0	12,0	.	100,0	
		III	N	2.469	8.370	11.666	5.115	848	28.468	
			%	8,7	29,4	41,0	18,0	3,0	100,0	
		IV	N	5.228	21.919	29.697	5.961	1.060	63.866	
			%	8,2	34,3	46,5	9,3	1,7	100,0	
		V	N	1.591	11.263	14.273	4.987	646	32.760	
			%	4,9	34,4	43,6	15,2	2,0	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	97.211	737.634	867.708	171.259	13.545	1.887.356
				%	5,2	39,1	46,0	9,1	0,7	100,0
		I	N	7.132	84.281	108.887	16.682	1.546	218.528	
			%	3,3	38,6	49,8	7,6	0,7	100,0	
		II	N	4.993	69.454	84.330	12.941	1.515	173.234	
			%	2,9	40,1	48,7	7,5	0,9	100,0	
		III	N	21.366	165.075	201.173	39.753	3.095	430.462	
			%	5,0	38,3	46,7	9,2	0,7	100,0	
		IV	N	49.902	321.593	362.684	71.582	4.987	810.747	
			%	6,2	39,7	44,7	8,8	0,6	100,0	
		V	N	13.818	97.232	110.633	30.300	2.402	254.385	
			%	5,4	38,2	43,5	11,9	0,9	100,0	
15-24		Total	Total	N	9.589	83.036	79.880	8.930	998	182.434
				%	5,3	45,5	43,8	4,9	0,5	100,0
			I	N	683	12.525	14.302	1.687	.	29.196
				%	2,3	42,9	49,0	5,8	.	100,0
			II	N	268	10.974	12.028	987	227	24.485
				%	1,1	44,8	49,1	4,0	0,9	100,0
		III	N	2.414	14.557	18.306	1.141	482	36.900	
			%	6,5	39,4	49,6	3,1	1,3	100,0	
		IV	N	4.453	36.424	29.276	3.907	290	74.351	
			%	6,0	49,0	39,4	5,3	0,4	100,0	
		V	N	1.771	8.557	5.967	1.208	.	17.503	
			%	10,1	48,9	34,1	6,9	.	100,0	
25-44	Total	Total	N	28.977	279.081	299.808	46.109	2.664	656.640	
			%	4,4	42,5	45,7	7,0	0,4	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	25-44	I	N	2.825	37.322	43.124	5.046	501	88.818
			%	3,2	42,0	48,6	5,7	0,6	100,0
		II	N	967	34.282	30.258	3.798	415	69.719
			%	1,4	49,2	43,4	5,4	0,6	100,0
		III	N	5.490	61.682	66.840	10.274	.	144.286
			%	3,8	42,7	46,3	7,1	.	100,0
		IV	N	15.388	112.732	120.582	20.975	1.441	271.117
			%	5,7	41,6	44,5	7,7	0,5	100,0
		V	N	4.307	33.064	39.005	6.015	307	82.699
			%	5,2	40,0	47,2	7,3	0,4	100,0
	45-64	Total	N	27.790	223.740	296.110	64.553	3.772	615.965
			%	4,5	36,3	48,1	10,5	0,6	100,0
		I	N	1.906	24.180	36.379	7.128	430	70.023
			%	2,7	34,5	52,0	10,2	0,6	100,0
		II	N	2.540	14.345	27.186	5.354	788	50.212
			%	5,1	28,6	54,1	10,7	1,6	100,0
		III	N	7.200	57.549	73.000	16.194	1.019	154.963
			%	4,6	37,1	47,1	10,5	0,7	100,0
		IV	N	11.903	94.409	123.575	23.740	1.089	254.716
			%	4,7	37,1	48,5	9,3	0,4	100,0
		V	N	4.240	33.257	35.971	12.137	446	86.052
			%	4,9	38,6	41,8	14,1	0,5	100,0
	65-74	Total	N	13.217	74.786	91.984	23.265	2.250	205.503
			%	6,4	36,4	44,8	11,3	1,1	100,0
		I	N	816	6.957	10.458	2.106	615	20.952
			%	3,9	33,2	49,9	10,1	2,9	100,0
		II	N	425	5.405	6.728	1.445	85	14.087
			%	3,0	38,4	47,8	10,3	0,6	100,0
		III	N	2.498	16.101	21.734	4.000	343	44.676
			%	5,6	36,0	48,6	9,0	0,8	100,0
		IV	N	7.940	38.054	39.762	11.439	691	97.887
			%	8,1	38,9	40,6	11,7	0,7	100,0
		V	N	1.538	8.270	13.302	4.275	517	27.901
			%	5,5	29,6	47,7	15,3	1,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	Total	N 17.639	76.990	99.925	28.401	3.859	226.814
			% 7,8	33,9	44,1	12,5	1,7	100,0
	I	N	902	3.297	4.625	715	.	9.538
		%	9,5	34,6	48,5	7,5	.	100,0
	II	N	794	4.449	8.131	1.357	.	14.731
		%	5,4	30,2	55,2	9,2	.	100,0
	III	N	3.764	15.187	21.292	8.143	1.252	49.638
		%	7,6	30,6	42,9	16,4	2,5	100,0
	IV	N	10.217	39.974	49.489	11.520	1.475	112.676
		%	9,1	35,5	43,9	10,2	1,3	100,0
	V	N	1.962	14.084	16.388	6.665	1.132	40.231
		%	4,9	35,0	40,7	16,6	2,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 211. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	Total	N	51.784	369.374	415.940	73.482	4.544	915.124
		%	5,7	40,4	45,5	8,0	0,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	12.515	81.827	96.131	18.441	1.686	210.600
		%	5,9	38,9	45,6	8,8	0,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	10.431	63.981	76.084	16.127	831	167.454
		%	6,2	38,2	45,4	9,6	0,5	100,0
	Secundaria, superior	N	23.449	151.094	158.737	26.493	897	360.670
		%	6,5	41,9	44,0	7,3	0,2	100,0
	Terciaria	N	5.389	72.472	84.987	12.421	1.130	176.400
		%	3,1	41,1	48,2	7,0	0,6	100,0
	15-24 Total	N	6.027	44.798	39.549	3.603	482	94.458
		%	6,4	47,4	41,9	3,8	0,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.105	4.635	3.912	265	.	9.918
		%	11,1	46,7	39,4	2,7	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.238	14.240	12.017	1.633	.	31.129
		%	10,4	45,7	38,6	5,2	.	100,0
	Secundaria, superior	N	1.481	21.127	18.538	1.212	482	42.840
		%	3,5	49,3	43,3	2,8	1,1	100,0
	Terciaria	N	203	4.795	5.081	492	.	10.572
		%	1,9	45,4	48,1	4,7	.	100,0
	25-44 Total	N	18.297	147.904	148.735	20.151	1.223	336.309
		%	5,4	44,0	44,2	6,0	0,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.032	16.955	16.582	2.206	.	37.776
		%	5,4	44,9	43,9	5,8	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.368	22.200	23.771	4.469	.	52.808
		%	4,5	42,0	45,0	8,5	.	100,0
	Secundaria, superior	N	11.277	71.205	72.719	8.657	415	164.274
		%	6,9	43,3	44,3	5,3	0,3	100,0
	Terciaria	N	2.619	37.543	35.662	4.818	808	81.451
		%	3,2	46,1	43,8	5,9	1,0	100,0
	45-64 Total	N	13.636	111.941	147.299	28.883	896	302.655
		%	4,5	37,0	48,7	9,5	0,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.621	26.931	34.916	5.697	235	70.400
		%	3,7	38,3	49,6	8,1	0,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

890

Tabla 211. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	1.912	17.235	26.336	7.262	499	53.244	
			%	3,6	32,4	49,5	13,6	0,9	100,0	
		Secundaria, superior	N	7.905	44.856	53.284	11.085	.	117.130	
			%	6,7	38,3	45,5	9,5	.	100,0	
		Terciaria	N	1.198	22.918	32.763	4.840	162	61.881	
			%	1,9	37,0	52,9	7,8	0,3	100,0	
	65-74	Total	N	6.226	34.943	43.871	10.055	638	95.733	
			%	6,5	36,5	45,8	10,5	0,7	100,0	
	>=75	Sin estudios, primaria	N	2.516	12.623	18.110	4.130	638	38.017	
			%	6,6	33,2	47,6	10,9	1,7	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.525	6.795	7.025	947	.	16.291	
			%	9,4	41,7	43,1	5,8	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.286	10.219	10.915	3.527	.	25.948	
			%	5,0	39,4	42,1	13,6	.	100,0	
		Terciaria	N	899	5.306	7.822	1.450	.	15.477	
			%	5,8	34,3	50,5	9,4	.	100,0	
		Total	Total	N	7.597	29.788	36.487	10.790	1.305	85.968
				%	8,8	34,7	42,4	12,6	1,5	100,0
Sin estudios, primaria			N	4.241	20.683	22.611	6.142	812	54.489	
			%	7,8	38,0	41,5	11,3	1,5	100,0	
Secundaria, inferior	N		1.389	3.510	6.936	1.815	331	13.981		
	%		9,9	25,1	49,6	13,0	2,4	100,0		
Secundaria, superior	N	1.499	3.685	3.281	2.012	.	10.478			
	%	14,3	35,2	31,3	19,2	.	100,0			
Terciaria	N	468	1.910	3.659	821	161	7.020			
	%	6,7	27,2	52,1	11,7	2,3	100,0			
Mujeres	Total	N	45.942	369.729	452.491	98.720	9.001	975.882		
		%	4,7	37,9	46,4	10,1	0,9	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	15.504	106.618	123.201	30.085	2.920	278.327		
		%	5,6	38,3	44,3	10,8	1,0	100,0		
	Secundaria, inferior	N	10.188	59.370	77.985	20.927	1.295	169.766		
		%	6,0	35,0	45,9	12,3	0,8	100,0		
Secundaria, superior	N	13.921	118.320	144.754	28.387	2.484	307.866			
	%	4,5	38,4	47,0	9,2	0,8	100,0			

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

891

Tabla 211. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N	6.329	85.421	106.551	19.321	2.302	219.923
			%	2,9	38,8	48,4	8,8	1,0	100,0
	15-24	Total	N	4.077	38.446	40.629	5.830	517	89.499
			%	4,6	43,0	45,4	6,5	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	866	4.849	4.681	990	.	11.386
			%	7,6	42,6	41,1	8,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	773	8.482	6.630	878	.	16.763
			%	4,6	50,6	39,6	5,2	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.438	18.586	21.407	3.012	.	45.443
			%	5,4	40,9	47,1	6,6	.	100,0
		Terciaria	N	.	6.529	7.912	950	517	15.907
			%	.	41,0	49,7	6,0	3,2	100,0
	25-44	Total	N	10.681	131.177	151.299	26.228	1.441	320.826
			%	3,3	40,9	47,2	8,2	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.271	9.509	12.102	3.107	.	25.990
			%	4,9	36,6	46,6	12,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.080	15.259	19.065	3.532	.	38.937
			%	2,8	39,2	49,0	9,1	.	100,0
		Secundaria, superior	N	5.126	52.826	60.832	10.643	1.061	130.487
			%	3,9	40,5	46,6	8,2	0,8	100,0
		Terciaria	N	3.203	53.583	59.300	8.945	380	125.412
			%	2,6	42,7	47,3	7,1	0,3	100,0
	45-64	Total	N	14.153	111.988	148.910	35.841	2.876	313.769
			%	4,5	35,7	47,5	11,4	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.743	31.465	35.088	7.999	667	77.963
			%	3,5	40,4	45,0	10,3	0,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.888	20.432	27.518	9.464	432	61.735
			%	6,3	33,1	44,6	15,3	0,7	100,0
		Secundaria, superior	N	5.198	39.396	54.385	10.886	457	110.322
			%	4,7	35,7	49,3	9,9	0,4	100,0
		Terciaria	N	2.324	20.694	31.920	7.491	1.320	63.749
			%	3,6	32,5	50,1	11,8	2,1	100,0
	65-74	Total	N	6.990	39.999	48.113	13.210	1.612	109.925
			%	6,4	36,4	43,8	12,0	1,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 211. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	3.519	25.802	25.409	6.875	247	61.852
			%	5,7	41,7	41,1	11,1	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.787	7.164	13.963	3.982	557	27.452
			%	6,5	26,1	50,9	14,5	2,0	100,0
		Secundaria, superior	N	1.159	4.492	4.371	1.149	723	11.893
			%	9,7	37,8	36,7	9,7	6,1	100,0
	Terciaria	N	526	2.541	4.370	1.205	85	8.727	
		%	6,0	29,1	50,1	13,8	1,0	100,0	
	>=75	Total	N	10.041	48.119	63.539	17.611	2.555	141.864
			%	7,1	33,9	44,8	12,4	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.104	34.991	45.922	11.113	2.006	101.136
			%	7,0	34,6	45,4	11,0	2,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.661	8.034	10.809	3.070	306	24.879
			%	10,7	32,3	43,4	12,3	1,2	100,0
		Secundaria, superior	N	.	3.021	3.759	2.697	243	9.720
			%	.	31,1	38,7	27,7	2,5	100,0
		Terciaria	N	275	2.073	3.049	731	.	6.129
			%	4,5	33,8	49,8	11,9	.	100,0
Ambos		Total	N	97.727	739.102	868.431	172.202	13.545	1.891.006
			%	5,2	39,1	45,9	9,1	0,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	28.019	188.445	219.332	48.525	4.606	488.927	
		%	5,7	38,5	44,9	9,9	0,9	100,0	
	Secundaria, inferior	N	20.619	123.351	154.070	37.054	2.126	337.220	
		%	6,1	36,6	45,7	11,0	0,6	100,0	
	Secundaria, superior	N	37.371	269.414	303.491	54.880	3.381	668.536	
		%	5,6	40,3	45,4	8,2	0,5	100,0	
	Terciaria	N	11.718	157.893	191.538	31.742	3.432	396.323	
		%	3,0	39,8	48,3	8,0	0,9	100,0	
	15-24	Total	N	10.104	83.243	80.178	9.433	998	183.958
			%	5,5	45,3	43,6	5,1	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.971	9.484	8.593	1.256	.	21.304
			%	9,3	44,5	40,3	5,9	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.010	22.722	18.647	2.512	.	47.891
			%	8,4	47,4	38,9	5,2	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 211. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	3.919	39.713	39.945	4.224	482	88.283
			%	4,4	45,0	45,2	4,8	0,5	100,0
		Terciaria	N	203	11.324	12.993	1.442	517	26.479
			%	0,8	42,8	49,1	5,4	2,0	100,0
	25-44	Total	N	28.977	279.081	300.033	46.378	2.664	657.135
			%	4,4	42,5	45,7	7,1	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.303	26.465	28.684	5.313	.	63.765
			%	5,2	41,5	45,0	8,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.448	37.459	42.837	8.001	.	91.745
			%	3,8	40,8	46,7	8,7	.	100,0
		Secundaria, superior	N	16.403	124.031	133.551	19.300	1.476	294.762
			%	5,6	42,1	45,3	6,5	0,5	100,0
		Terciaria	N	5.823	91.127	94.962	13.763	1.188	206.862
			%	2,8	44,1	45,9	6,7	0,6	100,0
	45-64	Total	N	27.790	223.928	296.209	64.724	3.772	616.424
			%	4,5	36,3	48,1	10,5	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.364	58.396	70.004	13.696	902	148.363
			%	3,6	39,4	47,2	9,2	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.800	37.668	53.854	16.727	932	114.979
			%	5,0	32,8	46,8	14,5	0,8	100,0
		Secundaria, superior	N	13.103	84.252	107.669	21.971	457	227.452
			%	5,8	37,0	47,3	9,7	0,2	100,0
		Terciaria	N	3.522	43.612	64.683	12.330	1.482	125.630
			%	2,8	34,7	51,5	9,8	1,2	100,0
	65-74	Total	N	13.217	74.942	91.984	23.265	2.250	205.658
			%	6,4	36,4	44,7	11,3	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.035	38.425	43.519	11.005	886	99.869
			%	6,0	38,5	43,6	11,0	0,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.311	13.959	20.988	4.929	557	43.744
			%	7,6	31,9	48,0	11,3	1,3	100,0
		Secundaria, superior	N	2.446	14.711	15.285	4.676	723	37.841
			%	6,5	38,9	40,4	12,4	1,9	100,0
		Terciaria	N	1.425	7.847	12.192	2.655	85	24.204
			%	5,9	32,4	50,4	11,0	0,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 211. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y nivel de estudios*

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	N	17.639	77.908	100.026	28.401	3.859	227.832
			%	7,7	34,2	43,9	12,5	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	11.345	55.674	68.533	17.255	2.818	155.625
			%	7,3	35,8	44,0	11,1	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.050	11.543	17.744	4.886	637	38.860
			%	10,4	29,7	45,7	12,6	1,6	100,0
		Secundaria, superior	N	1.499	6.706	7.040	4.708	243	20.198
			%	7,4	33,2	34,9	23,3	1,2	100,0
		Terciaria	N	744	3.984	6.708	1.552	161	13.149
			%	5,7	30,3	51,0	11,8	1,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 212. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	Total	CAPV	N	21.965	238.790	479.445	156.830	18.093	915.124
			%	2,4	26,1	52,4	17,1	2,0	100,0
		Araba	N	2.906	31.947	69.682	26.366	2.850	133.751
			%	2,2	23,9	52,1	19,7	2,1	100,0
		Gipuzkoa	N	7.079	75.345	158.782	47.017	5.589	293.812
			%	2,4	25,6	54,0	16,0	1,9	100,0
		Bizkaia	N	11.981	131.498	250.981	83.446	9.654	487.561
			%	2,5	27,0	51,5	17,1	2,0	100,0
	15-24	CAPV	N	2.331	27.747	50.346	11.592	2.443	94.458
			%	2,5	29,4	53,3	12,3	2,6	100,0
		Araba	N	624	4.018	8.429	1.183	616	14.869
			%	4,2	27,0	56,7	8,0	4,1	100,0
		Gipuzkoa	N	591	8.398	18.238	3.379	700	31.305
			%	1,9	26,8	58,3	10,8	2,2	100,0
		Bizkaia	N	1.116	15.331	23.679	7.030	1.127	48.284
			%	2,3	31,8	49,0	14,6	2,3	100,0
	25-44	CAPV	N	7.769	98.787	173.890	48.883	6.980	336.309
			%	2,3	29,4	51,7	14,5	2,1	100,0
		Araba	N	699	13.588	26.327	10.868	579	52.062
			%	1,3	26,1	50,6	20,9	1,1	100,0
		Gipuzkoa	N	1.528	30.762	58.325	13.900	2.275	106.790
			%	1,4	28,8	54,6	13,0	2,1	100,0
		Bizkaia	N	5.542	54.436	89.238	24.116	4.125	177.458
			%	3,1	30,7	50,3	13,6	2,3	100,0
	45-64	CAPV	N	6.360	68.956	160.081	62.897	4.362	302.655
			%	2,1	22,8	52,9	20,8	1,4	100,0
		Araba	N	812	8.480	23.342	9.171	947	42.751
			%	1,9	19,8	54,6	21,5	2,2	100,0
		Gipuzkoa	N	2.904	21.758	52.675	18.247	1.835	97.419
			%	3,0	22,3	54,1	18,7	1,9	100,0
		Bizkaia	N	2.644	38.718	84.064	35.480	1.580	162.485
			%	1,6	23,8	51,7	21,8	1,0	100,0
	65-74	CAPV	N	2.618	20.144	55.001	16.114	1.858	95.733
			%	2,7	21,0	57,5	16,8	1,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 212. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres 65-74	Araba	N	266	2.758	6.924	2.852	362	13.163	
		%	2,0	21,0	52,6	21,7	2,8	100,0	
	Gipuzkoa	N	1.350	6.352	17.820	6.371	237	32.130	
		%	4,2	19,8	55,5	19,8	0,7	100,0	
	Bizkaia	N	1.001	11.033	30.256	6.890	1.259	50.440	
		%	2,0	21,9	60,0	13,7	2,5	100,0	
	>=75	CAPV	N	2.888	23.158	40.128	17.344	2.450	85.968
			%	3,4	26,9	46,7	20,2	2,9	100,0
		Araba	N	505	3.103	4.659	2.292	345	10.905
			%	4,6	28,5	42,7	21,0	3,2	100,0
		Gipuzkoa	N	705	8.075	11.725	5.121	543	26.168
			%	2,7	30,9	44,8	19,6	2,1	100,0
Bizkaia		N	1.678	11.980	23.744	9.931	1.562	48.895	
		%	3,4	24,5	48,6	20,3	3,2	100,0	
Mujeres		Total	N	17.861	226.269	513.530	185.288	32.934	975.882
			%	1,8	23,2	52,6	19,0	3,4	100,0
		Araba	N	2.947	29.489	72.088	28.600	3.648	136.772
			%	2,2	21,6	52,7	20,9	2,7	100,0
	Gipuzkoa	N	6.681	65.945	175.579	53.396	11.084	312.686	
		%	2,1	21,1	56,2	17,1	3,5	100,0	
	Bizkaia	N	8.233	130.836	265.863	103.292	18.202	526.425	
		%	1,6	24,9	50,5	19,6	3,5	100,0	
	15-24	CAPV	N	1.314	24.279	44.474	16.706	2.727	89.499
			%	1,5	27,1	49,7	18,7	3,0	100,0
		Araba	N	581	3.054	6.762	2.813	.	13.210
			%	4,4	23,1	51,2	21,3	.	100,0
Gipuzkoa		N	734	4.610	17.244	5.413	1.442	29.443	
		%	2,5	15,7	58,6	18,4	4,9	100,0	
Bizkaia		N	.	16.615	20.467	8.480	1.284	46.846	
		%	.	35,5	43,7	18,1	2,7	100,0	
25-44		CAPV	N	3.496	76.375	172.131	57.914	10.909	320.826
			%	1,1	23,8	53,7	18,1	3,4	100,0
		Araba	N	746	11.036	26.780	7.853	1.453	47.869
			%	1,6	23,1	55,9	16,4	3,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 212. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	971	21.499	59.747	15.423	4.264	101.905	
			%	1,0	21,1	58,6	15,1	4,2	100,0	
		Bizkaia	N	1.779	43.840	85.604	34.638	5.192	171.052	
	%		1,0	25,6	50,0	20,2	3,0	100,0		
		45-64	CAPV	N	4.698	73.993	163.707	59.945	11.424	313.769
	%			1,5	23,6	52,2	19,1	3,6	100,0	
		Araba	N	540	9.324	23.621	9.608	1.171	44.263	
	%		1,2	21,1	53,4	21,7	2,6	100,0		
		Gipuzkoa	N	1.899	22.727	54.771	16.866	3.399	99.662	
	%		1,9	22,8	55,0	16,9	3,4	100,0		
		Bizkaia	N	2.260	41.942	85.316	33.471	6.855	169.843	
	%		1,3	24,7	50,2	19,7	4,0	100,0		
		65-74	CAPV	N	5.182	25.665	56.424	19.472	3.181	109.925
	%			4,7	23,3	51,3	17,7	2,9	100,0	
		Araba	N	381	3.540	5.872	4.082	444	14.320	
	%		2,7	24,7	41,0	28,5	3,1	100,0		
		Gipuzkoa	N	1.711	6.926	20.723	5.820	942	36.120	
	%		4,7	19,2	57,4	16,1	2,6	100,0		
		Bizkaia	N	3.091	15.199	29.829	9.570	1.795	59.484	
	%		5,2	25,6	50,1	16,1	3,0	100,0		
		>=75	CAPV	N	3.170	25.958	76.794	31.251	4.693	141.864
	%			2,2	18,3	54,1	22,0	3,3	100,0	
		Araba	N	700	2.534	9.053	4.244	579	17.110	
	%		4,1	14,8	52,9	24,8	3,4	100,0		
	Gipuzkoa	N	1.367	10.183	23.094	9.874	1.037	45.555		
%		3,0	22,4	50,7	21,7	2,3	100,0			
	Bizkaia	N	1.103	13.240	44.647	17.133	3.076	79.200		
%		1,4	16,7	56,4	21,6	3,9	100,0			
Ambos	Total	CAPV	N	39.826	465.060	992.975	342.118	51.027	1.891.006	
			%	2,1	24,6	52,5	18,1	2,7	100,0	
		Araba	N	5.853	61.436	141.770	54.966	6.498	270.523	
	%		2,2	22,7	52,4	20,3	2,4	100,0		
		Gipuzkoa	N	13.759	141.290	334.361	100.414	16.673	606.497	
	%		2,3	23,3	55,1	16,6	2,7	100,0		
		Bizkaia	N	20.214	262.334	516.844	186.738	27.856	1.013.987	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 212. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	Total	Bizkaia	%	A diario					
				2,0	25,9	51,0	18,4	2,7	100,0
	15-24	CAPV	N	3.645	52.025	94.819	28.298	5.170	183.958
			%	2,0	28,3	51,5	15,4	2,8	100,0
		Araba	N	1.205	7.071	15.191	3.996	616	28.079
			%	4,3	25,2	54,1	14,2	2,2	100,0
		Gipuzkoa	N	1.324	13.008	35.482	8.791	2.142	60.748
			%	2,2	21,4	58,4	14,5	3,5	100,0
		Bizkaia	N	1.116	31.946	44.146	15.510	2.412	95.130
			%	1,2	33,6	46,4	16,3	2,5	100,0
	25-44	CAPV	N	11.265	175.162	346.022	106.798	17.889	657.135
			%	1,7	26,7	52,7	16,3	2,7	100,0
		Araba	N	1.445	24.625	53.107	18.721	2.033	99.930
			%	1,4	24,6	53,1	18,7	2,0	100,0
		Gipuzkoa	N	2.499	52.261	118.073	29.323	6.539	208.695
			%	1,2	25,0	56,6	14,1	3,1	100,0
		Bizkaia	N	7.321	98.276	174.842	58.754	9.317	348.509
			%	2,1	28,2	50,2	16,9	2,7	100,0
	45-64	CAPV	N	11.058	142.949	323.788	122.843	15.787	616.424
			%	1,8	23,2	52,5	19,9	2,6	100,0
		Araba	N	1.351	17.804	46.963	18.778	2.118	87.015
			%	1,6	20,5	54,0	21,6	2,4	100,0
		Gipuzkoa	N	4.803	44.485	107.446	35.114	5.234	197.081
			%	2,4	22,6	54,5	17,8	2,7	100,0
		Bizkaia	N	4.904	80.660	169.379	68.951	8.435	332.328
			%	1,5	24,3	51,0	20,7	2,5	100,0
	65-74	CAPV	N	7.800	45.808	111.425	35.586	5.039	205.658
			%	3,8	22,3	54,2	17,3	2,5	100,0
		Araba	N	648	6.298	12.797	6.935	806	27.483
			%	2,4	22,9	46,6	25,2	2,9	100,0
		Gipuzkoa	N	3.061	13.278	38.543	12.191	1.178	68.251
			%	4,5	19,5	56,5	17,9	1,7	100,0
		Bizkaia	N	4.092	26.232	60.085	16.460	3.055	109.924
			%	3,7	23,9	54,7	15,0	2,8	100,0
	>=75	CAPV	N	6.058	49.115	116.922	48.595	7.143	227.832
			%	2,7	21,6	51,3	21,3	3,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 212. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Araba	N	1.205	5.638	13.712	6.536	925	28.015
			%	4,3	20,1	48,9	23,3	3,3	100,0
	Gipuzkoa	N	2.072	18.258	34.818	14.995	1.580	71.723	
		%	2,9	25,5	48,5	20,9	2,2	100,0	
	Bizkaia	N	2.781	25.220	68.391	27.064	4.638	128.094	
		%	2,2	19,7	53,4	21,1	3,6	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 213. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
		A diario							
Hombres	Total	Total	N	21.965	237.927	479.048	156.830	18.093	913.863
			%	2,4	26,0	52,4	17,2	2,0	100,0
	I	N		2.472	31.839	59.307	18.624	1.447	113.690
			%	2,2	28,0	52,2	16,4	1,3	100,0
	II	N		981	18.974	43.593	13.047	1.611	78.206
			%	1,3	24,3	55,7	16,7	2,1	100,0
	III	N		5.862	48.802	99.998	30.626	3.068	188.355
			%	3,1	25,9	53,1	16,3	1,6	100,0
	IV	N		10.875	116.132	235.177	79.986	8.136	450.306
			%	2,4	25,8	52,2	17,8	1,8	100,0
	V	N		1.776	22.180	40.973	14.548	3.832	83.307
			%	2,1	26,6	49,2	17,5	4,6	100,0
	15-24	Total	N	2.331	27.487	50.048	11.592	2.443	93.900
			%	2,5	29,3	53,3	12,3	2,6	100,0
	I	N		323	7.485	4.735	1.884	207	14.634
			%	2,2	51,1	32,4	12,9	1,4	100,0
	II	N		268	2.270	7.184	1.266	.	10.988
			%	2,4	20,7	65,4	11,5	.	100,0
	III	N		823	4.005	8.361	2.645	997	16.830
			%	4,9	23,8	49,7	15,7	5,9	100,0
	IV	N		917	11.270	24.620	4.957	974	42.737
			%	2,1	26,4	57,6	11,6	2,3	100,0
	V	N		.	2.456	5.148	841	265	8.711
			%	.	28,2	59,1	9,7	3,0	100,0
	25-44	Total	N	7.769	98.787	173.890	48.883	6.980	336.309
			%	2,3	29,4	51,7	14,5	2,1	100,0
	I	N		1.422	10.410	24.723	6.777	399	43.732
			%	3,3	23,8	56,5	15,5	0,9	100,0
	II	N		713	9.549	17.223	4.199	811	32.496
			%	2,2	29,4	53,0	12,9	2,5	100,0
	III	N		1.241	20.360	32.301	8.017	338	62.257
			%	2,0	32,7	51,9	12,9	0,5	100,0
	IV	N		3.866	47.368	81.637	24.266	3.254	160.392
			%	2,4	29,5	50,9	15,1	2,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 213. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres 25-44 V	N		527	11.098	18.005	5.624	2.178	37.432
	%		1,4	29,6	48,1	15,0	5,8	100,0
45-64 Total	N		6.360	68.767	159.982	62.897	4.362	302.368
	%		2,1	22,7	52,9	20,8	1,4	100,0
I	N		531	9.691	19.935	7.163	586	37.907
	%		1,4	25,6	52,6	18,9	1,5	100,0
II	N		.	5.937	11.468	5.340	674	23.419
	%		.	25,3	49,0	22,8	2,9	100,0
III	N		2.049	14.387	36.845	12.232	809	66.322
	%		3,1	21,7	55,6	18,4	1,2	100,0
IV	N		2.930	32.669	80.213	32.876	1.927	150.614
	%		1,9	21,7	53,3	21,8	1,3	100,0
V	N		849	6.084	11.520	5.285	367	24.106
	%		3,5	25,2	47,8	21,9	1,5	100,0
65-74 Total	N		2.618	20.144	55.001	16.114	1.858	95.733
	%		2,7	21,0	57,5	16,8	1,9	100,0
I	N		.	2.995	8.275	2.228	255	13.753
	%		.	21,8	60,2	16,2	1,9	100,0
II	N		.	828	4.366	1.544	125	6.862
	%		.	12,1	63,6	22,5	1,8	100,0
III	N		636	4.093	13.023	3.681	343	21.777
	%		2,9	18,8	59,8	16,9	1,6	100,0
IV	N		1.582	11.356	25.925	7.756	1.134	47.753
	%		3,3	23,8	54,3	16,2	2,4	100,0
V	N		399	872	3.412	905	.	5.588
	%		7,1	15,6	61,1	16,2	.	100,0
>=75 Total	N		2.888	22.743	40.128	17.344	2.450	85.553
	%		3,4	26,6	46,9	20,3	2,9	100,0
I	N		196	1.258	1.638	571	.	3.663
	%		5,3	34,3	44,7	15,6	.	100,0
II	N		.	390	3.352	698	.	4.440
	%		.	8,8	75,5	15,7	.	100,0
III	N		1.113	5.957	9.469	4.051	581	21.169
	%		5,3	28,1	44,7	19,1	2,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 213. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres >=75	IV	N	1.580	13.469	22.782	10.131	848	48.810
		%	3,2	27,6	46,7	20,8	1,7	100,0
	V	N	.	1.669	2.887	1.893	1.021	7.470
		%	.	22,3	38,6	25,3	13,7	100,0
Mujeres Total	Total	N	17.861	225.334	512.651	184.712	32.934	973.492
		%	1,8	23,1	52,7	19,0	3,4	100,0
I	N	392	24.925	57.368	17.896	4.257	104.838	
	%	0,4	23,8	54,7	17,1	4,1	100,0	
II	N	1.733	23.212	48.842	18.497	2.743	95.028	
	%	1,8	24,4	51,4	19,5	2,9	100,0	
III	N	6.865	53.289	129.715	42.977	9.262	242.107	
	%	2,8	22,0	53,6	17,8	3,8	100,0	
IV	N	6.648	83.582	195.030	65.577	9.604	360.441	
	%	1,8	23,2	54,1	18,2	2,7	100,0	
V	N	2.222	40.326	81.695	39.766	7.068	171.077	
	%	1,3	23,6	47,8	23,2	4,1	100,0	
15-24 Total	Total	N	1.314	23.769	44.224	16.499	2.727	88.533
		%	1,5	26,8	50,0	18,6	3,1	100,0
I	N	.	3.769	7.547	2.905	341	14.562	
	%	.	25,9	51,8	20,0	2,3	100,0	
II	N	506	4.472	6.273	1.540	707	13.497	
	%	3,7	33,1	46,5	11,4	5,2	100,0	
III	N	506	4.872	11.495	2.388	808	20.069	
	%	2,5	24,3	57,3	11,9	4,0	100,0	
IV	N	302	8.072	15.469	7.169	602	31.614	
	%	1,0	25,5	48,9	22,7	1,9	100,0	
V	N	.	2.585	3.441	2.497	270	8.792	
	%	.	29,4	39,1	28,4	3,1	100,0	
25-44 Total	Total	N	3.496	76.375	171.906	57.645	10.909	320.330
		%	1,1	23,8	53,7	18,0	3,4	100,0
I	N	.	11.694	23.696	7.902	1.794	45.086	
	%	.	25,9	52,6	17,5	4,0	100,0	
II	N	.	8.351	20.964	7.496	413	37.223	
	%	.	22,4	56,3	20,1	1,1	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 213. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	1.422	19.157	44.005	15.266	2.179	82.029
			%	1,7	23,4	53,6	18,6	2,7	100,0
		IV	N	1.546	24.936	61.126	19.022	4.095	110.725
			%	1,4	22,5	55,2	17,2	3,7	100,0
		V	N	528	12.237	22.114	7.958	2.429	45.267
			%	1,2	27,0	48,9	17,6	5,4	100,0
	45-64	Total	N	4.698	73.822	163.707	59.945	11.424	313.598
			%	1,5	23,5	52,2	19,1	3,6	100,0
		I	N	102	6.337	18.751	5.222	1.704	32.116
			%	0,3	19,7	58,4	16,3	5,3	100,0
		II	N	743	7.399	11.794	5.577	1.279	26.792
			%	2,8	27,6	44,0	20,8	4,8	100,0
		III	N	1.793	19.369	47.866	15.373	4.239	88.641
			%	2,0	21,9	54,0	17,3	4,8	100,0
		IV	N	1.150	25.568	57.443	17.894	2.046	104.102
			%	1,1	24,6	55,2	17,2	2,0	100,0
		V	N	910	15.149	27.852	15.879	2.157	61.946
			%	1,5	24,5	45,0	25,6	3,5	100,0
	65-74	Total	N	5.182	25.510	56.424	19.472	3.181	109.770
			%	4,7	23,2	51,4	17,7	2,9	100,0
		I	N	.	2.181	3.995	604	419	7.199
			%	.	30,3	55,5	8,4	5,8	100,0
		II	N	310	1.213	3.959	1.742	.	7.225
			%	4,3	16,8	54,8	24,1	.	100,0
		III	N	1.534	4.845	12.018	3.916	586	22.899
			%	6,7	21,2	52,5	17,1	2,6	100,0
		IV	N	2.722	12.795	25.922	7.069	1.626	50.134
			%	5,4	25,5	51,7	14,1	3,2	100,0
		V	N	615	4.474	10.530	6.142	550	22.312
			%	2,8	20,1	47,2	27,5	2,5	100,0
	>=75	Total	N	3.170	25.858	76.390	31.151	4.693	141.261
			%	2,2	18,3	54,1	22,1	3,3	100,0
		I	N	290	944	3.379	1.263	.	5.875
			%	4,9	16,1	57,5	21,5	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 213. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	>=75	II	N	174	1.777	5.852	2.143	345	10.292	
			%	1,7	17,3	56,9	20,8	3,4	100,0	
		III	N	1.608	5.046	14.331	6.034	1.450	28.468	
			%	5,6	17,7	50,3	21,2	5,1	100,0	
		IV	N	928	12.210	35.071	14.422	1.235	63.866	
			%	1,5	19,1	54,9	22,6	1,9	100,0	
		V	N	169	5.882	17.758	7.290	1.662	32.760	
			%	0,5	18,0	54,2	22,3	5,1	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	39.826	463.261	991.700	341.542	51.027	1.887.356
				%	2,1	24,5	52,5	18,1	2,7	100,0
		I	N	2.864	56.765	116.676	36.519	5.704	218.528	
			%	1,3	26,0	53,4	16,7	2,6	100,0	
		II	N	2.714	42.186	92.436	31.544	4.354	173.234	
			%	1,6	24,4	53,4	18,2	2,5	100,0	
		III	N	12.726	102.091	229.713	73.602	12.329	430.462	
			%	3,0	23,7	53,4	17,1	2,9	100,0	
		IV	N	17.523	199.713	430.208	145.563	17.741	810.747	
			%	2,2	24,6	53,1	18,0	2,2	100,0	
		V	N	3.998	62.506	122.668	54.314	10.900	254.385	
			%	1,6	24,6	48,2	21,4	4,3	100,0	
15-24		Total	Total	N	3.645	51.256	94.272	28.091	5.170	182.434
				%	2,0	28,1	51,7	15,4	2,8	100,0
			I	N	323	11.254	12.282	4.789	548	29.196
				%	1,1	38,5	42,1	16,4	1,9	100,0
			II	N	773	6.742	13.457	2.805	707	24.485
				%	3,2	27,5	55,0	11,5	2,9	100,0
		III	N	1.330	8.877	19.856	5.033	1.804	36.900	
			%	3,6	24,1	53,8	13,6	4,9	100,0	
		IV	N	1.219	19.342	40.088	12.126	1.576	74.351	
			%	1,6	26,0	53,9	16,3	2,1	100,0	
		V	N	.	5.041	8.589	3.338	535	17.503	
			%	.	28,8	49,1	19,1	3,1	100,0	
25-44	Total	Total	N	11.265	175.162	345.796	106.528	17.889	656.640	
			%	1,7	26,7	52,7	16,2	2,7	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 213. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	25-44	I	N	1.422	22.104	48.420	14.679	2.193	88.818
			%	1,6	24,9	54,5	16,5	2,5	100,0
		II	N	713	17.900	38.187	11.695	1.224	69.719
			%	1,0	25,7	54,8	16,8	1,8	100,0
		III	N	2.663	39.517	76.306	23.284	2.517	144.286
			%	1,8	27,4	52,9	16,1	1,7	100,0
		IV	N	5.412	72.305	142.763	43.289	7.349	271.117
			%	2,0	26,7	52,7	16,0	2,7	100,0
		V	N	1.055	23.335	40.120	13.582	4.607	82.699
			%	1,3	28,2	48,5	16,4	5,6	100,0
	45-64	Total	N	11.058	142.589	323.689	122.843	15.787	615.965
			%	1,8	23,1	52,5	19,9	2,6	100,0
		I	N	634	16.029	38.687	12.385	2.289	70.023
			%	0,9	22,9	55,2	17,7	3,3	100,0
		II	N	743	13.336	23.263	10.917	1.953	50.212
			%	1,5	26,6	46,3	21,7	3,9	100,0
		III	N	3.842	33.756	84.711	27.605	5.048	154.963
			%	2,5	21,8	54,7	17,8	3,3	100,0
		IV	N	4.079	58.237	137.656	50.770	3.973	254.716
			%	1,6	22,9	54,0	19,9	1,6	100,0
		V	N	1.759	21.232	39.372	21.165	2.524	86.052
			%	2,0	24,7	45,8	24,6	2,9	100,0
	65-74	Total	N	7.800	45.653	111.425	35.586	5.039	205.503
			%	3,8	22,2	54,2	17,3	2,5	100,0
		I	N	.	5.176	12.270	2.833	674	20.952
			%	.	24,7	58,6	13,5	3,2	100,0
		II	N	310	2.041	8.324	3.286	125	14.087
			%	2,2	14,5	59,1	23,3	0,9	100,0
		III	N	2.171	8.939	25.041	7.596	929	44.676
			%	4,9	20,0	56,1	17,0	2,1	100,0
		IV	N	4.304	24.151	51.847	14.825	2.760	97.887
			%	4,4	24,7	53,0	15,1	2,8	100,0
		V	N	1.015	5.347	13.943	7.047	550	27.901
			%	3,6	19,2	50,0	25,3	2,0	100,0
	>=75	Total	N	6.058	48.601	116.518	48.495	7.143	226.814

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 213. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	%	2,7	21,4	51,4	21,4	3,1	100,0
		I	N	485	2.202	5.017	1.834	.	9.538
			%	5,1	23,1	52,6	19,2	.	100,0
		II	N	174	2.167	9.204	2.841	345	14.731
			%	1,2	14,7	62,5	19,3	2,3	100,0
		III	N	2.721	11.003	23.799	10.084	2.031	49.638
			%	5,5	22,2	47,9	20,3	4,1	100,0
		IV	N	2.508	25.679	57.853	24.553	2.084	112.676
			%	2,2	22,8	51,3	21,8	1,8	100,0
		V	N	169	7.551	20.645	9.182	2.683	40.231
			%	0,4	18,8	51,3	22,8	6,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 214. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	Total	N	21.965	238.790	479.445	156.830	18.093	915.124
		%	2,4	26,1	52,4	17,1	2,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	5.354	56.250	101.734	41.388	5.874	210.600
		%	2,5	26,7	48,3	19,7	2,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	4.801	46.528	85.753	26.281	4.092	167.454
		%	2,9	27,8	51,2	15,7	2,4	100,0
	Secundaria, superior	N	9.419	92.574	192.296	60.607	5.774	360.670
		%	2,6	25,7	53,3	16,8	1,6	100,0
	Terciaria	N	2.391	43.439	99.663	28.554	2.352	176.400
		%	1,4	24,6	56,5	16,2	1,3	100,0
	15-24 Total	N	2.331	27.747	50.346	11.592	2.443	94.458
		%	2,5	29,4	53,3	12,3	2,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	245	3.472	4.379	700	1.121	9.918
		%	2,5	35,0	44,2	7,1	11,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.338	9.331	14.701	4.913	845	31.129
		%	4,3	30,0	47,2	15,8	2,7	100,0
	Secundaria, superior	N	747	11.055	25.050	5.510	477	42.840
		%	1,7	25,8	58,5	12,9	1,1	100,0
	Terciaria	N	.	3.888	6.215	469	.	10.572
		%	.	36,8	58,8	4,4	.	100,0
	25-44 Total	N	7.769	98.787	173.890	48.883	6.980	336.309
		%	2,3	29,4	51,7	14,5	2,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	251	13.059	17.034	6.700	732	37.776
		%	0,7	34,6	45,1	17,7	1,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.476	18.670	25.726	5.197	1.739	52.808
		%	2,8	35,4	48,7	9,8	3,3	100,0
	Secundaria, superior	N	3.906	46.164	86.414	24.431	3.359	164.274
		%	2,4	28,1	52,6	14,9	2,0	100,0
	Terciaria	N	2.136	20.894	44.717	12.555	1.149	81.451
		%	2,6	25,7	54,9	15,4	1,4	100,0
	45-64 Total	N	6.360	68.956	160.081	62.897	4.362	302.655
		%	2,1	22,8	52,9	20,8	1,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.880	17.818	33.005	16.406	1.292	70.400
		%	2,7	25,3	46,9	23,3	1,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 214. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	702	11.395	28.949	11.453	745	53.244	
			%	1,3	21,4	54,4	21,5	1,4	100,0	
		Secundaria, superior	N	3.778	26.079	63.049	22.768	1.455	117.130	
			%	3,2	22,3	53,8	19,4	1,2	100,0	
		Terciaria	N	.	13.663	35.078	12.271	870	61.881	
			%	.	22,1	56,7	19,8	1,4	100,0	
	65-74	Total	N	2.618	20.144	55.001	16.114	1.858	95.733	
			%	2,7	21,0	57,5	16,8	1,9	100,0	
	>=75	Sin estudios, primaria	N	1.443	6.640	22.526	6.585	823	38.017	
			%	3,8	17,5	59,3	17,3	2,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	831	4.125	9.328	1.710	298	16.291	
			%	5,1	25,3	57,3	10,5	1,8	100,0	
		Secundaria, superior	N	343	6.006	13.447	5.669	482	25.948	
			%	1,3	23,1	51,8	21,8	1,9	100,0	
		Terciaria	N	.	3.373	9.699	2.150	255	15.477	
			%	.	21,8	62,7	13,9	1,6	100,0	
		Total	Total	N	2.888	23.158	40.128	17.344	2.450	85.968
				%	3,4	26,9	46,7	20,2	2,9	100,0
Sin estudios, primaria			N	1.535	15.261	24.790	10.996	1.907	54.489	
			%	2,8	28,0	45,5	20,2	3,5	100,0	
Secundaria, inferior	N		453	3.006	7.049	3.008	465	13.981		
	%		3,2	21,5	50,4	21,5	3,3	100,0		
Secundaria, superior	N	644	3.269	4.335	2.230	.	10.478			
	%	6,1	31,2	41,4	21,3	.	100,0			
Terciaria	N	256	1.621	3.954	1.110	78	7.020			
	%	3,6	23,1	56,3	15,8	1,1	100,0			
Mujeres	Total	N	17.861	226.269	513.530	185.288	32.934	975.882		
		%	1,8	23,2	52,6	19,0	3,4	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	6.508	58.424	145.854	58.521	9.021	278.327		
		%	2,3	21,0	52,4	21,0	3,2	100,0		
	Secundaria, inferior	N	3.665	42.869	87.809	29.774	5.650	169.766		
		%	2,2	25,3	51,7	17,5	3,3	100,0		
	Secundaria, superior	N	5.642	72.790	160.827	58.860	9.746	307.866		
		%	1,8	23,6	52,2	19,1	3,2	100,0		
	Terciaria	N	2.046	52.187	119.040	38.134	8.517	219.923		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 214. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	%	0,9	23,7	54,1	17,3	3,9	100,0
	15-24	Total	N	1.314	24.279	44.474	16.706	2.727	89.499
			%	1,5	27,1	49,7	18,7	3,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	556	2.108	5.608	3.115	.	11.386
			%	4,9	18,5	49,3	27,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	253	6.016	8.204	2.123	167	16.763
			%	1,5	35,9	48,9	12,7	1,0	100,0
		Secundaria, superior	N	278	10.709	23.097	9.498	1.861	45.443
			%	0,6	23,6	50,8	20,9	4,1	100,0
		Terciaria	N	227	5.446	7.565	1.970	699	15.907
			%	1,4	34,2	47,6	12,4	4,4	100,0
	25-44	Total	N	3.496	76.375	172.131	57.914	10.909	320.826
			%	1,1	23,8	53,7	18,1	3,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	528	5.797	13.860	5.039	766	25.990
			%	2,0	22,3	53,3	19,4	2,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	138	12.052	19.560	5.548	1.640	38.937
			%	0,4	31,0	50,2	14,2	4,2	100,0
		Secundaria, superior	N	1.922	29.175	70.138	25.247	4.004	130.487
			%	1,5	22,4	53,8	19,3	3,1	100,0
		Terciaria	N	908	29.350	68.573	22.081	4.499	125.412
			%	0,7	23,4	54,7	17,6	3,6	100,0
	45-64	Total	N	4.698	73.993	163.707	59.945	11.424	313.769
			%	1,5	23,6	52,2	19,1	3,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	895	18.570	39.772	15.707	3.018	77.963
			%	1,1	23,8	51,0	20,1	3,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.269	12.502	32.720	13.424	1.820	61.735
			%	2,1	20,3	53,0	21,7	2,9	100,0
		Secundaria, superior	N	1.929	28.721	56.507	19.898	3.267	110.322
			%	1,7	26,0	51,2	18,0	3,0	100,0
		Terciaria	N	605	14.201	34.708	10.916	3.318	63.749
			%	0,9	22,3	54,4	17,1	5,2	100,0
	65-74	Total	N	5.182	25.665	56.424	19.472	3.181	109.925
			%	4,7	23,3	51,3	17,7	2,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.505	14.681	30.566	12.522	1.577	61.852
			%	4,1	23,7	49,4	20,2	2,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 214. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Mujeres	65-74	Secundaria, inferior	N	1.244	5.565	14.946	4.464	1.233	27.452		
			%	4,5	20,3	54,4	16,3	4,5	100,0		
		Secundaria, superior	N	1.227	2.855	6.396	1.045	371	11.893		
			%	10,3	24,0	53,8	8,8	3,1	100,0		
		Terciaria	N	206	2.565	4.515	1.441	.	8.727		
			%	2,4	29,4	51,7	16,5	.	100,0		
	>=75	Total	N	3.170	25.958	76.794	31.251	4.693	141.864		
			%	2,2	18,3	54,1	22,0	3,3	100,0		
	Ambos	Total	Sin estudios, primaria	N	2.024	17.267	56.047	22.138	3.660	101.136	
				%	2,0	17,1	55,4	21,9	3,6	100,0	
			Secundaria, inferior	N	760	6.735	12.379	4.215	790	24.879	
				%	3,1	27,1	49,8	16,9	3,2	100,0	
			Secundaria, superior	N	285	1.330	4.689	3.173	243	9.720	
				%	2,9	13,7	48,2	32,6	2,5	100,0	
		Terciaria	N	100	625	3.679	1.725	.	6.129		
			%	1,6	10,2	60,0	28,1	.	100,0		
		15-24	Total	Sin estudios, primaria	N	39.826	465.060	992.975	342.118	51.027	1.891.006
					%	2,1	24,6	52,5	18,1	2,7	100,0
Secundaria, inferior				N	11.862	114.673	247.587	99.909	14.896	488.927	
				%	2,4	23,5	50,6	20,4	3,0	100,0	
Secundaria, superior	N			8.466	89.396	173.562	56.055	9.742	337.220		
	%			2,5	26,5	51,5	16,6	2,9	100,0		
Terciaria	N		15.062	165.364	353.123	119.467	15.520	668.536			
	%		2,3	24,7	52,8	17,9	2,3	100,0			
15-24	Total		N	4.437	95.626	218.704	66.688	10.869	396.323		
			%	1,1	24,1	55,2	16,8	2,7	100,0		
	Sin estudios, primaria		N	3.645	52.025	94.819	28.298	5.170	183.958		
			%	2,0	28,3	51,5	15,4	2,8	100,0		
	Secundaria, inferior	N	801	5.580	9.987	3.815	1.121	21.304			
		%	3,8	26,2	46,9	17,9	5,3	100,0			
Secundaria, superior	N	1.591	15.347	22.905	7.036	1.012	47.891				
	%	3,3	32,0	47,8	14,7	2,1	100,0				
Secundaria, superior	N	1.026	21.765	48.147	15.008	2.338	88.283				
	%	1,2	24,7	54,5	17,0	2,6	100,0				

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 214. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
15-24	Terciaria	N	227	9.334	13.780	2.439	699	26.479
		%	0,9	35,2	52,0	9,2	2,6	100,0
25-44	Total	N	11.265	175.162	346.022	106.798	17.889	657.135
		%	1,7	26,7	52,7	16,3	2,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	779	18.856	30.894	11.739	1.498	63.765
		%	1,2	29,6	48,4	18,4	2,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.614	30.722	45.285	10.745	3.379	91.745
		%	1,8	33,5	49,4	11,7	3,7	100,0
	Secundaria, superior	N	5.829	75.339	156.552	49.678	7.363	294.762
		%	2,0	25,6	53,1	16,9	2,5	100,0
	Terciaria	N	3.044	50.244	113.290	34.636	5.649	206.862
		%	1,5	24,3	54,8	16,7	2,7	100,0
45-64	Total	N	11.058	142.949	323.788	122.843	15.787	616.424
		%	1,8	23,2	52,5	19,9	2,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.774	36.388	72.777	32.113	4.310	148.363
		%	1,9	24,5	49,1	21,6	2,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.971	23.897	61.669	24.877	2.566	114.979
		%	1,7	20,8	53,6	21,6	2,2	100,0
	Secundaria, superior	N	5.708	54.800	119.557	42.665	4.722	227.452
		%	2,5	24,1	52,6	18,8	2,1	100,0
	Terciaria	N	605	27.864	69.786	23.187	4.188	125.630
		%	0,5	22,2	55,5	18,5	3,3	100,0
65-74	Total	N	7.800	45.808	111.425	35.586	5.039	205.658
		%	3,8	22,3	54,2	17,3	2,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.948	21.320	53.093	19.108	2.400	99.869
		%	4,0	21,3	53,2	19,1	2,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.076	9.689	24.274	6.174	1.531	43.744
		%	4,7	22,1	55,5	14,1	3,5	100,0
	Secundaria, superior	N	1.570	8.861	19.843	6.713	853	37.841
		%	4,2	23,4	52,4	17,7	2,3	100,0
	Terciaria	N	206	5.938	14.215	3.591	255	24.204
		%	0,9	24,5	58,7	14,8	1,1	100,0
>=75	Total	N	6.058	49.115	116.922	48.595	7.143	227.832
		%	2,7	21,6	51,3	21,3	3,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 214. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	Sin estudios, primaria	N	3.559	32.529	80.837	33.134	5.567	155.625
			%	2,3	20,9	51,9	21,3	3,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.214	9.741	19.428	7.222	1.255	38.860	
		%	3,1	25,1	50,0	18,6	3,2	100,0	
	Secundaria, superior	N	929	4.599	9.024	5.403	243	20.198	
		%	4,6	22,8	44,7	26,7	1,2	100,0	
	Terciaria	N	355	2.247	7.633	2.836	78	13.149	
		%	2,7	17,1	58,1	21,6	0,6	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 215. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres Total	CAPV	N	714.140	143.585	34.158	13.761	9.481	915.124
		%	78,0	15,7	3,7	1,5	1,0	100,0
	Araba	N	111.637	14.159	5.480	1.310	1.165	133.751
		%	83,5	10,6	4,1	1,0	0,9	100,0
	Gipuzkoa	N	233.318	43.585	7.089	6.627	3.192	293.812
		%	79,4	14,8	2,4	2,3	1,1	100,0
	Bizkaia	N	369.184	85.841	21.589	5.824	5.124	487.561
		%	75,7	17,6	4,4	1,2	1,1	100,0
15-24	CAPV	N	65.328	20.935	4.645	2.333	1.217	94.458
		%	69,2	22,2	4,9	2,5	1,3	100,0
	Araba	N	12.249	2.256	146	.	219	14.869
		%	82,4	15,2	1,0	.	1,5	100,0
	Gipuzkoa	N	22.572	4.935	1.276	1.986	536	31.305
		%	72,1	15,8	4,1	6,3	1,7	100,0
	Bizkaia	N	30.507	13.744	3.224	347	463	48.284
		%	63,2	28,5	6,7	0,7	1,0	100,0
25-44	CAPV	N	251.049	60.510	14.490	7.453	2.807	336.309
		%	74,6	18,0	4,3	2,2	0,8	100,0
	Araba	N	40.731	7.071	3.389	646	224	52.062
		%	78,2	13,6	6,5	1,2	0,4	100,0
	Gipuzkoa	N	81.411	19.037	3.220	2.506	616	106.790
		%	76,2	17,8	3,0	2,3	0,6	100,0
	Bizkaia	N	128.906	34.402	7.880	4.302	1.967	177.458
		%	72,6	19,4	4,4	2,4	1,1	100,0
45-64	CAPV	N	243.861	43.012	9.546	2.001	4.236	302.655
		%	80,6	14,2	3,2	0,7	1,4	100,0
	Araba	N	36.035	4.176	1.566	494	480	42.751
		%	84,3	9,8	3,7	1,2	1,1	100,0
	Gipuzkoa	N	80.315	12.365	1.758	1.202	1.779	97.419
		%	82,4	12,7	1,8	1,2	1,8	100,0
	Bizkaia	N	127.511	26.471	6.222	305	1.977	162.485
		%	78,5	16,3	3,8	0,2	1,2	100,0
65-74	CAPV	N	79.646	11.659	3.021	1.002	405	95.733
		%	83,2	12,2	3,2	1,0	0,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 215. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres 65-74	Araba	N	12.656	439	69	.	.	13.163	
		%	96,1	3,3	0,5	.	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	27.050	3.794	595	430	261	32.130	
		%	84,2	11,8	1,9	1,3	0,8	100,0	
	Bizkaia	N	39.940	7.427	2.357	572	144	50.440	
		%	79,2	14,7	4,7	1,1	0,3	100,0	
	>=75	CAPV	N	74.256	7.468	2.456	972	815	85.968
			%	86,4	8,7	2,9	1,1	0,9	100,0
		Araba	N	9.967	216	310	170	242	10.905
			%	91,4	2,0	2,8	1,6	2,2	100,0
		Gipuzkoa	N	21.970	3.454	241	504	.	26.168
			%	84,0	13,2	0,9	1,9	.	100,0
Bizkaia		N	42.320	3.797	1.906	299	573	48.895	
		%	86,6	7,8	3,9	0,6	1,2	100,0	
Mujeres Total		CAPV	N	738.893	152.077	45.348	20.399	19.166	975.882
			%	75,7	15,6	4,6	2,1	2,0	100,0
		Araba	N	113.507	12.425	5.192	2.222	3.426	136.772
			%	83,0	9,1	3,8	1,6	2,5	100,0
	Gipuzkoa	N	243.826	47.073	13.260	5.453	3.073	312.686	
		%	78,0	15,1	4,2	1,7	1,0	100,0	
	Bizkaia	N	381.561	92.579	26.895	12.724	12.667	526.425	
		%	72,5	17,6	5,1	2,4	2,4	100,0	
	15-24	CAPV	N	64.612	16.335	5.294	2.595	663	89.499
			%	72,2	18,3	5,9	2,9	0,7	100,0
		Araba	N	9.909	1.532	1.259	363	147	13.210
			%	75,0	11,6	9,5	2,7	1,1	100,0
Gipuzkoa		N	21.930	4.909	1.238	1.184	182	29.443	
		%	74,5	16,7	4,2	4,0	0,6	100,0	
Bizkaia	N	32.772	9.894	2.797	1.048	334	46.846		
	%	70,0	21,1	6,0	2,2	0,7	100,0		
25-44	CAPV	N	222.694	62.912	21.761	7.353	6.106	320.826	
		%	69,4	19,6	6,8	2,3	1,9	100,0	
	Araba	N	37.796	5.227	1.980	1.164	1.703	47.869	
		%	79,0	10,9	4,1	2,4	3,6	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 215. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	73.114	20.022	6.375	1.578	817	101.905	
			%	71,7	19,6	6,3	1,5	0,8	100,0	
		Bizkaia	N	111.784	37.663	13.407	4.611	3.587	171.052	
	%		65,4	22,0	7,8	2,7	2,1	100,0		
		45-64	CAPV	N	240.481	46.783	12.375	6.762	7.368	313.769
	%			76,6	14,9	3,9	2,2	2,3	100,0	
		Araba	N	37.184	3.825	1.603	526	1.126	44.263	
	%		84,0	8,6	3,6	1,2	2,5	100,0		
		Gipuzkoa	N	77.963	15.249	4.050	1.334	1.066	99.662	
	%		78,2	15,3	4,1	1,3	1,1	100,0		
		Bizkaia	N	125.334	27.709	6.722	4.902	5.176	169.843	
	%		73,8	16,3	4,0	2,9	3,0	100,0		
		65-74	CAPV	N	90.140	13.695	2.682	1.148	2.260	109.925
	%			82,0	12,5	2,4	1,0	2,1	100,0	
		Araba	N	13.197	954	85	.	85	14.320	
	%		92,2	6,7	0,6	.	0,6	100,0		
		Gipuzkoa	N	30.342	3.517	651	864	747	36.120	
	%		84,0	9,7	1,8	2,4	2,1	100,0		
		Bizkaia	N	46.602	9.223	1.947	284	1.429	59.484	
	%		78,3	15,5	3,3	0,5	2,4	100,0		
		>=75	CAPV	N	120.966	12.353	3.236	2.541	2.768	141.864
	%			85,3	8,7	2,3	1,8	2,0	100,0	
		Araba	N	15.420	887	266	169	367	17.110	
	%		90,1	5,2	1,6	1,0	2,1	100,0		
	Gipuzkoa	N	40.477	3.376	947	493	261	45.555		
%		88,9	7,4	2,1	1,1	0,6	100,0			
	Bizkaia	N	65.069	8.090	2.022	1.878	2.141	79.200		
%		82,2	10,2	2,6	2,4	2,7	100,0			
Ambos	Total	CAPV	N	1.453.033	295.661	79.506	34.159	28.647	1.891.006	
			%	76,8	15,6	4,2	1,8	1,5	100,0	
		Araba	N	225.144	26.583	10.672	3.532	4.591	270.523	
	%		83,2	9,8	3,9	1,3	1,7	100,0		
		Gipuzkoa	N	477.144	90.658	20.349	12.080	6.265	606.497	
	%		78,7	14,9	3,4	2,0	1,0	100,0		
		Bizkaia	N	750.745	178.420	48.484	18.547	17.790	1.013.987	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 215. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	Total	Bizkaia	%	74,0	17,6	4,8	1,8	1,8	100,0
	15-24	CAPV	N	129.940	37.271	9.939	4.927	1.880	183.958
			%	70,6	20,3	5,4	2,7	1,0	100,0
		Araba	N	22.158	3.788	1.405	363	366	28.079
			%	78,9	13,5	5,0	1,3	1,3	100,0
		Gipuzkoa	N	44.502	9.845	2.514	3.170	718	60.748
			%	73,3	16,2	4,1	5,2	1,2	100,0
		Bizkaia	N	63.279	23.638	6.021	1.395	797	95.130
			%	66,5	24,8	6,3	1,5	0,8	100,0
	25-44	CAPV	N	473.743	123.422	36.251	14.806	8.913	657.135
			%	72,1	18,8	5,5	2,3	1,4	100,0
		Araba	N	78.528	12.298	5.369	1.810	1.926	99.930
			%	78,6	12,3	5,4	1,8	1,9	100,0
		Gipuzkoa	N	154.526	39.059	9.595	4.083	1.432	208.695
			%	74,0	18,7	4,6	2,0	0,7	100,0
		Bizkaia	N	240.690	72.065	21.287	8.913	5.554	348.509
			%	69,1	20,7	6,1	2,6	1,6	100,0
	45-64	CAPV	N	484.341	89.794	21.921	8.763	11.604	616.424
			%	78,6	14,6	3,6	1,4	1,9	100,0
		Araba	N	73.219	8.001	3.169	1.020	1.606	87.015
			%	84,1	9,2	3,6	1,2	1,8	100,0
		Gipuzkoa	N	158.278	27.614	5.808	2.536	2.846	197.081
			%	80,3	14,0	2,9	1,3	1,4	100,0
		Bizkaia	N	252.845	54.180	12.944	5.207	7.153	332.328
			%	76,1	16,3	3,9	1,6	2,2	100,0
	65-74	CAPV	N	169.786	25.354	5.703	2.149	2.666	205.658
			%	82,6	12,3	2,8	1,0	1,3	100,0
		Araba	N	25.853	1.393	153	.	85	27.483
			%	94,1	5,1	0,6	.	0,3	100,0
		Gipuzkoa	N	57.392	7.311	1.245	1.294	1.009	68.251
			%	84,1	10,7	1,8	1,9	1,5	100,0
		Bizkaia	N	86.542	16.650	4.304	855	1.573	109.924
			%	78,7	15,1	3,9	0,8	1,4	100,0
	>=75	CAPV	N	195.222	19.821	5.692	3.513	3.584	227.832
			%	85,7	8,7	2,5	1,5	1,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 215. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	Araba	N	25.387	1.103	577	339	609	28.015
			%	90,6	3,9	2,1	1,2	2,2	100,0
	Gipuzkoa	N	62.446	6.830	1.188	997	261	71.723	
		%	87,1	9,5	1,7	1,4	0,4	100,0	
	Bizkaia	N	107.389	11.887	3.928	2.177	2.714	128.094	
		%	83,8	9,3	3,1	1,7	2,1	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 216. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	Total	Total	N	A diario					
			N	712.879	143.585	34.158	13.761	9.481	913.863
			%	78,0	15,7	3,7	1,5	1,0	100,0
	I		N	86.021	21.140	3.314	2.129	1.085	113.690
			%	75,7	18,6	2,9	1,9	1,0	100,0
	II		N	57.406	15.667	3.126	631	1.375	78.206
			%	73,4	20,0	4,0	0,8	1,8	100,0
	III		N	149.747	27.167	6.819	2.481	2.142	188.355
			%	79,5	14,4	3,6	1,3	1,1	100,0
	IV		N	352.505	66.940	19.033	7.851	3.976	450.306
			%	78,3	14,9	4,2	1,7	0,9	100,0
	V		N	67.201	12.670	1.865	669	903	83.307
			%	80,7	15,2	2,2	0,8	1,1	100,0
	15-24 Total		N	64.770	20.935	4.645	2.333	1.217	93.900
			%	69,0	22,3	4,9	2,5	1,3	100,0
	I		N	11.258	3.376	.	.	.	14.634
			%	76,9	23,1	.	.	.	100,0
	II		N	6.956	3.062	507	.	463	10.988
			%	63,3	27,9	4,6	.	4,2	100,0
	III		N	11.837	3.091	1.190	442	270	16.830
			%	70,3	18,4	7,1	2,6	1,6	100,0
	IV		N	29.269	8.757	2.948	1.544	219	42.737
			%	68,5	20,5	6,9	3,6	0,5	100,0
	V		N	5.449	2.649	.	347	265	8.711
			%	62,6	30,4	.	4,0	3,0	100,0
	25-44 Total		N	251.049	60.510	14.490	7.453	2.807	336.309
			%	74,6	18,0	4,3	2,2	0,8	100,0
	I		N	31.802	9.424	859	1.647	.	43.732
			%	72,7	21,5	2,0	3,8	.	100,0
	II		N	24.023	7.045	725	289	415	32.496
			%	73,9	21,7	2,2	0,9	1,3	100,0
	III		N	46.893	9.508	3.618	1.363	875	62.257
			%	75,3	15,3	5,8	2,2	1,4	100,0
	IV		N	118.401	27.452	8.868	4.155	1.517	160.392
			%	73,8	17,1	5,5	2,6	0,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 216. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres 25-44 V	N		29.930	7.082	420	.	.	37.432
	%		80,0	18,9	1,1	.	.	100,0
45-64 Total	N		243.573	43.012	9.546	2.001	4.236	302.368
	%		80,6	14,2	3,2	0,7	1,4	100,0
I	N		29.063	5.784	1.898	338	824	37.907
	%		76,7	15,3	5,0	0,9	2,2	100,0
II	N		18.351	3.197	1.387	129	355	23.419
	%		78,4	13,7	5,9	0,6	1,5	100,0
III	N		53.969	10.032	1.128	345	849	66.322
	%		81,4	15,1	1,7	0,5	1,3	100,0
IV	N		122.236	21.726	4.213	867	1.572	150.614
	%		81,2	14,4	2,8	0,6	1,0	100,0
V	N		19.954	2.273	920	322	637	24.106
	%		82,8	9,4	3,8	1,3	2,6	100,0
65-74 Total	N		79.646	11.659	3.021	1.002	405	95.733
	%		83,2	12,2	3,2	1,0	0,4	100,0
I	N		10.719	2.268	361	144	261	13.753
	%		77,9	16,5	2,6	1,0	1,9	100,0
II	N		4.502	1.757	390	213	.	6.862
	%		65,6	25,6	5,7	3,1	.	100,0
III	N		19.175	2.234	368	.	.	21.777
	%		88,1	10,3	1,7	.	.	100,0
IV	N		40.611	4.976	1.377	645	144	47.753
	%		85,0	10,4	2,9	1,4	0,3	100,0
V	N		4.639	424	526	.	.	5.588
	%		83,0	7,6	9,4	.	.	100,0
>=75 Total	N		73.841	7.468	2.456	972	815	85.553
	%		86,3	8,7	2,9	1,1	1,0	100,0
I	N		3.179	288	196	.	.	3.663
	%		86,8	7,9	5,3	.	.	100,0
II	N		3.573	606	118	.	142	4.440
	%		80,5	13,7	2,7	.	3,2	100,0
III	N		17.873	2.302	515	331	148	21.169
	%		84,4	10,9	2,4	1,6	0,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 216. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres >=75	IV	N	41.988	4.029	1.627	641	525	48.810
		%	86,0	8,3	3,3	1,3	1,1	100,0
	V	N	7.228	242	.	.	.	7.470
		%	96,8	3,2	.	.	.	100,0
Mujeres Total	Total	N	736.604	152.077	45.247	20.399	19.166	973.492
		%	75,7	15,6	4,6	2,1	2,0	100,0
	I	N	78.545	17.906	3.343	2.607	2.437	104.838
		%	74,9	17,1	3,2	2,5	2,3	100,0
	II	N	68.555	17.935	5.001	1.975	1.562	95.028
		%	72,1	18,9	5,3	2,1	1,6	100,0
	III	N	184.244	36.073	13.711	3.879	4.199	242.107
		%	76,1	14,9	5,7	1,6	1,7	100,0
	IV	N	278.113	53.345	14.171	8.325	6.488	360.441
		%	77,2	14,8	3,9	2,3	1,8	100,0
	V	N	127.146	26.817	9.021	3.613	4.480	171.077
		%	74,3	15,7	5,3	2,1	2,6	100,0
15-24	Total	N	63.646	16.335	5.294	2.595	663	88.533
		%	71,9	18,5	6,0	2,9	0,7	100,0
	I	N	10.532	3.280	750	.	.	14.562
		%	72,3	22,5	5,1	.	.	100,0
	II	N	11.184	1.744	232	336	.	13.497
		%	82,9	12,9	1,7	2,5	.	100,0
	III	N	13.580	3.538	2.481	471	.	20.069
		%	67,7	17,6	12,4	2,3	.	100,0
	IV	N	23.114	6.025	1.063	1.230	182	31.614
		%	73,1	19,1	3,4	3,9	0,6	100,0
	V	N	5.236	1.748	769	558	481	8.792
		%	59,6	19,9	8,7	6,3	5,5	100,0
25-44	Total	N	222.199	62.912	21.761	7.353	6.106	320.330
		%	69,4	19,6	6,8	2,3	1,9	100,0
	I	N	33.487	7.297	1.528	1.372	1.402	45.086
		%	74,3	16,2	3,4	3,0	3,1	100,0
	II	N	25.947	6.797	2.915	1.249	314	37.223
		%	69,7	18,3	7,8	3,4	0,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 216. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	57.038	16.301	6.448	1.048	1.196	82.029
			%	69,5	19,9	7,9	1,3	1,5	100,0
		IV	N	77.087	20.842	7.248	2.757	2.791	110.725
			%	69,6	18,8	6,5	2,5	2,5	100,0
		V	N	28.640	11.674	3.622	927	404	45.267
			%	63,3	25,8	8,0	2,0	0,9	100,0
	45-64	Total	N	240.310	46.783	12.375	6.762	7.368	313.598
			%	76,6	14,9	3,9	2,2	2,3	100,0
	I	N	24.242	5.508	707	977	682	32.116	
		%	75,5	17,2	2,2	3,0	2,1	100,0	
	II	N	19.596	4.611	1.129	294	1.163	26.792	
		%	73,1	17,2	4,2	1,1	4,3	100,0	
	III	N	69.978	12.092	2.990	2.062	1.519	88.641	
		%	78,9	13,6	3,4	2,3	1,7	100,0	
	IV	N	80.141	15.526	4.129	2.429	1.876	104.102	
		%	77,0	14,9	4,0	2,3	1,8	100,0	
	V	N	46.353	9.045	3.419	1.000	2.128	61.946	
		%	74,8	14,6	5,5	1,6	3,4	100,0	
	65-74	Total	N	89.985	13.695	2.682	1.148	2.260	109.770
			%	82,0	12,5	2,4	1,0	2,1	100,0
	I	N	5.100	1.130	358	258	353	7.199	
		%	70,8	15,7	5,0	3,6	4,9	100,0	
	II	N	5.045	1.809	286	.	85	7.225	
		%	69,8	25,0	4,0	.	1,2	100,0	
III	N	19.159	2.358	646	.	736	22.899		
	%	83,7	10,3	2,8	.	3,2	100,0		
IV	N	41.081	6.633	957	750	713	50.134		
	%	81,9	13,2	1,9	1,5	1,4	100,0		
V	N	19.599	1.765	434	140	374	22.312		
	%	87,8	7,9	1,9	0,6	1,7	100,0		
>=75	Total	N	120.464	12.353	3.135	2.541	2.768	141.261	
		%	85,3	8,7	2,2	1,8	2,0	100,0	
I	N	5.184	691	.	.	.	5.875		
	%	88,2	11,8	.	.	.	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 216. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	>=75	II	N	6.783	2.974	439	95	.	10.292	
			%	65,9	28,9	4,3	0,9	.	100,0	
		III	N	24.489	1.786	1.146	299	749	28.468	
			%	86,0	6,3	4,0	1,0	2,6	100,0	
		IV	N	56.690	4.318	773	1.159	927	63.866	
			%	88,8	6,8	1,2	1,8	1,5	100,0	
		V	N	27.318	2.585	777	988	1.093	32.760	
			%	83,4	7,9	2,4	3,0	3,3	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	1.449.483	295.661	79.405	34.159	28.647	1.887.356
				%	76,8	15,7	4,2	1,8	1,5	100,0
	I	N	164.567	39.047	6.657	4.736	3.522	218.528		
		%	75,3	17,9	3,0	2,2	1,6	100,0		
	II	N	125.961	33.602	8.127	2.606	2.937	173.234		
		%	72,7	19,4	4,7	1,5	1,7	100,0		
	III	N	333.991	63.240	20.530	6.360	6.341	430.462		
		%	77,6	14,7	4,8	1,5	1,5	100,0		
	IV	N	630.618	120.285	33.204	16.176	10.464	810.747		
		%	77,8	14,8	4,1	2,0	1,3	100,0		
	V	N	194.347	39.488	10.886	4.282	5.383	254.385		
		%	76,4	15,5	4,3	1,7	2,1	100,0		
15-24	Total	N	128.416	37.271	9.939	4.927	1.880	182.434		
		%	70,4	20,4	5,4	2,7	1,0	100,0		
	I	N	21.790	6.656	750	.	.	29.196		
		%	74,6	22,8	2,6	.	.	100,0		
	II	N	18.140	4.806	739	336	463	24.485		
		%	74,1	19,6	3,0	1,4	1,9	100,0		
	III	N	25.417	6.629	3.671	913	270	36.900		
		%	68,9	18,0	9,9	2,5	0,7	100,0		
	IV	N	52.383	14.782	4.011	2.774	401	74.351		
		%	70,5	19,9	5,4	3,7	0,5	100,0		
	V	N	10.686	4.397	769	905	747	17.503		
		%	61,1	25,1	4,4	5,2	4,3	100,0		
25-44	Total	N	473.248	123.422	36.251	14.806	8.913	656.640		
		%	72,1	18,8	5,5	2,3	1,4	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 216. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	25-44	I	N	65.289	16.721	2.388	3.019	1.402	88.818
			%	73,5	18,8	2,7	3,4	1,6	100,0
		II	N	49.970	13.842	3.640	1.538	730	69.719
			%	71,7	19,9	5,2	2,2	1,0	100,0
		III	N	103.931	25.809	10.066	2.410	2.071	144.286
			%	72,0	17,9	7,0	1,7	1,4	100,0
		IV	N	195.489	48.294	16.116	6.912	4.307	271.117
			%	72,1	17,8	5,9	2,5	1,6	100,0
		V	N	58.570	18.756	4.042	927	404	82.699
			%	70,8	22,7	4,9	1,1	0,5	100,0
45-64 Total			N	483.883	89.794	21.921	8.763	11.604	615.965
			%	78,6	14,6	3,6	1,4	1,9	100,0
		I	N	53.305	11.292	2.605	1.315	1.505	70.023
			%	76,1	16,1	3,7	1,9	2,1	100,0
		II	N	37.947	7.808	2.516	423	1.518	50.212
			%	75,6	15,5	5,0	0,8	3,0	100,0
		III	N	123.946	22.124	4.118	2.407	2.367	154.963
			%	80,0	14,3	2,7	1,6	1,5	100,0
		IV	N	202.378	37.252	8.343	3.295	3.448	254.716
			%	79,5	14,6	3,3	1,3	1,4	100,0
		V	N	66.307	11.318	4.339	1.322	2.766	86.052
			%	77,1	13,2	5,0	1,5	3,2	100,0
65-74 Total			N	169.631	25.354	5.703	2.149	2.666	205.503
			%	82,5	12,3	2,8	1,0	1,3	100,0
		I	N	15.819	3.398	719	401	615	20.952
			%	75,5	16,2	3,4	1,9	2,9	100,0
		II	N	9.547	3.566	676	213	85	14.087
			%	67,8	25,3	4,8	1,5	0,6	100,0
		III	N	38.335	4.591	1.014	.	736	44.676
			%	85,8	10,3	2,3	.	1,6	100,0
		IV	N	81.692	11.610	2.334	1.395	857	97.887
			%	83,5	11,9	2,4	1,4	0,9	100,0
		V	N	24.238	2.189	960	140	374	27.901
			%	86,9	7,8	3,4	0,5	1,3	100,0
>=75 Total			N	194.305	19.821	5.591	3.513	3.584	226.814

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 216. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	Total	%	85,7	8,7	2,5	1,5	1,6	100,0
		I	N	8.364	979	196	.	.	9.538
			%	87,7	10,3	2,1	.	.	100,0
		II	N	10.356	3.581	557	95	142	14.731
			%	70,3	24,3	3,8	0,6	1,0	100,0
		III	N	42.362	4.088	1.662	630	897	49.638
			%	85,3	8,2	3,3	1,3	1,8	100,0
		IV	N	98.677	8.346	2.401	1.800	1.452	112.676
			%	87,6	7,4	2,1	1,6	1,3	100,0
		V	N	34.546	2.827	777	988	1.093	40.231
			%	85,9	7,0	1,9	2,5	2,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

925

Tabla 217. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres Total	Total	N	714.140	143.585	34.158	13.761	9.481	915.124
		%	78,0	15,7	3,7	1,5	1,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	174.365	24.401	7.521	1.629	2.683	210.600
		%	82,8	11,6	3,6	0,8	1,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	134.564	24.077	6.047	1.323	1.443	167.454
		%	80,4	14,4	3,6	0,8	0,9	100,0
	Secundaria, superior	N	273.398	62.283	14.698	6.372	3.919	360.670
		%	75,8	17,3	4,1	1,8	1,1	100,0
	Terciaria	N	131.812	32.823	5.892	4.437	1.436	176.400
		%	74,7	18,6	3,3	2,5	0,8	100,0
15-24	Total	N	65.328	20.935	4.645	2.333	1.217	94.458
		%	69,2	22,2	4,9	2,5	1,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	6.654	2.109	889	.	265	9.918
		%	67,1	21,3	9,0	.	2,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	21.461	7.227	2.093	347	.	31.129
		%	68,9	23,2	6,7	1,1	.	100,0
	Secundaria, superior	N	29.932	8.989	1.663	1.986	270	42.840
		%	69,9	21,0	3,9	4,6	0,6	100,0
	Terciaria	N	7.280	2.610	.	.	681	10.572
		%	68,9	24,7	.	.	6,4	100,0
25-44	Total	N	251.049	60.510	14.490	7.453	2.807	336.309
		%	74,6	18,0	4,3	2,2	0,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	27.972	7.925	1.285	.	594	37.776
		%	74,0	21,0	3,4	.	1,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	41.411	8.892	1.945	237	323	52.808
		%	78,4	16,8	3,7	0,4	0,6	100,0
	Secundaria, superior	N	123.894	26.734	8.479	3.277	1.890	164.274
		%	75,4	16,3	5,2	2,0	1,2	100,0
	Terciaria	N	57.771	16.960	2.780	3.940	.	81.451
		%	70,9	20,8	3,4	4,8	.	100,0
45-64	Total	N	243.861	43.012	9.546	2.001	4.236	302.655
		%	80,6	14,2	3,2	0,7	1,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	60.766	6.124	1.920	558	1.032	70.400
		%	86,3	8,7	2,7	0,8	1,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

926

Tabla 217. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	44.101	6.325	1.415	427	977	53.244
			%	82,8	11,9	2,7	0,8	1,8	100,0
		Secundaria, superior	N	90.108	21.548	3.341	519	1.614	117.130
			%	76,9	18,4	2,9	0,4	1,4	100,0
		Terciaria	N	48.886	9.015	2.870	497	612	61.881
			%	79,0	14,6	4,6	0,8	1,0	100,0
	65-74	Total	N	79.646	11.659	3.021	1.002	405	95.733
			%	83,2	12,2	3,2	1,0	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	32.440	3.485	1.499	332	261	38.017
			%	85,3	9,2	3,9	0,9	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	14.574	1.027	379	311	.	16.291
			%	89,5	6,3	2,3	1,9	.	100,0
	Secundaria, superior	N	20.554	3.872	1.020	359	144	25.948	
		%	79,2	14,9	3,9	1,4	0,6	100,0	
	Terciaria	N	12.078	3.275	124	.	.	15.477	
		%	78,0	21,2	0,8	.	.	100,0	
	>=75	Total	N	74.256	7.468	2.456	972	815	85.968
			%	86,4	8,7	2,9	1,1	0,9	100,0
Sin estudios, primaria		N	46.532	4.758	1.928	740	530	54.489	
		%	85,4	8,7	3,5	1,4	1,0	100,0	
Secundaria, inferior		N	13.017	607	215	.	142	13.981	
		%	93,1	4,3	1,5	.	1,0	100,0	
Secundaria, superior	N	8.910	1.140	196	232	.	10.478		
	%	85,0	10,9	1,9	2,2	.	100,0		
Terciaria	N	5.797	963	118	.	142	7.020		
	%	82,6	13,7	1,7	.	2,0	100,0		
Mujeres	Total	N	738.893	152.077	45.348	20.399	19.166	975.882	
		%	75,7	15,6	4,6	2,1	2,0	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	229.902	30.395	9.642	3.954	4.434	278.327	
		%	82,6	10,9	3,5	1,4	1,6	100,0	
	Secundaria, inferior	N	133.841	23.294	5.815	3.765	3.051	169.766	
		%	78,8	13,7	3,4	2,2	1,8	100,0	
	Secundaria, superior	N	219.126	58.521	17.143	6.858	6.218	307.866	
		%	71,2	19,0	5,6	2,2	2,0	100,0	
	Terciaria	N	156.025	39.866	12.747	5.821	5.464	219.923	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

927

Tabla 217. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	%	70,9	18,1	5,8	2,6	2,5	100,0
	15-24	Total	N	64.612	16.335	5.294	2.595	663	89.499
			%	72,2	18,3	5,9	2,9	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.447	2.007	932	.	.	11.386
			%	74,2	17,6	8,2	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.470	1.572	686	700	334	16.763
			%	80,4	9,4	4,1	4,2	2,0	100,0
		Secundaria, superior	N	31.261	9.131	2.975	1.895	182	45.443
			%	68,8	20,1	6,5	4,2	0,4	100,0
		Terciaria	N	11.433	3.626	701	.	147	15.907
			%	71,9	22,8	4,4	.	0,9	100,0
	25-44	Total	N	222.694	62.912	21.761	7.353	6.106	320.826
			%	69,4	19,6	6,8	2,3	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	19.924	3.818	1.846	401	.	25.990
			%	76,7	14,7	7,1	1,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	27.171	8.436	1.802	883	645	38.937
			%	69,8	21,7	4,6	2,3	1,7	100,0
		Secundaria, superior	N	89.480	27.947	8.170	2.830	2.060	130.487
			%	68,6	21,4	6,3	2,2	1,6	100,0
		Terciaria	N	86.120	22.711	9.943	3.238	3.400	125.412
			%	68,7	18,1	7,9	2,6	2,7	100,0
	45-64	Total	N	240.481	46.783	12.375	6.762	7.368	313.769
			%	76,6	14,9	3,9	2,2	2,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	62.026	9.909	3.629	992	1.407	77.963
			%	79,6	12,7	4,7	1,3	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	49.081	8.500	1.652	1.312	1.189	61.735
			%	79,5	13,8	2,7	2,1	1,9	100,0
		Secundaria, superior	N	82.178	17.622	5.533	2.134	2.855	110.322
			%	74,5	16,0	5,0	1,9	2,6	100,0
		Terciaria	N	47.195	10.751	1.560	2.325	1.917	63.749
			%	74,0	16,9	2,4	3,6	3,0	100,0
	65-74	Total	N	90.140	13.695	2.682	1.148	2.260	109.925
			%	82,0	12,5	2,4	1,0	2,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	52.086	7.317	799	514	1.136	61.852
			%	84,2	11,8	1,3	0,8	1,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

928

Tabla 217. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	65-74	Secundaria, inferior	N	22.695	2.581	1.029	376	771	27.452	
			%	82,7	9,4	3,7	1,4	2,8	100,0	
		Secundaria, superior	N	9.086	1.988	466	.	353	11.893	
			%	76,4	16,7	3,9	.	3,0	100,0	
		Terciaria	N	6.274	1.807	388	258	.	8.727	
			%	71,9	20,7	4,4	3,0	.	100,0	
	>=75	Total	N	120.966	12.353	3.236	2.541	2.768	141.864	
			%	85,3	8,7	2,3	1,8	2,0	100,0	
	>=75	Sin estudios, primaria	N	87.419	7.344	2.435	2.048	1.890	101.136	
			%	86,4	7,3	2,4	2,0	1,9	100,0	
		Secundaria, inferior	N	21.423	2.205	646	493	112	24.879	
			%	86,1	8,9	2,6	2,0	0,4	100,0	
		Secundaria, superior	N	7.121	1.833	.	.	766	9.720	
			%	73,3	18,9	.	.	7,9	100,0	
	Terciaria	N	5.003	971	155	.	.	6.129		
		%	81,6	15,8	2,5	.	.	100,0		
	Ambos	Total	Total	N	1.453.033	295.661	79.506	34.159	28.647	1.891.006
				%	76,8	15,6	4,2	1,8	1,5	100,0
Sin estudios, primaria		N	404.266	54.796	17.163	5.584	7.117	488.927		
		%	82,7	11,2	3,5	1,1	1,5	100,0		
Secundaria, inferior		N	268.405	47.372	11.862	5.088	4.493	337.220		
		%	79,6	14,0	3,5	1,5	1,3	100,0		
Secundaria, superior		N	492.524	120.804	31.841	13.230	10.136	668.536		
		%	73,7	18,1	4,8	2,0	1,5	100,0		
Terciaria		N	287.837	72.689	18.639	10.258	6.900	396.323		
		%	72,6	18,3	4,7	2,6	1,7	100,0		
15-24		Total	N	129.940	37.271	9.939	4.927	1.880	183.958	
			%	70,6	20,3	5,4	2,7	1,0	100,0	
15-24		Sin estudios, primaria	N	15.101	4.116	1.821	.	265	21.304	
			%	70,9	19,3	8,5	.	1,2	100,0	
15-24		Secundaria, inferior	N	34.932	8.799	2.779	1.047	334	47.891	
			%	72,9	18,4	5,8	2,2	0,7	100,0	
15-24		Secundaria, superior	N	61.193	18.120	4.638	3.880	452	88.283	
			%	69,3	20,5	5,3	4,4	0,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 217. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	15-24	Terciaria	N	18.713	6.236	701	.	828	26.479
			%	70,7	23,6	2,6	.	3,1	100,0
	25-44	Total	N	473.743	123.422	36.251	14.806	8.913	657.135
			%	72,1	18,8	5,5	2,3	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	47.896	11.742	3.132	401	594	63.765
			%	75,1	18,4	4,9	0,6	0,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	68.583	17.327	3.747	1.120	968	91.745
			%	74,8	18,9	4,1	1,2	1,1	100,0
		Secundaria, superior	N	213.374	54.682	16.649	6.106	3.950	294.762
			%	72,4	18,6	5,6	2,1	1,3	100,0
		Terciaria	N	143.891	39.671	12.723	7.178	3.400	206.862
			%	69,6	19,2	6,2	3,5	1,6	100,0
	45-64	Total	N	484.341	89.794	21.921	8.763	11.604	616.424
				%	78,6	14,6	3,6	1,4	1,9
		Sin estudios, primaria	N	122.792	16.034	5.549	1.549	2.439	148.363
			%	82,8	10,8	3,7	1,0	1,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	93.182	14.825	3.067	1.739	2.166	114.979
			%	81,0	12,9	2,7	1,5	1,9	100,0
		Secundaria, superior	N	172.286	39.170	8.874	2.653	4.470	227.452
			%	75,7	17,2	3,9	1,2	2,0	100,0
		Terciaria	N	96.082	19.766	4.431	2.822	2.529	125.630
			%	76,5	15,7	3,5	2,2	2,0	100,0
	65-74	Total	N	169.786	25.354	5.703	2.149	2.666	205.658
				%	82,6	12,3	2,8	1,0	1,3
		Sin estudios, primaria	N	84.526	10.802	2.298	845	1.398	99.869
			%	84,6	10,8	2,3	0,8	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	37.269	3.608	1.408	688	771	43.744
			%	85,2	8,2	3,2	1,6	1,8	100,0
		Secundaria, superior	N	29.640	5.860	1.485	359	497	37.841
			%	78,3	15,5	3,9	0,9	1,3	100,0
		Terciaria	N	18.352	5.083	512	258	.	24.204
			%	75,8	21,0	2,1	1,1	.	100,0
	>=75	Total	N	195.222	19.821	5.692	3.513	3.584	227.832
				%	85,7	8,7	2,5	1,5	1,6

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 217. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	Sin estudios, primaria	N	133.952	12.102	4.363	2.788	2.421	155.625
			%	86,1	7,8	2,8	1,8	1,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	34.440	2.812	861	493	254	38.860	
		%	88,6	7,2	2,2	1,3	0,7	100,0	
	Secundaria, superior	N	16.031	2.973	196	232	766	20.198	
		%	79,4	14,7	1,0	1,1	3,8	100,0	
	Terciaria	N	10.799	1.934	273	.	142	13.149	
		%	82,1	14,7	2,1	.	1,1	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 218. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	191.566	366.433	248.064	80.965	28.096	915.124
			%	20,9	40,0	27,1	8,8	3,1	100,0
		Araba	N	25.761	48.177	41.730	15.318	2.764	133.751
			%	19,3	36,0	31,2	11,5	2,1	100,0
		Gipuzkoa	N	74.605	130.776	72.188	12.726	3.517	293.812
			%	25,4	44,5	24,6	4,3	1,2	100,0
		Bizkaia	N	91.200	187.481	134.145	52.921	21.815	487.561
			%	18,7	38,5	27,5	10,9	4,5	100,0
	15-24	CAPV	N	12.271	32.556	30.291	13.994	5.347	94.458
			%	13,0	34,5	32,1	14,8	5,7	100,0
		Araba	N	1.222	3.268	6.585	3.549	245	14.869
			%	8,2	22,0	44,3	23,9	1,7	100,0
		Gipuzkoa	N	6.368	13.398	9.024	1.514	1.001	31.305
			%	20,3	42,8	28,8	4,8	3,2	100,0
		Bizkaia	N	4.682	15.890	14.681	8.931	4.101	48.284
			%	9,7	32,9	30,4	18,5	8,5	100,0
	25-44	CAPV	N	52.454	130.430	100.994	37.611	14.821	336.309
			%	15,6	38,8	30,0	11,2	4,4	100,0
		Araba	N	5.930	18.088	18.659	8.009	1.377	52.062
			%	11,4	34,7	35,8	15,4	2,6	100,0
		Gipuzkoa	N	19.185	46.643	33.276	6.254	1.431	106.790
			%	18,0	43,7	31,2	5,9	1,3	100,0
		Bizkaia	N	27.339	65.699	49.059	23.347	12.013	177.458
			%	15,4	37,0	27,6	13,2	6,8	100,0
	45-64	CAPV	N	62.617	127.244	83.416	23.395	5.983	302.655
			%	20,7	42,0	27,6	7,7	2,0	100,0
		Araba	N	9.183	16.935	12.629	3.009	996	42.751
			%	21,5	39,6	29,5	7,0	2,3	100,0
		Gipuzkoa	N	26.098	45.224	21.671	3.675	752	97.419
			%	26,8	46,4	22,2	3,8	0,8	100,0
		Bizkaia	N	27.336	65.085	49.117	16.711	4.236	162.485
			%	16,8	40,1	30,2	10,3	2,6	100,0
	65-74	CAPV	N	31.046	41.025	19.718	3.438	506	95.733
			%	32,4	42,9	20,6	3,6	0,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 218. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres 65-74	Araba	N	5.124	5.241	2.505	147	147	13.163	
		%	38,9	39,8	19,0	1,1	1,1	100,0	
	Gipuzkoa	N	11.316	14.841	4.802	948	223	32.130	
		%	35,2	46,2	14,9	3,0	0,7	100,0	
	Bizkaia	N	14.606	20.943	12.411	2.343	137	50.440	
		%	29,0	41,5	24,6	4,6	0,3	100,0	
	>=75	CAPV	N	33.178	35.179	13.645	2.527	1.439	85.968
			%	38,6	40,9	15,9	2,9	1,7	100,0
		Araba	N	4.303	4.645	1.352	605	.	10.905
			%	39,5	42,6	12,4	5,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	11.638	10.670	3.415	335	110	26.168
			%	44,5	40,8	13,1	1,3	0,4	100,0
Bizkaia		N	17.237	19.865	8.878	1.588	1.328	48.895	
		%	35,3	40,6	18,2	3,2	2,7	100,0	
Mujeres		Total CAPV	N	316.465	391.526	204.278	49.632	13.982	975.882
			%	32,4	40,1	20,9	5,1	1,4	100,0
		Araba	N	40.496	55.803	31.075	8.293	1.104	136.772
			%	29,6	40,8	22,7	6,1	0,8	100,0
	Gipuzkoa	N	118.213	130.407	53.075	8.269	2.721	312.686	
		%	37,8	41,7	17,0	2,6	0,9	100,0	
	Bizkaia	N	157.755	205.315	120.128	33.070	10.157	526.425	
		%	30,0	39,0	22,8	6,3	1,9	100,0	
	15-24	CAPV	N	20.687	31.253	24.546	9.373	3.641	89.499
			%	23,1	34,9	27,4	10,5	4,1	100,0
		Araba	N	2.798	4.529	4.929	790	163	13.210
			%	21,2	34,3	37,3	6,0	1,2	100,0
Gipuzkoa		N	8.511	12.360	7.449	1.123	.	29.443	
		%	28,9	42,0	25,3	3,8	.	100,0	
Bizkaia	N	9.377	14.364	12.169	7.459	3.477	46.846		
	%	20,0	30,7	26,0	15,9	7,4	100,0		
25-44	CAPV	N	86.489	127.324	79.020	21.394	6.599	320.826	
		%	27,0	39,7	24,6	6,7	2,1	100,0	
	Araba	N	9.537	18.364	14.272	4.755	941	47.869	
		%	19,9	38,4	29,8	9,9	2,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 218. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	35.928	42.467	18.103	3.606	1.801	101.905	
			%	35,3	41,7	17,8	3,5	1,8	100,0	
		Bizkaia	N	41.025	66.493	46.644	13.033	3.856	171.052	
	%		24,0	38,9	27,3	7,6	2,3	100,0		
		45-64	CAPV	N	108.421	131.073	59.607	12.693	1.974	313.769
	%			34,6	41,8	19,0	4,0	0,6	100,0	
		Araba	N	14.515	18.961	8.624	2.164	.	44.263	
	%		32,8	42,8	19,5	4,9	.	100,0		
		Gipuzkoa	N	36.889	42.790	17.179	2.260	544	99.662	
	%		37,0	42,9	17,2	2,3	0,5	100,0		
		Bizkaia	N	57.016	69.323	33.804	8.270	1.430	169.843	
	%		33,6	40,8	19,9	4,9	0,8	100,0		
		65-74	CAPV	N	40.247	48.383	17.518	2.947	830	109.925
	%			36,6	44,0	15,9	2,7	0,8	100,0	
		Araba	N	6.088	6.734	1.311	187	.	14.320	
	%		42,5	47,0	9,2	1,3	.	100,0		
		Gipuzkoa	N	15.506	16.015	4.080	520	.	36.120	
	%		42,9	44,3	11,3	1,4	.	100,0		
		Bizkaia	N	18.653	25.635	12.127	2.240	830	59.484	
	%		31,4	43,1	20,4	3,8	1,4	100,0		
		>=75	CAPV	N	60.621	53.492	23.586	3.225	939	141.864
	%			42,7	37,7	16,6	2,3	0,7	100,0	
		Araba	N	7.558	7.216	1.939	396	.	17.110	
	%		44,2	42,2	11,3	2,3	.	100,0		
	Gipuzkoa	N	21.379	16.776	6.264	761	376	45.555		
%		46,9	36,8	13,7	1,7	0,8	100,0			
	Bizkaia	N	31.684	29.501	15.383	2.068	564	79.200		
%		40,0	37,2	19,4	2,6	0,7	100,0			
Ambos	Total	CAPV	N	508.031	757.959	452.341	130.596	42.078	1.891.006	
			%	26,9	40,1	23,9	6,9	2,2	100,0	
		Araba	N	66.258	103.980	72.805	23.611	3.869	270.523	
			%	24,5	38,4	26,9	8,7	1,4	100,0	
		Gipuzkoa	N	192.819	261.183	125.263	20.995	6.237	606.497	
			%	31,8	43,1	20,7	3,5	1,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 218. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	Total	Bizkaia	N 248.955	392.796	254.273	85.991	31.972	1.013.987
			% 24,6	38,7	25,1	8,5	3,2	100,0
	15-24	CAPV	N 32.958	63.808	54.837	23.366	8.988	183.958
			% 17,9	34,7	29,8	12,7	4,9	100,0
		Araba	N 4.020	7.797	11.514	4.339	409	28.079
			% 14,3	27,8	41,0	15,5	1,5	100,0
		Gipuzkoa	N 14.879	25.758	16.474	2.637	1.001	60.748
			% 24,5	42,4	27,1	4,3	1,6	100,0
		Bizkaia	N 14.059	30.253	26.850	16.390	7.578	95.130
			% 14,8	31,8	28,2	17,2	8,0	100,0
	25-44	CAPV	N 138.943	257.755	180.013	59.004	21.419	657.135
			% 21,1	39,2	27,4	9,0	3,3	100,0
		Araba	N 15.467	36.452	32.931	12.764	2.318	99.930
			% 15,5	36,5	33,0	12,8	2,3	100,0
		Gipuzkoa	N 55.113	89.110	51.379	9.860	3.232	208.695
			% 26,4	42,7	24,6	4,7	1,5	100,0
		Bizkaia	N 68.364	132.192	95.703	36.380	15.869	348.509
			% 19,6	37,9	27,5	10,4	4,6	100,0
	45-64	CAPV	N 171.038	258.317	143.024	36.088	7.957	616.424
			% 27,7	41,9	23,2	5,9	1,3	100,0
		Araba	N 23.698	35.895	21.253	5.173	996	87.015
			% 27,2	41,3	24,4	5,9	1,1	100,0
		Gipuzkoa	N 62.988	88.014	38.849	5.934	1.296	197.081
			% 32,0	44,7	19,7	3,0	0,7	100,0
		Bizkaia	N 84.353	134.407	82.921	24.981	5.666	332.328
			% 25,4	40,4	25,0	7,5	1,7	100,0
	65-74	CAPV	N 71.293	89.408	37.236	6.385	1.336	205.658
			% 34,7	43,5	18,1	3,1	0,6	100,0
		Araba	N 11.212	11.975	3.816	334	147	27.483
			% 40,8	43,6	13,9	1,2	0,5	100,0
		Gipuzkoa	N 26.822	30.856	8.882	1.468	223	68.251
			% 39,3	45,2	13,0	2,2	0,3	100,0
		Bizkaia	N 33.259	46.578	24.538	4.583	967	109.924
			% 30,3	42,4	22,3	4,2	0,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 218. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	CAPV	N	93.799	88.671	37.231	5.753	2.378	227.832
			%	41,2	38,9	16,3	2,5	1,0	100,0
		Araba	N	11.861	11.861	3.291	1.001	.	28.015
			%	42,3	42,3	11,7	3,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	33.017	27.445	9.679	1.096	486	71.723
			%	46,0	38,3	13,5	1,5	0,7	100,0
		Bizkaia	N	48.921	49.365	24.261	3.656	1.892	128.094
			%	38,2	38,5	18,9	2,9	1,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
		A diario							
Hombres	Total	Total	N	191.268	365.830	247.803	80.866	28.096	913.863
			%	20,9	40,0	27,1	8,8	3,1	100,0
	I	N		30.084	52.869	21.918	6.100	2.720	113.690
			%	26,5	46,5	19,3	5,4	2,4	100,0
	II	N		14.941	39.987	15.227	6.783	1.268	78.206
			%	19,1	51,1	19,5	8,7	1,6	100,0
	III	N		39.458	71.407	57.671	14.522	5.298	188.355
			%	20,9	37,9	30,6	7,7	2,8	100,0
	IV	N		89.530	175.750	129.888	41.834	13.304	450.306
			%	19,9	39,0	28,8	9,3	3,0	100,0
	V	N		17.256	25.818	23.100	11.627	5.507	83.307
			%	20,7	31,0	27,7	14,0	6,6	100,0
	15-24	Total	N	11.973	32.556	30.031	13.994	5.347	93.900
			%	12,8	34,7	32,0	14,9	5,7	100,0
	I	N		2.695	6.398	2.245	2.965	331	14.634
			%	18,4	43,7	15,3	20,3	2,3	100,0
	II	N		1.518	5.940	1.558	1.464	507	10.988
			%	13,8	54,1	14,2	13,3	4,6	100,0
	III	N		2.753	4.019	6.500	2.051	1.507	16.830
			%	16,4	23,9	38,6	12,2	9,0	100,0
	IV	N		3.337	15.145	15.902	5.353	3.001	42.737
			%	7,8	35,4	37,2	12,5	7,0	100,0
	V	N		1.670	1.053	3.827	2.161	.	8.711
			%	19,2	12,1	43,9	24,8	.	100,0
	25-44	Total	N	52.454	130.430	100.994	37.611	14.821	336.309
			%	15,6	38,8	30,0	11,2	4,4	100,0
	I	N		9.733	19.904	10.079	2.160	1.855	43.732
			%	22,3	45,5	23,0	4,9	4,2	100,0
	II	N		5.140	17.013	6.395	3.660	288	32.496
			%	15,8	52,4	19,7	11,3	0,9	100,0
	III	N		8.676	23.948	20.469	6.365	2.799	62.257
			%	13,9	38,5	32,9	10,2	4,5	100,0
	IV	N		22.459	58.868	53.563	19.647	5.855	160.392
			%	14,0	36,7	33,4	12,2	3,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	25-44	V	N	6.446	10.697	10.488	5.778	4.023	37.432
			%	17,2	28,6	28,0	15,4	10,7	100,0
	45-64	Total	N	62.617	127.055	83.416	23.296	5.983	302.368
			%	20,7	42,0	27,6	7,7	2,0	100,0
		I	N	11.044	18.123	7.233	974	533	37.907
			%	29,1	47,8	19,1	2,6	1,4	100,0
		II	N	5.965	10.599	5.538	981	336	23.419
			%	25,5	45,3	23,6	4,2	1,4	100,0
		III	N	12.118	27.469	21.216	4.746	772	66.322
			%	18,3	41,4	32,0	7,2	1,2	100,0
		IV	N	28.713	62.258	42.805	13.414	3.424	150.614
			%	19,1	41,3	28,4	8,9	2,3	100,0
		V	N	4.776	8.606	6.625	3.180	918	24.106
			%	19,8	35,7	27,5	13,2	3,8	100,0
	65-74	Total	N	31.046	41.025	19.718	3.438	506	95.733
			%	32,4	42,9	20,6	3,6	0,5	100,0
		I	N	4.682	6.967	2.103	.	.	13.753
			%	34,0	50,7	15,3	.	.	100,0
		II	N	1.061	4.140	847	677	137	6.862
			%	15,5	60,3	12,3	9,9	2,0	100,0
		III	N	7.108	8.082	5.881	639	67	21.777
			%	32,6	37,1	27,0	2,9	0,3	100,0
		IV	N	16.494	19.319	9.931	1.786	223	47.753
			%	34,5	40,5	20,8	3,7	0,5	100,0
		V	N	1.702	2.516	955	336	80	5.588
			%	30,5	45,0	17,1	6,0	1,4	100,0
	>=75	Total	N	33.178	34.764	13.645	2.527	1.439	85.553
			%	38,8	40,6	15,9	3,0	1,7	100,0
		I	N	1.929	1.476	258	.	.	3.663
			%	52,7	40,3	7,0	.	.	100,0
		II	N	1.257	2.294	888	.	.	4.440
			%	28,3	51,7	20,0	.	.	100,0
		III	N	8.803	7.889	3.606	721	151	21.169
			%	41,6	37,3	17,0	3,4	0,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres >=75	IV	N	18.527	20.161	7.687	1.634	801	48.810	
		%	38,0	41,3	15,7	3,3	1,6	100,0	
	V	N	2.661	2.945	1.206	172	486	7.470	
		%	35,6	39,4	16,1	2,3	6,5	100,0	
Mujeres	Total	Total N	315.611	391.076	203.652	49.171	13.982	973.492	
		%	32,4	40,2	20,9	5,1	1,4	100,0	
	I	N	43.183	36.681	19.289	4.691	994	104.838	
		%	41,2	35,0	18,4	4,5	0,9	100,0	
	II	N	31.930	41.618	17.601	2.473	1.407	95.028	
		%	33,6	43,8	18,5	2,6	1,5	100,0	
	III	N	75.713	98.190	54.027	12.200	1.977	242.107	
		%	31,3	40,6	22,3	5,0	0,8	100,0	
	IV	N	113.384	149.419	74.231	17.156	6.251	360.441	
		%	31,5	41,5	20,6	4,8	1,7	100,0	
	V	N	51.401	65.168	38.504	12.650	3.354	171.077	
		%	30,0	38,1	22,5	7,4	2,0	100,0	
	15-24	Total	N	20.687	31.003	24.291	8.912	3.641	88.533
			%	23,4	35,0	27,4	10,1	4,1	100,0
	I	N	5.329	4.224	3.780	980	249	14.562	
		%	36,6	29,0	26,0	6,7	1,7	100,0	
	II	N	3.015	5.881	3.804	543	254	13.497	
		%	22,3	43,6	28,2	4,0	1,9	100,0	
	III	N	3.941	8.119	4.768	2.795	446	20.069	
		%	19,6	40,5	23,8	13,9	2,2	100,0	
IV	N	6.787	10.561	9.285	2.957	2.023	31.614		
	%	21,5	33,4	29,4	9,4	6,4	100,0		
V	N	1.615	2.218	2.654	1.636	669	8.792		
	%	18,4	25,2	30,2	18,6	7,6	100,0		
25-44	Total	N	86.264	127.324	78.750	21.394	6.599	320.330	
		%	26,9	39,7	24,6	6,7	2,1	100,0	
I	N	18.822	13.867	9.162	2.490	745	45.086		
	%	41,7	30,8	20,3	5,5	1,7	100,0		
II	N	11.574	16.105	7.146	1.246	1.153	37.223		
	%	31,1	43,3	19,2	3,3	3,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	20.321	32.674	23.263	4.828	944	82.029
			%	24,8	39,8	28,4	5,9	1,2	100,0
		IV	N	25.158	47.987	27.064	7.898	2.618	110.725
			%	22,7	43,3	24,4	7,1	2,4	100,0
		V	N	10.390	16.692	12.115	4.931	1.139	45.267
			%	23,0	36,9	26,8	10,9	2,5	100,0
	45-64	Total	N	108.250	131.073	59.607	12.693	1.974	313.598
			%	34,5	41,8	19,0	4,0	0,6	100,0
	I	N	12.993	13.281	5.235	607	.	32.116	
		%	40,5	41,4	16,3	1,9	.	100,0	
	II	N	10.361	12.429	3.473	529	.	26.792	
		%	38,7	46,4	13,0	2,0	.	100,0	
	III	N	29.146	38.544	16.928	3.765	258	88.641	
		%	32,9	43,5	19,1	4,2	0,3	100,0	
	IV	N	33.894	44.762	20.128	4.422	896	104.102	
		%	32,6	43,0	19,3	4,2	0,9	100,0	
	V	N	21.856	22.057	13.844	3.369	820	61.946	
		%	35,3	35,6	22,3	5,4	1,3	100,0	
	65-74	Total	N	40.092	48.383	17.518	2.947	830	109.770
			%	36,5	44,1	16,0	2,7	0,8	100,0
	I	N	2.380	3.910	521	387	.	7.199	
		%	33,1	54,3	7,2	5,4	.	100,0	
	II	N	3.524	2.832	713	155	.	7.225	
		%	48,8	39,2	9,9	2,1	.	100,0	
III	N	8.866	8.749	4.769	356	159	22.899		
	%	38,7	38,2	20,8	1,6	0,7	100,0		
IV	N	18.807	22.368	7.309	1.189	462	50.134		
	%	37,5	44,6	14,6	2,4	0,9	100,0		
V	N	6.514	10.524	4.206	860	208	22.312		
	%	29,2	47,2	18,8	3,9	0,9	100,0		
>=75	Total	N	60.319	53.292	23.485	3.225	939	141.261	
		%	42,7	37,7	16,6	2,3	0,7	100,0	
I	N	3.658	1.399	591	227	.	5.875		
	%	62,3	23,8	10,1	3,9	.	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	>=75	II	N	3.456	4.370	2.465	.	.	10.292	
			%	33,6	42,5	24,0	.	.	100,0	
		III	N	13.440	10.104	4.298	456	169	28.468	
			%	47,2	35,5	15,1	1,6	0,6	100,0	
		IV	N	28.739	23.741	10.445	689	252	63.866	
			%	45,0	37,2	16,4	1,1	0,4	100,0	
		V	N	11.026	13.677	5.686	1.853	518	32.760	
			%	33,7	41,7	17,4	5,7	1,6	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	506.880	756.906	451.455	130.036	42.078	1.887.356
				%	26,9	40,1	23,9	6,9	2,2	100,0
		I	N	73.266	89.550	41.207	10.791	3.714	218.528	
			%	33,5	41,0	18,9	4,9	1,7	100,0	
		II	N	46.872	81.604	32.828	9.256	2.674	173.234	
			%	27,1	47,1	19,0	5,3	1,5	100,0	
		III	N	115.171	169.597	111.697	26.722	7.274	430.462	
			%	26,8	39,4	25,9	6,2	1,7	100,0	
		IV	N	202.914	325.170	204.118	58.990	19.555	810.747	
			%	25,0	40,1	25,2	7,3	2,4	100,0	
	V	N	68.657	90.985	61.604	24.277	8.861	254.385		
		%	27,0	35,8	24,2	9,5	3,5	100,0		
15-24	Total	Total	N	32.660	63.559	54.322	22.906	8.988	182.434	
			%	17,9	34,8	29,8	12,6	4,9	100,0	
		I	N	8.024	10.622	6.024	3.945	581	29.196	
			%	27,5	36,4	20,6	13,5	2,0	100,0	
		II	N	4.533	11.822	5.362	2.007	761	24.485	
			%	18,5	48,3	21,9	8,2	3,1	100,0	
		III	N	6.694	12.138	11.268	4.846	1.954	36.900	
			%	18,1	32,9	30,5	13,1	5,3	100,0	
		IV	N	10.124	25.706	25.187	8.310	5.024	74.351	
			%	13,6	34,6	33,9	11,2	6,8	100,0	
	V	N	3.285	3.271	6.480	3.797	669	17.503		
		%	18,8	18,7	37,0	21,7	3,8	100,0		
25-44	Total	Total	N	138.718	257.755	179.744	59.004	21.419	656.640	
			%	21,1	39,3	27,4	9,0	3,3	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	25-44	I	N	28.555	33.771	19.241	4.651	2.600	88.818
			%	32,1	38,0	21,7	5,2	2,9	100,0
		II	N	16.714	33.118	13.541	4.906	1.440	69.719
			%	24,0	47,5	19,4	7,0	2,1	100,0
		III	N	28.996	56.621	43.732	11.193	3.743	144.286
			%	20,1	39,2	30,3	7,8	2,6	100,0
		IV	N	47.616	106.855	80.627	27.546	8.473	271.117
			%	17,6	39,4	29,7	10,2	3,1	100,0
		V	N	16.836	27.389	22.603	10.709	5.162	82.699
			%	20,4	33,1	27,3	12,9	6,2	100,0
	45-64	Total	N	170.867	258.128	143.024	35.989	7.957	615.965
			%	27,7	41,9	23,2	5,8	1,3	100,0
		I	N	24.037	31.404	12.468	1.581	533	70.023
			%	34,3	44,8	17,8	2,3	0,8	100,0
		II	N	16.326	23.028	9.011	1.510	336	50.212
			%	32,5	45,9	17,9	3,0	0,7	100,0
		III	N	41.264	66.013	38.143	8.511	1.030	154.963
			%	26,6	42,6	24,6	5,5	0,7	100,0
		IV	N	62.607	107.020	62.932	17.837	4.320	254.716
			%	24,6	42,0	24,7	7,0	1,7	100,0
		V	N	26.632	30.664	20.468	6.550	1.738	86.052
			%	30,9	35,6	23,8	7,6	2,0	100,0
	65-74	Total	N	71.138	89.408	37.236	6.385	1.336	205.503
			%	34,6	43,5	18,1	3,1	0,7	100,0
		I	N	7.063	10.878	2.625	387	.	20.952
			%	33,7	51,9	12,5	1,8	.	100,0
		II	N	4.585	6.973	1.560	832	137	14.087
			%	32,5	49,5	11,1	5,9	1,0	100,0
		III	N	15.974	16.832	10.650	994	226	44.676
			%	35,8	37,7	23,8	2,2	0,5	100,0
		IV	N	35.301	41.686	17.240	2.975	685	97.887
			%	36,1	42,6	17,6	3,0	0,7	100,0
		V	N	8.216	13.040	5.160	1.196	288	27.901
			%	29,4	46,7	18,5	4,3	1,0	100,0
	>=75	Total	N	93.497	88.056	37.130	5.753	2.378	226.814

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	%	41,2	38,8	16,4	2,5	1,0	100,0
		I	N	5.587	2.875	849	227	.	9.538
			%	58,6	30,1	8,9	2,4	.	100,0
		II	N	4.714	6.664	3.353	.	.	14.731
			%	32,0	45,2	22,8	.	.	100,0
		III	N	22.243	17.993	7.904	1.177	321	49.638
			%	44,8	36,2	15,9	2,4	0,6	100,0
		IV	N	47.266	43.902	18.132	2.323	1.053	112.676
			%	41,9	39,0	16,1	2,1	0,9	100,0
		V	N	13.687	16.622	6.892	2.025	1.004	40.231
			%	34,0	41,3	17,1	5,0	2,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 220. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	Total	N	191.566	366.433	248.064	80.965	28.096	915.124
		%	20,9	40,0	27,1	8,8	3,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	50.063	85.712	51.122	18.293	5.409	210.600
		%	23,8	40,7	24,3	8,7	2,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	33.624	57.999	48.538	21.463	5.830	167.454
		%	20,1	34,6	29,0	12,8	3,5	100,0
	Secundaria, superior	N	64.338	144.511	107.395	30.830	13.596	360.670
		%	17,8	40,1	29,8	8,5	3,8	100,0
	Terciaria	N	43.541	78.211	41.010	10.379	3.261	176.400
		%	24,7	44,3	23,2	5,9	1,8	100,0
	15-24 Total	N	12.271	32.556	30.291	13.994	5.347	94.458
		%	13,0	34,5	32,1	14,8	5,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	430	4.737	2.735	1.630	385	9.918
		%	4,3	47,8	27,6	16,4	3,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.918	8.100	10.709	6.734	1.667	31.129
		%	12,6	26,0	34,4	21,6	5,4	100,0
	Secundaria, superior	N	6.096	15.432	14.209	4.715	2.388	42.840
		%	14,2	36,0	33,2	11,0	5,6	100,0
	Terciaria	N	1.827	4.287	2.637	915	906	10.572
		%	17,3	40,6	24,9	8,7	8,6	100,0
	25-44 Total	N	52.454	130.430	100.994	37.611	14.821	336.309
		%	15,6	38,8	30,0	11,2	4,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	5.491	11.760	11.160	6.658	2.707	37.776
		%	14,5	31,1	29,5	17,6	7,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	5.549	20.187	18.020	6.032	3.020	52.808
		%	10,5	38,2	34,1	11,4	5,7	100,0
	Secundaria, superior	N	25.960	61.418	52.004	18.003	6.890	164.274
		%	15,8	37,4	31,7	11,0	4,2	100,0
	Terciaria	N	15.454	37.065	19.810	6.918	2.204	81.451
		%	19,0	45,5	24,3	8,5	2,7	100,0
	45-64 Total	N	62.617	127.244	83.416	23.395	5.983	302.655
		%	20,7	42,0	27,6	7,7	2,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	12.550	30.269	19.951	6.517	1.113	70.400
		%	17,8	43,0	28,3	9,3	1,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 220. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	10.540	19.230	14.394	7.938	1.143	53.244
			%	19,8	36,1	27,0	14,9	2,1	100,0
		Secundaria, superior	N	21.207	50.982	34.476	6.738	3.728	117.130
			%	18,1	43,5	29,4	5,8	3,2	100,0
		Terciaria	N	18.320	26.762	14.596	2.203	.	61.881
			%	29,6	43,2	23,6	3,6	.	100,0
	65-74	Total	N	31.046	41.025	19.718	3.438	506	95.733
			%	32,4	42,9	20,6	3,6	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	12.024	16.002	8.432	1.412	147	38.017
			%	31,6	42,1	22,2	3,7	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.511	6.064	3.092	625	.	16.291
			%	40,0	37,2	19,0	3,8	.	100,0
	Secundaria, superior	N	7.395	11.580	5.555	1.058	360	25.948	
		%	28,5	44,6	21,4	4,1	1,4	100,0	
	Terciaria	N	5.116	7.379	2.639	343	.	15.477	
		%	33,1	47,7	17,1	2,2	.	100,0	
>=75	Total	N	33.178	35.179	13.645	2.527	1.439	85.968	
		%	38,6	40,9	15,9	2,9	1,7	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	19.568	22.944	8.844	2.076	1.057	54.489	
		%	35,9	42,1	16,2	3,8	1,9	100,0	
	Secundaria, inferior	N	7.106	4.418	2.322	135	.	13.981	
		%	50,8	31,6	16,6	1,0	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	3.681	5.099	1.151	316	230	10.478	
		%	35,1	48,7	11,0	3,0	2,2	100,0	
	Terciaria	N	2.823	2.718	1.327	.	151	7.020	
		%	40,2	38,7	18,9	.	2,2	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	316.465	391.526	204.278	49.632	13.982	975.882
		%	32,4	40,1	20,9	5,1	1,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	101.447	109.635	54.165	10.305	2.775	278.327
			%	36,4	39,4	19,5	3,7	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	51.338	67.708	37.606	9.813	3.301	169.766
			%	30,2	39,9	22,2	5,8	1,9	100,0
		Secundaria, superior	N	88.013	125.033	69.639	20.129	5.052	307.866
			%	28,6	40,6	22,6	6,5	1,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 220. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N	75.667	89.150	42.867	9.384	2.853	219.923
			%	34,4	40,5	19,5	4,3	1,3	100,0
	15-24	Total	N	20.687	31.253	24.546	9.373	3.641	89.499
			%	23,1	34,9	27,4	10,5	4,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.984	3.740	3.115	1.294	254	11.386
			%	26,2	32,8	27,4	11,4	2,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.935	4.804	5.237	2.166	1.621	16.763
			%	17,5	28,7	31,2	12,9	9,7	100,0
		Secundaria, superior	N	9.994	16.669	11.510	5.667	1.602	45.443
			%	22,0	36,7	25,3	12,5	3,5	100,0
		Terciaria	N	4.773	6.039	4.684	247	163	15.907
			%	30,0	38,0	29,4	1,5	1,0	100,0
	25-44	Total	N	86.489	127.324	79.020	21.394	6.599	320.826
			%	27,0	39,7	24,6	6,7	2,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.239	10.830	6.487	2.828	605	25.990
			%	20,2	41,7	25,0	10,9	2,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.620	16.142	12.060	2.533	582	38.937
			%	19,6	41,5	31,0	6,5	1,5	100,0
		Secundaria, superior	N	33.409	52.051	32.953	8.927	3.149	130.487
			%	25,6	39,9	25,3	6,8	2,4	100,0
		Terciaria	N	40.221	48.302	27.520	7.106	2.263	125.412
			%	32,1	38,5	21,9	5,7	1,8	100,0
	45-64	Total	N	108.421	131.073	59.607	12.693	1.974	313.769
			%	34,6	41,8	19,0	4,0	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	27.874	29.373	17.272	2.497	948	77.963
			%	35,8	37,7	22,2	3,2	1,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	18.647	25.745	12.648	4.228	467	61.735
			%	30,2	41,7	20,5	6,8	0,8	100,0
		Secundaria, superior	N	37.779	46.695	21.327	4.220	301	110.322
			%	34,2	42,3	19,3	3,8	0,3	100,0
		Terciaria	N	24.122	29.260	8.361	1.748	258	63.749
			%	37,8	45,9	13,1	2,7	0,4	100,0
	65-74	Total	N	40.247	48.383	17.518	2.947	830	109.925
			%	36,6	44,0	15,9	2,7	0,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 220. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	23.255	27.070	9.547	1.492	488	61.852
			%	37,6	43,8	15,4	2,4	0,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	10.180	11.547	4.970	414	341	27.452
			%	37,1	42,1	18,1	1,5	1,2	100,0
		Secundaria, superior	N	3.212	5.877	2.048	757	.	11.893
			%	27,0	49,4	17,2	6,4	.	100,0
	Terciaria	N	3.601	3.889	953	284	.	8.727	
		%	41,3	44,6	10,9	3,3	.	100,0	
	>=75	Total	N	60.621	53.492	23.586	3.225	939	141.864
			%	42,7	37,7	16,6	2,3	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	42.095	38.622	17.744	2.194	480	101.136
			%	41,6	38,2	17,5	2,2	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	11.956	9.470	2.691	473	290	24.879
			%	48,1	38,1	10,8	1,9	1,2	100,0
		Secundaria, superior	N	3.620	3.740	1.801	558	.	9.720
			%	37,2	38,5	18,5	5,7	.	100,0
		Terciaria	N	2.950	1.660	1.349	.	169	6.129
			%	48,1	27,1	22,0	.	2,8	100,0
Ambos		Total	N	508.031	757.959	452.341	130.596	42.078	1.891.006
			%	26,9	40,1	23,9	6,9	2,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	151.510	195.347	105.287	28.599	8.184	488.927	
		%	31,0	40,0	21,5	5,8	1,7	100,0	
	Secundaria, inferior	N	84.962	125.707	86.144	31.276	9.132	337.220	
		%	25,2	37,3	25,5	9,3	2,7	100,0	
	Secundaria, superior	N	152.352	269.544	177.034	50.958	18.648	668.536	
		%	22,8	40,3	26,5	7,6	2,8	100,0	
	Terciaria	N	119.208	167.361	83.877	19.763	6.114	396.323	
		%	30,1	42,2	21,2	5,0	1,5	100,0	
	15-24	Total	N	32.958	63.808	54.837	23.366	8.988	183.958
			%	17,9	34,7	29,8	12,7	4,9	100,0
Sin estudios, primaria		N	3.414	8.477	5.850	2.924	639	21.304	
		%	16,0	39,8	27,5	13,7	3,0	100,0	
Secundaria, inferior	N	6.853	12.904	15.946	8.900	3.289	47.891		
	%	14,3	26,9	33,3	18,6	6,9	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 220. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	16.090	32.101	25.720	10.382	3.991	88.283
			%	18,2	36,4	29,1	11,8	4,5	100,0
		Terciaria	N	6.601	10.326	7.321	1.161	1.069	26.479
			%	24,9	39,0	27,6	4,4	4,0	100,0
	25-44	Total	N	138.943	257.755	180.013	59.004	21.419	657.135
			%	21,1	39,2	27,4	9,0	3,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	10.730	22.590	17.647	9.486	3.312	63.765
			%	16,8	35,4	27,7	14,9	5,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.169	36.329	30.080	8.565	3.602	91.745
			%	14,4	39,6	32,8	9,3	3,9	100,0
		Secundaria, superior	N	59.368	113.469	84.956	26.929	10.039	294.762
			%	20,1	38,5	28,8	9,1	3,4	100,0
		Terciaria	N	55.675	85.367	47.330	14.024	4.466	206.862
			%	26,9	41,3	22,9	6,8	2,2	100,0
	45-64	Total	N	171.038	258.317	143.024	36.088	7.957	616.424
			%	27,7	41,9	23,2	5,9	1,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	40.424	59.642	37.222	9.014	2.061	148.363
			%	27,2	40,2	25,1	6,1	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	29.187	44.975	27.041	12.165	1.610	114.979
			%	25,4	39,1	23,5	10,6	1,4	100,0
		Secundaria, superior	N	58.985	97.678	55.803	10.958	4.029	227.452
			%	25,9	42,9	24,5	4,8	1,8	100,0
		Terciaria	N	42.442	56.022	22.957	3.951	258	125.630
			%	33,8	44,6	18,3	3,1	0,2	100,0
	65-74	Total	N	71.293	89.408	37.236	6.385	1.336	205.658
			%	34,7	43,5	18,1	3,1	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	35.279	43.072	17.979	2.905	635	99.869
			%	35,3	43,1	18,0	2,9	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	16.690	17.611	8.063	1.038	341	43.744
			%	38,2	40,3	18,4	2,4	0,8	100,0
		Secundaria, superior	N	10.607	17.457	7.602	1.815	360	37.841
			%	28,0	46,1	20,1	4,8	1,0	100,0
		Terciaria	N	8.717	11.268	3.592	627	.	24.204
			%	36,0	46,6	14,8	2,6	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 220. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	N	93.799	88.671	37.231	5.753	2.378	227.832
			%	41,2	38,9	16,3	2,5	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	61.663	61.566	26.589	4.270	1.537	155.625
			%	39,6	39,6	17,1	2,7	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	19.062	13.888	5.013	608	290	38.860
			%	49,1	35,7	12,9	1,6	0,7	100,0
		Secundaria, superior	N	7.301	8.839	2.953	874	230	20.198
			%	36,1	43,8	14,6	4,3	1,1	100,0
		Terciaria	N	5.773	4.378	2.677	.	321	13.149
			%	43,9	33,3	20,4	.	2,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 221. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	Total	CAPV	N	22.211	284.998	512.381	82.268	13.266	915.124
			%	2,4	31,1	56,0	9,0	1,4	100,0
		Araba	N	3.291	43.237	76.077	9.648	1.497	133.751
			%	2,5	32,3	56,9	7,2	1,1	100,0
		Gipuzkoa	N	7.384	84.102	178.866	20.013	3.446	293.812
			%	2,5	28,6	60,9	6,8	1,2	100,0
		Bizkaia	N	11.536	157.659	257.438	52.606	8.322	487.561
			%	2,4	32,3	52,8	10,8	1,7	100,0
	15-24	CAPV	N	1.101	26.587	53.754	8.275	4.741	94.458
			%	1,2	28,1	56,9	8,8	5,0	100,0
		Araba	N	483	5.098	8.573	716	.	14.869
			%	3,2	34,3	57,7	4,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	248	10.729	16.432	1.842	2.054	31.305
			%	0,8	34,3	52,5	5,9	6,6	100,0
		Bizkaia	N	370	10.760	28.749	5.717	2.687	48.284
			%	0,8	22,3	59,5	11,8	5,6	100,0
	25-44	CAPV	N	10.097	99.894	187.977	33.932	4.409	336.309
			%	3,0	29,7	55,9	10,1	1,3	100,0
		Araba	N	1.294	15.123	30.246	4.414	986	52.062
			%	2,5	29,0	58,1	8,5	1,9	100,0
		Gipuzkoa	N	1.897	30.108	67.631	6.847	307	106.790
			%	1,8	28,2	63,3	6,4	0,3	100,0
		Bizkaia	N	6.906	54.663	90.101	22.672	3.115	177.458
			%	3,9	30,8	50,8	12,8	1,8	100,0
	45-64	CAPV	N	6.943	93.992	173.524	26.462	1.734	302.655
			%	2,3	31,1	57,3	8,7	0,6	100,0
		Araba	N	884	14.933	24.064	2.485	385	42.751
			%	2,1	34,9	56,3	5,8	0,9	100,0
		Gipuzkoa	N	3.357	22.856	62.775	8.057	373	97.419
			%	3,4	23,5	64,4	8,3	0,4	100,0
		Bizkaia	N	2.702	56.203	86.684	15.920	976	162.485
			%	1,7	34,6	53,3	9,8	0,6	100,0
	65-74	CAPV	N	2.199	29.568	56.911	6.521	534	95.733
			%	2,3	30,9	59,4	6,8	0,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 221. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Hombres	65-74	Araba	N	301	4.076	7.829	957	.	13.163	
			%	2,3	31,0	59,5	7,3	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	898	9.699	19.170	2.011	353	32.130	
			%	2,8	30,2	59,7	6,3	1,1	100,0	
		Bizkaia	N	1.001	15.793	29.912	3.553	181	50.440	
			%	2,0	31,3	59,3	7,0	0,4	100,0	
	>=75	CAPV	N	1.871	34.956	40.214	7.078	1.849	85.968	
			%	2,2	40,7	46,8	8,2	2,2	100,0	
		Araba	N	330	4.007	5.365	1.077	126	10.905	
			%	3,0	36,7	49,2	9,9	1,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	984	10.709	12.859	1.256	360	26.168	
			%	3,8	40,9	49,1	4,8	1,4	100,0	
Bizkaia		N	557	20.240	21.990	4.745	1.363	48.895		
		%	1,1	41,4	45,0	9,7	2,8	100,0		
Mujeres		Total	CAPV	N	21.041	281.141	541.534	106.034	26.133	975.882
			%	2,2	28,8	55,5	10,9	2,7	100,0	
		Araba	N	3.828	38.778	75.595	14.489	4.081	136.772	
			%	2,8	28,4	55,3	10,6	3,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	9.246	78.424	187.295	29.156	8.565	312.686		
		%	3,0	25,1	59,9	9,3	2,7	100,0		
	Bizkaia	N	7.968	163.938	278.644	62.389	13.487	526.425		
		%	1,5	31,1	52,9	11,9	2,6	100,0		
	15-24	CAPV	N	2.096	23.223	48.963	11.221	3.996	89.499	
			%	2,3	25,9	54,7	12,5	4,5	100,0	
		Araba	N	593	4.236	5.707	2.059	615	13.210	
			%	4,5	32,1	43,2	15,6	4,7	100,0	
Gipuzkoa		N	713	5.897	17.628	3.360	1.845	29.443		
		%	2,4	20,0	59,9	11,4	6,3	100,0		
Bizkaia	N	790	13.090	25.628	5.802	1.537	46.846			
	%	1,7	27,9	54,7	12,4	3,3	100,0			
25-44	CAPV	N	7.718	86.373	183.457	33.839	9.438	320.826		
		%	2,4	26,9	57,2	10,5	2,9	100,0		
	Araba	N	1.103	10.460	28.852	5.476	1.978	47.869		
		%	2,3	21,9	60,3	11,4	4,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 221. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	3.524	23.486	62.371	9.641	2.883	101.905	
			%	3,5	23,0	61,2	9,5	2,8	100,0	
		Bizkaia	N	3.091	52.427	92.235	18.722	4.577	171.052	
	%		1,8	30,6	53,9	10,9	2,7	100,0		
		45-64	CAPV	N	5.258	88.443	178.592	34.858	6.618	313.769
	%			1,7	28,2	56,9	11,1	2,1	100,0	
		Araba	N	1.076	13.583	24.602	3.921	1.081	44.263	
	%		2,4	30,7	55,6	8,9	2,4	100,0		
		Gipuzkoa	N	2.290	24.832	60.380	9.653	2.507	99.662	
	%		2,3	24,9	60,6	9,7	2,5	100,0		
		Bizkaia	N	1.892	50.028	93.609	21.283	3.031	169.843	
	%		1,1	29,5	55,1	12,5	1,8	100,0		
		65-74	CAPV	N	3.287	38.087	56.680	9.848	2.023	109.925
	%			3,0	34,6	51,6	9,0	1,8	100,0	
		Araba	N	507	4.899	7.376	1.314	224	14.320	
	%		3,5	34,2	51,5	9,2	1,6	100,0		
		Gipuzkoa	N	1.555	11.515	20.387	2.355	308	36.120	
	%		4,3	31,9	56,4	6,5	0,9	100,0		
		Bizkaia	N	1.225	21.674	28.916	6.179	1.490	59.484	
	%		2,1	36,4	48,6	10,4	2,5	100,0		
		>=75	CAPV	N	2.682	45.014	73.842	16.268	4.057	141.864
	%			1,9	31,7	52,1	11,5	2,9	100,0	
		Araba	N	549	5.601	9.058	1.719	184	17.110	
	%		3,2	32,7	52,9	10,0	1,1	100,0		
	Gipuzkoa	N	1.163	12.694	26.528	4.147	1.022	45.555		
%		2,6	27,9	58,2	9,1	2,2	100,0			
	Bizkaia	N	970	26.720	38.257	10.402	2.851	79.200		
%		1,2	33,7	48,3	13,1	3,6	100,0			
Ambos	Total	CAPV	N	43.253	566.138	1.053.915	188.302	39.399	1.891.006	
			%	2,3	29,9	55,7	10,0	2,1	100,0	
		Araba	N	7.119	82.015	151.672	24.137	5.578	270.523	
	%		2,6	30,3	56,1	8,9	2,1	100,0		
		Gipuzkoa	N	16.629	162.526	366.161	49.169	12.012	606.497	
	%		2,7	26,8	60,4	8,1	2,0	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 221. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	Total	Bizkaia	N	19.504	321.597	536.082	114.995	21.809	1.013.987
			%	1,9	31,7	52,9	11,3	2,2	100,0
	15-24	CAPV	N	3.197	49.810	102.717	19.495	8.738	183.958
			%	1,7	27,1	55,8	10,6	4,7	100,0
		Araba	N	1.075	9.334	14.280	2.774	615	28.079
			%	3,8	33,2	50,9	9,9	2,2	100,0
		Gipuzkoa	N	961	16.626	34.060	5.202	3.899	60.748
			%	1,6	27,4	56,1	8,6	6,4	100,0
		Bizkaia	N	1.160	23.850	54.377	11.519	4.224	95.130
			%	1,2	25,1	57,2	12,1	4,4	100,0
	25-44	CAPV	N	17.815	186.267	371.435	67.771	13.846	657.135
			%	2,7	28,3	56,5	10,3	2,1	100,0
		Araba	N	2.397	25.582	59.097	9.890	2.964	99.930
			%	2,4	25,6	59,1	9,9	3,0	100,0
		Gipuzkoa	N	5.422	53.594	130.001	16.488	3.190	208.695
			%	2,6	25,7	62,3	7,9	1,5	100,0
		Bizkaia	N	9.997	107.090	182.336	41.393	7.693	348.509
			%	2,9	30,7	52,3	11,9	2,2	100,0
	45-64	CAPV	N	12.201	182.435	352.116	61.320	8.352	616.424
			%	2,0	29,6	57,1	9,9	1,4	100,0
		Araba	N	1.960	28.517	48.667	6.406	1.466	87.015
			%	2,3	32,8	55,9	7,4	1,7	100,0
		Gipuzkoa	N	5.647	47.688	123.156	17.711	2.879	197.081
			%	2,9	24,2	62,5	9,0	1,5	100,0
		Bizkaia	N	4.594	106.230	180.294	37.203	4.007	332.328
			%	1,4	32,0	54,3	11,2	1,2	100,0
	65-74	CAPV	N	5.486	67.655	113.591	16.369	2.557	205.658
			%	2,7	32,9	55,2	8,0	1,2	100,0
		Araba	N	808	8.975	15.205	2.271	224	27.483
			%	2,9	32,7	55,3	8,3	0,8	100,0
		Gipuzkoa	N	2.453	21.214	39.557	4.366	661	68.251
			%	3,6	31,1	58,0	6,4	1,0	100,0
		Bizkaia	N	2.226	37.466	58.828	9.732	1.672	109.924
			%	2,0	34,1	53,5	8,9	1,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 221. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	CAPV	N	4.553	79.971	114.056	23.346	5.906	227.832
			%	2,0	35,1	50,1	10,2	2,6	100,0
		Araba	N	879	9.607	14.423	2.796	310	28.015
			%	3,1	34,3	51,5	10,0	1,1	100,0
		Gipuzkoa	N	2.147	23.403	39.387	5.403	1.383	71.723
			%	3,0	32,6	54,9	7,5	1,9	100,0
		Bizkaia	N	1.526	46.960	60.247	15.147	4.214	128.094
			%	1,2	36,7	47,0	11,8	3,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 222. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	Total	Total	N	A diario					
			N	22.211	284.134	511.984	82.268	13.266	913.863
			%	2,4	31,1	56,0	9,0	1,5	100,0
	I		N	1.388	32.480	68.998	9.899	925	113.690
			%	1,2	28,6	60,7	8,7	0,8	100,0
	II		N	1.552	21.442	48.060	6.704	448	78.206
			%	2,0	27,4	61,5	8,6	0,6	100,0
	III		N	4.762	54.820	106.330	18.421	4.020	188.355
			%	2,5	29,1	56,5	9,8	2,1	100,0
	IV		N	11.460	147.479	245.756	39.937	5.674	450.306
			%	2,5	32,8	54,6	8,9	1,3	100,0
	V		N	3.050	27.913	42.840	7.307	2.199	83.307
			%	3,7	33,5	51,4	8,8	2,6	100,0
	15-24 Total		N	1.101	26.327	53.456	8.275	4.741	93.900
			%	1,2	28,0	56,9	8,8	5,0	100,0
	I		N	.	4.715	7.599	1.725	596	14.634
			%	.	32,2	51,9	11,8	4,1	100,0
	II		N	.	2.388	7.661	938	.	10.988
			%	.	21,7	69,7	8,5	.	100,0
	III		N	.	2.309	10.774	1.518	2.229	16.830
			%	.	13,7	64,0	9,0	13,2	100,0
	IV		N	937	13.949	23.315	2.619	1.917	42.737
			%	2,2	32,6	54,6	6,1	4,5	100,0
	V		N	164	2.966	4.106	1.475	.	8.711
			%	1,9	34,0	47,1	16,9	.	100,0
	25-44 Total		N	10.097	99.894	187.977	33.932	4.409	336.309
			%	3,0	29,7	55,9	10,1	1,3	100,0
	I		N	445	10.887	28.423	3.977	.	43.732
			%	1,0	24,9	65,0	9,1	.	100,0
	II		N	1.089	9.636	19.027	2.745	.	32.496
			%	3,4	29,7	58,6	8,4	.	100,0
	III		N	2.195	20.181	29.983	8.827	1.071	62.257
			%	3,5	32,4	48,2	14,2	1,7	100,0
	IV		N	4.813	47.787	90.840	15.327	1.625	160.392
			%	3,0	29,8	56,6	9,6	1,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 222. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres 25-44 V	N		1.555	11.402	19.705	3.057	1.712	37.432
	%		4,2	30,5	52,6	8,2	4,6	100,0
45-64 Total	N		6.943	93.804	173.425	26.462	1.734	302.368
	%		2,3	31,0	57,4	8,8	0,6	100,0
I	N		297	11.996	21.976	3.494	144	37.907
	%		0,8	31,6	58,0	9,2	0,4	100,0
II	N		463	6.200	13.945	2.363	448	23.419
	%		2,0	26,5	59,5	10,1	1,9	100,0
III	N		1.580	19.289	40.356	4.713	384	66.322
	%		2,4	29,1	60,8	7,1	0,6	100,0
IV	N		3.579	47.201	84.993	14.084	757	150.614
	%		2,4	31,3	56,4	9,4	0,5	100,0
V	N		1.024	9.118	12.155	1.808	.	24.106
	%		4,2	37,8	50,4	7,5	.	100,0
65-74 Total	N		2.199	29.568	56.911	6.521	534	95.733
	%		2,3	30,9	59,4	6,8	0,6	100,0
I	N		576	3.379	8.910	703	185	13.753
	%		4,2	24,6	64,8	5,1	1,3	100,0
II	N		.	2.487	4.077	298	.	6.862
	%		.	36,2	59,4	4,3	.	100,0
III	N		315	4.486	15.522	1.454	.	21.777
	%		1,4	20,6	71,3	6,7	.	100,0
IV	N		1.002	17.492	25.194	3.717	348	47.753
	%		2,1	36,6	52,8	7,8	0,7	100,0
V	N		306	1.724	3.209	349	.	5.588
	%		5,5	30,9	57,4	6,2	.	100,0
>=75 Total	N		1.871	34.542	40.214	7.078	1.849	85.553
	%		2,2	40,4	47,0	8,3	2,2	100,0
I	N		69	1.504	2.090	.	.	3.663
	%		1,9	41,1	57,1	.	.	100,0
II	N		.	730	3.348	361	.	4.440
	%		.	16,5	75,4	8,1	.	100,0
III	N		672	8.554	9.696	1.910	337	21.169
	%		3,2	40,4	45,8	9,0	1,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 222. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres >=75	IV	N	1.129	21.050	21.415	4.190	1.026	48.810
		%	2,3	43,1	43,9	8,6	2,1	100,0
	V	N	.	2.703	3.665	617	486	7.470
		%	.	36,2	49,1	8,3	6,5	100,0
Mujeres Total	Total	N	20.617	280.586	540.123	106.034	26.133	973.492
		%	2,1	28,8	55,5	10,9	2,7	100,0
	I	N	615	25.708	64.236	11.517	2.761	104.838
		%	0,6	24,5	61,3	11,0	2,6	100,0
	II	N	3.120	24.706	53.093	12.604	1.506	95.028
		%	3,3	26,0	55,9	13,3	1,6	100,0
	III	N	4.937	65.711	136.288	28.967	6.205	242.107
		%	2,0	27,1	56,3	12,0	2,6	100,0
	IV	N	8.969	107.483	198.609	35.264	10.117	360.441
		%	2,5	29,8	55,1	9,8	2,8	100,0
	V	N	2.977	56.978	87.897	17.683	5.543	171.077
		%	1,7	33,3	51,4	10,3	3,2	100,0
	15-24 Total	N	1.842	23.223	48.251	11.221	3.996	88.533
		%	2,1	26,2	54,5	12,7	4,5	100,0
	I	N	166	3.609	9.848	554	384	14.562
		%	1,1	24,8	67,6	3,8	2,6	100,0
	II	N	254	3.283	7.308	2.412	240	13.497
		%	1,9	24,3	54,1	17,9	1,8	100,0
	III	N	.	4.491	11.401	3.717	460	20.069
		%	.	22,4	56,8	18,5	2,3	100,0
	IV	N	972	10.388	15.450	2.784	2.020	31.614
		%	3,1	32,9	48,9	8,8	6,4	100,0
	V	N	450	1.452	4.244	1.754	892	8.792
		%	5,1	16,5	48,3	20,0	10,1	100,0
	25-44 Total	N	7.718	86.373	182.962	33.839	9.438	320.330
		%	2,4	27,0	57,1	10,6	2,9	100,0
	I	N	217	11.075	27.149	5.581	1.064	45.086
		%	0,5	24,6	60,2	12,4	2,4	100,0
	II	N	1.002	9.013	22.392	4.816	.	37.223
		%	2,7	24,2	60,2	12,9	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 222. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	2.209	24.149	42.100	10.474	3.098	82.029
			%	2,7	29,4	51,3	12,8	3,8	100,0
		IV	N	3.263	27.414	64.749	11.129	4.170	110.725
			%	2,9	24,8	58,5	10,1	3,8	100,0
		V	N	1.028	14.722	26.572	1.840	1.106	45.267
			%	2,3	32,5	58,7	4,1	2,4	100,0
	45-64	Total	N	5.087	88.443	178.592	34.858	6.618	313.598
			%	1,6	28,2	56,9	11,1	2,1	100,0
	I	N	138	6.988	19.878	4.153	959	32.116	
		%	0,4	21,8	61,9	12,9	3,0	100,0	
	II	N	1.118	7.418	13.692	3.658	905	26.792	
		%	4,2	27,7	51,1	13,7	3,4	100,0	
	III	N	1.098	20.709	55.762	9.422	1.650	88.641	
		%	1,2	23,4	62,9	10,6	1,9	100,0	
	IV	N	2.065	29.189	60.388	10.589	1.870	104.102	
		%	2,0	28,0	58,0	10,2	1,8	100,0	
	V	N	668	24.138	28.871	7.035	1.234	61.946	
		%	1,1	39,0	46,6	11,4	2,0	100,0	
	65-74	Total	N	3.287	37.932	56.680	9.848	2.023	109.770
			%	3,0	34,6	51,6	9,0	1,8	100,0
	I	N	95	1.893	3.864	994	353	7.199	
		%	1,3	26,3	53,7	13,8	4,9	100,0	
	II	N	465	3.077	3.092	589	.	7.225	
		%	6,4	42,6	42,8	8,2	.	100,0	
III	N	836	7.281	12.621	1.715	447	22.899		
	%	3,6	31,8	55,1	7,5	2,0	100,0		
IV	N	1.500	19.331	24.863	3.890	551	50.134		
	%	3,0	38,6	49,6	7,8	1,1	100,0		
V	N	391	6.350	12.240	2.660	672	22.312		
	%	1,8	28,5	54,9	11,9	3,0	100,0		
>=75	Total	N	2.682	44.615	73.639	16.268	4.057	141.261	
		%	1,9	31,6	52,1	11,5	2,9	100,0	
I	N	.	2.143	3.496	235	.	5.875		
	%	.	36,5	59,5	4,0	.	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 222. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	>=75	II	N	280	1.914	6.607	1.129	361	10.292
			%	2,7	18,6	64,2	11,0	3,5	100,0
		III	N	794	9.081	14.404	3.639	551	28.468
			%	2,8	31,9	50,6	12,8	1,9	100,0
		IV	N	1.168	21.161	33.160	6.871	1.506	63.866
			%	1,8	33,1	51,9	10,8	2,4	100,0
	V	N	440	10.316	15.971	4.393	1.640	32.760	
		%	1,3	31,5	48,8	13,4	5,0	100,0	
	Ambos Total	Total	N	42.828	564.720	1.052.107	188.302	39.399	1.887.356
			%	2,3	29,9	55,7	10,0	2,1	100,0
	15-24	I	N	2.003	58.188	133.235	21.415	3.686	218.528
			%	0,9	26,6	61,0	9,8	1,7	100,0
II		N	4.671	46.147	101.152	19.308	1.955	173.234	
		%	2,7	26,6	58,4	11,1	1,1	100,0	
III		N	9.699	120.531	242.618	47.388	10.226	430.462	
		%	2,3	28,0	56,4	11,0	2,4	100,0	
IV		N	20.428	254.962	444.366	75.200	15.791	810.747	
		%	2,5	31,4	54,8	9,3	1,9	100,0	
V		N	6.026	84.891	130.737	24.989	7.742	254.385	
		%	2,4	33,4	51,4	9,8	3,0	100,0	
Total		N	2.943	49.550	101.707	19.495	8.738	182.434	
		%	1,6	27,2	55,8	10,7	4,8	100,0	
I		N	166	8.324	17.447	2.278	980	29.196	
		%	0,6	28,5	59,8	7,8	3,4	100,0	
II		N	254	5.671	14.970	3.350	240	24.485	
		%	1,0	23,2	61,1	13,7	1,0	100,0	
III		N	.	6.801	22.175	5.235	2.689	36.900	
		%	.	18,4	60,1	14,2	7,3	100,0	
IV	N	1.910	24.337	38.765	5.403	3.937	74.351		
	%	2,6	32,7	52,1	7,3	5,3	100,0		
V	N	614	4.417	8.350	3.230	892	17.503		
	%	3,5	25,2	47,7	18,5	5,1	100,0		
25-44	Total	N	17.815	186.267	370.939	67.771	13.846	656.640	
		%	2,7	28,4	56,5	10,3	2,1	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 222. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	25-44	I	N	662	21.962	55.572	9.558	1.064	88.818
			%	0,7	24,7	62,6	10,8	1,2	100,0
		II	N	2.090	18.649	41.420	7.560	.	69.719
			%	3,0	26,7	59,4	10,8	.	100,0
		III	N	4.404	44.330	72.083	19.301	4.169	144.286
			%	3,1	30,7	50,0	13,4	2,9	100,0
		IV	N	8.077	75.201	155.589	26.456	5.795	271.117
			%	3,0	27,7	57,4	9,8	2,1	100,0
		V	N	2.583	26.125	46.276	4.896	2.818	82.699
			%	3,1	31,6	56,0	5,9	3,4	100,0
45-64 Total			N	12.030	182.246	352.017	61.320	8.352	615.965
			%	2,0	29,6	57,1	10,0	1,4	100,0
		I	N	435	18.984	41.855	7.647	1.103	70.023
			%	0,6	27,1	59,8	10,9	1,6	100,0
		II	N	1.581	13.618	27.638	6.021	1.354	50.212
			%	3,1	27,1	55,0	12,0	2,7	100,0
		III	N	2.678	39.999	96.118	14.134	2.034	154.963
			%	1,7	25,8	62,0	9,1	1,3	100,0
		IV	N	5.644	76.390	145.381	24.673	2.628	254.716
			%	2,2	30,0	57,1	9,7	1,0	100,0
		V	N	1.692	33.256	41.026	8.844	1.234	86.052
			%	2,0	38,6	47,7	10,3	1,4	100,0
65-74 Total			N	5.486	67.500	113.591	16.369	2.557	205.503
			%	2,7	32,8	55,3	8,0	1,2	100,0
		I	N	671	5.272	12.774	1.696	539	20.952
			%	3,2	25,2	61,0	8,1	2,6	100,0
		II	N	465	5.565	7.170	887	.	14.087
			%	3,3	39,5	50,9	6,3	.	100,0
		III	N	1.151	11.767	28.142	3.169	447	44.676
			%	2,6	26,3	63,0	7,1	1,0	100,0
		IV	N	2.502	36.823	50.057	7.607	899	97.887
			%	2,6	37,6	51,1	7,8	0,9	100,0
		V	N	697	8.074	15.448	3.009	672	27.901
			%	2,5	28,9	55,4	10,8	2,4	100,0
>=75 Total			N	4.553	79.156	113.853	23.346	5.906	226.814

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 222. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	%	2,0	34,9	50,2	10,3	2,6	100,0
		I	N	69	3.647	5.587	235	.	9.538
			%	0,7	38,2	58,6	2,5	.	100,0
		II	N	280	2.644	9.956	1.490	361	14.731
			%	1,9	18,0	67,6	10,1	2,4	100,0
		III	N	1.466	17.635	24.100	5.549	888	49.638
			%	3,0	35,5	48,6	11,2	1,8	100,0
		IV	N	2.297	42.211	54.575	11.061	2.531	112.676
			%	2,0	37,5	48,4	9,8	2,2	100,0
		V	N	440	13.019	19.635	5.010	2.126	40.231
			%	1,1	32,4	48,8	12,5	5,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

961

Tabla 223. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres Total	Total	N	22.211	284.998	512.381	82.268	13.266	915.124
		%	2,4	31,1	56,0	9,0	1,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	5.931	72.747	110.236	17.836	3.849	210.600
		%	2,8	34,5	52,3	8,5	1,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.835	58.797	89.794	13.346	1.682	167.454
		%	2,3	35,1	53,6	8,0	1,0	100,0
	Secundaria, superior	N	10.820	105.307	201.729	36.718	6.097	360.670
		%	3,0	29,2	55,9	10,2	1,7	100,0
	Terciaria	N	1.626	48.146	110.622	14.368	1.638	176.400
		%	0,9	27,3	62,7	8,1	0,9	100,0
15-24	Total	N	1.101	26.587	53.754	8.275	4.741	94.458
		%	1,2	28,1	56,9	8,8	5,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	836	7.230	947	905	9.918
		%	.	8,4	72,9	9,6	9,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	346	10.122	14.795	4.857	1.009	31.129
		%	1,1	32,5	47,5	15,6	3,2	100,0
	Secundaria, superior	N	755	12.611	24.370	2.276	2.828	42.840
		%	1,8	29,4	56,9	5,3	6,6	100,0
	Terciaria	N	.	3.018	7.359	195	.	10.572
		%	.	28,5	69,6	1,8	.	100,0
25-44	Total	N	10.097	99.894	187.977	33.932	4.409	336.309
		%	3,0	29,7	55,9	10,1	1,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.120	11.168	21.039	2.602	847	37.776
		%	5,6	29,6	55,7	6,9	2,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.259	18.240	28.732	3.258	321	52.808
		%	4,3	34,5	54,4	6,2	0,6	100,0
	Secundaria, superior	N	5.718	46.889	87.999	21.057	2.611	164.274
		%	3,5	28,5	53,6	12,8	1,6	100,0
	Terciaria	N	.	23.596	50.208	7.016	631	81.451
		%	.	29,0	61,6	8,6	0,8	100,0
45-64	Total	N	6.943	93.992	173.524	26.462	1.734	302.655
		%	2,3	31,1	57,3	8,7	0,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.722	24.062	37.613	6.584	420	70.400
		%	2,4	34,2	53,4	9,4	0,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 223. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	1.075	20.496	27.427	4.062	186	53.244
			%	2,0	38,5	51,5	7,6	0,3	100,0
		Secundaria, superior	N	3.625	34.111	69.448	9.638	306	117.130
			%	3,1	29,1	59,3	8,2	0,3	100,0
		Terciaria	N	521	15.324	39.036	6.178	822	61.881
			%	0,8	24,8	63,1	10,0	1,3	100,0
	65-74	Total	N	2.199	29.568	56.911	6.521	534	95.733
			%	2,3	30,9	59,4	6,8	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	679	13.051	21.484	2.803	.	38.017
			%	1,8	34,3	56,5	7,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	155	5.442	10.031	496	167	16.291
			%	1,0	33,4	61,6	3,0	1,0	100,0
	Secundaria, superior	N	491	7.787	14.770	2.718	181	25.948	
		%	1,9	30,0	56,9	10,5	0,7	100,0	
	Terciaria	N	874	3.288	10.626	503	185	15.477	
		%	5,6	21,2	68,7	3,2	1,2	100,0	
	>=75	Total	N	1.871	34.956	40.214	7.078	1.849	85.968
			%	2,2	40,7	46,8	8,2	2,2	100,0
Sin estudios, primaria		N	1.410	23.631	22.870	4.900	1.678	54.489	
		%	2,6	43,4	42,0	9,0	3,1	100,0	
Secundaria, inferior		N	.	4.498	8.810	674	.	13.981	
		%	.	32,2	63,0	4,8	.	100,0	
Secundaria, superior	N	230	3.908	5.142	1.028	171	10.478		
	%	2,2	37,3	49,1	9,8	1,6	100,0		
Terciaria	N	230	2.920	3.392	477	.	7.020		
	%	3,3	41,6	48,3	6,8	.	100,0		
Mujeres	Total	N	21.041	281.141	541.534	106.034	26.133	975.882	
		%	2,2	28,8	55,5	10,9	2,7	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	6.696	91.093	142.627	32.892	5.020	278.327	
		%	2,4	32,7	51,2	11,8	1,8	100,0	
	Secundaria, inferior	N	3.719	50.109	97.064	13.831	5.043	169.766	
		%	2,2	29,5	57,2	8,1	3,0	100,0	
Secundaria, superior	N	6.966	86.641	172.481	31.801	9.976	307.866		
	%	2,3	28,1	56,0	10,3	3,2	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

963

Tabla 223. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N	3.660	53.297	129.362	27.510	6.094	219.923
			%	1,7	24,2	58,8	12,5	2,8	100,0
	15-24	Total	N	2.096	23.223	48.963	11.221	3.996	89.499
			%	2,3	25,9	54,7	12,5	4,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	254	2.823	6.179	2.130	.	11.386
			%	2,2	24,8	54,3	18,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	970	5.731	7.623	1.926	514	16.763
			%	5,8	34,2	45,5	11,5	3,1	100,0
		Secundaria, superior	N	872	11.593	24.694	5.678	2.606	45.443
			%	1,9	25,5	54,3	12,5	5,7	100,0
		Terciaria	N	.	3.077	10.467	1.486	877	15.907
			%	.	19,3	65,8	9,3	5,5	100,0
	25-44	Total	N	7.718	86.373	183.457	33.839	9.438	320.826
			%	2,4	26,9	57,2	10,5	2,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	950	8.218	15.335	1.194	293	25.990
			%	3,7	31,6	59,0	4,6	1,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	339	10.908	25.085	1.542	1.063	38.937
			%	0,9	28,0	64,4	4,0	2,7	100,0
		Secundaria, superior	N	3.967	36.330	70.035	15.007	5.148	130.487
			%	3,0	27,8	53,7	11,5	3,9	100,0
		Terciaria	N	2.462	30.918	73.002	16.097	2.933	125.412
			%	2,0	24,7	58,2	12,8	2,3	100,0
	45-64	Total	N	5.258	88.443	178.592	34.858	6.618	313.769
			%	1,7	28,2	56,9	11,1	2,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.129	24.656	40.840	10.427	910	77.963
			%	1,4	31,6	52,4	13,4	1,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.408	19.206	32.553	6.828	1.740	61.735
			%	2,3	31,1	52,7	11,1	2,8	100,0
		Secundaria, superior	N	1.884	30.782	67.448	8.524	1.684	110.322
			%	1,7	27,9	61,1	7,7	1,5	100,0
		Terciaria	N	837	13.799	37.751	9.078	2.284	63.749
			%	1,3	21,6	59,2	14,2	3,6	100,0
	65-74	Total	N	3.287	38.087	56.680	9.848	2.023	109.925
			%	3,0	34,6	51,6	9,0	1,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 223. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	2.151	22.864	29.411	6.675	750	61.852
			%	3,5	37,0	47,6	10,8	1,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	775	7.755	16.414	1.774	734	27.452
			%	2,8	28,2	59,8	6,5	2,7	100,0
		Secundaria, superior	N	.	3.350	7.053	953	538	11.893
			%	.	28,2	59,3	8,0	4,5	100,0
	Terciaria	N	361	4.118	3.802	446	.	8.727	
		%	4,1	47,2	43,6	5,1	.	100,0	
	>=75	Total	N	2.682	45.014	73.842	16.268	4.057	141.864
			%	1,9	31,7	52,1	11,5	2,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.212	32.532	50.861	12.465	3.066	101.136
			%	2,2	32,2	50,3	12,3	3,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	227	6.510	15.390	1.761	991	24.879
			%	0,9	26,2	61,9	7,1	4,0	100,0
	Secundaria, superior	N	243	4.586	3.251	1.639	.	9.720	
		%	2,5	47,2	33,4	16,9	.	100,0	
	Terciaria	N	.	1.386	4.340	403	.	6.129	
		%	.	22,6	70,8	6,6	.	100,0	
Ambos	Total	N	43.253	566.138	1.053.915	188.302	39.399	1.891.006	
		%	2,3	29,9	55,7	10,0	2,1	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	12.628	163.840	252.862	50.728	8.869	488.927	
		%	2,6	33,5	51,7	10,4	1,8	100,0	
	Secundaria, inferior	N	7.553	108.907	186.859	27.177	6.725	337.220	
		%	2,2	32,3	55,4	8,1	2,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	17.786	191.947	374.210	68.519	16.074	668.536	
		%	2,7	28,7	56,0	10,2	2,4	100,0	
	Terciaria	N	5.286	101.444	239.984	41.878	7.732	396.323	
		%	1,3	25,6	60,6	10,6	2,0	100,0	
	15-24	Total	N	3.197	49.810	102.717	19.495	8.738	183.958
			%	1,7	27,1	55,8	10,6	4,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	254	3.658	13.410	3.078	905	21.304
			%	1,2	17,2	62,9	14,4	4,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.315	15.853	22.418	6.782	1.522	47.891	
		%	2,7	33,1	46,8	14,2	3,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 223. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	1.628	24.204	49.064	7.954	5.433	88.283
			%	1,8	27,4	55,6	9,0	6,2	100,0
		Terciaria	N	.	6.094	17.826	1.681	877	26.479
			%	.	23,0	67,3	6,3	3,3	100,0
	25-44	Total	N	17.815	186.267	371.435	67.771	13.846	657.135
		%	2,7	28,3	56,5	10,3	2,1	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	3.071	19.386	36.374	3.795	1.140	63.765
	%		4,8	30,4	57,0	6,0	1,8	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.598	29.148	53.817	4.799	1.384	91.745
	%		2,8	31,8	58,7	5,2	1,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	9.685	83.219	158.034	36.064	7.759	294.762
	%		3,3	28,2	53,6	12,2	2,6	100,0	
		Terciaria	N	2.462	54.514	123.210	23.112	3.564	206.862
	%		1,2	26,4	59,6	11,2	1,7	100,0	
	45-64	Total	N	12.201	182.435	352.116	61.320	8.352	616.424
		%	2,0	29,6	57,1	9,9	1,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.851	48.717	78.453	17.011	1.330	148.363
	%		1,9	32,8	52,9	11,5	0,9	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.483	39.702	59.980	10.889	1.926	114.979
	%		2,2	34,5	52,2	9,5	1,7	100,0	
		Secundaria, superior	N	5.509	64.893	136.897	18.163	1.990	227.452
	%		2,4	28,5	60,2	8,0	0,9	100,0	
		Terciaria	N	1.359	29.123	76.786	15.257	3.106	125.630
	%		1,1	23,2	61,1	12,1	2,5	100,0	
	65-74	Total	N	5.486	67.655	113.591	16.369	2.557	205.658
		%	2,7	32,9	55,2	8,0	1,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.830	35.916	50.895	9.479	750	99.869
	%		2,8	36,0	51,0	9,5	0,8	100,0	
		Secundaria, inferior	N	930	13.197	26.445	2.271	901	43.744
	%		2,1	30,2	60,5	5,2	2,1	100,0	
		Secundaria, superior	N	491	11.137	21.823	3.671	720	37.841
	%		1,3	29,4	57,7	9,7	1,9	100,0	
		Terciaria	N	1.235	7.406	14.429	948	185	24.204
	%		5,1	30,6	59,6	3,9	0,8	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 223. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	N	4.553	79.971	114.056	23.346	5.906	227.832
			%	2,0	35,1	50,1	10,2	2,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.622	56.163	73.731	17.365	4.744	155.625
			%	2,3	36,1	47,4	11,2	3,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	227	11.007	24.200	2.435	991	38.860
			%	0,6	28,3	62,3	6,3	2,6	100,0
		Secundaria, superior	N	473	8.494	8.393	2.667	171	20.198
			%	2,3	42,1	41,6	13,2	0,8	100,0
		Terciaria	N	230	4.306	7.733	879	.	13.149
			%	1,8	32,8	58,8	6,7	.	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 224. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Hombres	Total	CAPV	N	72.060	197.635	279.916	254.668	110.845	915.124	
			%	7,9	21,6	30,6	27,8	12,1	100,0	
		Araba	N	10.448	27.190	39.906	39.264	16.943	133.751	
			%	7,8	20,3	29,8	29,4	12,7	100,0	
		Gipuzkoa	N	17.351	55.944	83.987	91.744	44.785	293.812	
			%	5,9	19,0	28,6	31,2	15,2	100,0	
		Bizkaia	N	44.260	114.501	156.024	123.660	49.117	487.561	
			%	9,1	23,5	32,0	25,4	10,1	100,0	
		15-24	CAPV	N	14.541	27.829	25.235	18.092	8.760	94.458
				%	15,4	29,5	26,7	19,2	9,3	100,0
			Araba	N	2.940	5.292	3.759	1.981	899	14.869
		%		19,8	35,6	25,3	13,3	6,0	100,0	
			Gipuzkoa	N	2.566	8.707	7.053	8.461	4.517	31.305
		%		8,2	27,8	22,5	27,0	14,4	100,0	
			Bizkaia	N	9.036	13.830	14.424	7.650	3.344	48.284
		%		18,7	28,6	29,9	15,8	6,9	100,0	
		25-44	CAPV	N	33.027	84.886	111.336	76.858	30.203	336.309
				%	9,8	25,2	33,1	22,9	9,0	100,0
			Araba	N	5.467	11.976	16.530	12.967	5.123	52.062
		%		10,5	23,0	31,7	24,9	9,8	100,0	
			Gipuzkoa	N	7.467	25.257	35.871	25.141	13.053	106.790
		%		7,0	23,7	33,6	23,5	12,2	100,0	
			Bizkaia	N	20.092	47.653	58.935	38.750	12.027	177.458
		%		11,3	26,9	33,2	21,8	6,8	100,0	
	45-64	CAPV	N	18.183	62.672	99.513	90.936	31.351	302.655	
			%	6,0	20,7	32,9	30,0	10,4	100,0	
		Araba	N	1.625	8.270	14.537	14.048	4.271	42.751	
	%		3,8	19,3	34,0	32,9	10,0	100,0		
		Gipuzkoa	N	5.196	15.178	30.110	33.348	13.586	97.419	
	%		5,3	15,6	30,9	34,2	13,9	100,0		
		Bizkaia	N	11.362	39.224	54.866	43.540	13.493	162.485	
	%		7,0	24,1	33,8	26,8	8,3	100,0		
	65-74	CAPV	N	2.690	13.413	27.901	34.278	17.450	95.733	
			%	2,8	14,0	29,1	35,8	18,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 224. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres 65-74	Araba	N	247	764	2.660	6.386	3.107	13.163	
		%	1,9	5,8	20,2	48,5	23,6	100,0	
	Gipuzkoa	N	527	4.588	7.177	12.047	7.792	32.130	
		%	1,6	14,3	22,3	37,5	24,3	100,0	
	Bizkaia	N	1.916	8.062	18.065	15.846	6.550	50.440	
		%	3,8	16,0	35,8	31,4	13,0	100,0	
	>=75	CAPV	N	3.618	8.834	15.930	34.504	23.081	85.968
			%	4,2	10,3	18,5	40,1	26,8	100,0
		Araba	N	170	889	2.420	3.883	3.543	10.905
			%	1,6	8,1	22,2	35,6	32,5	100,0
		Gipuzkoa	N	1.594	2.213	3.776	12.748	5.837	26.168
			%	6,1	8,5	14,4	48,7	22,3	100,0
Bizkaia		N	1.854	5.732	9.734	17.874	13.701	48.895	
		%	3,8	11,7	19,9	36,6	28,0	100,0	
Mujeres		Total	N	41.620	148.683	273.101	325.097	187.381	975.882
			%	4,3	15,2	28,0	33,3	19,2	100,0
		Araba	N	5.824	20.895	36.959	49.654	23.440	136.772
			%	4,3	15,3	27,0	36,3	17,1	100,0
	Gipuzkoa	N	10.427	40.353	80.385	114.535	66.986	312.686	
		%	3,3	12,9	25,7	36,6	21,4	100,0	
	Bizkaia	N	25.370	87.435	155.757	160.908	96.955	526.425	
		%	4,8	16,6	29,6	30,6	18,4	100,0	
	15-24	CAPV	N	7.622	19.587	28.175	21.272	12.843	89.499
			%	8,5	21,9	31,5	23,8	14,4	100,0
		Araba	N	1.018	2.949	3.906	3.498	1.838	13.210
			%	7,7	22,3	29,6	26,5	13,9	100,0
Gipuzkoa		N	850	6.196	8.843	7.171	6.384	29.443	
		%	2,9	21,0	30,0	24,4	21,7	100,0	
Bizkaia		N	5.754	10.442	15.426	10.603	4.621	46.846	
		%	12,3	22,3	32,9	22,6	9,9	100,0	
25-44		CAPV	N	16.836	65.269	101.377	93.477	43.867	320.826
			%	5,2	20,3	31,6	29,1	13,7	100,0
		Araba	N	3.306	8.335	15.642	14.977	5.608	47.869
			%	6,9	17,4	32,7	31,3	11,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 224. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	4.702	16.190	30.933	31.829	18.251	101.905	
			%	4,6	15,9	30,4	31,2	17,9	100,0	
		Bizkaia	N	8.828	40.743	54.802	46.671	20.008	171.052	
	%		5,2	23,8	32,0	27,3	11,7	100,0		
		45-64	CAPV	N	10.549	45.900	91.555	108.697	57.068	313.769
	%			3,4	14,6	29,2	34,6	18,2	100,0	
		Araba	N	1.016	8.036	11.891	17.362	5.958	44.263	
	%		2,3	18,2	26,9	39,2	13,5	100,0		
		Gipuzkoa	N	3.085	11.904	24.735	39.954	19.984	99.662	
	%		3,1	11,9	24,8	40,1	20,1	100,0		
		Bizkaia	N	6.448	25.960	54.929	51.380	31.126	169.843	
	%		3,8	15,3	32,3	30,3	18,3	100,0		
		65-74	CAPV	N	4.049	10.602	26.296	41.456	27.521	109.925
	%			3,7	9,6	23,9	37,7	25,0	100,0	
		Araba	N	394	774	2.818	6.593	3.741	14.320	
	%		2,8	5,4	19,7	46,0	26,1	100,0		
		Gipuzkoa	N	999	2.806	6.671	17.146	8.497	36.120	
	%		2,8	7,8	18,5	47,5	23,5	100,0		
		Bizkaia	N	2.656	7.021	16.807	17.717	15.283	59.484	
	%		4,5	11,8	28,3	29,8	25,7	100,0		
		>=75	CAPV	N	2.564	7.325	25.699	60.195	46.082	141.864
	%			1,8	5,2	18,1	42,4	32,5	100,0	
		Araba	N	90	800	2.701	7.224	6.295	17.110	
	%		0,5	4,7	15,8	42,2	36,8	100,0		
	Gipuzkoa	N	790	3.257	9.204	18.434	13.870	45.555		
%		1,7	7,1	20,2	40,5	30,4	100,0			
	Bizkaia	N	1.684	3.269	13.794	34.536	25.917	79.200		
%		2,1	4,1	17,4	43,6	32,7	100,0			
Ambos	Total	CAPV	N	113.680	346.317	553.018	579.766	298.226	1.891.006	
			%	6,0	18,3	29,2	30,7	15,8	100,0	
		Araba	N	16.272	48.084	76.864	88.918	40.383	270.523	
	%		6,0	17,8	28,4	32,9	14,9	100,0		
		Gipuzkoa	N	27.778	96.297	164.372	206.280	111.771	606.497	
	%		4,6	15,9	27,1	34,0	18,4	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 224. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	Total	Bizkaia	N	69.630	201.936	311.781	284.568	146.072	1.013.987
			%	6,9	19,9	30,7	28,1	14,4	100,0
	15-24	CAPV	N	22.163	47.416	53.410	39.364	21.604	183.958
			%	12,0	25,8	29,0	21,4	11,7	100,0
		Araba	N	3.958	8.241	7.665	5.478	2.737	28.079
			%	14,1	29,3	27,3	19,5	9,7	100,0
		Gipuzkoa	N	3.416	14.903	15.896	15.632	10.901	60.748
			%	5,6	24,5	26,2	25,7	17,9	100,0
		Bizkaia	N	14.789	24.272	29.850	18.253	7.966	95.130
			%	15,5	25,5	31,4	19,2	8,4	100,0
	25-44	CAPV	N	49.863	150.154	212.713	170.335	74.069	657.135
			%	7,6	22,8	32,4	25,9	11,3	100,0
		Araba	N	8.773	20.311	32.172	27.944	10.731	99.930
			%	8,8	20,3	32,2	28,0	10,7	100,0
		Gipuzkoa	N	12.169	41.448	66.804	56.970	31.303	208.695
			%	5,8	19,9	32,0	27,3	15,0	100,0
		Bizkaia	N	28.921	88.396	113.737	85.421	32.035	348.509
			%	8,3	25,4	32,6	24,5	9,2	100,0
	45-64	CAPV	N	28.732	108.572	191.068	199.633	88.419	616.424
			%	4,7	17,6	31,0	32,4	14,3	100,0
		Araba	N	2.641	16.306	26.429	31.410	10.229	87.015
			%	3,0	18,7	30,4	36,1	11,8	100,0
		Gipuzkoa	N	8.281	27.082	54.845	73.302	33.571	197.081
			%	4,2	13,7	27,8	37,2	17,0	100,0
		Bizkaia	N	17.810	65.184	109.794	94.921	44.619	332.328
			%	5,4	19,6	33,0	28,6	13,4	100,0
	65-74	CAPV	N	6.740	24.015	54.197	75.735	44.971	205.658
			%	3,3	11,7	26,4	36,8	21,9	100,0
		Araba	N	641	1.538	5.477	12.979	6.848	27.483
			%	2,3	5,6	19,9	47,2	24,9	100,0
		Gipuzkoa	N	1.527	7.394	13.848	29.193	16.289	68.251
			%	2,2	10,8	20,3	42,8	23,9	100,0
		Bizkaia	N	4.572	15.083	34.873	33.563	21.833	109.924
			%	4,2	13,7	31,7	30,5	19,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 224. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	CAPV	N	6.182	16.159	41.629	94.699	69.163	227.832
			%	2,7	7,1	18,3	41,6	30,4	100,0
		Araba	N	259	1.688	5.121	11.107	9.839	28.015
			%	0,9	6,0	18,3	39,6	35,1	100,0
		Gipuzkoa	N	2.385	5.470	12.980	31.182	19.706	71.723
			%	3,3	7,6	18,1	43,5	27,5	100,0
		Bizkaia	N	3.538	9.001	23.528	52.410	39.618	128.094
			%	2,8	7,0	18,4	40,9	30,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 225. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
		A diario						
Hombres Total	Total	N	72.060	197.446	278.944	254.668	110.746	913.863
		%	7,9	21,6	30,5	27,9	12,1	100,0
I	N	6.083	24.617	38.822	34.667	9.501	113.690	
	%	5,4	21,7	34,1	30,5	8,4	100,0	
II	N	6.851	16.301	24.347	23.345	7.362	78.206	
	%	8,8	20,8	31,1	29,9	9,4	100,0	
III	N	11.424	41.900	59.386	53.882	21.763	188.355	
	%	6,1	22,2	31,5	28,6	11,6	100,0	
IV	N	37.721	99.931	130.122	121.833	60.699	450.306	
	%	8,4	22,2	28,9	27,1	13,5	100,0	
V	N	9.981	14.696	26.268	20.942	11.421	83.307	
	%	12,0	17,6	31,5	25,1	13,7	100,0	
15-24	Total	N	14.541	27.829	24.677	18.092	8.760	93.900
		%	15,5	29,6	26,3	19,3	9,3	100,0
I	N	1.422	4.930	4.644	3.141	498	14.634	
	%	9,7	33,7	31,7	21,5	3,4	100,0	
II	N	2.451	3.414	2.935	2.041	147	10.988	
	%	22,3	31,1	26,7	18,6	1,3	100,0	
III	N	1.815	5.636	5.866	1.858	1.656	16.830	
	%	10,8	33,5	34,9	11,0	9,8	100,0	
IV	N	7.823	10.623	9.717	8.555	6.019	42.737	
	%	18,3	24,9	22,7	20,0	14,1	100,0	
V	N	1.030	3.226	1.516	2.498	440	8.711	
	%	11,8	37,0	17,4	28,7	5,1	100,0	
25-44	Total	N	33.027	84.886	111.336	76.858	30.203	336.309
		%	9,8	25,2	33,1	22,9	9,0	100,0
I	N	3.018	12.511	13.531	11.730	2.942	43.732	
	%	6,9	28,6	30,9	26,8	6,7	100,0	
II	N	2.218	8.036	12.080	8.196	1.966	32.496	
	%	6,8	24,7	37,2	25,2	6,1	100,0	
III	N	6.864	16.118	20.116	14.960	4.199	62.257	
	%	11,0	25,9	32,3	24,0	6,7	100,0	
IV	N	15.616	41.666	52.752	34.312	16.046	160.392	
	%	9,7	26,0	32,9	21,4	10,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 225. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres 25-44 V	N		5.310	6.555	12.858	7.660	5.050	37.432
	%		14,2	17,5	34,3	20,5	13,5	100,0
45-64 Total	N		18.183	62.484	99.513	90.936	31.252	302.368
	%		6,0	20,7	32,9	30,1	10,3	100,0
I	N		1.243	5.472	15.305	12.680	3.207	37.907
	%		3,3	14,4	40,4	33,5	8,5	100,0
II	N		1.951	3.600	6.770	7.721	3.378	23.419
	%		8,3	15,4	28,9	33,0	14,4	100,0
III	N		1.940	14.491	23.181	20.600	6.110	66.322
	%		2,9	21,8	35,0	31,1	9,2	100,0
IV	N		9.956	35.251	44.746	44.152	16.508	150.614
	%		6,6	23,4	29,7	29,3	11,0	100,0
V	N		3.093	3.670	9.512	5.782	2.048	24.106
	%		12,8	15,2	39,5	24,0	8,5	100,0
65-74 Total	N		2.690	13.413	27.901	34.278	17.450	95.733
	%		2,8	14,0	29,1	35,8	18,2	100,0
I	N		400	1.433	4.479	5.041	2.399	13.753
	%		2,9	10,4	32,6	36,7	17,4	100,0
II	N		.	1.095	1.777	2.614	1.376	6.862
	%		.	16,0	25,9	38,1	20,0	100,0
III	N		469	3.196	6.671	7.388	4.052	21.777
	%		2,2	14,7	30,6	33,9	18,6	100,0
IV	N		1.539	7.003	13.490	17.586	8.136	47.753
	%		3,2	14,7	28,2	36,8	17,0	100,0
V	N		282	686	1.484	1.650	1.487	5.588
	%		5,0	12,3	26,6	29,5	26,6	100,0
>=75 Total	N		3.618	8.834	15.515	34.504	23.081	85.553
	%		4,2	10,3	18,1	40,3	27,0	100,0
I	N		.	271	863	2.075	455	3.663
	%		.	7,4	23,6	56,6	12,4	100,0
II	N		231	155	785	2.773	495	4.440
	%		5,2	3,5	17,7	62,5	11,2	100,0
III	N		335	2.460	3.553	9.076	5.746	21.169
	%		1,6	11,6	16,8	42,9	27,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 225. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres >=75	IV	N	2.786	5.389	9.417	17.228	13.990	48.810	
		%	5,7	11,0	19,3	35,3	28,7	100,0	
	V	N	266	559	898	3.352	2.395	7.470	
		%	3,6	7,5	12,0	44,9	32,1	100,0	
Mujeres	Total	Total N	41.196	148.683	272.746	324.270	186.598	973.492	
		%	4,2	15,3	28,0	33,3	19,2	100,0	
	I	N	4.628	20.513	29.350	35.009	15.338	104.838	
		%	4,4	19,6	28,0	33,4	14,6	100,0	
	II	N	4.433	13.975	30.418	29.239	16.963	95.028	
		%	4,7	14,7	32,0	30,8	17,9	100,0	
	III	N	11.519	41.762	69.225	74.104	45.497	242.107	
		%	4,8	17,2	28,6	30,6	18,8	100,0	
	IV	N	14.417	51.982	99.109	126.393	68.541	360.441	
		%	4,0	14,4	27,5	35,1	19,0	100,0	
	V	N	6.199	20.451	44.644	59.524	40.259	171.077	
		%	3,6	12,0	26,1	34,8	23,5	100,0	
	15-24	Total	N	7.368	19.587	27.919	21.272	12.387	88.533
			%	8,3	22,1	31,5	24,0	14,0	100,0
	I	N	1.679	4.682	3.250	3.686	1.265	14.562	
		%	11,5	32,1	22,3	25,3	8,7	100,0	
	II	N	548	1.838	5.595	3.025	2.491	13.497	
		%	4,1	13,6	41,5	22,4	18,5	100,0	
	III	N	1.756	4.258	6.893	5.510	1.653	20.069	
		%	8,7	21,2	34,3	27,5	8,2	100,0	
IV	N	2.841	7.955	9.269	6.393	5.156	31.614		
	%	9,0	25,2	29,3	20,2	16,3	100,0		
V	N	544	855	2.913	2.658	1.821	8.792		
	%	6,2	9,7	33,1	30,2	20,7	100,0		
25-44	Total	N	16.836	65.269	101.377	93.208	43.641	320.330	
		%	5,3	20,4	31,6	29,1	13,6	100,0	
I	N	1.919	10.798	12.412	14.245	5.712	45.086		
	%	4,3	23,9	27,5	31,6	12,7	100,0		
II	N	1.986	6.509	13.921	8.869	5.939	37.223		
	%	5,3	17,5	37,4	23,8	16,0	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 225. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	6.044	19.166	24.419	20.400	12.001	82.029
			%	7,4	23,4	29,8	24,9	14,6	100,0
		IV	N	4.076	22.664	34.776	34.903	14.306	110.725
			%	3,7	20,5	31,4	31,5	12,9	100,0
		V	N	2.812	6.132	15.849	14.791	5.683	45.267
			%	6,2	13,5	35,0	32,7	12,6	100,0
	45-64	Total	N	10.378	45.900	91.555	108.697	57.068	313.598
			%	3,3	14,6	29,2	34,7	18,2	100,0
	I	N	741	3.725	10.839	12.506	4.306	32.116	
		%	2,3	11,6	33,7	38,9	13,4	100,0	
	II	N	1.795	4.622	6.152	10.286	3.938	26.792	
		%	6,7	17,2	23,0	38,4	14,7	100,0	
	III	N	1.426	14.778	28.997	27.655	15.785	88.641	
		%	1,6	16,7	32,7	31,2	17,8	100,0	
	IV	N	4.483	13.714	29.500	38.587	17.818	104.102	
		%	4,3	13,2	28,3	37,1	17,1	100,0	
	V	N	1.934	9.061	16.067	19.663	15.222	61.946	
		%	3,1	14,6	25,9	31,7	24,6	100,0	
	65-74	Total	N	4.049	10.602	26.296	41.301	27.521	109.770
			%	3,7	9,7	24,0	37,6	25,1	100,0
	I	N	289	1.135	1.281	1.455	3.039	7.199	
		%	4,0	15,8	17,8	20,2	42,2	100,0	
	II	N	105	460	2.149	2.883	1.627	7.225	
		%	1,4	6,4	29,8	39,9	22,5	100,0	
III	N	1.665	1.846	4.649	8.639	6.100	22.899		
	%	7,3	8,1	20,3	37,7	26,6	100,0		
IV	N	1.867	4.799	14.246	19.284	9.938	50.134		
	%	3,7	9,6	28,4	38,5	19,8	100,0		
V	N	124	2.362	3.970	9.040	6.817	22.312		
	%	0,6	10,6	17,8	40,5	30,6	100,0		
>=75	Total	N	2.564	7.325	25.599	59.792	45.981	141.261	
		%	1,8	5,2	18,1	42,3	32,6	100,0	
I	N	.	174	1.568	3.117	1.016	5.875		
	%	.	3,0	26,7	53,1	17,3	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 225. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	>=75	II	N	.	547	2.601	4.176	2.968	10.292
			%	.	5,3	25,3	40,6	28,8	100,0
		III	N	628	1.713	4.268	11.900	9.959	28.468
			%	2,2	6,0	15,0	41,8	35,0	100,0
		IV	N	1.150	2.851	11.317	27.226	21.323	63.866
			%	1,8	4,5	17,7	42,6	33,4	100,0
	V	N	786	2.041	5.846	13.372	10.716	32.760	
		%	2,4	6,2	17,8	40,8	32,7	100,0	
	Ambos	Total	Total N	113.255	346.129	551.689	578.938	297.344	1.887.356
			%	6,0	18,3	29,2	30,7	15,8	100,0
		I	N	10.711	45.130	68.172	69.676	24.839	218.528
			%	4,9	20,7	31,2	31,9	11,4	100,0
II		N	11.284	30.276	54.765	52.585	24.325	173.234	
		%	6,5	17,5	31,6	30,4	14,0	100,0	
III		N	22.943	83.662	128.611	127.986	67.260	430.462	
		%	5,3	19,4	29,9	29,7	15,6	100,0	
IV		N	52.138	151.913	229.230	248.226	129.240	810.747	
		%	6,4	18,7	28,3	30,6	15,9	100,0	
V		N	16.180	35.147	70.912	80.465	51.680	254.385	
		%	6,4	13,8	27,9	31,6	20,3	100,0	
15-24		Total	N	21.910	47.416	52.596	39.364	21.147	182.434
			%	12,0	26,0	28,8	21,6	11,6	100,0
		I	N	3.101	9.612	7.893	6.827	1.763	29.196
			%	10,6	32,9	27,0	23,4	6,0	100,0
		II	N	2.999	5.252	8.529	5.066	2.638	24.485
			%	12,2	21,4	34,8	20,7	10,8	100,0
	III	N	3.571	9.894	12.758	7.368	3.308	36.900	
		%	9,7	26,8	34,6	20,0	9,0	100,0	
	IV	N	10.664	18.577	18.986	14.947	11.176	74.351	
		%	14,3	25,0	25,5	20,1	15,0	100,0	
	V	N	1.575	4.081	4.429	5.156	2.262	17.503	
		%	9,0	23,3	25,3	29,5	12,9	100,0	
25-44	Total	N	49.863	150.154	212.713	170.066	73.844	656.640	
		%	7,6	22,9	32,4	25,9	11,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 225. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	25-44	I	N	4.937	23.309	25.944	25.975	8.654	88.818
			%	5,6	26,2	29,2	29,2	9,7	100,0
		II	N	4.204	14.545	26.000	17.065	7.905	69.719
			%	6,0	20,9	37,3	24,5	11,3	100,0
		III	N	12.908	35.284	44.534	35.361	16.199	144.286
			%	8,9	24,5	30,9	24,5	11,2	100,0
		IV	N	19.693	64.330	87.528	69.215	30.352	271.117
			%	7,3	23,7	32,3	25,5	11,2	100,0
		V	N	8.122	12.687	28.707	22.450	10.733	82.699
			%	9,8	15,3	34,7	27,1	13,0	100,0
	45-64	Total	N	28.561	108.383	191.068	199.633	88.320	615.965
			%	4,6	17,6	31,0	32,4	14,3	100,0
		I	N	1.985	9.196	26.144	25.186	7.512	70.023
			%	2,8	13,1	37,3	36,0	10,7	100,0
		II	N	3.745	8.222	12.922	18.007	7.316	50.212
			%	7,5	16,4	25,7	35,9	14,6	100,0
		III	N	3.366	29.269	52.177	48.255	21.896	154.963
			%	2,2	18,9	33,7	31,1	14,1	100,0
		IV	N	14.439	48.965	74.246	82.739	34.326	254.716
			%	5,7	19,2	29,1	32,5	13,5	100,0
		V	N	5.027	12.731	25.579	25.445	17.270	86.052
			%	5,8	14,8	29,7	29,6	20,1	100,0
	65-74	Total	N	6.740	24.015	54.197	75.580	44.971	205.503
			%	3,3	11,7	26,4	36,8	21,9	100,0
		I	N	689	2.568	5.761	6.496	5.439	20.952
			%	3,3	12,3	27,5	31,0	26,0	100,0
		II	N	105	1.556	3.927	5.497	3.003	14.087
			%	0,7	11,0	27,9	39,0	21,3	100,0
		III	N	2.135	5.042	11.321	16.026	10.152	44.676
			%	4,8	11,3	25,3	35,9	22,7	100,0
		IV	N	3.406	11.802	27.736	36.870	18.074	97.887
			%	3,5	12,1	28,3	37,7	18,5	100,0
		V	N	405	3.048	5.454	10.690	8.304	27.901
			%	1,5	10,9	19,5	38,3	29,8	100,0
	>=75	Total	N	6.182	16.159	41.114	94.296	69.062	226.814

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

978

Tabla 225. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	%	2,7	7,1	18,1	41,6	30,4	100,0
		I	N	.	445	2.431	5.192	1.471	9.538
			%	.	4,7	25,5	54,4	15,4	100,0
		II	N	231	702	3.386	6.949	3.463	14.731
			%	1,6	4,8	23,0	47,2	23,5	100,0
		III	N	963	4.173	7.820	20.976	15.704	49.638
			%	1,9	8,4	15,8	42,3	31,6	100,0
		IV	N	3.936	8.240	20.734	44.455	35.313	112.676
			%	3,5	7,3	18,4	39,5	31,3	100,0
		V	N	1.052	2.600	6.743	16.724	13.111	40.231
			%	2,6	6,5	16,8	41,6	32,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 226. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	Total	N	72.060	197.635	279.916	254.668	110.845	915.124
		%	7,9	21,6	30,6	27,8	12,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	12.337	38.954	55.764	65.514	38.031	210.600
		%	5,9	18,5	26,5	31,1	18,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	20.256	36.568	48.970	42.444	19.215	167.454
		%	12,1	21,8	29,2	25,3	11,5	100,0
	Secundaria, superior	N	29.319	83.054	116.676	95.506	36.114	360.670
		%	8,1	23,0	32,3	26,5	10,0	100,0
	Terciaria	N	10.147	39.059	58.506	51.205	17.484	176.400
		%	5,8	22,1	33,2	29,0	9,9	100,0
	15-24 Total	N	14.541	27.829	25.235	18.092	8.760	94.458
		%	15,4	29,5	26,7	19,2	9,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	742	3.326	3.609	961	1.280	9.918
		%	7,5	33,5	36,4	9,7	12,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	7.081	10.603	6.973	4.056	2.416	31.129
		%	22,7	34,1	22,4	13,0	7,8	100,0
	Secundaria, superior	N	5.408	10.087	12.458	10.576	4.310	42.840
		%	12,6	23,5	29,1	24,7	10,1	100,0
	Terciaria	N	1.310	3.813	2.195	2.499	754	10.572
		%	12,4	36,1	20,8	23,6	7,1	100,0
	25-44 Total	N	33.027	84.886	111.336	76.858	30.203	336.309
		%	9,8	25,2	33,1	22,9	9,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.361	8.818	10.262	11.267	3.067	37.776
		%	11,5	23,3	27,2	29,8	8,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	7.982	11.791	17.583	8.965	6.488	52.808
		%	15,1	22,3	33,3	17,0	12,3	100,0
	Secundaria, superior	N	16.064	42.201	55.367	36.494	14.147	164.274
		%	9,8	25,7	33,7	22,2	8,6	100,0
	Terciaria	N	4.620	22.076	28.124	20.132	6.500	81.451
		%	5,7	27,1	34,5	24,7	8,0	100,0
	45-64 Total	N	18.183	62.672	99.513	90.936	31.351	302.655
		%	6,0	20,7	32,9	30,0	10,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.305	16.836	21.876	19.689	8.694	70.400
		%	4,7	23,9	31,1	28,0	12,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 226. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	4.240	9.378	17.406	17.578	4.643	53.244
			%	8,0	17,6	32,7	33,0	8,7	100,0
		Secundaria, superior	N	7.355	25.997	37.502	34.180	12.096	117.130
			%	6,3	22,2	32,0	29,2	10,3	100,0
		Terciaria	N	3.283	10.462	22.729	19.489	5.919	61.881
			%	5,3	16,9	36,7	31,5	9,6	100,0
	65-74	Total	N	2.690	13.413	27.901	34.278	17.450	95.733
			%	2,8	14,0	29,1	35,8	18,2	100,0
	>=75	Sin estudios, primaria	N	1.409	4.157	9.508	13.985	8.957	38.017
			%	3,7	10,9	25,0	36,8	23,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	472	3.103	4.944	4.832	2.941	16.291
			%	2,9	19,0	30,3	29,7	18,1	100,0
		Secundaria, superior	N	105	4.320	8.865	9.683	2.974	25.948
			%	0,4	16,7	34,2	37,3	11,5	100,0
		Terciaria	N	704	1.833	4.585	5.778	2.578	15.477
			%	4,5	11,8	29,6	37,3	16,7	100,0
		Total	N	3.618	8.834	15.930	34.504	23.081	85.968
			%	4,2	10,3	18,5	40,1	26,8	100,0
Sin estudios, primaria		N	2.519	5.817	10.508	19.612	16.033	54.489	
		%	4,6	10,7	19,3	36,0	29,4	100,0	
Secundaria, inferior	N	481	1.694	2.065	7.013	2.728	13.981		
	%	3,4	12,1	14,8	50,2	19,5	100,0		
Secundaria, superior	N	387	449	2.483	4.572	2.587	10.478		
	%	3,7	4,3	23,7	43,6	24,7	100,0		
Terciaria	N	231	875	874	3.307	1.733	7.020		
	%	3,3	12,5	12,5	47,1	24,7	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	41.620	148.683	273.101	325.097	187.381	975.882
		%	4,3	15,2	28,0	33,3	19,2	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	9.379	28.186	68.084	100.305	72.374	278.327	
		%	3,4	10,1	24,5	36,0	26,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	8.059	21.970	47.056	59.074	33.608	169.766	
		%	4,7	12,9	27,7	34,8	19,8	100,0	
	Secundaria, superior	N	12.695	57.410	94.354	97.776	45.631	307.866	
		%	4,1	18,6	30,6	31,8	14,8	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 226. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N	11.488	41.117	63.607	67.942	35.768	219.923
			%	5,2	18,7	28,9	30,9	16,3	100,0
	15-24	Total	N	7.622	19.587	28.175	21.272	12.843	89.499
			%	8,5	21,9	31,5	23,8	14,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	990	1.833	2.892	2.387	3.285	11.386
			%	8,7	16,1	25,4	21,0	28,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.522	3.631	4.767	4.250	1.593	16.763
			%	15,0	21,7	28,4	25,4	9,5	100,0
		Secundaria, superior	N	2.668	10.143	15.040	11.937	5.656	45.443
			%	5,9	22,3	33,1	26,3	12,4	100,0
		Terciaria	N	1.443	3.981	5.475	2.698	2.310	15.907
			%	9,1	25,0	34,4	17,0	14,5	100,0
	25-44	Total	N	16.836	65.269	101.377	93.477	43.867	320.826
			%	5,2	20,3	31,6	29,1	13,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.251	4.448	8.022	9.458	2.810	25.990
			%	4,8	17,1	30,9	36,4	10,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.811	6.485	14.147	10.846	5.648	38.937
			%	4,7	16,7	36,3	27,9	14,5	100,0
		Secundaria, superior	N	6.456	27.505	41.963	38.287	16.277	130.487
			%	4,9	21,1	32,2	29,3	12,5	100,0
		Terciaria	N	7.318	26.830	37.246	34.886	19.132	125.412
			%	5,8	21,4	29,7	27,8	15,3	100,0
	45-64	Total	N	10.549	45.900	91.555	108.697	57.068	313.769
			%	3,4	14,6	29,2	34,6	18,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.764	11.243	24.865	24.044	15.047	77.963
			%	3,5	14,4	31,9	30,8	19,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.707	7.049	16.562	22.249	13.168	61.735
			%	4,4	11,4	26,8	36,0	21,3	100,0
		Secundaria, superior	N	2.831	18.237	32.095	37.951	19.208	110.322
			%	2,6	16,5	29,1	34,4	17,4	100,0
		Terciaria	N	2.247	9.371	18.032	24.453	9.646	63.749
			%	3,5	14,7	28,3	38,4	15,1	100,0
	65-74	Total	N	4.049	10.602	26.296	41.456	27.521	109.925
			%	3,7	9,6	23,9	37,7	25,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 226. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	2.231	4.961	15.250	23.227	16.183	61.852
			%	3,6	8,0	24,7	37,6	26,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	597	3.357	6.764	10.953	5.782	27.452
			%	2,2	12,2	24,6	39,9	21,1	100,0
		Secundaria, superior	N	741	1.350	2.795	4.101	2.907	11.893
			%	6,2	11,3	23,5	34,5	24,4	100,0
	Terciaria	N	480	934	1.488	3.175	2.649	8.727	
		%	5,5	10,7	17,1	36,4	30,4	100,0	
	>=75	Total	N	2.564	7.325	25.699	60.195	46.082	141.864
			%	1,8	5,2	18,1	42,4	32,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.142	5.702	17.055	41.188	35.049	101.136
			%	2,1	5,6	16,9	40,7	34,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	422	1.448	4.816	10.776	7.417	24.879
			%	1,7	5,8	19,4	43,3	29,8	100,0
		Secundaria, superior	N	.	175	2.461	5.500	1.584	9.720
			%	.	1,8	25,3	56,6	16,3	100,0
		Terciaria	N	.	.	1.367	2.730	2.032	6.129
			%	.	.	22,3	44,5	33,1	100,0
Ambos		Total	N	113.680	346.317	553.018	579.766	298.226	1.891.006
			%	6,0	18,3	29,2	30,7	15,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	21.716	67.140	123.848	165.818	110.405	488.927	
		%	4,4	13,7	25,3	33,9	22,6	100,0	
	Secundaria, inferior	N	28.315	58.538	96.026	101.519	52.823	337.220	
		%	8,4	17,4	28,5	30,1	15,7	100,0	
	Secundaria, superior	N	42.014	140.464	211.031	193.281	81.745	668.536	
		%	6,3	21,0	31,6	28,9	12,2	100,0	
	Terciaria	N	21.634	80.176	122.114	119.147	53.252	396.323	
		%	5,5	20,2	30,8	30,1	13,4	100,0	
	15-24	Total	N	22.163	47.416	53.410	39.364	21.604	183.958
			%	12,0	25,8	29,0	21,4	11,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.732	5.158	6.502	3.348	4.564	21.304
			%	8,1	24,2	30,5	15,7	21,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	9.603	14.234	11.740	8.306	4.009	47.891	
		%	20,1	29,7	24,5	17,3	8,4	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 226. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	8.075	20.230	27.499	22.513	9.966	88.283
			%	9,1	22,9	31,1	25,5	11,3	100,0
		Terciaria	N	2.753	7.794	7.670	5.197	3.065	26.479
			%	10,4	29,4	29,0	19,6	11,6	100,0
	25-44	Total	N	49.863	150.154	212.713	170.335	74.069	657.135
			%	7,6	22,8	32,4	25,9	11,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.612	13.266	18.284	20.726	5.877	63.765
			%	8,8	20,8	28,7	32,5	9,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	9.794	18.276	31.729	19.811	12.136	91.745
			%	10,7	19,9	34,6	21,6	13,2	100,0
		Secundaria, superior	N	22.520	69.707	97.330	74.781	30.424	294.762
			%	7,6	23,6	33,0	25,4	10,3	100,0
		Terciaria	N	11.937	48.906	65.370	55.018	25.632	206.862
			%	5,8	23,6	31,6	26,6	12,4	100,0
	45-64	Total	N	28.732	108.572	191.068	199.633	88.419	616.424
			%	4,7	17,6	31,0	32,4	14,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.070	28.078	46.741	43.733	23.741	148.363
			%	4,1	18,9	31,5	29,5	16,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.947	16.426	33.968	39.827	17.811	114.979
			%	6,0	14,3	29,5	34,6	15,5	100,0
		Secundaria, superior	N	10.186	44.234	69.598	72.131	31.303	227.452
			%	4,5	19,4	30,6	31,7	13,8	100,0
		Terciaria	N	5.529	19.833	40.761	43.942	15.564	125.630
			%	4,4	15,8	32,4	35,0	12,4	100,0
	65-74	Total	N	6.740	24.015	54.197	75.735	44.971	205.658
			%	3,3	11,7	26,4	36,8	21,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.641	9.118	24.758	37.213	25.140	99.869
			%	3,6	9,1	24,8	37,3	25,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.069	6.460	11.707	15.785	8.723	43.744
			%	2,4	14,8	26,8	36,1	19,9	100,0
		Secundaria, superior	N	846	5.670	11.660	13.784	5.881	37.841
			%	2,2	15,0	30,8	36,4	15,5	100,0
		Terciaria	N	1.184	2.767	6.073	8.953	5.226	24.204
			%	4,9	11,4	25,1	37,0	21,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 226. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	Total	N	6.182	16.159	41.629	94.699	69.163	227.832
			%	2,7	7,1	18,3	41,6	30,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.661	11.519	27.563	60.800	51.082	155.625
			%	3,0	7,4	17,7	39,1	32,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	903	3.142	6.881	17.790	10.145	38.860
			%	2,3	8,1	17,7	45,8	26,1	100,0
		Secundaria, superior	N	387	624	4.944	10.072	4.171	20.198
			%	1,9	3,1	24,5	49,9	20,7	100,0
		Terciaria	N	231	875	2.241	6.037	3.765	13.149
			%	1,8	6,7	17,0	45,9	28,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 227. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y territorio histórico

Hombres	Total	CAPV	N	A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
				659.003	151.939	55.762	30.405	18.016	915.124
			%	72,0	16,6	6,1	3,3	2,0	100,0
		Araba	N	106.077	15.279	6.017	3.933	2.444	133.751
			%	79,3	11,4	4,5	2,9	1,8	100,0
		Gipuzkoa	N	212.261	47.189	18.824	9.732	5.805	293.812
			%	72,2	16,1	6,4	3,3	2,0	100,0
		Bizkaia	N	340.664	89.471	30.921	16.739	9.767	487.561
			%	69,9	18,4	6,3	3,4	2,0	100,0
	15-24	CAPV	N	65.366	21.670	3.708	2.252	1.462	94.458
			%	69,2	22,9	3,9	2,4	1,5	100,0
		Araba	N	11.557	2.935	245	.	132	14.869
			%	77,7	19,7	1,7	.	0,9	100,0
		Gipuzkoa	N	23.084	6.204	1.166	581	270	31.305
			%	73,7	19,8	3,7	1,9	0,9	100,0
		Bizkaia	N	30.726	12.531	2.297	1.671	1.059	48.284
			%	63,6	26,0	4,8	3,5	2,2	100,0
	25-44	CAPV	N	232.542	63.106	24.922	11.175	4.565	336.309
			%	69,1	18,8	7,4	3,3	1,4	100,0
		Araba	N	40.486	6.051	3.267	2.096	162	52.062
			%	77,8	11,6	6,3	4,0	0,3	100,0
		Gipuzkoa	N	74.755	19.095	8.101	3.305	1.534	106.790
			%	70,0	17,9	7,6	3,1	1,4	100,0
		Bizkaia	N	117.301	37.960	13.554	5.774	2.869	177.458
			%	66,1	21,4	7,6	3,3	1,6	100,0
	45-64	CAPV	N	216.158	48.597	20.605	10.162	7.134	302.655
			%	71,4	16,1	6,8	3,4	2,4	100,0
		Araba	N	32.591	5.264	2.224	1.536	1.136	42.751
			%	76,2	12,3	5,2	3,6	2,7	100,0
		Gipuzkoa	N	68.591	15.051	8.334	2.612	2.831	97.419
			%	70,4	15,4	8,6	2,7	2,9	100,0
		Bizkaia	N	114.976	28.282	10.046	6.014	3.167	162.485
			%	70,8	17,4	6,2	3,7	1,9	100,0
	65-74	CAPV	N	73.094	12.531	4.055	4.592	1.462	95.733
			%	76,4	13,1	4,2	4,8	1,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 227. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres 65-74	Araba	N	11.706	667	194	302	295	13.163	
		%	88,9	5,1	1,5	2,3	2,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	24.223	4.955	607	1.875	470	32.130	
		%	75,4	15,4	1,9	5,8	1,5	100,0	
	Bizkaia	N	37.165	6.909	3.255	2.415	697	50.440	
		%	73,7	13,7	6,5	4,8	1,4	100,0	
	>=75	CAPV	N	71.843	6.034	2.473	2.224	3.393	85.968
			%	83,6	7,0	2,9	2,6	3,9	100,0
		Araba	N	9.737	362	87	.	719	10.905
			%	89,3	3,3	0,8	.	6,6	100,0
		Gipuzkoa	N	21.609	1.883	617	1.359	700	26.168
			%	82,6	7,2	2,4	5,2	2,7	100,0
Bizkaia		N	40.497	3.789	1.769	865	1.975	48.895	
		%	82,8	7,8	3,6	1,8	4,0	100,0	
Mujeres		Total CAPV	N	757.206	145.038	40.335	16.261	17.042	975.882
			%	77,6	14,9	4,1	1,7	1,7	100,0
		Araba	N	113.264	15.872	4.398	943	2.295	136.772
			%	82,8	11,6	3,2	0,7	1,7	100,0
	Gipuzkoa	N	237.823	48.244	13.297	7.309	6.013	312.686	
		%	76,1	15,4	4,3	2,3	1,9	100,0	
	Bizkaia	N	406.119	80.923	22.640	8.010	8.734	526.425	
		%	77,1	15,4	4,3	1,5	1,7	100,0	
	15-24	CAPV	N	63.362	18.289	5.537	1.402	909	89.499
			%	70,8	20,4	6,2	1,6	1,0	100,0
		Araba	N	10.191	2.096	722	.	202	13.210
			%	77,1	15,9	5,5	.	1,5	100,0
Gipuzkoa		N	20.528	6.408	1.546	734	227	29.443	
		%	69,7	21,8	5,2	2,5	0,8	100,0	
Bizkaia		N	32.644	9.785	3.270	667	480	46.846	
		%	69,7	20,9	7,0	1,4	1,0	100,0	
25-44		CAPV	N	236.174	55.893	13.744	7.468	7.546	320.826
			%	73,6	17,4	4,3	2,3	2,4	100,0
		Araba	N	37.464	6.870	1.728	662	1.145	47.869
			%	78,3	14,4	3,6	1,4	2,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 227. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	74.227	17.989	3.840	4.331	1.518	101.905	
			%	72,8	17,7	3,8	4,2	1,5	100,0	
		Bizkaia	N	124.483	31.034	8.176	2.476	4.883	171.052	
	%		72,8	18,1	4,8	1,4	2,9	100,0		
		45-64	CAPV	N	245.060	47.915	11.152	4.805	4.836	313.769
	%			78,1	15,3	3,6	1,5	1,5	100,0	
		Araba	N	36.452	5.352	1.722	101	636	44.263	
	%		82,4	12,1	3,9	0,2	1,4	100,0		
		Gipuzkoa	N	74.969	16.424	4.912	1.131	2.225	99.662	
	%		75,2	16,5	4,9	1,1	2,2	100,0		
		Bizkaia	N	133.639	26.138	4.518	3.573	1.975	169.843	
	%		78,7	15,4	2,7	2,1	1,2	100,0		
		65-74	CAPV	N	90.572	11.667	5.106	790	1.789	109.925
	%			82,4	10,6	4,6	0,7	1,6	100,0	
		Araba	N	13.302	754	85	180	.	14.320	
	%		92,9	5,3	0,6	1,3	.	100,0		
		Gipuzkoa	N	29.797	3.891	1.095	140	1.197	36.120	
	%		82,5	10,8	3,0	0,4	3,3	100,0		
		Bizkaia	N	47.473	7.022	3.926	470	592	59.484	
	%		79,8	11,8	6,6	0,8	1,0	100,0		
		>=75	CAPV	N	122.038	11.274	4.795	1.796	1.961	141.864
	%			86,0	7,9	3,4	1,3	1,4	100,0	
		Araba	N	15.855	800	142	.	313	17.110	
	%		92,7	4,7	0,8	.	1,8	100,0		
	Gipuzkoa	N	38.302	3.532	1.903	973	845	45.555		
%		84,1	7,8	4,2	2,1	1,9	100,0			
	Bizkaia	N	67.881	6.943	2.750	823	803	79.200		
%		85,7	8,8	3,5	1,0	1,0	100,0			
Ambos	Total	CAPV	N	1.416.209	296.977	96.097	46.666	35.058	1.891.006	
			%	74,9	15,7	5,1	2,5	1,9	100,0	
		Araba	N	219.341	31.151	10.415	4.876	4.739	270.523	
	%		81,1	11,5	3,9	1,8	1,8	100,0		
		Gipuzkoa	N	450.085	95.433	32.121	17.041	11.818	606.497	
	%		74,2	15,7	5,3	2,8	1,9	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 227. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	Total	Bizkaia	N	746.783	170.393	53.560	24.749	18.501	1.013.987
			%	73,6	16,8	5,3	2,4	1,8	100,0
	15-24	CAPV	N	128.729	39.960	9.245	3.654	2.371	183.958
			%	70,0	21,7	5,0	2,0	1,3	100,0
		Araba	N	21.747	5.031	967	.	334	28.079
			%	77,4	17,9	3,4	.	1,2	100,0
		Gipuzkoa	N	43.612	12.612	2.712	1.315	497	60.748
			%	71,8	20,8	4,5	2,2	0,8	100,0
		Bizkaia	N	63.369	22.316	5.566	2.339	1.539	95.130
			%	66,6	23,5	5,9	2,5	1,6	100,0
	25-44	CAPV	N	468.715	119.000	38.666	18.643	12.111	657.135
			%	71,3	18,1	5,9	2,8	1,8	100,0
		Araba	N	77.950	12.921	4.995	2.757	1.307	99.930
			%	78,0	12,9	5,0	2,8	1,3	100,0
		Gipuzkoa	N	148.981	37.084	11.941	7.636	3.052	208.695
			%	71,4	17,8	5,7	3,7	1,5	100,0
		Bizkaia	N	241.784	68.994	21.730	8.249	7.752	348.509
			%	69,4	19,8	6,2	2,4	2,2	100,0
	45-64	CAPV	N	461.218	96.512	31.757	14.967	11.971	616.424
			%	74,8	15,7	5,2	2,4	1,9	100,0
		Araba	N	69.043	10.617	3.947	1.636	1.772	87.015
			%	79,3	12,2	4,5	1,9	2,0	100,0
		Gipuzkoa	N	143.560	31.475	13.246	3.743	5.056	197.081
			%	72,8	16,0	6,7	1,9	2,6	100,0
		Bizkaia	N	248.614	54.420	14.564	9.588	5.143	332.328
			%	74,8	16,4	4,4	2,9	1,5	100,0
	65-74	CAPV	N	163.666	24.198	9.161	5.382	3.251	205.658
			%	79,6	11,8	4,5	2,6	1,6	100,0
		Araba	N	25.007	1.420	278	482	295	27.483
			%	91,0	5,2	1,0	1,8	1,1	100,0
		Gipuzkoa	N	54.020	8.846	1.702	2.015	1.667	68.251
			%	79,1	13,0	2,5	3,0	2,4	100,0
		Bizkaia	N	84.638	13.931	7.181	2.885	1.289	109.924
			%	77,0	12,7	6,5	2,6	1,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 227. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	CAPV	N	193.881	17.308	7.268	4.021	5.355	227.832
			%	85,1	7,6	3,2	1,8	2,4	100,0
		Araba	N	25.592	1.162	229	.	1.032	28.015
			%	91,4	4,1	0,8	.	3,7	100,0
		Gipuzkoa	N	59.911	5.415	2.520	2.332	1.545	71.723
			%	83,5	7,5	3,5	3,3	2,2	100,0
		Bizkaia	N	108.377	10.732	4.519	1.688	2.778	128.094
			%	84,6	8,4	3,5	1,3	2,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 228. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	Total	Total	N	A diario					
			N	658.229	151.641	55.573	30.405	18.016	913.863
			%	72,0	16,6	6,1	3,3	2,0	100,0
	I		N	86.898	16.879	5.267	2.588	2.058	113.690
			%	76,4	14,8	4,6	2,3	1,8	100,0
	II		N	55.432	12.643	5.312	3.682	1.137	78.206
			%	70,9	16,2	6,8	4,7	1,5	100,0
	III		N	135.299	30.890	12.408	5.507	4.251	188.355
			%	71,8	16,4	6,6	2,9	2,3	100,0
	IV		N	320.948	78.104	26.642	15.788	8.823	450.306
			%	71,3	17,3	5,9	3,5	2,0	100,0
	V		N	59.651	13.125	5.945	2.840	1.746	83.307
			%	71,6	15,8	7,1	3,4	2,1	100,0
	15-24 Total		N	65.106	21.373	3.708	2.252	1.462	93.900
			%	69,3	22,8	3,9	2,4	1,6	100,0
	I		N	12.267	1.454	567	347	.	14.634
			%	83,8	9,9	3,9	2,4	.	100,0
	II		N	7.833	1.821	872	.	463	10.988
			%	71,3	16,6	7,9	.	4,2	100,0
	III		N	12.401	2.290	883	775	482	16.830
			%	73,7	13,6	5,2	4,6	2,9	100,0
	IV		N	26.944	13.868	669	872	385	42.737
			%	63,0	32,4	1,6	2,0	0,9	100,0
	V		N	5.663	1.941	717	258	132	8.711
			%	65,0	22,3	8,2	3,0	1,5	100,0
	25-44 Total		N	232.542	63.106	24.922	11.175	4.565	336.309
			%	69,1	18,8	7,4	3,3	1,4	100,0
	I		N	32.527	7.544	1.949	1.078	634	43.732
			%	74,4	17,3	4,5	2,5	1,4	100,0
	II		N	23.266	5.813	1.921	1.497	.	32.496
			%	71,6	17,9	5,9	4,6	.	100,0
	III		N	40.703	14.220	5.267	874	1.192	62.257
			%	65,4	22,8	8,5	1,4	1,9	100,0
	IV		N	110.621	28.715	12.098	6.221	2.738	160.392
			%	69,0	17,9	7,5	3,9	1,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 228. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres 25-44 V	N		25.424	6.815	3.688	1.505	.	37.432
	%		67,9	18,2	9,9	4,0	.	100,0
45-64 Total	N		216.059	48.597	20.416	10.162	7.134	302.368
	%		71,5	16,1	6,8	3,4	2,4	100,0
I	N		28.618	4.695	2.259	1.163	1.173	37.907
	%		75,5	12,4	6,0	3,1	3,1	100,0
II	N		16.108	3.353	2.520	986	452	23.419
	%		68,8	14,3	10,8	4,2	1,9	100,0
III	N		47.002	10.775	3.797	2.962	1.785	66.322
	%		70,9	16,2	5,7	4,5	2,7	100,0
IV	N		105.543	26.824	10.436	4.551	3.261	150.614
	%		70,1	17,8	6,9	3,0	2,2	100,0
V	N		18.787	2.950	1.404	501	463	24.106
	%		77,9	12,2	5,8	2,1	1,9	100,0
65-74 Total	N		73.094	12.531	4.055	4.592	1.462	95.733
	%		76,4	13,1	4,2	4,8	1,5	100,0
I	N		10.181	2.829	492	.	251	13.753
	%		74,0	20,6	3,6	.	1,8	100,0
II	N		4.307	1.365	.	969	222	6.862
	%		62,8	19,9	.	14,1	3,2	100,0
III	N		17.442	1.952	1.469	562	352	21.777
	%		80,1	9,0	6,7	2,6	1,6	100,0
IV	N		37.299	5.503	1.958	2.586	406	47.753
	%		78,1	11,5	4,1	5,4	0,9	100,0
V	N		3.865	882	136	475	230	5.588
	%		69,2	15,8	2,4	8,5	4,1	100,0
>=75 Total	N		71.428	6.034	2.473	2.224	3.393	85.553
	%		83,5	7,1	2,9	2,6	4,0	100,0
I	N		3.306	358	.	.	.	3.663
	%		90,2	9,8	.	.	.	100,0
II	N		3.918	291	.	231	.	4.440
	%		88,3	6,5	.	5,2	.	100,0
III	N		17.751	1.654	991	333	440	21.169
	%		83,9	7,8	4,7	1,6	2,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 228. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres >=75	IV	N	40.541	3.195	1.482	1.560	2.032	48.810	
		%	83,1	6,5	3,0	3,2	4,2	100,0	
	V	N	5.912	538	.	100	921	7.470	
		%	79,1	7,2	.	1,3	12,3	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	755.172	144.783	40.234	16.261	17.042	973.492
			%	77,6	14,9	4,1	1,7	1,8	100,0
	I	N	83.263	14.130	1.484	2.510	3.451	104.838	
		%	79,4	13,5	1,4	2,4	3,3	100,0	
	II	N	71.437	16.945	3.350	679	2.618	95.028	
		%	75,2	17,8	3,5	0,7	2,8	100,0	
	III	N	184.823	39.608	8.580	4.368	4.729	242.107	
		%	76,3	16,4	3,5	1,8	2,0	100,0	
	IV	N	284.594	48.033	17.651	6.027	4.136	360.441	
		%	79,0	13,3	4,9	1,7	1,1	100,0	
	V	N	131.055	26.067	9.170	2.677	2.109	171.077	
		%	76,6	15,2	5,4	1,6	1,2	100,0	
	15-24	Total	N	62.652	18.034	5.537	1.402	909	88.533
			%	70,8	20,4	6,3	1,6	1,0	100,0
	I	N	11.827	1.947	.	308	480	14.562	
		%	81,2	13,4	.	2,1	3,3	100,0	
	II	N	10.930	1.817	522	.	227	13.497	
		%	81,0	13,5	3,9	.	1,7	100,0	
	III	N	13.238	5.194	1.277	360	.	20.069	
		%	66,0	25,9	6,4	1,8	.	100,0	
	IV	N	22.113	6.542	2.023	733	202	31.614	
		%	69,9	20,7	6,4	2,3	0,6	100,0	
V	N	4.544	2.533	1.715	.	.	8.792		
	%	51,7	28,8	19,5	.	.	100,0		
25-44	Total	N	235.678	55.893	13.744	7.468	7.546	320.330	
		%	73,6	17,4	4,3	2,3	2,4	100,0	
I	N	36.406	5.329	507	1.590	1.253	45.086		
	%	80,7	11,8	1,1	3,5	2,8	100,0		
II	N	26.928	7.352	1.222	.	1.721	37.223		
	%	72,3	19,8	3,3	.	4,6	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 228. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	59.522	15.618	3.064	1.503	2.323	82.029
			%	72,6	19,0	3,7	1,8	2,8	100,0
		IV	N	82.206	17.886	5.781	3.411	1.441	110.725
			%	74,2	16,2	5,2	3,1	1,3	100,0
		V	N	30.616	9.709	3.171	963	808	45.267
			%	67,6	21,4	7,0	2,1	1,8	100,0
	45-64	Total	N	244.889	47.915	11.152	4.805	4.836	313.598
			%	78,1	15,3	3,6	1,5	1,5	100,0
	I	N	24.621	4.664	747	612	1.472	32.116	
		%	76,7	14,5	2,3	1,9	4,6	100,0	
	II	N	20.454	4.724	895	583	135	26.792	
		%	76,3	17,6	3,3	2,2	0,5	100,0	
	III	N	68.455	13.789	2.714	1.891	1.793	88.641	
		%	77,2	15,6	3,1	2,1	2,0	100,0	
	IV	N	82.164	15.435	4.579	934	991	104.102	
		%	78,9	14,8	4,4	0,9	1,0	100,0	
	V	N	49.195	9.303	2.217	785	446	61.946	
		%	79,4	15,0	3,6	1,3	0,7	100,0	
	65-74	Total	N	90.417	11.667	5.106	790	1.789	109.770
			%	82,4	10,6	4,7	0,7	1,6	100,0
	I	N	5.059	1.666	229	.	245	7.199	
		%	70,3	23,1	3,2	.	3,4	100,0	
	II	N	5.368	1.562	157	.	137	7.225	
		%	74,3	21,6	2,2	.	1,9	100,0	
III	N	18.294	3.010	1.153	180	261	22.899		
	%	79,9	13,1	5,0	0,8	1,1	100,0		
IV	N	42.669	3.819	2.592	366	689	50.134		
	%	85,1	7,6	5,2	0,7	1,4	100,0		
V	N	19.027	1.609	974	244	458	22.312		
	%	85,3	7,2	4,4	1,1	2,1	100,0		
>=75	Total	N	121.535	11.274	4.694	1.796	1.961	141.261	
		%	86,0	8,0	3,3	1,3	1,4	100,0	
I	N	5.350	524	.	.	.	5.875		
	%	91,1	8,9	.	.	.	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 228. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	>=75	II	N 7.756	1.489	554	95	397	10.292	
			% 75,4	14,5	5,4	0,9	3,9	100,0	
		III	N 25.315	1.996	372	432	353	28.468	
			% 88,9	7,0	1,3	1,5	1,2	100,0	
		IV	N 55.441	4.351	2.676	584	814	63.866	
			% 86,8	6,8	4,2	0,9	1,3	100,0	
		V	N 27.673	2.913	1.093	685	397	32.760	
			% 84,5	8,9	3,3	2,1	1,2	100,0	
	Ambos	Total	Total	N 1.413.401	296.424	95.807	46.666	35.058	1.887.356
				% 74,9	15,7	5,1	2,5	1,9	100,0
I		N	170.162	31.009	6.750	5.098	5.509	218.528	
		%	77,9	14,2	3,1	2,3	2,5	100,0	
II		N	126.869	29.588	8.663	4.361	3.755	173.234	
		%	73,2	17,1	5,0	2,5	2,2	100,0	
III		N	320.123	70.497	20.987	9.874	8.981	430.462	
		%	74,4	16,4	4,9	2,3	2,1	100,0	
IV		N	605.542	126.138	44.292	21.816	12.959	810.747	
		%	74,7	15,6	5,5	2,7	1,6	100,0	
V		N	190.706	39.192	15.115	5.517	3.855	254.385	
		%	75,0	15,4	5,9	2,2	1,5	100,0	
15-24		Total	Total	N 127.758	39.406	9.245	3.654	2.371	182.434
				% 70,0	21,6	5,1	2,0	1,3	100,0
		I	N	24.093	3.400	567	655	480	29.196
			%	82,5	11,6	1,9	2,2	1,6	100,0
		II	N	18.763	3.638	1.394	.	690	24.485
			%	76,6	14,9	5,7	.	2,8	100,0
	III	N	25.639	7.484	2.160	1.136	482	36.900	
		%	69,5	20,3	5,9	3,1	1,3	100,0	
	IV	N	49.057	20.410	2.692	1.605	587	74.351	
		%	66,0	27,5	3,6	2,2	0,8	100,0	
V	N	10.206	4.474	2.432	258	132	17.503		
	%	58,3	25,6	13,9	1,5	0,8	100,0		
25-44	Total	Total	N 468.220	119.000	38.666	18.643	12.111	656.640	
			% 71,3	18,1	5,9	2,8	1,8	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 228. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	25-44	I	N	68.934	12.873	2.456	2.668	1.887	88.818
			%	77,6	14,5	2,8	3,0	2,1	100,0
		II	N	50.194	13.166	3.142	1.497	1.721	69.719
			%	72,0	18,9	4,5	2,1	2,5	100,0
		III	N	100.225	29.838	8.331	2.378	3.515	144.286
			%	69,5	20,7	5,8	1,6	2,4	100,0
		IV	N	192.827	46.600	17.879	9.632	4.179	271.117
			%	71,1	17,2	6,6	3,6	1,5	100,0
		V	N	56.041	16.523	6.858	2.468	808	82.699
			%	67,8	20,0	8,3	3,0	1,0	100,0
	45-64	Total	N	460.948	96.512	31.568	14.967	11.971	615.965
			%	74,8	15,7	5,1	2,4	1,9	100,0
		I	N	53.238	9.359	3.006	1.775	2.645	70.023
			%	76,0	13,4	4,3	2,5	3,8	100,0
		II	N	36.563	8.078	3.415	1.569	587	50.212
			%	72,8	16,1	6,8	3,1	1,2	100,0
		III	N	115.457	24.564	6.511	4.853	3.578	154.963
			%	74,5	15,9	4,2	3,1	2,3	100,0
		IV	N	187.707	42.258	15.015	5.484	4.251	254.716
			%	73,7	16,6	5,9	2,2	1,7	100,0
		V	N	67.983	12.253	3.621	1.286	909	86.052
			%	79,0	14,2	4,2	1,5	1,1	100,0
	65-74	Total	N	163.511	24.198	9.161	5.382	3.251	205.503
			%	79,6	11,8	4,5	2,6	1,6	100,0
		I	N	15.240	4.495	721	.	496	20.952
			%	72,7	21,5	3,4	.	2,4	100,0
		II	N	9.675	2.927	157	969	359	14.087
			%	68,7	20,8	1,1	6,9	2,6	100,0
		III	N	35.736	4.962	2.622	742	613	44.676
			%	80,0	11,1	5,9	1,7	1,4	100,0
		IV	N	79.968	9.322	4.550	2.952	1.095	97.887
			%	81,7	9,5	4,6	3,0	1,1	100,0
		V	N	22.892	2.492	1.110	719	688	27.901
			%	82,0	8,9	4,0	2,6	2,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 228. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	Total	N 192.964	17.308	7.167	4.021	5.355	226.814
			% 85,1	7,6	3,2	1,8	2,4	100,0
	I	Total	N 8.656	882	.	.	.	9.538
			% 90,8	9,2	.	.	.	100,0
	II	Total	N 11.675	1.779	554	326	397	14.731
			% 79,3	12,1	3,8	2,2	2,7	100,0
	III	Total	N 43.066	3.650	1.363	766	793	49.638
			% 86,8	7,4	2,7	1,5	1,6	100,0
	IV	Total	N 95.982	7.547	4.157	2.144	2.847	112.676
			% 85,2	6,7	3,7	1,9	2,5	100,0
	V	Total	N 33.585	3.450	1.093	785	1.318	40.231
			% 83,5	8,6	2,7	2,0	3,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 229. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres Total	Total	N	659.003	151.939	55.762	30.405	18.016	915.124
		%	72,0	16,6	6,1	3,3	2,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	156.952	29.322	11.977	5.859	6.489	210.600
		%	74,5	13,9	5,7	2,8	3,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	119.423	27.728	9.891	7.857	2.555	167.454
		%	71,3	16,6	5,9	4,7	1,5	100,0
	Secundaria, superior	N	256.835	62.669	22.289	12.485	6.391	360.670
		%	71,2	17,4	6,2	3,5	1,8	100,0
	Terciaria	N	125.793	32.219	11.605	4.203	2.580	176.400
		%	71,3	18,3	6,6	2,4	1,5	100,0
15-24	Total	N	65.366	21.670	3.708	2.252	1.462	94.458
		%	69,2	22,9	3,9	2,4	1,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	6.950	2.243	385	339	.	9.918
		%	70,1	22,6	3,9	3,4	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	20.899	7.887	1.170	1.041	132	31.129
		%	67,1	25,3	3,8	3,3	0,4	100,0
	Secundaria, superior	N	29.683	9.511	1.907	872	867	42.840
		%	69,3	22,2	4,5	2,0	2,0	100,0
	Terciaria	N	7.834	2.030	245	.	463	10.572
		%	74,1	19,2	2,3	.	4,4	100,0
25-44	Total	N	232.542	63.106	24.922	11.175	4.565	336.309
		%	69,1	18,8	7,4	3,3	1,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	23.797	8.695	3.337	658	1.289	37.776
		%	63,0	23,0	8,8	1,7	3,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	34.863	10.064	3.900	3.496	485	52.808
		%	66,0	19,1	7,4	6,6	0,9	100,0
	Secundaria, superior	N	117.399	27.056	12.156	5.874	1.789	164.274
		%	71,5	16,5	7,4	3,6	1,1	100,0
	Terciaria	N	56.482	17.291	5.529	1.147	1.002	81.451
		%	69,3	21,2	6,8	1,4	1,2	100,0
45-64	Total	N	216.158	48.597	20.605	10.162	7.134	302.655
		%	71,4	16,1	6,8	3,4	2,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	52.312	10.449	4.739	1.408	1.492	70.400
		%	74,3	14,8	6,7	2,0	2,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

998

Tabla 229. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	38.430	7.831	3.679	1.966	1.338	53.244
			%	72,2	14,7	6,9	3,7	2,5	100,0
		Secundaria, superior	N	80.137	21.601	7.131	4.525	3.736	117.130
			%	68,4	18,4	6,1	3,9	3,2	100,0
		Terciaria	N	45.278	8.716	5.055	2.263	568	61.881
			%	73,2	14,1	8,2	3,7	0,9	100,0
	65-74	Total	N	73.094	12.531	4.055	4.592	1.462	95.733
			%	76,4	13,1	4,2	4,8	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	28.984	4.465	1.719	2.045	804	38.017
			%	76,2	11,7	4,5	5,4	2,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.213	1.580	466	921	111	16.291
			%	81,1	9,7	2,9	5,7	0,7	100,0
	Secundaria, superior	N	20.206	3.433	1.094	1.214	.	25.948	
		%	77,9	13,2	4,2	4,7	.	100,0	
	Terciaria	N	10.690	3.053	776	411	547	15.477	
		%	69,1	19,7	5,0	2,7	3,5	100,0	
	>=75	Total	N	71.843	6.034	2.473	2.224	3.393	85.968
			%	83,6	7,0	2,9	2,6	3,9	100,0
Sin estudios, primaria		N	44.907	3.472	1.797	1.409	2.905	54.489	
		%	82,4	6,4	3,3	2,6	5,3	100,0	
Secundaria, inferior		N	12.018	365	676	433	489	13.981	
		%	86,0	2,6	4,8	3,1	3,5	100,0	
Secundaria, superior	N	9.409	1.069	.	.	.	10.478		
	%	89,8	10,2	.	.	.	100,0		
Terciaria	N	5.509	1.129	.	382	.	7.020		
	%	78,5	16,1	.	5,4	.	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	757.206	145.038	40.335	16.261	17.042	975.882
			%	77,6	14,9	4,1	1,7	1,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	230.687	29.506	11.184	3.485	3.465	278.327	
		%	82,9	10,6	4,0	1,3	1,2	100,0	
	Secundaria, inferior	N	129.268	25.399	10.636	2.695	1.768	169.766	
		%	76,1	15,0	6,3	1,6	1,0	100,0	
Secundaria, superior	N	231.201	52.620	12.812	6.523	4.710	307.866		
	%	75,1	17,1	4,2	2,1	1,5	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 229. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N 166.051	37.512	5.704	3.557	7.099	219.923
			% 75,5	17,1	2,6	1,6	3,2	100,0
	15-24	Total	N 63.362	18.289	5.537	1.402	909	89.499
			% 70,8	20,4	6,2	1,6	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N 6.625	3.565	1.197	.	.	11.386
			% 58,2	31,3	10,5	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N 12.092	2.460	2.009	.	202	16.763
			% 72,1	14,7	12,0	.	1,2	100,0
		Secundaria, superior	N 33.832	9.081	1.797	733	.	45.443
			% 74,4	20,0	4,0	1,6	.	100,0
		Terciaria	N 10.813	3.183	535	668	707	15.907
			% 68,0	20,0	3,4	4,2	4,4	100,0
	25-44	Total	N 236.174	55.893	13.744	7.468	7.546	320.826
			% 73,6	17,4	4,3	2,3	2,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N 19.306	4.128	1.132	1.216	208	25.990
			% 74,3	15,9	4,4	4,7	0,8	100,0
		Secundaria, inferior	N 25.111	8.785	3.215	1.827	.	38.937
			% 64,5	22,6	8,3	4,7	.	100,0
		Secundaria, superior	N 95.162	22.427	6.077	3.721	3.100	130.487
			% 72,9	17,2	4,7	2,9	2,4	100,0
		Terciaria	N 96.595	20.554	3.320	705	4.238	125.412
			% 77,0	16,4	2,6	0,6	3,4	100,0
	45-64	Total	N 245.060	47.915	11.152	4.805	4.836	313.769
			% 78,1	15,3	3,6	1,5	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N 63.448	10.306	2.894	897	418	77.963
			% 81,4	13,2	3,7	1,1	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	N 48.964	9.260	2.329	272	909	61.735
			% 79,3	15,0	3,8	0,4	1,5	100,0
		Secundaria, superior	N 85.494	17.354	4.380	1.621	1.472	110.322
			% 77,5	15,7	4,0	1,5	1,3	100,0
		Terciaria	N 47.153	10.995	1.549	2.014	2.037	63.749
			% 74,0	17,2	2,4	3,2	3,2	100,0
	65-74	Total	N 90.572	11.667	5.106	790	1.789	109.925
			% 82,4	10,6	4,6	0,7	1,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1000

Tabla 229. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	53.460	4.456	2.483	285	1.169	61.852
			%	86,4	7,2	4,0	0,5	1,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	21.816	2.637	2.196	320	483	27.452
			%	79,5	9,6	8,0	1,2	1,8	100,0
		Secundaria, superior	N	8.762	2.574	236	185	137	11.893
			%	73,7	21,6	2,0	1,6	1,2	100,0
	Terciaria	N	6.535	2.000	192	.	.	8.727	
		%	74,9	22,9	2,2	.	.	100,0	
	>=75	Total	N	122.038	11.274	4.795	1.796	1.961	141.864
			%	86,0	7,9	3,4	1,3	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	87.848	7.052	3.478	1.088	1.670	101.136
			%	86,9	7,0	3,4	1,1	1,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	21.285	2.257	887	276	175	24.879
			%	85,6	9,1	3,6	1,1	0,7	100,0
	Secundaria, superior	N	7.950	1.185	322	263	.	9.720	
		%	81,8	12,2	3,3	2,7	.	100,0	
	Terciaria	N	4.955	780	108	169	117	6.129	
		%	80,8	12,7	1,8	2,8	1,9	100,0	
Ambos	Total	Total	N	1.416.209	296.977	96.097	46.666	35.058	1.891.006
			%	74,9	15,7	5,1	2,5	1,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	387.638	58.829	23.161	9.344	9.955	488.927	
		%	79,3	12,0	4,7	1,9	2,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	248.691	53.127	20.526	10.552	4.324	337.220	
		%	73,7	15,8	6,1	3,1	1,3	100,0	
	Secundaria, superior	N	488.036	115.290	35.101	19.009	11.101	668.536	
		%	73,0	17,2	5,3	2,8	1,7	100,0	
	Terciaria	N	291.844	69.731	17.309	7.761	9.679	396.323	
		%	73,6	17,6	4,4	2,0	2,4	100,0	
	15-24	Total	N	128.729	39.960	9.245	3.654	2.371	183.958
			%	70,0	21,7	5,0	2,0	1,3	100,0
Sin estudios, primaria		N	13.575	5.807	1.582	339	.	21.304	
		%	63,7	27,3	7,4	1,6	.	100,0	
Secundaria, inferior	N	32.991	10.347	3.178	1.041	334	47.891		
	%	68,9	21,6	6,6	2,2	0,7	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1001

Tabla 229. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	63.516	18.592	3.704	1.605	867	88.283
			%	71,9	21,1	4,2	1,8	1,0	100,0
		Terciaria	N	18.647	5.213	781	668	1.170	26.479
			%	70,4	19,7	2,9	2,5	4,4	100,0
	25-44	Total	N	468.715	119.000	38.666	18.643	12.111	657.135
			%	71,3	18,1	5,9	2,8	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	43.103	12.823	4.469	1.873	1.497	63.765
			%	67,6	20,1	7,0	2,9	2,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	59.974	18.850	7.115	5.323	485	91.745
			%	65,4	20,5	7,8	5,8	0,5	100,0
		Secundaria, superior	N	212.561	49.483	18.233	9.595	4.889	294.762
			%	72,1	16,8	6,2	3,3	1,7	100,0
		Terciaria	N	153.077	37.845	8.849	1.851	5.240	206.862
			%	74,0	18,3	4,3	0,9	2,5	100,0
	45-64	Total	N	461.218	96.512	31.757	14.967	11.971	616.424
			%	74,8	15,7	5,2	2,4	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	115.760	20.755	7.633	2.304	1.910	148.363
			%	78,0	14,0	5,1	1,6	1,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	87.395	17.091	6.008	2.238	2.247	114.979
			%	76,0	14,9	5,2	1,9	2,0	100,0
		Secundaria, superior	N	165.631	38.955	11.512	6.147	5.208	227.452
			%	72,8	17,1	5,1	2,7	2,3	100,0
		Terciaria	N	92.431	19.711	6.604	4.278	2.605	125.630
			%	73,6	15,7	5,3	3,4	2,1	100,0
	65-74	Total	N	163.666	24.198	9.161	5.382	3.251	205.658
			%	79,6	11,8	4,5	2,6	1,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	82.444	8.921	4.202	2.330	1.973	99.869
			%	82,6	8,9	4,2	2,3	2,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	35.029	4.217	2.662	1.242	595	43.744
			%	80,1	9,6	6,1	2,8	1,4	100,0
		Secundaria, superior	N	28.968	6.007	1.330	1.399	137	37.841
			%	76,6	15,9	3,5	3,7	0,4	100,0
		Terciaria	N	17.225	5.053	967	411	547	24.204
			%	71,2	20,9	4,0	1,7	2,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1002

Tabla 229. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	Total	N	193.881	17.308	7.268	4.021	5.355	227.832
			%	85,1	7,6	3,2	1,8	2,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	132.756	10.523	5.275	2.497	4.575	155.625
			%	85,3	6,8	3,4	1,6	2,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	33.302	2.622	1.564	709	663	38.860
			%	85,7	6,7	4,0	1,8	1,7	100,0
		Secundaria, superior	N	17.360	2.253	322	263	.	20.198
			%	85,9	11,2	1,6	1,3	.	100,0
		Terciaria	N	10.463	1.909	108	552	117	13.149
			%	79,6	14,5	0,8	4,2	0,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1003

Tabla 230. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	309.026	172.002	150.554	153.808	129.735	915.124
			%	33,8	18,8	16,5	16,8	14,2	100,0
		Araba	N	46.329	24.480	18.756	23.079	21.106	133.751
			%	34,6	18,3	14,0	17,3	15,8	100,0
		Gipuzkoa	N	104.294	52.346	51.070	43.860	42.242	293.812
			%	35,5	17,8	17,4	14,9	14,4	100,0
		Bizkaia	N	158.402	95.176	80.728	86.868	66.387	487.561
			%	32,5	19,5	16,6	17,8	13,6	100,0
	15-24	CAPV	N	39.144	26.250	10.542	11.606	6.915	94.458
			%	41,4	27,8	11,2	12,3	7,3	100,0
		Araba	N	6.331	4.425	1.462	1.412	1.240	14.869
			%	42,6	29,8	9,8	9,5	8,3	100,0
		Gipuzkoa	N	11.313	8.476	4.963	3.724	2.828	31.305
			%	36,1	27,1	15,9	11,9	9,0	100,0
		Bizkaia	N	21.500	13.349	4.117	6.471	2.847	48.284
			%	44,5	27,6	8,5	13,4	5,9	100,0
	25-44	CAPV	N	116.207	68.700	61.128	56.376	33.898	336.309
			%	34,6	20,4	18,2	16,8	10,1	100,0
		Araba	N	19.993	9.361	6.502	10.434	5.772	52.062
			%	38,4	18,0	12,5	20,0	11,1	100,0
		Gipuzkoa	N	39.040	20.397	21.404	15.092	10.857	106.790
			%	36,6	19,1	20,0	14,1	10,2	100,0
		Bizkaia	N	57.174	38.943	33.222	30.851	17.269	177.458
			%	32,2	21,9	18,7	17,4	9,7	100,0
	45-64	CAPV	N	94.369	51.162	52.897	55.933	48.295	302.655
			%	31,2	16,9	17,5	18,5	16,0	100,0
		Araba	N	12.185	7.725	7.882	7.829	7.130	42.751
			%	28,5	18,1	18,4	18,3	16,7	100,0
		Gipuzkoa	N	32.264	15.297	16.400	17.861	15.597	97.419
			%	33,1	15,7	16,8	18,3	16,0	100,0
		Bizkaia	N	49.919	28.140	28.615	30.243	25.568	162.485
			%	30,7	17,3	17,6	18,6	15,7	100,0
	65-74	CAPV	N	29.463	14.125	14.594	14.637	22.915	95.733
			%	30,8	14,8	15,2	15,3	23,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 230. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	65-74	Araba	N	4.099	1.312	1.767	2.157	3.828	13.163
			%	31,1	10,0	13,4	16,4	29,1	100,0
		Gipuzkoa	N	11.052	4.933	3.980	3.528	8.637	32.130
			%	34,4	15,4	12,4	11,0	26,9	100,0
		Bizkaia	N	14.312	7.880	8.847	8.952	10.449	50.440
			%	28,4	15,6	17,5	17,7	20,7	100,0
	>=75	CAPV	N	29.843	11.764	11.393	15.256	17.712	85.968
			%	34,7	13,7	13,3	17,7	20,6	100,0
		Araba	N	3.721	1.657	1.143	1.247	3.136	10.905
			%	34,1	15,2	10,5	11,4	28,8	100,0
		Gipuzkoa	N	10.624	3.243	4.323	3.656	4.323	26.168
			%	40,6	12,4	16,5	14,0	16,5	100,0
Bizkaia	N	15.498	6.864	5.927	10.352	10.253	48.895		
	%	31,7	14,0	12,1	21,2	21,0	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	311.076	193.408	172.950	162.404	136.044	975.882
			%	31,9	19,8	17,7	16,6	13,9	100,0
	Araba	N	49.172	22.769	22.941	23.712	18.178	136.772	
		%	36,0	16,6	16,8	17,3	13,3	100,0	
	Gipuzkoa	N	107.872	64.372	49.195	51.369	39.878	312.686	
		%	34,5	20,6	15,7	16,4	12,8	100,0	
	Bizkaia	N	154.033	106.266	100.815	87.323	77.987	526.425	
		%	29,3	20,2	19,2	16,6	14,8	100,0	
	15-24	CAPV	N	30.215	23.528	17.292	12.734	5.731	89.499
			%	33,8	26,3	19,3	14,2	6,4	100,0
		Araba	N	6.536	2.109	3.084	784	697	13.210
			%	49,5	16,0	23,3	5,9	5,3	100,0
		Gipuzkoa	N	8.245	7.731	4.365	6.398	2.704	29.443
			%	28,0	26,3	14,8	21,7	9,2	100,0
	Bizkaia	N	15.433	13.687	9.843	5.552	2.330	46.846	
		%	32,9	29,2	21,0	11,9	5,0	100,0	
	25-44	CAPV	N	107.627	80.180	57.395	44.618	31.006	320.826
			%	33,5	25,0	17,9	13,9	9,7	100,0
Araba		N	19.248	8.105	8.371	8.960	3.184	47.869	
		%	40,2	16,9	17,5	18,7	6,7	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1005

Tabla 230. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	38.045	27.403	12.975	12.953	10.530	101.905	
			%	37,3	26,9	12,7	12,7	10,3	100,0	
		Bizkaia	N	50.334	44.671	36.049	22.706	17.291	171.052	
	%		29,4	26,1	21,1	13,3	10,1	100,0		
		45-64	CAPV	N	94.370	53.170	61.939	57.008	47.281	313.769
	%			30,1	16,9	19,7	18,2	15,1	100,0	
		Araba	N	14.431	7.644	7.670	7.226	7.292	44.263	
	%		32,6	17,3	17,3	16,3	16,5	100,0		
		Gipuzkoa	N	31.131	17.860	18.607	18.017	14.048	99.662	
	%		31,2	17,9	18,7	18,1	14,1	100,0		
		Bizkaia	N	48.808	27.666	35.662	31.766	25.941	169.843	
	%		28,7	16,3	21,0	18,7	15,3	100,0		
		65-74	CAPV	N	31.336	14.730	18.180	23.465	22.214	109.925
	%			28,5	13,4	16,5	21,3	20,2	100,0	
		Araba	N	3.739	1.901	1.703	3.727	3.249	14.320	
	%		26,1	13,3	11,9	26,0	22,7	100,0		
		Gipuzkoa	N	11.835	4.781	5.969	6.251	7.285	36.120	
	%		32,8	13,2	16,5	17,3	20,2	100,0		
		Bizkaia	N	15.762	8.048	10.508	13.487	11.680	59.484	
	%		26,5	13,5	17,7	22,7	19,6	100,0		
		>=75	CAPV	N	47.529	21.801	18.143	24.579	29.813	141.864
	%			33,5	15,4	12,8	17,3	21,0	100,0	
		Araba	N	5.217	3.010	2.112	3.016	3.755	17.110	
	%		30,5	17,6	12,3	17,6	21,9	100,0		
	Gipuzkoa	N	18.616	6.597	7.279	7.751	5.311	45.555		
%		40,9	14,5	16,0	17,0	11,7	100,0			
	Bizkaia	N	23.696	12.194	8.752	13.812	20.746	79.200		
%		29,9	15,4	11,1	17,4	26,2	100,0			
Ambos	Total	CAPV	N	620.102	365.410	323.504	316.212	265.779	1.891.006	
			%	32,8	19,3	17,1	16,7	14,1	100,0	
		Araba	N	95.500	47.249	41.697	46.791	39.285	270.523	
			%	35,3	17,5	15,4	17,3	14,5	100,0	
		Gipuzkoa	N	212.166	116.718	100.264	95.229	82.120	606.497	
			%	35,0	19,2	16,5	15,7	13,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1006

Tabla 230. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	Total	Bizkaia	N	312.436	201.442	181.543	174.191	144.374	1.013.987
			%	30,8	19,9	17,9	17,2	14,2	100,0
	15-24	CAPV	N	69.359	49.778	27.834	24.340	12.646	183.958
			%	37,7	27,1	15,1	13,2	6,9	100,0
		Araba	N	12.867	6.534	4.545	2.196	1.937	28.079
			%	45,8	23,3	16,2	7,8	6,9	100,0
		Gipuzkoa	N	19.559	16.207	9.328	10.121	5.532	60.748
			%	32,2	26,7	15,4	16,7	9,1	100,0
		Bizkaia	N	36.933	27.036	13.961	12.023	5.177	95.130
			%	38,8	28,4	14,7	12,6	5,4	100,0
	25-44	CAPV	N	223.834	148.880	118.524	100.994	64.903	657.135
			%	34,1	22,7	18,0	15,4	9,9	100,0
		Araba	N	39.241	17.466	14.873	19.394	8.956	99.930
			%	39,3	17,5	14,9	19,4	9,0	100,0
		Gipuzkoa	N	77.084	47.800	34.379	28.044	21.387	208.695
			%	36,9	22,9	16,5	13,4	10,2	100,0
		Bizkaia	N	107.508	83.614	69.271	53.556	34.560	348.509
			%	30,8	24,0	19,9	15,4	9,9	100,0
	45-64	CAPV	N	188.739	104.332	114.836	112.941	95.576	616.424
			%	30,6	16,9	18,6	18,3	15,5	100,0
		Araba	N	26.616	15.369	15.552	15.055	14.423	87.015
			%	30,6	17,7	17,9	17,3	16,6	100,0
		Gipuzkoa	N	63.395	33.157	35.006	35.878	29.645	197.081
			%	32,2	16,8	17,8	18,2	15,0	100,0
		Bizkaia	N	98.727	55.806	64.278	62.009	51.509	332.328
			%	29,7	16,8	19,3	18,7	15,5	100,0
	65-74	CAPV	N	60.799	28.855	32.774	38.101	45.129	205.658
			%	29,6	14,0	15,9	18,5	21,9	100,0
		Araba	N	7.838	3.213	3.471	5.884	7.077	27.483
			%	28,5	11,7	12,6	21,4	25,7	100,0
		Gipuzkoa	N	22.887	9.714	9.948	9.779	15.923	68.251
			%	33,5	14,2	14,6	14,3	23,3	100,0
		Bizkaia	N	30.074	15.928	19.355	22.438	22.129	109.924
			%	27,4	14,5	17,6	20,4	20,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1007

Tabla 230. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	CAPV	N	77.372	33.565	29.537	39.835	47.525	227.832
			%	34,0	14,7	13,0	17,5	20,9	100,0
		Araba	N	8.938	4.666	3.256	4.263	6.892	28.015
			%	31,9	16,7	11,6	15,2	24,6	100,0
		Gipuzkoa	N	29.240	9.840	11.602	11.407	9.634	71.723
			%	40,8	13,7	16,2	15,9	13,4	100,0
		Bizkaia	N	39.193	19.058	14.679	24.165	30.999	128.094
			%	30,6	14,9	11,5	18,9	24,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1008

Tabla 231. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	Total	Total	N	A diario					
			N	308.666	172.002	150.554	152.906	129.735	913.863
			%	33,8	18,8	16,5	16,7	14,2	100,0
	I		N	40.712	24.114	15.450	19.317	14.097	113.690
			%	35,8	21,2	13,6	17,0	12,4	100,0
	II		N	23.625	16.606	14.868	12.688	10.420	78.206
			%	30,2	21,2	19,0	16,2	13,3	100,0
	III		N	59.026	37.074	34.432	31.024	26.797	188.355
			%	31,3	19,7	18,3	16,5	14,2	100,0
	IV		N	155.789	79.657	73.462	73.528	67.870	450.306
			%	34,6	17,7	16,3	16,3	15,1	100,0
	V		N	29.514	14.551	12.342	16.349	10.551	83.307
			%	35,4	17,5	14,8	19,6	12,7	100,0
	15-24	Total	N	38.884	26.250	10.542	11.309	6.915	93.900
			%	41,4	28,0	11,2	12,0	7,4	100,0
	I		N	6.451	5.542	1.135	957	549	14.634
			%	44,1	37,9	7,8	6,5	3,8	100,0
	II		N	4.223	2.389	1.170	3.029	177	10.988
			%	38,4	21,7	10,6	27,6	1,6	100,0
	III		N	7.214	3.305	1.984	1.887	2.439	16.830
			%	42,9	19,6	11,8	11,2	14,5	100,0
	IV		N	18.887	11.475	5.568	3.742	3.065	42.737
			%	44,2	26,8	13,0	8,8	7,2	100,0
	V		N	2.109	3.540	685	1.693	685	8.711
			%	24,2	40,6	7,9	19,4	7,9	100,0
	25-44	Total	N	116.207	68.700	61.128	56.376	33.898	336.309
			%	34,6	20,4	18,2	16,8	10,1	100,0
	I		N	16.971	10.395	5.278	7.436	3.652	43.732
			%	38,8	23,8	12,1	17,0	8,4	100,0
	II		N	9.565	8.212	7.211	4.326	3.181	32.496
			%	29,4	25,3	22,2	13,3	9,8	100,0
	III		N	18.160	14.372	12.458	10.422	6.845	62.257
			%	29,2	23,1	20,0	16,7	11,0	100,0
	IV		N	56.032	30.545	29.937	26.810	17.069	160.392
			%	34,9	19,0	18,7	16,7	10,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1009

Tabla 231. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	25-44	V	N 15.478	5.176	6.245	7.382	3.151	37.432
			% 41,4	13,8	16,7	19,7	8,4	100,0
	45-64	Total	N 94.270	51.162	52.897	55.744	48.295	302.368
			% 31,2	16,9	17,5	18,4	16,0	100,0
	I	N	13.097	5.146	5.705	8.467	5.490	37.907
		%	34,6	13,6	15,1	22,3	14,5	100,0
	II	N	7.116	4.180	4.303	3.493	4.327	23.419
		%	30,4	17,8	18,4	14,9	18,5	100,0
	III	N	18.312	13.303	12.920	12.210	9.577	66.322
		%	27,6	20,1	19,5	18,4	14,4	100,0
	IV	N	46.920	25.244	26.558	26.941	24.951	150.614
		%	31,2	16,8	17,6	17,9	16,6	100,0
	V	N	8.824	3.289	3.410	4.633	3.951	24.106
		%	36,6	13,6	14,1	19,2	16,4	100,0
	65-74	Total	N 29.463	14.125	14.594	14.637	22.915	95.733
			% 30,8	14,8	15,2	15,3	23,9	100,0
	I	N	3.035	2.251	3.010	1.838	3.619	13.753
		%	22,1	16,4	21,9	13,4	26,3	100,0
	II	N	1.623	1.251	1.310	794	1.884	6.862
		%	23,7	18,2	19,1	11,6	27,4	100,0
	III	N	7.481	3.359	3.345	2.844	4.747	21.777
		%	34,4	15,4	15,4	13,1	21,8	100,0
	IV	N	16.087	5.978	6.103	8.254	11.331	47.753
		%	33,7	12,5	12,8	17,3	23,7	100,0
	V	N	1.236	1.287	825	906	1.334	5.588
		%	22,1	23,0	14,8	16,2	23,9	100,0
	>=75	Total	N 29.843	11.764	11.393	14.841	17.712	85.553
			% 34,9	13,8	13,3	17,3	20,7	100,0
	I	N	1.157	780	322	618	786	3.663
		%	31,6	21,3	8,8	16,9	21,5	100,0
	II	N	1.098	573	873	1.045	851	4.440
		%	24,7	12,9	19,7	23,5	19,2	100,0
	III	N	7.858	2.737	3.725	3.661	3.189	21.169
		%	37,1	12,9	17,6	17,3	15,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1010

Tabla 231. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	>=75	IV	N 17.862	6.416	5.296	7.781	11.455	48.810
			% 36,6	13,1	10,9	15,9	23,5	100,0
	V	N 1.867	1.260	1.178	1.736	1.431	7.470	
		% 25,0	16,9	15,8	23,2	19,1	100,0	
Mujeres	Total	Total	N 309.976	192.703	172.950	162.301	135.562	973.492
			% 31,8	19,8	17,8	16,7	13,9	100,0
	I	N 38.987	20.598	18.537	15.763	10.953	104.838	
		% 37,2	19,6	17,7	15,0	10,4	100,0	
	II	N 25.763	23.702	19.189	17.242	9.133	95.028	
		% 27,1	24,9	20,2	18,1	9,6	100,0	
	III	N 77.654	48.484	43.863	37.920	34.186	242.107	
		% 32,1	20,0	18,1	15,7	14,1	100,0	
	IV	N 116.656	66.946	60.844	65.043	50.953	360.441	
		% 32,4	18,6	16,9	18,0	14,1	100,0	
	V	N 50.915	32.973	30.518	26.333	30.338	171.077	
		% 29,8	19,3	17,8	15,4	17,7	100,0	
	15-24	Total	N 29.754	23.023	17.292	12.734	5.731	88.533
			% 33,6	26,0	19,5	14,4	6,5	100,0
	I	N 5.421	2.357	2.053	4.022	709	14.562	
		% 37,2	16,2	14,1	27,6	4,9	100,0	
	II	N 3.417	3.456	3.297	2.040	1.287	13.497	
		% 25,3	25,6	24,4	15,1	9,5	100,0	
	III	N 8.499	5.256	4.372	1.560	383	20.069	
		% 42,3	26,2	21,8	7,8	1,9	100,0	
	IV	N 10.788	7.690	5.948	4.063	3.124	31.614	
		% 34,1	24,3	18,8	12,9	9,9	100,0	
V	N 1.629	4.265	1.622	1.048	227	8.792		
	% 18,5	48,5	18,5	11,9	2,6	100,0		
25-44	Total	N 107.357	80.180	57.395	44.618	30.780	320.330	
		% 33,5	25,0	17,9	13,9	9,6	100,0	
I	N 18.229	10.880	7.816	5.167	2.993	45.086		
	% 40,4	24,1	17,3	11,5	6,6	100,0		
II	N 11.723	10.437	7.992	5.884	1.187	37.223		
	% 31,5	28,0	21,5	15,8	3,2	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 231. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	24.697	23.153	14.081	12.394	7.704	82.029
			%	30,1	28,2	17,2	15,1	9,4	100,0
		IV	N	38.286	26.266	19.236	15.451	11.486	110.725
			%	34,6	23,7	17,4	14,0	10,4	100,0
		V	N	14.422	9.443	8.270	5.721	7.410	45.267
			%	31,9	20,9	18,3	12,6	16,4	100,0
	45-64	Total	N	94.199	53.170	61.939	57.008	47.281	313.598
			%	30,0	17,0	19,8	18,2	15,1	100,0
		I	N	10.330	4.847	7.128	5.139	4.672	32.116
			%	32,2	15,1	22,2	16,0	14,5	100,0
		II	N	5.182	6.506	6.439	5.752	2.914	26.792
			%	19,3	24,3	24,0	21,5	10,9	100,0
		III	N	27.198	14.900	17.031	15.439	14.073	88.641
			%	30,7	16,8	19,2	17,4	15,9	100,0
		IV	N	33.397	16.313	19.593	20.755	14.044	104.102
			%	32,1	15,7	18,8	19,9	13,5	100,0
		V	N	18.091	10.604	11.748	9.924	11.578	61.946
			%	29,2	17,1	19,0	16,0	18,7	100,0
	65-74	Total	N	31.336	14.730	18.180	23.465	22.059	109.770
			%	28,5	13,4	16,6	21,4	20,1	100,0
		I	N	1.441	1.941	1.020	728	2.069	7.199
			%	20,0	27,0	14,2	10,1	28,7	100,0
		II	N	2.361	1.353	757	1.918	835	7.225
			%	32,7	18,7	10,5	26,5	11,6	100,0
		III	N	5.811	2.052	4.395	3.989	6.651	22.899
			%	25,4	9,0	19,2	17,4	29,0	100,0
		IV	N	14.566	6.583	6.856	12.479	9.650	50.134
			%	29,1	13,1	13,7	24,9	19,2	100,0
		V	N	7.157	2.799	5.153	4.350	2.854	22.312
			%	32,1	12,5	23,1	19,5	12,8	100,0
	>=75	Total	N	47.329	21.600	18.143	24.476	29.712	141.261
			%	33,5	15,3	12,8	17,3	21,0	100,0
		I	N	3.566	572	520	707	510	5.875
			%	60,7	9,7	8,8	12,0	8,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 231. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	>=75	II	N 3.080	1.950	703	1.648	2.910	10.292	
		%	29,9	18,9	6,8	16,0	28,3	100,0	
		III	N 11.449	3.123	3.985	4.538	5.374	28.468	
		%	40,2	11,0	14,0	15,9	18,9	100,0	
		IV	N 19.619	10.093	9.211	12.294	12.649	63.866	
		%	30,7	15,8	14,4	19,2	19,8	100,0	
		V	N 9.615	5.862	3.725	5.289	8.269	32.760	
		%	29,4	17,9	11,4	16,1	25,2	100,0	
	Ambos	Total	Total	N 618.642	364.705	323.504	315.208	265.297	1.887.356
			%	32,8	19,3	17,1	16,7	14,1	100,0
I		N	79.699	44.712	33.987	35.080	25.050	218.528	
		%	36,5	20,5	15,6	16,1	11,5	100,0	
II		N	49.388	40.307	34.056	29.930	19.552	173.234	
		%	28,5	23,3	19,7	17,3	11,3	100,0	
III		N	136.680	85.559	78.295	68.944	60.983	430.462	
		%	31,8	19,9	18,2	16,0	14,2	100,0	
IV		N	272.445	146.603	134.306	138.571	118.823	810.747	
		%	33,6	18,1	16,6	17,1	14,7	100,0	
V		N	80.429	47.524	42.860	42.683	40.889	254.385	
		%	31,6	18,7	16,8	16,8	16,1	100,0	
15-24		Total	Total	N 68.638	49.273	27.834	24.042	12.646	182.434
			%	37,6	27,0	15,3	13,2	6,9	100,0
		I	N	11.872	7.898	3.188	4.979	1.258	29.196
			%	40,7	27,1	10,9	17,1	4,3	100,0
		II	N	7.639	5.845	4.467	5.070	1.464	24.485
			%	31,2	23,9	18,2	20,7	6,0	100,0
	III	N	15.713	8.561	6.356	3.447	2.822	36.900	
		%	42,6	23,2	17,2	9,3	7,6	100,0	
	IV	N	29.675	19.165	11.516	7.805	6.189	74.351	
		%	39,9	25,8	15,5	10,5	8,3	100,0	
V	N	3.738	7.805	2.307	2.741	912	17.503		
	%	21,4	44,6	13,2	15,7	5,2	100,0		
25-44	Total	N	223.564	148.880	118.524	100.994	64.678	656.640	
		%	34,0	22,7	18,1	15,4	9,8	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1013

Tabla 231. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	25-44	I	N	35.200	21.276	13.094	12.603	6.645	88.818
			%	39,6	24,0	14,7	14,2	7,5	100,0
		II	N	21.289	18.649	15.203	10.210	4.368	69.719
			%	30,5	26,7	21,8	14,6	6,3	100,0
		III	N	42.857	37.525	26.538	22.816	14.549	144.286
			%	29,7	26,0	18,4	15,8	10,1	100,0
		IV	N	94.318	56.811	49.173	42.261	28.555	271.117
			%	34,8	21,0	18,1	15,6	10,5	100,0
		V	N	29.900	14.619	14.515	13.103	10.561	82.699
			%	36,2	17,7	17,6	15,8	12,8	100,0
	45-64	Total	N	188.469	104.332	114.836	112.753	95.576	615.965
			%	30,6	16,9	18,6	18,3	15,5	100,0
		I	N	23.428	9.994	12.833	13.607	10.162	70.023
			%	33,5	14,3	18,3	19,4	14,5	100,0
		II	N	12.298	10.686	10.743	9.245	7.240	50.212
			%	24,5	21,3	21,4	18,4	14,4	100,0
		III	N	45.510	28.203	29.951	27.649	23.650	154.963
			%	29,4	18,2	19,3	17,8	15,3	100,0
		IV	N	80.317	41.557	46.152	47.695	38.994	254.716
			%	31,5	16,3	18,1	18,7	15,3	100,0
		V	N	26.915	13.892	15.158	14.557	15.529	86.052
			%	31,3	16,1	17,6	16,9	18,0	100,0
	65-74	Total	N	60.799	28.855	32.774	38.101	44.973	205.503
			%	29,6	14,0	15,9	18,5	21,9	100,0
		I	N	4.476	4.192	4.031	2.566	5.688	20.952
			%	21,4	20,0	19,2	12,2	27,1	100,0
		II	N	3.985	2.604	2.067	2.712	2.719	14.087
			%	28,3	18,5	14,7	19,3	19,3	100,0
		III	N	13.293	5.411	7.740	6.834	11.398	44.676
			%	29,8	12,1	17,3	15,3	25,5	100,0
		IV	N	30.653	12.561	12.958	20.734	20.981	97.887
			%	31,3	12,8	13,2	21,2	21,4	100,0
		V	N	8.393	4.086	5.978	5.256	4.188	27.901
			%	30,1	14,6	21,4	18,8	15,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1014

Tabla 231. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	N	77.172	33.364	29.537	39.317	47.424	226.814
			%	34,0	14,7	13,0	17,3	20,9	100,0
	I	N	4.723	1.352	841	1.325	1.297	9.538	
		%	49,5	14,2	8,8	13,9	13,6	100,0	
	II	N	4.178	2.523	1.576	2.693	3.761	14.731	
		%	28,4	17,1	10,7	18,3	25,5	100,0	
	III	N	19.307	5.859	7.710	8.198	8.563	49.638	
		%	38,9	11,8	15,5	16,5	17,3	100,0	
	IV	N	37.481	16.509	14.507	20.075	24.104	112.676	
		%	33,3	14,7	12,9	17,8	21,4	100,0	
	V	N	11.482	7.122	4.902	7.025	9.699	40.231	
		%	28,5	17,7	12,2	17,5	24,1	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1015

Tabla 232. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	Total	N	309.026	172.002	150.554	153.808	129.735	915.124
		%	33,8	18,8	16,5	16,8	14,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	67.173	37.255	31.722	35.449	39.000	210.600
		%	31,9	17,7	15,1	16,8	18,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	61.650	27.419	26.932	28.029	23.425	167.454
		%	36,8	16,4	16,1	16,7	14,0	100,0
	Secundaria, superior	N	121.958	72.455	61.166	59.278	45.813	360.670
		%	33,8	20,1	17,0	16,4	12,7	100,0
	Terciaria	N	58.244	34.873	30.734	31.052	21.498	176.400
		%	33,0	19,8	17,4	17,6	12,2	100,0
	15-24 Total	N	39.144	26.250	10.542	11.606	6.915	94.458
		%	41,4	27,8	11,2	12,3	7,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.076	4.194	.	1.263	385	9.918
		%	41,1	42,3	.	12,7	3,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	12.671	7.640	3.998	3.583	3.237	31.129
		%	40,7	24,5	12,8	11,5	10,4	100,0
	Secundaria, superior	N	18.061	11.410	5.858	5.252	2.260	42.840
		%	42,2	26,6	13,7	12,3	5,3	100,0
	Terciaria	N	4.337	3.006	686	1.509	1.034	10.572
		%	41,0	28,4	6,5	14,3	9,8	100,0
	25-44 Total	N	116.207	68.700	61.128	56.376	33.898	336.309
		%	34,6	20,4	18,2	16,8	10,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	8.696	8.731	8.943	6.003	5.402	37.776
		%	23,0	23,1	23,7	15,9	14,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	20.399	8.778	8.458	8.527	6.646	52.808
		%	38,6	16,6	16,0	16,1	12,6	100,0
	Secundaria, superior	N	58.909	34.635	26.940	28.638	15.152	164.274
		%	35,9	21,1	16,4	17,4	9,2	100,0
	Terciaria	N	28.203	16.556	16.787	13.208	6.698	81.451
		%	34,6	20,3	20,6	16,2	8,2	100,0
	45-64 Total	N	94.369	51.162	52.897	55.933	48.295	302.655
		%	31,2	16,9	17,5	18,5	16,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	22.716	12.825	11.299	11.495	12.064	70.400
		%	32,3	18,2	16,1	16,3	17,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1016

Tabla 232. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	17.980	7.166	10.659	10.462	6.977	53.244
			%	33,8	13,5	20,0	19,6	13,1	100,0
		Secundaria, superior	N	34.907	20.602	21.258	20.898	19.464	117.130
			%	29,8	17,6	18,1	17,8	16,6	100,0
		Terciaria	N	18.765	10.569	9.680	13.077	9.789	61.881
			%	30,3	17,1	15,6	21,1	15,8	100,0
	65-74	Total	N	29.463	14.125	14.594	14.637	22.915	95.733
			%	30,8	14,8	15,2	15,3	23,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	13.878	4.383	4.735	6.848	8.175	38.017
			%	36,5	11,5	12,5	18,0	21,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.119	2.079	2.085	2.208	4.801	16.291
			%	31,4	12,8	12,8	13,6	29,5	100,0
		Secundaria, superior	N	5.526	4.576	5.153	3.536	7.156	25.948
			%	21,3	17,6	19,9	13,6	27,6	100,0
		Terciaria	N	4.941	3.087	2.621	2.046	2.782	15.477
			%	31,9	19,9	16,9	13,2	18,0	100,0
	>=75	Total	N	29.843	11.764	11.393	15.256	17.712	85.968
			%	34,7	13,7	13,3	17,7	20,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	17.808	7.122	6.745	9.840	12.974	54.489	
		%	32,7	13,1	12,4	18,1	23,8	100,0	
	Secundaria, inferior	N	5.481	1.756	1.732	3.249	1.763	13.981	
		%	39,2	12,6	12,4	23,2	12,6	100,0	
	Secundaria, superior	N	4.555	1.232	1.956	954	1.781	10.478	
		%	43,5	11,8	18,7	9,1	17,0	100,0	
	Terciaria	N	1.998	1.655	960	1.213	1.194	7.020	
		%	28,5	23,6	13,7	17,3	17,0	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	311.076	193.408	172.950	162.404	136.044	975.882
		%	31,9	19,8	17,7	16,6	13,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	85.856	47.131	46.527	47.609	51.206	278.327
			%	30,8	16,9	16,7	17,1	18,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	53.724	29.012	31.258	29.491	26.281	169.766
			%	31,6	17,1	18,4	17,4	15,5	100,0
		Secundaria, superior	N	100.354	65.158	56.016	48.698	37.640	307.866
			%	32,6	21,2	18,2	15,8	12,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1017

Tabla 232. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N	71.143	52.107	39.149	36.606	20.917	219.923
			%	32,3	23,7	17,8	16,6	9,5	100,0
	15-24	Total	N	30.215	23.528	17.292	12.734	5.731	89.499
			%	33,8	26,3	19,3	14,2	6,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.745	4.056	2.291	716	579	11.386
			%	32,9	35,6	20,1	6,3	5,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.608	4.723	2.567	1.855	1.011	16.763
			%	39,4	28,2	15,3	11,1	6,0	100,0
		Secundaria, superior	N	14.775	10.829	9.009	7.175	3.655	45.443
			%	32,5	23,8	19,8	15,8	8,0	100,0
		Terciaria	N	5.087	3.920	3.426	2.987	486	15.907
			%	32,0	24,6	21,5	18,8	3,1	100,0
	25-44	Total	N	107.627	80.180	57.395	44.618	31.006	320.826
			%	33,5	25,0	17,9	13,9	9,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.740	5.399	5.506	4.460	2.885	25.990
			%	29,8	20,8	21,2	17,2	11,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	11.529	8.387	8.342	5.412	5.267	38.937
			%	29,6	21,5	21,4	13,9	13,5	100,0
		Secundaria, superior	N	45.532	33.652	21.734	17.920	11.650	130.487
			%	34,9	25,8	16,7	13,7	8,9	100,0
		Terciaria	N	42.826	32.742	21.813	16.827	11.204	125.412
			%	34,1	26,1	17,4	13,4	8,9	100,0
	45-64	Total	N	94.370	53.170	61.939	57.008	47.281	313.769
			%	30,1	16,9	19,7	18,2	15,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	23.664	13.695	14.520	12.747	13.336	77.963
			%	30,4	17,6	18,6	16,4	17,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	18.984	9.463	13.275	10.654	9.358	61.735
			%	30,8	15,3	21,5	17,3	15,2	100,0
		Secundaria, superior	N	33.559	17.290	21.673	19.982	17.819	110.322
			%	30,4	15,7	19,6	18,1	16,2	100,0
		Terciaria	N	18.162	12.723	12.471	13.625	6.768	63.749
			%	28,5	20,0	19,6	21,4	10,6	100,0
	65-74	Total	N	31.336	14.730	18.180	23.465	22.214	109.925
			%	28,5	13,4	16,5	21,3	20,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1018

Tabla 232. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	17.303	8.051	11.140	13.812	11.547	61.852
			%	28,0	13,0	18,0	22,3	18,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.529	3.604	3.890	5.524	5.906	27.452
			%	31,1	13,1	14,2	20,1	21,5	100,0
		Secundaria, superior	N	3.034	1.358	2.166	2.300	3.036	11.893
			%	25,5	11,4	18,2	19,3	25,5	100,0
	Terciaria	N	2.471	1.717	984	1.830	1.725	8.727	
		%	28,3	19,7	11,3	21,0	19,8	100,0	
	>=75	Total	N	47.529	21.801	18.143	24.579	29.813	141.864
			%	33,5	15,4	12,8	17,3	21,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	33.404	15.930	13.070	15.874	22.859	101.136
			%	33,0	15,8	12,9	15,7	22,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.074	2.836	3.184	6.046	4.739	24.879
			%	32,5	11,4	12,8	24,3	19,0	100,0
		Secundaria, superior	N	3.454	2.029	1.435	1.322	1.481	9.720
			%	35,5	20,9	14,8	13,6	15,2	100,0
		Terciaria	N	2.597	1.005	455	1.337	734	6.129
			%	42,4	16,4	7,4	21,8	12,0	100,0
Ambos		Total	N	620.102	365.410	323.504	316.212	265.779	1.891.006
			%	32,8	19,3	17,1	16,7	14,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	153.029	84.386	78.249	83.058	90.206	488.927	
		%	31,3	17,3	16,0	17,0	18,4	100,0	
	Secundaria, inferior	N	115.374	56.431	58.190	57.520	49.706	337.220	
		%	34,2	16,7	17,3	17,1	14,7	100,0	
	Secundaria, superior	N	222.312	137.613	117.182	107.976	83.452	668.536	
		%	33,3	20,6	17,5	16,2	12,5	100,0	
	Terciaria	N	129.387	86.980	69.883	67.658	42.415	396.323	
		%	32,6	21,9	17,6	17,1	10,7	100,0	
	15-24	Total	N	69.359	49.778	27.834	24.340	12.646	183.958
			%	37,7	27,1	15,1	13,2	6,9	100,0
Sin estudios, primaria		N	7.821	8.250	2.291	1.980	963	21.304	
		%	36,7	38,7	10,8	9,3	4,5	100,0	
Secundaria, inferior	N	19.278	12.363	6.565	5.438	4.247	47.891		
	%	40,3	25,8	13,7	11,4	8,9	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1019

Tabla 232. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	32.836	22.239	14.867	12.427	5.914	88.283
			%	37,2	25,2	16,8	14,1	6,7	100,0
		Terciaria	N	9.424	6.926	4.112	4.496	1.521	26.479
			%	35,6	26,2	15,5	17,0	5,7	100,0
	25-44	Total	N	223.834	148.880	118.524	100.994	64.903	657.135
			%	34,1	22,7	18,0	15,4	9,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	16.436	14.131	14.449	10.463	8.287	63.765
			%	25,8	22,2	22,7	16,4	13,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	31.929	17.165	16.800	13.939	11.913	91.745
			%	34,8	18,7	18,3	15,2	13,0	100,0
		Secundaria, superior	N	104.441	68.286	48.675	46.558	26.802	294.762
			%	35,4	23,2	16,5	15,8	9,1	100,0
		Terciaria	N	71.029	49.298	38.599	30.035	17.902	206.862
			%	34,3	23,8	18,7	14,5	8,7	100,0
	45-64	Total	N	188.739	104.332	114.836	112.941	95.576	616.424
			%	30,6	16,9	18,6	18,3	15,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	46.380	26.520	25.819	24.243	25.400	148.363
			%	31,3	17,9	17,4	16,3	17,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	36.964	16.628	23.935	21.116	16.336	114.979
			%	32,1	14,5	20,8	18,4	14,2	100,0
		Secundaria, superior	N	68.466	37.892	42.931	40.880	37.283	227.452
			%	30,1	16,7	18,9	18,0	16,4	100,0
		Terciaria	N	36.927	23.292	22.151	26.702	16.557	125.630
			%	29,4	18,5	17,6	21,3	13,2	100,0
	65-74	Total	N	60.799	28.855	32.774	38.101	45.129	205.658
			%	29,6	14,0	15,9	18,5	21,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	31.180	12.433	15.875	20.659	19.722	99.869
			%	31,2	12,4	15,9	20,7	19,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.648	5.683	5.974	7.732	10.707	43.744
			%	31,2	13,0	13,7	17,7	24,5	100,0
		Secundaria, superior	N	8.560	5.935	7.319	5.835	10.192	37.841
			%	22,6	15,7	19,3	15,4	26,9	100,0
		Terciaria	N	7.412	4.805	3.605	3.875	4.507	24.204
			%	30,6	19,9	14,9	16,0	18,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1020

Tabla 232. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y nivel de estudios*

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	N	77.372	33.565	29.537	39.835	47.525	227.832
			%	34,0	14,7	13,0	17,5	20,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	51.212	23.052	19.815	25.713	35.833	155.625
			%	32,9	14,8	12,7	16,5	23,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.555	4.592	4.916	9.295	6.502	38.860
			%	34,9	11,8	12,7	23,9	16,7	100,0
		Secundaria, superior	N	8.009	3.261	3.390	2.276	3.261	20.198
			%	39,7	16,1	16,8	11,3	16,1	100,0
		Terciaria	N	4.595	2.660	1.416	2.550	1.928	13.149
			%	34,9	20,2	10,8	19,4	14,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1021

Tabla 233. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y territorio histórico

Hombres	Total	CAPV	N	A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
				N	%	N	%	N	%
			N	54.956	93.915	141.765	191.499	432.990	915.124
			%	6,0	10,3	15,5	20,9	47,3	100,0
		Araba	N	6.655	10.401	20.322	32.120	64.253	133.751
			%	5,0	7,8	15,2	24,0	48,0	100,0
		Gipuzkoa	N	16.340	30.102	34.314	55.570	157.486	293.812
			%	5,6	10,2	11,7	18,9	53,6	100,0
		Bizkaia	N	31.961	53.412	87.129	103.808	211.252	487.561
			%	6,6	11,0	17,9	21,3	43,3	100,0
	15-24	CAPV	N	7.658	21.942	26.835	22.882	15.142	94.458
			%	8,1	23,2	28,4	24,2	16,0	100,0
		Araba	N	444	3.598	4.722	4.143	1.962	14.869
			%	3,0	24,2	31,8	27,9	13,2	100,0
		Gipuzkoa	N	1.817	6.027	6.686	8.842	7.934	31.305
			%	5,8	19,3	21,4	28,2	25,3	100,0
		Bizkaia	N	5.397	12.317	15.427	9.897	5.246	48.284
			%	11,2	25,5	32,0	20,5	10,9	100,0
	25-44	CAPV	N	31.701	51.641	82.087	80.881	89.999	336.309
			%	9,4	15,4	24,4	24,0	26,8	100,0
		Araba	N	5.143	4.671	11.450	14.887	15.911	52.062
			%	9,9	9,0	22,0	28,6	30,6	100,0
		Gipuzkoa	N	10.170	19.064	18.156	25.160	34.239	106.790
			%	9,5	17,9	17,0	23,6	32,1	100,0
		Bizkaia	N	16.388	27.906	52.481	40.834	39.848	177.458
			%	9,2	15,7	29,6	23,0	22,5	100,0
	45-64	CAPV	N	12.228	18.464	26.847	68.323	176.793	302.655
			%	4,0	6,1	8,9	22,6	58,4	100,0
		Araba	N	821	1.794	3.696	11.332	25.108	42.751
			%	1,9	4,2	8,6	26,5	58,7	100,0
		Gipuzkoa	N	3.436	4.695	8.394	16.039	64.855	97.419
			%	3,5	4,8	8,6	16,5	66,6	100,0
		Bizkaia	N	7.970	11.975	14.758	40.952	86.830	162.485
			%	4,9	7,4	9,1	25,2	53,4	100,0
	65-74	CAPV	N	2.485	1.102	4.251	11.676	76.219	95.733
			%	2,6	1,2	4,4	12,2	79,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 233. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres 65-74	Araba	N	247	80	360	1.152	11.325	13.163	
		%	1,9	0,6	2,7	8,8	86,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	711	316	625	3.614	26.865	32.130	
		%	2,2	1,0	1,9	11,2	83,6	100,0	
	Bizkaia	N	1.527	706	3.267	6.910	38.030	50.440	
		%	3,0	1,4	6,5	13,7	75,4	100,0	
	>=75	CAPV	N	884	766	1.745	7.736	74.837	85.968
			%	1,0	0,9	2,0	9,0	87,1	100,0
		Araba	N	.	258	95	606	9.947	10.905
			%	.	2,4	0,9	5,6	91,2	100,0
		Gipuzkoa	N	205	.	454	1.916	23.593	26.168
			%	0,8	.	1,7	7,3	90,2	100,0
Bizkaia		N	679	508	1.196	5.214	41.297	48.895	
		%	1,4	1,0	2,4	10,7	84,5	100,0	
Mujeres		Total CAPV	N	36.388	54.937	105.871	195.057	583.629	975.882
			%	3,7	5,6	10,8	20,0	59,8	100,0
		Araba	N	5.181	6.111	16.480	28.940	80.060	136.772
			%	3,8	4,5	12,0	21,2	58,5	100,0
	Gipuzkoa	N	9.558	16.660	24.151	52.518	209.799	312.686	
		%	3,1	5,3	7,7	16,8	67,1	100,0	
	Bizkaia	N	21.649	32.166	65.240	113.600	293.770	526.425	
		%	4,1	6,1	12,4	21,6	55,8	100,0	
	15-24	CAPV	N	5.367	11.688	24.182	20.513	27.749	89.499
			%	6,0	13,1	27,0	22,9	31,0	100,0
		Araba	N	760	1.199	3.765	3.760	3.726	13.210
			%	5,8	9,1	28,5	28,5	28,2	100,0
Gipuzkoa		N	1.470	2.401	5.946	6.745	12.882	29.443	
		%	5,0	8,2	20,2	22,9	43,8	100,0	
Bizkaia	N	3.137	8.089	14.471	10.009	11.141	46.846		
	%	6,7	17,3	30,9	21,4	23,8	100,0		
25-44	CAPV	N	17.411	30.816	51.222	89.301	132.076	320.826	
		%	5,4	9,6	16,0	27,8	41,2	100,0	
	Araba	N	2.994	3.068	8.043	13.397	20.367	47.869	
		%	6,3	6,4	16,8	28,0	42,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1023

Tabla 233. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	4.656	10.258	10.637	23.667	52.688	101.905
			%	4,6	10,1	10,4	23,2	51,7	100,0
		Bizkaia	N	9.761	17.490	32.542	52.237	59.022	171.052
			%	5,7	10,2	19,0	30,5	34,5	100,0
	45-64	CAPV	N	9.171	9.416	24.271	60.304	210.606	313.769
			%	2,9	3,0	7,7	19,2	67,1	100,0
		Araba	N	853	1.516	4.268	8.596	29.031	44.263
			%	1,9	3,4	9,6	19,4	65,6	100,0
		Gipuzkoa	N	1.819	2.208	5.216	14.647	75.772	99.662
			%	1,8	2,2	5,2	14,7	76,0	100,0
		Bizkaia	N	6.499	5.693	14.787	37.061	105.804	169.843
			%	3,8	3,4	8,7	21,8	62,3	100,0
	65-74	CAPV	N	1.550	1.491	4.275	14.000	88.609	109.925
			%	1,4	1,4	3,9	12,7	80,6	100,0
		Araba	N	343	231	84	2.073	11.589	14.320
			%	2,4	1,6	0,6	14,5	80,9	100,0
		Gipuzkoa	N	626	1.045	1.308	3.572	29.569	36.120
			%	1,7	2,9	3,6	9,9	81,9	100,0
		Bizkaia	N	581	215	2.883	8.354	47.451	59.484
			%	1,0	0,4	4,8	14,0	79,8	100,0
>=75	CAPV	N	2.890	1.525	1.920	10.941	124.589	141.864	
		%	2,0	1,1	1,4	7,7	87,8	100,0	
	Araba	N	230	98	319	1.115	15.347	17.110	
		%	1,3	0,6	1,9	6,5	89,7	100,0	
	Gipuzkoa	N	988	748	1.043	3.887	38.889	45.555	
		%	2,2	1,6	2,3	8,5	85,4	100,0	
	Bizkaia	N	1.671	680	558	5.939	70.352	79.200	
		%	2,1	0,9	0,7	7,5	88,8	100,0	
Ambos	Total	CAPV	N	91.344	148.852	247.635	386.556	1.016.619	1.891.006
			%	4,8	7,9	13,1	20,4	53,8	100,0
		Araba	N	11.836	16.512	36.801	61.060	144.313	270.523
			%	4,4	6,1	13,6	22,6	53,3	100,0
		Gipuzkoa	N	25.898	46.762	58.465	108.088	367.285	606.497
			%	4,3	7,7	9,6	17,8	60,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 233. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	Total	Bizkaia	N	53.610	85.578	152.369	217.408	505.021	1.013.987
			%	5,3	8,4	15,0	21,4	49,8	100,0
	15-24	CAPV	N	13.025	33.630	51.017	43.395	42.891	183.958
			%	7,1	18,3	27,7	23,6	23,3	100,0
		Araba	N	1.204	4.797	8.487	7.903	5.688	28.079
			%	4,3	17,1	30,2	28,1	20,3	100,0
		Gipuzkoa	N	3.287	8.427	12.632	15.586	20.816	60.748
			%	5,4	13,9	20,8	25,7	34,3	100,0
		Bizkaia	N	8.534	20.406	29.898	19.906	16.387	95.130
			%	9,0	21,5	31,4	20,9	17,2	100,0
	25-44	CAPV	N	49.112	82.456	133.309	170.182	222.075	657.135
			%	7,5	12,5	20,3	25,9	33,8	100,0
		Araba	N	8.137	7.739	19.493	28.284	36.278	99.930
			%	8,1	7,7	19,5	28,3	36,3	100,0
		Gipuzkoa	N	14.826	29.322	28.793	48.827	86.927	208.695
			%	7,1	14,1	13,8	23,4	41,7	100,0
		Bizkaia	N	26.149	45.396	85.023	93.072	98.870	348.509
			%	7,5	13,0	24,4	26,7	28,4	100,0
	45-64	CAPV	N	21.399	27.881	51.118	128.627	387.399	616.424
			%	3,5	4,5	8,3	20,9	62,8	100,0
		Araba	N	1.674	3.310	7.964	19.928	54.139	87.015
			%	1,9	3,8	9,2	22,9	62,2	100,0
		Gipuzkoa	N	5.256	6.903	13.609	30.686	140.626	197.081
			%	2,7	3,5	6,9	15,6	71,4	100,0
		Bizkaia	N	14.469	17.667	29.545	78.013	192.634	332.328
			%	4,4	5,3	8,9	23,5	58,0	100,0
	65-74	CAPV	N	4.035	2.593	8.526	25.676	164.828	205.658
			%	2,0	1,3	4,1	12,5	80,1	100,0
		Araba	N	590	311	444	3.225	22.914	27.483
			%	2,1	1,1	1,6	11,7	83,4	100,0
		Gipuzkoa	N	1.337	1.361	1.933	7.186	56.434	68.251
			%	2,0	2,0	2,8	10,5	82,7	100,0
		Bizkaia	N	2.108	921	6.149	15.265	85.481	109.924
			%	1,9	0,8	5,6	13,9	77,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1025

Tabla 233. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	CAPV	N	3.774	2.291	3.665	18.676	199.426	227.832
			%	1,7	1,0	1,6	8,2	87,5	100,0
		Araba	N	230	356	414	1.720	25.294	28.015
			%	0,8	1,3	1,5	6,1	90,3	100,0
		Gipuzkoa	N	1.193	748	1.497	5.803	62.482	71.723
			%	1,7	1,0	2,1	8,1	87,1	100,0
		Bizkaia	N	2.350	1.188	1.754	11.153	111.649	128.094
			%	1,8	0,9	1,4	8,7	87,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1026

Tabla 234. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	Total	Total	N	54.658	93.466	141.666	191.499	432.575	913.863
			%	6,0	10,2	15,5	21,0	47,3	100,0
	I	N		2.068	11.835	17.868	28.594	53.325	113.690
			%	1,8	10,4	15,7	25,2	46,9	100,0
	II	N		3.651	8.999	13.601	17.801	34.154	78.206
			%	4,7	11,5	17,4	22,8	43,7	100,0
	III	N		9.461	17.625	29.166	37.311	94.792	188.355
			%	5,0	9,4	15,5	19,8	50,3	100,0
	IV	N		32.374	44.936	65.313	91.920	215.763	450.306
			%	7,2	10,0	14,5	20,4	47,9	100,0
	V	N		7.104	10.071	15.718	15.873	34.541	83.307
			%	8,5	12,1	18,9	19,1	41,5	100,0
	15-24	Total	N	7.360	21.682	26.835	22.882	15.142	93.900
			%	7,8	23,1	28,6	24,4	16,1	100,0
	I	N		808	3.508	4.369	4.453	1.496	14.634
			%	5,5	24,0	29,9	30,4	10,2	100,0
	II	N		896	1.600	3.353	2.695	2.443	10.988
			%	8,2	14,6	30,5	24,5	22,2	100,0
	III	N		2.139	2.911	4.281	3.228	4.272	16.830
			%	12,7	17,3	25,4	19,2	25,4	100,0
	IV	N		3.218	11.619	12.057	9.493	6.350	42.737
			%	7,5	27,2	28,2	22,2	14,9	100,0
	V	N		299	2.044	2.775	3.013	580	8.711
			%	3,4	23,5	31,9	34,6	6,7	100,0
	25-44	Total	N	31.701	51.641	82.087	80.881	89.999	336.309
			%	9,4	15,4	24,4	24,0	26,8	100,0
	I	N		551	5.835	8.728	14.165	14.453	43.732
			%	1,3	13,3	20,0	32,4	33,0	100,0
	II	N		2.021	6.194	7.409	8.702	8.170	32.496
			%	6,2	19,1	22,8	26,8	25,1	100,0
	III	N		3.521	10.024	17.519	13.282	17.910	62.257
			%	5,7	16,1	28,1	21,3	28,8	100,0
	IV	N		18.922	23.932	38.317	37.931	41.290	160.392
			%	11,8	14,9	23,9	23,6	25,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1027

Tabla 234. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social

			3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres 25-44 V	N	6.685	5.655	10.114	6.801	8.177	37.432
	%	17,9	15,1	27,0	18,2	21,8	100,0
45-64 Total	N	12.228	18.276	26.748	68.323	176.793	302.368
	%	4,0	6,0	8,8	22,6	58,5	100,0
I	N	516	2.219	3.735	7.970	23.467	37.907
	%	1,4	5,9	9,9	21,0	61,9	100,0
II	N	640	1.125	2.303	4.029	15.324	23.419
	%	2,7	4,8	9,8	17,2	65,4	100,0
III	N	2.729	3.794	5.502	16.660	37.637	66.322
	%	4,1	5,7	8,3	25,1	56,7	100,0
IV	N	8.223	8.766	12.519	34.782	86.324	150.614
	%	5,5	5,8	8,3	23,1	57,3	100,0
V	N	121	2.372	2.689	4.883	14.041	24.106
	%	0,5	9,8	11,2	20,3	58,2	100,0
65-74 Total	N	2.485	1.102	4.251	11.676	76.219	95.733
	%	2,6	1,2	4,4	12,2	79,6	100,0
I	N	.	273	860	1.937	10.684	13.753
	%	.	2,0	6,2	14,1	77,7	100,0
II	N	94	80	536	1.367	4.785	6.862
	%	1,4	1,2	7,8	19,9	69,7	100,0
III	N	1.072	527	966	1.934	17.278	21.777
	%	4,9	2,4	4,4	8,9	79,3	100,0
IV	N	1.320	223	1.889	5.823	38.499	47.753
	%	2,8	0,5	4,0	12,2	80,6	100,0
V	N	.	.	.	615	4.974	5.588
	%	.	.	.	11,0	89,0	100,0
>=75 Total	N	884	766	1.745	7.736	74.422	85.553
	%	1,0	0,9	2,0	9,0	87,0	100,0
I	N	193	.	175	69	3.226	3.663
	%	5,3	.	4,8	1,9	88,1	100,0
II	N	.	.	.	1.007	3.432	4.440
	%	.	.	.	22,7	77,3	100,0
III	N	.	369	898	2.207	17.695	21.169
	%	.	1,7	4,2	10,4	83,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1028

Tabla 234. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres >=75	IV	N	691	397	531	3.891	43.300	48.810
		%	1,4	0,8	1,1	8,0	88,7	100,0
	V	N	.	.	140	561	6.769	7.470
		%	.	.	1,9	7,5	90,6	100,0
	Total	N	36.388	54.681	105.617	194.748	582.058	973.492
		%	3,7	5,6	10,8	20,0	59,8	100,0
Mujeres	I	N	2.268	6.628	12.234	22.633	61.075	104.838
		%	2,2	6,3	11,7	21,6	58,3	100,0
	II	N	2.546	5.862	10.785	24.830	51.005	95.028
		%	2,7	6,2	11,3	26,1	53,7	100,0
	III	N	5.653	13.027	28.164	52.452	142.812	242.107
		%	2,3	5,4	11,6	21,7	59,0	100,0
	IV	N	17.277	20.406	37.692	64.070	220.996	360.441
		%	4,8	5,7	10,5	17,8	61,3	100,0
	V	N	8.644	8.758	16.742	30.763	106.171	171.077
		%	5,1	5,1	9,8	18,0	62,1	100,0
	15-24 Total	N	5.367	11.433	23.928	20.306	27.500	88.533
		%	6,1	12,9	27,0	22,9	31,1	100,0
	I	N	555	1.729	2.846	4.270	5.162	14.562
		%	3,8	11,9	19,5	29,3	35,5	100,0
	II	N	624	748	2.288	3.947	5.890	13.497
		%	4,6	5,5	17,0	29,2	43,6	100,0
	III	N	430	2.250	6.947	4.674	5.769	20.069
		%	2,1	11,2	34,6	23,3	28,7	100,0
	IV	N	3.102	4.686	9.285	6.027	8.513	31.614
		%	9,8	14,8	29,4	19,1	26,9	100,0
	V	N	656	2.020	2.562	1.388	2.166	8.792
		%	7,5	23,0	29,1	15,8	24,6	100,0
	25-44 Total	N	17.411	30.816	51.222	89.301	131.581	320.330
		%	5,4	9,6	16,0	27,9	41,1	100,0
I	N	1.413	4.317	5.493	12.073	21.790	45.086	
	%	3,1	9,6	12,2	26,8	48,3	100,0	
II	N	825	2.855	5.345	12.990	15.208	37.223	
	%	2,2	7,7	14,4	34,9	40,9	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1029

Tabla 234. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	3.064	8.611	14.744	22.426	33.184	82.029
			%	3,7	10,5	18,0	27,3	40,5	100,0
		IV	N	7.242	11.596	17.811	29.184	44.892	110.725
			%	6,5	10,5	16,1	26,4	40,5	100,0
		V	N	4.867	3.436	7.830	12.627	16.507	45.267
			%	10,8	7,6	17,3	27,9	36,5	100,0
	45-64	Total	N	9.171	9.416	24.271	60.304	210.435	313.598
			%	2,9	3,0	7,7	19,2	67,1	100,0
		I	N	194	207	3.170	4.587	23.958	32.116
			%	0,6	0,6	9,9	14,3	74,6	100,0
		II	N	541	1.907	2.772	6.194	15.379	26.792
			%	2,0	7,1	10,3	23,1	57,4	100,0
		III	N	1.599	1.710	5.521	19.385	60.426	88.641
			%	1,8	1,9	6,2	21,9	68,2	100,0
		IV	N	4.925	2.892	7.668	17.845	70.771	104.102
			%	4,7	2,8	7,4	17,1	68,0	100,0
		V	N	1.912	2.699	5.140	12.293	39.901	61.946
			%	3,1	4,4	8,3	19,8	64,4	100,0
	65-74	Total	N	1.550	1.491	4.275	14.000	88.454	109.770
			%	1,4	1,4	3,9	12,8	80,6	100,0
		I	N	106	253	611	822	5.407	7.199
			%	1,5	3,5	8,5	11,4	75,1	100,0
		II	N	.	.	.	436	6.789	7.225
			%	.	.	.	6,0	94,0	100,0
		III	N	174	.	243	2.639	19.842	22.899
			%	0,8	.	1,1	11,5	86,7	100,0
		IV	N	351	1.035	2.532	6.967	39.249	50.134
			%	0,7	2,1	5,1	13,9	78,3	100,0
		V	N	918	203	888	3.134	17.168	22.312
			%	4,1	0,9	4,0	14,0	76,9	100,0
	>=75	Total	N	2.890	1.525	1.920	10.838	124.088	141.261
			%	2,0	1,1	1,4	7,7	87,8	100,0
		I	N	.	122	114	880	4.759	5.875
			%	.	2,1	1,9	15,0	81,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1030

Tabla 234. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	>=75	II	N	557	352	380	1.263	7.740	10.292
			%	5,4	3,4	3,7	12,3	75,2	100,0
		III	N	386	456	709	3.327	23.590	28.468
			%	1,4	1,6	2,5	11,7	82,9	100,0
		IV	N	1.657	197	396	4.046	57.570	63.866
			%	2,6	0,3	0,6	6,3	90,1	100,0
		V	N	290	399	321	1.321	30.429	32.760
			%	0,9	1,2	1,0	4,0	92,9	100,0
	Ambos	Total	N	91.046	148.147	247.283	386.246	1.014.633	1.887.356
			%	4,8	7,8	13,1	20,5	53,8	100,0
	I	N	4.336	18.462	30.101	51.227	114.400	218.528	
		%	2,0	8,4	13,8	23,4	52,4	100,0	
	II	N	6.198	14.861	24.386	42.631	85.159	173.234	
		%	3,6	8,6	14,1	24,6	49,2	100,0	
	III	N	15.113	30.652	57.331	89.763	237.604	430.462	
		%	3,5	7,1	13,3	20,9	55,2	100,0	
	IV	N	49.651	65.343	103.005	155.989	436.758	810.747	
		%	6,1	8,1	12,7	19,2	53,9	100,0	
	V	N	15.748	18.829	32.460	46.636	140.712	254.385	
		%	6,2	7,4	12,8	18,3	55,3	100,0	
	15-24	Total	N	12.727	33.114	50.763	43.188	42.641	182.434
			%	7,0	18,2	27,8	23,7	23,4	100,0
		I	N	1.362	5.237	7.215	8.723	6.659	29.196
			%	4,7	17,9	24,7	29,9	22,8	100,0
		II	N	1.520	2.348	5.641	6.641	8.333	24.485
			%	6,2	9,6	23,0	27,1	34,0	100,0
		III	N	2.569	5.160	11.228	7.902	10.041	36.900
			%	7,0	14,0	30,4	21,4	27,2	100,0
	IV	N	6.320	16.305	21.342	15.521	14.864	74.351	
		%	8,5	21,9	28,7	20,9	20,0	100,0	
	V	N	955	4.064	5.337	4.401	2.745	17.503	
		%	5,5	23,2	30,5	25,1	15,7	100,0	
25-44	Total	N	49.112	82.456	133.309	170.182	221.580	656.640	
		%	7,5	12,6	20,3	25,9	33,7	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1031

Tabla 234. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	25-44	I	N	1.964	10.152	14.222	26.238	36.242	88.818
			%	2,2	11,4	16,0	29,5	40,8	100,0
		II	N	2.846	9.049	12.753	21.693	23.378	69.719
			%	4,1	13,0	18,3	31,1	33,5	100,0
		III	N	6.585	18.636	32.263	35.708	51.094	144.286
			%	4,6	12,9	22,4	24,7	35,4	100,0
		IV	N	26.164	35.528	56.128	67.116	86.182	271.117
			%	9,7	13,1	20,7	24,8	31,8	100,0
		V	N	11.552	9.091	17.944	19.428	24.684	82.699
			%	14,0	11,0	21,7	23,5	29,8	100,0
		45-64 Total	N	21.399	27.692	51.019	128.627	387.228	615.965
			%	3,5	4,5	8,3	20,9	62,9	100,0
		I	N	710	2.427	6.905	12.558	47.425	70.023
			%	1,0	3,5	9,9	17,9	67,7	100,0
		II	N	1.181	3.032	5.074	10.223	30.702	50.212
			%	2,4	6,0	10,1	20,4	61,1	100,0
		III	N	4.327	5.504	11.023	36.045	98.064	154.963
			%	2,8	3,6	7,1	23,3	63,3	100,0
		IV	N	13.148	11.658	20.187	52.626	157.095	254.716
			%	5,2	4,6	7,9	20,7	61,7	100,0
		V	N	2.033	5.071	7.830	17.176	53.943	86.052
			%	2,4	5,9	9,1	20,0	62,7	100,0
		65-74 Total	N	4.035	2.593	8.526	25.676	164.673	205.503
			%	2,0	1,3	4,1	12,5	80,1	100,0
		I	N	106	525	1.471	2.759	16.091	20.952
			%	0,5	2,5	7,0	13,2	76,8	100,0
		II	N	94	80	536	1.803	11.574	14.087
			%	0,7	0,6	3,8	12,8	82,2	100,0
		III	N	1.246	527	1.210	4.573	37.120	44.676
			%	2,8	1,2	2,7	10,2	83,1	100,0
		IV	N	1.671	1.258	4.421	12.790	77.747	97.887
			%	1,7	1,3	4,5	13,1	79,4	100,0
		V	N	918	203	888	3.749	22.142	27.901
			%	3,3	0,7	3,2	13,4	79,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1032

Tabla 234. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	Total	N 3.774	2.291	3.665	18.574	198.510	226.814
			% 1,7	1,0	1,6	8,2	87,5	100,0
	I	N	193	122	289	950	7.984	9.538
		%	2,0	1,3	3,0	10,0	83,7	100,0
	II	N	557	352	380	2.271	11.172	14.731
		%	3,8	2,4	2,6	15,4	75,8	100,0
	III	N	386	825	1.607	5.534	41.285	49.638
		%	0,8	1,7	3,2	11,1	83,2	100,0
	IV	N	2.348	594	927	7.937	100.870	112.676
		%	2,1	0,5	0,8	7,0	89,5	100,0
	V	N	290	399	461	1.882	37.198	40.231
		%	0,7	1,0	1,1	4,7	92,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1033

Tabla 235. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	Total	N	54.956	93.915	141.765	191.499	432.990	915.124
		%	6,0	10,3	15,5	20,9	47,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	11.088	9.933	21.437	30.641	137.501	210.600
		%	5,3	4,7	10,2	14,5	65,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	14.735	18.066	26.735	32.111	75.807	167.454
		%	8,8	10,8	16,0	19,2	45,3	100,0
	Secundaria, superior	N	24.628	46.644	62.102	87.682	139.614	360.670
		%	6,8	12,9	17,2	24,3	38,7	100,0
	Terciaria	N	4.504	19.273	31.491	41.065	80.069	176.400
		%	2,6	10,9	17,9	23,3	45,4	100,0
	15-24 Total	N	7.658	21.942	26.835	22.882	15.142	94.458
		%	8,1	23,2	28,4	24,2	16,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.412	1.810	3.482	1.931	1.282	9.918
		%	14,2	18,3	35,1	19,5	12,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.015	5.938	10.061	6.579	5.535	31.129
		%	9,7	19,1	32,3	21,1	17,8	100,0
	Secundaria, superior	N	3.011	11.799	10.623	10.761	6.647	42.840
		%	7,0	27,5	24,8	25,1	15,5	100,0
	Terciaria	N	219	2.394	2.669	3.611	1.678	10.572
		%	2,1	22,6	25,2	34,2	15,9	100,0
	25-44 Total	N	31.701	51.641	82.087	80.881	89.999	336.309
		%	9,4	15,4	24,4	24,0	26,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.232	4.542	10.600	8.151	10.250	37.776
		%	11,2	12,0	28,1	21,6	27,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	8.840	8.261	11.013	8.480	16.216	52.808
		%	16,7	15,6	20,9	16,1	30,7	100,0
	Secundaria, superior	N	16.619	24.751	39.959	42.887	40.059	164.274
		%	10,1	15,1	24,3	26,1	24,4	100,0
	Terciaria	N	2.011	14.087	20.515	21.364	23.474	81.451
		%	2,5	17,3	25,2	26,2	28,8	100,0
	45-64 Total	N	12.228	18.464	26.847	68.323	176.793	302.655
		%	4,0	6,1	8,9	22,6	58,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.679	3.044	4.830	12.682	46.165	70.400
		%	5,2	4,3	6,9	18,0	65,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1034

Tabla 235. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	1.608	3.780	4.804	14.292	28.760	53.244
			%	3,0	7,1	9,0	26,8	54,0	100,0
		Secundaria, superior	N	4.999	9.265	10.056	28.269	64.542	117.130
			%	4,3	7,9	8,6	24,1	55,1	100,0
		Terciaria	N	1.941	2.376	7.158	13.080	37.326	61.881
			%	3,1	3,8	11,6	21,1	60,3	100,0
	65-74	Total	N	2.485	1.102	4.251	11.676	76.219	95.733
			%	2,6	1,2	4,4	12,2	79,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.204	.	1.059	3.672	32.082	38.017
			%	3,2	.	2,8	9,7	84,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.141	.	754	1.370	13.027	16.291
			%	7,0	.	4,6	8,4	80,0	100,0
	Secundaria, superior	N	.	829	1.465	4.306	19.347	25.948	
		%	.	3,2	5,6	16,6	74,6	100,0	
	Terciaria	N	140	273	973	2.328	11.764	15.477	
		%	0,9	1,8	6,3	15,0	76,0	100,0	
	>=75	Total	N	884	766	1.745	7.736	74.837	85.968
			%	1,0	0,9	2,0	9,0	87,1	100,0
Sin estudios, primaria		N	560	536	1.466	4.205	47.722	54.489	
		%	1,0	1,0	2,7	7,7	87,6	100,0	
Secundaria, inferior		N	132	87	104	1.390	12.270	13.981	
		%	0,9	0,6	0,7	9,9	87,8	100,0	
Secundaria, superior	N	.	.	.	1.459	9.019	10.478		
	%	.	.	.	13,9	86,1	100,0		
Terciaria	N	193	143	175	682	5.826	7.020		
	%	2,8	2,0	2,5	9,7	83,0	100,0		
Mujeres	Total	N	36.388	54.937	105.871	195.057	583.629	975.882	
		%	3,7	5,6	10,8	20,0	59,8	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	7.416	9.620	12.843	35.897	212.551	278.327	
		%	2,7	3,5	4,6	12,9	76,4	100,0	
	Secundaria, inferior	N	8.393	10.494	18.780	30.967	101.133	169.766	
		%	4,9	6,2	11,1	18,2	59,6	100,0	
Secundaria, superior	N	13.545	24.537	44.514	70.991	154.280	307.866		
	%	4,4	8,0	14,5	23,1	50,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1035

Tabla 235. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N	7.034	10.286	29.734	57.203	115.666	219.923
			%	3,2	4,7	13,5	26,0	52,6	100,0
	15-24	Total	N	5.367	11.688	24.182	20.513	27.749	89.499
			%	6,0	13,1	27,0	22,9	31,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	729	2.612	2.169	1.603	4.274	11.386
			%	6,4	22,9	19,0	14,1	37,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.776	2.413	4.018	3.159	5.397	16.763
			%	10,6	14,4	24,0	18,8	32,2	100,0
		Secundaria, superior	N	2.862	5.239	14.037	10.158	13.147	45.443
			%	6,3	11,5	30,9	22,4	28,9	100,0
		Terciaria	N	.	1.424	3.958	5.593	4.931	15.907
			%	.	9,0	24,9	35,2	31,0	100,0
	25-44	Total	N	17.411	30.816	51.222	89.301	132.076	320.826
			%	5,4	9,6	16,0	27,8	41,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.753	2.637	2.871	6.695	11.034	25.990
			%	10,6	10,1	11,0	25,8	42,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.178	4.949	7.297	11.015	13.498	38.937
			%	5,6	12,7	18,7	28,3	34,7	100,0
		Secundaria, superior	N	7.345	15.710	20.789	34.844	51.799	130.487
			%	5,6	12,0	15,9	26,7	39,7	100,0
		Terciaria	N	5.135	7.519	20.265	36.748	55.745	125.412
			%	4,1	6,0	16,2	29,3	44,4	100,0
	45-64	Total	N	9.171	9.416	24.271	60.304	210.606	313.769
			%	2,9	3,0	7,7	19,2	67,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.370	2.945	4.306	14.251	55.092	77.963
			%	1,8	3,8	5,5	18,3	70,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.133	2.014	5.737	10.761	40.090	61.735
			%	5,1	3,3	9,3	17,4	64,9	100,0
		Secundaria, superior	N	3.075	3.489	8.717	21.914	73.127	110.322
			%	2,8	3,2	7,9	19,9	66,3	100,0
		Terciaria	N	1.594	968	5.511	13.378	42.297	63.749
			%	2,5	1,5	8,6	21,0	66,4	100,0
	65-74	Total	N	1.550	1.491	4.275	14.000	88.609	109.925
			%	1,4	1,4	3,9	12,7	80,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1036

Tabla 235. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	1.065	789	2.426	6.985	50.587	61.852
			%	1,7	1,3	3,9	11,3	81,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	378	351	1.343	4.040	21.339	27.452
			%	1,4	1,3	4,9	14,7	77,7	100,0
		Secundaria, superior	N	.	98	506	2.491	8.799	11.893
			%	.	0,8	4,3	20,9	74,0	100,0
	Terciaria	N	106	253	.	483	7.885	8.727	
		%	1,2	2,9	.	5,5	90,4	100,0	
	>=75	Total	N	2.890	1.525	1.920	10.941	124.589	141.864
			%	2,0	1,1	1,4	7,7	87,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.500	638	1.072	6.363	91.564	101.136
			%	1,5	0,6	1,1	6,3	90,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	928	766	385	1.992	20.809	24.879
			%	3,7	3,1	1,5	8,0	83,6	100,0
		Secundaria, superior	N	263	.	464	1.585	7.408	9.720
			%	2,7	.	4,8	16,3	76,2	100,0
		Terciaria	N	199	122	.	1.001	4.807	6.129
			%	3,2	2,0	.	16,3	78,4	100,0
Ambos		Total	N	91.344	148.852	247.635	386.556	1.016.619	1.891.006
			%	4,8	7,9	13,1	20,4	53,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	18.504	19.553	34.280	66.539	350.051	488.927	
		%	3,8	4,0	7,0	13,6	71,6	100,0	
	Secundaria, inferior	N	23.129	28.560	45.514	63.078	176.939	337.220	
		%	6,9	8,5	13,5	18,7	52,5	100,0	
	Secundaria, superior	N	38.173	71.180	106.616	158.672	293.894	668.536	
		%	5,7	10,6	15,9	23,7	44,0	100,0	
	Terciaria	N	11.538	29.559	61.225	98.268	195.734	396.323	
		%	2,9	7,5	15,4	24,8	49,4	100,0	
	15-24	Total	N	13.025	33.630	51.017	43.395	42.891	183.958
			%	7,1	18,3	27,7	23,6	23,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.141	4.422	5.651	3.535	5.555	21.304
			%	10,1	20,8	26,5	16,6	26,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	4.791	8.352	14.079	9.738	10.932	47.891	
		%	10,0	17,4	29,4	20,3	22,8	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1037

Tabla 235. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	5.874	17.038	24.660	20.918	19.794	88.283
			%	6,7	19,3	27,9	23,7	22,4	100,0
		Terciaria	N	219	3.819	6.627	9.204	6.610	26.479
			%	0,8	14,4	25,0	34,8	25,0	100,0
	25-44	Total	N	49.112	82.456	133.309	170.182	222.075	657.135
			%	7,5	12,5	20,3	25,9	33,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.985	7.179	13.471	14.846	21.284	63.765
			%	11,0	11,3	21,1	23,3	33,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	11.018	13.210	18.309	19.495	29.713	91.745
			%	12,0	14,4	20,0	21,2	32,4	100,0
		Secundaria, superior	N	23.963	40.461	60.748	77.731	91.858	294.762
			%	8,1	13,7	20,6	26,4	31,2	100,0
		Terciaria	N	7.146	21.606	40.780	58.111	79.220	206.862
			%	3,5	10,4	19,7	28,1	38,3	100,0
	45-64	Total	N	21.399	27.881	51.118	128.627	387.399	616.424
			%	3,5	4,5	8,3	20,9	62,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.049	5.989	9.136	26.933	101.257	148.363
			%	3,4	4,0	6,2	18,2	68,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.741	5.794	10.540	25.053	68.850	114.979
			%	4,1	5,0	9,2	21,8	59,9	100,0
		Secundaria, superior	N	8.073	12.754	18.773	50.183	137.668	227.452
			%	3,5	5,6	8,3	22,1	60,5	100,0
		Terciaria	N	3.535	3.344	12.669	26.458	79.624	125.630
			%	2,8	2,7	10,1	21,1	63,4	100,0
	65-74	Total	N	4.035	2.593	8.526	25.676	164.828	205.658
			%	2,0	1,3	4,1	12,5	80,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.269	789	3.485	10.658	82.669	99.869
			%	2,3	0,8	3,5	10,7	82,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.520	351	2.097	5.410	34.365	43.744
			%	3,5	0,8	4,8	12,4	78,6	100,0
		Secundaria, superior	N	.	927	1.971	6.797	28.146	37.841
			%	.	2,4	5,2	18,0	74,4	100,0
		Terciaria	N	246	525	973	2.811	19.649	24.204
			%	1,0	2,2	4,0	11,6	81,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1038

Tabla 235. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y nivel de estudios*

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	N	3.774	2.291	3.665	18.676	199.426	227.832
			%	1,7	1,0	1,6	8,2	87,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.059	1.174	2.537	10.568	139.287	155.625
			%	1,3	0,8	1,6	6,8	89,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.060	853	488	3.381	33.078	38.860
			%	2,7	2,2	1,3	8,7	85,1	100,0
		Secundaria, superior	N	263	.	464	3.043	16.428	20.198
			%	1,3	.	2,3	15,1	81,3	100,0
		Terciaria	N	392	265	175	1.684	10.633	13.149
			%	3,0	2,0	1,3	12,8	80,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1039

Tabla 236. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	6.028	33.183	131.717	301.291	442.906	915.124
			%	0,7	3,6	14,4	32,9	48,4	100,0
		Araba	N	2.078	4.096	19.139	48.529	59.909	133.751
			%	1,6	3,1	14,3	36,3	44,8	100,0
		Gipuzkoa	N	473	9.771	41.555	94.612	147.401	293.812
			%	0,2	3,3	14,1	32,2	50,2	100,0
		Bizkaia	N	3.478	19.315	71.023	158.150	235.596	487.561
			%	0,7	4,0	14,6	32,4	48,3	100,0
	15-24	CAPV	N	1.403	6.923	30.760	43.003	12.370	94.458
			%	1,5	7,3	32,6	45,5	13,1	100,0
		Araba	N	662	907	5.620	6.851	830	14.869
			%	4,4	6,1	37,8	46,1	5,6	100,0
		Gipuzkoa	N	.	2.238	8.917	13.939	6.211	31.305
			%	.	7,2	28,5	44,5	19,8	100,0
		Bizkaia	N	741	3.778	16.223	22.214	5.329	48.284
			%	1,5	7,8	33,6	46,0	11,0	100,0
	25-44	CAPV	N	2.481	18.889	69.533	155.974	89.433	336.309
			%	0,7	5,6	20,7	46,4	26,6	100,0
		Araba	N	634	2.314	10.249	25.169	13.697	52.062
			%	1,2	4,4	19,7	48,3	26,3	100,0
		Gipuzkoa	N	305	6.622	22.572	50.214	27.076	106.790
			%	0,3	6,2	21,1	47,0	25,4	100,0
		Bizkaia	N	1.541	9.953	36.712	80.592	48.660	177.458
			%	0,9	5,6	20,7	45,4	27,4	100,0
	45-64	CAPV	N	1.442	6.831	29.391	88.405	176.587	302.655
			%	0,5	2,3	9,7	29,2	58,3	100,0
		Araba	N	674	876	3.270	14.961	22.972	42.751
			%	1,6	2,0	7,6	35,0	53,7	100,0
		Gipuzkoa	N	167	706	9.241	26.793	60.511	97.419
			%	0,2	0,7	9,5	27,5	62,1	100,0
		Bizkaia	N	601	5.249	16.880	46.651	93.104	162.485
			%	0,4	3,2	10,4	28,7	57,3	100,0
	65-74	CAPV	N	704	397	1.169	9.918	83.546	95.733
			%	0,7	0,4	1,2	10,4	87,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1040

Tabla 236. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	65-74	Araba	N	108	.	.	1.130	11.925	13.163
			%	0,8	.	.	8,6	90,6	100,0
		Gipuzkoa	N	.	204	609	2.725	28.592	32.130
			%	.	0,6	1,9	8,5	89,0	100,0
		Bizkaia	N	595	193	560	6.063	43.029	50.440
			%	1,2	0,4	1,1	12,0	85,3	100,0
	>=75	CAPV	N	.	142	864	3.991	80.971	85.968
			%	.	0,2	1,0	4,6	94,2	100,0
		Araba	N	.	.	.	419	10.486	10.905
			%	.	.	.	3,8	96,2	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	217	941	25.010	26.168
			%	.	.	0,8	3,6	95,6	100,0
Bizkaia	N	.	142	647	2.630	45.475	48.895		
	%	.	0,3	1,3	5,4	93,0	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	3.748	22.031	101.352	300.934	547.817	975.882
			%	0,4	2,3	10,4	30,8	56,1	100,0
	Araba	N	298	1.912	17.132	41.842	75.588	136.772	
		%	0,2	1,4	12,5	30,6	55,3	100,0	
	Gipuzkoa	N	782	6.191	28.645	95.480	181.588	312.686	
		%	0,3	2,0	9,2	30,5	58,1	100,0	
	Bizkaia	N	2.668	13.928	55.576	163.612	290.640	526.425	
		%	0,5	2,6	10,6	31,1	55,2	100,0	
	15-24	CAPV	N	943	5.199	23.558	41.364	18.436	89.499
			%	1,1	5,8	26,3	46,2	20,6	100,0
		Araba	N	.	134	4.451	5.520	3.104	13.210
			%	.	1,0	33,7	41,8	23,5	100,0
		Gipuzkoa	N	267	913	5.144	13.780	9.340	29.443
			%	0,9	3,1	17,5	46,8	31,7	100,0
	Bizkaia	N	675	4.152	13.963	22.064	5.992	46.846	
		%	1,4	8,9	29,8	47,1	12,8	100,0	
	25-44	CAPV	N	1.584	11.014	58.270	153.229	96.730	320.826
			%	0,5	3,4	18,2	47,8	30,2	100,0
Araba		N	298	935	9.343	23.410	13.882	47.869	
		%	0,6	2,0	19,5	48,9	29,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1041

Tabla 236. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	.	4.013	18.595	48.739	30.557	101.905
			%	.	3,9	18,2	47,8	30,0	100,0
		Bizkaia	N	1.285	6.066	30.332	81.079	52.290	171.052
			%	0,8	3,5	17,7	47,4	30,6	100,0
	45-64	CAPV	N	731	4.961	18.223	88.595	201.258	313.769
			%	0,2	1,6	5,8	28,2	64,1	100,0
		Araba	N	.	842	3.255	11.146	29.019	44.263
			%	.	1,9	7,4	25,2	65,6	100,0
	Gipuzkoa	N	301	811	4.125	28.269	66.155	99.662	
		%	0,3	0,8	4,1	28,4	66,4	100,0	
		Bizkaia	N	430	3.307	10.843	49.179	106.084	169.843
			%	0,3	1,9	6,4	29,0	62,5	100,0
	65-74	CAPV	N	278	379	902	10.323	98.043	109.925
			%	0,3	0,3	0,8	9,4	89,2	100,0
		Araba	N	.	.	82	1.549	12.689	14.320
			%	.	.	0,6	10,8	88,6	100,0
	Gipuzkoa	N	.	224	381	2.428	33.087	36.120	
		%	.	0,6	1,1	6,7	91,6	100,0	
		Bizkaia	N	278	155	438	6.346	52.268	59.484
			%	0,5	0,3	0,7	10,7	87,9	100,0
	>=75	CAPV	N	213	479	399	7.423	133.350	141.864
			%	0,2	0,3	0,3	5,2	94,0	100,0
		Araba	N	.	.	.	216	16.894	17.110
			%	.	.	.	1,3	98,7	100,0
Gipuzkoa	N	213	229	399	2.264	42.449	45.555		
	%	0,5	0,5	0,9	5,0	93,2	100,0		
	Bizkaia	N	.	249	.	4.944	74.007	79.200	
		%	.	0,3	.	6,2	93,4	100,0	
Ambos	Total	CAPV	N	9.777	55.214	233.069	602.225	990.722	1.891.006
			%	0,5	2,9	12,3	31,8	52,4	100,0
	Araba	N	2.376	6.008	36.270	90.371	135.497	270.523	
		%	0,9	2,2	13,4	33,4	50,1	100,0	
	Gipuzkoa	N	1.254	15.962	70.200	190.092	328.989	606.497	
		%	0,2	2,6	11,6	31,3	54,2	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1042

Tabla 236. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	Total	Bizkaia	N	6.146	33.244	126.598	321.762	526.236	1.013.987
			%	0,6	3,3	12,5	31,7	51,9	100,0
	15-24	CAPV	N	2.345	12.121	54.318	84.367	30.806	183.958
			%	1,3	6,6	29,5	45,9	16,7	100,0
		Araba	N	662	1.041	10.071	12.371	3.934	28.079
			%	2,4	3,7	35,9	44,1	14,0	100,0
		Gipuzkoa	N	267	3.151	14.060	27.718	15.551	60.748
			%	0,4	5,2	23,1	45,6	25,6	100,0
		Bizkaia	N	1.416	7.929	30.186	44.278	11.320	95.130
			%	1,5	8,3	31,7	46,5	11,9	100,0
	25-44	CAPV	N	4.064	29.903	127.803	309.203	186.162	657.135
			%	0,6	4,6	19,4	47,1	28,3	100,0
		Araba	N	933	3.249	19.592	48.579	27.579	99.930
			%	0,9	3,3	19,6	48,6	27,6	100,0
		Gipuzkoa	N	305	10.636	41.167	98.953	57.634	208.695
			%	0,1	5,1	19,7	47,4	27,6	100,0
		Bizkaia	N	2.826	16.019	67.044	161.671	100.950	348.509
			%	0,8	4,6	19,2	46,4	29,0	100,0
	45-64	CAPV	N	2.173	11.792	47.614	177.000	377.845	616.424
			%	0,4	1,9	7,7	28,7	61,3	100,0
		Araba	N	674	1.718	6.525	26.107	51.991	87.015
			%	0,8	2,0	7,5	30,0	59,7	100,0
		Gipuzkoa	N	468	1.518	13.366	55.063	126.666	197.081
			%	0,2	0,8	6,8	27,9	64,3	100,0
		Bizkaia	N	1.031	8.556	27.723	95.830	199.188	332.328
			%	0,3	2,6	8,3	28,8	59,9	100,0
	65-74	CAPV	N	981	776	2.071	20.241	181.589	205.658
			%	0,5	0,4	1,0	9,8	88,3	100,0
		Araba	N	108	.	82	2.679	24.614	27.483
			%	0,4	.	0,3	9,7	89,6	100,0
		Gipuzkoa	N	.	429	990	5.153	61.679	68.251
			%	.	0,6	1,5	7,5	90,4	100,0
		Bizkaia	N	873	348	998	12.409	95.296	109.924
			%	0,8	0,3	0,9	11,3	86,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1043

Tabla 236. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	CAPV	N	213	621	1.263	11.414	214.320	227.832
			%	0,1	0,3	0,6	5,0	94,1	100,0
		Araba	N	.	.	.	635	27.380	28.015
			%	.	.	.	2,3	97,7	100,0
		Gipuzkoa	N	213	229	616	3.205	67.459	71.723
			%	0,3	0,3	0,9	4,5	94,1	100,0
	Bizkaia	N	.	392	647	7.574	119.481	128.094	
		%	.	0,3	0,5	5,9	93,3	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1044

Tabla 237. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
		A diario							
Hombres	Total	Total	N	6.028	32.994	131.159	301.291	442.392	913.863
			%	0,7	3,6	14,4	33,0	48,4	100,0
	I	N		133	4.958	17.018	42.870	48.712	113.690
			%	0,1	4,4	15,0	37,7	42,8	100,0
	II	N		148	1.556	16.153	27.426	32.922	78.206
			%	0,2	2,0	20,7	35,1	42,1	100,0
	III	N		94	7.633	24.218	60.512	95.897	188.355
			%	0,1	4,1	12,9	32,1	50,9	100,0
	IV	N		5.037	15.048	59.710	140.806	229.705	450.306
			%	1,1	3,3	13,3	31,3	51,0	100,0
	V	N		617	3.798	14.059	29.677	35.157	83.307
			%	0,7	4,6	16,9	35,6	42,2	100,0
	15-24	Total	N	1.403	6.923	30.202	43.003	12.370	93.900
			%	1,5	7,4	32,2	45,8	13,2	100,0
	I	N		.	2.019	5.212	6.140	1.263	14.634
			%	.	13,8	35,6	42,0	8,6	100,0
	II	N		148	268	3.032	4.647	2.893	10.988
			%	1,3	2,4	27,6	42,3	26,3	100,0
	III	N		.	1.400	6.561	5.703	3.166	16.830
			%	.	8,3	39,0	33,9	18,8	100,0
	IV	N		1.122	2.970	11.900	22.027	4.718	42.737
			%	2,6	6,9	27,8	51,5	11,0	100,0
	V	N		132	265	3.498	4.486	329	8.711
			%	1,5	3,0	40,2	51,5	3,8	100,0
	25-44	Total	N	2.481	18.889	69.533	155.974	89.433	336.309
			%	0,7	5,6	20,7	46,4	26,6	100,0
	I	N		.	2.181	6.880	23.996	10.675	43.732
			%	.	5,0	15,7	54,9	24,4	100,0
	II	N		.	992	10.144	14.607	6.754	32.496
			%	.	3,1	31,2	44,9	20,8	100,0
	III	N		.	4.885	10.334	27.730	19.308	62.257
			%	.	7,8	16,6	44,5	31,0	100,0
	IV	N		1.996	8.218	33.761	72.830	43.587	160.392
			%	1,2	5,1	21,0	45,4	27,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1045

Tabla 237. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres 25-44 V	N		484	2.613	8.414	16.810	9.109	37.432
	%		1,3	7,0	22,5	44,9	24,3	100,0
45-64 Total	N		1.442	6.643	29.391	88.405	176.488	302.368
	%		0,5	2,2	9,7	29,2	58,4	100,0
I	N		.	758	4.750	10.857	21.542	37.907
	%		.	2,0	12,5	28,6	56,8	100,0
II	N		.	104	2.978	6.653	13.684	23.419
	%		.	0,4	12,7	28,4	58,4	100,0
III	N		94	1.144	6.349	23.470	35.264	66.322
	%		0,1	1,7	9,6	35,4	53,2	100,0
IV	N		1.347	3.718	13.280	39.725	92.544	150.614
	%		0,9	2,5	8,8	26,4	61,4	100,0
V	N		.	919	2.034	7.699	13.454	24.106
	%		.	3,8	8,4	31,9	55,8	100,0
65-74 Total	N		704	397	1.169	9.918	83.546	95.733
	%		0,7	0,4	1,2	10,4	87,3	100,0
I	N		133	.	.	1.876	11.744	13.753
	%		1,0	.	.	13,6	85,4	100,0
II	N		.	193	.	1.288	5.382	6.862
	%		.	2,8	.	18,8	78,4	100,0
III	N		.	204	871	1.931	18.771	21.777
	%		.	0,9	4,0	8,9	86,2	100,0
IV	N		571	.	298	4.339	42.545	47.753
	%		1,2	.	0,6	9,1	89,1	100,0
V	N		.	.	.	485	5.104	5.588
	%		.	.	.	8,7	91,3	100,0
>=75 Total	N		.	142	864	3.991	80.556	85.553
	%		.	0,2	1,0	4,7	94,2	100,0
I	N		.	.	175	.	3.488	3.663
	%		.	.	4,8	.	95,2	100,0
II	N		.	.	.	231	4.209	4.440
	%		.	.	.	5,2	94,8	100,0
III	N		.	.	104	1.678	19.388	21.169
	%		.	.	0,5	7,9	91,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1046

Tabla 237. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres >=75	IV	N	.	142	472	1.885	46.310	48.810	
		%	.	0,3	1,0	3,9	94,9	100,0	
	V	N	.	.	113	197	7.161	7.470	
		%	.	.	1,5	2,6	95,9	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	3.748	21.776	101.145	300.680	546.143	973.492
			%	0,4	2,2	10,4	30,9	56,1	100,0
	I	N	.	3.040	10.012	48.636	43.150	104.838	
		%	.	2,9	9,6	46,4	41,2	100,0	
	II	N	430	1.912	13.050	33.372	46.264	95.028	
		%	0,5	2,0	13,7	35,1	48,7	100,0	
	III	N	1.197	5.246	29.058	76.668	129.938	242.107	
		%	0,5	2,2	12,0	31,7	53,7	100,0	
	IV	N	975	8.406	37.228	100.698	213.134	360.441	
		%	0,3	2,3	10,3	27,9	59,1	100,0	
	V	N	1.147	3.171	11.796	41.306	113.657	171.077	
		%	0,7	1,9	6,9	24,1	66,4	100,0	
	15-24	Total	N	943	4.943	23.351	41.110	18.187	88.533
			%	1,1	5,6	26,4	46,4	20,5	100,0
		I	N	.	1.177	2.269	8.184	2.931	14.562
			%	.	8,1	15,6	56,2	20,1	100,0
		II	N	.	1.141	3.307	5.790	3.259	13.497
			%	.	8,5	24,5	42,9	24,1	100,0
		III	N	618	689	5.594	10.004	3.164	20.069
			%	3,1	3,4	27,9	49,8	15,8	100,0
IV		N	325	1.434	9.134	12.794	7.927	31.614	
		%	1,0	4,5	28,9	40,5	25,1	100,0	
V		N	.	503	3.047	4.338	905	8.792	
		%	.	5,7	34,7	49,3	10,3	100,0	
25-44	Total	N	1.584	11.014	58.270	153.229	96.235	320.330	
		%	0,5	3,4	18,2	47,8	30,0	100,0	
	I	N	.	1.276	5.109	26.558	12.143	45.086	
		%	.	2,8	11,3	58,9	26,9	100,0	
	II	N	.	695	7.268	16.502	12.758	37.223	
		%	.	1,9	19,5	44,3	34,3	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1047

Tabla 237. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	25-44	III	N	.	2.775	18.248	36.808	24.199	82.029
			%	.	3,4	22,2	44,9	29,5	100,0
		IV	N	650	4.892	22.301	53.695	29.188	110.725
			%	0,6	4,4	20,1	48,5	26,4	100,0
		V	N	934	1.377	5.344	19.666	17.947	45.267
			%	2,1	3,0	11,8	43,4	39,6	100,0
	45-64	Total	N	731	4.961	18.223	88.595	201.087	313.598
			%	0,2	1,6	5,8	28,3	64,1	100,0
	I	N	.	587	2.634	12.571	16.324	32.116	
		%	.	1,8	8,2	39,1	50,8	100,0	
	II	N	430	76	2.366	9.891	14.030	26.792	
		%	1,6	0,3	8,8	36,9	52,4	100,0	
	III	N	301	1.783	4.968	25.664	55.924	88.641	
		%	0,3	2,0	5,6	29,0	63,1	100,0	
	IV	N	.	1.447	5.308	25.598	71.749	104.102	
		%	.	1,4	5,1	24,6	68,9	100,0	
	V	N	.	1.068	2.947	14.872	43.060	61.946	
		%	.	1,7	4,8	24,0	69,5	100,0	
	65-74	Total	N	278	379	902	10.323	97.888	109.770
			%	0,3	0,3	0,8	9,4	89,2	100,0
	I	N	.	.	.	833	6.366	7.199	
		%	.	.	.	11,6	88,4	100,0	
	II	N	.	.	.	472	6.753	7.225	
		%	.	.	.	6,5	93,5	100,0	
III	N	278	.	82	3.181	19.358	22.899		
	%	1,2	.	0,4	13,9	84,5	100,0		
IV	N	.	155	485	4.399	45.095	50.134		
	%	.	0,3	1,0	8,8	89,9	100,0		
V	N	.	224	335	1.437	20.317	22.312		
	%	.	1,0	1,5	6,4	91,1	100,0		
>=75	Total	N	213	479	399	7.423	132.747	141.261	
		%	0,2	0,3	0,3	5,3	94,0	100,0	
I	N	.	.	.	489	5.385	5.875		
	%	.	.	.	8,3	91,7	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1048

Tabla 237. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	>=75	II	N	.	.	110	718	9.464	10.292	
			%	.	.	1,1	7,0	92,0	100,0	
		III	N	.	.	165	1.010	27.293	28.468	
			%	.	.	0,6	3,5	95,9	100,0	
		IV	N	.	479	.	4.212	59.175	63.866	
			%	.	0,7	.	6,6	92,7	100,0	
	V	N	213	.	124	994	31.429	32.760		
		%	0,7	.	0,4	3,0	95,9	100,0		
	Ambos	Total	Total	N	9.777	54.770	232.303	601.971	988.535	1.887.356
				%	0,5	2,9	12,3	31,9	52,4	100,0
		I	N	133	7.998	27.030	91.505	91.861	218.528	
			%	0,1	3,7	12,4	41,9	42,0	100,0	
II		N	578	3.468	29.204	60.798	79.186	173.234		
		%	0,3	2,0	16,9	35,1	45,7	100,0		
III		N	1.291	12.880	53.276	137.181	225.835	430.462		
		%	0,3	3,0	12,4	31,9	52,5	100,0		
IV		N	6.011	23.454	96.938	241.504	442.839	810.747		
		%	0,7	2,9	12,0	29,8	54,6	100,0		
V		N	1.764	6.969	25.855	70.983	148.814	254.385		
		%	0,7	2,7	10,2	27,9	58,5	100,0		
15-24		Total	Total	N	2.345	11.866	53.553	84.114	30.556	182.434
				%	1,3	6,5	29,4	46,1	16,7	100,0
		I	N	.	3.196	7.481	14.324	4.195	29.196	
			%	.	10,9	25,6	49,1	14,4	100,0	
		II	N	148	1.409	6.338	10.437	6.152	24.485	
			%	0,6	5,8	25,9	42,6	25,1	100,0	
	III	N	618	2.089	12.155	15.708	6.330	36.900		
		%	1,7	5,7	32,9	42,6	17,2	100,0		
	IV	N	1.447	4.404	21.034	34.821	12.645	74.351		
		%	1,9	5,9	28,3	46,8	17,0	100,0		
	V	N	132	768	6.545	8.823	1.234	17.503		
		%	0,8	4,4	37,4	50,4	7,1	100,0		
25-44	Total	Total	N	4.064	29.903	127.803	309.203	185.667	656.640	
			%	0,6	4,6	19,5	47,1	28,3	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1049

Tabla 237. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	25-44	I	N	.	3.457	11.990	50.554	22.817	88.818
			%	.	3,9	13,5	56,9	25,7	100,0
		II	N	.	1.686	17.412	31.109	19.512	69.719
			%	.	2,4	25,0	44,6	28,0	100,0
		III	N	.	7.659	28.582	64.538	43.507	144.286
			%	.	5,3	19,8	44,7	30,2	100,0
		IV	N	2.646	13.110	56.062	126.525	72.775	271.117
			%	1,0	4,8	20,7	46,7	26,8	100,0
		V	N	1.418	3.990	13.758	36.476	27.056	82.699
			%	1,7	4,8	16,6	44,1	32,7	100,0
	45-64	Total	N	2.173	11.603	47.614	177.000	377.575	615.965
			%	0,4	1,9	7,7	28,7	61,3	100,0
		I	N	.	1.345	7.384	23.428	37.866	70.023
			%	.	1,9	10,5	33,5	54,1	100,0
		II	N	430	179	5.343	16.544	27.715	50.212
			%	0,9	0,4	10,6	32,9	55,2	100,0
		III	N	396	2.927	11.317	49.134	91.188	154.963
			%	0,3	1,9	7,3	31,7	58,8	100,0
		IV	N	1.347	5.165	18.588	65.323	164.293	254.716
			%	0,5	2,0	7,3	25,6	64,5	100,0
		V	N	.	1.987	4.981	22.571	56.514	86.052
			%	.	2,3	5,8	26,2	65,7	100,0
	65-74	Total	N	981	776	2.071	20.241	181.434	205.503
			%	0,5	0,4	1,0	9,8	88,3	100,0
		I	N	133	.	.	2.709	18.110	20.952
			%	0,6	.	.	12,9	86,4	100,0
		II	N	.	193	.	1.760	12.135	14.087
			%	.	1,4	.	12,5	86,1	100,0
		III	N	278	204	953	5.112	38.129	44.676
			%	0,6	0,5	2,1	11,4	85,3	100,0
		IV	N	571	155	783	8.738	87.640	97.887
			%	0,6	0,2	0,8	8,9	89,5	100,0
		V	N	.	224	335	1.922	25.420	27.901
			%	.	0,8	1,2	6,9	91,1	100,0
	>=75	Total	N	213	621	1.263	11.414	213.302	226.814

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1050

Tabla 237. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	%	0,1	0,3	0,6	5,0	94,0	100,0
		I	N	.	.	175	489	8.873	9.538
			%	.	.	1,8	5,1	93,0	100,0
		II	N	.	.	110	948	13.673	14.731
			%	.	.	0,7	6,4	92,8	100,0
		III	N	.	.	269	2.688	46.681	49.638
			%	.	.	0,5	5,4	94,0	100,0
		IV	N	.	621	472	6.097	105.486	112.676
			%	.	0,6	0,4	5,4	93,6	100,0
		V	N	213	.	237	1.191	38.590	40.231
			%	0,5	.	0,6	3,0	95,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1051

Tabla 238. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	Total	N	6.028	33.183	131.717	301.291	442.906	915.124
		%	0,7	3,6	14,4	32,9	48,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.709	5.977	13.748	38.838	150.327	210.600
		%	0,8	2,8	6,5	18,4	71,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.227	5.878	27.730	51.692	79.926	167.454
		%	1,3	3,5	16,6	30,9	47,7	100,0
	Secundaria, superior	N	1.792	13.559	60.340	146.079	138.900	360.670
		%	0,5	3,8	16,7	40,5	38,5	100,0
	Terciaria	N	300	7.769	29.898	64.682	73.752	176.400
		%	0,2	4,4	16,9	36,7	41,8	100,0
	15-24 Total	N	1.403	6.923	30.760	43.003	12.370	94.458
		%	1,5	7,3	32,6	45,5	13,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	977	1.260	1.829	4.530	1.322	9.918
		%	9,8	12,7	18,4	45,7	13,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	278	1.793	10.243	14.315	4.499	31.129
		%	0,9	5,8	32,9	46,0	14,5	100,0
	Secundaria, superior	N	148	3.245	14.587	20.444	4.416	42.840
		%	0,3	7,6	34,0	47,7	10,3	100,0
	Terciaria	N	.	625	4.101	3.715	2.132	10.572
		%	.	5,9	38,8	35,1	20,2	100,0
	25-44 Total	N	2.481	18.889	69.533	155.974	89.433	336.309
		%	0,7	5,6	20,7	46,4	26,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	4.015	7.145	14.392	12.224	37.776
		%	.	10,6	18,9	38,1	32,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.056	2.499	11.532	21.774	15.947	52.808
		%	2,0	4,7	21,8	41,2	30,2	100,0
	Secundaria, superior	N	1.424	7.629	33.799	82.085	39.338	164.274
		%	0,9	4,6	20,6	50,0	23,9	100,0
	Terciaria	N	.	4.747	17.056	37.724	21.924	81.451
		%	.	5,8	20,9	46,3	26,9	100,0
	45-64 Total	N	1.442	6.831	29.391	88.405	176.587	302.655
		%	0,5	2,3	9,7	29,2	58,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	161	702	4.032	15.197	50.306	70.400
		%	0,2	1,0	5,7	21,6	71,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1052

Tabla 238. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	893	1.443	5.851	14.064	30.992	53.244	
			%	1,7	2,7	11,0	26,4	58,2	100,0	
		Secundaria, superior	N	220	2.481	11.224	38.650	64.555	117.130	
			%	0,2	2,1	9,6	33,0	55,1	100,0	
		Terciaria	N	167	2.204	8.283	20.493	30.733	61.881	
			%	0,3	3,6	13,4	33,1	49,7	100,0	
	65-74	Total	N	704	397	1.169	9.918	83.546	95.733	
			%	0,7	0,4	1,2	10,4	87,3	100,0	
	>=75	Sin estudios, primaria	N	571	.	156	2.099	35.192	38.017	
			%	1,5	.	0,4	5,5	92,6	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	.	.	1.342	14.950	16.291	
			%	.	.	.	8,2	91,8	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	204	730	3.958	21.056	25.948	
			%	.	0,8	2,8	15,3	81,1	100,0	
		Terciaria	N	133	193	284	2.519	12.349	15.477	
			%	0,9	1,2	1,8	16,3	79,8	100,0	
		Total	Sin estudios, primaria	N	.	142	864	3.991	80.971	85.968
				%	.	0,2	1,0	4,6	94,2	100,0
Secundaria, inferior			N	.	142	104	197	13.538	13.981	
			%	.	1,0	0,7	1,4	96,8	100,0	
Secundaria, superior	N		.	.	.	942	9.535	10.478		
	%		.	.	.	9,0	91,0	100,0		
Terciaria	N	.	.	175	231	6.614	7.020			
	%	.	.	2,5	3,3	94,2	100,0			
Mujeres	Total	N	3.748	22.031	101.352	300.934	547.817	975.882		
		%	0,4	2,3	10,4	30,8	56,1	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	491	2.534	11.595	44.304	219.404	278.327		
		%	0,2	0,9	4,2	15,9	78,8	100,0		
	Secundaria, inferior	N	1.276	2.358	11.746	47.100	107.287	169.766		
		%	0,8	1,4	6,9	27,7	63,2	100,0		
	Secundaria, superior	N	1.503	11.045	44.920	116.511	133.886	307.866		
		%	0,5	3,6	14,6	37,8	43,5	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1053

Tabla 238. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N	478	6.095	33.091	93.019	87.240	219.923
			%	0,2	2,8	15,0	42,3	39,7	100,0
	15-24	Total	N	943	5.199	23.558	41.364	18.436	89.499
			%	1,1	5,8	26,3	46,2	20,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	341	3.662	4.474	2.909	11.386
			%	.	3,0	32,2	39,3	25,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	350	1.031	3.156	9.386	2.838	16.763
			%	2,1	6,2	18,8	56,0	16,9	100,0
		Secundaria, superior	N	592	2.543	11.936	21.360	9.012	45.443
			%	1,3	5,6	26,3	47,0	19,8	100,0
		Terciaria	N	.	1.283	4.802	6.144	3.677	15.907
			%	.	8,1	30,2	38,6	23,1	100,0
	25-44	Total	N	1.584	11.014	58.270	153.229	96.730	320.826
			%	0,5	3,4	18,2	47,8	30,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	299	4.265	11.851	9.574	25.990
			%	.	1,2	16,4	45,6	36,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	625	414	4.850	19.172	13.876	38.937
			%	1,6	1,1	12,5	49,2	35,6	100,0
		Secundaria, superior	N	650	6.880	26.428	60.015	36.514	130.487
			%	0,5	5,3	20,3	46,0	28,0	100,0
		Terciaria	N	309	3.421	22.726	62.190	36.765	125.412
			%	0,2	2,7	18,1	49,6	29,3	100,0
	45-64	Total	N	731	4.961	18.223	88.595	201.258	313.769
			%	0,2	1,6	5,8	28,2	64,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.191	2.935	18.312	55.524	77.963
			%	.	1,5	3,8	23,5	71,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	301	912	3.336	13.288	43.897	61.735
			%	0,5	1,5	5,4	21,5	71,1	100,0
		Secundaria, superior	N	262	1.467	6.390	33.825	68.379	110.322
			%	0,2	1,3	5,8	30,7	62,0	100,0
		Terciaria	N	168	1.390	5.562	23.170	33.458	63.749
			%	0,3	2,2	8,7	36,3	52,5	100,0
	65-74	Total	N	278	379	902	10.323	98.043	109.925
			%	0,3	0,3	0,8	9,4	89,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1054

Tabla 238. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	278	224	623	4.855	55.873	61.852	
			%	0,4	0,4	1,0	7,8	90,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	.	279	3.910	23.263	27.452	
			%	.	.	1,0	14,2	84,7	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	155	.	543	11.195	11.893	
			%	.	1,3	.	4,6	94,1	100,0	
		Terciaria	N	.	.	.	1.015	7.712	8.727	
			%	.	.	.	11,6	88,4	100,0	
	>=75	Total	N	213	479	399	7.423	133.350	141.864	
			%	0,2	0,3	0,3	5,2	94,0	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	213	479	110	4.811	95.523	101.136
				%	0,2	0,5	0,1	4,8	94,4	100,0
			Secundaria, inferior	N	.	.	124	1.344	23.412	24.879
				%	.	.	0,5	5,4	94,1	100,0
		Secundaria, superior	N	.	.	165	768	8.786	9.720	
			%	.	.	1,7	7,9	90,4	100,0	
		Terciaria	N	.	.	.	500	5.628	6.129	
			%	.	.	.	8,2	91,8	100,0	
Ambos	Total	Total	N	9.777	55.214	233.069	602.225	990.722	1.891.006	
			%	0,5	2,9	12,3	31,8	52,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.200	8.511	25.343	83.142	369.731	488.927	
			%	0,4	1,7	5,2	17,0	75,6	100,0	
		Secundaria, inferior	N	3.504	8.235	39.476	98.792	187.213	337.220	
			%	1,0	2,4	11,7	29,3	55,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	3.296	24.605	105.260	262.589	272.786	668.536	
			%	0,5	3,7	15,7	39,3	40,8	100,0	
		Terciaria	N	777	13.863	62.990	157.701	160.992	396.323	
			%	0,2	3,5	15,9	39,8	40,6	100,0	
	15-24	Total	N	2.345	12.121	54.318	84.367	30.806	183.958	
			%	1,3	6,6	29,5	45,9	16,7	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	977	1.600	5.492	9.004	4.231	21.304
				%	4,6	7,5	25,8	42,3	19,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	628	2.824	13.400	23.701	7.338	47.891		
		%	1,3	5,9	28,0	49,5	15,3	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 238. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	740	5.789	26.523	41.803	13.428	88.283
			%	0,8	6,6	30,0	47,4	15,2	100,0
		Terciaria	N	.	1.908	8.903	9.859	5.809	26.479
			%	.	7,2	33,6	37,2	21,9	100,0
	25-44	Total	N	4.064	29.903	127.803	309.203	186.162	657.135
			%	0,6	4,6	19,4	47,1	28,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	4.314	11.410	26.243	21.798	63.765
			%	.	6,8	17,9	41,2	34,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.681	2.913	16.383	40.946	29.823	91.745
			%	1,8	3,2	17,9	44,6	32,5	100,0
		Secundaria, superior	N	2.074	14.509	60.227	142.100	75.852	294.762
			%	0,7	4,9	20,4	48,2	25,7	100,0
		Terciaria	N	309	8.168	39.782	99.914	58.689	206.862
			%	0,1	3,9	19,2	48,3	28,4	100,0
	45-64	Total	N	2.173	11.792	47.614	177.000	377.845	616.424
			%	0,4	1,9	7,7	28,7	61,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	161	1.894	6.968	33.510	105.831	148.363
			%	0,1	1,3	4,7	22,6	71,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.195	2.356	9.187	27.352	74.890	114.979
			%	1,0	2,0	8,0	23,8	65,1	100,0
		Secundaria, superior	N	482	3.948	17.614	72.475	132.933	227.452
			%	0,2	1,7	7,7	31,9	58,4	100,0
		Terciaria	N	335	3.595	13.845	43.663	64.191	125.630
			%	0,3	2,9	11,0	34,8	51,1	100,0
	65-74	Total	N	981	776	2.071	20.241	181.589	205.658
			%	0,5	0,4	1,0	9,8	88,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	848	224	778	6.954	91.065	99.869
			%	0,8	0,2	0,8	7,0	91,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	279	5.252	38.212	43.744
			%	.	.	0,6	12,0	87,4	100,0
		Secundaria, superior	N	.	360	730	4.501	32.251	37.841
			%	.	1,0	1,9	11,9	85,2	100,0
		Terciaria	N	133	193	284	3.534	20.061	24.204
			%	0,5	0,8	1,2	14,6	82,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1056

Tabla 238. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	N	213	621	1.263	11.414	214.320	227.832
			%	0,1	0,3	0,6	5,0	94,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	213	479	695	7.432	146.806	155.625
			%	0,1	0,3	0,4	4,8	94,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	142	228	1.540	36.950	38.860
			%	.	0,4	0,6	4,0	95,1	100,0
		Secundaria, superior	N	.	.	165	1.710	18.322	20.198
			%	.	.	0,8	8,5	90,7	100,0
		Terciaria	N	.	.	175	731	12.242	13.149
			%	.	.	1,3	5,6	93,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 239. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	8.636	40.280	136.241	282.149	447.818	915.124
			%	0,9	4,4	14,9	30,8	48,9	100,0
		Araba	N	1.485	4.060	20.216	46.225	61.765	133.751
			%	1,1	3,0	15,1	34,6	46,2	100,0
		Gipuzkoa	N	2.701	13.296	42.713	85.990	149.112	293.812
			%	0,9	4,5	14,5	29,3	50,8	100,0
		Bizkaia	N	4.449	22.924	73.312	149.935	236.941	487.561
			%	0,9	4,7	15,0	30,8	48,6	100,0
	15-24	CAPV	N	1.093	12.153	28.276	32.404	20.532	94.458
			%	1,2	12,9	29,9	34,3	21,7	100,0
		Araba	N	146	1.857	5.050	6.228	1.589	14.869
			%	1,0	12,5	34,0	41,9	10,7	100,0
		Gipuzkoa	N	.	1.917	8.984	10.110	10.293	31.305
			%	.	6,1	28,7	32,3	32,9	100,0
		Bizkaia	N	947	8.379	14.242	16.067	8.650	48.284
			%	2,0	17,4	29,5	33,3	17,9	100,0
	25-44	CAPV	N	4.871	19.913	69.722	135.962	105.841	336.309
			%	1,4	5,9	20,7	40,4	31,5	100,0
		Araba	N	1.271	1.470	9.852	22.857	16.612	52.062
			%	2,4	2,8	18,9	43,9	31,9	100,0
		Gipuzkoa	N	1.587	7.784	21.943	42.903	32.573	106.790
			%	1,5	7,3	20,5	40,2	30,5	100,0
		Bizkaia	N	2.013	10.660	37.926	70.202	56.656	177.458
			%	1,1	6,0	21,4	39,6	31,9	100,0
	45-64	CAPV	N	1.622	5.524	32.260	88.633	174.616	302.655
			%	0,5	1,8	10,7	29,3	57,7	100,0
		Araba	N	.	503	4.387	14.036	23.826	42.751
			%	.	1,2	10,3	32,8	55,7	100,0
		Gipuzkoa	N	827	2.373	10.393	26.053	57.773	97.419
			%	0,8	2,4	10,7	26,7	59,3	100,0
		Bizkaia	N	796	2.648	17.480	48.544	93.018	162.485
			%	0,5	1,6	10,8	29,9	57,2	100,0
	65-74	CAPV	N	576	1.745	4.713	16.109	72.590	95.733
			%	0,6	1,8	4,9	16,8	75,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 239. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y territorio histórico

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Hombres	65-74	Araba	N	.	141	756	1.693	10.573	13.163	
			%	.	1,1	5,7	12,9	80,3	100,0	
		Gipuzkoa	N	287	661	1.289	4.603	25.290	32.130	
			%	0,9	2,1	4,0	14,3	78,7	100,0	
		Bizkaia	N	288	943	2.668	9.812	36.727	50.440	
			%	0,6	1,9	5,3	19,5	72,8	100,0	
	>=75	CAPV	N	474	944	1.270	9.041	74.239	85.968	
			%	0,6	1,1	1,5	10,5	86,4	100,0	
		Araba	N	69	90	170	1.410	9.166	10.905	
			%	0,6	0,8	1,6	12,9	84,1	100,0	
		Gipuzkoa	N	.	560	104	2.321	23.183	26.168	
			%	.	2,1	0,4	8,9	88,6	100,0	
Bizkaia	N	405	294	996	5.310	41.890	48.895			
	%	0,8	0,6	2,0	10,9	85,7	100,0			
Mujeres	Total	CAPV	N	8.013	31.406	115.980	273.603	546.880	975.882	
			%	0,8	3,2	11,9	28,0	56,0	100,0	
		Araba	N	1.110	4.689	18.394	40.260	72.318	136.772	
			%	0,8	3,4	13,4	29,4	52,9	100,0	
		Gipuzkoa	N	2.718	9.151	30.386	80.372	190.058	312.686	
			%	0,9	2,9	9,7	25,7	60,8	100,0	
		Bizkaia	N	4.185	17.566	67.200	152.970	284.504	526.425	
			%	0,8	3,3	12,8	29,1	54,0	100,0	
		15-24	CAPV	N	1.384	7.138	25.175	31.292	24.510	89.499
				%	1,5	8,0	28,1	35,0	27,4	100,0
			Araba	N	348	1.323	2.979	5.729	2.831	13.210
				%	2,6	10,0	22,5	43,4	21,4	100,0
			Gipuzkoa	N	781	1.071	6.838	9.246	11.507	29.443
				%	2,7	3,6	23,2	31,4	39,1	100,0
		Bizkaia	N	256	4.744	15.358	16.317	10.172	46.846	
			%	0,5	10,1	32,8	34,8	21,7	100,0	
		25-44	CAPV	N	5.307	17.600	57.549	129.829	110.540	320.826
				%	1,7	5,5	17,9	40,5	34,5	100,0
Araba	N		664	2.612	10.247	17.549	16.797	47.869		
	%		1,4	5,5	21,4	36,7	35,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 239. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	1.317	5.787	14.666	37.228	42.907	101.905	
			%	1,3	5,7	14,4	36,5	42,1	100,0	
		Bizkaia	N	3.325	9.202	32.635	75.053	50.837	171.052	
	%		1,9	5,4	19,1	43,9	29,7	100,0		
		45-64	CAPV	N	775	4.788	26.161	79.635	202.410	313.769
	%			0,2	1,5	8,3	25,4	64,5	100,0	
		Araba	N	.	492	4.711	13.136	25.925	44.263	
	%		.	1,1	10,6	29,7	58,6	100,0		
		Gipuzkoa	N	345	1.871	6.097	24.015	67.334	99.662	
	%		0,3	1,9	6,1	24,1	67,6	100,0		
		Bizkaia	N	430	2.424	15.353	42.485	109.151	169.843	
	%		0,3	1,4	9,0	25,0	64,3	100,0		
		65-74	CAPV	N	372	863	3.619	17.503	87.567	109.925
	%			0,3	0,8	3,3	15,9	79,7	100,0	
		Araba	N	98	263	358	2.094	11.507	14.320	
	%		0,7	1,8	2,5	14,6	80,4	100,0		
		Gipuzkoa	N	274	112	1.203	4.950	29.581	36.120	
	%		0,8	0,3	3,3	13,7	81,9	100,0		
		Bizkaia	N	.	488	2.057	10.459	46.479	59.484	
	%		.	0,8	3,5	17,6	78,1	100,0		
		>=75	CAPV	N	174	1.018	3.476	15.343	121.853	141.864
	%			0,1	0,7	2,5	10,8	85,9	100,0	
		Araba	N	.	.	100	1.752	15.258	17.110	
	%		.	.	0,6	10,2	89,2	100,0		
	Gipuzkoa	N	.	309	1.581	4.934	38.730	45.555		
%		.	0,7	3,5	10,8	85,0	100,0			
	Bizkaia	N	174	709	1.795	8.656	67.865	79.200		
%		0,2	0,9	2,3	10,9	85,7	100,0			
Ambos	Total	CAPV	N	16.649	71.686	252.221	555.752	994.699	1.891.006	
			%	0,9	3,8	13,3	29,4	52,6	100,0	
		Araba	N	2.595	8.749	38.610	86.485	134.084	270.523	
			%	1,0	3,2	14,3	32,0	49,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	5.419	22.447	73.099	166.363	339.170	606.497	
			%	0,9	3,7	12,1	27,4	55,9	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1060

Tabla 239. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	Total	Bizkaia	N	8.634	40.491	140.512	302.905	521.445	1.013.987
			%	0,9	4,0	13,9	29,9	51,4	100,0
	15-24	CAPV	N	2.477	19.291	53.451	63.696	45.042	183.958
			%	1,3	10,5	29,1	34,6	24,5	100,0
		Araba	N	494	3.179	8.029	11.957	4.420	28.079
			%	1,8	11,3	28,6	42,6	15,7	100,0
		Gipuzkoa	N	781	2.988	15.822	19.356	21.801	60.748
			%	1,3	4,9	26,0	31,9	35,9	100,0
		Bizkaia	N	1.203	13.123	29.600	32.384	18.821	95.130
			%	1,3	13,8	31,1	34,0	19,8	100,0
	25-44	CAPV	N	10.177	37.514	127.271	265.792	216.381	657.135
			%	1,5	5,7	19,4	40,4	32,9	100,0
		Araba	N	1.935	4.082	20.100	40.406	33.409	99.930
			%	1,9	4,1	20,1	40,4	33,4	100,0
		Gipuzkoa	N	2.904	13.571	36.609	80.130	75.479	208.695
			%	1,4	6,5	17,5	38,4	36,2	100,0
		Bizkaia	N	5.338	19.861	70.562	145.255	107.493	348.509
			%	1,5	5,7	20,2	41,7	30,8	100,0
	45-64	CAPV	N	2.398	10.312	58.421	168.268	377.026	616.424
			%	0,4	1,7	9,5	27,3	61,2	100,0
		Araba	N	.	995	9.097	27.172	49.751	87.015
			%	.	1,1	10,5	31,2	57,2	100,0
		Gipuzkoa	N	1.172	4.245	16.490	50.068	125.106	197.081
			%	0,6	2,2	8,4	25,4	63,5	100,0
		Bizkaia	N	1.226	5.073	32.833	91.028	202.169	332.328
			%	0,4	1,5	9,9	27,4	60,8	100,0
	65-74	CAPV	N	948	2.609	8.332	33.612	160.158	205.658
			%	0,5	1,3	4,1	16,3	77,9	100,0
		Araba	N	98	404	1.114	3.787	22.080	27.483
			%	0,4	1,5	4,1	13,8	80,3	100,0
		Gipuzkoa	N	562	773	2.492	9.553	54.870	68.251
			%	0,8	1,1	3,7	14,0	80,4	100,0
		Bizkaia	N	288	1.431	4.726	20.272	83.207	109.924
			%	0,3	1,3	4,3	18,4	75,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1061

Tabla 239. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y territorio histórico

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	CAPV	N	648	1.961	4.746	24.384	196.092	227.832
			%	0,3	0,9	2,1	10,7	86,1	100,0
		Araba	N	69	90	269	3.163	24.424	28.015
			%	0,2	0,3	1,0	11,3	87,2	100,0
		Gipuzkoa	N	.	869	1.685	7.256	61.913	71.723
			%	.	1,2	2,3	10,1	86,3	100,0
	Bizkaia	N	579	1.002	2.792	13.966	109.755	128.094	
		%	0,5	0,8	2,2	10,9	85,7	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1062

Tabla 240. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
		A diario							
Hombres	Total	N	8.375	39.982	136.241	282.149	447.116	913.863	
		%	0,9	4,4	14,9	30,9	48,9	100,0	
	I	N	828	5.377	17.310	40.928	49.247	113.690	
		%	0,7	4,7	15,2	36,0	43,3	100,0	
	II	N	178	4.129	15.771	24.550	33.578	78.206	
		%	0,2	5,3	20,2	31,4	42,9	100,0	
	III	N	1.492	7.897	29.435	53.194	96.336	188.355	
		%	0,8	4,2	15,6	28,2	51,1	100,0	
	IV	N	5.392	15.730	61.646	138.303	229.235	450.306	
		%	1,2	3,5	13,7	30,7	50,9	100,0	
	V	N	484	6.849	12.079	25.174	38.721	83.307	
		%	0,6	8,2	14,5	30,2	46,5	100,0	
	15-24	Total	N	833	11.855	28.276	32.404	20.532	93.900
			%	0,9	12,6	30,1	34,5	21,9	100,0
		I	N	286	1.660	4.141	5.383	3.164	14.634
			%	2,0	11,3	28,3	36,8	21,6	100,0
		II	N	.	1.813	4.582	2.215	2.378	10.988
			%	.	16,5	41,7	20,2	21,6	100,0
		III	N	401	1.385	5.188	5.924	3.933	16.830
			%	2,4	8,2	30,8	35,2	23,4	100,0
		IV	N	146	4.908	12.350	16.103	9.231	42.737
			%	0,3	11,5	28,9	37,7	21,6	100,0
		V	N	.	2.090	2.016	2.779	1.825	8.711
			%	.	24,0	23,1	31,9	21,0	100,0
	25-44	Total	N	4.871	19.913	69.722	135.962	105.841	336.309
			%	1,4	5,9	20,7	40,4	31,5	100,0
		I	N	.	3.106	7.463	17.763	15.400	43.732
			%	.	7,1	17,1	40,6	35,2	100,0
		II	N	.	2.316	8.693	12.225	9.263	32.496
			%	.	7,1	26,8	37,6	28,5	100,0
		III	N	462	3.703	13.670	23.410	21.011	62.257
			%	0,7	5,9	22,0	37,6	33,7	100,0
		IV	N	3.924	6.503	31.949	69.035	48.980	160.392
			%	2,4	4,1	19,9	43,0	30,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1063

Tabla 240. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres 25-44 V	N		484	4.285	7.947	13.529	11.186	37.432
	%		1,3	11,4	21,2	36,1	29,9	100,0
45-64 Total	N		1.622	5.524	32.260	88.633	174.329	302.368
	%		0,5	1,8	10,7	29,3	57,7	100,0
I	N		164	472	4.899	14.427	17.944	37.907
	%		0,4	1,2	12,9	38,1	47,3	100,0
II	N		178	.	2.496	7.588	13.157	23.419
	%		0,8	.	10,7	32,4	56,2	100,0
III	N		114	1.941	8.065	16.537	39.665	66.322
	%		0,2	2,9	12,2	24,9	59,8	100,0
IV	N		1.166	2.637	14.941	42.734	89.135	150.614
	%		0,8	1,8	9,9	28,4	59,2	100,0
V	N		.	474	1.859	7.346	14.427	24.106
	%		.	2,0	7,7	30,5	59,8	100,0
65-74 Total	N		576	1.745	4.713	16.109	72.590	95.733
	%		0,6	1,8	4,9	16,8	75,8	100,0
I	N		309	139	807	2.794	9.704	13.753
	%		2,2	1,0	5,9	20,3	70,6	100,0
II	N		.	.	.	1.599	5.264	6.862
	%		.	.	.	23,3	76,7	100,0
III	N		111	627	1.243	4.640	15.155	21.777
	%		0,5	2,9	5,7	21,3	69,6	100,0
IV	N		156	979	2.406	6.524	37.688	47.753
	%		0,3	2,1	5,0	13,7	78,9	100,0
V	N		.	.	257	552	4.780	5.588
	%		.	.	4,6	9,9	85,5	100,0
>=75 Total	N		474	944	1.270	9.041	73.824	85.553
	%		0,6	1,1	1,5	10,6	86,3	100,0
I	N		69	.	.	560	3.034	3.663
	%		1,9	.	.	15,3	82,8	100,0
II	N		.	.	.	923	3.516	4.440
	%		.	.	.	20,8	79,2	100,0
III	N		405	241	1.270	2.683	16.571	21.169
	%		1,9	1,1	6,0	12,7	78,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1064

Tabla 240. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres >=75	IV	N	.	703	.	3.907	44.200	48.810	
		%	.	1,4	.	8,0	90,6	100,0	
	V	N	.	.	.	968	6.503	7.470	
		%	.	.	.	13,0	87,0	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	7.758	31.199	115.980	272.754	545.801	973.492
			%	0,8	3,2	11,9	28,0	56,1	100,0
	I	N	580	3.503	12.185	38.961	49.609	104.838	
		%	0,6	3,3	11,6	37,2	47,3	100,0	
	II	N	1.403	3.839	12.795	33.399	43.591	95.028	
		%	1,5	4,0	13,5	35,1	45,9	100,0	
	III	N	2.312	7.409	33.130	71.977	127.279	242.107	
		%	1,0	3,1	13,7	29,7	52,6	100,0	
	IV	N	2.847	10.084	42.332	91.370	213.808	360.441	
		%	0,8	2,8	11,7	25,3	59,3	100,0	
	V	N	614	6.364	15.538	37.047	111.514	171.077	
		%	0,4	3,7	9,1	21,7	65,2	100,0	
	15-24	Total	N	1.129	6.931	25.175	31.038	24.261	88.533
			%	1,3	7,8	28,4	35,1	27,4	100,0
		I	N	.	733	3.242	5.939	4.647	14.562
			%	.	5,0	22,3	40,8	31,9	100,0
		II	N	273	1.105	4.550	4.092	3.476	13.497
			%	2,0	8,2	33,7	30,3	25,8	100,0
		III	N	267	1.256	4.419	9.259	4.868	20.069
			%	1,3	6,3	22,0	46,1	24,3	100,0
IV		N	588	2.861	9.516	9.413	9.236	31.614	
		%	1,9	9,0	30,1	29,8	29,2	100,0	
V		N	.	977	3.448	2.335	2.033	8.792	
		%	.	11,1	39,2	26,6	23,1	100,0	
25-44	Total	N	5.307	17.600	57.549	129.334	110.540	320.330	
		%	1,7	5,5	18,0	40,4	34,5	100,0	
	I	N	411	2.476	5.271	21.472	15.455	45.086	
		%	0,9	5,5	11,7	47,6	34,3	100,0	
	II	N	700	1.842	5.480	17.551	11.650	37.223	
		%	1,9	4,9	14,7	47,2	31,3	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1065

Tabla 240. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	25-44	III	N	1.696	3.459	19.189	31.257	26.428	82.029	
			%	2,1	4,2	23,4	38,1	32,2	100,0	
		IV	N	1.886	5.770	20.607	43.929	38.534	110.725	
			%	1,7	5,2	18,6	39,7	34,8	100,0	
		V	N	614	4.053	7.002	15.125	18.472	45.267	
			%	1,4	9,0	15,5	33,4	40,8	100,0	
	45-64	Total	N	775	4.788	26.161	79.635	202.239	313.598	
			%	0,2	1,5	8,3	25,4	64,5	100,0	
		I	N	170	294	3.388	8.455	19.811	32.116	
			%	0,5	0,9	10,5	26,3	61,7	100,0	
		II	N	430	626	2.080	8.856	14.800	26.792	
			%	1,6	2,3	7,8	33,1	55,2	100,0	
		III	N	176	1.977	7.562	23.884	55.042	88.641	
			%	0,2	2,2	8,5	26,9	62,1	100,0	
		IV	N	.	728	8.936	24.607	69.831	104.102	
			%	.	0,7	8,6	23,6	67,1	100,0	
		V	N	.	1.163	4.195	13.834	42.754	61.946	
			%	.	1,9	6,8	22,3	69,0	100,0	
		65-74	Total	N	372	863	3.619	17.503	87.412	109.770
				%	0,3	0,8	3,3	15,9	79,6	100,0
			I	N	.	.	182	1.316	5.701	7.199
				%	.	.	2,5	18,3	79,2	100,0
			II	N	.	92	251	1.448	5.433	7.225
				%	.	1,3	3,5	20,0	75,2	100,0
III	N		.	382	896	4.314	17.307	22.899		
	%		.	1,7	3,9	18,8	75,6	100,0		
IV	N		372	218	1.954	6.590	41.000	50.134		
	%		0,7	0,4	3,9	13,1	81,8	100,0		
V	N		.	171	336	3.835	17.971	22.312		
	%		.	0,8	1,5	17,2	80,5	100,0		
>=75	Total		N	174	1.018	3.476	15.243	121.350	141.261	
			%	0,1	0,7	2,5	10,8	85,9	100,0	
	I		N	.	.	101	1.779	3.995	5.875	
			%	.	.	1,7	30,3	68,0	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 240. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	>=75	II	N	.	174	434	1.452	8.231	10.292	
			%	.	1,7	4,2	14,1	80,0	100,0	
		III	N	174	336	1.063	3.262	23.633	28.468	
			%	0,6	1,2	3,7	11,5	83,0	100,0	
		IV	N	.	508	1.320	6.832	55.207	63.866	
			%	.	0,8	2,1	10,7	86,4	100,0	
		V	N	.	.	558	1.918	30.284	32.760	
			%	.	.	1,7	5,9	92,4	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	16.133	71.181	252.221	554.904	992.917	1.887.356
				%	0,9	3,8	13,4	29,4	52,6	100,0
		I	N	1.409	8.880	29.495	79.889	98.856	218.528	
			%	0,6	4,1	13,5	36,6	45,2	100,0	
		II	N	1.581	7.968	28.566	57.950	77.169	173.234	
			%	0,9	4,6	16,5	33,5	44,5	100,0	
		III	N	3.805	15.306	62.565	125.172	223.614	430.462	
			%	0,9	3,6	14,5	29,1	51,9	100,0	
		IV	N	8.239	25.814	103.978	229.673	443.043	810.747	
			%	1,0	3,2	12,8	28,3	54,6	100,0	
		V	N	1.099	13.213	27.617	62.221	150.235	254.385	
			%	0,4	5,2	10,9	24,5	59,1	100,0	
		15-24	Total	N	1.961	18.786	53.451	63.443	44.793	182.434
				%	1,1	10,3	29,3	34,8	24,6	100,0
			I	N	286	2.393	7.383	11.322	7.812	29.196
				%	1,0	8,2	25,3	38,8	26,8	100,0
			II	N	273	2.918	9.132	6.308	5.854	24.485
				%	1,1	11,9	37,3	25,8	23,9	100,0
		III	N	668	2.640	9.607	15.184	8.802	36.900	
			%	1,8	7,2	26,0	41,1	23,9	100,0	
		IV	N	734	7.768	21.866	25.516	18.467	74.351	
			%	1,0	10,4	29,4	34,3	24,8	100,0	
		V	N	.	3.067	5.463	5.114	3.858	17.503	
			%	.	17,5	31,2	29,2	22,0	100,0	
		25-44	Total	N	10.177	37.514	127.271	265.297	216.381	656.640
				%	1,5	5,7	19,4	40,4	33,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1067

Tabla 240. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	25-44	I	N	411	5.582	12.734	39.235	30.856	88.818
			%	0,5	6,3	14,3	44,2	34,7	100,0
		II	N	700	4.158	14.173	29.776	20.913	69.719
			%	1,0	6,0	20,3	42,7	30,0	100,0
		III	N	2.157	7.163	32.859	54.667	47.440	144.286
			%	1,5	5,0	22,8	37,9	32,9	100,0
		IV	N	5.811	12.273	52.556	112.964	87.514	271.117
			%	2,1	4,5	19,4	41,7	32,3	100,0
		V	N	1.099	8.338	14.949	28.654	29.658	82.699
			%	1,3	10,1	18,1	34,6	35,9	100,0
	45-64	Total	N	2.398	10.312	58.421	168.268	376.567	615.965
			%	0,4	1,7	9,5	27,3	61,1	100,0
		I	N	334	766	8.287	22.882	37.755	70.023
			%	0,5	1,1	11,8	32,7	53,9	100,0
		II	N	608	626	4.576	16.444	27.957	50.212
			%	1,2	1,2	9,1	32,7	55,7	100,0
		III	N	289	3.918	15.627	40.421	94.707	154.963
			%	0,2	2,5	10,1	26,1	61,1	100,0
		IV	N	1.166	3.365	23.877	67.341	158.967	254.716
			%	0,5	1,3	9,4	26,4	62,4	100,0
		V	N	.	1.637	6.054	21.180	57.181	86.052
			%	.	1,9	7,0	24,6	66,4	100,0
	65-74	Total	N	948	2.609	8.332	33.612	160.002	205.503
			%	0,5	1,3	4,1	16,4	77,9	100,0
		I	N	309	139	989	4.110	15.405	20.952
			%	1,5	0,7	4,7	19,6	73,5	100,0
		II	N	.	92	251	3.047	10.697	14.087
			%	.	0,7	1,8	21,6	75,9	100,0
		III	N	111	1.009	2.139	8.954	32.462	44.676
			%	0,2	2,3	4,8	20,0	72,7	100,0
		IV	N	528	1.198	4.360	13.114	78.688	97.887
			%	0,5	1,2	4,5	13,4	80,4	100,0
		V	N	.	171	594	4.386	22.750	27.901
			%	.	0,6	2,1	15,7	81,5	100,0
	>=75	Total	N	648	1.961	4.746	24.284	195.174	226.814

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1068

Tabla 240. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Ambos	>=75	Total	%	0,3	0,9	2,1	10,7	86,1	100,0
		I	N	69	.	101	2.339	7.029	9.538
			%	0,7	.	1,1	24,5	73,7	100,0
		II	N	.	174	434	2.375	11.747	14.731
			%	.	1,2	2,9	16,1	79,7	100,0
		III	N	579	577	2.333	5.945	40.204	49.638
			%	1,2	1,2	4,7	12,0	81,0	100,0
		IV	N	.	1.210	1.320	10.739	99.407	112.676
			%	.	1,1	1,2	9,5	88,2	100,0
		V	N	.	.	558	2.886	36.787	40.231
			%	.	.	1,4	7,2	91,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1069

Tabla 241. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Hombres	Total	Total	N	8.636	40.280	136.241	282.149	447.818	915.124
			%	0,9	4,4	14,9	30,8	48,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	740	8.296	20.295	40.669	140.600	210.600
			%	0,4	3,9	9,6	19,3	66,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.763	9.445	31.033	42.701	82.512	167.454
			%	1,1	5,6	18,5	25,5	49,3	100,0
		Secundaria, superior	N	5.312	13.472	56.605	137.662	147.620	360.670
			%	1,5	3,7	15,7	38,2	40,9	100,0
		Terciaria	N	822	9.067	28.308	61.118	77.085	176.400
			%	0,5	5,1	16,0	34,6	43,7	100,0
	15-24	Total	N	1.093	12.153	28.276	32.404	20.532	94.458
			%	1,2	12,9	29,9	34,3	21,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	2.613	3.414	2.520	1.371	9.918
			%	.	26,3	34,4	25,4	13,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	406	3.895	9.561	9.814	7.454	31.129
			%	1,3	12,5	30,7	31,5	23,9	100,0
		Secundaria, superior	N	687	4.309	12.433	15.953	9.458	42.840
			%	1,6	10,1	29,0	37,2	22,1	100,0
		Terciaria	N	.	1.337	2.869	4.118	2.248	10.572
			%	.	12,6	27,1	38,9	21,3	100,0
	25-44	Total	N	4.871	19.913	69.722	135.962	105.841	336.309
			%	1,4	5,9	20,7	40,4	31,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	3.453	7.276	12.412	14.635	37.776
			%	.	9,1	19,3	32,9	38,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	583	4.235	13.817	14.648	19.526	52.808
			%	1,1	8,0	26,2	27,7	37,0	100,0
		Secundaria, superior	N	4.011	6.061	31.863	77.436	44.904	164.274
			%	2,4	3,7	19,4	47,1	27,3	100,0
		Terciaria	N	277	6.164	16.766	31.467	26.776	81.451
			%	0,3	7,6	20,6	38,6	32,9	100,0
	45-64	Total	N	1.622	5.524	32.260	88.633	174.616	302.655
			%	0,5	1,8	10,7	29,3	57,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	370	1.230	6.764	15.521	46.515	70.400
			%	0,5	1,7	9,6	22,0	66,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1070

Tabla 241. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y nivel de estudios*

			A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total		
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	472	1.173	6.998	15.576	29.026	53.244	
			%	0,9	2,2	13,1	29,3	54,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	438	1.985	10.652	37.566	66.490	117.130	
			%	0,4	1,7	9,1	32,1	56,8	100,0	
		Terciaria	N	342	1.137	7.846	19.970	32.586	61.881	
			%	0,6	1,8	12,7	32,3	52,7	100,0	
	65-74	Total	N	576	1.745	4.713	16.109	72.590	95.733	
			%	0,6	1,8	4,9	16,8	75,8	100,0	
	>=75	Sin estudios, primaria	N	156	440	2.267	5.429	29.726	38.017	
			%	0,4	1,2	6,0	14,3	78,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	111	.	554	1.920	13.706	16.291	
			%	0,7	.	3,4	11,8	84,1	100,0	
		Secundaria, superior	N	176	1.027	1.066	4.503	19.176	25.948	
			%	0,7	4,0	4,1	17,4	73,9	100,0	
		Terciaria	N	133	278	827	4.258	9.982	15.477	
			%	0,9	1,8	5,3	27,5	64,5	100,0	
		Total	Sin estudios, primaria	N	214	560	575	4.787	48.353	54.489
				%	0,4	1,0	1,1	8,8	88,7	100,0
Secundaria, inferior			N	191	142	104	743	12.800	13.981	
			%	1,4	1,0	0,7	5,3	91,6	100,0	
Secundaria, superior	N		.	90	591	2.204	7.593	10.478		
	%		.	0,9	5,6	21,0	72,5	100,0		
Terciaria	N	69	151	.	1.306	5.493	7.020			
	%	1,0	2,2	.	18,6	78,2	100,0			
Mujeres	Total	N	8.013	31.406	115.980	273.603	546.880	975.882		
		%	0,8	3,2	11,9	28,0	56,0	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	449	4.156	15.536	47.062	211.125	278.327		
		%	0,2	1,5	5,6	16,9	75,9	100,0		
	Secundaria, inferior	N	1.370	5.777	19.024	42.903	100.692	169.766		
		%	0,8	3,4	11,2	25,3	59,3	100,0		
	Secundaria, superior	N	3.242	14.665	48.302	97.009	144.649	307.866		
		%	1,1	4,8	15,7	31,5	47,0	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1071

Tabla 241. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y nivel de estudios*

				3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total	
Mujeres	Total	Terciaria	N	2.953	6.809	33.118	86.629	90.414	219.923
			%	1,3	3,1	15,1	39,4	41,1	100,0
	15-24	Total	N	1.384	7.138	25.175	31.292	24.510	89.499
			%	1,5	8,0	28,1	35,0	27,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.719	3.719	3.340	2.608	11.386
			%	.	15,1	32,7	29,3	22,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	769	1.324	4.793	4.910	4.967	16.763
			%	4,6	7,9	28,6	29,3	29,6	100,0
		Secundaria, superior	N	615	2.925	12.637	16.219	13.048	45.443
			%	1,4	6,4	27,8	35,7	28,7	100,0
		Terciaria	N	.	1.169	4.026	6.824	3.888	15.907
			%	.	7,4	25,3	42,9	24,4	100,0
	25-44	Total	N	5.307	17.600	57.549	129.829	110.540	320.826
			%	1,7	5,5	17,9	40,5	34,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	748	3.594	10.550	11.098	25.990
			%	.	2,9	13,8	40,6	42,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	601	2.634	6.889	14.355	14.458	38.937
			%	1,5	6,8	17,7	36,9	37,1	100,0
		Secundaria, superior	N	2.091	9.578	25.571	47.368	45.878	130.487
			%	1,6	7,3	19,6	36,3	35,2	100,0
		Terciaria	N	2.615	4.640	21.495	57.556	39.105	125.412
			%	2,1	3,7	17,1	45,9	31,2	100,0
	45-64	Total	N	775	4.788	26.161	79.635	202.410	313.769
			%	0,2	1,5	8,3	25,4	64,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	676	4.681	15.315	57.291	77.963
			%	.	0,9	6,0	19,6	73,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	1.501	5.304	14.996	39.934	61.735
			%	.	2,4	8,6	24,3	64,7	100,0
		Secundaria, superior	N	437	1.779	9.250	29.537	69.318	110.322
			%	0,4	1,6	8,4	26,8	62,8	100,0
		Terciaria	N	338	831	6.926	19.788	35.867	63.749
			%	0,5	1,3	10,9	31,0	56,3	100,0
	65-74	Total	N	372	863	3.619	17.503	87.567	109.925
			%	0,3	0,8	3,3	15,9	79,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1072

Tabla 241. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	274	481	1.311	8.462	51.325	61.852
			%	0,4	0,8	2,1	13,7	83,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	1.806	5.230	20.416	27.452
			%	.	.	6,6	19,1	74,4	100,0
		Secundaria, superior	N	98	382	155	1.880	9.379	11.893
			%	0,8	3,2	1,3	15,8	78,9	100,0
	Terciaria	N	.	.	347	1.932	6.448	8.727	
		%	.	.	4,0	22,1	73,9	100,0	
	>=75	Total	N	174	1.018	3.476	15.343	121.853	141.864
			%	0,1	0,7	2,5	10,8	85,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	174	531	2.232	9.395	88.804	101.136
			%	0,2	0,5	2,2	9,3	87,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	317	232	3.413	20.917	24.879
			%	.	1,3	0,9	13,7	84,1	100,0
		Secundaria, superior	N	.	.	688	2.006	7.026	9.720
			%	.	.	7,1	20,6	72,3	100,0
		Terciaria	N	.	169	325	529	5.106	6.129
			%	.	2,8	5,3	8,6	83,3	100,0
Ambos		Total	N	16.649	71.686	252.221	555.752	994.699	1.891.006
			%	0,9	3,8	13,3	29,4	52,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.188	12.452	35.831	87.731	351.725	488.927	
		%	0,2	2,5	7,3	17,9	71,9	100,0	
	Secundaria, inferior	N	3.133	15.222	50.057	85.604	183.205	337.220	
		%	0,9	4,5	14,8	25,4	54,3	100,0	
	Secundaria, superior	N	8.553	28.136	104.907	234.671	292.269	668.536	
		%	1,3	4,2	15,7	35,1	43,7	100,0	
	Terciaria	N	3.775	15.876	61.426	147.747	167.499	396.323	
		%	1,0	4,0	15,5	37,3	42,3	100,0	
	15-24	Total	N	2.477	19.291	53.451	63.696	45.042	183.958
			%	1,3	10,5	29,1	34,6	24,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	4.332	7.132	5.861	3.979	21.304
			%	.	20,3	33,5	27,5	18,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.175	5.219	14.354	14.723	12.421	47.891	
		%	2,5	10,9	30,0	30,7	25,9	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1073

Tabla 241. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, superior	N	1.302	7.234	25.070	32.171	22.506	88.283
			%	1,5	8,2	28,4	36,4	25,5	100,0
		Terciaria	N	.	2.506	6.895	10.941	6.136	26.479
			%	.	9,5	26,0	41,3	23,2	100,0
	25-44	Total	N	10.177	37.514	127.271	265.792	216.381	657.135
			%	1,5	5,7	19,4	40,4	32,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	4.201	10.870	22.962	25.732	63.765
			%	.	6,6	17,0	36,0	40,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.183	6.869	20.706	29.003	33.984	91.745
			%	1,3	7,5	22,6	31,6	37,0	100,0
		Secundaria, superior	N	6.102	15.640	57.434	124.804	90.782	294.762
			%	2,1	5,3	19,5	42,3	30,8	100,0
		Terciaria	N	2.892	10.804	38.261	89.024	65.882	206.862
			%	1,4	5,2	18,5	43,0	31,8	100,0
	45-64	Total	N	2.398	10.312	58.421	168.268	377.026	616.424
			%	0,4	1,7	9,5	27,3	61,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	370	1.906	11.445	30.836	103.805	148.363
			%	0,2	1,3	7,7	20,8	70,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	472	2.674	12.302	30.571	68.960	114.979
			%	0,4	2,3	10,7	26,6	60,0	100,0
		Secundaria, superior	N	875	3.764	19.902	67.103	135.808	227.452
			%	0,4	1,7	8,8	29,5	59,7	100,0
		Terciaria	N	680	1.967	14.772	39.758	68.453	125.630
			%	0,5	1,6	11,8	31,6	54,5	100,0
	65-74	Total	N	948	2.609	8.332	33.612	160.158	205.658
			%	0,5	1,3	4,1	16,3	77,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	430	921	3.577	13.890	81.051	99.869
			%	0,4	0,9	3,6	13,9	81,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	111	.	2.360	7.150	34.122	43.744
			%	0,3	.	5,4	16,3	78,0	100,0
		Secundaria, superior	N	274	1.409	1.221	6.382	28.555	37.841
			%	0,7	3,7	3,2	16,9	75,5	100,0
		Terciaria	N	133	278	1.174	6.189	16.430	24.204
			%	0,5	1,1	4,8	25,6	67,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1074

Tabla 241. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	>=75	Total	N	648	1.961	4.746	24.384	196.092	227.832
			%	0,3	0,9	2,1	10,7	86,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	388	1.091	2.807	14.182	137.157	155.625
			%	0,2	0,7	1,8	9,1	88,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	191	460	335	4.157	33.717	38.860
			%	0,5	1,2	0,9	10,7	86,8	100,0
		Secundaria, superior	N	.	90	1.279	4.210	14.619	20.198
			%	.	0,4	6,3	20,8	72,4	100,0
		Terciaria	N	69	321	325	1.835	10.599	13.149
			%	0,5	2,4	2,5	14,0	80,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1075

Tabla 242. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y territorio histórico

			no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Hombres	Total	CAPV	N 304.299	259.467	236.835	114.523	915.124
			% 33,3	28,4	25,9	12,5	100,0
		Araba	N 33.467	40.440	38.826	21.018	133.751
			% 25,0	30,2	29,0	15,7	100,0
		Gipuzkoa	N 103.883	78.434	76.850	34.644	293.812
			% 35,4	26,7	26,2	11,8	100,0
		Bizkaia	N 166.948	140.593	121.159	58.862	487.561
			% 34,2	28,8	24,8	12,1	100,0
	15-24	CAPV	N 39.531	28.574	17.988	8.365	94.458
			% 41,8	30,3	19,0	8,9	100,0
		Araba	N 4.694	5.869	2.779	1.527	14.869
			% 31,6	39,5	18,7	10,3	100,0
		Gipuzkoa	N 12.226	8.584	7.943	2.552	31.305
			% 39,1	27,4	25,4	8,2	100,0
		Bizkaia	N 22.611	14.121	7.266	4.286	48.284
			% 46,8	29,2	15,0	8,9	100,0
	25-44	CAPV	N 141.365	93.252	68.297	33.394	336.309
			% 42,0	27,7	20,3	9,9	100,0
		Araba	N 16.464	14.235	13.898	7.466	52.062
			% 31,6	27,3	26,7	14,3	100,0
		Gipuzkoa	N 49.766	28.558	19.777	8.688	106.790
			% 46,6	26,7	18,5	8,1	100,0
		Bizkaia	N 75.135	50.459	34.622	17.241	177.458
			% 42,3	28,4	19,5	9,7	100,0
	45-64	CAPV	N 97.451	89.602	74.739	40.862	302.655
			% 32,2	29,6	24,7	13,5	100,0
		Araba	N 10.422	13.056	12.149	7.125	42.751
			% 24,4	30,5	28,4	16,7	100,0
		Gipuzkoa	N 34.694	25.023	24.090	13.612	97.419
			% 35,6	25,7	24,7	14,0	100,0
		Bizkaia	N 52.336	51.523	38.500	20.125	162.485
			% 32,2	31,7	23,7	12,4	100,0
	65-74	CAPV	N 14.284	26.013	40.422	15.015	95.733
			% 14,9	27,2	42,2	15,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1076

Tabla 242. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y territorio histórico

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total	
Hombres	65-74	Araba	N	1.061	3.362	6.355	2.386	13.163	
			%	8,1	25,5	48,3	18,1	100,0	
		Gipuzkoa	N	5.084	8.918	13.167	4.961	32.130	
			%	15,8	27,8	41,0	15,4	100,0	
		Bizkaia	N	8.139	13.733	20.900	7.668	50.440	
			%	16,1	27,2	41,4	15,2	100,0	
	>=75	CAPV	N	11.667	22.025	35.389	16.887	85.968	
			%	13,6	25,6	41,2	19,6	100,0	
			Araba	N	827	3.919	3.645	2.514	10.905
				%	7,6	35,9	33,4	23,1	100,0
			Gipuzkoa	N	2.113	7.350	11.874	4.831	26.168
				%	8,1	28,1	45,4	18,5	100,0
		Bizkaia	N	8.727	10.757	19.870	9.541	48.895	
			%	17,8	22,0	40,6	19,5	100,0	
Mujeres		Total	CAPV	N	233.861	258.489	306.628	176.904	975.882
				%	24,0	26,5	31,4	18,1	100,0
			Araba	N	31.630	30.892	46.382	27.867	136.772
				%	23,1	22,6	33,9	20,4	100,0
		Gipuzkoa	N	74.248	85.911	96.046	56.481	312.686	
			%	23,7	27,5	30,7	18,1	100,0	
		Bizkaia	N	127.983	141.687	164.199	92.556	526.425	
			%	24,3	26,9	31,2	17,6	100,0	
	15-24	CAPV	N	35.298	25.292	18.711	10.198	89.499	
			%	39,4	28,3	20,9	11,4	100,0	
			Araba	N	5.123	3.366	3.494	1.227	13.210
				%	38,8	25,5	26,5	9,3	100,0
			Gipuzkoa	N	9.031	8.939	6.797	4.676	29.443
				%	30,7	30,4	23,1	15,9	100,0
		Bizkaia	N	21.145	12.986	8.420	4.295	46.846	
			%	45,1	27,7	18,0	9,2	100,0	
	25-44	CAPV	N	107.195	95.153	75.806	42.671	320.826	
			%	33,4	29,7	23,6	13,3	100,0	
		Araba	N	16.685	11.259	14.429	5.496	47.869	
			%	34,9	23,5	30,1	11,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1077

Tabla 242. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y territorio histórico

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total	
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	34.284	33.226	20.921	13.473	101.905	
			%	33,6	32,6	20,5	13,2	100,0	
		Bizkaia	N	56.226	50.669	40.456	23.702	171.052	
	%		32,9	29,6	23,7	13,9	100,0		
		45-64	CAPV	N	64.428	74.671	108.110	66.560	313.769
	%			20,5	23,8	34,5	21,2	100,0	
		Araba	N	8.021	8.307	15.936	11.999	44.263	
	%		18,1	18,8	36,0	27,1	100,0		
		Gipuzkoa	N	21.085	23.044	34.557	20.976	99.662	
	%		21,2	23,1	34,7	21,0	100,0		
		Bizkaia	N	35.321	43.320	57.617	33.585	169.843	
	%		20,8	25,5	33,9	19,8	100,0		
		65-74	CAPV	N	13.171	28.408	43.812	24.534	109.925
	%			12,0	25,8	39,9	22,3	100,0	
		Araba	N	1.114	3.442	4.938	4.827	14.320	
	%		7,8	24,0	34,5	33,7	100,0		
		Gipuzkoa	N	5.364	8.604	14.483	7.670	36.120	
	%		14,8	23,8	40,1	21,2	100,0		
		Bizkaia	N	6.693	16.363	24.391	12.037	59.484	
	%		11,3	27,5	41,0	20,2	100,0		
		>=75	CAPV	N	13.769	34.965	60.189	32.942	141.864
	%			9,7	24,6	42,4	23,2	100,0	
		Araba	N	686	4.519	7.586	4.318	17.110	
	%		4,0	26,4	44,3	25,2	100,0		
	Gipuzkoa	N	4.484	12.097	19.287	9.686	45.555		
%		9,8	26,6	42,3	21,3	100,0			
	Bizkaia	N	8.598	18.349	33.316	18.937	79.200		
%		10,9	23,2	42,1	23,9	100,0			
Ambos	Total	CAPV	N	538.160	517.957	543.462	291.427	1.891.006	
			%	28,5	27,4	28,7	15,4	100,0	
		Araba	N	65.097	71.332	85.208	48.885	270.523	
	%		24,1	26,4	31,5	18,1	100,0		
		Gipuzkoa	N	178.132	164.345	172.896	91.125	606.497	
	%		29,4	27,1	28,5	15,0	100,0		
		Bizkaia	N	294.931	282.280	285.358	151.418	1.013.987	
	%								

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1078

Tabla 242. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y territorio histórico

		no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Ambos	Total	29,1	27,8	28,1	14,9	100,0
	15-24					
	CAPV	N 74.829	53.866	36.700	18.563	183.958
		% 40,7	29,3	19,9	10,1	100,0
	Araba	N 9.816	9.235	6.273	2.754	28.079
		% 35,0	32,9	22,3	9,8	100,0
	Gipuzkoa	N 21.257	17.523	14.740	7.227	60.748
		% 35,0	28,8	24,3	11,9	100,0
	Bizkaia	N 43.756	27.108	15.686	8.581	95.130
		% 46,0	28,5	16,5	9,0	100,0
	25-44					
	CAPV	N 248.561	188.405	144.103	76.065	657.135
		% 37,8	28,7	21,9	11,6	100,0
	Araba	N 33.149	25.493	28.326	12.962	99.930
		% 33,2	25,5	28,3	13,0	100,0
	Gipuzkoa	N 84.051	61.784	40.699	22.161	208.695
		% 40,3	29,6	19,5	10,6	100,0
	Bizkaia	N 131.361	101.128	75.078	40.943	348.509
		% 37,7	29,0	21,5	11,7	100,0
	45-64					
	CAPV	N 161.879	164.274	182.849	107.422	616.424
		% 26,3	26,6	29,7	17,4	100,0
	Araba	N 18.443	21.362	28.085	19.124	87.015
		% 21,2	24,6	32,3	22,0	100,0
	Gipuzkoa	N 55.779	48.068	58.647	34.588	197.081
		% 28,3	24,4	29,8	17,6	100,0
	Bizkaia	N 87.657	94.844	96.118	53.710	332.328
		% 26,4	28,5	28,9	16,2	100,0
	65-74					
	CAPV	N 27.455	54.421	84.233	39.549	205.658
		% 13,4	26,5	41,0	19,2	100,0
	Araba	N 2.175	6.804	11.293	7.213	27.483
		% 7,9	24,8	41,1	26,2	100,0
	Gipuzkoa	N 10.448	17.522	27.650	12.631	68.251
		% 15,3	25,7	40,5	18,5	100,0
	Bizkaia	N 14.833	30.095	45.291	19.705	109.924
		% 13,5	27,4	41,2	17,9	100,0
	>=75					
	CAPV	N 25.436	56.991	95.577	49.829	227.832
		% 11,2	25,0	42,0	21,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 242. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y territorio histórico

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Ambos	>=75	Araba	N	1.514	8.437	11.231	6.832	28.015
			%	5,4	30,1	40,1	24,4	100,0
		Gipuzkoa	N	6.597	19.448	31.160	14.518	71.723
			%	9,2	27,1	43,4	20,2	100,0
		Bizkaia	N	17.325	29.106	53.185	28.479	128.094
			%	13,5	22,7	41,5	22,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1080

Tabla 243. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social

			no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Hombres	Total	Total	N 304.039	258.765	236.537	114.523	913.863
			% 33,3	28,3	25,9	12,5	100,0
	I	N	31.931	32.284	30.119	19.355	113.690
		%	28,1	28,4	26,5	17,0	100,0
	II	N	28.935	20.599	20.091	8.580	78.206
		%	37,0	26,3	25,7	11,0	100,0
	III	N	64.147	48.946	51.162	24.100	188.355
		%	34,1	26,0	27,2	12,8	100,0
	IV	N	147.652	135.361	114.060	53.233	450.306
		%	32,8	30,1	25,3	11,8	100,0
	V	N	31.373	21.574	21.106	9.255	83.307
		%	37,7	25,9	25,3	11,1	100,0
	15-24	Total	N 39.271	28.574	17.690	8.365	93.900
			% 41,8	30,4	18,8	8,9	100,0
	I	N	4.069	4.914	3.734	1.917	14.634
		%	27,8	33,6	25,5	13,1	100,0
	II	N	4.204	2.303	2.152	2.328	10.988
		%	38,3	21,0	19,6	21,2	100,0
	III	N	7.386	3.760	3.674	2.010	16.830
		%	43,9	22,3	21,8	11,9	100,0
	IV	N	18.694	15.347	7.498	1.199	42.737
		%	43,7	35,9	17,5	2,8	100,0
	V	N	4.918	2.251	632	910	8.711
		%	56,5	25,8	7,3	10,4	100,0
	25-44	Total	N 141.365	93.252	68.297	33.394	336.309
			% 42,0	27,7	20,3	9,9	100,0
	I	N	15.806	11.134	10.610	6.182	43.732
		%	36,1	25,5	24,3	14,1	100,0
	II	N	15.169	7.945	6.755	2.627	32.496
		%	46,7	24,4	20,8	8,1	100,0
	III	N	28.375	16.028	9.952	7.901	62.257
		%	45,6	25,7	16,0	12,7	100,0
	IV	N	67.063	47.939	31.649	13.741	160.392
		%	41,8	29,9	19,7	8,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1081

Tabla 243. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social

			no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Hombres 25-44 V	N		14.953	10.206	9.331	2.942	37.432
	%		39,9	27,3	24,9	7,9	100,0
45-64 Total	N		97.451	89.315	74.739	40.862	302.368
	%		32,2	29,5	24,7	13,5	100,0
I	N		8.972	12.309	9.934	6.692	37.907
	%		23,7	32,5	26,2	17,7	100,0
II	N		7.114	6.798	6.736	2.772	23.419
	%		30,4	29,0	28,8	11,8	100,0
III	N		22.528	19.194	18.790	5.809	66.322
	%		34,0	28,9	28,3	8,8	100,0
IV	N		49.211	45.912	33.535	21.956	150.614
	%		32,7	30,5	22,3	14,6	100,0
V	N		9.627	5.101	5.744	3.634	24.106
	%		39,9	21,2	23,8	15,1	100,0
65-74 Total	N		14.284	26.013	40.422	15.015	95.733
	%		14,9	27,2	42,2	15,7	100,0
I	N		2.807	3.050	4.445	3.451	13.753
	%		20,4	22,2	32,3	25,1	100,0
II	N		1.603	1.742	3.306	211	6.862
	%		23,4	25,4	48,2	3,1	100,0
III	N		2.921	5.790	9.891	3.174	21.777
	%		13,4	26,6	45,4	14,6	100,0
IV	N		6.106	13.920	20.638	7.088	47.753
	%		12,8	29,2	43,2	14,8	100,0
V	N		846	1.510	2.141	1.091	5.588
	%		15,1	27,0	38,3	19,5	100,0
>=75 Total	N		11.667	21.611	35.389	16.887	85.553
	%		13,6	25,3	41,4	19,7	100,0
I	N		278	877	1.396	1.112	3.663
	%		7,6	23,9	38,1	30,4	100,0
II	N		845	1.810	1.142	642	4.440
	%		19,0	40,8	25,7	14,5	100,0
III	N		2.937	4.173	8.853	5.206	21.169
	%		13,9	19,7	41,8	24,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1082

Tabla 243. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social

			no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total	
Hombres >=75	IV	N	6.579	12.242	20.740	9.249	48.810	
		%	13,5	25,1	42,5	18,9	100,0	
	V	N	1.029	2.507	3.257	678	7.470	
		%	13,8	33,6	43,6	9,1	100,0	
Mujeres	Total	Total N	233.129	258.035	305.907	176.421	973.492	
		%	23,9	26,5	31,4	18,1	100,0	
	I	N	20.700	31.764	31.103	21.271	104.838	
		%	19,7	30,3	29,7	20,3	100,0	
	II	N	23.618	24.945	31.678	14.787	95.028	
		%	24,9	26,2	33,3	15,6	100,0	
	III	N	64.545	59.798	79.140	38.624	242.107	
		%	26,7	24,7	32,7	16,0	100,0	
	IV	N	86.504	95.608	111.301	67.029	360.441	
		%	24,0	26,5	30,9	18,6	100,0	
	V	N	37.763	45.920	52.685	34.710	171.077	
		%	22,1	26,8	30,8	20,3	100,0	
	15-24	Total	N	34.836	25.038	18.462	10.198	88.533
			%	39,3	28,3	20,9	11,5	100,0
	I	N	4.335	4.019	3.028	3.180	14.562	
		%	29,8	27,6	20,8	21,8	100,0	
	II	N	5.642	3.478	3.152	1.225	13.497	
		%	41,8	25,8	23,4	9,1	100,0	
	III	N	9.594	5.368	4.205	902	20.069	
		%	47,8	26,7	21,0	4,5	100,0	
IV	N	11.272	10.085	6.288	3.968	31.614		
	%	35,7	31,9	19,9	12,6	100,0		
V	N	3.993	2.088	1.788	923	8.792		
	%	45,4	23,8	20,3	10,5	100,0		
25-44	Total	N	106.926	95.153	75.806	42.445	320.330	
		%	33,4	29,7	23,7	13,3	100,0	
I	N	10.124	16.458	11.171	7.333	45.086		
	%	22,5	36,5	24,8	16,3	100,0		
II	N	8.511	11.627	12.351	4.734	37.223		
	%	22,9	31,2	33,2	12,7	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1083

Tabla 243. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Mujeres	25-44	III	N	32.807	21.531	18.882	8.809	82.029
			%	40,0	26,2	23,0	10,7	100,0
		IV	N	40.271	32.521	23.408	14.525	110.725
			%	36,4	29,4	21,1	13,1	100,0
		V	N	15.212	13.016	9.995	7.044	45.267
			%	33,6	28,8	22,1	15,6	100,0
	45-64	Total	N	64.428	74.671	107.939	66.560	313.598
			%	20,5	23,8	34,4	21,2	100,0
		I	N	5.901	8.343	9.812	8.061	32.116
			%	18,4	26,0	30,6	25,1	100,0
		II	N	6.184	6.299	10.210	4.099	26.792
			%	23,1	23,5	38,1	15,3	100,0
		III	N	16.518	22.153	32.179	17.791	88.641
			%	18,6	25,0	36,3	20,1	100,0
		IV	N	23.176	24.681	33.473	22.772	104.102
			%	22,3	23,7	32,2	21,9	100,0
		V	N	12.649	13.195	22.265	13.838	61.946
			%	20,4	21,3	35,9	22,3	100,0
	65-74	Total	N	13.171	28.408	43.812	24.379	109.770
			%	12,0	25,9	39,9	22,2	100,0
		I	N	.	1.786	4.286	1.127	7.199
			%	.	24,8	59,5	15,7	100,0
		II	N	1.529	1.102	2.210	2.384	7.225
			%	21,2	15,3	30,6	33,0	100,0
		III	N	3.061	5.211	10.457	4.170	22.899
			%	13,4	22,8	45,7	18,2	100,0
		IV	N	6.322	13.643	19.485	10.684	50.134
			%	12,6	27,2	38,9	21,3	100,0
		V	N	2.259	6.666	7.374	6.014	22.312
			%	10,1	29,9	33,0	27,0	100,0
	>=75	Total	N	13.769	34.765	59.889	32.839	141.261
			%	9,7	24,6	42,4	23,2	100,0
		I	N	341	1.158	2.806	1.570	5.875
			%	5,8	19,7	47,8	26,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 243. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total	
Mujeres	>=75	II	N	1.752	2.438	3.754	2.347	10.292	
			%	17,0	23,7	36,5	22,8	100,0	
		III	N	2.565	5.535	13.417	6.951	28.468	
			%	9,0	19,4	47,1	24,4	100,0	
		IV	N	5.461	14.677	28.647	15.080	63.866	
			%	8,6	23,0	44,9	23,6	100,0	
		V	N	3.649	10.956	11.264	6.891	32.760	
			%	11,1	33,4	34,4	21,0	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	537.168	516.800	542.444	290.944	1.887.356
				%	28,5	27,4	28,7	15,4	100,0
		I	N	52.631	64.048	61.222	40.626	218.528	
			%	24,1	29,3	28,0	18,6	100,0	
		II	N	52.553	45.544	51.769	23.368	173.234	
			%	30,3	26,3	29,9	13,5	100,0	
		III	N	128.692	108.744	130.301	62.724	430.462	
			%	29,9	25,3	30,3	14,6	100,0	
		IV	N	234.155	230.968	225.361	120.262	810.747	
			%	28,9	28,5	27,8	14,8	100,0	
		V	N	69.135	67.495	73.791	43.964	254.385	
			%	27,2	26,5	29,0	17,3	100,0	
		15-24	Total	N	74.106	53.613	36.152	18.563	182.434
				%	40,6	29,4	19,8	10,2	100,0
			I	N	8.404	8.932	6.762	5.097	29.196
				%	28,8	30,6	23,2	17,5	100,0
			II	N	9.846	5.781	5.305	3.553	24.485
				%	40,2	23,6	21,7	14,5	100,0
		III	N	16.980	9.128	7.880	2.912	36.900	
			%	46,0	24,7	21,4	7,9	100,0	
		IV	N	29.966	25.432	13.786	5.167	74.351	
			%	40,3	34,2	18,5	6,9	100,0	
		V	N	8.911	4.339	2.420	1.833	17.503	
			%	50,9	24,8	13,8	10,5	100,0	
	25-44	Total	N	248.291	188.405	144.103	75.840	656.640	
			%	37,8	28,7	21,9	11,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1085

Tabla 243. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total	
Ambos	25-44	I	N	25.930	27.592	21.781	13.516	88.818	
			%	29,2	31,1	24,5	15,2	100,0	
		II	N	23.680	19.572	19.106	7.361	69.719	
			%	34,0	28,1	27,4	10,6	100,0	
		III	N	61.182	37.559	28.834	16.711	144.286	
			%	42,4	26,0	20,0	11,6	100,0	
		IV	N	107.334	80.461	55.057	28.266	271.117	
			%	39,6	29,7	20,3	10,4	100,0	
		V	N	30.165	23.222	19.325	9.987	82.699	
			%	36,5	28,1	23,4	12,1	100,0	
45-64 Total				N	161.879	163.986	182.678	107.422	615.965
				%	26,3	26,6	29,7	17,4	100,0
		I	N	14.872	20.652	19.746	14.753	70.023	
			%	21,2	29,5	28,2	21,1	100,0	
		II	N	13.298	13.098	16.946	6.871	50.212	
			%	26,5	26,1	33,7	13,7	100,0	
		III	N	39.046	41.348	50.969	23.600	154.963	
			%	25,2	26,7	32,9	15,2	100,0	
		IV	N	72.387	70.593	67.008	44.728	254.716	
			%	28,4	27,7	26,3	17,6	100,0	
		V	N	22.276	18.296	28.009	17.471	86.052	
			%	25,9	21,3	32,5	20,3	100,0	
65-74 Total				N	27.455	54.421	84.233	39.394	205.503
				%	13,4	26,5	41,0	19,2	100,0
		I	N	2.807	4.836	8.731	4.578	20.952	
			%	13,4	23,1	41,7	21,9	100,0	
		II	N	3.132	2.844	5.516	2.594	14.087	
			%	22,2	20,2	39,2	18,4	100,0	
		III	N	5.982	11.001	20.348	7.344	44.676	
			%	13,4	24,6	45,5	16,4	100,0	
		IV	N	12.429	27.563	40.123	17.772	97.887	
			%	12,7	28,2	41,0	18,2	100,0	
		V	N	3.106	8.175	9.515	7.105	27.901	
			%	11,1	29,3	34,1	25,5	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1086

Tabla 243. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social

		no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total		
Ambos	>=75	Total	N	25.436	56.375	95.277	49.726	226.814
			%	11,2	24,9	42,0	21,9	100,0
	I	N		619	2.036	4.202	2.682	9.538
			%	6,5	21,3	44,1	28,1	100,0
	II	N		2.597	4.249	4.896	2.988	14.731
			%	17,6	28,8	33,2	20,3	100,0
	III	N		5.502	9.709	22.271	12.157	49.638
			%	11,1	19,6	44,9	24,5	100,0
	IV	N		12.040	26.920	49.387	24.329	112.676
			%	10,7	23,9	43,8	21,6	100,0
	V	N		4.678	13.463	14.521	7.569	40.231
			%	11,6	33,5	36,1	18,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1087

Tabla 244. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

			no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Hombres	Total	Total	N 304.299	259.467	236.835	114.523	915.124
			% 33,3	28,4	25,9	12,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N 55.868	63.069	67.932	23.730	210.600	
		% 26,5	29,9	32,3	11,3	100,0	
	Secundaria, inferior	N 61.001	46.058	38.205	22.189	167.454	
		% 36,4	27,5	22,8	13,3	100,0	
	Secundaria, superior	N 130.799	101.039	86.461	42.371	360.670	
		% 36,3	28,0	24,0	11,7	100,0	
	Terciaria	N 56.631	49.300	44.236	26.233	176.400	
		% 32,1	27,9	25,1	14,9	100,0	
15-24	Total	N 39.531	28.574	17.988	8.365	94.458	
		% 41,8	30,3	19,0	8,9	100,0	
	Sin estudios, primaria	N 5.226	2.952	1.145	595	9.918	
		% 52,7	29,8	11,5	6,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N 12.823	10.199	4.683	3.423	31.129	
		% 41,2	32,8	15,0	11,0	100,0	
	Secundaria, superior	N 17.693	12.111	9.545	3.491	42.840	
		% 41,3	28,3	22,3	8,1	100,0	
	Terciaria	N 3.789	3.312	2.615	856	10.572	
		% 35,8	31,3	24,7	8,1	100,0	
25-44	Total	N 141.365	93.252	68.297	33.394	336.309	
		% 42,0	27,7	20,3	9,9	100,0	
	Sin estudios, primaria	N 15.291	11.623	9.139	1.723	37.776	
		% 40,5	30,8	24,2	4,6	100,0	
	Secundaria, inferior	N 28.432	12.434	7.216	4.727	52.808	
		% 53,8	23,5	13,7	9,0	100,0	
	Secundaria, superior	N 66.418	45.533	36.302	16.021	164.274	
		% 40,4	27,7	22,1	9,8	100,0	
	Terciaria	N 31.225	23.663	15.640	10.923	81.451	
		% 38,3	29,1	19,2	13,4	100,0	
45-64	Total	N 97.451	89.602	74.739	40.862	302.655	
		% 32,2	29,6	24,7	13,5	100,0	
	Sin estudios, primaria	N 22.637	21.259	18.713	7.792	70.400	
		% 32,2	30,2	26,6	11,1	100,0	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1088

Tabla 244. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

			no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total		
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	15.895	16.458	13.333	7.559	53.244	
			%	29,9	30,9	25,0	14,2	100,0	
		Secundaria, superior	N	41.629	34.417	24.953	16.132	117.130	
			%	35,5	29,4	21,3	13,8	100,0	
		Terciaria	N	17.291	17.469	17.741	9.380	61.881	
			%	27,9	28,2	28,7	15,2	100,0	
		65-74	Total	N	14.284	26.013	40.422	15.015	95.733
			%	14,9	27,2	42,2	15,7	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	5.223	11.111	16.769	4.914	38.017
			%	13,7	29,2	44,1	12,9	100,0	
			Secundaria, inferior	N	2.101	5.051	6.517	2.622	16.291
			%	12,9	31,0	40,0	16,1	100,0	
		Secundaria, superior	N	3.269	6.665	11.213	4.800	25.948	
		%	12,6	25,7	43,2	18,5	100,0		
		Terciaria	N	3.691	3.186	5.922	2.678	15.477	
		%	23,8	20,6	38,3	17,3	100,0		
	>=75	Total	N	11.667	22.025	35.389	16.887	85.968	
		%	13,6	25,6	41,2	19,6	100,0		
		Sin estudios, primaria	N	7.492	16.124	22.166	8.706	54.489	
		%	13,7	29,6	40,7	16,0	100,0		
		Secundaria, inferior	N	1.750	1.917	6.457	3.857	13.981	
		%	12,5	13,7	46,2	27,6	100,0		
		Secundaria, superior	N	1.790	2.313	4.448	1.927	10.478	
		%	17,1	22,1	42,4	18,4	100,0		
		Terciaria	N	635	1.671	2.318	2.396	7.020	
		%	9,0	23,8	33,0	34,1	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	233.861	258.489	306.628	176.904	975.882	
			%	24,0	26,5	31,4	18,1	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	44.504	77.170	102.625	54.028	278.327	
			%	16,0	27,7	36,9	19,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N	38.651	38.087	57.641	35.388	169.766	
			%	22,8	22,4	34,0	20,8	100,0	
		Secundaria, superior	N	95.626	80.030	82.337	49.873	307.866	
			%	31,1	26,0	26,7	16,2	100,0	
		Terciaria	N	55.081	63.202	64.024	37.616	219.923	

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1089

Tabla 244. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Mujeres	Total	Terciaria	%	25,0	28,7	29,1	17,1	100,0
	15-24	Total	N	35.298	25.292	18.711	10.198	89.499
			%	39,4	28,3	20,9	11,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.090	2.747	2.187	1.362	11.386
			%	44,7	24,1	19,2	12,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.830	4.653	3.189	2.091	16.763
			%	40,7	27,8	19,0	12,5	100,0
		Secundaria, superior	N	17.354	13.498	9.197	5.395	45.443
			%	38,2	29,7	20,2	11,9	100,0
		Terciaria	N	6.025	4.394	4.138	1.350	15.907
			%	37,9	27,6	26,0	8,5	100,0
	25-44	Total	N	107.195	95.153	75.806	42.671	320.826
			%	33,4	29,7	23,6	13,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	9.645	7.998	5.150	3.197	25.990
			%	37,1	30,8	19,8	12,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	14.443	11.360	8.511	4.624	38.937
			%	37,1	29,2	21,9	11,9	100,0
		Secundaria, superior	N	48.010	35.827	29.306	17.344	130.487
			%	36,8	27,5	22,5	13,3	100,0
		Terciaria	N	35.098	39.969	32.839	17.506	125.412
			%	28,0	31,9	26,2	14,0	100,0
	45-64	Total	N	64.428	74.671	108.110	66.560	313.769
			%	20,5	23,8	34,5	21,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	14.940	19.913	28.898	14.212	77.963
			%	19,2	25,5	37,1	18,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	10.790	13.512	23.331	14.102	61.735
			%	17,5	21,9	37,8	22,8	100,0
		Secundaria, superior	N	26.507	25.199	35.458	23.158	110.322
			%	24,0	22,8	32,1	21,0	100,0
		Terciaria	N	12.190	16.047	20.423	15.088	63.749
			%	19,1	25,2	32,0	23,7	100,0
	65-74	Total	N	13.171	28.408	43.812	24.534	109.925
			%	12,0	25,8	39,9	22,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.850	18.460	23.301	14.242	61.852
			%	9,5	29,8	37,7	23,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1090

Tabla 244. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total	
Mujeres	65-74	Secundaria, inferior	N	3.692	5.206	12.111	6.443	27.452	
			%	13,4	19,0	44,1	23,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	2.186	3.310	4.708	1.690	11.893	
			%	18,4	27,8	39,6	14,2	100,0	
		Terciaria	N	1.443	1.433	3.692	2.159	8.727	
			%	16,5	16,4	42,3	24,7	100,0	
	>=75	Total	N	13.769	34.965	60.189	32.942	141.864	
			%	9,7	24,6	42,4	23,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	8.979	28.053	43.089	21.016	101.136	
			%	8,9	27,7	42,6	20,8	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.896	3.357	10.499	8.127	24.879	
			%	11,6	13,5	42,2	32,7	100,0	
	Secundaria, superior	N	1.570	2.195	3.669	2.286	9.720		
		%	16,1	22,6	37,7	23,5	100,0		
	Terciaria	N	325	1.360	2.931	1.513	6.129		
		%	5,3	22,2	47,8	24,7	100,0		
	Ambos	Total	Total	N	538.160	517.957	543.462	291.427	1.891.006
				%	28,5	27,4	28,7	15,4	100,0
Sin estudios, primaria			N	100.371	140.240	170.558	77.758	488.927	
			%	20,5	28,7	34,9	15,9	100,0	
Secundaria, inferior			N	99.652	84.146	95.846	57.577	337.220	
			%	29,6	25,0	28,4	17,1	100,0	
Secundaria, superior		N	226.425	181.069	168.799	92.244	668.536		
		%	33,9	27,1	25,2	13,8	100,0		
Terciaria		N	111.712	112.502	108.260	63.849	396.323		
		%	28,2	28,4	27,3	16,1	100,0		
15-24		Total	N	74.829	53.866	36.700	18.563	183.958	
			%	40,7	29,3	19,9	10,1	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	10.316	5.699	3.333	1.956	21.304	
			%	48,4	26,8	15,6	9,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	19.654	14.852	7.872	5.514	47.891	
			%	41,0	31,0	16,4	11,5	100,0	
Secundaria, superior		N	35.046	25.609	18.742	8.886	88.283		
		%	39,7	29,0	21,2	10,1	100,0		

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1091

Tabla 244. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Ambos	15-24	Terciaria	N	9.814	7.705	6.753	2.206	26.479
			%	37,1	29,1	25,5	8,3	100,0
	25-44	Total	N	248.561	188.405	144.103	76.065	657.135
			%	37,8	28,7	21,9	11,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	24.935	19.621	14.289	4.920	63.765
			%	39,1	30,8	22,4	7,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	42.874	23.793	15.727	9.352	91.745
			%	46,7	25,9	17,1	10,2	100,0
		Secundaria, superior	N	114.428	81.360	65.609	33.365	294.762
			%	38,8	27,6	22,3	11,3	100,0
		Terciaria	N	66.323	63.631	48.479	28.429	206.862
			%	32,1	30,8	23,4	13,7	100,0
	45-64	Total	N	161.879	164.274	182.849	107.422	616.424
			%	26,3	26,6	29,7	17,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	37.577	41.172	47.611	22.003	148.363
			%	25,3	27,8	32,1	14,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	26.686	29.969	36.664	21.661	114.979
			%	23,2	26,1	31,9	18,8	100,0
		Secundaria, superior	N	68.136	59.616	60.410	39.290	227.452
			%	30,0	26,2	26,6	17,3	100,0
		Terciaria	N	29.481	33.516	38.164	24.469	125.630
			%	23,5	26,7	30,4	19,5	100,0
	65-74	Total	N	27.455	54.421	84.233	39.549	205.658
			%	13,4	26,5	41,0	19,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	11.073	29.571	40.070	19.156	99.869
			%	11,1	29,6	40,1	19,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.793	10.257	18.628	9.065	43.744
			%	13,2	23,4	42,6	20,7	100,0
		Secundaria, superior	N	5.455	9.975	15.921	6.490	37.841
			%	14,4	26,4	42,1	17,2	100,0
		Terciaria	N	5.134	4.618	9.614	4.837	24.204
			%	21,2	19,1	39,7	20,0	100,0
	>=75	Total	N	25.436	56.991	95.577	49.829	227.832
			%	11,2	25,0	42,0	21,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1092

Tabla 244. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Ambos	>=75	Sin estudios, primaria	N	16.471	44.177	65.256	29.722	155.625
			%	10,6	28,4	41,9	19,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.645	5.274	16.956	11.985	38.860
			%	12,0	13,6	43,6	30,8	100,0
		Secundaria, superior	N	3.359	4.508	8.116	4.214	20.198
			%	16,6	22,3	40,2	20,9	100,0
		Terciaria	N	960	3.031	5.249	3.908	13.149
			%	7,3	23,1	39,9	29,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1093

Tabla 245. Proporción (%) de familias que usan sal yodada para cocinar por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	49,3	39,8	47,4	53,2
	15-24	65,3	38,5	59,4	77,4
	25-44	49,8	40,8	48,5	53,5
	45-64	53,8	44,5	50,2	58,6
	65-74	45,6	26,7	46,2	50,3
	>=75	34,6	37,2	33,1	34,7
	Mujeres	Total	48,8	43,3	46,8
	15-24	36,9	0,0	39,2	46,2
	25-44	52,8	50,4	49,5	55,3
	45-64	53,5	42,7	55,5	55,1
	65-74	50,2	42,8	51,8	51,3
	>=75	39,1	40,0	34,6	42,0
Ambos sexos	Total	49,1	40,7	47,2	52,6
	15-24	58,2	30,3	53,4	70,3
	25-44	50,7	43,1	48,9	54,1
	45-64	53,7	44,1	51,4	57,7
	65-74	46,8	30,9	47,5	50,6
	>=75	36,7	38,3	33,9	38,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 246. Proporción (%) de familias que usan sal yodada para cocinar por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

		Clase social					
		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	49,3	56,4	55,0	54,7	43,9	34,0
	15-24	65,3	51,2	81,3	71,2	51,7	58,4
	25-44	49,8	58,0	48,5	54,5	46,0	32,1
	45-64	53,8	59,5	58,6	55,0	51,1	37,8
	65-74	45,6	45,1	56,6	54,0	37,9	56,9
	>=75	34,6	54,5	43,9	49,0	27,8	15,3
Mujeres	Total	48,8	46,3	54,0	52,2	46,1	40,7
	15-24	36,9	31,4	41,4	35,3	42,7	.
	25-44	52,8	45,2	61,2	52,2	63,0	45,6
	45-64	53,5	54,2	57,9	53,3	51,9	47,4
	65-74	50,2	41,3	26,8	52,0	52,5	61,9
	>=75	39,1	40,3	39,6	52,5	34,6	28,7
Ambos sexos	Total	49,1	53,0	54,6	53,8	44,3	37,1
	15-24	58,2	43,4	72,3	63,5	49,6	58,4
	25-44	50,7	52,7	54,0	53,6	48,0	35,1
	45-64	53,7	58,2	58,3	54,4	51,2	41,7
	65-74	46,8	44,5	48,5	53,4	41,0	59,9
	>=75	36,7	47,2	41,3	50,6	30,3	24,6

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

1095

Tabla 247. Proporción (%) de familias que usan sal yodada para cocinar por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

		Nivel de estudios				
		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	49,3	40,8	46,6	53,7	53,7
	15-24	65,3	36,6	77,4	57,4	64,6
	25-44	49,8	45,5	40,0	52,1	51,8
	45-64	53,8	50,2	50,3	55,1	57,7
	65-74	45,6	39,3	42,8	54,3	48,5
	>=75	34,6	30,7	30,6	53,8	47,1
Mujeres	Total	48,8	43,8	46,2	54,4	49,9
	15-24	36,9	.	0,0	51,0	29,7
	25-44	52,8	38,0	65,1	58,6	49,5
	45-64	53,5	47,3	49,2	57,2	54,2
	65-74	50,2	51,6	58,0	30,5	55,8
	>=75	39,1	40,8	31,2	39,9	46,4
Ambos sexos	Total	49,1	41,8	46,5	53,9	52,2
	15-24	58,2	36,6	74,1	56,0	40,4
	25-44	50,7	44,3	45,0	53,5	50,7
	45-64	53,7	49,7	50,1	55,6	56,6
	65-74	46,8	43,2	47,8	50,5	49,7
	>=75	36,7	35,4	30,9	48,7	46,8

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1096

Tabla 248. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando viajan en motocicleta por ciudad por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	93,7	91,0	93,8	94,1
	15-24	94,2	100,0	96,0	88,8
	25-44	94,6	87,8	94,6	96,3
	45-64	95,1	100,0	94,7	94,6
	65-74	85,9	.	82,3	100,0
	>=75	35,8	0,0	0,0	55,9
	Mujeres	Total	88,5	89,4	90,2
	15-24	87,8	100,0	89,8	81,9
	25-44	90,8	79,4	90,8	92,3
	45-64	83,2	100,0	87,6	76,1
	65-74	100,0	.	100,0	.
	>=75	100,0	.	100,0	.
Ambos sexos	Total	92,3	90,7	92,9	91,8
	15-24	92,5	100,0	94,8	86,5
	25-44	93,4	86,3	93,5	95,0
	45-64	92,2	100,0	92,9	89,6
	65-74	87,8	.	85,2	100,0
	>=75	48,9	0,0	56,6	55,9

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1097

Tabla 249. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando viajan en motocicleta por ciudad por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	93,7	97,0	90,3	86,9	95,7	96,3
	15-24	94,2	100,0	0,0	70,2	100,0	100,0
	25-44	94,6	100,0	92,5	85,0	96,2	100,0
	45-64	95,1	92,7	100,0	92,9	96,2	100,0
	65-74	85,9	87,6	100,0	100,0	68,0	100,0
	>=75	35,8	.	.	51,1	48,9	0,0
	Mujeres	Total	88,5	89,8	92,2	85,8	92,4
	15-24	87,8	75,9	100,0	100,0	100,0	57,6
	25-44	90,8	100,0	100,0	84,5	88,1	81,4
	45-64	83,2	79,7	61,9	83,1	100,0	78,1
	65-74	100,0	.	100,0	100,0	.	.
	>=75	100,0	.	.	.	100,0	.
Ambos sexos	Total	92,3	94,7	91,2	86,6	95,0	90,5
	15-24	92,5	90,9	66,0	80,3	100,0	93,4
	25-44	93,4	100,0	96,6	84,8	94,5	94,1
	45-64	92,2	88,9	86,3	90,4	96,8	89,7
	65-74	87,8	87,6	100,0	100,0	68,0	100,0
	>=75	48,9	.	.	51,1	69,3	0,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1098

Tabla 250. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando viajan en motocicleta por ciudad por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	93,7	89,7	100,0	92,5	94,9
	15-24	94,2	100,0	100,0	91,4	100,0
	25-44	94,6	93,5	100,0	93,4	94,4
	45-64	95,1	96,9	100,0	90,4	96,1
	65-74	85,9	50,2	100,0	100,0	83,3
	>=75	35,8	35,8	.	.	.
Mujeres	Total	88,5	92,0	84,6	89,1	88,0
	15-24	87,8	74,5	100,0	84,6	100,0
	25-44	90,8	100,0	90,1	89,7	91,3
	45-64	83,2	100,0	35,2	89,9	70,5
	65-74	100,0	100,0	.	.	100,0
	>=75	100,0	100,0	.	.	.
Ambos sexos	Total	92,3	90,0	96,9	91,6	92,2
	15-24	92,5	91,5	100,0	90,0	100,0
	25-44	93,4	94,4	97,5	92,5	92,8
	45-64	92,2	97,1	93,9	90,2	90,7
	65-74	87,8	63,8	100,0	100,0	87,2
	>=75	48,9	48,9	.	.	.

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1099

Tabla 251. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando viajan en motocicleta por carretera por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	91,2	93,3	91,8	89,9
	15-24	92,2	100,0	92,8	88,8
	25-44	93,1	91,9	93,5	93,0
	45-64	90,1	100,0	90,5	87,2
	65-74	90,5	.	88,1	100,0
	>=75	35,8	0,0	0,0	55,9
	Mujeres	Total	88,1	89,4	87,0
	15-24	80,9	100,0	74,5	81,9
	25-44	90,8	79,4	90,8	92,3
	45-64	87,4	100,0	87,6	85,7
	65-74	46,1	.	46,1	.
	>=75	100,0	.	100,0	.
Ambos sexos	Total	90,4	92,5	90,5	89,7
	15-24	89,2	100,0	89,1	86,5
	25-44	92,4	89,5	92,7	92,7
	45-64	89,4	100,0	89,8	86,8
	65-74	84,5	.	81,2	100,0
	>=75	48,9	0,0	56,6	55,9

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1100

Tabla 252. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando viajan en motocicleta por carretera por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	91,2	100,0	94,1	84,0	91,1	93,1
	15-24	92,2	100,0	0,0	70,2	95,8	100,0
	25-44	93,1	100,0	100,0	78,8	95,0	100,0
	45-64	90,1	100,0	100,0	92,9	84,2	83,0
	65-74	90,5	100,0	100,0	100,0	68,0	100,0
	>=75	35,8	.	.	51,1	48,9	0,0
	Mujeres	Total	88,1	89,8	89,5	85,8	92,4
	15-24	80,9	75,9	49,8	100,0	100,0	57,6
	25-44	90,8	100,0	100,0	84,5	88,1	81,4
	45-64	87,4	79,7	100,0	83,1	100,0	78,1
	65-74	46,1	.	0,0	100,0	.	.
	>=75	100,0	.	.	.	100,0	.
Ambos sexos	Total	90,4	96,7	91,8	84,5	91,3	88,3
	15-24	89,2	90,9	32,9	80,3	96,5	93,4
	25-44	92,4	100,0	100,0	80,6	93,5	94,1
	45-64	89,4	93,9	100,0	90,4	86,6	80,7
	65-74	84,5	100,0	64,4	100,0	68,0	100,0
	>=75	48,9	.	.	51,1	69,3	0,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1101

Tabla 253. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando viajan en motocicleta por carretera por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	91,2	80,5	98,0	91,6	94,2
	15-24	92,2	100,0	100,0	91,4	68,9
	25-44	93,1	93,5	100,0	91,9	90,4
	45-64	90,1	75,6	94,3	90,4	100,0
	65-74	90,5	50,2	100,0	100,0	100,0
	>=75	35,8	35,8	.	.	.
Mujeres	Total	88,1	92,0	84,6	89,7	85,7
	15-24	80,9	74,5	100,0	70,9	100,0
	25-44	90,8	100,0	90,1	89,7	91,3
	45-64	87,4	100,0	35,2	96,1	70,5
	65-74	46,1	100,0	.	.	0,0
	>=75	100,0	100,0	.	.	.
Ambos sexos	Total	90,4	82,1	95,3	91,1	90,9
	15-24	89,2	91,5	100,0	87,1	81,6
	25-44	92,4	94,4	97,5	91,3	90,9
	45-64	89,4	77,0	88,7	92,8	93,8
	65-74	84,5	63,8	100,0	100,0	76,4
	>=75	48,9	48,9	.	.	.

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1102

Tabla 254. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando se desplazan en bicicleta por ciudad por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	48,9	38,2	46,9	55,1
	15-24	25,8	26,0	21,6	29,7
	25-44	50,5	38,6	50,4	54,9
	45-64	63,7	49,4	56,7	79,3
	65-74	43,7	38,4	43,8	44,6
	>=75	71,6	43,9	71,3	100,0
	Mujeres	Total	33,3	23,1	31,9
15-24		24,8	8,4	28,4	31,2
25-44		38,7	26,9	40,4	45,3
45-64		25,7	29,0	9,6	43,8
65-74		67,6	27,7	63,2	100,0
>=75	
Ambos sexos		Total	44,2	32,6	42,2
	15-24	25,5	19,9	24,1	30,2
	25-44	46,8	33,7	46,9	52,5
	45-64	54,2	43,3	45,6	70,6
	65-74	47,5	35,5	47,8	50,2
	>=75	71,6	43,9	71,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1103

Tabla 255. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando se desplazan en bicicleta por ciudad por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	49,0	40,1	40,7	51,2	53,3	49,2
	15-24	26,0	11,1	38,2	23,0	28,7	35,0
	25-44	50,5	45,0	41,9	48,5	55,5	51,6
	45-64	63,9	49,9	47,9	70,9	71,5	48,2
	65-74	43,7	64,6	0,0	43,2	35,2	100,0
	>=75	71,6	.	.	100,0	44,6	.
	Mujeres	Total	33,1	30,5	36,8	31,3	34,5
	15-24	23,8	36,3	17,8	26,9	20,8	0,0
	25-44	38,7	31,9	43,0	37,3	42,1	37,1
	45-64	25,7	16,0	44,4	19,2	28,1	43,5
	65-74	67,6	100,0	.	100,0	27,5	100,0
	>=75
Ambos sexos	Total	44,3	36,9	39,3	44,0	48,8	45,1
	15-24	25,3	19,5	29,8	24,8	26,7	26,3
	25-44	46,8	40,4	42,3	44,3	51,8	47,7
	45-64	54,4	39,1	46,8	55,4	64,1	46,9
	65-74	47,5	71,4	0,0	50,9	34,0	100,0
	>=75	71,6	.	.	100,0	44,6	.

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

Tabla 256. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando se desplazan en bicicleta por ciudad por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin				
		Total	estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	48,9	53,2	49,9	51,3	40,5
	15-24	25,8	16,4	34,4	22,4	28,4
	25-44	50,5	51,8	63,8	55,3	33,9
	45-64	63,7	71,2	59,8	69,7	52,5
	65-74	43,7	58,2	14,8	39,6	50,8
	>=75	71,6	68,7	.	100,0	.
Mujeres	Total	33,3	30,6	28,5	35,6	33,1
	15-24	24,8	10,1	25,1	28,1	24,4
	25-44	38,7	51,4	28,3	42,0	37,8
	45-64	25,7	31,0	25,4	29,8	21,0
	65-74	67,6	45,2	100,0	.	100,0
	>=75
Ambos sexos	Total	44,2	49,5	44,5	46,9	37,4
	15-24	25,5	14,4	32,1	24,3	26,4
	25-44	46,8	51,7	53,1	51,7	35,7
	45-64	54,2	65,9	54,9	59,8	41,9
	65-74	47,5	54,6	27,0	39,6	59,1
	>=75	71,6	68,7	.	100,0	.

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

Tabla 257. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando se desplazan en bicicleta por carretera por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	65,1	69,7	61,1	67,5
	15-24	43,1	54,2	37,1	43,1
	25-44	69,5	76,6	65,8	70,5
	45-64	74,7	74,5	69,0	82,2
	65-74	61,6	58,8	59,4	63,4
	>=75	48,8	43,9	31,4	100,0
	Mujeres	Total	49,5	42,3	46,3
	15-24	46,4	38,3	43,9	55,6
	25-44	51,6	41,7	52,2	58,6
	45-64	44,7	45,9	31,4	60,7
	65-74	77,8	75,5	63,2	100,0
	>=75
Ambos sexos	Total	60,5	59,5	56,5	65,5
	15-24	44,2	48,7	39,6	46,7
	25-44	63,8	61,8	61,1	67,6
	45-64	67,2	65,9	60,1	77,0
	65-74	64,2	63,4	60,2	67,1
	>=75	48,8	43,9	31,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1106

Tabla 258. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando se desplazan en bicicleta por carretera por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	65,2	66,0	57,7	69,6	65,7	60,1
	15-24	43,5	28,9	48,0	53,9	43,5	49,4
	25-44	69,5	75,3	54,1	69,7	72,8	62,5
	45-64	74,6	74,7	70,5	79,6	75,0	60,6
	65-74	61,6	90,6	83,6	50,6	44,9	81,4
	>=75	48,8	.	.	100,0	0,0	.
	Mujeres	Total	49,4	49,4	45,9	49,9	48,2
	15-24	45,7	49,5	41,5	52,1	42,9	28,3
	25-44	51,6	51,2	46,4	52,0	51,9	58,5
	45-64	44,7	41,0	50,5	39,6	42,5	73,8
	65-74	77,8	100,0	.	100,0	50,3	100,0
	>=75
Ambos sexos	Total	60,5	60,5	53,5	62,4	61,5	59,5
	15-24	44,2	35,7	45,3	53,0	43,3	44,1
	25-44	63,8	66,9	51,2	63,1	67,1	61,4
	45-64	67,1	63,9	64,3	67,7	69,4	64,3
	65-74	64,2	92,4	83,6	57,3	45,8	86,9
	>=75	48,8	.	.	100,0	0,0	.

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1107

Tabla 259. Proporción (%) de personas que se ponen el casco siempre o casi siempre cuando se desplazan en bicicleta por carretera por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	65,1	58,7	63,1	68,4	64,5
	15-24	43,1	35,7	52,4	38,0	50,1
	25-44	69,5	61,5	74,0	75,4	59,9
	45-64	74,7	67,4	70,8	80,0	73,2
	65-74	61,6	60,2	22,7	69,4	80,1
	>=75	48,8	43,5	.	100,0	.
Mujeres	Total	49,5	48,3	41,7	53,2	48,4
	15-24	46,4	22,9	47,1	52,1	44,9
	25-44	51,6	67,7	36,2	55,3	51,5
	45-64	44,7	57,7	36,8	49,6	38,9
	65-74	77,8	62,5	100,0	.	100,0
	>=75
Ambos sexos	Total	60,5	56,9	57,7	64,2	57,8
	15-24	44,2	31,7	51,1	42,7	47,5
	25-44	63,8	62,1	62,6	70,0	56,0
	45-64	67,2	66,1	66,0	72,4	61,7
	65-74	64,2	60,8	33,8	69,4	83,4
	>=75	48,8	43,5	.	100,0	.

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1108

Tabla 260. Proporción (%) de personas que cuando van en automóvil por ciudad siempre o casi siempre llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	97,4	97,6	100,0	95,4
	15-24	55,5	.	100,0	0,0
	25-44	97,9	100,0	100,0	95,7
	45-64	96,6	91,8	100,0	95,6
	65-74	100,0	100,0	.	.
	>=75	100,0	.	100,0	.
Mujeres	Total	98,3	100,0	99,2	97,2
	15-24	89,2	100,0	100,0	82,5
	25-44	98,2	100,0	99,1	97,1
	45-64	99,4	100,0	100,0	98,8
	65-74
	>=75
Ambos sexos	Total	97,8	98,8	99,6	96,4
	15-24	82,6	100,0	100,0	70,0
	25-44	98,1	100,0	99,5	96,5
	45-64	97,7	95,2	100,0	97,0
	65-74	100,0	100,0	.	.
	>=75	100,0	.	100,0	.

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1109

Tabla 261. Proporción (%) de personas que cuando van en automóvil por ciudad siempre o casi siempre llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	97,5	100,0	100,0	97,9	97,9	86,9
	15-24	100,0	.	.	.	100,0	.
	25-44	97,9	100,0	100,0	100,0	97,9	87,1
	45-64	96,6	100,0	100,0	95,0	97,7	86,5
	65-74	100,0	.	.	.	100,0	.
	>=75	100,0	.	.	.	100,0	.
	Mujeres	Total	98,4	100,0	98,9	97,6	98,7
15-24	100,0	.	.	100,0	100,0	100,0	
25-44	98,2	100,0	100,0	97,0	98,5	97,1	
45-64	99,4	100,0	94,4	100,0	100,0	100,0	
65-74	
>=75	
Ambos sexos	Total	98,0	100,0	99,4	97,7	98,2	94,3
	15-24	100,0	.	.	100,0	100,0	100,0
	25-44	98,1	100,0	100,0	98,0	98,2	94,2
	45-64	97,7	100,0	97,5	96,9	98,4	94,2
	65-74	100,0	.	.	.	100,0	.
	>=75	100,0	.	.	.	100,0	.

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1110

Tabla 262. Proporción (%) de personas que cuando van en automóvil por ciudad siempre o casi siempre llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	97,4	98,1	92,8	98,4	98,2
	15-24	55,5	100,0	0,0	.	.
	25-44	97,9	100,0	92,6	98,7	100,0
	45-64	96,6	95,1	96,8	97,7	95,6
	65-74	100,0	100,0	.	.	.
	>=75	100,0	100,0	.	.	.
Mujeres	Total	98,3	98,3	95,7	98,5	99,0
	15-24	89,2	100,0	0,0	100,0	.
	25-44	98,2	97,8	95,9	98,2	99,2
	45-64	99,4	100,0	100,0	100,0	98,2
	65-74
	>=75
Ambos sexos	Total	97,8	98,2	94,1	98,5	98,7
	15-24	82,6	100,0	0,0	100,0	.
	25-44	98,1	98,7	94,0	98,4	99,5
	45-64	97,7	96,6	98,1	98,6	96,7
	65-74	100,0	100,0	.	.	.
	>=75	100,0	100,0	.	.	.

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1111

Tabla 263. Proporción (%) de personas que cuando van en automóvil por carretera siempre o casi siempre llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	97,8	98,3	100,0	96,1
	15-24	55,5	.	100,0	0,0
	25-44	97,9	100,0	100,0	95,7
	45-64	98,1	94,0	100,0	98,0
	65-74	100,0	100,0	.	.
	>=75	100,0	.	100,0	.
Mujeres	Total	98,9	100,0	99,2	98,4
	15-24	89,2	100,0	100,0	82,5
	25-44	98,8	100,0	99,1	98,3
	45-64	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-74
	>=75
Ambos sexos	Total	98,4	99,1	99,6	97,3
	15-24	82,6	100,0	100,0	70,0
	25-44	98,4	100,0	99,5	97,2
	45-64	98,8	96,5	100,0	98,8
	65-74	100,0	100,0	.	.
	>=75	100,0	.	100,0	.

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1112

Tabla 264. Proporción (%) de personas que cuando van en automóvil por carretera siempre o casi siempre llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	98,0	100,0	100,0	99,5	97,9	88,7
	15-24	100,0	.	.	.	100,0	.
	25-44	97,9	100,0	100,0	100,0	97,9	87,1
	45-64	98,1	100,0	100,0	98,8	97,7	92,1
	65-74	100,0	.	.	.	100,0	.
	>=75	100,0	.	.	.	100,0	.
	Mujeres	Total	99,0	100,0	100,0	99,4	98,7
	15-24	100,0	.	.	100,0	100,0	100,0
	25-44	98,8	100,0	100,0	99,2	98,5	97,1
	45-64	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-74
	>=75
Ambos sexos	Total	98,5	100,0	100,0	99,4	98,2	94,9
	15-24	100,0	.	.	100,0	100,0	100,0
	25-44	98,4	100,0	100,0	99,5	98,2	94,2
	45-64	98,8	100,0	100,0	99,3	98,4	96,6
	65-74	100,0	.	.	.	100,0	.
	>=75	100,0	.	.	.	100,0	.

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Prácticas preventivas no sanitarias

1113

Tabla 265. Proporción (%) de personas que cuando van en automóvil por carretera siempre o casi siempre llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	97,8	98,1	93,7	98,4	99,6
	15-24	55,5	100,0	0,0	.	.
	25-44	97,9	100,0	92,6	98,7	100,0
	45-64	98,1	95,1	100,0	97,7	98,9
	65-74	100,0	100,0	.	.	.
	>=75	100,0	100,0	.	.	.
Mujeres	Total	98,9	98,3	95,7	99,1	100,0
	15-24	89,2	100,0	0,0	100,0	.
	25-44	98,8	97,8	95,9	98,9	100,0
	45-64	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-74
	>=75
Ambos sexos	Total	98,4	98,2	94,5	98,8	99,8
	15-24	82,6	100,0	0,0	100,0	.
	25-44	98,4	98,7	94,0	98,8	100,0
	45-64	98,8	96,6	100,0	98,6	99,4
	65-74	100,0	100,0	.	.	.
	>=75	100,0	100,0	.	.	.

