

PARAMETROS DASOMÉTRICOS

BIZKAIA

Estrato Definición	SUPERFICIE (ha)	PIES MAYORES (pies/ha)	AREA BASIMETRICA (m ² /ha)	VOLUMEN (m ³ /ha)	CRECIMIENTO (m ³ /ha/año)	PIES MENORES (pies/ha)
Pino radiata con cobertura superior al 70%	45.210	516	29,25	270,00	21,81	340
Pino radiata con cobertura inferior al 70%	5.589	350	15,05	118,58	12,73	231
Pino radiata en monte bravo o repoblado	12.382	603	5,89	22,75	13,82	642
Pino radiata y Pino laricio con diversas frondosas, en monte bravo o repoblado, con cobertura inferior al 40%	8.655	16	0,58	1,79	0,19	345
Ciprés de Lawson, Abeto Douglas y alerce	4.297	556	25,54	193,26	15,93	394
Pino pinaster y Pino laricio	5.250	592	24,59	168,50	13,88	276
Quercus robur, solo o con diversas frondosas	17.649	424	14,31	75,65	3,91	542
Encina, sola o con diversas frondosas	6.563	752	16,32	58,89	3,27	1.257
Eucalipto	9.183	1.059	22,92	164,18	27,54	670
Eucalipto, solo o con Pino radiata, en monte bravo o repoblado	3.804	157	1,74	7,12	2,84	950
Haya, sola o con diversas frondosas	5.523	479	19,91	98,25	3,42	908
Árboles de ribera	2.522	513	13,70	84,43	5,85	953
Todos los estratos	126.628	514	19,31	149,21	13,89	519

Ver Errores de Muestreo

NOTAS:

La cobertura se refiere a la fracción de cabida cubierta, es decir, al porcentaje de suelo cubierto por la proyección horizontal de las copas arbóreas.

En la mayoría de los estratos, en los que no figura el estado de masa, se trata de "Fustal y Latizal"

En el proceso de datos no se han tenido en cuenta las talas debido a su biomasa arbórea prácticamente nula.