



11.11. ADAPTACIÓN CALENDARIO EN PEDIATRÍA

2024	DOSIS QUE DEBE TENER PARA LA EDAD									
	6 meses	7-10 meses	11-15 meses	16-23 meses	2-3 años	4-5 años	6-7 años	8-9 años	10-14 años	
DTPa/dTpa/Td	Calendario	2 dosis ¹	3 dosis ¹	3 dosis ¹	3 dosis ¹	3 dosis ¹	4 dosis ¹	4 dosis ²	4 dosis ²	
VPI		2 dosis ¹	3 dosis ¹	3 dosis ¹	3 dosis ¹	3 dosis ¹	4 dosis ¹	4 dosis ²	4 dosis ²	
Hib		2 dosis	3 dosis	1 dosis ³	1 dosis ³	1 dosis ³				
Men C		1 dosis	1 dosis ⁴	1 dosis ⁴	1 dosis ⁴	1 dosis ⁴	1 dosis ⁴	1 dosis ⁴	1 dosis ⁵	
Men B		2 dosis Nac. desde 2023								
VNC13		2 dosis	2 dosis ⁴	2 dosis ⁴	1 dosis ⁶	1 dosis ⁶	1 dosis ⁶	1 dosis ⁶ Nac. desde 2015	1 dosis ⁶ Nac. desde 2015	
Hepatitis B		2 dosis	3 dosis	3 dosis	3 dosis	3 dosis	3 dosis	3 dosis	3 dosis	
TV			1 dosis	1 dosis	1 dosis	2 dosis	2 dosis	2 dosis	2 dosis	
Varicela			1 dosis 15 meses edad	1 dosis	1 dosis	2 dosis	2 dosis	2 dosis Nac. desde 2015	2 dosis Nac. 1995-2014	
Papiloma									2 dosis En niños sólo desde nac 2012	
Men ACWY			CONTINUAR CALENDARIO							1 dosis

1 Utilizar presentación Hexavalente; **2** vacuna tetravalente hasta 13 años. A partir de 14 años usar Td/incluir una dosis dTpa; **3** con vacuna hexavalente son 3 dosis; **4** administrada a partir de 12 meses de edad; **5** a partir de 10 años de edad administrar Men ACWY que equivale a dosis de 12 años; **6** administrada a partir de 2 años de edad.

	INTERVALOS MÍNIMOS		
	Entre 1ª y 2ª dosis	Entre 2ª y 3ª dosis	Entre dosis recuerdo
DTPa-VPI-VHB-Hib/DTPa-VPI	4 semanas (pauta 3+1) 8 semanas (pauta 2 +1)	4 semanas (pauta 3+1) 6 meses (pauta 2 +1)	6 meses
Td	4 semanas	6 meses	12 meses*
dTpa			6 meses de una dosis previa de vacuna que contenga tétanos
VPI	4 semanas	4 semanas	6 meses
Hib	4 semanas	4 semanas	6 meses
Men C	8 semanas		6 meses
Men B (4cMenB)	4-8 semanas (según pauta)		2-12 meses (según pauta)
VNC	4 semanas (< 12 m) 8 semanas (12-23 m)	8 semanas (< 12 m)	5-7 meses (según pauta)
VHB	4 semanas	8 semanas**	
VPH	6 meses (pauta 2 dosis)		
	1 mes (pauta 3 dosis)	3 meses	

* Para completar la pauta 5 dosis hasta los 65 años el intervalo entre 4ª y 5ª será 10 años

** Con intervalo mínimo entre la 1ª y la 3ª dosis de al menos 16 semanas