

11.15. ADAPTACIÓN CALENDARIO EN PERSONAS ADULTAS EXTRANJERAS

2024	DOSIS A COMPLETAR SEGÚN AÑO DE NACIMIENTO *				
	Antes de 1970	1970-1980	1981-1983	1984-1994	Desde 1995
Td	5 dosis	5 dosis	5 dosis	5 dosis	5 dosis
VPI ³		3 dosis Procedentes de países con circulación de virus salvaje 1 dosis Procedentes de países con circulación de virus vacunal	3 dosis Procedentes de países con circulación de virus salvaje 1 dosis Procedentes de países con circulación de virus vacunal	3 dosis Procedentes de países con circulación de virus salvaje 1 dosis Procedentes de países con circulación de virus vacunal	3 dosis Procedentes de países con circulación de virus salvaje 1 dosis Procedentes de países con circulación de virus vacunal
Men ACWY					1 dosis Nac desde 2001
Hepatitis B			3 dosis	3 dosis	3 dosis
TV		2 dosis	2 dosis	2 dosis	2 dosis
Varicela	2 dosis ¹	2 dosis ¹	2 dosis ¹	2 dosis ¹	2 dosis
Papiloma					3 dosis ²
Zoster Herpesa	2 dosis (Población a partir de 65 años de edad)				

* Pautas con intervalos mínimos entre dosis. 1 Personas con alto riesgo de contagio. 2 Sólo mujeres 3 sólo en procedentes de países con circulación de poliovirus <http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/public-health-emergency-status>

	PAUTA	INTERVALOS MÍNIMOS	
		Entre 1ª y 2ª dosis	Entre 2ª y 3ª dosis
Td	0-1-12m-10 a-10 a	1 mes	6 mes
VPI	Según país origen	1 mes	8 meses
Triple Vírica	0-1 m	1 mes	
Hepatitis B	0-1-6 m	1 mes	2 meses*
Papiloma	0-2-6/0-1-6 m	1 mes	3/5 meses según vacuna
Varicela	0-1 m	1 mes	
Zoster Herpesa	0-2 m	1 mes	

* Con intervalo mínimo entre la 1ª y la 3ª dosis de al menos 16 semanas