

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE:

<http://www.osanet.euskadi.net>
(profesionales)

FORVEY®, PERLIC® (frovatriptan)

Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

folleto promocional original: 6-03-06

NO ES CIERTO. Esto no ha sido demostrado. No existen ensayos comparativos directos que midan el % de recurrencias con otros triptanes.

El primer tratamiento que previene la recurrencia de la migraña

Los datos de frovatriptán en pacientes de más de 65 años son limitados, por lo que NO se recomienda su uso para esta categoría de pacientes².

perlic 2,5mg

- Menor tasa de recurrencias⁽⁸⁾
- Acción selectiva sobre los vasos craneales y escaso efecto sobre los coronarios^(11, 6, 11)
- Doble vía de eliminación: hepática y renal⁽⁹⁾
- No precisa ajuste de dosis en función de la edad o el sexo de los pacientes⁽¹¹⁾
- Muy bien valorado por la mayoría de los pacientes^(9, 10)

FORVEY, un tratamiento de la migraña adaptado para poblaciones especiales.⁴

- Ancianos
No requiere ajuste de dosis
- Pacientes con insuficiencia renal
Cinética similar a pacientes sanos. No requiere ajuste de dosis
- Pacientes con insuficiencia hepática
Leve a moderada. No requiere ajuste de dosis

34% de ahorro frente al resto de los triptanes^(12, 13)



Tolerabilidad similar a placebo, bajo riesgo de interacciones farmacológicas.^{1,4,5}

- No inhibición de la MAO → menor potencial de interacción con antidepresivos IMAO.⁵
- No inhibición ni inducción del Cyp1A2 → menor potencial de interacción con propranolol.⁵
- No interacciona significativamente con alcohol, tabaco, ni anticonceptivos orales.⁴
- Los alimentos no tienen efecto significativo en su biodisponibilidad.⁴
- Incidenca de efectos adversos similares a placebo.¹

...pero un 21% más caro que Sumatriptán EFG (coste/DDD: 5,35 € frente a 4,42 €)

FORVEY®
FROVATRIPTAN 2,5 mg

folleto promocional original: FOR 206 05

BIBLIOGRAFÍA

- Guidelines for controlled trials of drugs in migraine: second edition. International Headache Society Clinical Trials Subcommittee. Cephalgia. 2000;20:765-86.
- Forvey® y Perlic® Ficha Técnica. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. [Accedido: 25 Abril de 2006]. Disponible en: <https://sinaem.agemed.es:83/presentacion/principal.asp>

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº 118/2006 y su informe