

# BERRIZTAPEN TERAPEUTIKOEN FITXA FICHA DE INNOVACIONES TERAPEUTICAS

<http://www.euskadi.net/sanidad>



OSO INTERESGARRIA  
MUY INTERESANTE




INTERESGARRIA  
INTERESANTE



ERABILGARRIA NOIZEAN  
BEHIN  
EVENTUALMENTE UTIL



EZ DAKAR EZER BERRIRIK  
NO APORTA NADA NUEVO



ESPERIENTZIA KLINIKO  
GUTXIEGIA  
EXPERIENCIA CLINICA  
INSUFICIENTE



**Moxifloxazino**

**ACTIRA**  
Bayer  
**PROFLOX**  
Esteve  
**OCTEGRA**  
Vita

400 mg-ko 5 konprimitu.  
Prezioa: 4.101 pta.  
400 mg-ko 7 konprimitu.  
Prezioa: 5.741 pta.



TALDE  
TERAPEUTIKOA/INDIKAZIOAK

Kimioterapiko sistemikoak.  
Kinolonak.

Arnas sistemaren infekzioen  
tratamendurako:

- Bronkitis kronikoaren exazerbazio akutua.
- Komunitatean harrapatutako pneumonia.
- Sinusitis bakteriano akutua.



KOMENTARIOAK

Moxifloxazinoa antibiotiko berria da, fluorokinolonaren taldekoa. Beste generazio berriko fluorokinolonen antzera, hots, grepafloxazinoaren, lebofloxazinoaren eta trobafloxazinoaren antzera, moxifloxazinoak ere eragin handiagoa du *S.pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Chlamydia sp.* eta *Mycoplasma sp.*ren aurka.

Entsegu klinikoetan, moxifloxazinoak klaritromizinen antzeko eragina erakutsi du bronkitis kronikoaren exazerbazio akutua tratatzeko, zefuroxima axetiloaren antzeko eragina sinusitis akutua tratatzeko, eta amoxicilinen antzeko eragina komunitatean harrapatutako pneumonia tratatzeko. Moxifloxazinoak sarrien azaltzen dituen efektu kaltegarriak honako hauek dira: goragaleak (% 7,2), beherakoak (%5,7), zorabioak (%2,8). Aurkezten duen abantaila posologia erosoagoa izatea da, hots, egunean behin hartu behar dela; bestalde, elektrokardiogramako QT tartearen luzapena eragiten du grepafloxazinoak bezala (aipatzekoa da grepafloxazino merkatutik erretiratu behar izan dela bihotz-toxizitateagatik).

Antibiotikoen aurka erresistentzia sor dezakenez, eta bestalde, grepafloxazinoak eta trobafloxazinoak efektu kaltegarriak erakutsi dituztenez (biak komertzializatu eta lehenengo urtean merkatutik erretiratu behar izan dira), lehenengo aukerako antibiotikoak gomendatzen ditugu infekzio horiek tratatzeko.

Esandakoagatik, moxifloxazinoa bigarren edo hirugarren aukerako antibiotikotzat hartu beharko litzateke, lehenengo aukerakoak erabili ezin direnerako.



ACTIRA, PROFLOX, OCTEGRA



TRATAMENDUAREN KOSTUA  
EGUNEKO

Moxifloxazino 400mg = 820 Pta.

Amoxicilina-EFG 3g = 203 Pta.

Amoxicilina-az.klabulaniko-EFG  
1500/475mg = 244 Pta.

Klaritromizina 500mg-1g = 440-769  
Pta.

Zefuroxima axetilo 500mg-1g =  
430-755 Pta.

## Moxifloxacin

**ACTIRA**  
Bayer  
**PROFLOX**  
Esteve  
**OCTEGRA**  
Vita

400 mg 5 comprimidos.  
Precio: 4.101 ptas.  
400 mg 7 comprimidos.  
Precio: 5.741 ptas.

### GRUPO TERAPÉUTICO / INDICACIONES

Quimioterápicos sistémicos.  
Quinolonas.

Tratamiento de infecciones respiratorias:

- Exacerbación aguda de la bronquitis crónica.
- Neumonía adquirida en la comunidad.
- Sinusitis bacteriana aguda.

### COMENTARIOS

El moxifloxacin es un nuevo antibiótico perteneciente al grupo de las fluoroquinolonas. De manera similar a otras fluoroquinolonas de nueva generación, tales como el grepafloxacin, levofloxacin y trovafloxacin, también el moxifloxacin demuestra una mayor actividad frente a *S.pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Chlamydia sp.* y *Mycoplasma sp.*

En los ensayos clínicos, moxifloxacin ha mostrado una eficacia similar a claritromicina en el tratamiento de exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, similar a cefuroxima axetilo en el tratamiento de sinusitis aguda y similar a amoxicilina en el tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad.

Los efectos adversos más frecuentes observados con moxifloxacin son náuseas (7,2%), diarrea (5,7%), mareos (2,8%).

La ventaja que presenta es el tener una posología más cómoda, una única administración al día; sin embargo, produce un alargamiento del intervalo QT del electrocardiograma, al igual que grepafloxacin, que fue retirado por su toxicidad cardíaca.

Debido al problema de desarrollo de resistencias a los antibióticos, y a los problemas de reacciones adversas observadas con grepafloxacin y trovafloxacin (fluoroquinolonas retiradas del mercado durante el primer año tras su comercialización), recomendamos utilizar los antibióticos de 1ª elección en cada una de estas infecciones.

Moxifloxacin quedaría como antibiótico de 2ª ó 3ª elección cuando los de 1ª elección estén contraindicados.

### COSTE TRATAMIENTO/DÍA

Moxifloxacin 400mg = 820 Ptas.

Amoxicilina-EFG 3g = 203 Ptas.

Amoxicilina-Ác.clavulánico-EFG 1500/475mg = 244 Ptas.

Claritromicina 500mg-1g = 440-769 Ptas.

Cefuroxima axetilo 500mg-1g = 430-755 Ptas.

Sendagai hauei buruz xehetasun gehiago jakiteko edo zerbait argitzeko honekin harremanetan jarri: e-mail: [cevime-san@ej-gv.es](mailto:cevime-san@ej-gv.es)  
MEBEIZ - Tel. 945 01 92 66  
Para ampliar o aclarar cualquier aspecto relacionado con estos u otros medicamentos póngase en contacto con: e-mail: [cevime-san@ej-gv.es](mailto:cevime-san@ej-gv.es)  
CEVIME - Tel. 945 01 92 66



**Osakidetza**  
Servicio vasco de salud

Emandako informazioa orain duguna da eta etorkizunean gerta daitezkeen aurrerapen zientifikoen arabera aldagarria da. La información que aquí se presenta es la disponible hasta el momento y es susceptible de modificaciones futuras en función de los avances científicos que se produzcan.