

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

www.osakidetza.euskadi.eus/cevime

▼ EPERZAN® (Albiglutida)

Solo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

FOLLETO PROMOCIONAL ORIGINAL: EPERZAN_GSKDC-PT-SPN-2015-0108_D14.INDD.



En pacientes adultos con diabetes tipo 2 que necesitan un control glucémico adicional

PACIENTE NO CONTROLADO CON TERAPIA ORAL³

- **EFICACIA:** EPERZAN® demostró reducciones de HbA_{1c} no inferiores a la insulina glargina a las 52 semanas.
- **PESO:** La pérdida de peso con EPERZAN® fue estadísticamente significativa frente a la ganancia con insulina glargina en la semana 52
- **1 INYECCION vs 7 INYECCIONES**

PACIENTE NO CONTROLADO CON INSULINA BASAL⁵


- **EFICACIA:** EPERZAN® demostró eficacia en la reducción de HbA_{1c} no inferior a la insulina glargina a las 26 semanas.
- **PESO:** La pérdida de peso con EPERZAN fue estadísticamente significativa frente a la ganancia con insulina lispro + insulina glargina en la semana 26
- **1 INYECCION vs 21 INYECCIONES**

PACIENTE NO CONTROLADO CON INSUFICIENCIA RENAL⁷

- **EFICACIA:** EPERZAN® demostró una eficacia superior a sitagliptina en la reducción de HbA_{1c} en pacientes con insuficiencia renal a las 26 semanas
- **TOLERABILIDAD:** EPERZAN demostró una tolerabilidad similar a Sitagliptina

En la semana 52, la pérdida de peso con EPERZAN® fue estadísticamente significativa frente a la ganancia con insulina glargina^{1,3}

En el grupo de EPERZAN® se observó pérdida de peso



A diferencia de los demás GLP-1, el efecto sobre el peso de albiglutida i se considera neutro !*

Valor medio basal de Peso:
EPERZAN®: 91,5 kg
Insulina glargina: 94,6 kg

▼ EPERZAN® (n=496) + metformina (con o sin SU)
▼ Insulina glargina (n=239) + metformina (con o sin SU)

- El cambio en el peso fue un objetivo secundario de eficacia.³
- Con el tratamiento con EPERZAN® se demostró una pérdida de peso estadísticamente significativa comparado con insulina glargina (-2,61 kg diferencia de tratamiento, IC 95%: -3,20, -2,02 p<0,0001)³
- **La pérdida de peso también se observó después de dos años de tratamiento^{1,a}**
– A las 104 semanas, el cambio medio ajustado del peso corporal desde el valor basal fue de -2,6 kg para EPERZAN® (n=184) y de +1,4 kg para insulina glargina (n=104)
- **EPERZAN® no está indicado para pérdida de peso**

BIBLIOGRAFÍA ORIGINAL DEL FOLLETO PROMOCIONAL

1. FT EPERZAN® (Albiglutida) 12/2014 GSK.
3. Weissman PN, Carr MC, Ye J, Cirkel DT, Stewart M, Perry C, et al. HARMONY 4: randomised clinical trial comparing once-weekly albiglutide and insulin glargine in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin with or without sulfonylurea. Diabetologia. 2014 Dec;57(12):2475-84.

BIBLIOGRAFÍA

- * INFORME DE POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO PT-ALBIGLUTIDA/V1/16062015 (Eperzan®) Fecha de publicación: 2 de julio de 2015. <http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-albiglutida-eperzan.pdf>

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la [ficha NME n° 229/2015](#) y en su informe.