

#### COMITÉ DE EVALUACIÓN DE NUEVOS MEDICAMENTOS DE EUSKADI

### **CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE:**




FOSAVANCE

http://www.osanet.euskadi.net (profesionales)

**FOSAVANCE®** (alendronato+vitamina D<sub>3</sub>)

Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.



En osteoporosis postmenopausica Mejore el tratamiento de sus pacientes con:

**FOSAVANCE®** 

## FOSAVANCE

alendronato/colecalciferol

En un solo comprimido semanal

Tamaño real

# ¿Mejora en el régimen posológico? ¿Y el calcio?

No se consigue reducir el número de tomas ya que además hay que administrar calcio diariamente, con o sin vitamina  $D_3$ . En los ensayos clínicos con alendronato<sup>1,2</sup> se ha administrado calcio como suplemento en las pacientes con ingestas inferiores a 1.000 mg/dia.

Una progresión en el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica

- Reduce el riesgo de fractura vertebral y de cadera
- El único tratamiento SEMANAL\* para la osteoporosis postmenopáusica que aporta una dosis semanal de Vitamina D.12

ANTES DE PRESCRIBIR, POR FAVOR CONSULTE LA FICHA TÉCNICA ADJUNTA

\* FOSAVANCE está indicado en el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica en nacientes con riesno de insuficioncia de Vitamina



folleto promocional original: 01-07-FSM-05-E-1408-DA (CREADO:DICIEMBRE 2005)

#### BIBLIOGRAFÍA

- 1. Black DM, Cummings SR, Karpf DB, Cauley JA, Thompson DE, Nevitt MC, et al. Randomised trial of effect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures. Lancet. 1996;348:1535-41.
- 2. Cummings SR, Black DM, Thompson DE, Applegate WB, Barrett-Connor E, Musliner TA, et al. Effect of alendronate on risk of fracture in women with low bone density but without vertebral fractures. Results from the Fracture Intervention Trial. JAMA. 1998;280:2077-82.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº 114/2006 y su informe