

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

www.osakidetza.euskadi.eus/cevime

SIMBRINZA® (BRINZOLAMIDA/BRIMONIDINA, TARTRATO)

Solo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

FOLLETO PROMOCIONAL ORIGINAL: : I11505336183


SIMBRINZA®
10 mg/ml + 2 mg/ml colirio en suspensión
(brinzolamida/tartrato de brimonidina)

La llave a nuevas opciones de tratamiento:

En pacientes en los que el tratamiento en monoterapia es insuficiente:¹



En pacientes en tratamiento con prostaglandina que necesitan una reducción adicional de PIO, añade SIMBRINZA® a su tratamiento con PG.*

3

3 Principios Activos

2

2 Colirios

3

1 gota, 1 vez al día
+
1 gota, 2 veces al día

Lo mejor está en el asterisco...

* No existen estudios en estos tipos de pacientes y con estas combinaciones.

«En pacientes en los que el tratamiento en monoterapia es insuficiente:¹...» antes de tratar con 3 principios activos, ¿no será mejor tratar solo con 2, añadiendo un beta-bloqueante al análogo de la prostaglandina?



En pacientes en tratamiento con combinación fija de prostaglandina que necesitan una reducción adicional de PIO, añade SIMBRINZA® a su tratamiento con CF de PG. Conseguirá la terapia máxima medicamentosa.

4

4 Principios Activos

2

2 Colirios

3

1 gota, 1 vez al día
+
1 gota, 2 veces al día

«Los cambios, poco a poco. Si las circunstancias lo permiten, al comenzar a tomar varios medicamentos al mismo tiempo, es preferible que empieces primero con uno, luego con otro... y con la menor dosis posible».^a

BIBLIOGRAFÍA

1. Ficha Técnica Simbrinza® (fecha revisión del texto Marzo 2015).

OTRA BIBLIOGRAFÍA

a «7 reglas para un uso más seguro de los medicamentos». Pastillaslasjustas. Disponible en: <http://pastillaslasjustas.org/images/documentos/pastillas-las-justas-7reglas.pdf>

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la [ficha NME nº 230/2015](#) y en su informe.