BERRIZTAPEN TERAPEUTIKOEN FITXA

http://www.euskadi.net/sanidad

52. Zkia. - 2000

DIOTUL

Dosmalfatoa

DIOTUL
FAES Lab.

1,5g-ko 30 edateko anpulu
Prezioa: 3.418 pta.

EZ DAKAR EZER BERRIRIK

TRATAMENDUAREN KOSTUA HILEKO

Dosmalfatoa (1,5g/12 orduro)= 228 pta.

Sukralfatoa (2g/12 orduro)= 124 pta.

Misoprostola (200mcg/6 orduro)= 190 pta.

INDIKAZIOAK

Antiinflamatorio Ez-Esteroideoen (AIEEren) tratamendu kronikoek urdail eta duodenoan sortutako lesioak prebenitzeko eta sendatzeko.

KOMENTARIOAK

Dosmalfatoa merkaturatu den urdaileko zelulen babesle berria da. Bere indikazioa zererako da, Antiinflamatorio Ez-Esteroideoen (AIEEren) tratamendu kronikoek urdail eta duodenoan sortutako lesioak prebenitzeko eta sendatzeko. Dosmalfatoaren akzioa, sukralfatoarena bezala, lokala da, urdail eta hesteko mukosan garatzen da hain zuzen ere, ez da sistemikoa, eta ez du efektu antisekretorerik. Batetik, urdail eta duodenoko mukosa babesten du gainean geruza bat eginez; bestetik, pepsinarekin konplexu bat egiten du pepsinaren akzio kaltegarria gutxituz; gainera, urin gastrikoko 2 prostaglandinaren (2 PGEren) konzentrazioa nabarmen handitzen du. Dosmalfatoarekin egindako ikerketek erakusten digutenez, odolera ez dela ea ezer pasatzen ahotik hartuz gero.

Entsegu klinikoetan ikusi denez, dosmalfatoa, misoprostol eta sukralfatoa bezain eraginkorra da.

Dosmalfatoaren dosi gomendagarria hauxe da: 1,5 mg/ 12 orduro. Ondo toleratzen da, eta ikusitako efektu kaltegarriek batez ere urdail eta hesteko sistemari eragiten diete goragaleak (%1,8), gonbitoak(1,2%) eta beherakoa (%0,8) sortuz.

Dosmalfatoa misoprostol eta sukralfato bezain eraginkorra da, eta Antiinflamatorio Ez-Esteroideoen (AIEEren) tratamendu kronikoek urdail-duodenoan sortutako lesioak prebenitzeko eta sendatzeko da. Bestalde, dosmalfatoak, misoprostolak baino beherako gutxiago sortzen du. Hala ere, ez du inongo abantailarik sukralfatoaren aldean.

OSO INTERESGARRIA — INTERESGARRIA — ERABILGARRIA NOIZEAN BEHIN — EZ DAKAR EZER BERRIRIK — ESPERIENTZIA KLINIKO GUTXIEGIA

Osakidetza
Servicio vasco de salud

Sendagai hauei buruz xehetasun gehiago jakiteko edo zerbait argitzeko harremanetan jarri MIEZ-ekin: e-mail: cevime-san@ej-gv.es Tel. 945 01 92 66

Emandako informazioa orain duguna da eta etorkizunean gerta daitezkeen aurrerapen zientifikoen arabera aldagarria da.

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SANIDAD

FICHA DE INNOVACIONES TERAPEUTICAS

http://www.euskadi.net/sanidad

N.º 52 - 2000

DIOTUL

Dosmalfato

DIOTUL
Lab. FAES

30 ampollas bebibles 1,5g
Precio: 3.418 ptas.

NO APORTA NADA NUEVO

COSTE TRATAMIENTO/MES

Dosmalfato (1,5g/12 horas)= 228 ptas.

Sucralfato (2g/12 horas)= 124 ptas.

Misoprostol (200mcg/6 horas)= 190 ptas.

INDICACIONES

Prevención y tratamiento de las lesiones gastroduodenales inducidas por tratamientos crónicos con AINE

COMENTARIOS

Dosmalfato es un nuevo agente citoprotector gástrico comercializado para la prevención y tratamiento de las lesiones gastroduodenales inducidas por tratamientos crónicos con AINE(anti-inflamatorios no esteroideos). Los mecanismos de acción de dosmalfato, (al igual que los de sucralfato), son locales, no sistémicos, desarrollados directamente sobre la mucosa gastroduodenal y sin efectos antisecretores. Por una parte dosmalfato recubre la mucosa formando una película protectora; por otra, forma un complejo con la pepsina disminuyendo su acción lesiva; y también aumenta significativamente la concentración de PGE2 en jugo gástrico. Los estudios llevados a cabo con dosmalfato revelan una absorción prácticamente nula tras su administración oral.

En los ensayos clínicos ha mostrado una eficacia comparable al misoprostol y al sucralfato.

La posología recomendada es de 1,5g/12 horas. Es bien tolerado, y los acontecimientos adversos observados afectan principalmente al sistema gastrointestinal: náuseas (1,8%), vómitos (1,2%) y diarrea (0,8%).

Dosmalfato ha mostrado una eficacia similar a la del misoprostol y sucralfato en la prevención y tratamiento de lesiones gastroduodenales inducidas por AINE.

Presenta la ventaja frente a misoprostol de no producir tantas diarreas, por el contrario, no presenta ninguna ventaja frente a sucralfato

MUY INTERESANTE — INTERESANTE — EVENTUALMENTE ÚTIL — NO APORTA NADA NUEVO — EXPERIENCIA CLÍNICA INSUFICIENTE

Osakidetza
Servicio vasco de salud

Para ampliar o aclarar cualquier aspecto relacionado con estos u otros medicamentos póngase en contacto con CEVIME: e-mail: cevime-san@ej-gv.es Tel. 945 01 92 66

La información que aquí se presenta es la disponible hasta el momento y es susceptible de modificaciones futuras en función de los avances científicos que se produzcan.

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SANIDAD