

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE:

<http://www.osanet.euskadi.net>
(profesionales)

AVIDART® (dutasterida)

Sólo se destacan aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más críticos.

El 2º inhibidor de la 5α-reductasa... Uno más.

EXPERIENCIA AVALADA
CON DATOS DE SEGURIDAD
Y EFICACIA A
4 AÑOS⁽¹⁴⁾

Avidart®
dutasterida



La HBP es una enfermedad progresiva⁽¹⁸⁾

Se desconoce la utilidad clínica de esta diferencia⁵.

Los 5 ARIs son una opción terapéutica adecuada para pacientes con síntomas moderados/severos y un aumento del tamaño prostático (>30-40 ml)⁽¹¹⁾

Avidart®, a diferencia de finasterida:

- Proporciona una supresión de la DHT sérica del 90-95%⁽¹⁾
(Finasterida: 70-75%)⁽¹⁾
- Una proporción significativamente mayor de hombres tratados con *Avidart®* mejoraron a los 3 meses la puntuación del cuestionario AUA-SI⁽¹³⁾

Avidart® reduce el volumen prostático desde el 1^{er} mes⁽⁹⁾

La mejora sintomática no es apreciable hasta pasados 3 a 6 meses².

Avidart® aporta mejoras significativas en el bienestar psicológico en pacientes con HBP⁽¹²⁾



AVI067(03/05)

Bibliografía del folleto original

folleto promocional original: AVI067(03/05)

1. Madersbacher S, et al. EAU 2004 Guidelines on Assessment, therapy and follow-up of men with lower Urinary Tract Symptoms Susgesstive of Benign Prostatic Obstruction (BPH Guidelines). Eur Urol. 2004; 46:547-54.
2. Roehrborn CG, et al. Efficacy and safety of a dual inhibitor of 5-alpha-reductase types 1 and 2 (dutasteride) in men with benign prostatic hyperplasia. Urology. 2002;60(3):434-41.
3. Clark RV, et al. Marked Suppression of Dihydrotestosterone in Men with Benign Prostatic Hyperplasia by Dutasteride, a Dual 5α-Reductase Inhibitor. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: (5) 2179-84.
4. Gitelman M, et al. Sustained prostate volume reduction with dutasteride after 4 years is independent of baseline prostate volume. J Urol. 2004; 171 (Suppl. 4):358:1360.
5. Roehrborn C, et al. Measurement of the effect of dutasteride on worry and embarrassment associated with lower urinary tract symptoms in men BPH: use of novel instrument. Eur Urol. (Suppl 1) 2005, No. 3, 212 (abs 838).
6. Hagerty J, et al. Aprospective, comparative study ofthe onset of symptomatic benefit of dutasteride versus finasteride in men with benign prostatic hyperplasia in everyday clinical practice. J Urol. 2004; 171 (Suppl. 4):356:1353.
7. Debruyne F, et al. Efficacy and Safety of Long-Term Treatment with the Dual 5α-reductase Inhibitor Dutasteride in Men with Symptomatic Benign Prostatic Hyperplasia. Eur Urol. 2004;46(4):488-95.
8. Barkin J, et al. Alpha-blocker therapy can be withdrawn in the majority of men following initial combination therapy with the dual 5α-reductase inhibitor dutasteride. Eur Urol. 2003;44(4):461-66.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº102/2005 y su informe