

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE:

ELECOR®, INSPRA® (eplerenona)

<http://www.osanet.euskadi.net>
(profesionales)

Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

El seguimiento medio en el ensayo EPHEBUS¹ fue de 16 meses...
...¿Cuántos pacientes quedaban en el ensayo a los 27 meses?



inspra®
eplerenona
La vida continúa

➤ **Inspra®**, añadido al tratamiento óptimo de la IC, produce efectos beneficiosos significativos en la mortalidad y morbilidad.

Parámetros de evaluación de EPHEBUS	30 días [§]	27 meses [§]
Mortalidad por todas las causas	-31% [§] (p = 0,004)	-15% [§] (p = 0,008)
Muerte súbita	-37% [§] (p = 0,051)	-21% [§] (p = 0,03)
Episodios de hospitalización por IC	-18% [§] (p = 0,106)	-23% [§] (p = 0,002)

§ Frente a placebo más tratamiento óptimo.

folleto promocional original INSPRA: ESP 09/05

➤ Las nuevas directrices de la ESC y ACC/AHA recomiendan el bloqueo de la aldosterona (recomendación clase I)^{2,3}

➤ **Inspra®** presenta tolerabilidad similar a la de placebo^{8,10}

www.pfizer.es

Avda. Europa, 20 B. Parque Empresarial La Moraleja, 28108 Alcobendas (Madrid).

Pfizer LA VIDA POR DELANTE

Elector®, añadido al tratamiento óptimo de la IC, produce efectos beneficiosos significativos en la mortalidad y morbilidad.

Parámetros de evaluación de EPHEBUS	30 días ^{§§}	27 meses ^{§§}
Mortalidad por todas las causas	-31% [§] (p=0,004)	-15% [§] (p=0,008)
Muerte súbita	-37% [§] (p=0,051)	-21% [§] (p=0,03)
Episodios de hospitalización por IC	-18% [§] (p=0,106)	-23% [§] (p=0,002)

*Tratamiento óptimo: IECA/ARAII (87%), betabloqueantes (75%), diuréticos del asa (60%), estatinas (47%), ácido acetilsalicílico (88%) y reperusión coronaria (45%).
§ Frente a placebo más tratamiento óptimo.

Las nuevas directrices de la ESC y ACC/AHA recomiendan el bloqueo de la aldosterona (recomendación clase I)^{2,3}

Elector® presenta tolerabilidad similar a la de placebo^{8,10}

Más vida que contar
Elector
EPLERENONA

Almirall
Soluciones pensando en ti

folleto promocional original ELECOR: ELEC3008

Para datos globales, pero...
¿y el potasio?

Efecto adverso	grupo eplerenona (% pacientes)	placebo (% pacientes)	p
Hiperkalemia grave (K ⁺ sérico ≥ 6mmol/L)	180 (5,5)	126 (3,9)	0,002

Datos extraídos del ensayo Ephesus¹

Bibliografía:

1. Pitt B, Remme W, Zannad F, Neaton J, Martínez F, Roniker B et al. Eplerenone a selective Aldosterone blocker in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. N Engl J Med. 2003;348:1309-21.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº 107/2006 y su informe