

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

LEVEMIR® (INSULINA DETEMIR)

Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

Un cambio hacia adelante

folleto promocional original:
936464/09-06





¡No tan rápido...!

¿Son clínicamente relevantes estas diferencias? En este ensayo en diabetes mellitus tipo 2, no hubo diferencias significativas en la incidencia de hipoglucemias graves¹. En otros ensayos clínicos, tanto en DM1 como en DM2, la frecuencia general de hipoglucemias fue similar con detemir e insulina NPH^{a,b}.

¡¡¡Atención!!!
escala trucada

Levemir® consigue los objetivos

Comparando NPH con Levemir®, se reduce el riesgo de hipoglucemias totales en un 47% ($p < 0,001$) y las hipoglucemias nocturnas en un 55% ($p < 0,001$)



Adaptado de Hermansen K, et al. 2006

BIBLIOGRAFÍA DEL FOLLETO ORIGINAL

1. Hermansen K, Davies M, Derezinski T, Martínez G, Clauson P, Home P. A 26-week, randomized, parallel, treat-to-target trial comparing insulin detemir with NPH insulin as add-on therapy to oral glucosa-lowering drugs in insulin naïve people with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2006;29(6):1269-74.

BIBLIOGRAFÍA DEL INFORME DE EVALUACIÓN

- a. Ficha Técnica Levemir®. Laboratorio Novo Nordisk A/S. [actualizado junio 2004; accedido mayo 2006]. Disponible en: <http://www.emea.eu.int/humandocs/Humans/EPAR/levemir/levemir.htm>
- b. Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP). Informe Europeo Público de Evaluación (EPAR). Levemir® (DCI): Insulina detemir. EMEA 2004; CPMP/0936/04. [accedido mayo 2006]. Disponible en: <http://www.emea.europa.eu/humandocs/EPAR/levemir/levemir.htm>