

## CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

www.osakidetza.euskadi.eus/cevime

# ▼ INVOKANA® (Canagliflozina)

Solo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

FOLLETO PROMOCIONAL ORIGINAL: PHES/CAN/0215/0007 ABRIL 2015.

# APUESTA POR MÁS

▼ Invokana®  
canagliflozina

¡CUIDADO CON  
LAS APUESTAS!

- Mayores de 75 años.\*\*
- Aclaramiento renal  $\geq 45$  ml/min.\*\*\*

El eslogan parece dar a entender que canagliflozina supone una ventaja en pacientes mayores de 75 años y en pacientes con el aclaramiento renal  $\geq 45$  ml/min... ¡Pero no es así! Lo importante está en la letra pequeña.

\* Para más información sobre efectos adversos, ver apartado 4.8 de la ficha técnica.

\*\* Para más información sobre indicaciones, ver apartado 4.2 de la ficha técnica.

\*\*\* En pacientes con TFGe  $< 60$  ml/min, no se debe iniciar el tratamiento con canagliflozina, pero se puede mantener con 100 mg. En pacientes con TFG  $< 45$  ml/min, interrumpir el tratamiento.

### \*\* Pacientes de edad avanzada ( $\geq 65$ años de edad)

Deben tenerse en cuenta la función renal y el riesgo de depleción del volumen (ver sección 4.4).

Se debe tener cuidado cuando se aumenta la dosis en pacientes  $\geq 75$  años de edad, pacientes con enfermedad cardiovascular conocida u otros pacientes para quienes la diuresis inicial inducida por canagliflozina suponga un riesgo (ver sección 4.4).

\*\*\* En pacientes con TFGe  $< 60$  ml/min, no se debe iniciar el tratamiento con canagliflozina, pero se puede mantener con 100 mg. En pacientes con TFG  $< 45$  ml/min, interrumpir el tratamiento.



La evaluación de este medicamento se puede consultar en la [ficha NME nº 231/2016](#) y en su informe.