

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

www.osakidetza.euskadi.net/cevime

▼ **LYXUMIA**[®] (Lixisenatida)

Sólo se ha destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

FOLLETO PROMOCIONAL ORIGINAL: PROES005350 JULIO 2013.



Estrategia recomendada ADA/EASD 2012

Insulina basal + Análogo de GLP-1

Nueva estrategia ADA/EASD 2012
para alcanzar el control glucémico ⁽⁵⁾



Estrategia ¿«recomendada»? ADA/EASD 2012: una más de las posibles asociaciones con insulina⁵...

If combination therapy that includes basal insulin has failed to achieve HbA1c target after 3-6 months, proceed to a more complex insulin strategy, usually in combination with one or two non-insulin agents:

**GPC Diabetes mellitus tipo 2 Euskadi 2014*:
no se recomienda el uso rutinario de análogos
GLP-1 con insulina.**

BIBLIOGRAFÍA ORIGINAL DEL FOLLETO PUBLICITARIO

5. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M, Ferrannini E, Nauck M, et al.; American Diabetes Association (ADA); European Association for the Study of Diabetes (EASD). Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes Care*. 2012 Jun;35(6):1364-79.

BIBLIOGRAFÍA

- * Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre diabetes tipo 2. Guía de Práctica Clínica sobre diabetes tipo 2. Vitoria-Gasteiz: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud; 2014. In press.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la [ficha NME nº 214/2014](#) y [su informe](#)