

BERRIZTAPEN TERAPEUTIKOEN FITXA

FICHA DE INNOVACIONES TERAPEUTICAS



OSO INTERESGARRIA
MUY INTERESANTE



INTERESGARRIA
INTERESANTE




ERABILGARRIA NOIZEAN
BEHIN
EVENTUALMENTE UTIL



EZ DAKAR EZER BERRIRIK
NO APORTA NADA NUEVO




ESPERIENTZIA KLINIKO
GUTXIEGIA
EXPERIENCIA CLINICA
INSUFICIENTE




NOREBOX

Reboxetina
Pharmacia & Upjohn
4 mg-ko 60 konprimido
Prezioa 2499 pta.
4 mg-ko 20 konprimido.
Prezioa 7102 pta.



TALDE TERAPEUTIKOA/INDIKAZIOAK

Beste antidepressiboak
Depresioaren tratamendua



KOMENTARIOAK

Reboxetina antidepressibo mota berri baten lehenengo farmakoa da, noradrenalinaren rekapazioaren inhibitzaile selektiboaren (NRIS) taldekoa, hain zuzen ere. Orain dela gutxi onartuta izan da indikazio hauetarako: depresioa/depresioa nagusiaren tratamendu akuturako eta hasieran reboxetinarekin erantzun duten pazienteak mantentzeko.

Argitaratutako entseiu klinikoetan, antidepressibo triziklikoak (imipramina eta desipramina) bezain efikaza dela erakutsi du. Fluoxetinarekin konparatuta, reboxetinak efikazia antidepressibo bera azaldu du; baina paziente larriki deprimuetan edo malenkoniatsuetan, efikazia handiago erakutsi du. Halaber, reboxetinak hobekuntza esanguratsua azaldu du, fluoxetinaren aldean, pazienteen adaptazio sozialari dagokionez.

Reboxetinak efektu kaltegarri hauek erakutsi ditu: ahoaren lehortasuna (%27), idorreria (%17) eta izerdiaren gehikuntza (%14); hala eta guztiz ere, antidepressibo triziklikoekin konparatuz, maiztasun gutxiagorekin azaltzen dira. Bestalde, honako hauek ere deskribatu dira: gizonezkoetan, %4-12an, txiza-urgentzia (erretentzioa noizean behin); hipotentsioa eta takikardia (%10ean) (imipraminarekin baino intzidentzia gutxiagoz); logabezia (%14) eta inpotentzia (%5). Dena den, konparaziozko entseiu kliniko gehiago egin behar dira oraindik, bai paziente gehiagorekin baita aldi luzeagoz ere, jakiteko, batetik, reboxetinak ondorio kaltegarrien perfil hobea duen, hobeto toleratzen diren antidepressibo triziklikoekin (nortriptilina, lofepraminarekin) konparatuta, eta ziurtatzeko, bestetik, pazienteen adaptazio soziala hobetu den, fluoxetinarekin konparatuta.



NOREBOX

TRATAMENDUAREN KOSTUA
EGUNEKO

Reboxetina(8 mg)= 237 pta.
Imipramina (150 mg)= 31 pta.
Fluoxetina (20 mg)= 179 pta.

NOREBOX

Reboxetina
Pharmacia &Upjohn
4 mg 60 comp P.V.P. 2499 ptas.
4 mg 20 comp P.V.P. 7102 ptas.

GRUPO TERAPÉUTICO / INDICACIONES

Otros antidepresivos
Tratamiento de la depresión

COMENTARIOS

Reboxetina es el primer representante de una nueva clase de antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina (IRNA), que ha sido aprobado recientemente para el tratamiento agudo de la depresión/depresión mayor y para el mantenimiento de pacientes que han respondido inicialmente al tratamiento con dicho fármaco.

En los ensayos clínicos publicados ha presentado una eficacia similar a la de los antidepresivos tricíclicos (ATC)(imipramina y desipramina). Cuando se ha comparado con fluoxetina, la eficacia antidepresiva ha sido la misma, si bien, en la subpoblación de pacientes gravemente deprimidos o melancólicos, reboxetina fue superior. Asimismo, reboxetina se asoció con una mejora significativa en la adaptación social en comparación a fluoxetina. Reboxetina puede ocasionar sequedad de boca (27%), estreñimiento(17%) y aumento de la sudoración(14%), aunque con menor frecuencia que con los ATC cuando se ha comparado con ellos directamente. También se ha descrito en varones, entre un 4-12% urgencia urinaria(retención ocasionalmente). Hasta en un 10% se han descrito hipotensión y taquicardia(con menor incidencia que con imipramina), insomnio(14%) e impotencia(5%).

Todavía se necesitan más ensayos clínicos comparativos realizados con un mayor número de pacientes y durante periodos más prolongados, frente a antidepresivos tricíclicos mejor tolerados (nortriptilina, lofepramina), para determinar si reboxetina presenta un mejor perfil de efectos adversos; y también frente a fluoxetina, para confirmar la mejora en la adaptación social de los pacientes.

COSTE TRATAMIENTO/DÍA

Reboxetina 8 mg= 237 ptas.
Imipramina 150 mg= 31 ptas.
Fluoxetina 20 mg= 179 ptas.

Sendagai hauei buruz zehetasun gehiago jakiteko edo zerbait argitzeko honekin harremanetan jarri: e-mail: cevime-san@ej-gv.es
MEBEIZ - Tel. 945 18 92 66
Para ampliar o aclarar cualquier aspecto relacionado con estos u otros medicamentos póngase en contacto con: e-mail: cevime-san@ej-gv.es
CEVIME - Tel. 945 18 92 66



Osakidetza
Servicio vasco de salud

Emandako informazioa orain duguna da eta etorkizunean gerta daitezkeen aurrerapen zientifikoen arabera aldagarria da. La información que aquí se presenta es la disponible hasta el momento y es susceptible de modificaciones futuras en función de los avances científicos que se produzcan.