

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

www.osanet.euskadi.net/cevime/es

ACREL® ACTONEL® (Risedronato 75 mg 2 días consecutivos/mes)

Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

Folleto promocional original: ACREL®: extraído de www.acrel.net; ACTONEL®: sin código.

Acrel 75mg¹
Risedronato de sodio

ESTUDIO⁸ REAL⁺
Osteoporosis Int
Enero 2017

Risedronato (Acrel), comparado con Alendronato, reduce el riesgo de fractura de cadera en un 43% a los 12 meses^{8**}

** p=001. Estudio de cohorte retrospectivo en mujeres (65 años) tratadas recientemente con risedronato semanal (n=12.215) o alendronato semanal (n=21.615).

Esta conclusión no se puede extraer de un estudio de cohortes. No hay ensayos clínicos comparativos del risedronato frente al alendronato.

Actonel® 75mg
ácido risedrónico

EFICACIA anti fractura en tratamiento mensual¹

Tratamiento MENSUAL^{*}

¡Cuidado!
Este mensaje puede llevar a confusión en la pauta (ver letra pequeña).

Modo de administración
Un comprimido
los mismos 2 días consecutivos de cada MES

BIBLIOGRAFÍA ORIGINAL DEL FOLLETO PUBLICITARIO

8. Silverman SL, Watts NB, Delmas PD, Lange JL, Lindsay R. Effectiveness of bisphosphonates on nonvertebral and hip fractures in the first year of therapy: The risedronate and alendronate (REAL) cohort study. Osteopor Int. 2007;18:25-34.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº 155/2009 y su informe