

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

NEUPRO® (Rotigotina)

Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.




folleto promocional
original: 06-NEU-53-04-07



• Neupro® eficacia similar a pramipexol

Neupro® en dosis hasta 16mg/24 horas redujo el tiempo "off" de forma similar a pramipexol⁽⁸⁾



Sí pero... con rotigotina se obtuvo un menor % de respondedores al tratamiento que con pramipexol, que también era una variable principal de este ensayo¹.

¿y frente al resto de los antiparkinsonianos?

Rotigotina fue significativamente menos eficaz que ROPINIROL en uno de los ensayos -no publicado- accesible a través de la EMEA².

La mayor parte de la bibliografía del folleto original son comunicaciones a congresos, pósters...

1.- Poewe WH, Rascol O, Quinn N, Tolosa E, Oertel WH, Martignoni E, et al. Efficacy of pramipexole and transdermal rotigotine in advanced Parkinson's disease: a double-blind, double-dummy, randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2007;6:513-20.
2.- European Medicines Agency. Neupro® (Rotigotine). EPAR Scientific Discussion. [actualizado marzo 2006; accedido marzo 2007]. Disponible en: <http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/neupro/H-626-PI-es.pdf>

BIBLIOGRAFÍA

1. Poewe WH, Rascol O, Quinn N, Tolosa E, Oertel WH, Martignoni E, et al. Efficacy of pramipexole and transdermal rotigotine in advanced Parkinson's disease: a double-blind, double-dummy, randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2007;6:513-20.
2. European Medicines Agency. Neupro® (Rotigotine). EPAR Scientific Discussion. [actualizado marzo 2006; accedido marzo 2007]. Disponible en: <http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/neupro/H-626-PI-es.pdf>

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº 128/2007 y su informe