

<http://www.osanet.euskadi.net>  
(profesionales)

**VESICARE® (solifenacina)**

**Nada nuevo bajo el sol**

**Bienvenido al nuevo mundo del  
tratamiento de la Vejiga Hiperactiva**

Una micción menos al día que con  
placebo<sup>7</sup>; ¿es **CLÍNICAMENTE**  
significativo?

Nº de micciones

Basal Final

Solifenacina 5mg

12,08 9,88

Placebo

12,20 10,99

Nº episodios de urgencia

Basal Final

Solifenacina 5mg

5,77 2,93

Placebo

5,30 3,89

Hasta 21% de  
incidencia<sup>4</sup>

- **Eficaz en todos los síntomas<sup>4</sup>**
- **Baja incidencia de boca seca<sup>6,7</sup>**
- **Valoración positiva por los pacientes<sup>4</sup>**
- **Menor uso de pañales<sup>9</sup>**
- **Elevada persistencia<sup>4</sup>**
- **Mejor calidad de vida<sup>2</sup>**

**Yamanouchi**

**Vesicare®**  
solifenacina  
Resultados rápidos y duraderos

VES 12-01/05.30

### Bibliografía del folleto original

folleto promocional original: VES 12-01/05.30

4. Haab F, Cardozo L, Chapple C y Ridder A for the Solifenacin Study Group. Long-term open label solifenacin treatment associated with high persistence with therapy in patients with overactive bladder syndrome. Eur Urol. 2005;47:376-84.

6. Cardozo L et al. Randomized, double-blind placebo controlled trial of the once daily antimuscarinic agent solifenacin succinate in patients with overactive bladder. J Urol. 2004;172:1919-24.

7. Chapple C et al. Ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y tolterodina, realizado con solifenacina, un fármaco antimuscarínico administrado una vez al día, en pacientes con vejiga hiperactiva sintomática. BJU Int. 2004;93(3):303-10.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº101/2005 y su informe