

## COMBIGAN® (Timolol/Brimonidina)

Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

folleto promocional original

# Potencia

combinada para encarrilar la PIO

Quando la **Monoterapia** no es suficiente

La asociación timolol/brimonidina no ha sido comparada con la asociación timolol/latanoprost, que combina dos fármacos de primera elección y además se administra una vez al día.

- COMBIGAN® redujo la PIO significativamente hasta un 33% (7,6 mm Hg) respecto a la basal<sup>2</sup>
- 98% de los médicos calificaron a COMBIGAN® como bueno o
- COMBIGAN® proporciona un mecanismo de acción dual
- COMBIGAN® cómoda administración, dos veces al día

Se dice el dato más favorable. En este ensayo, el descenso de la PIO respecto a la basal fue en un rango de 4,4 a 7,6 mm Hg<sup>1</sup>.

Nuevo **Combigan**®  
(tartrato de brimonidina, 2 mg/ml y timolol, 5 mg/ml)

### BIBLIOGRAFÍA

1. Sherwood MB, Craven ER, Chou C, DuBiner HB, Batoosingh AL, Schiffman RM, et al. Twice-daily 0.2% brimonidine-0.5% timolol fixed-combination therapy vs monotherapy with timolol or brimonidine in patients with glaucoma or ocular hypertension. Arch Ophthalmol. 2006; 124(9):1230-8.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº 127/2007 y su informe