

## CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

www.osanet.euskadi.net (profesionales)

# DUOTRAV® (Travoprost/Timolol)


Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

Quando el tratamiento con Prostaglandinas  
no sea suficiente:

**DUOTRAV®**  
PREPARADO PARA EL ÉXITO

La seguridad de estar haciendo lo mejor para sus pacientes


folleto promocional original: 1190997



Seguros, seguros,  
no podemos estar  
porque no se ha  
comparado con la  
asociación latano-  
prost/timolol

El eje Y no  
comienza en  
el 0 por lo que  
las diferencias  
se magnifican

**DUOTRAV®: Mayor reducción de PIO que Travatan en monoterapia (1)**



P < 0.001 para todas las mediciones.

Estudio multicéntrico, de grupos paralelos, doble-ciego de 3 meses de duración, en el que participaron 263 pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular y que fueron distribuidos aleatoriamente para recibir Duotrav (n=82) una vez al día por la mañana o Travatan (n=84) una vez al día por la noche.

1 gota  
DUOTRAV®

Tan eficaz como  
la terapia concomitante,  
y además mejora  
la cumplimentación (2)

En el estudio referenciado no se  
estudia la cumplimentación (tampoco  
en el resto de los ensayos publicados)

### BIBLIOGRAFÍA DEL FOLLETO ORIGINAL

1. Barnebey HS, Orengo-Nania S, Flowers BE, Samples J, Mallick S, Landry TA, et al. The safety and efficacy of travoprost 0.004%/timolol 0.5% fixed combination ophthalmic solution. Am J Ophthalmol. 2005; 140(1):1-7.
2. Hughes BA, Bacharach J, Craven ER, Kaback MB, Mallick S, Landry TA, et al. A three-month, multicenter, double-masked study of the safety and efficacy of travoprost 0.004%/timolol 0.5% ophthalmic solution compared to travoprost 0.004% ophthalmic solution and timolol 0.5% dosed concomitantly in subjects with open angle glaucoma or ocular hypertension. J Glaucoma. 2005; 14(5):392-399.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº 129/2007 y su informe