

Comarca
Interior / *Barrualdea*

Este documento se ha elaborado con los datos del registro de cáncer del periodo 1986-2009 y los resultados de la publicación "Atlas municipal del cáncer de la CAPV, 2003-2008". Tiene como objetivo, mostrar la evolución del cáncer en la población de la comarca en las dos últimas décadas, así como destacar la información municipal.

La evolución de las tasas ajustadas por edad (con la población estándar europea) de la comarca se representa gráficamente junto con la de la Comunidad Autónoma; se ha utilizado el modelo de regresión log lineal JoinPoint para su estimación. Junto a la evolución temporal se expone el mapa de probabilidades, donde se representa la mayor o menor probabilidad de riesgo de los municipios de la comarca en comparación al promedio de la CAPV. Finalmente, los diagramas de cajas muestran la distribución del riesgo en los municipios de las comarcas de Bizkaia con respecto al conjunto de la CAPV.



Resumen de resultados destacados

Todas las localizaciones (♂/♀)

Se mantiene la tendencia ascendente en las tasas de incidencia. El incremento anual es de 1,12 % en hombre, y 1,74% en mujeres. Las probabilidades de riesgo de los municipios de la comarca normalmente se encuentra por debajo del de la CAPV (mapa).

Cabeza y Cuello (♂)

Tasas con tendencia decreciente, con un descenso anual de 0,65%. Los municipios con probabilidad de riesgo mayor que el de la CAPV son: Basauri y Exebarri.

Colon-Recto (♂/♀)

Las tasas presentan una tendencia ascendente con un incremento anual de 2,82% en hombres y de 2,25% en mujeres. Las probabilidades de riesgo por municipio están por debajo del riesgo de la CAPV.

Pulmón (♂/♀)

Mientras que las tasas en hombres presentan una ligera disminución, las tasas de las mujeres aumentan, aunque siguen siendo tasas bajas. Las probabilidades de riesgo de los municipios de la comarca son menores o a la par de las de la CAPV.

Melanoma cutáneo(♀)

Las tasas presentan una tendencia ascendente con un incremento anual de 2,69%. No hay diferencias con respecto a la probabilidad de riesgo con respecto a la CAPV.

Mama(♀)

El incremento anual de la tasa ajustada es de 2,07%. Solamente Gernika aparece con una probabilidad de riesgo mayor al de la CAPV.

Próstata (♂)

El incremento anual de la tasa ajustada es de un 4%. Las probabilidades de riesgo de los municipios son inferiores a los de la CAPV.

Vías urinarias y vejiga (♂)

Las tasas presentan cambios de tendencia, estando siempre por debajo de las tasas de la CAPV. Etxebarri presenta con una probabilidad de riesgo aumentado con respecto a la CAPV.

Tiroides (♀)

Las tasas han aumentado un 6% anual, sin embargo no presentan el incremento observado en la CAPV a partir del 2006. Las probabilidades de riesgo a la par o por debajo de las de la CAPV (mapa).

2
0
1
3

CONTACTO:
Epidemiología Unitatea
Osasun Publikoko Lurralde Ordezkaritza.
Bizkaia.
Alamedad Recalde, 39A
4808 Bilbao



HOMBRES

	Tendencia, <i>JoinPoint</i> , de las tasas de incidencia ajustadas por edad (x 100,000 habitantes, población de referencia: Población Europea)	Riesgo de que la probabilidad sea superior al de la CAPV
Todas las localizaciones (CIE-10: C00-C99, no C44)		
Cabeza y Cuello (CIE-10: C00-C14)		
Colon-Recto (CIE-10: C18-C20)		
Pulmón (CIE-10: C33-C34)		
Próstata (CIE-10: C61)		
Vías urinarias y vejiga (CIE-10: C65-C68)		
	<p>— Berrueta — CAPV</p>	<p> ■ < 0.10 ■ 0.10 - 0.20 ■ 0.20 - 0.80 ■ 0.80 - 0.90 ■ >= 0.90 </p>

MUJERES

	Tendencia, <i>JoinPoint</i> , de las tasas de incidencia ajustadas por edad (x 100,000 habitantes, población de referencia: Población Europea)	Riesgo de que la probabilidad sea superior al de la CAPV
Todas las localizaciones (CIE-10: C00-C99, no C44)		
Colon-Recto (CIE-10: C18-C20)		
Pulmón (CIE-10: C33-C34)		
Melanoma cutáneo (CIE-10: C43)		
Mama (CIE-10: C50)		
Tiroides (CIE-10: C73)		
	<p>— Berrualsea — CAPV</p>	<p> ■ < 0.10 ■ 0.10 - 0.20 0.20 - 0.80 ■ 0.80 - 0.90 ■ ≥ 0.90 </p>

Razón de Incidencia Estandarizada de las Comarcas

