



INFORME DEL REGISTRO DE

ALTAS HOSPITALARIAS

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

2012

octubre 2013

Servicio de Registros e Información sanitaria

RESUMEN EJECUTIVO

- El **número total de altas** declaradas en 2012 en los hospitales públicos y privados de la CAPV ha sido de 319.874, lo que supone un descenso del 4,2% respecto a 2011; este descenso se ha debido fundamentalmente a una disminución de la declaración de algunos procesos ambulatorios. Del total de altas registradas el 76,9% corresponden a los hospitales públicos y el 23,1% a los hospitales privados.
- La **estancia media** registrada en el conjunto de los hospitales en 2012 ha sido de 5,9 días en la hospitalización convencional. En los hospitales públicos ha sido de 6,3 días y en los privados de 3,9 días.
- La **tasa de hospitalización convencional**, nº de altas por 1.000 habitantes, en los hospitales públicos ha sido de 84,1 en el conjunto de la CAPV; si bien se observan diferencias entre los Territorios Históricos, destacando el hecho de que en Araba-Álava esta tasa es de 99,8.
- La **principal causa de hospitalización** convencional en los hospitales públicos de agudos en 2012 ha sido la insuficiencia cardiaca (4.826 altas) y en el caso de los hospitales privados el trastorno interno de rodilla (2.188 altas).
- El **primer procedimiento quirúrgico** más frecuente en hospitalización convencional en los hospitales públicos de agudos ha sido "otros procedimientos para ayudar al parto" (11.564 altas) en el caso de las mujeres y la "colecistectomía y exploración del conducto común" (1.260 altas) en el caso de los hombres. En el caso de los hospitales privados, el primer procedimiento quirúrgico más frecuente en ambos sexos ha sido la artroscopia.
- Los procedimientos más frecuentes de **cirugía mayor ambulatoria** en hospitales públicos y privados, en ambos sexos, son las 'procedimientos sobre cristalino y cataratas', con 17.168 y 3.755 altas respectivamente.
- El **porcentaje de ambulatorización** del total de los procesos de cirugía mayor ha sido similar en los hospitales públicos y privados con un 37% y 35% respectivamente.
- La evaluación del grado de cumplimentación del **indicador POA** (present on admission) se introdujo por primera vez en el informe del 2011, en 2012 se ha continuado evaluando este registro. El porcentaje de cumplimentación ha sido del 100% en los hospitales de agudos públicos y del 78% en los privados. Es necesario señalar que al igual que en 2011, el porcentaje de los POA en las categorías 'no' y 'desconocida' ha sido bastante heterogénea en hospitales *a priori* similares, lo que indica la necesidad de mejorar la estandarización de la recogida de esta variable.

1.- INTRODUCCIÓN

El informe que se presenta a continuación corresponde al análisis de los datos declarados al Registro de Altas Hospitalarias (RAH) en 2012 y ofrece información de todos los casos atendidos en los hospitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), públicos y privados, salvo de los hospitales psiquiátricos.

Dicho registro fue creado por el Decreto 303/1992, de 3 de noviembre (1) como un registro administrativo que contiene un conjunto de variables clínicas, demográficas y administrativas que resumen los episodios de hospitalización y que se conoce como Conjunto Mínimo Básico de Datos (cmbd).

Por Orden de 3 de septiembre de 2010 se han incorporado nuevas variables a dicho cmbd (2).

2.- MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyen todas las altas de pacientes dados de alta en hospitales públicos o privados de la CAPV en 2012. La unidad de análisis son los **episodios**.

El tipo de asistencia se ha categorizado en dos grandes grupos: **Hospitalización convencional**, que incluye todos los ingresos con estancia > 0 días y los traslados a otro hospital, las altas voluntarias o defunciones, y **procesos ambulatorios**, en el que se incluyen todos los ingresos programados con estancia cero y los ingresos urgentes con estancia 0 que no hayan sido trasladados a otro hospital, alta voluntaria o defunción.

Las variables en estudio son las recogidas en la Orden de 3 de septiembre de 2010 y en el Manual técnico que lo ha desarrollado (3). Además de los datos básicos referidos a los pacientes atendidos (sexo, edad, territorio histórico de residencia, centro hospitalario, tipo de ingreso, tipo de alta, servicio de alta, etc.), se estudian cuatro indicadores relevantes:

1. **Estancia media.** Se obtiene como cociente entre el número de estancias y el número de altas.
2. **Tasa de utilización.** Es el número de altas, en nuestro caso por cada 1.000 habitantes/año; como denominador de las tasas, se ha empleado la población estimada para 2011 por extrapolación lineal a partir del censo de 2001 y el padrón de habitantes de 2006 del Eustat.
3. **Razón de tasas.** Es el cociente entre dos tasas de utilización.
4. **Porcentaje de ambulatorización.** Es el % de procedimientos de cirugía mayor realizados ambulatoriamente (ingreso programado y estancia 0).

La calidad de los datos se mide por el grado de cumplimiento de las variables administrativas y clínicas obligatorias (tipo de ingreso, tipo de alta, lugar de residencia, diagnóstico principal, etc.) y, de forma indirecta, por determinados indicadores: media de diagnósticos, media de procedimientos, etc. Por segundo año se ha evaluado el grado de cumplimiento del indicador de diagnóstico presente al ingreso (conocido por sus siglas en inglés, POA).

El análisis de los datos es de tipo descriptivo y hace referencia a las variables administrativas básicas y a las siguientes variables clínicas: diagnóstico principal y primer procedimiento quirúrgico. Para el análisis de los porcentajes de ambulatorización de los procesos más frecuentes de cirugía mayor se han utilizado todos los procedimientos declarados.

Para obtener las tablas de diagnósticos más frecuentes se ha utilizado los tres primeros dígitos del diagnóstico principal de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 9ª revisión, Modificación Clínica (CIE-9-MC)(4) y para las tablas de procedimientos más frecuentes, se ha utilizado un agrupador de procedimientos elaborado por la Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ) del Gobierno de EEUU, denominado CCS (5). Previamente, para la selección de procedimientos de cirugía mayor, se ha utilizado un agrupador elaborado por la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud.

En este informe se analizan con detalle los casos de hospitalización convencional en la CAPV y, de los procesos ambulatorios, sólo se analizan los casos de cirugía mayor ambulatoria ya que la declaración del resto de procesos (cirugía menor, hospital de día médico, ingresos urgentes con estancia 0, etc.) no está todavía suficientemente consolidada en la CAPV. En ambos casos el análisis se centra en las altas de personas residentes en la CAPV.

En el anexo 1 se desglosan todas las altas declaradas por tipo de hospital y tipo de asistencia recibida.

3.- RESULTADOS

3.1. Datos generales

El número total de altas declaradas en 2012 en los hospitales públicos y privados de la CAPV fue de 319.874 casos, es decir, un 4,2% menos que en 2011, 0,9% en hospitalización convencional y un 15% en procesos ambulatorios. Este último descenso se ha debido fundamentalmente a una menor declaración de un hospital privado (6).

En cuanto al tipo de asistencia, en los hospitales públicos el 79,6% son casos de hospitalización convencional, frente al 61,4% en los hospitales privados (figura 1).

Centrándonos ya en el análisis de calidad de los datos, y más en concreto de los casos de hospitalización convencional en residentes, en la tabla 3 se presenta el grado de cumplimentación de 4 variables obligatorias seleccionadas (municipio de residencia, edad, diagnóstico principal, así como de una variable optativa -el indicador de diagnóstico presente al ingreso (conocido por sus siglas en inglés, POA)-. Se observan algunos valores ausentes en las variables obligatorias; en concreto en 29 casos no se ha codificado el diagnóstico principal (frente a 18 casos en 2011). En cuanto al indicador POA, si bien era de declaración optativa, se observa que ha alcanzado una cumplimentación del 98% de total de diagnósticos; no obstante el porcentaje de los POA en la categoría 'no' y en la categoría 'desconocida' muestran una distribución bastante heterogénea en algunos hospitales que *a priori* son bastantes similares, lo que indica la necesidad de mejorar la estandarización de la recogida de esta variable.

Por otra parte, en la tabla 3 bis se presentan la media de diagnósticos y la media de procedimientos por tipo de hospital y hospital concreto. En cuanto a la media de diagnósticos, es mayor en los hospitales públicos de agudos (4,9) en comparación con los hospitales de agudos privados (2,4); en los hospitales de media-larga estancia existe una distribución más heterogénea. Se observa en general una escasísima declaración de procedimientos no quirúrgicos, es decir procedimientos diagnósticos y otros procedimientos terapéuticos (de media, 1 procedimiento por alta).

En cuanto a los procedimientos quirúrgicos u obstétricos, el 47 % de los casos de hospitalización convencional tienen alguno de estos procedimientos; existe una ligera heterogeneidad entre los distintos hospitales, aunque la media de estos procedimientos prácticamente es igual en el conjunto de los hospitales públicos de agudos y en los privados (tabla 3 bis).

3.2. Hospitales de agudos

3.2.1. Hospitalización convencional

En la **tabla 4** se desglosa la **edad media** de las altas de hospitalización convencional. Como se observa, la edad media observada en los hospitales públicos es de 57,5 años, 1,2 años mayor que la observada en los privados, que ha sido de 56,3 años. En la **estancia media** la diferencia es de 2,4 días, 6,3 días en los hospitales públicos frente a 3,9 en los privados.

En cuanto al **tipo de ingreso**, al igual que en el 2011, en los hospitales públicos predominan los ingresos urgentes (70,6%), en cambio en los hospitales privados predomina el ingreso programado (69,8%) (**figura 2**).

Con respecto al **tipo de alta**, en los hospitales públicos, en el 92,7 % de las altas el destino es a domicilio, en tanto que en los privados éste representa el 96,2% (en esta categoría se incluyen las altas a hospitalización a domicilio). La tasa de fallecimientos ha sido del 3,5% en los hospitales públicos y del 2,2% en los hospitales privados, relacionado probablemente en este último caso por la menor complejidad de los casos atendidos en dichos centros. El resto de los destinos se desglosa en la **tabla 5**.

En cuanto al **servicio del alta**, los servicios con mayor número de altas son medicina interna (14%), obstetricia-ginecología (13%), traumatología y cirugía general y del aparato digestivo (12,7%). En términos relativos, en los hospitales públicos tienen una presencia mayor las especialidades de medicina interna, obstetricia-ginecología y cirugía general y del aparato digestivo, en tanto que en los hospitales privados prevalece la traumatología, la cirugía general y del aparato digestivo y medicina interna (**tabla 6**).

En la **tabla 7** se muestra la distribución por **grupos de edad y sexo**. En los hombres se observa que el pico mayor de ingresos se produce en el grupo de 65 a 79 años, en tanto que en las mujeres el pico mayor se da en el grupo de 30-49 años.

La **figura 3** es más ilustrativa. Se observa que excepto en los grupos de edad de 15 a 29 años y de 30 a 49 años en los que la tasa de frecuentación es mayor en mujeres (razón de tasas de 1,66 y 1,88 respectivamente), en el resto de los grupos de edad la tasa es superior en hombres, sobre todo en los tres grupos de mayor

edad, siendo la razón de tasas de 1,54 en el grupo de 50-64 años, 1,68 en el grupo de 65-79 años y 1,52 en el de 80 y más años.

En las **tablas 8a y 8b** se muestra el número de altas por persona y la tasa de utilización por 1.000 habitantes, en hospitales públicos y privados, respectivamente. En los hospitales públicos el **nº de altas por persona** es superior en hombres (1,3) en comparación con las mujeres (1,21), debido a los ingresos por partos que raramente producen reingresos. Por otra parte, el número de altas/persona es superior en los hospitales públicos (1,3) en comparación con los privados (1,1), relacionado probablemente con la mayor complejidad de los casos atendidos. En cuanto a las **tasas de utilización**, destaca el hecho de que Araba-Álava presenta una tasa de hospitalización convencional en hospitales públicos en ambos sexos (99,8) bastante superior a la de Bizkaia y Gipuzkoa (76,8 y 88,7, respectivamente). En cambio, las tasas de hospitalización convencional en los hospitales privados es inferior en Araba-Álava (10,2) con respecto a Bizkaia y Gipuzkoa (19,4 y 22,4, respectivamente).

En la **tabla 9** y **figura 4** se muestran las **altas por grupo de diagnóstico y Territorio Histórico en hombres**. En términos relativos, las mayores diferencias se observan en el grupo diagnóstico "neoplasias" que son más frecuentes en Bizkaia (12%) en comparación con Álava-Araba (9,4%) y Gipuzkoa (10,7%).

En la **tabla 10** y **figura 5** se muestran las **altas por grupo de diagnóstico y Territorio Histórico en mujeres**. En términos relativos, las mayores diferencias también se observan en las neoplasias, que son más frecuentes en Bizkaia (9,5%) en comparación con Gipuzkoa (8,5%) y Araba-Álava (7,9%).

En la **tabla 11** se presentan los veinticinco **diagnósticos más frecuentes** en hospitalización convencional, por sexo, en **hospitales públicos**. La insuficiencia cardíaca seguida de la colestiasis representan las dos causas principales de hospitalización convencional. Señalar que el nº de altas por insuficiencia cardíaca en 2012 (4.826 altas) se ha incrementado en un 7,4% en relación a las registradas en 2011. En el caso de la colestiasis no se han observado diferencias.

En la **tabla 12** se presentan esos mismos datos para los **hospitales privados**. En este caso, al igual que en 2011, el trastorno interno de la rodilla, la osteoartritis y la hernia inguinal son las tres causas más frecuentes de ingreso.

En las **tablas 14 y 15** se presentan las 10 categorías más frecuentes del **primer procedimiento quirúrgico** en hospitalización convencional, por sexo, en hospitales públicos y privados, respectivamente, de acuerdo a la clasificación de la CCS. Dos procedimientos relacionados con el parto seguidos por la colecistomías representan las tres primeras categorías en los hospitales públicos. Sin embargo, al analizar por sexo, el procedimiento más frecuente en hombres es la 'reparación de hernia inguinal y femoral'. En los privados, las categorías más frecuentes son dos procedimientos relacionados con la rodilla y la 'reparación de hernia inguinal y femoral'. Sin embargo al analizar por sexo el procedimiento más frecuente en mujeres sigue siendo 'otro parto asistido manualmente'.

3.2.2. Cirugía mayor ambulatoria

En la **tabla 16** se desglosa el número de **altas de cirugía mayor ambulatoria** y la edad media; como se observa, la edad media es mayor en los hospitales públicos en comparación con los privados, 60,5 y 55,6 años respectivamente.

En las **tablas 17 y 18** se presentan las 10 categorías más frecuentes del **primer procedimiento quirúrgico en cirugía mayor ambulatoria**, por sexo, en hospitales públicos y privados, respectivamente, de acuerdo a la clasificación de la CCS. En ambos tipos de hospitales los 'procedimientos sobre cristalino y cataratas' son los más frecuentes.

Finalmente, en la **tablas 19 y 20** se muestra el grado de 'ambulatorización', es decir el porcentaje de todos los procedimientos de cirugía mayor realizados de forma programada sin ingreso, en los hospitales públicos y privados, respectivamente. Se observa que el índice de ambulatorización total es muy similar (34,4% en los públicos y 34% en los privados).

3.3. Hospitales de media-larga estancia

En la **tabla 21** se desglosa la **edad media y estancia media** de las altas de hospitalización convencional en este tipo de hospitales. Como se observa, la edad media es similar en los hospitales públicos (79,8 años) y privados (80,6 años), pero la estancia media sigue presentando diferencias notables entre en este tipo de hospitales.

En la **figura 6** se muestra la distribución por **grupos de edad y sexo**. En el caso de los hombres el 77,1% de las altas se dan entre los 60 y 89 años, en el caso de las mujeres este porcentaje es del 72,3%.

En cuanto al **tipo de ingreso**, existe una variabilidad importante en el porcentaje de ingresos urgentes en cada uno de estos hospitales, el 43% en los públicos y el 0% en los privados. (**figura 7**).

Con respecto al **tipo de alta**, en los hospitales públicos el 68,1 % de las altas el destino es a domicilio, en tanto que en los privados éste es del 42,6 %. Por otra parte, el porcentaje de fallecimientos es muy dispar. Estos datos vuelven a reflejar la heterogeneidad de la casuística atendida en estos centros. El resto de los destinos se desglosa en la **tabla 22**.

En la **tabla 23 y figura 8** se muestran las altas por grupo de diagnóstico y Territorio Histórico. Las mayores diferencias se observan en los códigos V, que son más frecuentes en Gipuzkoa (71,2%) en comparación con los otros territorios y, en segundo lugar, las enfermedades del aparato respiratorio que son más frecuentes en Bizkaia (32,8%) en comparación con los otros dos.

Finalmente, en la **tabla 24** se presentan los veinticinco **diagnósticos más frecuentes** por sexo en hospitales de media-larga estancia públicos y privados, utilizando los tres primeros dígitos del diagnóstico principal. Los diagnósticos 'cuidados que implican procedimientos de rehabilitación' y la convalecencia son los que representan las dos primeras causas de hospitalización en ambos sexos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Decreto 303/1992, de 3 de noviembre, por el que se regula el conjunto mínimo básico de datos del Alta Hospitalaria y se crea el registro de Altas Hospitalarias de Euskadi (BOPV, 1/12/1992).
2. Orden de 3 de septiembre de 2010, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se incorporan nuevas variables al Conjunto Mínimo Básico de Datos del alta hospitalaria (BOPV, 29/9/2010)
3. Manual Técnico del Registro del CMBD de las altas hospitalarias de Euskadi, 2010. Departamento de Sanidad y Consumo, Gobierno Vasco.
4. Clasificación Internacional de Enfermedades, 9ª Revisión, Modificación Clínica (CIE-9-MC), 7ª edición. Ministerio de Sanidad y Consumo, 2010
5. Agrupador CCS de la AHRQ:
<http://www.hcup-us.ahrq.gov/toolssoftware/ccs/ccs.jsp>
6. Informe del Registro de altas hospitalarias, 2011.
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-pkpubl01/es/contenidos/informacion/estado_salud/es_5463/morbilidad_hosp_c.html
7. Instituto de Información Sanitaria. La hospitalización en el Sistema Nacional de Salud. Informe resumen 2010 [Publicación en Internet]. Madrid. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2012.
http://www.msc.es/fr/estadEstudios/estadisticas/docs/Hospitalizacion_SNS_CMBD_Informe2010.pdf

Agradecimientos

A todos los profesionales que colaboran en la recogida de datos del cmbd de las altas hospitalarias por su dedicación a que esta información sea de la mayor calidad posible.

Tabla 1. Altas totales por tipo de hospital y tipo de asistencia en la CAPV, 2012

| Tipo hospital | Tipo de asistencia | | | | Total | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|------------|
| | Hospitalización convencional* | | Procesos ambulatorios** | | | |
| | nº casos | % | nº casos | % | nº casos | % |
| H. públicos de agudos | 187.418 | 77,7 | 50.148 | 63,7 | 237.566 | 74,3 |
| H. privados de agudos | 44.232 | 18,3 | 28.591 | 36,3 | 72.823 | 22,8 |
| H. públicos m/l estancia | 8.213 | 3,4 | 8 | 0,0 | 8.221 | 2,6 |
| H. privados m/l estancia | 1.264 | 0,5 | 0 | 0 | 1.264 | 0,4 |
| Total | 241.127 | 100 | 78.747 | 100 | 319.874 | 100 |

* Altas con estancia>0 o traslados a otro hospital, altas voluntarias y defunciones.

** Procedimientos programados y los ingresos urgentes con estancia 0.

Figura 1. Distribución de las altas por tipo de asistencia, CAPV 2012




Tabla 2. Altas por tipo hospital y tipo de residencia en la CAPV, 2012

| | Residente | | | No residente | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| | Hospitalización convencional | Procesos ambulatorios | Total | Hospitalización convencional | Procesos ambulatorios | Total |
| Hospitales públicos | 192.199 | 49.435 | 241.634 | 3.432 | 721 | 4.153 |
| Hospitales privados | 42.895 | 26.939 | 69.834 | 2.601 | 1.652 | 4.253 |
| TOTAL | 235.094 | 76.374 | 311.468 | 6.033 | 2.373 | 8.406 |

Tabla 3. Valores ausentes o erróneos de las variables seleccionadas y grado de cumplimentación de la variable optativa diagnóstico presente al ingreso (indicador POA) en hospitalización convencional en hospitales de agudos públicos y privados, en residentes en la CAPV 2012

| | | Munic. resid. | Edad | Dx ppal. | Todos los diagnóst. | % Cumplim. POA | % POA 'no' | % POA 'desconoc.' |
|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|
| H. de agudos públicos | Santiago | 0 | 0 | 0 | 49.602 | 100 | 6,00% | 0,20% |
| | Txagorritxu | 0 | 0 | 0 | 88.798 | 100 | 3,40% | 16,40% |
| | Bidasoa | 0 | 0 | 0 | 20.830 | 100 | 1,90% | 0,40% |
| | Alto Deba | 0 | 0 | 0 | 14.134 | 100 | 0,30% | 0,00% |
| | Donostia | 6 | 0 | 0 | 247.668 | 100 | 1,90% | 20,10% |
| | Zumarraga | 0 | 0 | 0 | 22.495 | 100 | 0,40% | 0,00% |
| | Mendaro | 0 | 0 | 0 | 33.773 | 100 | 1,00% | 22,80% |
| | Cruces | 2 | 0 | 0 | 190.273 | 100 | 5,90% | 13,10% |
| | San Eloy | 0 | 0 | 0 | 26.625 | 100 | 2,50% | 17,40% |
| | Basurto | 0 | 0 | 0 | 160.263 | 100 | 4,40% | 0,00% |
| | Galdakao | 1 | 0 | 0 | 84.807 | 100 | 3,70% | 0,10% |
| | Total | 9 | 0 | 0 | 939.268 | 100 | 3,60% | 10,90% |
| H. de agudos privados | La Esperanza | 1 | 1 | 0 | 1.218 | 100 | 0,00% | 100,00% |
| | Pol. San José | 0 | 1 | 0 | 3.334 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | V. Pilar | 5 | 0 | 0 | 2.611 | 100 | 0,00% | 0,60% |
| | Onkologikoa | 1 | 0 | 0 | 8.380 | 100 | 3,30% | 0,20% |
| | Mutualia-Pakea | 0 | 0 | 0 | 426 | 100% | 0,00% | 0,00% |
| | Policl. Gipuzkoa | 1 | 0 | 7 | 25.728 | 100 | 24,20% | 0,00% |
| | Quirón-Donostia | 64 | 0 | 0 | 3.189 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | La Asunción | 0 | 0 | 0 | 10.520 | 100 | 1,50% | 34,30% |
| | Indautxu | 0 | 47 | 21 | 696 | 100 | 0,00% | 100,00% |
| | Vic. San Sebastián | 0 | 0 | 0 | 25.629 | 46 | 1,30% | 6,90% |
| | Virgen Blanca | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 100 | 0,00% | 0,00% |
| | Cruz Roja-Bilbao | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 100 | 0,00% | 0,00% |
| | Mutualia-Ercilla | 0 | 0 | 0 | 791 | 100 | 0,00% | 0,00% |
| | Sanat. Bilbaino | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 99 | 0,00% | 0,00% |
| | Guimón | 5 | 1 | 0 | 1.258 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Intermutual | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 100 | 0,00% | 0,00% |
| | S. Juan Dios-Santurtzi | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 100 | 0,00% | 0,00% |
| | Quirón-Bizkaia | 0 | 0 | 1 | 2.706 | 100 | 0,00% | 98,50% |
| | Total | 77 | 50 | 29 | 99.407 | 78 | 7,00% | 10,10% |
| H. de m-l estancia públicos | Leza | 0 | 0 | 0 | 2.350 | 99 | 0,00% | 0,00% |
| | Amara | 0 | 0 | 0 | 9.538 | 100 | 2,30% | 32,70% |
| | Santa Marina | 0 | 0 | 0 | 47.599 | 100 | 1,80% | 0,10% |
| | Gorliz | 0 | 0 | 0 | 13.074 | 100 | 0,00% | 0,00% |
| | Total | 0 | 0 | 0 | 72.561 | 100 | 1,50% | 4,40% |
| H. de m-l estancia privados | Clin. Álava | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Matía | 0 | 0 | 0 | 7.186 | 100 | 41,20% | 0,00% |
| | Total | 0 | 0 | 0 | 7.304 | 98 | 40,60% | 0,00% |
| TOTAL | 86 | 50 | 29 | 1.118.540 | 98% | 4,00% | 10,30% | |

Tabla 3 bis. Media de diagnósticos y de procedimientos en hospitalización convencional, en residentes en la CAPV, 2012

| Tipo de hospital/Hospital | | Nº altas | Media diagn. | Media proc. no quir. | Altas c/proc quir. | Media proc. quir. |
|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| H. de agudos públicos | Santiago | 10.990 | 4,4 | 1,1 | 4.407 | 1,6 |
| | Txagorritxu | 19.900 | 4,4 | 1,2 | 8.733 | 1,6 |
| | Bidasoa | 4.182 | 4,8 | 1,1 | 1.466 | 1,4 |
| | Alto Deba | 3.896 | 3,6 | 0,6 | 1.679 | 1,2 |
| | Donostia | 42.923 | 5,5 | 1,1 | 19.265 | 1,7 |
| | Zumarraga | 6.738 | 3,3 | 0,7 | 2.947 | 1,1 |
| | Mendaro | 5.319 | 6 | 0,9 | 2.080 | 1,2 |
| | Cruces | 36.480 | 5 | 1,5 | 20.114 | 1,7 |
| | San Eloy | 4.776 | 5,5 | 1,1 | 2.142 | 1,4 |
| | Basurto | 30.466 | 5,1 | 0,9 | 12.173 | 1,5 |
| | Galdakao | 18.410 | 4,6 | 1,5 | 7.048 | 1,6 |
| | Total | 184.080 | 4,9 | 1,2 | 82.054 | 1,6 |
| H. de agudos privados | La Esperanza | 1.040 | 1,2 | 0,4 | 783 | 1,6 |
| | Pol. San José | 1.660 | 2 | 0,2 | 1.296 | 1,7 |
| | V. Pilar | 1.341 | 1,9 | 0,1 | 991 | 1,3 |
| | Onkologikoa | 2.396 | 3,5 | 1 | 1.271 | 1,6 |
| | Mutualia-Pakea | 314 | 1,4 | 0 | 314 | 1,5 |
| | Policl. Gipuzkoa | 6.436 | 4 | 0,7 | 4.893 | 2,1 |
| | Quirón-Donostia | 1.631 | 2 | 0,1 | 1.288 | 1,5 |
| | La Asunción | 3.493 | 3 | 0 | 1.107 | 1,3 |
| | Indautxu | 710 | 1 | 0 | 314 | 1 |
| | Vic. San Sebastián | 8.121 | 3,1 | 0,7 | 5.095 | 1,5 |
| | Virgen Blanca | 4.058 | 1,1 | 0,2 | 2.452 | 1,1 |
| | Cruz Roja-Bilbao | 2.743 | 1 | 0 | 2.702 | 1 |
| | Mutualia-Ercilla | 300 | 2,6 | 0 | 300 | 1,8 |
| | Sanat. Bilbaino | 1.860 | 1,1 | 0 | 1.778 | 1,1 |
| | Guimón | 1.258 | 1 | 0,4 | 614 | 1 |
| | Intermutual | 978 | 1,1 | 0 | 770 | 1 |
| | S. Juan Dios-Santurtzi | 1.628 | 1,5 | 0 | 1.445 | 1,4 |
| | Quirón-Bizkaia | 1.669 | 1,6 | 0,5 | 1.201 | 1,3 |
| | Total | 41.636 | 2,4 | 0,4 | 28.614 | 1,5 |
| H. de m-l estancia públicos | Leza | 441 | 5,3 | 1,7 | . | . |
| | Amara | 867 | 9,6 | 1,5 | 58 | 1,3 |
| | Santa Marina | 4.686 | 9,2 | 1,1 | 4 | 1 |
| | Gorliz | 2.125 | 6,1 | 2,2 | . | . |
| | Total | 8.119 | 8,2 | 1,5 | 62 | 1,3 |
| H. de m-l estancia privados | Clin. Álava | 118 | 1 | 0 | . | . |
| | Matía | 1.141 | 6,3 | 0 | . | . |
| | Total | 1.259 | 5,8 | 0 | . | . |
| TOTAL | 235.094 | 4,6 | 1 | 110.730 | 1,6 | |

Tabla 4. Edad media y estancia media de altas de hospitalización convencional en hospitales de agudos públicos y privados por tipo de hospital, en residentes en la CAPV, 2012

| Tipo de hospital/Hospital | | Nº altas | Edad media | Estancia media |
|---------------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|
| H. públicos de agudos | Santiago | 10.990 | 63,6 | 6,5 |
| | Txagorritxu | 19.900 | 55,2 | 5,9 |
| | Bidasoa | 4.182 | 66,0 | 5,6 |
| | Alto Deba | 3.896 | 55,6 | 5,1 |
| | Donostia | 42.923 | 56,6 | 6,8 |
| | Zumarraga | 6.738 | 56,0 | 4,9 |
| | Mendaro | 5.319 | 63,2 | 5,9 |
| | Cruces | 36.480 | 50,9 | 6,9 |
| | San Eloy | 4.776 | 68,3 | 6,3 |
| | Basurto | 30.466 | 58,6 | 6,1 |
| | Galdakao | 18.410 | 64,4 | 5,5 |
| | Total | 184.080 | 57,5 | 6,3 |
| H. privados de agudos | La Esperanza | 1.040 | 48,2 | 2,1 |
| | Pol. San José | 1.660 | 55,7 | 3,5 |
| | V. Pilar | 1.341 | 52,0 | 3,1 |
| | Onkologikoa | 2.396 | 60,7 | 5,9 |
| | Mutualia-Pakea | 314 | 49,2 | 2,8 |
| | Policl. Gipuzkoa | 6.436 | 55,7 | 3,6 |
| | Quirón-Donostia | 1.631 | 45,1 | 2,1 |
| | La Asunción | 3.493 | 66,4 | 6,4 |
| | Indautxu | 710 | 53,7 | 6,9 |
| | Vic. San Sebastián | 8.121 | 58,7 | 4,5 |
| | Virgen Blanca | 4.058 | 61,6 | 4,1 |
| | Cruz Roja-Bilbao | 2.743 | 57,9 | 2,2 |
| | Mutualia-Ercilla | 300 | 45,5 | 3,5 |
| | Sanat. Bilbaino | 1.860 | 53,5 | 2,2 |
| | Guimón | 1.258 | 59,5 | 2,8 |
| | Intermutual | 978 | 43,5 | 3,4 |
| | S. Juan Dios-Santurtzi | 1.628 | 54,4 | 4,8 |
| | Quirón-Bizkaia | 1.669 | 38,6 | 2,9 |
| Total | 41.636 | 56,3 | 3,9 | |
| TOTAL | 225.716 | 57,3 | 5,9 | |

Figura 2. Tipo de ingreso en los casos de hospitalización convencional en los hospitales de agudos públicos y privados, en residentes en la CAPV, 2012




Tabla 5. Tipo de alta en los casos de hospitalización convencional en los hospitales de agudos públicos y privados, en residentes en la CAPV, 2012.

| Tipo de alta | H. públicos de agudos | | H. priv. de agudos | |
|---|-----------------------|------------|--------------------|------------|
| | n | % | n | % |
| A domicilio o a hospitaliz. a domicilio | 170.667 | 92,7 | 40.051 | 96,2 |
| Fallecimiento | 6.398 | 3,5 | 913 | 2,2 |
| Traslado a otro hospital | 5.151 | 2,8 | 447 | 1,1 |
| Otras causas | 818 | 0,4 | 122 | 0,3 |
| Residencia social | 560 | 0,3 | 16 | 0,0 |
| Altas voluntarias | 486 | 0,3 | 87 | 0,2 |
| Total | 184.080 | 100 | 41.636 | 100 |

6. Servicio de alta en los casos de hospitalización convencional en los hospitales de agudos públicos y privados en residentes en la CAPV, 2012.

| Servicio de alta | Total | | H. públicos de agudos | | H. privados. de agudos | |
|-------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| | n | % | n | % | n | % |
| Medicina interna | 31.586 | 14,0 | 26.659 | 14,5 | 4.927 | 11,8 |
| Obstetricia y ginecología | 29.241 | 13,0 | 24.993 | 13,6 | 4.248 | 10,2 |
| Cirugía general y del ap. digestivo | 28.662 | 12,7 | 20.807 | 11,3 | 7.855 | 18,9 |
| Traumatología | 28.163 | 12,5 | 17.913 | 9,7 | 10.250 | 24,6 |
| Cardiología | 16.365 | 7,3 | 14.185 | 7,7 | 2.180 | 5,2 |
| Urología | 11.901 | 5,3 | 9.216 | 5,0 | 2.685 | 6,4 |
| Neumología | 11.636 | 5,2 | 11.360 | 6,2 | 276 | 0,7 |
| Digestivo | 10.107 | 4,5 | 10.028 | 5,4 | 79 | 0,2 |
| Pediatría y neonatología | 7.882 | 3,5 | 7.675 | 4,2 | 207 | 0,5 |
| Neurología | 6.963 | 3,1 | 6.702 | 3,6 | 261 | 0,6 |
| ORL | 5.954 | 2,6 | 4.348 | 2,4 | 1.606 | 3,9 |
| Oncología médica | 5.732 | 2,5 | 4.587 | 2,5 | 1.145 | 2,8 |
| Cirugía vascular y angiología | 4.518 | 2,0 | 3.861 | 2,1 | 657 | 1,6 |
| Psiquiatría | 4.494 | 2,0 | 4.412 | 2,4 | 82 | 0,2 |
| Otros | 3.417 | 1,5 | 2.580 | 1,4 | 837 | 2,0 |
| Cirugía plástica | 3.283 | 1,5 | 1.537 | 0,8 | 1.746 | 4,2 |
| Neurocirugía | 3.210 | 1,4 | 3.001 | 1,6 | 209 | 0,5 |
| Hematología clín. | 2.255 | 1,0 | 2.237 | 1,2 | 18 | 0,0 |
| Nefrología | 1.949 | 0,9 | 1.810 | 1,0 | 139 | 0,3 |
| Cirugía torácica | 1.311 | 0,6 | 1.122 | 0,6 | 189 | 0,5 |
| Cirugía pediátrica | 1.243 | 0,6 | 1.187 | 0,6 | 56 | 0,1 |
| Cirugía cardíaca | 1.218 | 0,5 | 724 | 0,4 | 494 | 1,2 |
| Cirugía máxilo-facial | 1.135 | 0,5 | 981 | 0,5 | 154 | 0,4 |
| Endocrinología | 850 | 0,4 | 728 | 0,4 | 122 | 0,3 |
| Reumatología | 671 | 0,3 | 671 | 0,4 | 0 | 0 |
| Oncología radioterápica | 557 | 0,2 | 302 | 0,2 | 255 | 0,6 |
| Oftalmología | 531 | 0,2 | 371 | 0,2 | 160 | 0,4 |
| Rehabilitación | 395 | 0,2 | 58 | 0,0 | 337 | 0,8 |
| Desconocido | 318 | 0,1 | 0 | 0 | 318 | 0,8 |
| Neurofisiología | 132 | 0,1 | 0 | 0 | 132 | 0,3 |
| Dermatología | 37 | 0,0 | 25 | 0,0 | 12 | 0,0 |
| Total | 225.716 | 100 | 184.080 | 100 | 41.636 | 100 |

Tabla 7. Altas de hospitalización convencional en hospitales de agudos públicos y privados, por grupo de edad y sexo, en residentes en la CAPV, 2012

| Grupo de edad | Total | | Hombres | | Mujeres | |
|---------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | nº | % | nº | % | nº | % |
| 0-14 | 11.593 | 5,1 | 6.826 | 6,1 | 4.767 | 4,2 |
| 15-29 | 14.785 | 6,6 | 5.712 | 5,1 | 9.073 | 8,0 |
| 30-49 | 52.426 | 23,2 | 18.672 | 16,7 | 33.753 | 29,6 |
| 50-64 | 44.923 | 19,9 | 26.714 | 23,9 | 18.209 | 16,0 |
| 65-79 | 59.881 | 26,5 | 34.955 | 31,3 | 24.926 | 21,9 |
| >=80 | 42.058 | 18,6 | 18.723 | 16,8 | 23.335 | 20,5 |
| Total | 225.669 | 100 | 111.605 | 100 | 114.063 | 100 |

Figura 3. Tasas de hospitalización convencional por 1.000 habitantes en hospitales públicos y privados de agudos, por grupos de edad y sexo en residentes en la CAPV, 2011




Tabla 8a. Indicadores de hospitalización convencional en los hospitales públicos de agudos por territorio histórico y sexo, en residentes en la CAPV, 2012

| Territorio Histórico | Total | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|----------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | nº de altas | Altas/persona | Tasa* | nº de altas | Altas/persona | Tasa* | nº de altas | Altas/persona | Tasa* |
| Araba-Álava | 32.368 | 1,28 | 99,8 | 16.138 | 1,35 | 99,9 | 16.230 | 1,22 | 99,7 |
| Bizkaia | 88.854 | 1,26 | 76,8 | 43.863 | 1,33 | 78,4 | 44.991 | 1,2 | 75,3 |
| Gipuzkoa | 62.858 | 1,27 | 88,7 | 30.673 | 1,32 | 88,2 | 32.185 | 1,22 | 89,1 |
| CAPV | 184.080 | 1,27 | 84,1 | 90.674 | 1,33 | 84,9 | 93.406 | 1,21 | 83,3 |

* Tasa de utilización (nº de altas) por 1.000 habitantes

Tabla 8b. Indicadores de hospitalización convencional en los hospitales privados de agudos por territorio histórico y sexo, en residentes en la CAPV, 2012

| Territorio Histórico | Total | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | nº de altas | Altas/persona | Tasa* | nº de altas | Altas/persona | Tasa* | nº de altas | Altas/persona | Tasa* |
| Araba-Álava | 3.322 | 1,1 | 10,2 | 1.901 | 1,11 | 11,8 | 1.421 | 1,09 | 8,7 |
| Bizkaia | 22.437 | 1,12 | 19,4 | 10.799 | 1,13 | 19,3 | 11.638 | 1,1 | 19,5 |
| Gipuzkoa | 15.876 | 1,19 | 22,4 | 8.263 | 1,22 | 23,8 | 7.613 | 1,16 | 21,1 |
| CAPV | 41.635 | 1,14 | 19 | 20.963 | 1,16 | 19,6 | 20.672 | 1,12 | 18,4 |

* Tasa de utilización (nº de altas) por 1.000 habitantes

Tabla 9. Altas de hospitalización convencional en los hospitales de agudos públicos y privados, por grupo diagnóstico y territorio histórico, en residentes en la CAPV. Hombres 2.012.

| CIE-9-MC Grupo diagnóstico | Araba-Álava | | Bizkaia | | Gipuzkoa | |
|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | n | % | n | % | n | % |
| Enf. infecciosas y parasitarias | 362 | 2 | 1.069 | 2 | 883 | 2,3 |
| Neoplasias | 1.692 | 9,4 | 6.554 | 12 | 4.168 | 10,7 |
| Enf. endocr., metaból. e inmunit. | 248 | 1,4 | 739 | 1,4 | 633 | 1,6 |
| Enf. de la sangre y órg. hematopoy. | 228 | 1,3 | 650 | 1,2 | 457 | 1,2 |
| Trastornos mentales | 429 | 2,4 | 1.432 | 2,6 | 780 | 2 |
| Enf. sist. nervioso y órg. sensor. | 492 | 2,7 | 1.660 | 3 | 1.054 | 2,7 |
| Enf. aparato circulatorio | 2.831 | 15,7 | 9.032 | 16,5 | 6.326 | 16,2 |
| Enf. aparato respiratorio | 2.583 | 14,3 | 6.254 | 11,4 | 5.433 | 14 |
| Enf. aparato digestivo | 2.632 | 14,6 | 9.092 | 16,6 | 5.441 | 14 |
| Enf. aparato genitourinario | 1.090 | 6 | 3.149 | 5,8 | 2.449 | 6,3 |
| Enf. de la piel y de los tejidos subc. | 208 | 1,2 | 717 | 1,3 | 507 | 1,3 |
| Enf. apar. músculo-esquelét. y tej. conectivos | 1.516 | 8,4 | 4.090 | 7,5 | 3.822 | 9,8 |
| Anomalías congénitas | 139 | 0,8 | 414 | 0,8 | 186 | 0,5 |
| Patología perinatal | 197 | 1,1 | 618 | 1,1 | 465 | 1,2 |
| Síntomas, signos y estados mal definidos | 1.336 | 7,4 | 3.147 | 5,8 | 2.170 | 5,6 |
| Lesiones y envenenamientos | 1.608 | 8,9 | 4.920 | 9 | 3.288 | 8,4 |
| Código V | 444 | 2,5 | 1.111 | 2 | 872 | 2,2 |
| Sin codificar | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 18.039 | 100 | 54.661 | 100 | 38.936 | 100 |

Figura 4. Grupos diagnósticos más frecuentes en Hospitalización convencional en los hospitales públicos y privados de agudos, en residentes en la CAPV, según territorio histórico. Hombres 2012




Tabla 10. Altas de hospitalización convencional en los hospitales de agudos públicos y privados, por grupo diagnóstico y territorio histórico, en residentes en la CAPV. Mujeres 2.012.

| CIE-9-MC Grupo diagnóstico | Araba-Álava | | Bizkaia | | Gipuzkoa | |
|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | nº | % | nº | % | nº | % |
| Enf. infecciosas y parasitarias | 218 | 1,2 | 870 | 1,5 | 603 | 1,5 |
| Neoplasias | 1.387 | 7,9 | 5.391 | 9,5 | 3.396 | 8,5 |
| Enf. endocr., metaból. e inmunit. | 313 | 1,8 | 1.023 | 1,8 | 853 | 2,1 |
| Enf. de la sangre y órg. hematopoy. | 209 | 1,2 | 711 | 1,3 | 468 | 1,2 |
| Trastornos mentales | 429 | 2,4 | 1.085 | 1,9 | 604 | 1,5 |
| Enf. sist. nervioso y órg. sensor. | 461 | 2,6 | 1.572 | 2,8 | 936 | 2,4 |
| Enf. aparato circulatorio | 2.055 | 11,6 | 6.287 | 11,1 | 4.738 | 11,9 |
| Enf. aparato respiratorio | 1.706 | 9,7 | 4.406 | 7,8 | 3.987 | 10 |
| Enf. aparato digestivo | 1.849 | 10,5 | 6.727 | 11,9 | 3.999 | 10 |
| Enf. aparato genitourinario | 1.046 | 5,9 | 3.510 | 6,2 | 2.502 | 6,3 |
| Complic. gestación, parto y puerperio | 3.356 | 19 | 11.124 | 19,6 | 7.786 | 19,6 |
| Enf. de la piel y de los tejidos subc. | 153 | 0,9 | 510 | 0,9 | 388 | 1 |
| Enf. apar. músculo-esquelét. y tej. conectivos | 1.463 | 8,3 | 4.367 | 7,7 | 3.586 | 9 |
| Anomalías congénitas | 116 | 0,7 | 303 | 0,5 | 184 | 0,5 |
| Patología perinatal | 156 | 0,9 | 428 | 0,8 | 398 | 1 |
| Síntomas, signos y estados mal definidos | 987 | 5,6 | 2.516 | 4,4 | 1.647 | 4,1 |
| Lesiones y envenenamientos | 1.431 | 8,1 | 4.613 | 8,1 | 2.869 | 7,2 |
| Código V | 315 | 1,8 | 1.181 | 2,1 | 849 | 2,1 |
| Sin codificar | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Total | 17.651 | 100 | 56.628 | 100 | 39.798 | 100 |

Figura 5. Grupos diagnósticos más frecuentes en Hospitalización convencional en los hospitales públicos y privados de agudos, en residentes en la CAPV, según territorio histórico. Mujeres 2012




Tabla 11. Diagnósticos principales más frecuentes (por categorías diagnósticas a 3 dígitos), edad media y estancia media en hospitalización convencional en los hospitales de agudos de Osakidetza en residentes en la CAPV, 2012

| CIE-9-MC Diagnóstico principal | Total | | | | Hombres | | | | Mujeres | | | |
|---|----------|-----|------------|----------------|----------|-----|------------|----------------|----------|-----|------------|----------------|
| | Nº altas | % | Edad media | Estancia media | Nº altas | % | Edad media | Estancia media | Nº altas | % | Edad media | Estancia media |
| 428. Insuficiencia cardiaca | 4.826 | 2,6 | 78,7 | 7,4 | 2.547 | 2,8 | 76,4 | 7,7 | 2.279 | 2,4 | 81,3 | 7 |
| 574. Colelitiasis | 4.004 | 2,2 | 63,3 | 5,2 | 1.726 | 1,9 | 65,6 | 5,6 | 2.278 | 2,4 | 61,6 | 4,8 |
| 486. Neumonía organismo sin especificar | 3.507 | 1,9 | 66,5 | 6,6 | 2.102 | 2,3 | 66,2 | 6,6 | 1.405 | 1,5 | 66,8 | 6,6 |
| 780. Síntomas generales | 3.326 | 1,8 | 61,2 | 4,7 | 2.016 | 2,2 | 59,9 | 4,6 | 1.310 | 1,4 | 63,1 | 4,9 |
| 715. Osteoartrosis/enf afines | 3.245 | 1,8 | 68,9 | 7,4 | 1.427 | 1,6 | 66,8 | 7,3 | 1.818 | 1,9 | 70,6 | 7,5 |
| 427. Disrritmias cardiacas | 3.036 | 1,6 | 71,5 | 5,1 | 1.713 | 1,9 | 69,1 | 5,1 | 1.323 | 1,4 | 74,6 | 5,1 |
| 645. Embarazo cronologicamente avanzado | 2.941 | 1,6 | 32,3 | 2,5 | . | . | . | . | 2.941 | 3,1 | 32,3 | 2,5 |
| 491. Bronquitis crónica | 2.865 | 1,6 | 73,5 | 6,4 | 2.314 | 2,6 | 73,9 | 6,4 | 551 | 0,6 | 71,6 | 6,3 |
| 786. Síntomas del aparato respiratorio y otros síntomas torácicos | 2.774 | 1,5 | 61,1 | 3,8 | 1.661 | 1,8 | 59,7 | 3,8 | 1.113 | 1,2 | 63,3 | 3,7 |
| 519. Otras enfermedades del aparato respiratorio | 2.644 | 1,4 | 73,7 | 6,2 | 1.345 | 1,5 | 70,8 | 6,2 | 1.299 | 1,4 | 76,8 | 6,3 |
| 599. Otras alteraciones de uretra y vías urinarias | 2.628 | 1,4 | 66,5 | 5,8 | 1.456 | 1,6 | 64,4 | 5,7 | 1.172 | 1,3 | 69,1 | 5,9 |
| 434. Oclusión de arterias cerebrales | 2.609 | 1,4 | 74,9 | 7,4 | 1.397 | 1,5 | 71,7 | 7,3 | 1.212 | 1,3 | 78,6 | 7,6 |
| 996. Complicaciones propias de ciertos procedimientos especificad | 2.369 | 1,3 | 64,9 | 10,2 | 1.317 | 1,5 | 64,1 | 9,9 | 1.052 | 1,1 | 66 | 10,6 |
| 518. Otras enfermedades pulmonares | 2.302 | 1,3 | 72 | 7,1 | 1.177 | 1,3 | 68,7 | 7,2 | 1.125 | 1,2 | 75,4 | 7,1 |
| 550. Hernia inguinal | 2.234 | 1,2 | 63,5 | 1,5 | 2.004 | 2,2 | 63,3 | 1,5 | 230 | 0,2 | 65,2 | 1,8 |
| 820. Fractura del cuello de fémur | 2.159 | 1,2 | 81,9 | 11 | 533 | 0,6 | 77,3 | 11,2 | 1.626 | 1,7 | 83,4 | 10,9 |
| 540. Apendicitis aguda | 2.127 | 1,2 | 32,6 | 3,8 | 1.211 | 1,3 | 30,9 | 3,8 | 916 | 1 | 34,9 | 3,8 |
| 659. Otras indicaciones de asistencia al parto ncoc | 1.965 | 1,1 | 35,2 | 2,9 | . | . | . | . | 1.965 | 2,1 | 35,2 | 2,9 |
| 410. Infarto agudo miocardio | 1.864 | 1 | 67,6 | 8 | 1.366 | 1,5 | 64,8 | 8 | 498 | 0,5 | 75,1 | 7,9 |
| 658. Otras alteraciones de la cavidad y membranas amnióticas | 1.863 | 1 | 32,6 | 3 | . | . | . | . | 1.863 | 2 | 32,6 | 3 |
| 466. Bronquitis y bronquiolitis agudas | 1.792 | 1 | 52,2 | 5,6 | 882 | 1 | 46 | 5,5 | 910 | 1 | 58,2 | 5,8 |
| 656. Otros problemas fetales y de placenta conocidos o sospechados que afectan al tratamiento de la madre | 1.731 | 0,9 | 32,8 | 2,9 | . | . | . | . | 1.731 | 1,9 | 32,8 | 2,9 |
| 188. Neoplasia maligna de la vejiga | 1.711 | 0,9 | 70,8 | 6 | 1.400 | 1,5 | 70,7 | 6,1 | 311 | 0,3 | 71,1 | 5,6 |
| 414. Otras formas de enferm. Cardiacas isquémicas crónicas | 1.711 | 0,9 | 67,5 | 6,3 | 1.315 | 1,5 | 66,3 | 6,4 | 396 | 0,4 | 71,2 | 6,3 |
| 664. Trauma de perineo y vulva durante alumbramiento | 1.672 | 0,9 | 32,2 | 2,4 | . | . | . | . | 1.672 | 1,8 | 32,2 | 2,4 |

Tabla 12. Diagnósticos principales más frecuentes (por categoría diagnóstica a 3 dígitos, edad media y estancia media en hospitalización convencional en los hospitales de agudos privados en residentes en la CAPV, 2012

| CIE-9-MC Diagnóstico principal | Total | | | | Hombres | | | | Mujeres | | | |
|---|----------|-----|------------|----------------|----------|-----|------------|----------------|----------|-----|------------|----------------|
| | Nº altas | % | Edad media | Estancia media | Nº altas | % | Edad media | Estancia media | Nº altas | % | Edad media | Estancia media |
| 717. Trastorno interno rodilla | 2.188 | 5,3 | 44,9 | 1,2 | 1.524 | 7,3 | 43,2 | 1,2 | 664 | 3,2 | 48,6 | 1,2 |
| 715. Osteoartrosis/enf afines | 2.017 | 4,8 | 69,2 | 6,8 | 861 | 4,1 | 66,5 | 6,7 | 1.156 | 5,6 | 71,3 | 6,8 |
| 550. Hernia inguinal | 1.764 | 4,2 | 59,8 | 1,3 | 1.560 | 7,4 | 59,7 | 1,3 | 204 | 1 | 60,6 | 1,2 |
| 574. Colelitiasis | 1.043 | 2,5 | 58 | 3,3 | 396 | 1,9 | 60,6 | 4,2 | 647 | 3,1 | 56,3 | 2,8 |
| 553. Otra hernia abdominal sin mención de obstr. Ni gangrena | 758 | 1,8 | 56,5 | 2,6 | 426 | 2 | 55,8 | 2,4 | 332 | 1,6 | 57,3 | 2,7 |
| 735. Deformación adquirida de dedo gordo del pie | 725 | 1,7 | 61,4 | 1,1 | 93 | 0,4 | 59,5 | 1,1 | 632 | 3,1 | 61,7 | 1,1 |
| 414. Otras formas de enferm. Cardiacas isquémicas crónicas | 695 | 1,7 | 67,7 | 2,6 | 558 | 2,7 | 66,6 | 2,5 | 137 | 0,7 | 72,3 | 2,9 |
| 780. Síntomas generales | 599 | 1,4 | 60,4 | 2,6 | 336 | 1,6 | 59,2 | 2,7 | 263 | 1,3 | 62 | 2,6 |
| 454. Venas varicosas de las extremidades inferiores | 573 | 1,4 | 51,5 | 1,2 | 208 | 1 | 49,2 | 1,1 | 365 | 1,8 | 52,8 | 1,2 |
| v58. Otros cuidados posteriores y atención posterior neom | 500 | 1,2 | 57 | 2,4 | 285 | 1,4 | 57,5 | 2,3 | 215 | 1 | 56,3 | 2,4 |
| 470. Tabique nasal desviado | 498 | 1,2 | 39,1 | 1,2 | 327 | 1,6 | 39,2 | 1,2 | 171 | 0,8 | 39 | 1,2 |
| 427. Disrritmias cardiacas | 497 | 1,2 | 69,6 | 3 | 285 | 1,4 | 67,4 | 2,6 | 212 | 1 | 72,6 | 3,6 |
| 428. Insuficiencia cardiaca | 495 | 1,2 | 79,4 | 6,7 | 250 | 1,2 | 76,7 | 6,6 | 245 | 1,2 | 82,1 | 6,9 |
| 726. Tendinitis intersecciones periféricas y síndromes conexos | 491 | 1,2 | 52,3 | 1,3 | 274 | 1,3 | 49,8 | 1,5 | 217 | 1,1 | 55,5 | 1,1 |
| 836. Luxación de rodilla | 478 | 1,1 | 48,6 | 1,4 | 303 | 1,4 | 47,1 | 1,5 | 175 | 0,8 | 51,1 | 1,1 |
| 996. Complicaciones propias de ciertos procedimientos especificad | 471 | 1,1 | 59,9 | 4,1 | 215 | 1 | 64,7 | 5,3 | 256 | 1,2 | 55,9 | 3 |
| 185. Neoplasia maligna próstata | 458 | 1,1 | 68,8 | 4,9 | 458 | 2,2 | 68,8 | 4,9 | . | . | . | . |
| 611. Otras alteraciones mamarias | 454 | 1,1 | 37,4 | 1,4 | 21 | 0,1 | 36,3 | 1,4 | 433 | 2,1 | 37,4 | 1,4 |
| 650. Parto en un caso totalmente normal | 449 | 1,1 | 34,1 | 2,7 | . | . | . | . | 449 | 2,2 | 34,1 | 2,7 |
| 174. Neoplasia maligna mama mujer | 428 | 1 | 59,5 | 4,9 | . | . | . | . | 428 | 2,1 | 59,5 | 4,9 |
| 600. Hiperplasia prostática | 414 | 1 | 68,6 | 3,7 | 408 | 1,9 | 68,7 | 3,7 | 6 | 0 | 61,7 | 2,7 |
| 727. Otros trastornos de sinovia tendón y bursa | 396 | 1 | 53,4 | 1,3 | 201 | 1 | 50,7 | 1,3 | 195 | 0,9 | 56,3 | 1,3 |
| 455. Hemorroides | 362 | 0,9 | 50,9 | 1,3 | 197 | 0,9 | 50,4 | 1,3 | 165 | 0,8 | 51,5 | 1,4 |
| 218. Leiomioma uterino | 358 | 0,9 | 48,3 | 4,2 | . | . | . | . | 358 | 1,7 | 48,3 | 4,2 |
| 474. Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides | 353 | 0,8 | 12,8 | 1 | 182 | 0,9 | 11,3 | 1 | 171 | 0,8 | 14,3 | 1,1 |

Tabla 13. Diagnósticos principales más frecuentes (por categorías diagnósticas a 3 dígitos), edad media y estancia media en hospitalización convencional en los hospitales públicos y privados de agudos por servicios en residentes en la CAPV, 2012

| CIE-9-MC Diagnóstico principal | Nº altas | % | Edad media | Estancia media |
|---|----------|------|------------|----------------|
| MEDICINA INTERNA | | | | |
| 428. Insuficiencia cardiaca | 2.178 | 6,9 | 81 | 7 |
| 486. Neumonía organismo sin especificar | 1.834 | 5,8 | 75,5 | 7,1 |
| 519. Otras enfermedades del aparato respiratorio | 1.765 | 5,6 | 78,9 | 6,3 |
| 599. Otras alteraciones de uretra y vías urinarias | 1.439 | 4,6 | 77,7 | 6,4 |
| 780. Síntomas generales | 1.265 | 4 | 71,6 | 5,7 |
| OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | | | | |
| 645. Embarazo cronológicamente avanzado | 2.998 | 10,3 | 32,3 | 2,5 |
| 659. Otras indicaciones de asistencia al parto ncoc | 2.186 | 7,5 | 35,4 | 2,9 |
| 658. Otras alteraciones de la cavidad y membranas amnióticas | 2.100 | 7,2 | 32,8 | 3,1 |
| 650. Parto en un caso totalmente normal | 1.936 | 6,6 | 31,9 | 2,5 |
| 664. Trauma de perineo y vulva durante alumbramiento | 1.896 | 6,5 | 32,4 | 2,5 |
| TRAUMATOLOGIA | | | | |
| 715. Osteoartrosis/enf afines | 5.227 | 18,6 | 69 | 7,2 |
| 717. Trastorno interno rodilla | 3.619 | 12,9 | 46,4 | 1,2 |
| 820. Fractura del cuello de fémur | 2.432 | 8,6 | 81,3 | 10,3 |
| 735. Deformación adquirida de dedo gordo del pie | 1.546 | 5,5 | 61,4 | 1,2 |
| 996. Complicaciones propias de ciertos procedimientos especificad | 1.154 | 4,1 | 67,3 | 12,2 |
| CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO | | | | |
| 574. Colelitiasis | 4.156 | 14,5 | 60,2 | 4,2 |
| 550. Hernia inguinal | 3.931 | 13,7 | 62,3 | 1,4 |
| 553. Otra hernia abdominal sin mención de obstr. Ni gangrena | 2.191 | 7,6 | 59 | 3,2 |
| 540. Apendicitis aguda | 2.035 | 7,1 | 37 | 3,6 |
| 153. Neoplasia maligna colon | 1.314 | 4,6 | 69,6 | 11,6 |
| CARDIOLOGIA | | | | |
| 428. Insuficiencia cardiaca | 2.628 | 16,1 | 77,5 | 7,3 |
| 427. Disrritmias cardiacas | 2.476 | 15,1 | 70,4 | 4,6 |
| 786. Síntomas del aparato respiratorio y otros síntomas torácicos | 1.981 | 12,1 | 66,2 | 3,7 |
| 414. Otras formas de enferm. Cardiacas isquémicas crónicas | 1.956 | 12 | 67,3 | 4,2 |
| 410. Infarto agudo miocardio | 1.676 | 10,2 | 67 | 7,7 |
| NEUMOLOGIA | | | | |
| 491. Bronquitis crónica | 1.701 | 14,6 | 71,9 | 5,8 |
| 486. Neumonía organismo sin especificar | 1.333 | 11,5 | 69,2 | 5,9 |
| 518. Otras enfermedades pulmonares | 1.122 | 9,6 | 73,3 | 6,4 |
| 493. Asma | 1.017 | 8,7 | 60,8 | 5,1 |
| 780. Síntomas generales | 587 | 5 | 59,2 | 1,7 |

| UROLOGIA | | | | |
|--|-------|------|------|-----|
| 188. Neoplasia maligna de la vejiga | 1.929 | 16,2 | 70,3 | 5,3 |
| 600. Hiperplasia prostática | 1.343 | 11,3 | 69,6 | 4,8 |
| 592. Calculo de riñón y uréter | 1.294 | 10,9 | 53,4 | 3,6 |
| 185. Neoplasia maligna próstata | 1.102 | 9,3 | 67,2 | 5,4 |
| 599. Otras alteraciones de uretra y vías urinarias | 917 | 7,7 | 68,8 | 4,7 |

| DIGESTIVO | | | | |
|--|-----|-----|------|------|
| 577. Enfermedades pancreáticas | 713 | 7,1 | 61,4 | 9,6 |
| 574. Colelitiasis | 707 | 7 | 71 | 7,6 |
| 571. Enfermedad hepática y cirrosis crónica | 570 | 5,6 | 59,9 | 11,1 |
| 789. Otros síntomas que implican al abdomen y pelvis | 530 | 5,2 | 56,3 | 5,5 |
| 578. Hemorragia gastrointestinal | 527 | 5,2 | 71,2 | 6,9 |

| PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA | | | | |
|--|-----|-----|-----|------|
| 765. Trastornos relacionados con gestación acortada y bajo peso en el nacimiento | 685 | 8,7 | 0 | 20,8 |
| 466. Bronquitis y bronquiolitis agudas | 584 | 7,4 | 0,3 | 4,9 |
| 774. Otras ictericias perinatal | 386 | 4,9 | 0 | 2,7 |
| 780. Síntomas generales | 373 | 4,7 | 2,8 | 2,8 |
| 493. Asma | 354 | 4,5 | 3,9 | 3,4 |

| NEUROLOGIA | | | | |
|--|-------|------|------|-----|
| 434. Oclusión de arterias cerebrales | 2.173 | 31,2 | 74,5 | 7,1 |
| 345. Epilepsia y crisis recurrentes | 564 | 8,1 | 55,8 | 4,9 |
| 435. Isquemia cerebral transitoria | 523 | 7,5 | 72,9 | 3,9 |
| 780. Síntomas generales | 360 | 5,2 | 66,2 | 4,5 |
| 433. Oclusión y estenosis arterias precerebrales | 270 | 3,9 | 73,4 | 6,4 |

| ONCOLOGIA MEDICA | | | | |
|---|-----|------|------|------|
| v58. Otros cuidados posteriores y atención posterior neom | 610 | 10,6 | 55,9 | 3,2 |
| 197. Neoplasia maligna sec. Aparato respiratorio y digestivo | 441 | 7,7 | 64,9 | 9,6 |
| 162. Neoplasia maligna tráquea, bronquios y pulmón | 421 | 7,3 | 63,6 | 10,3 |
| 288. Enfermedades de glóbulos blancos | 326 | 5,7 | 57,9 | 5,7 |
| 198. Neoplasia maligna secundaria de otros sitios especificados | 294 | 5,1 | 61,9 | 10,5 |

| ORL | | | | |
|--|-------|------|------|-----|
| 474. Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides | 1.299 | 21,8 | 12 | 1,1 |
| 470. Tabique nasal desviado | 807 | 13,6 | 40,2 | 1,4 |
| 475. Absceso peritonsilar | 427 | 7,2 | 35,3 | 2,7 |
| 478. Otras enferm. De tracto respiratorio superior | 414 | 7 | 50,3 | 2,4 |
| 471. Pólipos nasales | 328 | 5,5 | 49,4 | 1,4 |

| PSIQUIATRIA | | | | |
|--|-----|------|------|------|
| 295. Trastornos esquizofrénicos | 914 | 20,4 | 41,5 | 18,6 |
| 296. Trastornos episódicos del humor | 756 | 16,9 | 50,4 | 21,6 |
| 301. Trastornos de personalidad | 314 | 7 | 37,7 | 11,4 |
| 298. Otras psicosis no orgánicas | 286 | 6,4 | 36,4 | 17 |
| 303. Síndrome de dependencia del alcohol | 286 | 6,4 | 47,6 | 11,8 |

| CIRUGIA VASCULAR | | | | |
|---|-------|------|------|------|
| 454. Venas varicosas de las extremidades inferiores | 1.254 | 27,8 | 50,9 | 1,2 |
| 440. Ateroesclerosis | 1.165 | 25,8 | 72 | 10,4 |
| 453. Otra embolia o trombosis venosa | 314 | 6,9 | 66,7 | 3,8 |
| 441. Aneurisma aórtico y disección | 271 | 6 | 71,9 | 9,1 |
| 444. Embolia y trombosis arteriales | 213 | 4,7 | 74,9 | 7,4 |

servicio=Cirugía plástica

| CIRUGIA PLASTICA | | | | |
|---|-----|------|------|-----|
| 611. Otras alteraciones mamarias | 577 | 17,6 | 37 | 1,7 |
| v51. Convalecencia de cirugía plástica | 349 | 10,6 | 50,5 | 4,2 |
| 173. Otras neoplasias malignas de la piel | 250 | 7,6 | 75,2 | 2,3 |
| 996. Complicaciones propias de ciertos procedimientos especificad | 197 | 6 | 47,5 | 2,2 |
| 802. Fractura de huesos faciales | 123 | 3,7 | 33,5 | 2,1 |

| NEUROCIRUGIA | | | | |
|--|-----|------|------|------|
| 722. Trastorno del disco intervertebral | 456 | 14,2 | 48,6 | 5,4 |
| 852. Hemorragia subaracnoidea/subdural/extradural, tras lesión | 237 | 7,4 | 73,2 | 10 |
| 191. Neoplasia maligna cerebro | 225 | 7 | 59,9 | 10,3 |
| 850. Contusión (incluye conmoción cerebral) | 191 | 6 | 63,3 | 1,8 |
| 431. Hemorragia intracerebral | 182 | 5,7 | 68,9 | 12,9 |

| HEMATOLOGIA CLINICA | | | | |
|--|-----|-----|------|------|
| v58. Otros cuidados posteriores y atención posterior neom | 428 | 19 | 55,2 | 9,2 |
| 288. Enfermedades de glóbulos blancos | 156 | 6,9 | 60,8 | 8,7 |
| 202. Otras neoplasias malignas tejidos linfoides e histiociticos | 156 | 6,9 | 62,5 | 16,4 |
| 205. Leucemia mieloide | 139 | 6,2 | 62,3 | 24 |
| 203. Neoplasia inmunoproliferativas y mieloma múltiple | 118 | 5,2 | 66,2 | 16,7 |

| NEFROLOGIA | | | | |
|---|-----|------|------|------|
| 584. Insuficiencia renal aguda | 356 | 18,3 | 72,5 | 8,3 |
| 585. Nefropatía crónica | 170 | 8,7 | 62,2 | 4,6 |
| 996. Complicaciones propias de ciertos procedimientos especificad | 166 | 8,5 | 62,4 | 7,6 |
| 403. Enfermedad del riñón hipertensiva crónica | 136 | 7 | 57,7 | 14,2 |
| 428. Insuficiencia cardiaca | 71 | 3,6 | 69,8 | 10,5 |

| CIRUGIA CARDIACA | | | | |
|---|-----|------|------|------|
| 424. Otras enfermedades de endocardio | 431 | 35,4 | 69,1 | 11,8 |
| 414. Otras formas de enferm. Cardiacas isquémicas crónicas | 204 | 16,8 | 65,5 | 13,5 |
| 996. Complicaciones propias de ciertos procedimientos especificad | 63 | 5,2 | 68,4 | 11,7 |
| 396. Enfermedades de la válvula mitral y aortica | 57 | 4,7 | 70,1 | 13,4 |
| 423. Otras enfermedades del pericardio | 54 | 4,4 | 61,8 | 4,9 |

| CIRUGIA TORACICA | | | | |
|--|-----|------|------|------|
| 162. Neoplasia maligna tráquea, bronquios y pulmón | 269 | 20,5 | 63,3 | 10,4 |
| 512. Neumotórax | 245 | 18,7 | 39,4 | 6 |
| 807. Fractura de costilla(s), esternón, laringe y tráquea | 144 | 11 | 66,5 | 4,6 |
| 197. Neoplasia maligna sec. Aparato respiratorio y digestivo | 133 | 10,1 | 64,3 | 6,1 |
| 511. Pleuresía | 65 | 5 | 60,3 | 6,2 |

Tabla 14. Primer procedimiento quirúrgico más frecuente (por categoría CCS), edad media y estancia media en hospitalización convencional en los hospitales de agudos de Osakidetza en residentes en la CAPV, 2012

| Categoría CCS del primer procedimiento quirúrgico | Total | | | | Hombres | | | | Mujeres | | | |
|--|----------|------|------------|----------------|----------|-----|------------|----------------|----------|------|------------|----------------|
| | Nº altas | % | Edad media | Estancia media | Nº altas | % | Edad media | Estancia media | Nº altas | % | Edad media | Estancia media |
| 137-Otros proced. para ayudar al parto | 11.564 | 14,1 | 32,6 | 2,6 | . | . | . | . | 11.564 | 24,4 | 32,6 | 2,6 |
| 135-Parto con forceps, ventosa y extracción con presentación de nalgas | 3.242 | 4 | 32,9 | 2,8 | . | . | . | . | 3.242 | 6,8 | 32,9 | 2,8 |
| 084-Colecistectomía y exploración del conducto común | 2.903 | 3,5 | 59,9 | 4 | 1.260 | 3,6 | 62,9 | 4,9 | 1.643 | 3,5 | 57,6 | 3,4 |
| 153-Sustitución de caderas total y parcial | 2.435 | 3 | 72,3 | 9,9 | 1.130 | 3,3 | 67,7 | 9,5 | 1.305 | 2,8 | 76,3 | 10,4 |
| 085-Reparación de hernia inguinal y femoral | 2.390 | 2,9 | 63,7 | 1,7 | 2.030 | 5,9 | 63,4 | 1,5 | 360 | 0,8 | 65,3 | 2,6 |
| 045-Angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) | 2.354 | 2,9 | 65,5 | 7 | 1.856 | 5,4 | 64,3 | 6,9 | 498 | 1,1 | 70,1 | 7,4 |
| 134-Cesárea | 2.259 | 2,8 | 33,5 | 5,1 | . | . | . | . | 2.259 | 4,8 | 33,5 | 5,1 |
| 080-Apendicectomía | 2.153 | 2,6 | 32,1 | 3,7 | 1.208 | 3,5 | 30,5 | 3,7 | 945 | 2 | 34,2 | 3,8 |
| 101-Escisión transuretral, drenaje o eliminación de obstrucción urinaria | 2.041 | 2,5 | 68,6 | 3,9 | 1.625 | 4,7 | 68,9 | 4,1 | 416 | 0,9 | 67,1 | 3,3 |
| 152-Artroplastia de rodilla | 1.915 | 2,3 | 70,6 | 8,3 | 690 | 2 | 69,2 | 8,4 | 1.225 | 2,6 | 71,5 | 8,3 |

Tabla 15. Primer procedimiento quirúrgico más frecuente (por categoría CCS), edad media y estancia media en hospitalización convencional en los hospitales privados de agudos en residentes en la CAPV, 2012

| Categoría CCS del primer procedimiento quirúrgico | Total | | | | Hombres | | | | Mujeres | | | |
|--|----------|-----|------------|----------------|----------|------|------------|----------------|----------|-----|------------|----------------|
| | Nº altas | % | Edad media | Estancia media | Nº altas | % | Edad media | Estancia media | Nº altas | % | Edad media | Estancia media |
| 149-Artroscopia | 2.249 | 7,9 | 43,9 | 1,4 | 1.493 | 10,7 | 42,4 | 1,4 | 756 | 5,2 | 46,8 | 1,4 |
| 085-Reparación de hernia inguinal y femoral | 1.814 | 6,4 | 59,9 | 1,3 | 1.575 | 11,3 | 59,8 | 1,3 | 239 | 1,6 | 60,8 | 1,4 |
| 137-Otros proced. para ayudar al parto | 1.296 | 4,5 | 34,4 | 2,7 | . | . | . | . | 1.296 | 8,9 | 34,4 | 2,7 |
| 175-Otros proced. terapéuticos sobre la piel y mama, | 1.286 | 4,5 | 40,1 | 1,5 | 227 | 1,6 | 33,5 | 1,2 | 1.059 | 7,2 | 41,5 | 1,5 |
| 152-Artroplastia de rodilla | 1.179 | 4,1 | 69,7 | 6,9 | 416 | 3 | 66,6 | 6,8 | 763 | 5,2 | 71,4 | 7 |
| 153-Sustitución de caderas total y parcial | 1.001 | 3,5 | 69,1 | 7,3 | 534 | 3,8 | 65,6 | 6,8 | 467 | 3,2 | 73,2 | 7,8 |
| 084-Colecistectomía y exploración del conducto común | 956 | 3,4 | 56,3 | 3 | 348 | 2,5 | 59 | 3,9 | 608 | 4,2 | 54,7 | 2,5 |
| 151-Escisión del cartílago semilunar de la rodilla | 854 | 3 | 49,8 | 1,1 | 600 | 4,3 | 48,3 | 1,1 | 254 | 1,7 | 53,2 | 1 |
| 160-Otros proced. terapéuticos sobre músculos y tendones | 796 | 2,8 | 52,4 | 1,3 | 524 | 3,8 | 51 | 1,2 | 272 | 1,9 | 55,1 | 1,5 |
| 134-Cesárea | 750 | 2,6 | 34,7 | 4,8 | . | . | . | . | 750 | 5,1 | 34,7 | 4,8 |

Tabla 16. Nº de altas y edad media de cirugía mayor ambulatoria en hospitales de agudos públicos y privados, por tipo de hospital, hospital, en residentes en la CAPV, 2.012

| Tipo de hospital/Hospital | | Nº de altas (cma) | Edad media casos cma | Otros procesos ambulatorios |
|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| H. públicos de agudos | Santiago | 1.979 | 62,4 | 204 |
| | Txagorritxu | 4.744 | 61,4 | 312 |
| | Bidasoa | 1.441 | 61,4 | 503 |
| | Alto Deba | 1.259 | 67,9 | 71 |
| | Donostia | 8.465 | 59,8 | 891 |
| | Zumarraga | 1.511 | 64,9 | 100 |
| | Mendaro | 1.746 | 63,3 | 60 |
| | Cruces | 10.114 | 54,9 | 1.980 |
| | San Eloy | 2.712 | 70,3 | 87 |
| | Basurto | 5.034 | 59,9 | 1.053 |
| | Galdakao | 2.556 | 63,2 | 498 |
| | Total | 41.561 | 60,5 | 5.759 |
| H. priv. de agudos | La Esperanza | 302 | 50,8 | 226 |
| | Pol. San José | 749 | 55,6 | 2.303 |
| | V. Pilar | 1.079 | 51,6 | 394 |
| | Onkologikoa | 1 | 25 | 12 |
| | Mutualia-Pakea | 79 | 47,7 | 21 |
| | Policl. Gipuzkoa | 1.369 | 47,9 | 2.130 |
| | Quirón-Donostia | 604 | 45,2 | 108 |
| | La Asunción | 1.144 | 63,8 | 57 |
| | Indautxu | 193 | 43,4 | 115 |
| | Vic. San Sebastián | 792 | 50,6 | 602 |
| | Virgen Blanca | 851 | 47,1 | 526 |
| | Cruz Roja-Bilbao | 3.454 | 62,3 | 239 |
| | Mutualia-Ercilla | 324 | 44,8 | 68 |
| | Sanat. Bilbaino | 1.009 | 54,2 | 194 |
| | Guimón | 1.900 | 62,8 | 604 |
| | Intermutual | 243 | 43 | 154 |
| | S. Juan Dios-Santurtzi | 1.567 | 57,1 | 1.715 |
| Quirón-Bizkaia | 400 | 43,9 | 325 | |
| Total | 16.060 | 55,6 | 9.793 | |
| TOTAL | 57.621 | 59,1 | 15.552 | |

Tabla 17. Procedimientos principales más frecuentes (por categoría CCS) y edad media en cirugía mayor ambulatoria en los hospitales de agudos los hospitales de agudos, en residentes en la CAPV, 2012

| Categoría CCS del procedimiento principal | Total | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|---|----------|------|------------|----------|------|------------|----------|------|------------|
| | Nº altas | % | Edad media | Nº altas | % | Edad media | Nº altas | % | Edad media |
| 015-Proced. s/ cristalino y cataratas | 17.168 | 41,3 | 74,4 | 7.101 | 40,9 | 73,2 | 10.067 | 41,6 | 75,2 |
| 020-Otros proced. terapéuticos intraoculares | 3.245 | 7,8 | 72 | 1.458 | 8,4 | 69,1 | 1.787 | 7,4 | 74,3 |
| 006-Descompresión de nervio periférico | 1.523 | 3,7 | 59 | 461 | 2,7 | 60,2 | 1.062 | 4,4 | 58,4 |
| 019-Otros proced. terapéuticos s/ párpados, conjuntiva y córnea | 1.288 | 3,1 | 63,2 | 515 | 3 | 60,8 | 773 | 3,2 | 64,8 |
| 160-Otros proced. terapéuticos sobre músculos y tendones | 1.268 | 3,1 | 50,4 | 632 | 3,6 | 50,2 | 636 | 2,6 | 50,7 |
| 127-Dilatación, legrado y aspiración tras parto o aborto | 1.101 | 2,6 | 34,2 | . | . | . | 1.101 | 4,5 | 34,2 |
| 170-Escisión de lesión de piel | 810 | 1,9 | 54,9 | 416 | 2,4 | 57,2 | 394 | 1,6 | 52,4 |
| 120-Otras intervenciones sobre ovario | 803 | 1,9 | 34,7 | . | . | . | 803 | 3,3 | 34,7 |
| 085-Reparación de hernia inguinal y femoral | 775 | 1,9 | 42,1 | 660 | 3,8 | 43 | 115 | 0,5 | 36,7 |
| 029-Proced. sobre dientes | 768 | 1,8 | 30,8 | 347 | 2 | 30,8 | 421 | 1,7 | 30,7 |

Tabla 18. Procedimientos principales más frecuentes (por categoría CCS) y edad media en cirugía mayor ambulatoria en los hospitales privados en residentes en la CAPV, 2012

| Categoría CCS del procedimiento principal | Total | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|---|----------|------|------------|----------|------|------------|----------|------|------------|
| | Nº altas | % | Edad media | Nº altas | % | Edad media | Nº altas | % | Edad media |
| 015-Proced. s/ cristalino y cataratas | 3.755 | 23,5 | 72,9 | 1.411 | 21,2 | 71,9 | 2.344 | 25,2 | 73,5 |
| 053-Eliminación de venas varicosa de miembro inferior | 1.465 | 9,2 | 51,4 | 477 | 7,2 | 50,1 | 988 | 10,6 | 52,1 |
| 160-Otros proced. terapéuticos sobre músculos y tendones | 1.309 | 8,2 | 53,8 | 601 | 9 | 51,5 | 708 | 7,6 | 55,7 |
| 006-Descompresión de nervio periférico | 1.268 | 8 | 56,4 | 369 | 5,6 | 55,9 | 899 | 9,7 | 56,6 |
| 151-Escisión del cartílago semilunar de la rodilla | 877 | 5,5 | 50,2 | 606 | 9,1 | 48,4 | 271 | 2,9 | 54,1 |
| 149-Artroscopia | 735 | 4,6 | 45,9 | 499 | 7,5 | 42,9 | 236 | 2,5 | 52,2 |
| 143-Bunionectomía o reparación de deformidades de los dedos de los pies | 500 | 3,1 | 60,6 | 82 | 1,2 | 58,3 | 418 | 4,5 | 61,1 |
| 085-Reparación de hernia inguinal y femoral | 415 | 2,6 | 55,3 | 358 | 5,4 | 56,2 | 57 | 0,6 | 49,5 |
| 019-Otros proced. terapéuticos s/ párpados, conjuntiva y córnea | 393 | 2,5 | 58,1 | 140 | 2,1 | 60,5 | 253 | 2,7 | 56,7 |
| 125-Otra escisión de cuello uterino y útero | 381 | 2,4 | 49 | . | . | . | 381 | 4,1 | 49 |

Tabla 19. Porcentaje de ambulatorización de los procesos de cirugía mayor más frecuentes en hospitales de agudos públicos, en residentes en la CAPV 2012

| Procedimientos por categoría del CCS | Total | | Cirugía mayor ambulatoria | | % ambulatorización |
|---|----------------|------------|---------------------------|------------|--------------------|
| | Nº proc. | % | Nº de proc. | % | |
| 015-Proced. s/ cristalino y cataratas | 34.681 | 19 | 34.541 | 54,9 | 99,6% |
| 020-Otros proced. terapéuticos intraoculares | 3.723 | 2 | 3.605 | 5,7 | 96,8% |
| 006-Descompresión de nervio periférico | 1.738 | 1 | 1.548 | 2,5 | 89,1% |
| 160-Otros proced. terapéuticos sobre músculos y tendones | 3.574 | 2 | 1.417 | 2,3 | 39,6% |
| 019-Otros proced. terapéuticos s/ párpados, conjuntiva y córnea | 1.533 | 0,8 | 1.389 | 2,2 | 90,6% |
| 127-Dilatación, legrado y aspiración tras parto o aborto | 1.614 | 0,9 | 1.105 | 1,8 | 68,5% |
| 170-Escisión de lesión de piel | 1.050 | 0,6 | 876 | 1,4 | 83,4% |
| 120-Otras intervenciones sobre ovario | 1.313 | 0,7 | 841 | 1,3 | 64,1% |
| 030-Amigdalectomía o adenoidectomía | 1.925 | 1,1 | 832 | 1,3 | 43,2% |
| 023-Miringotomía | 1.022 | 0,6 | 832 | 1,3 | 81,4% |
| 143-Bunionectomía o reparación de deformidades de los dedos de los pies | 1.989 | 1,1 | 824 | 1,3 | 41,4% |
| 149-Artroscopia | 3.502 | 1,9 | 816 | 1,3 | 23,3% |
| 085-Reparación de hernia inguinal y femoral | 3.282 | 1,8 | 784 | 1,2 | 23,9% |
| 125-Otra escisión de cuello uterino y útero | 1.259 | 0,7 | 776 | 1,2 | 61,6% |
| 042-Otros proced. terapéut. s/ aparato respiratorio, con uso de quirófano | 1.336 | 0,7 | 736 | 1,2 | 55,1% |
| 029-Proced. sobre dientes | 760 | 0,4 | 714 | 1,1 | 93,9% |
| 132-Otros proced. terapéuticos sobre órganos femeninos, con uso de quirófano | 1.239 | 0,7 | 713 | 1,1 | 57,5% |
| 053-Eliminación de venas varicosa de miembro inferior | 1.875 | 1 | 683 | 1,1 | 36,4% |
| 151-Escisión del cartílago semilunar de la rodilla | 1.684 | 0,9 | 646 | 1 | 38,4% |
| 118-Otros proced. terapéuticos sobre genitales masculinos, con uso de quirófano | 1.193 | 0,7 | 560 | 0,9 | 46,9% |
| 033-Otros proced. terapéut. sobre nariz, boca y faringe, con uso de quirófano | 1.839 | 1 | 549 | 0,9 | 29,9% |
| 166-Lumpectomía y cuadrantectomía de la mama | 1.519 | 0,8 | 479 | 0,8 | 31,5% |
| 174-Otros proced. terapéuticos sobre la piel y mama, sin uso de quirófano | 600 | 0,3 | 473 | 0,8 | 78,8% |
| 016-Reparación de desgarro y desprendimiento de retina | 496 | 0,3 | 462 | 0,7 | 93,1% |
| 021-Otros proced. terapéuticos s/ músculos extraoculares y órbita | 565 | 0,3 | 447 | 0,7 | 79,1% |
| .../..... | | | | | |
| Total | 182.917 | 100 | 62.871 | 100 | 34,4% |

Tabla 20. Porcentaje de ambulatorización de los procesos de cirugía mayor más frecuentes en hospitales de agudos privados, en residentes en la CAPV 2012

| Procedimientos por categoría del CCS | Total | | Cirugía mayor ambulatoria | | % ambulatorización |
|---|---------------|------------|---------------------------|------------|--------------------|
| | Nº de proc. | % | Nº de proc. | % | |
| 015-Proced. s/ cristalino y cataratas | 5.840 | 9,8 | 5.775 | 28,5 | 98,9% |
| 149-Artroscopia | 6.054 | 10,2 | 1.708 | 8,4 | 28,2% |
| 053-Eliminación de venas varicosa de miembro inferior | 1.969 | 3,3 | 1.509 | 7,4 | 76,6% |
| 160-Otros proced. terapéuticos sobre músculos y tendones | 2.535 | 4,3 | 1.375 | 6,8 | 54,2% |
| 006-Descompresión de nervio periférico | 1.427 | 2,4 | 1.281 | 6,3 | 89,8% |
| 151-Escisión del cartílago semilunar de la rodilla | 2.615 | 4,4 | 1.220 | 6 | 46,7% |
| 143-Bunionectomía o reparación de deformidades de los dedos de los pies | 1.514 | 2,5 | 609 | 3 | 40,2% |
| 061-Otros proced. en vasos no de cabeza y cuello | 2.510 | 4,2 | 461 | 2,3 | 18,4% |
| 085-Reparación de hernia inguinal y femoral | 2.312 | 3,9 | 444 | 2,2 | 19,2% |
| 019-Otros proced. terapéuticos s/ párpados, conjuntiva y córnea | 622 | 1 | 435 | 2,1 | 69,9% |
| 125-Otra escisión de cuello uterino y útero | 582 | 1 | 385 | 1,9 | 66,2% |
| 175-Otros proced. terapéuticos sobre la piel y mama, con uso de quirófano | 2.101 | 3,5 | 375 | 1,9 | 17,8% |
| 172-Injerto de piel | 573 | 1 | 372 | 1,8 | 64,9% |
| 120-Otras intervenciones sobre ovario | 436 | 0,7 | 271 | 1,3 | 62,2% |
| 162-Otros proced. terapéuticos sobre articulaciones, con uso de quirófano | 899 | 1,5 | 255 | 1,3 | 28,4% |
| 142-Escisión parcial de hueso | 453 | 0,8 | 208 | 1 | 45,9% |
| 127-Dilatación, legrado y aspiración tras parto o aborto | 279 | 0,5 | 206 | 1 | 73,8% |
| 028-Proced. plásticos sobre nariz | 886 | 1,5 | 204 | 1 | 23,0% |
| 096-Otros proced. terapéuticos sobre tracto gastrointestinal inferior, con uso de quirófano | 644 | 1,1 | 168 | 0,8 | 26,1% |
| 086-Otra reparación de hernia | 959 | 1,6 | 163 | 0,8 | 17,0% |
| 081-Proced. sobre hemorroides | 518 | 0,9 | 149 | 0,7 | 28,8% |
| 023-Miringotomía | 305 | 0,5 | 131 | 0,6 | 43,0% |
| 148-Otro proced. sobre fracturas o luxaciones | 484 | 0,8 | 130 | 0,6 | 26,9% |
| 150-División de la cápsula articular, ligamento o cartílago | 247 | 0,4 | 129 | 0,6 | 52,2% |
| 042-Otros proced. terapéut. s/ aparato respiratorio, con uso de quirófano | 343 | 0,6 | 128 | 0,6 | 37,3% |
| --/-- | | | | | |
| Total | 59.572 | 100 | 20.264 | 100 | 34,0% |

Tabla 21. Edad media y estancia media de altas de hospitalización convencional en hospitales de media-larga estancia públicos y privados, por tipo de hospital y hospital, en residentes en la CAPV, 2011

| Tipo de hospital/Hospital | | Nº altas | Edad media | Estancia media |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| H. públ. de m-l estancia | Leza | 441 | 77,5 | 40,6 |
| | Amara | 867 | 73,0 | 28,6 |
| | Santa Marina | 4.686 | 82,6 | 11,5 |
| | Gorliz | 2.125 | 77,0 | 20,6 |
| | Total | 8.119 | 79,8 | 17,3 |
| H. priv. de m-l estancia | Clin. Álava | 118 | 78,1 | 100,8 |
| | Matía | 1.141 | 80,8 | 28,1 |
| | Total | 1.259 | 80,6 | 34,9 |
| TOTAL | | 9.378 | 79,9 | 19,6 |

Figura 6. Altas de hospitalización convencional en hospitales públicos y privados de media-larga estancia, por grupo de edad y sexo, en residentes en la CAPV, 2012




Figura 7. Tipo de ingreso en los casos de hospitalización convencional en los hospitales de media-larga estancia, en residentes en la CAPV, 2012




Tabla 22. Tipo de alta en los casos de hospitalización convencional en los hospitales de media-larga estancia, en residentes en la CAPV, 2012

| Tipo de alta | H. públ. de m-l estancia | | H. priv. de m-l estancia | |
|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| | N | % | N | % |
| A domicilio | 5.526 | 68,1 | 536 | 42,6 |
| Fallecimiento | 1.978 | 24,4 | 427 | 33,9 |
| Trasl. residencia social | 279 | 3,4 | 227 | 18 |
| Traslado a otro hospital | 278 | 3,4 | 52 | 4,1 |
| Otras | 36 | 0,4 | 6 | 0,5 |
| Alta voluntaria | 22 | 0,3 | 11 | 0,9 |
| Total | 8.119 | 100 | 1.259 | 100 |

Tabla 23. Altas de hospitalización convencional en los hospitales de media-larga estancia públicos y privados, por grupo diagnóstico y territorio histórico, en residentes en la CAPV, 2.012.

| CIE-9-MC Grupo diagnóstico | Araba-Álava | | Bizkaia | | Gipuzkoa | |
|--|-------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | nº | % | nº | % | nº | % |
| Enf. infecciosas y parasitarias | 2 | 0,3 | 110 | 1,6 | 18 | 0,9 |
| Neoplasias | 90 | 13,8 | 825 | 12,3 | 302 | 15,1 |
| Enf. endocr., metaból. e inmunit. | 7 | 1,1 | 67 | 1,0 | 6 | 0,3 |
| Enf. de la sangre y órg. hematopoy. | 5 | 0,8 | 10 | 0,1 | 5 | 0,3 |
| Trastornos mentales | 4 | 0,6 | 17 | 0,3 | 20 | 1,0 |
| Enf. sist. nervioso y órg. sensor. | 16 | 2,4 | 27 | 0,4 | 63 | 3,2 |
| Enf. aparato circulatorio | 76 | 11,6 | 1.048 | 15,6 | 39 | 2,0 |
| Enf. aparato respiratorio | 146 | 22,3 | 2.208 | 32,8 | 67 | 3,4 |
| Enf. aparato digestivo | 17 | 2,6 | 126 | 1,9 | 11 | 0,6 |
| Enf. aparato genitourinario | 17 | 2,6 | 310 | 4,6 | 6 | 0,3 |
| Enf. de la piel y de los tejidos subc. | 8 | 1,2 | 28 | 0,4 | 4 | 0,2 |
| Enf. apar. músculo-esquelét. y tej. conectivos | 2 | 0,3 | 22 | 0,3 | 3 | 0,2 |
| Anomalías congénitas | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 |
| Síntomas, signos y estados mal definidos | 22 | 3,4 | 126 | 1,9 | 28 | 1,4 |
| Lesiones y envenenamientos | 7 | 1,1 | 109 | 1,6 | 4 | 0,2 |
| Código V | 235 | 35,9 | 1.689 | 25,1 | 1.424 | 71,2 |
| Total | 654 | 100 | 6.724 | 100 | 2.000 | 100 |

Figura 8. Grupos diagnósticos más frecuentes en hospitalización convencional en los hospitales públicos y privados de media-larga estancia, según territorio histórico en residentes en la CAPV 2012. Ambos sexos




Tabla 24. Diagnósticos principales más frecuentes (por categoría diagnóstica a 3 dígitos), edad media y estancia media en hospitalización convencional en los hospitales de media-larga estancia públicos y privados en residentes en la CAPV, 2012

| CIE-9-MC Diagnóstico principal | Total | | | | Hombres | | | | Mujeres | | | |
|--|----------|-----|------------|----------------|----------|-----|------------|----------------|----------|-----|------------|----------------|
| | Nº altas | % | Edad media | Estancia media | Nº altas | % | Edad media | Estancia media | Nº altas | % | Edad media | Estancia media |
| v57. Cuidados que implican procedimientos de rehabilitación | 1.959 | 21 | 75 | 28,8 | 826 | 18 | 71,7 | 33,2 | 1.133 | 23 | 77,4 | 25,6 |
| v66. Convalecencia | 1.355 | 14 | 80,6 | 25,1 | 635 | 14 | 77,5 | 26,1 | 720 | 15 | 83,4 | 24,3 |
| 491. Bronquitis crónica | 703 | 7,5 | 81,5 | 11,3 | 579 | 13 | 80,9 | 11,3 | 124 | 2,5 | 84,3 | 11,1 |
| 466. Bronquitis y bronquiolitis agudas | 693 | 7,4 | 84,7 | 10,8 | 250 | 5,5 | 82,6 | 11,6 | 443 | 9,1 | 85,9 | 10,3 |
| 428. Insuficiencia cardíaca | 547 | 5,8 | 84,8 | 10,3 | 237 | 5,3 | 82,8 | 10,1 | 310 | 6,4 | 86,4 | 10,5 |
| 486. Neumonía organismo sin especificar | 388 | 4,1 | 84,8 | 11,4 | 195 | 4,3 | 83,9 | 12,2 | 193 | 4 | 85,8 | 10,7 |
| 599. Otras alteraciones de uretra y vías urinarias | 255 | 2,7 | 85,3 | 12,7 | 71 | 1,6 | 82,9 | 16,2 | 184 | 3,8 | 86,2 | 11,4 |
| 162. Neoplasia maligna tráquea, bronquios y pulmón | 237 | 2,5 | 71 | 14,5 | 194 | 4,3 | 72,4 | 13,6 | 43 | 0,9 | 65 | 18,6 |
| 518. Otras enfermedades pulmonares | 182 | 1,9 | 81,4 | 14,6 | 78 | 1,7 | 79 | 17,5 | 104 | 2,1 | 83,1 | 12,4 |
| 493. Asma | 163 | 1,7 | 81,4 | 9,9 | 17 | 0,4 | 82,8 | 9,1 | 146 | 3 | 81,3 | 10 |
| 402. Enferm. Cardíaca hipertensiva | 152 | 1,6 | 86 | 8,9 | 33 | 0,7 | 86 | 7,1 | 119 | 2,4 | 86 | 9,4 |
| 153. Neoplasia maligna colon | 117 | 1,2 | 77,7 | 15,7 | 64 | 1,4 | 77,4 | 13,7 | 53 | 1,1 | 78,1 | 18 |
| 434. Oclusión de arterias cerebrales | 116 | 1,2 | 83,6 | 21,1 | 37 | 0,8 | 79 | 28 | 79 | 1,6 | 85,8 | 17,8 |
| 507. Neumonitis por sólidos y líquidos | 113 | 1,2 | 83,4 | 11,8 | 53 | 1,2 | 82,1 | 12,5 | 60 | 1,2 | 84,6 | 11,1 |
| 038. Septicemia | 82 | 0,9 | 84,4 | 13 | 34 | 0,8 | 81,3 | 15,9 | 48 | 1 | 86,5 | 11 |
| 151. Neoplasia maligna estomago | 80 | 0,9 | 76 | 16,2 | 48 | 1,1 | 73,9 | 16,9 | 32 | 0,7 | 79 | 15,1 |
| 780. Síntomas generales | 76 | 0,8 | 80,4 | 24,5 | 35 | 0,8 | 80,9 | 12,2 | 41 | 0,8 | 80,1 | 35 |
| 404. Enfermedad cardíaca y renal crónica hipertensiva | 76 | 0,8 | 85 | 9,3 | 39 | 0,9 | 83,1 | 9,6 | 37 | 0,8 | 87,1 | 9 |
| 185. Neoplasia maligna próstata | 72 | 0,8 | 77,8 | 13,2 | 72 | 1,6 | 77,8 | 13,2 | . | . | . | . |
| 188. Neoplasia maligna de la vejiga | 68 | 0,7 | 78,2 | 14,3 | 55 | 1,2 | 78,7 | 14,7 | 13 | 0,3 | 76,5 | 12,7 |
| 494. Bronquiectasias | 66 | 0,7 | 84,5 | 16,9 | 27 | 0,6 | 84,9 | 18,7 | 39 | 0,8 | 84,3 | 15,7 |
| 155. Neoplasia maligna hígado y canales biliares intrahepat. | 66 | 0,7 | 75 | 23,8 | 45 | 1 | 74,1 | 24,5 | 21 | 0,4 | 77 | 22,4 |
| 331. Otras degeneraciones cerebrales | 64 | 0,7 | 79,4 | 97,3 | 28 | 0,6 | 75,3 | 32,9 | 36 | 0,7 | 82,6 | 147 |
| 157. Neoplasia maligna páncreas | 62 | 0,7 | 74,1 | 16,3 | 33 | 0,7 | 69 | 16,8 | 29 | 0,6 | 80 | 15,8 |
| 174. Neoplasia maligna mama mujer | 53 | 0,6 | 77,5 | 29,9 | . | . | . | . | 53 | 1,1 | 77,5 | 29,9 |

Anexo 1. Altas totales por tipo de hospital, hospital y tipo de asistencia en la CAPV, 2012

| | | Hospitalización convencional | Procesos ambulatorios | Total |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Hospitales de agudos públicos | Santiago | 11.178 | 2.401 | 13.579 |
| | Txagorritxu | 20.274 | 5.302 | 25.576 |
| | Bidasoa | 4.579 | 2.156 | 6.735 |
| | Alto Deba | 3.914 | 1.417 | 5.331 |
| | Donostia | 43.552 | 9.885 | 53.437 |
| | Zumarraga | 6.756 | 1.695 | 8.451 |
| | Mendaro | 5.345 | 1.879 | 7.224 |
| | Cruces | 37.554 | 12.744 | 50.298 |
| | San Eloy | 4.815 | 2.926 | 7.741 |
| | Basurto | 30.992 | 6.488 | 37.480 |
| | Galdakao | 18.459 | 3.255 | 21.714 |
| Hospitales de M/I estancia públicos | Leza | 446 | 1 | 447 |
| | Amara | 876 | 1 | 877 |
| | Santa Marina | 4.746 | 1 | 4.747 |
| | Gorliz | 2.145 | 5 | 2.150 |
| Hospitales de agudos privados | La Esperanza | 1.227 | 625 | 1.852 |
| | Pol. San José | 1.875 | 3.547 | 5.422 |
| | V. Pilar | 1.397 | 1.611 | 3.008 |
| | Onkologikoa | 2.424 | 24 | 2.448 |
| | Mutualia-Pakea | 333 | 104 | 437 |
| | Policl. Gipuzkoa | 6.662 | 3.708 | 10.370 |
| | Quirón-Donostia | 1.708 | 864 | 2.572 |
| | La Asunción | 3.513 | 1.243 | 4.756 |
| | Indautxu | 756 | 376 | 1.132 |
| | Vic. San Sebastián | 8.426 | 1.534 | 9.960 |
| | Virgen Blanca | 4.225 | 1.476 | 5.701 |
| | Cruz Roja-Bilbao | 2.775 | 3.844 | 6.619 |
| | Mutualia-Ercilla | 311 | 404 | 715 |
| | Sanat. Bilbaino | 1.912 | 1.238 | 3.150 |
| | Guimón | 1.325 | 2.761 | 4.086 |
| | Intermutual | 1.645 | 647 | 2.292 |
| | S. Juan Dios-Santurtzi | 1.716 | 3.547 | 5.263 |
| Quirón-Bizkaia | 2.002 | 1.038 | 3.040 | |
| Hospitales de M/I estancia privados | Clin. Álava | 119 | . | 119 |
| | Matía | 1.145 | . | 1.145 |
| Total | | 241.127 | 78.747 | 319.874 |