

TOXIKOMANIEI buruzko informazio sistema

Sistema de información sobre TOXICOMANÍAS

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO

2018

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAHIA

DEPARTAMENTO DE SALUD

Egileak / Autores:

Nieves Rodríguez-Sierra Huguet
Luis Javier Echevarría González de Garibay

Edizioan eta maketazioan lankidetzak / Colaboración en la edición y maquetación:

Maria Victoria Perianes Vilariño

*Erregistroetako eta Osasun-informazioko Zerbitzua. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko
Zuzendaritza. Osasun Saila*

Servicio de Registros e Información Sanitaria. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación
Sanitarias. Departamento de Salud

registros-epidemiologicos@euskadi.eus

2021eko Ekaina / Junio 2021

AURKIBIDEA / ÍNDICE

Sarrera

5

Introducción

Materiala eta metodoak

8

Materiales y métodos

TRATAMENDU ADIERAZLEA:

1. grafikoa. Tratamendurako onartutakoen kopurua, berau eragin duen drogaren arabera. EAE 2018

10

2. grafikoa. Pertsonen tratamendua hasterakoan eta kontsumitzen hasterakoan daukaten batez besteko adina, droga nagusiaren arabera. EAE 2018

10

1. taula. Tratamendurako onartu diren pertsonen ezaugarriak, onarpen hori eragin duen drogaren arabera. EAE 2018

11

2. taula. Tokikomania ez alkoholikoengatik tratamendua hastea onartutakoen bilakaera, tratamenduan hastea eragin duen drogaren arabera. EAE 1996-2018

15

3. grafikoa. Tratamendurako onarpen kopuruaren bilakaera, heroína, kokaina eta cannabisaren kasuetan. EAE 1991-2018

16

4. grafikoa. Heroína abusuagatik edo mendekotasunagatik emandako tratamendu kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendurik egin izanaren edo ez izanaren arabera. EAE 1996-2018

17

4.1 grafikoa. Espainian 1996-2018n heroína gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

17

5. grafikoa. Kokaina abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua jaso izanaren edo jaso ez izanaren arabera. EAE 1996-2018

18

5.1 grafikoa. Espainian 1996-2018n kokaina abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

18

6. grafikoa. Cannabis abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 1996-2018

19

6.1. grafikoa. Espainian 1996-2018n cannabis abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

19

INDICADOR DE TRATAMIENTO:

Gráfico 1. Número de admisiones a tratamiento según la droga que lo motiva. CAPV 2018

Gráfico 2. Edad media al inicio de tratamiento y edad media al inicio del consumo según droga principal. CAPV 2018

Tabla 1. Características de las personas que han sido admitidas a tratamiento según la droga que causa dicha admisión. CAPV 2018

Tabla 2. Evolución del número de admisiones a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas según droga que motiva la admisión. CAPV 1996-2018

Gráfico 3. Evolución del número de admisiones a tratamiento por heroína, cocaína y cannabis. CAPV 1991-2018

Gráfico 4. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de heroína según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2018

Gráfico 4.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de heroína en España 1996-2018

Gráfico 5. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2018

Gráfico 5.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína en España 1996-2018

Gráfico 6. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cannabis según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2018

Gráfico 6.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cannabis en España 1996-2018

7. grafikoa. Alkohol abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 1996-2018	20	Gráfico 7. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de alcohol según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2018
3. taula. Alkohol kontsumoaren tratamendurako onarpenen ezaugarriak. EAE 2018	21	Tabla 3. Características de las admisiones a tratamiento por consumo de alcohol. CAPV año 2018
8. grafikoa. Alkoholagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1996-2018	24	Gráfico 8. Evolución del número de admisiones a tratamiento por alcohol, según sexo. CAPV 1996-2018
9. grafikoa. Aurretik opiazeoekin ordezko tratamendu bat egin eta tratamendua egiteko onartu diren pertsonak. EAE 2018	25	Gráfico 9. Personas admitidas a tratamiento en 2017 que han realizado previamente tratamiento sustitutivo con opiáceos. CAPV 2018
10. grafikoa. Injekzio-bidea erabiltzea tratamendurako onartutako pertsonekin. EAE 2018	25	Gráfico 10. Uso de la vía inyectada en las admisiones a tratamiento. CAPV 2018
11. grafikoa. GIB testaren egoera tratamendurako onartutako pertsonekin EAE 2018	26	Gráfico 11. Situación test VIH en las admisiones a tratamiento. CAPV 2018
11.1. grafikoa. GIB birusarekiko serologia-egoera tratamendurako onartutako pertsonekin EAE 2018	26	Gráfico 11.1 Estado serológico frente al VIH en las admisiones a tratamiento. CAPV 2018
12. grafikoa. C Hepatitisaren testa tratamendurako onartutako pertsonekin EAE 2018	27	Gráfico 12. Situación test Hepatitis C en las admisiones a tratamiento. CAPV 2018
12.1. grafikoa. C Hepatitisarekiko serologia-egoera tratamendurako onartutako pertsonekin EAE 2018	27	Gráfico 12.1. Estado serológico frente a Hepatitis C en las admisiones a tratamiento. CAPV 2018
13. grafikoa. B Hepatitisarekiko egoera tratamendurako onartutako pertsonekin EAE 2018	28	Gráfico 13. Situación Hepatitis B en las personas admitidas a tratamiento. CAPV 2018
LARRIALDI ADIERAZLEA:		INDICADOR DE URGENCIAS:
4. taula. Substantzia psikoaktiboen kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien ezaugarriak. EAeko erreferentziatzko ospitaleak 2018	29	Tabla 4. Características de los episodios de urgencias en los que se menciona consumo de sustancias psicoactivas. Hospitales de referencia CAPV 2018
5. taula. LARRIALDI ADIERAZLEA. Substantzia psikoaktiboen kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien 10 diagnostiko arruntenak, GNS 3 digitu multzoren arabera. EAeko erreferentziatzko ospitaleak 2018	31	Tabla 5. INDICADOR URGENCIAS. 10 diagnósticos más frecuentes, por categorías CIE de 3 dígitos de los episodios de urgencias en los que se menciona consumo de sustancias psicoactivas. Hospitales de referencia CAPV 2018.
6. taula. Larrialdi-gertakarietan aipatutako substantzia psikoaktiboen banaketa, sexuaren arabera. EAeko erreferentziatzko ospitaleak 2018	32	Tabla 6. Distribución de las sustancias psicoactivas mencionadas en los episodios de urgencia según sexo. Hospitales de referencia CAPV 2018

7. taula. Larrialdi-gertakariarekin lotuta dauden substantzia psikoaktiboen banaketa, sexuaren arabera. EAEko erreferentziatzko ospitaleak 2018 33

HILKORTASUN ADIERAZLEA:

8. taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuek eragindako heriotzen ezaugarriak. EAE 2018 34

14. grafikoa Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuen ondoriozko hilkortasun tasaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1998-2018 35

9 taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioen ondorioz hildakoek heriotzaren aurretik kontsumitutako substantzia psikoaktiboen banaketa. EAE 2018 36

10. taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioek eragindako heriotza kopurua eta tasak, sexuaren arabera. EAE 2000-2018 37

15. grafikoa Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuen ondorioz hildakoen batez besteko adinaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1996-2018 38

Tabla 7. Distribución de las sustancias psicoactivas relacionadas en los episodios de urgencia según sexo. Hospitales de referencia CAPV 2018

INDICADOR DE MORTALIDAD:

Tabla 8. Características de los fallecimientos por reacción aguda a sustancias psicoactivas. CAPV 2018

Gráfico 14. Evolución de la tasa de mortalidad por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAPV 1998-2018

Tabla 9. Distribución de las sustancias psicoactivas consumidas antes de la muerte en los fallecidos por reacción adversa a sustancias psicoactivas. CAPV 2018

Tabla 10. Número y tasas de mortalidad por reacción adversa a sustancias psicoactivas por sexos, CAPV 2000-2018

Gráfico 15. Evolución de la edad media de los fallecidos por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAPV 1996-2018

ERANSKINAK

1. ERANSKINA. Drogomenpekotasunen kontratako tratamendu ambulatorioa egin eta TRATAMENDU-ADIERAZLERAKO datuak eman dituzten zentroak edo zerbitzuak. EAE 2018 39

2. ERANSKINA. Adin-taldearen arabera biztanleria, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera. EAE 2018 40

ANEXOS

ANEXO 1. Centros o servicios que realizan tratamiento ambulatorio de drogodependencias y que han aportado sus datos al INDICADOR TRATAMIENTO. CAPV 2018

ANEXO 2. Población por grupos de edad según Territorio Histórico y sexo. CAPV 2018

Sarrera

Euskadiko toxikomaniei buruzko informazio-sistema (TIS) osatzen duten adierazleen multzoak hauei buruzko informazioa biltzen du: EAEko tratamendu ambulatorioko zentroetan substantzia psikoaktiboaren kontsumoaren ondoriozko tratamenduan onartutako pertsonen datuak; substantzia psikoaktiboaren kontsumoa aipatzen den ospitale-larrialdien datuak; eta substantzia horiekiko erreakzio akutuari loturiko heriotza-tasaren datuak.

Ez da, beraz, kontsumoari buruzko inkesta bat, kontsumo horiek eragindako osasun-ondorioei buruzko populazio-erregistroa baizik (tratamenduaren hasiera, larrialdietan artatzea eta heriotza-tasa). Erregistroak 1991z geroztiko informazioa biltzen du.

Tratamenduaren hasiera

Droga-mendekotasuna izateagatik tratatzea onartu den kopuruak % 25 egin du behera 1996 eta 2018 urteen artean (2.058 kasu izatetik, 1.546 izatera).

2018 urtean, guztira 1.546 pertsonak ekin zioten toxikomania ez alkoholikoak tratatzeari. Horietatik, % 36an kokaina zen droga nagusia (mendekotasuna eragiten duen substantzia, edo, terapeuten iritzian, arazo kliniko, psikologiko edo sozial nagusiak eragiten dituena); % 30ean, cannabis; % 14an, heroína; % 13an, anfetaminak; eta % 7an beste substantzia batzuk.

Urteotako joera aztertuta, aldaketa handiak sumatzen dira portaeretan. Heroinaren kasuan, beherakada handia; kokainaren kasuan, intzidentzia handia 2004 eta 2008 urteen artean, 2016tik berriro ere gora egin du; eta cannabisaren kasuan, goranzko joera etengabea. Anfetaminaren ondoriozko asistentzien kopuruak gora egin du 2014tik hona eta 2018an erregistratu dira eskari gehien.

Alkoholaren kasuan, 2001an, 2013an eta 2018an erregistratu dira eskari gehien eta Erregistro hasieratik gaur egunera arte tratamendua eskatzen duten emakumeen kopuruak gora egin du pixkanaka.

Introducción

El Sistema de Información sobre Toxicomanías (SIT) del País Vasco es un conjunto de indicadores que aporta información sobre las personas admitidas a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en centros de tratamiento ambulatorio de la CAPV, así como de urgencias hospitalarias en las que se menciona un consumo de sustancias psicoactivas y de la mortalidad por reacción aguda a dichas sustancias.

No se trata, por tanto, de una encuesta de consumos, sino de un registro poblacional de las consecuencias en la salud derivadas de estos consumos: inicio de tratamiento, asistencia a urgencias y mortalidad. Este Registro incluye información desde 1991.

Inicio de tratamiento

Entre 1996 y 2018 el nº de admisiones a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas ha disminuido un 25%, pasando de 2.058 casos a 1.546.

En 2018 un total de 1.546 personas iniciaron tratamiento por toxicomanías no alcohólicas. Un 36% consumía cocaína como droga principal (sustancia que causa dependencia o la que el terapeuta considera causante de los problemas clínicos, psicológicos o sociales más importantes), un 30% cannabis, un 14% heroína, un 13% anfetaminas y un 7% otras sustancias.

Se mantiene el cambio de tendencia que se venía observando en años anteriores respecto a los patrones de consumo de las personas que demandan tratamiento. Descenso muy pronunciado de la heroína; la cocaína, que tuvo una mayor incidencia entre 2004 y 2008, ha vuelto a repuntar desde 2016; y el cannabis muestra una tendencia de incremento sostenido. Las admisiones a tratamiento por anfetaminas se han incrementado desde 2014 siendo 2018, el año en el que se ha registrado el mayor número de demandas.

En el caso del alcohol, los años 2001, 2013 y 2018 son los que mayor número de admisiones registraron, reflejándose un aumento paulatino de las mujeres que solicitan tratamiento desde el inicio del registro hasta la actualidad.

Tratamendua hasteko adinari dagokionez, 2018an mendekotasunen tratamendua lehen aldiz hasi zuten pertsonetan cannabis-kontsumitzaileak ziren gazteenak), kokaina-, anfetamina- eta heroína-mendekotasuna zutenen aurretik). Azkenik, alkohol-mendekotasunaren tratamendua hasten duten pertsonak dira adintsuenak

Ikasketa-mailari dagokionez, beste batzuetan ezik, substantzia guztietan gailentzen dira derrigorrezko lehen hezkuntza bakarrik gainditu dutenak.

Lan-egoerari dagokionez, langabezia geratutako pertsonena da talde nagusia (% 33), eta lan-harreman mugagabea dutenena edo norbere konturako langileena datoz gero (% 27). Tratamenduan onartutako pertsonen artean, langabezia-egoeraren eta substantziaren arteko lotura hau da: heroína (% 55), anfetaminak (% 44), kokaina (% 37), alkohola (% 29) eta cannabis (% 26). Cannabisaren kasuan, gainera, %15 langabezia dago, inoiz lanik egin gabe.

Aurreko urteetan bezala heroína eta alkohola dira kontsumo-aldi luzeeneko substantziak: 48% eta 46% hurrenez hurren 25 urteko edo gehiagoko historiala dutenak. Kokainaren kasuan, kasuen % 41an kontsumo-historia 15 urte baino gehiagokoa zen.

Heroína-mendekotasuna tratatzeari ekin ziotenetatik, % 8ak positibo eman zuten GIBa detektatzeko proban; % 70ek, negatibo. Gainerako substantzietan, oro har, ez da datu hori ezagutzen.

Sustantzia guztien multzorako %41ean ez da ezagutzen C hepatitisaren testari buruzko egoera.

Alkohol-mendekotasuna tratatzen ari direnen artean ere gehiengoa langabezia dago edo lan-kontratu mugagabea du/norbere konturako langilea da. Alabaina, emakumeetatik % 8k etxeko lanak soilik egiten ditu; gizonetan, batek ere ez.

Al igual que en años anteriores, las personas que inician tratamiento por consumo de cannabis son las más jóvenes y en todos los casos (heroína, anfetaminas, cocaína, cannabis y alcohol) la proporción de hombres es muy superior a la de las mujeres. Las personas que inician tratamiento por consumo de alcohol son las que tienen mayor edad.

Con respecto al nivel de estudios, excepto en el grupo de "otras", en todas las sustancias predominan las personas que solo han terminado la educación primaria obligatoria.

En cuanto a la situación laboral, el mayor número de casos se concentraba en las personas paradas que habían trabajado antes (33%), seguido de las que tenían una relación laboral indefinida o eran autónomas (27%). Entre las personas admitidas a tratamiento la proporción de quienes estaban en desempleo (habiendo trabajado antes) presentaba el siguiente gradiente en función de la sustancia: heroína (55%), anfetaminas (44%), cocaína (37%), alcohol (29%) y cannabis (26%) aunque en el caso del cannabis, además un 15% se encuentra en paro no habiendo trabajado nunca.

Como en años anteriores la heroína y el alcohol fueron las sustancias de mayor duración temporal de consumo, con un 48 y 46%, respectivamente, de población admitida a tratamiento con un historial de 25 o más años. En el caso de la cocaína el 41% de los casos tenía una historia de consumo de más de 15 años.

El 8% de las personas que iniciaron tratamiento por heroína presentaron resultado positivo en la prueba de detección del VIH y en el 70% fue negativo. En el resto de sustancias este dato era desconocido en la mayoría de los casos.

Para el conjunto de todas las sustancias en el 41% no se conoce la situación sobre el test de la hepatitis C.

También se da una mayoría de personas en tratamiento por alcohol en paro o con trabajo indefinido/autónomo, pero en el caso de las mujeres un 8% de las mismas realizan exclusivamente labores del hogar, frente al 0% de esta categoría en hombres.

Substantzien erabilera aipatzen den larrialdiak

Ospitaleko larrialdietan artatutako pertsonetatik % 72 gizonetzkoak ziren; % 28, emakumezkoak. Pazienteen adina, batez beste, 36 urte izan zen kasu bietan. Drogen edo substantzia psikoaktiboen kontsumoa aipatu zen ospitale-larrialdiko gertaeren % 40an asistentzia-beharrak lotura zuzena zuen kontsumoarekin berarekin.

Ospitale-larrialdiaren substantzia-eragile nagusia, gizonetan, alkohola eta hipnotiko eta lasaigarriak izan ziren (% 19). Ondoren, alkohola (% 17), eta kokaina (% 16).

Alabaina, emakumetan, hipnotiko eta lasaigarriak droga nagusiak ziren (%38), eta bigarren alkohola (%14).

Droga-erabilera aipatu zen ospitale-larrialdietan, diagnostiko ohikoena buru- eta portaera-nahasmenduen taldekoa zen (GNS-10: F00-F99):

Substantzia psikoaktiboekiko erreakzio akutuak eragindako heriotzak

2018an, 50 pertsona hil ziren substantzia psikoaktiboekiko erreakzio akuturen baten ondorioz (horietatik, 43 EAeko biztanleak ziren). % 78 gizonak ziren, batez beste, 50 urtekoak, eta % 22 emakumean, batez beste, 54 urtekoak. Bi sexuetan, heriotza-tasak egonkortzera egin badu ere urteotan guztiotan, bilakaera ez da berdina izan bi sexuetan. Gizonetan, apur bat egin du behera 2000ko hamarkadako lehen urteetan, 5,1ekoa zen adinaren arabera estandarizatutako heriotza-tasa 100.000 gizoneko, eta 4,0ra jaitxi da. Emakumetan, aldiz, goranzko joera oso txikia; 0,8koa zen estandarizatutako heriotza-tasa 100.000 emakumeko, eta 1,0koa da orain.

Erreakzio akutuz hildako pertsonetan gehien hautemandako substantzia kokaina izan zen (heriotzen % 38an), eta ondoren, eragin handiko lasaigarriak edo antipsikotikoak (% 36ean), alkohola (% 34an) eta anfetaminak (% 30).

Urgencias en las que se menciona uso de drogas

El 72% de las personas atendidas en urgencias hospitalarias fueron hombres y el 28% mujeres. La edad media, en ambos casos fue de 36 años. En el 40% de los episodios de urgencia hospitalaria en los que se mencionó consumo de drogas o sustancias psicoactivas, los episodios tenían relación directa con dichos consumos.

Entre las drogas relacionadas directamente con las urgencias hospitalarias atendidas en hombres, el cannabis y los hipnosedantes fueron las sustancias más frecuentes (19%). A continuación, se hallaba el alcohol (17%) y la cocaína (16%).

Sin embargo, en las mujeres los hipnosedantes ocupaban el primer lugar (38%) seguidos del alcohol (14%)

El diagnóstico asignado con más frecuencia en los episodios de urgencia hospitalaria con mención de uso de drogas fueron los incluidos en el grupo de trastornos mentales y del comportamiento (CIE-10: F00-F99):

Fallecimientos por reacción aguda a sustancias psicoactivas

En 2018, un total de 50 personas fallecieron por reacción aguda a sustancias psicoactivas (43 de ellas residentes en la CAPV). Un 78% del total fueron hombres, con 50 años de edad media, y el 22% restante mujeres, de 54 años de edad media. Si bien la tendencia temporal es hacia la estabilización de estas defunciones en ambos sexos, la evolución temporal ha sido diferente para cada sexo. En los hombres se ha observado una ligera disminución a partir de los primeros años de la década del 2000, con tasas estandarizadas por edad de alrededor de 5,1 casos por 100.000 hombres a 4,0. En las mujeres se aprecia una ligera tendencia a aumentar, ya que la tasa estandarizada ha pasado de 0,8 defunciones por 100.000 mujeres a 1,0.

Las sustancias más frecuentemente detectadas en personas fallecidas por reacción adversa fueron cocaína, (identificado en el 38% de las defunciones), tranquilizantes mayores o antipsicóticos (36%), alcohol (34%) y anfetaminas (30%).

Hildakoetan hautemandako 20 drogetatik, 13 benzodiazepinen familiakoak ziren, edota analgesiko opioideak, farmako antidepressiboak edo antipsikotikoak. Hildakoen profil-aldaketa agerian geratzen da Erregistroaren hasieratik. 2000. urtean, opiaceoak hildakoen %92an aurkitzen ziren.

Azkenik, aipatu behar da hildako pertsonak gero eta adintsuagoak direla. 2000 urtean, batez besteko heriotza-adina 34 urte zen gizonetan, eta 33 emakumetan; 2017an, 48 urte, gizonetan; eta 57 urte, emakumetan.

Materiala eta Metodoak

Txosten honetan agertzen diren datuak Euskal Autonomia Erkidegoko Toxikomaniei buruzko Informazio Sistematik (TIS) atera dira.

Hona hemen erabilitako adierazleak dira:

TRATAMENDU ADIERAZLEAK helburu hau du: urte jakin batean, toxikomaniak tratatzeko zentroetan (bai Osakidetza eta bai zentro itundu edo pribatuetan) substantzia psikoaktibo gehiegi kontsumitzeagatik edo mendekotasunagatik tratamenduari ekiten dioten pertsonen kopurua zein den jakitea, adin guztietakoak, bai egoiliarak eta ez egoiliarak EAEn.

Datuak jasotzeko protokoloa 2013an aldatu zen azken aldiz, eta, horrenbestez, 2018ko datuak azken protokolo horren arabera jaso dira⁽¹⁾. Beste aldagai batzuk sartu dira ordeko tratamenduak egiteari, injekzio-bidea erabiltzeari eta gaixotasun infektosoei buruz.

(1)- Drogen Espainiako Behatokia, Drogen Plan Nazionala (2013). "Substantzia psikoaktiboak kontsumitzeagatik tratamendua egiteko onartu direnak"; Madrid, 2013ko azaroa

LARRIALDI ADIERAZLEAREN helburua: 15-64 urtekoek substantzia edo droga psikoaktiboak hartzeagatik ospitaleko zenbat larrialdi-gertakari izan dituzten jakitea. Hauak dira 2018an EAeko erreferentziarako ospitaletzat hartu direnak erregistro honetarako, 5 astetan zehar: Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, Basurtuko

Cabe destacar que, entre las 20 drogas identificadas entre las personas fallecidas, 13 de las mismas bien pertenecían a la familia de las benzodiazepinas, o bien se trataba de analgésicos opioides, fármacos antidepressivos o antipsicóticos evidenciándose un cambio de perfil de las personas fallecidas desde el inicio del registro. En el año 2000 los opiáceos se encontraban en el 92% de los fallecidos.

También se observa un aumento de la edad media en este periodo pasando de 34 años en hombres y de 33 en mujeres, y en el año 2018, la edad media en hombres fue de 50 años y en mujeres de 54 años.

Material y métodos

Los datos que se presentan en este informe son los que pertenecen al Sistema de Información sobre Toxicomanías de la Comunidad Autónoma del País Vasco (SIT).

Los indicadores utilizados son:

EL INDICADOR DE TRATAMIENTO tiene como objetivo conocer el número anual de personas que inician tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, en un año dado, en los centros de tratamiento de toxicomanías, tanto de Osakidetza como de centros concertados o privados, de todas las edades, incluyendo residentes y no residentes en la CAPV.

El protocolo de recogida de datos sufre su última modificación en 2013 y por tanto los datos de 2018 se recogen según este último protocolo⁽¹⁾. Se han introducido nuevas variables sobre la realización de tratamientos sustitutivos, el uso de la vía inyectada y enfermedades infecciosas.

(1) Observatorio Español de Drogas, Plan Nacional de Drogas. (2013). Indicador "Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas" Madrid, noviembre 2013

INDICADOR DE URGENCIAS pretende conocer el número de episodios de urgencia hospitalaria en personas de 15 a 64 años en los que se menciona el uso de sustancias o drogas psicoactivas. En 2018 los hospitales que se han considerado de referencia de la CAPV para este registro, a lo largo de 5 semanas, han sido el Hospital Universitario de

Unibertsitate Ospitalea eta Galdakao-Usansoloko Ospitalea.

HILKORTASUN ADIERAZLEAren bidez jakin nahi da urtean zenbat pertsona hiltzen diren, gure erkidegoan, substantzia psikoaktiboak kontsumitzean (medikuak agindu gabe eta nahita) aurkako erreakzio akutuak izan dituztelako. 2017. urteaz gero, adin guztietako heriotzak sartzen dira (2016. urtera arte soilik jasotzen ziren 10 eta 64 urte arteko pertsonen heriotzak).

2018ko heriotza-tasak 10-64 urte bitarteko pertsonen gainekoak ziren.

Metodologiari buruzko informazio gehiagorako kontsultatu:

[Toxikomaniei Buruzko Informazio Sistema. TIES 2012](#)

Cruces, Hospital Universitario de Basurto y Hospital de Galdakao-Usansolo.


EI INDICADOR DE MORTALIDAD tiene como objetivo conocer el número anual de muertes por reacción adversa aguda tras el consumo no médico e intencional de sustancias psicoactivas en nuestra Comunidad. A partir de 2017 se incluyen los fallecimientos en todas las edades (hasta 2016 se registraban sólo los casos entre 10 y 64 años).

Las tasas de mortalidad de 2018 se han presentado para el rango de edad de 10 a 64.

Para más información sobre la metodología y cálculo de indicadores:

[Informe del Sistema de Información de Toxicomanías. SIT 2012](#)


1. grafikoa. Tratamendurako onartutakoen kopurua, berau eragin duen drogaren arabera. EAE 2018
Gráfico 1. Número de admisiones a tratamiento según la droga que lo motiva. CAPV 2018



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

2. grafikoa. Pertsonen tratamendua hasterakoan eta kontsumitzen hasterakoan daukaten batez besteko adina, droga nagusiaren arabera. EAE 2018

Gráfico 2. Edad media al inicio de tratamiento y edad media al inicio del consumo según droga principal. CAPV 2018



- Batez besteko adina tratamendua hasterakoan (lehenengoa bakarrik) - Edad media al inicio (sólo 1º tratamiento)
- Batez besteko adina kontsumitzen hasterakoan - Edad media inicio consumo

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

1. taula. TRATAMENDU ADIERAZLEA. Tratamendurako onartu diren pertsonen ezaugarriak, onarpen hori eragin duen drogaren arabera. EAE 2018

Tabla 1. INDICADOR DE TRATAMIENTO. Características de las personas que han sido admitidas a tratamiento según la droga que causa dicha admisión. CAPV 2018

	Heroina	Anfetaminak	Kokaina	Cannabisa	Alkohola	Beste batzuk	Guztira	
	Heroína	Anfetaminas	Cocaína	Cannabis	Alcohol	Otras	Todo	%
Kopuru osoa Nº total	192	197	550	464	1201	143	2.747	
Batez besteko adina Edad media	44.67	37.57	35.81	27.89	47.98	39.59	40.73	
Sexua Sexo								
Gizonak Hombres	83,9	74,6	89,6	85,6	74,7	78,3	2.207	80,3
Emakumeak Mujeres	16,1	25,4	10,4	14,4	25,3	21,7	540	19,7
Adin-taldea Grupo de edad								
10-14	0	0	0	0,2	0	0	1	0
15-19	0	3,6	2,7	29,7	0,7	0,7	169	6,2
20-24	1,6	3,6	8,2	18,5	1,7	7,7	172	6,3
25-29	4,2	10,7	15,6	14	4	12,6	246	9
30-34	7,8	17,3	18,2	11,6	7,7	14,7	317	11,5
35-39	7,3	21,8	20,7	10,3	10,4	16,1	367	13,4
40-44	24	23,4	17,1	6,3	14,6	16,8	414	15,1
45-49	25	9,6	10,9	5	15,2	9,1	346	12,6
50-54	19,8	8,6	5,3	2,8	15,6	11,2	300	10,9
55-59	7,8	1,5	0,7	0,9	14,1	9,1	208	7,6
60 edo gehiago / 60 ó más	2,6	0	0,5	0,6	16,1	2,1	207	7,5
Ikasketak Estudios								
Ez daki ez irakurtzen ez idazten No sabe ni leer ni escribir	1	0	0,4	0,6	0,6	0,7	15	0,5
Ez du derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu No ha finalizado la Educación Primaria obligatoria	15,6	13,7	12,2	12,7	9,1	16,8	316	11,5
Derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu du Ha finalizado la Educación Primaria obligatoria	40,1	39,1	31,8	40,3	29,9	23,8	909	33,1
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitu du Ha finalizado la Enseñanza Secundaria obligatoria	15,1	21,8	21,3	20,3	16,5	11,2	497	18,1
Batxilergoa edo maila ertaineko prestakuntza-ziklo bat amaitu du Ha finalizado Bachillerato o ciclo formativo de grado medio	17,7	15,7	21,5	15,5	21,8	25,9	554	20,2
Goi-mailako ikasketak amaitu ditu Ha finalizado estudios superiores	4,2	5,1	7,6	6,5	10,3	8,4	226	8,2
Ezezaguna Desconocido	6,3	4,6	5,3	4,1	11,8	13,3	230	8,4

	Heroina	Anfetaminas	Cocaína	Cannabis	Alcohol	Otras	Todo	%
Lan egoera								
Situación laboral								
<i>Lan-harreman mugagabea edo autonomoa</i> Relación laboral indefinida o autónomo	16,7	21,8	35,3	15,7	31,4	21,7	750	27,3
<i>Aldi baterako lan-harremana</i> Relación laboral temporal	7,8	13,7	12,2	10,8	10,2	8,4	293	10,7
<i>Soldatarik gabe, familiarentzako lanean</i> Trabajando sin sueldo para la familia	0	0,5	0,2	0,4	0,6	0	11	0,4
<i>Langabea, aurretik lanik egin gabea</i> Parado no habiendo trabajado antes	9,9	7,1	6,2	14,9	3,7	10,5	196	7,1
<i>Langabea, aurretik lana eginda</i> Parado, habiendo trabajado antes	55,2	43,7	36,7	26,1	28,6	39,9	916	33,3
<i>Ezintasun iraunkorra duena, pentsioduna</i> Incapacitado permanente, pensionista	6,8	8,6	4,2	3,4	17,8	9,8	297	10,8
<i>Ikasten edo oposizioak egiten</i> Estudiando u opositando	0	1	1,3	21,1	0,7	2,1	118	4,3
<i>Soilik etxeke lanak egiten</i> Realizando exclusivamente labores del hogar	0	0,5	0,2	0	2,2	0,7	29	1,1
<i>Beste egoera batean</i> En otra situación	2,1	3	1,6	5,8	2,4	2,1	78	2,8
<i>Ezezaguna</i> Desconocida	1,6	0	2,2	1,7	2,4	4,9	59	2,1
Bizilekua								
Lugar de residencia								
<i>Etxeak, etxebizitzak, apartamentuak</i> Casas, pisos, apartamento	80,2	73,6	86,5	81,9	86,7	83,9	2.316	84,3
<i>Espetxea, adingabeentzako barneratze-zentroa edo erreforma-zentroa</i> Prisión centro de reforma o internamiento menores	4,2	7,6	2,9	3,4	1,6	4,2	80	2,9
<i>Beste erakunde batzuk</i> Otras instituciones	4,2	7,1	2,7	4,5	3,7	2,8	107	3,9
<i>Pentsioak, hotelak eta ostatuak</i> Pensiones, hoteles, hostales	1,6	0,5	2	0,9	1,6	2,1	41	1,5
<i>Ostatu hartze ezegonkorra/behin-behinekoa</i> Alojamiento inestable/precario	4,7	6,1	2,7	3,9	2,7	3,5	92	3,3
<i>Beste lekuren bat</i> Otro lugar	3,6	4,6	1,6	4,3	1,8	2,8	71	2,6
<i>Ezezaguna</i> Desconocido	1,6	0,5	1,5	1,1	1,8	0,7	40	1,5
Bizikidetza								
Convivencia								
<i>Bakarrik</i> Solo/a	27,1	24,4	16,4	15,5	23,1	16,1	563	20,5
<i>Bikotekidearekin baino ez</i> Únicamente con pareja	11,5	10,7	13,8	5,8	17,5	11,9	373	13,6
<i>Seme-alabekin baino ez</i> Únicamente con hijos	4,2	4,1	3,6	1,1	5,3	3,5	110	4
<i>Bikotekidearekin eta seme-alabekin</i> Con pareja e hijos	8,3	9,1	13,5	8,8	20,4	16,1	417	15,2
<i>Gurasoekin edo jatorrizko familiarekin</i> Con padres o familia de origen	28,1	27,4	36	47,4	19	32,2	800	29,1
<i>Lagunekin</i> Con amigos	5,2	4,6	5,8	5	3,9	7,7	132	4,8
<i>Atxilotua</i> Detenido	3,6	7,6	4,7	5	2,2	2,8	101	3,7
<i>Erakunde batean, atxilotua egon gabe</i> En instituciones no detenido	6,8	7,1	3,1	7,1	4,7	4,2	140	5,1
<i>Beste batzuk</i> Otros	4,2	5,1	2,4	3,7	2,9	3,5	88	3,2
<i>Ezezaguna</i> Desconocida	1	0	0,7	0,6	0,9	2,1	23	0,8

	Heroina	Anfetaminak	Kokaina	Cannabisa	Alkohola	Beste batzuk	Guztira	
	Heroína	Anfetaminas	Cocaína	Cannabis	Alcohol	Otras	Todo	%
Jaioterria								
País de nacimiento								
Espainia España	87	92,4	84,5	73,3	83,3	87,4	2.280	83
Europako gainerako herrialdeak Otros países europeos	8,3	1,5	1,3	3,4	4,3	4,9	99	3,6
Afrika Países africanos	3	2	8,3	13,3	3,5	4,9	166	6
Amerika Países americanos	1	3,5	5,7	8	7,8	2,8	177	6,5
Asia Países asiáticos	0	0	0	0,4	0,1	0	3	0,1
Nazioarteak aitortzen ez dituen herrialdeak Países no reconocidos internacionalmente	0	0	0	0,2	0	0	1	0
Ezezaguna Desconocido	0,5	0,5	0,2	1,1	1,1	0	21	0,8
Erreferentzia								
Fuente de referencia								
Droga-mendekotasunen beste zerbitzu bat Otro servicio drogodependencias	18,2	10,7	8,9	5,4	4,9	4,9	196	7,1
Mediku orokorra, lehen mailako atentzioa Médico General, atención primaria de salud	15,6	19,8	22	22,2	40,4	32,2	824	30
Ospitalea edo bestelako osasun-zerbitzuak Hospital u otros servicios de salud	4,2	13,2	9,3	14	18,7	16,1	398	14,5
Gizarte-zerbitzuak Servicios sociales	0,5	7,1	2,2	5,2	3,4	0,7	93	3,4
Espetxea, adingabeentzako barneratze- zentroa edo erreforma-zentroa Prisión, centro de reforma o internamiento menores	4,2	5,6	5,5	6,9	2,2	6,3	116	4,2
Lege-zerbitzuak edo polizia-zerbitzuak Servicios legales o policiales	0,5	8,1	3,3	14	1,7	2,1	123	4,5
Enpresa edo enplegu-emailea Empresa o empleador	0	0,5	0,4	0,2	0	0	4	0,1
Senideak edo lagunak Familiares o amigos	3,6	11,2	13,3	8,4	9,1	9,1	263	9,6
Norberaren ekimenez Iniciativa propia	48,4	22,8	33,8	20,9	17,6	28,7	673	24,5
Hezkuntza-zerbitzuak Servicios de educación	0	0	0,4	0,4	0,1	0	5	0,2
Besteren bat Otra	2,1	0,5	0,4	1,7	1,4	0	32	1,2
Ezezaguna Desconocida	2,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0	20	0,7
Aurretik beste tratamendurik								
Tratamiento previo								
Bai, droga beragatik Sí, por la misma droga	78,6	46,2	48,7	29,3	46	54,5	1.276	46,5
Bai, bestelako droga batengatik Sí, por una droga diferente	2,6	5,1	1,5	2,2	1,6	2,8	56	2
Bai, droga beragatik eta bestelako droga batengatik Sí, por la misma droga y por una droga diferente	7,8	3,6	3,8	5,8	2,1	4,9	102	3,7
Ez, inoiz ez No, nunca	8,3	43,7	45,1	62,7	48,6	33,6	1.273	46,3
Ezezaguna Desconocido	2,6	1,5	0,9	0	1,7	4,2	40	1,5

	Heroina	Anfetaminak	Kokaina	Cannabisa	Alkohola	Beste batzuk	Guztira	
	Heroína	Anfetaminas	Cocaína	Cannabis	Alcohol	Otras	Todo	%
Kontsumo denbora								
Tiempo de consumo (en años)								
0-2	3,1	6,1	5,8	9,3	1,4	7	120	4,4
3-5	4,7	6,6	8,2	19,8	2,4	9,1	201	7,3
6-10	11,5	11,7	16	21,1	5,5	8,4	309	11,2
11-15	9,4	13,7	20,5	13,6	6,3	12,6	315	11,5
16-20	7,3	17,3	18	12,1	8,2	15,4	323	11,8
21-25	11,5	20,3	12,4	7,8	9,1	14,7	296	10,8
25 edo gehiago / 25 y más	47,9	14,7	10,9	9,5	45,7	19,6	802	29,2
Ezezaguna / desconocido	4,7	9,6	8,2	6,9	21,4	13,3	381	13,9
Kontsumoaren maiztasuna								
Frecuencia de consumo								
Egunero								
Todos los días	65,1	34	25,8	77,6	58,6	45,5	1.463	53,3
4-6 egun/aste								
4-6 días/semana	5,2	13,7	14	4,5	8,4	8,4	248	9
2-3 egun/aste								
2-3 días/semana	6,8	18,8	24,5	4,1	12,2	14,7	371	13,5
1 egun/aste								
1 día/semana	4,2	5,6	7,8	1,9	3	5,6	115	4,2
1 egun/aste baino gutxiago								
Menos de 1 día/semana	4,2	5,6	9,5	2,8	4,1	7	143	5,2
Ez zuen kontsumitu								
No consumió	14,1	20,8	17,1	8,4	13	16,1	380	13,8
Ezezaguna								
Desconocida	0,5	1,5	1,3	0,6	0,7	2,8	27	1
Kontsumitzeko bidea								
Vía de consumo								
Ahotik								
Oral	0	10,7	0	1,3	100	32,2	1.274	46,4
Biriketarik edo errez								
Pulmonar o fumada	64,1	1,5	10,7	98,7	0	13,3	662	24,1
Sudurretik edo esnifatuz								
Intranasal o esnifada	10,9	86,8	86	0	0	44,1	728	26,5
Parenterala edo xiringen bidez								
Parenteral o inyectada	22,9	0,5	2,2	0	0	6,3	66	2,4
Besteren bat								
Otra	0,5	0	0	0	0	0,7	2	0,1
Ezezaguna								
Desconocida	1,6	0,5	1,1	0	0	3,5	15	0,5
GIB								
VIH								
Positiboa								
Positivo	8,3	2,5	2,7	0,6	0,7	5,6	56	2
Negatiboa								
Negativo	70,8	52,3	46,9	34,5	30,8	42	1.087	39,6
Emaitzaren zain								
Pendiente de resultado	0,5	0	0,5	0,9	0,4	0,7	14	0,5
Ezezaguna								
Desconocido	20,3	45,2	49,8	64	68	51,7	1.590	57,9
GUZTIRA TOTAL	100	100	100	100	100	100	2.747	100

Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

2. taula. TRATAMENDU ADIERAZLEA. *Toxikomania ez alkoholikoengatik tratamendua hastea onartutakoen bilakaera**, tratamenduan hastea eragin duen drogaren arabera. EAE 1996-2018

Tabla 2. INDICADOR DE TRATAMIENTO. Evolución* del número de admisiones a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas según droga que motiva la admisión. CAPV 1996-2018

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
HASITAKOEN KOP. GUZTIRA Nº DE INICIOS TOTAL	2.058	1.886	1.652	1.494	1.408	1.432	1.443	1.728	1.894	1.818	1.701	1.671	1.804	1.671	1.666	1.552	1.576	1.484	1.466	1.405	1.392	1.449	1.546	
DROGA NAGUSIA DROGA PRINCIPAL																								
<i>Heroina</i> Heróina	1755	1502	1233	945	897	849	728	636	611	515	504	435	467	442	423	330	301	253	224	237	198	174	192	
<i>Kokaina</i> Cocaína	95	139	195	326	322	377	438	735	902	941	833	826	904	768	710	655	600	529	463	404	456	540	550	
<i>Anfetaminak</i> Anfetaminas	51	62	42	46	40	41	85	68	73	65	55	75	68	72	69	84	70	95	132	140	155	134	178	
<i>Speeda</i> Speed	28	51	50	53	32	19	44	55	62	52	61	65	75	66	58	63	76	61	41	38	31	24	19	
<i>Extasia</i> Éxtasis	17	15	15	10	13	21	14	5	2	2	0	4	1	2	1	1	0	0	5	1	2	3	1	
<i>Hipnotikoa eta lasaigarria</i> Hipnóticos y sedantes	13	22	10	7	15	8	10	15	16	17	3	11	12	11	15	21	24	20	20	14	23	17	16	
<i>Haluzinogenoak</i> Alucinógenos	8	5	3	1	1	1	2	3	4	4	1	4	4	7	8	18	17	22	13	13	12	11	9	
<i>Cannabisa</i> Cannabis	68	68	84	90	73	106	115	150	177	183	189	208	235	269	346	352	455	472	472	472	439	430	464	
<i>Heroina+kokaina</i> Heróina+cocaína	0	0	0	0	0	0	0	0	25	23	17	15	6	9	6	6	7	4	19	19	17	29	28	
<i>Beste zerbaít**</i> Otros**	23	22	20	16	15	10	7	61	22	16	38	28	32	25	30	22	26	28	77	67	59	87	89	

* 1996tik aurrera, beste substantzia psikoaktibo batzuek (heroina eta kokainaz gain) eragindako tratamendu-hasierak jakinarazteari ekin zitzaion

* A partir de 1996 se comienzan a notificar los inicios de tratamiento por otras sustancias psicoactivas además de heroína y cocaína

** Honako hauek barne hartzen ditu: "Bestelako opiazeoak", "Beste substantzia psikoaktibo batzuk", "Beste estimulatzaile batzuk" eta "Substantzia lurrunkorak".


** Incluye: "Otros opiáceos", "Otras sustancias psicoactivas", "Otros estimulantes" y "Sustancias volátiles".

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

3. grafikoa. *Tratamendurako onarpen kopuruaren bilakaera, heroína, kokaina eta cannabisaren kasuetan. EAE 1991-2018*


Gráfico 3. Evolución del número de admisiones a tratamiento por heroína, cocaína y cannabis. CAPV 1991-2018



Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

4. grafikoa. *Heroina* abusuagatik edo mendekotasunagatik emandako tratamendu kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendurik egin izanaren edo ez izanaren arabera. EAE 1996-2018


Gráfico 4. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de *heroína* según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2018



Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

4.1 grafikoa. *Espainian* 1996-2018n *heroína* abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera


Gráfico 4.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de *heroína* en España 1996-2018



Iturria: Drogei buruzko Espainiako Behatokiak (DEB) emandako datuak, argitaratu gabe. Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioa.
 Fuente: Datos no publicados facilitados por el Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

5. grafikoa. Kokaina abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua jaso izanaren edo jaso ez izanaren arabera. EAE 1996-2018


Gráfico 5. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2018



Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

5.1 grafikoa. Espainian 1996-2018n kokaina abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera


Gráfico 5.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína en España 1996-2018



Iturria: Drogei buruzko Espainiako Behatokiak (DEB) emandako datuak, argitaratu gabe. Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioa
Fuente: Datos no publicados facilitados por el Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad, consumo y bienestar social.

6. grafikoa. *Cannabis* abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 1996-2018


Gráfico 6. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de *cannabis* según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2018



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

6.1. grafikoa. *Espainian* 1996-2018n *cannabis* abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera


Gráfico 6.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de *cannabis* en España 1996-2018



Iturria: Drogei buruzko Espainiako Behatokiak (DEB) emandako datuak, argitaratu gabe. Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioa
Fuente: Datos no publicados facilitados por el Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad, consumo y bienestar social

7. grafikoa. Alkohol abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 1996-2018

Gráfico 7. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de alcohol según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2018



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitarias. Departamento de Salud

3. taula. TRATAMENDU ADIERAZLEA. Alkohol kontsumoaren tratamendurako onarpenen ezaugarriak. EAE 2018

Tabla 3. INDICADOR DE TRATAMIENTO. Características de las admisiones a tratamiento por consumo de alcohol. CAPV 2018

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
Kopurua, guztira Número total	897	304	1.201	
<i>Batez besteko adina tratamendua hastean (urtetan)</i> Edad media al inicio de tratamiento (en años)	47.98	47.96	47.98	
<i>Batez besteko adina kontsumoa hastean (urtetan)</i> Edad media al inicio del consumo (en años)	18.24	22.96	19.45	
	%	%	Kop./Nº	%
Lurralde historikoa Territorio Histórico				
Araba/Alava	22,6	20,7	266	22,1
Gipuzkoa	30,2	30,3	363	30,2
Bizkaia	47,2	49	572	47,6
Ikasketak Estudios				
<i>Ez daki ez irakurtzen ez idazten</i> No sabe ni leer ni escribir	0,8	0	7	0,6
<i>Ez du derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu</i> No ha finalizado la Educación Primaria obligatoria	9,6	7,6	109	9,1
<i>Derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu du</i> Ha finalizado la Educación Primaria obligatoria	30,4	28,3	359	29,9
<i>Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitu du</i> Ha finalizado la Enseñanza Secundaria obligatoria	15,7	18,8	198	16,5
<i>Batxilergoa edo maila ertaineko prestakuntza-ziklo bat amaitu du</i> Ha finalizado Bachillerato o ciclo formativo de grado medio	22,1	21,1	262	21,8
<i>Goi-mailako ikasketak amaitu ditu</i> Ha finalizado estudios superiores	8,9	14,5	124	10,3
<i>Ezezaguna</i> Desconocido	12,5	9,9	142	11,8
Lan egoera Situación laboral				
<i>Lan harreman mugagabea edo aldi baterakoa</i> Relación laboral indefinida o autónomo	33	26,6	377	31,4
<i>Aldi baterako lan harremana</i> Relación laboral temporal	9,4	12,5	122	10,2
<i>Lanean, familiarentzako soldatarik gabe</i> Trabajando sin sueldo para la familia	0,1	2	7	0,6
<i>Langabetua, aurretik lan egin gabekoa</i> Parado no habiendo trabajado antes	3,5	4,6	45	3,7
<i>Langabetua, aurretik lan egindakoa</i> Parado, habiendo trabajado antes	28,4	29,3	344	28,6
<i>Ezindu iraunkorra, pentsioduna</i> Incapacitado permanente, pensionista	19,6	12,5	214	17,8
<i>Ikasten edo oposizioak egiten</i> Estudiando u opositando	0,8	0,3	8	0,7
<i>Etxeko lanak bakarrik egiten ditu</i> Realizando exclusivamente labores del hogar	0,3	7,6	26	2,2
<i>Beste egoera batean</i> En otra situación	2,7	1,6	29	2,4
<i>Ezezaguna</i> Desconocida	2,2	3	29	2,4


	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
Jaioterra				
País de nacimiento				
Espainia España	84,3	80,6	1.001	83,3
Europako beste herrialde batzuk Resto Europa	4,3	3,3	50	4,3
Afrikako herrialdeak Países africanos	4,4	0,3	42	3,5
Ameriketako herrialdeak Países americanos	5,3	14,4	94	7,8
Asiako herrialdeak Países asiáticos	0	0,3	1	0,1
Nazioarteak aitortzen ez dituen herrialdeak Países no reconocidos internacionalmente	0	0	0	0
Ezezaguna Desconocido	1,1	1	13	1,1
Bizikidetz				
Convivencia				
Bakarrik Solo/a	24	20,7	278	23,1
Bikotekidearekin bakarrik Únicamente con pareja	17,3	18,1	210	17,5
Seme-alabekin bakarrik Únicamente con hijos	2,2	14,5	64	5,3
Bikotekidearekin eta seme-alabekin Con la pareja e hijos	20,8	19,1	245	20,4
Gurasoekin edo berezko familiarekin Con padres o familia de origen	20,4	14,8	228	19
Lagunekin Con amigos	3,9	3,9	47	3,9
Atxilotua Detenido	2,8	0,3	26	2,2
Erakunde batean, atxilotua egon gabe En instituciones no detenido	4,9	4,3	57	4,7
Beste batzuk Otros	2,9	3	35	2,9
Ezezaguna Desconocida	0,8	1,3	11	0,9
Erreferentzia				
Referencia				
Beste drogomendekotasun zerbitzu bat Otro servicio Drogodependencias	5,2	3,9	59	4,9
Mediku orokorra, lehen mailako arreta Médico General, atención primaria de salud	39,6	42,8	485	40,4
Ospitalea edo beste osasun zerbitzu batzuk Hospital u otros servicios de salud	17,8	21,4	225	18,7
Gizarte zerbitzuak Servicios sociales	3,5	3,3	41	3,4
Espeixea, gazteentzako zentzate-zentroa edo zentro itxia Prisión, centro de reforma o internamiento menores	2,9	0	26	2,2
Lege edo polizia zerbitzuak Servicios legales o policiales	1,8	1,3	20	1,7
Enpresa edo enplegu emailea Empresa o empleador	0	0	0	0
Senideak edo lagunak Familiares o amigos	9,6	7,6	109	9,1
Bere kabuz Iniciativa propia	17,7	17,1	211	17,6

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
Hezkuntza-zerbitzuak Servicios de educación	0	0,3	1	0,1
Besteren bat Otra	1,2	2	17	1,4
Ezezaguna Desconocida	0,7	0,3	7	0,6
Aurretik beste tratamendurik Tratamiento previo				
Bai, droga beragatik Sí, por la misma droga	46,5	44,4	552	46
Bai, bestelako droga batengatik Sí, por una droga diferente	1,9	0,7	19	1,6
Bai, droga beragatik eta bestelako droga batengatik Sí, por la misma droga y por una droga diferente	2	2,3	25	2,1
Ez, inoiz ez No, nunca	48,2	50	584	48,6
Ezezaguna Desconocido	1,4	2,6	21	1,7
Kontsumoaren maiztasuna Frecuencia de consumo				
Egunero Todos los días	60	54,6	704	58,6
4-6 egun/aste 4-6 días/semana	8,2	8,9	101	8,4
2-3 egun/aste 2-3 días/semana	11,4	14,5	146	12,2
1 egun/aste 1 día/semana	2,8	3,6	36	3
1 egun/aste baino gutxiago Menos de 1 día/semana	3,3	6,3	49	4,1
Ez zuen kontsumitu No consumió	13,5	11,5	156	13
Ezezaguna Desconocida	0,8	0,7	9	0,7
Kontsumo denbora Tiempo de consumo				
0-2	1	2,6	17	1,4
3-5	1,9	3,9	29	2,4
6-10	5	6,9	66	5,5
11-15	5,5	8,9	76	6,3
16-20	8,2	7,9	98	8,2
21-25	9,3	8,6	109	9,1
25 y +	47,4	40,8	549	45,7
Ezezaguna/Desconocido	21,7	20,4	257	21,4
GUZTIRA TOTAL	100	100	1.201	100

Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

8. grafikoa. Alkoholagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1996-2018


Gráfico 8. Evolución del número de admisiones a tratamiento por alcohol, según sexo. CAPV 1996-2018



Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitarias. Departamento de Salud

9. grafikoa. Aurretik opiazeoekin ordezeko tratamendu bat egin eta tratamendua egiteko onartu diren pertsonak. EAE 2018


Gráfico 9. Personas admitidas a tratamiento que han realizado previamente tratamiento sustitutivo con opiáceos. CAPV 2018



Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Salla
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitarias. Departamento de Salud

10. grafikoa. Injekzio-bidea erabiltzea tratamendurako onartutako pertsonekin. EAE 2018


Gráfico 10. Uso de la vía inyectada en las admisiones a tratamiento. CAPV 2018



Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Salla
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitarias. Departamento de Salud


11. grafikoa. GIB testaren egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. EAE 2018

Gráfico 11. Situación test VIH en las admisiones a tratamiento. CAPV 2018



11.1. grafikoa. GIB birusarekiko serologia-egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. EAE 2018


Gráfico 11.1 Estado serológico frente al VIH en las admisiones a tratamiento. CAPV 2018



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitarias. Departamento de Salud


12. grafikoa. C Hepatitisaren testa tratamendurako onartutako pertsonekin. EAE 2018

Gráfico 12. Situación test Hepatitis C en las admisiones a tratamiento. CAPV 2018



12.1. grafikoa. C Hepatitisarekiko serologia-egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. EAE 2018


Gráfico 12.1. Estado serológico frente a Hepatitis C en las admisiones a tratamiento. CAPV 2018



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitarias. Departamento de Salud

13.grafikoa. B Hepatitisarekiko egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. EAE 2018

Gráfico 13. Situación Hepatitis B en las personas admitidas a tratamiento. CAPV 2018



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitarias. Departamento de Salud

4. taula. LARRIALDI ADIERAZLEA. *Substantzia psikoaktiboen kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien ezaugarriak. EAEko erreferentziatzko ospitaleak 2018*

Tabla 4. INDICADOR URGENCIAS. Características de los episodios de urgencias en los que se menciona consumo de sustancias psicoactivas. Hospitales de referencia CAPV 2018.

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
Batez besteko adina Edad media (en años)	36,39	36,10		
Gertakari kopurua Nº de episodios	318	124	442	
	%	%	Kop./Nº	%
Ospitalea Hospital				
<i>Basurtuko Unibertsitate ospitalea</i> Hospital Universitario de Basurto	43,08	38,71	185	41,86
<i>Gurutzetako Unibertsitate ospitalea</i> Hospital Universitario de Cruces	35,53	35,48	157	35,52
<i>Galdakaoko ospitalea</i> Hospital Galdakao	21,38	25,81	100	22,62
Adin taldea Grupo de edad				
15-19	8,49	8,06	37	8,37
20-24	9,43	7,26	39	8,82
25-29	12,58	15,32	59	13,35
30-34	11,95	9,68	50	11,31
35-39	15,72	21,77	77	17,42
40-44	16,98	17,74	76	17,19
45-49	10,69	9,68	46	10,41
50-54	6,92	4,84	28	6,33
55-59	5,03	4,84	22	4,98
60-64	2,2	0,81	8	1,81
Ebidentzia Evidencia				
<i>Kontsumoarekin harreman zuzena</i> Relación directa con el consumo	36,16	50,00	177	40,05
<i>Harreman zuzenik ez</i> No relación directa	63,84	50,00	265	59,95
Bukaera Resolución				
<i>Medikuaren alta</i> Alta médica	72,33	72,58	320	72,40
<i>Borondatezko alta</i> Alta voluntaria	1,89	0,81	7	1,58
<i>Ospitaleratzea</i> Ingreso hospitalario	22,33	18,55	94	21,27
<i>Heriotza</i> Muerte	0	0	0	0
<i>Beste osasun zentro batera eramatea</i> Traslado a otro centro sanitario	3,46	8,06	21	4,75
<i>Ezezaguna</i> Desconocida	0	0	0	0

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
Asteke eguna Día de la semana				
Astelehena Lunes	16,04	12,9	67	15,16
Asteartea Martes	16,98	16,94	75	16,97
Asteazkena Miércoles	12,58	15,32	59	13,35
Osteguna Jueves	13,21	12,1	57	12,9
Ostirala Viernes	14,78	12,9	63	14,25
Larunbata Sábado	10,38	16,13	53	11,99
Igandea Domingo	16,04	13,71	68	15,38
Larrialdi astea Semana de la urgencia				
Urtarrila Enero	17,61	17,74	78	17,65
Otsaila Febrero	22,96	16,13	93	21,04
Martxoa Marzo	21,38	25	99	22,4
Apirila Abril	19,18	17,74	83	18,78
Maiatza Mayo	18,87	23,39	89	20,14

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

5. taula LARRIALDI ADIERAZLEA. Substantzia psikoaktiboen kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien 10 diagnostiko arruntenak, GNS 3 digitu multzoren arabera. EAEko erreferentziazko ospitaleak 2018

Tabla 5. INDICADOR DE URGENCIAS. 10 diagnósticos más frecuentes, por categorías CIE de 3 dígitos de los episodios de urgencias en los que se menciona consumo de sustancias psicoactivas. Hospitales de referencia CAPV 2018.

GNS-10 (3 digitu)	Diagnostiko multzoa	Kop./Nº			%	
		Gizonak	Emakumeak	Guztira	Gizonak	Emakumeak
CIE-10 (3 digitos)	Categoría diagnóstica	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
F10	Alcoholarekin lotutako nahasmenduak Trastornos relacionados con alcohol	30	16	46	6,7	8,4
F12	Cannabisarekin lotutako nahasmenduak Trastornos relacionados con cannabis	32	9	41	7,1	4,7
X61	Nahitako botika-pozoidura Intoxicación medicamentosa voluntaria	15	20	35	3,4	10,5
F41	Beste antsietate-nahasmendu batzuk Otros trastornos de ansiedad	26	8	34	5,8	4,2
F14	Kokainarekin lotutako nahasmenduak Trastornos relacionados con cocaína	24	9	33	5,4	4,7
F13	Lasaiagarirekin, hipnotikorekin edo ansiolitikorekin lotutako nahasmenduak Trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos	13	16	29	2,9	8,4
F15	Beste estimulante batzuekin lotutako nahasmenduak Trastornos relacionados con otros tipos de estimulantes	21	8	29	4,7	4,2
F60	Berariazko pertsonalitate-nahasmenduak Trastornos específicos de personalidad	11	8	19	2,5	4,2
R45	Egoera emozionalari eragiten dioten sintomak eta zeinuak Síntomas y signos que afectan al estado emocional	13	5	18	2,9	2,6
F29	Psikosi zehaztugabea, substantzia edo nahasmendu fisiologiko ezagun batek ez eragindakoa Psicosis no especificada no debida a sustancia o afección fisiológica conocidas	14	3	17	3,1	1,6

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

6. taula LARRIALDI ADIERAZLEA. Larrialdi-gertakarietan aipatutako substantzia psikoaktiboen banaketa, sexuaren arabera. EAEko erreferentziako ospitaleak 2018

Tabla 6. INDICADOR DE URGENCIAS. Distribución de las sustancias psicoactivas mencionadas en los episodios de urgencia según sexo. Hospitales de referencia CAPV 2018.

SEXUA - SEXO							
GIZONAK - HOMBRES				EMAKUMEAK - MUJERES			
AIPATUTAKO DROGA	Kop.			AIPATUTAKO DROGA	Kop.		
DROGA MENCIONADA	Nº	%*	%**	DROGA MENCIONADA	Nº	%*	%**
Cannabisa Cannabis	210	31,53	66%	Cannabisa Cannabis	65	27,7	52%
Alkohola Alcohol	138	20,7	43%	Hipnolasaigarriak Hipnóticos y Sedantes	50	21,3	40%
Kokaina Cocaína	102	15,3	32%	Alkohola Alcohol	47	20,0	38%
Anfetaminak Anfetaminas	67	10,1	21%	Kokaina Cocaína	26	11,1	21%
Hipnolasaigarriak Hipnóticos y Sedantes	57	8,6	18%	Anfetaminak Anfetaminas	23	9,8	19%
Heroina Heroína	22	3,3	7%	Beste subs. psikoaktibo batzuk Otras sust. psicoactivas	11	4,7	9%
Ezezaguna Desconocida	22	3,3	7%	Heroina Heroína	4	1,7	3%
Beste opiazeo batzuk Otros opiáceos	13	2,0	4%	Haluzinogenoak Alucinógenos	3	1,3	2%
Beste estimulatzaile batzuk Otros estimulantes	10	1,5	3%	Extasia Extasis	3	1,3	2%
Substantzia lurrunkorrek Sustancias volátiles	9	1,4	3%	Beste estimulatzaile batzuk Otros estimulantes	2	0,9	2%
Haluzinogenoak Alucinógenos	8	1,2	3%	Beste opiazeo batzuk Otros opiáceos	1	0,4	1%
Beste subs. psikoaktibo batzuk Otras sust. psicoactivas	8	1,2	3%	Ezezaguna Desconocida	0	0,0	0%
Extasia Extasis	0	0,0	0%	Substantzia lurrunkorrek Sustancias volátiles	0	0,0	0%
Speeda Speed	0	0,0	0%	Speeda Speed	0	0,0	0%
GUZTIRA TOTAL	666	100			235	100	

* Aipatutako droga guztien gaineko portzentaia.

* Porcentaje realizado sobre el total de drogas mencionadas.

** Jasotako larrialdi-gertakari guztien gaineko portzentaia.

**Porcentaje realizado sobre el total de episodios de urgencia recogidos.

Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Eregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

7. taula. LARRIALDI ADIERAZLEA. Larrialdi-gertakariarekin lotuta dauden substantzia psikoaktiboen banaketa, sexuaren arabera. EAEko erreferentziatzko ospitaleak 2018

Tabla 7. INDICADOR DE URGENCIAS. Distribución de las sustancias psicoactivas relacionadas en los episodios de urgencia según sexo. Hospitales de referencia CAPV 2018.

SEXUA - SEXO							
GIZONAK - HOMBRES				EMAKUMEAK - MUJERES			
LOTUTAKO DROGA	Kop.			LOTUTAKO DROGA	Kop.		
DROGA RELACIONADA	Nº	%*	%**	DROGA RELACIONADA	Nº	%*	%**
Cannabisa Cannabis	44	19,38	14%	Hipnolasaigarriak Hipnóticos y Sedantes	46	38,0	37%
Hipnolasaigarriak Hipnóticos y Sedantes	43	18,94	14%	Alkohola Alcohol	17	14,1	14%
Alkohola Alcohol	39	17,2	12%	Cannabisa Cannabis	15	12,4	12%
Kokaina Cocaína	36	15,9	11%	Kokaina Cocaína	12	9,9	10%
Anfetaminak Anfetaminas	24	10,6	8%	Beste subs. psikoaktibo batzuk Otras sust. psicoactivas	9	7,4	7%
Beste opiazeo batzuk Otros opiáceos	9	4,0	3%	Anfetaminak Anfetaminas	8	6,6	6%
Heroina Heroína	8	3,5	3%	Ezezaguna Desconocida	8	6,6	6%
Beste subs. psikoaktibo batzuk Otras sust. psicoactivas	7	3,1	2%	Beste opiazeo batzuk Otros opiáceos	2	1,7	2%
Ezezaguna Desconocida	6	2,6	2%	Extasia Extasis	2	1,7	2%
Substantzia lurrunkorak Sustancias volátiles	4	1,8	1%	Haluzinogenoak Alucinógenos	1	0,8	1%
Haluzinogenoak Alucinógenos	4	1,8	1%	Heroina Heroína	1	0,8	1%
Beste estimulatzaile batzuk Otros estimulantes	3	1,3	1%	Substantzia lurrunkorak Sustancias volátiles	0	0,0	0%
Extasia Extasis	0	0,0	0%	Speeda Speed	0	0,0	0%
Speeda Speed	0	0,0	0%	Beste estimulatzaile batzuk Otros estimulantes	0	0,0	0%
GUZTIRA TOTAL	227	100			121	100	

* Lotutako droga guztien gaineko portzentaia.

* Porcentaje realizado sobre el total de drogas relacionadas .

**Larrialdi-gertakari guztiekin zuzenean erlazionatutako droga guztiak kontuan hartuta ateratako ehunekoa

**Porcentaje realizado sobre el total de episodios de urgencia recogidos.

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.


Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

8. taula. HILKORTASUN ADIERAZLEA. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuek eragindako heriotzen ezaugarriak. EAE 2018

Tabla 8. INDICADOR MORTALIDAD. Características de los fallecimientos por reacción aguda a sustancias psicoactivas. CAPV 2018

	Kop. - N°	%
KOPURUA, GUZTIRA		
NÚMERO TOTAL	50	
AMEE Zuzendariordeztzak		
Subdirecciones IVML		
AMEE Araba - IVML Álava	6	12,0
AMEE Gipuzkoa - IVML Gipuzkoa	11	22,0
AMEE BIZKAIA - IVML Bizkaia	33	66,0
Sexua		
Sexo		
Gizonak - Hombre	39	78,0
Emakumeak - Mujer	11	22,0
Batez besteko adina		
Edad media		
Gizonak - Hombre	50,0	
Emakumeak - Mujer	54,3	
Adin taldea		
Grupo de edad		
30-34	2	4,0
35-39	5	10,0
40-44	8	16,0
45-49	5	10,0
50-54	12	24,0
55-59	9	18,0
60-64	4	8,0
65-69	2	4,0
70-74	3	6,0
Hilotzaren jatorria		
Procedencia del cadáver		
Etxea - Domicilio	37	74,0
Hotela edo ostatua - Hotel o pensión	1	2,0
kalea - Calle	5	10,0
Establezimendu publikoa - Establecimiento público	1	2,0
Ospitalea - Hospital	1	2,0
Beste - Otros	1	2,0
Ezezaguna - Desconocido	4	8,0
GIB		
VIH		
Positiboa - Positivo	7	14,0
Negatiboa - Negativo	26	52,0
Ezezaguna - Desconocido	17	34,0
Suizidioa		
Suicidio		
Ebidentziak daude - Sí hay evidencias	17	34,0
Ez dago ebidentziarik - No hay evidencias	33	66,0

14. grafikoa Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuaren ondoriozko hilkortasun tasaren* bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1998-2018
Gráfico 14. Evolución de la tasa* de mortalidad por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAPV 1998-2018



* Adinaren arabera, 2013ko Europar populazio estandarrera egokituta, 100.000 biztanlerako tasak.

* Tasas por 100.000 habitantes, ajustadas por edad a la población europea estándar 2013

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

9 taula. HILKORTASUN ADIERAZLEA. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioen ondorioz hildakoek heriotzaren aurretik kontsumitutako substantzia psikoaktiboen banaketa. EAE 2018

Tabla 9. INDICADOR DE MORTALIDAD. Distribución de las sustancias psicoactivas consumidas antes de la muerte en los fallecidos por reacción adversa a sustancias psicoactivas. CAPV 2018

DROGA DROGA	Kop. Nº	%*
Kokaina Cocaína	19	38,0
Eragin handiko lasaigariak edo antipsikotiko zehatzak Tranquilizantes mayores o antipsicóticos especificados	18	36,0
Alkohola Alcohol	17	34,0
Anfetaminak (zehaztu gabe) Anfetaminas (sin especificar)	15	30,0
Alprazolama Alprazolam	11	22,0
Nordiazepama Nordiazepam	11	22,0
Metadona Metadona	9	18,0
Heroína Heroína	8	16,0
Cannabisa Cannabis	8	16,0
Bestelako antidepresiboak Otros medicamentos antidepresivos especificados	6	12,0
Lorazepama Lorazepam	6	12,0
Morfina Morfina	5	10,0
Diazepama Diazepam	4	8,0
Fentaniloeta antzekoak Fentanilo y análogos	4	8,0
Lormetazepama Lormetazepam	4	8,0
Benlafaxina Venlafaxina	3	6,0
Klonazepama Clonazepam	2	4,0
Zitaloprama Citalopram	2	4,0
Serotonina berriz biltzearen inhibitzaileak Inhibidores de la recaptación de serotonina	2	4,0
Fenobarbitala Fenobarbital	2	4,0
Bestelako substantzia psikoaktiboak Otras sustancias psicoactivas especificadas	15	0,0
GUZTIRA TOTAL	171	100

* Hildako kopuru osoaren gaineko portzentaia.

* Porcentaje realizado sobre el total de fallecidos.

**Nordiazepam eta Oxazepam hainbat benzodiazepinaren metabolito aktiboak dira, adibidez: diazepam, klorazepato eta klordiazepoxidoarena, baita temazepamarena ere. Oxazepamaren kasuan, botika gisa ere merkaturatzen da.

**Nordiazepam y Oxazepam son metabolitos activos de diferentes benzodiazepinas como diazepam, clorazepato, clordiazepóxido e incluso temazepam. En el caso del Oxazepam también se comercializa como fármaco.

***Soilik ulertuko da heroína kontsumitu dela analisi toxikologikoan 6-monoacetil morfina edo heroína agertzen bada.

***Sólo se ha considerado que se ha consumido heroína cuando en el análisis toxicológico aparece 6-monoacetil morfina o heroína

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

10. taula. HILKORTASUN ADIERAZLEA. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioek eragindako heriotza kopurua eta tasak, sexuaren arabera. EAE 2000-2018
Tabla 10. INDICADOR MORTALIDAD. Número y tasas de mortalidad por reacción adversa a sustancias psicoactivas por sexos, CAPV 2000-2018

Sexua Sexo	Urtea Año	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gizonak Hombres	Kop. Nº	31	31	29	30	23	46	40	36	31	35	31	37	45	42	40	36	41	41	34
	Tasa gordina Tasa bruta	5,34	5,61	5,29	3,92	3,03	6,11	5,12	4,58	3,94	4,44	3,93	4,69	5,85	5,51	5,29	4,75	5,44	5,45	4,5
	Tasa estandarizatua** Tasa estandarizada**	5,13	5,22	4,82	3,38	2,54	5,15	4,46	3,86	3,45	3,78	3,44	4,11	5,11	4,61	4,65	4,17	4,9	4,87	4,02
	(KT % 95) (IC95%)	(3,32-6,94)	(3,34-6,99)	(3,06-6,57)	(2,16-4,59)	(1,50-3,58)	(3,63-6,68)	(3,07-5,85)	(2,60-5,13)	(2,22-4,67)	(2,52-5,03)	(2,21-4,68)	(2,77-5,46)	(3,60-6,63)	(3,21-6,01)	(3,21-6,09)	(2,81-5,54)	(3,39-6,41)	(3,37-6,37)	(2,66-5,38)
Emakumeak Mujeres	Kop. Nº	5	5	4	4	6	10	8	9	13	11	9	18	11	12	15	7	16	12	9
	Tasa gordina Tasa bruta	0,88	0,93	0,75	0,53	0,8	1,35	1,04	1,16	1,68	1,42	1,16	2,33	1,45	1,59	2,01	0,93	2,14	1,6	1,2
	Tasa estandarizatua** Tasa estandarizada**	0,86	0,84	0,7	0,44	0,73	1,13	0,88	0,99	1,51	1,22	1,1	1,98	1,23	1,39	1,76	0,83	1,95	1,4	1,04
	(KT % 95) (IC95%)	(0,10-1,61)	(0,10-1,55)	(0,01-1,38)	(0,01-0,88)	(0,14-1,32)	(0,43-1,83)	(0,27-1,50)	(0,34-1,64)	(0,69-2,33)	(0,50-1,94)	(0,37-1,84)	(1,07-2,90)	(0,50-1,96)	(0,59-2,19)	(0,87-2,65)	(0,21-1,44)	(0,98-2,91)	(0,61-2,20)	(0,36-1,72)
Bi sexuak Ambos sexos	Kop. Nº	36	36	33	34	29	56	48	45	44	46	40	55	56	54	55	43	57	53	43
	Tasa gordina Tasa bruta	3,13	3,3	3,05	2,24	1,92	3,75	3,1	2,89	2,82	2,94	2,56	3,52	3,66	3,56	3,66	2,85	3,8	3,53	2,86
	Tasa estandarizatua** Tasa estandarizada**	2,99	3,04	2,79	1,92	1,65	3,17	2,7	2,44	2,50	2,52	2,30	3,07	3,18	3,01	3,22	2,51	3,43	3,14	2,53
	(KT % 95) (IC95%)	(2,01-3,97)	(2,01-3,96)	(1,84-3,74)	(1,27-2,57)	(1,05-2,25)	(2,32-4,02)	(1,93-3,46)	(1,73-3,15)	(1,75-3,24)	(1,79-3,25)	(1,58-3,03)	(2,25-3,88)	(2,34-4,03)	(2,20-3,81)	(2,37-4,07)	(1,76-3,27)	(2,53-4,33)	(2,29-3,99)	(1,77-3,29)

* EAEko egoiliarren heriotzak . / * Muertes de residentes en la CAPV


** Adinaren arabera, 2013ko Europar populazio estandarerra egokituta, 100.000 biztanlerako tasak.

** Tasas por 100.000 habitantes, ajustadas por edad a la población europea estándar 2013

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

15. grafikoa Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuaren ondorioz hildakoen batez besteko adinaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1996-2018
Gráfico 15. Evolución de la edad media de los fallecidos por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAPV 1996-2018



Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud
 * 2017. urteaz gero, adin guztietako heriotzak sartzen dira (2016. urtera arte soilik jasotzen ziren 10 eta 64 urte arteko pertsonen heriotzak).
 * A partir de 2017 se incluyen los fallecimientos en todas las edades (Hasta 2016 se registraban sólo los casos entre 10 y 64 años)

1. ERANSKINA. Drogomenpeketasunen kontratako tratamendu ambulatorioa egin eta TRATAMENDU-ADIERAZLERAKO datuak eman dituzten zentroak edo zerbitzuak. EAE 2018

ANEXO 1. Centros o servicios que realizan tratamiento ambulatorio de drogodependencias y que han aportado sus datos al INDICADOR TRATAMIENTO. CAPV 2018

OSAKIDETZA	BESTE BATZUK - OTROS
Araba / Álava	
Adikzioentzako orientazio eta tratamendu zentroa Centro de orientación y tratamiento de adicciones	Jeiki Fundazioa. Arabako Gizakia Helburu Fundación Jeiki. P. Hombre Araba
Gipuzkoa	
Amarako OMZ C.S.M. de Amara	A.G.I.P.A.D. A.G.I.P.A.D.
Andoain OMZ C.S.M. DE Andoain	Izan Fundazioa. Gipuzkoako Gizakia Helburu Fundación Izan. P. Hombre Gipuzkoa
Arrasateko OMZ C.S.M. de Mondragón	
Azpeitiko OMZ C.S.M. de Azpeitia	
Beasaingo OMZ C.S.M. de Beasain	
Donostia-Antiguoko OMZ C.S.M. de Donostia-Antiguo	
Errenteriako OMZ C.S.M. de Rentería	
Egla OMZ C.S.M. de Eguía	
Eibarko OMZ C.S.M. de Eibar	
Irungo OMZ C.S.M. de Irún	
Tolosako OMZ C.S.M. de Tolosa	
Zarauzko OMZ C.S.M. de Zarautz	
Zumarragako OMZ C.S.M. de Zumárraga	
Bitarte Bitarte	
Bizkaia	
Basauriko OMZ C.S.M. de Basauri	Etokintza Fundazioa Fundación Etorkintza
Bermeoko OMZ C.S.M. de Bermeo	Gizakia Fundazioa. Bizkaiko Gizakia Helburu Fundación Gizakia. P. Hombre Bizkaia
Durangoko OMZ C.S.M. de Durango	Auzolan APM M.A.P.S. Auzolan
Gernikako OMZ C.S.M. de Gernika	 Gurutzetako APM M.A.P.S. de Cruces
Ortuellako OMZ C.S.M. de Ortuella	Errekaldeko APM M.A.P.S. de Rekalde
Portugaleteko OMZ C.S.M. de Portugalete	Deustu-San Ignazioko APM M.A.P.S. Deusto-San Ignacio
Santurtziko OMZ C.S.M. de Santurce	Burmuin institutua Instituto Burmuin
Sestaoko OMZ C.S.M. de Sestao	
Uribeko OMZ C.S.M. de Uribe	
Zallako OMZ C.S.M. de Zalla	
Otxarkoagako OMZ C.S.M. de Otxarkoaga	
Galdakaoko OMZ C.S.M. de Galdakao	
Barakaldoko Adi. OMZ C.S.M. Adic. Barakaldo	
Julián Ajuriaguerrako Adi. OMZ C.S.M. Adic. Julian de Ajuriaguerra	
Novia Salcedo Adi. OMZ C.S.M. Adic. Novia Salcedo	

2. ERANSKINA. Adin-taldeen araberako biztanleria, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera. EAE 2018
ANEXO 2. Población por grupos de edad según Territorio Histórico y sexo. CAPV 2018

Adin-Taldea	ARABA / ÁLAVA		BIZKAIA		GIPUZKOA		
	Grupo de edad	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres
0-4		8.087	7.680	23.769	22.634	15.756	15.293
5-9		9.032	8.324	26.957	25.941	19.039	17.720
10-14		8.064	7.637	26.816	25.449	18.749	17.727
15-19		7.368	6.938	25.069	23.248	17.023	16.089
20-24		6.853	6.635	23.723	22.939	16.324	15.389
25-29		7.564	7.651	25.918	25.766	16.506	16.271
30-34		9.389	9.596	31.789	31.547	19.213	18.980
35-39		12.629	12.370	41.201	40.508	24.958	24.721
40-44		14.510	13.514	47.865	47.210	30.530	29.150
45-49		13.478	12.940	46.010	45.765	28.932	27.628
50-54		12.598	12.729	44.924	46.527	27.660	27.533
55-59		11.183	11.861	41.824	44.984	25.158	26.124
60-64		9.786	10.489	36.282	39.721	22.142	23.168
65-69		8.841	9.525	31.495	35.722	20.135	21.901
70-74		7.823	8.544	26.648	32.759	17.645	20.544
75-79		5.168	6.004	18.202	24.369	11.607	14.470
80-84		4.268	5.784	16.419	25.694	9.657	14.815
85-89		2.515	4.313	10.064	19.401	5.739	11.095
90-94		836	2.151	3.277	9.127	1.796	5.212
>95		162	679	620	2.479	349	1.521

EUSTAT. Biztanleen Udal Estatistika (BUE) www.eustat.eus

EUSTAT: Estadística Municipal de Habitantes (EMH) www.eustat.eus

