

A la edad de **10 años** se administrará **una vacuna** que protegerá contra **la Varicela** a quienes hayan nacido entre 1995 y 2014 (ambos inclusive).

Se administrarán **dos dosis** con un intervalo mínimo de 4 semanas.



Comparación de los efectos de las enfermedades y de las vacunas

Enfermedad	Efectos de la Enfermedad	Eficacia de la vacuna*	Efectos adversos
Varicela**	Infecciones bacterianas secundarias (5-10% de los casos). Zóster (68/100.000 casos). Complicaciones graves en personas adultas.	94-99%	Dolor, enrojecimiento a nivel local (10-20%). Rash tipo variceloso (1-5%). Zóster post vacunal (2,6/100.000 dosis).

** Sólo población no vacunada y que no haya pasado la enfermedad.

* Vacunación completa, nivel de anticuerpos al mes de la última dosis



UMEEN TXERTAKETA-EGUTEGIA. EUSKADI 2018




10

URTE*

*2015 baino
lehenago
jaiotakoak

Barizela*

* 2015. urtea baino lehen jaiotakoak, soilik txertoa hartu ez badute eta gaixotasuna pasa ez badute. Bi dosi: 2. dosia, lehenengoa eman eta handik hilabetera.



10 urterekin, Barizelatik babestuko duen txerto bat jarriko zaio.

Bi dosi jarriko dira gutxienez 4 asteko tartearekin.
(1995etik 2014ra jaiotakoentzat)

Urte

10

Gaixotasunen eta txertoen ondorioen alderaketa

Gaixotasuna

Gaixotasunaren ondorioak

Txertoaren eraginkortasuna*

Ondorio kaltegarriak

Barizela**

Infekzio bakteriano sekundarioak (kasuen %5-10).
Zosterra (68/100.000 kasuko).
Konplikazio larriak helduengan.

%94-99

Mina, gorriunea (%10-20).
Barizela motako rasha (%1-5).
Txertoaren ondoko Zosterra (2,6/100.000 dosiko).

** Txertorik hartu ez eta gaixotasuna izan ez duten biztanleak bakarrik.



CALENDARIO VACUNAL INFANTIL DE EUSKADI 2018



10

AÑOS*

* Nacidos
antes de 2015

Varicela*

* Para quienes hayan nacido antes del año 2015, sólo población no vacunada y que no haya pasado la enfermedad. Dos dosis, 2º dosis al mes de la primera.

