

**TABLAS DE RESULTADOS:
ESTADO DE SALUD**
Encuesta de Salud del País Vasco
2013

13ko EAEOI ESCAV₁₃



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

OSASUN SAIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

TABLAS GENERALES

ÍNDICE

ESTADO DE SALUD

1. Autovaloración de la salud

Tabla 1. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y territorio histórico	1
Tabla 2. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y clase social	5
Tabla 3. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y nivel de estudios	11

2. Calidad de vida relacionada con la salud

Tabla 4. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y territorio histórico	16
Tabla 5. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y clase social	18
Tabla 6. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y nivel de estudios	21
Tabla 7. Distribución de la población según las dimensiones del Euroqol EQ-5D-5L por sexo y edad	24
Tabla 8. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo, edad y territorio histórico	28
Tabla 9. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo, edad y clase social	29
Tabla 10. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo, edad y nivel de estudios	30
Tabla 11. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo, edad y territorio histórico	31
Tabla 12. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo, edad y clase social	32
Tabla 13. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo, edad y nivel de estudios	33
Tabla 14. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo, edad y territorio histórico	34
Tabla 15. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo, edad y clase social	35
Tabla 16. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo, edad y nivel de estudios	36
Tabla 17. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo, edad y territorio histórico	37
Tabla 18. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo, edad y clase social	38
Tabla 19. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo, edad y nivel de estudios	39
Tabla 20. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo, edad y territorio histórico	40
Tabla 21. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo, edad y clase social	41
Tabla 22. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo, edad y nivel de estudios	42

3. Salud mental

Tabla 23. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo, edad y territorio histórico	43
Tabla 24. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo, edad y clase social	45
Tabla 25. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo, edad y nivel de estudios	48
Tabla 26. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo, edad y territorio histórico	51
Tabla 27. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo, edad y clase social	52
Tabla 28. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo, edad y nivel de estudios	53
Tabla 29. Proporción (%) de personas que han pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y territorio histórico	54
Tabla 30. Proporción (%) de personas que han pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y clase social	55
Tabla 31. Proporción (%) de personas que han pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y nivel de estudios	56
Tabla 32. Proporción (%) de personas que han pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo, edad y territorio histórico	57
Tabla 33. Proporción (%) de personas que han pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo, edad y clase social	58
Tabla 34. Proporción (%) de personas que han pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo, edad y nivel de estudios	59

4. Salud bucodental

Tabla 35. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y territorio histórico	60
Tabla 36. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y clase social	64
Tabla 37. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y nivel de estudios	70

5. Limitación temporal de la actividad

Tabla 38. Proporción (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo, edad y territorio histórico	75
Tabla 39. Proporción (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo, edad y clase social	76
Tabla 40. Proporción (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo, edad y nivel de estudios	77
Tabla 41. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y territorio histórico	78
Tabla 42. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y clase social	81
Tabla 43. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y nivel de estudios	85

6. Discapacidad y dependencia

Tabla 44. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico	88
---	----

Tabla 45. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social	89
Tabla 46. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios	90
Tabla 47. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico	91
Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social	96
Tabla 49. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios	104
Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico	110
Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social	118
Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios	129
Tabla 53. Proporción (%) de personas de 70 y más años que necesitan ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y territorio histórico	138
Tabla 54. Proporción (%) de personas de 70 y más años que necesitan ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y clase social	139
Tabla 55. Proporción (%) de personas de 70 y más años que necesitan ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y nivel de estudios	140
Tabla 56. Proporción (%) de personas de 70 y más años que necesitan ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo, edad y territorio histórico	141
Tabla 57. Proporción (%) de personas de 70 y más años que necesitan ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo, edad y clase social	142
Tabla 58. Proporción (%) de personas de 70 y más años que necesitan ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo, edad y nivel de estudios	143
Tabla 59. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico	144
Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social	150
Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios	158
Tabla 62. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo y edad	165
Tabla 63. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y territorio histórico	166
Hombres.....	166
Mujeres.....	167
Tabla 64. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y clase social	168
Hombres.....	168
Mujeres.....	169
Tabla 65. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y nivel de estudios	170
Hombres.....	170
Mujeres.....	173

7. Problemas crónicos

Tabla 66. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y edad	176
Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico	178
Hombres.....	178
Mujeres.....	182
Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social	186
Hombres.....	186
Mujeres.....	190
Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios	194
Hombres.....	194
Mujeres.....	200
Tabla 70. Proporción (%) de personas con algún problema crónico por sexo, edad y territorio histórico	206
Tabla 71. Proporción (%) de personas con algún problema crónico por sexo, edad y clase social	207
Tabla 72. Proporción (%) de personas con algún problema crónico por sexo, edad y nivel de estudios	208

8. Lesiones no intencionadas

Tabla 73. Proporción (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico	209
Tabla 74. Proporción (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social	210
Tabla 75. Proporción (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios	211
Tabla 76. Distribución de la población* según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico	212
Tabla 77. Distribución de la población* según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social	221
Tabla 78. Distribución de la población* según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios	234
Tabla 79. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo y edad	244
Tabla 80. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y territorio histórico	245
Hombres.....	245
Mujeres.....	246
Tabla 81. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y clase social	247
Hombres.....	247
Mujeres.....	248
Tabla 82. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios	249
Hombres.....	249
Mujeres.....	252
Tabla 83. Distribución de la población* según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico	255

Tabla 84. Distribución de la población* según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social	263
Tabla 85. Distribución de la población* según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios	275
Tabla 86. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según la localización de la lesión por sexo y edad	284
Tabla 87. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según la localización de la lesión por sexo, edad y territorio histórico	285
Hombres.....	285
Mujeres.....	286
Tabla 88. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según la localización de la lesión por sexo, edad y clase social	287
Hombres.....	287
Mujeres.....	288
Tabla 89. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según la localización de la lesión por sexo, edad y nivel de estudios	289
Hombres.....	289
Mujeres.....	290

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 1. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y territorio histórico

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Hombres Total	CAPV	N	233.874	525.779	125.301	26.639	3.531	915.124
		%	25,6	57,5	13,7	2,9	0,4	100,0
	Araba	N	39.911	74.096	17.217	2.527	.	133.751
		%	29,8	55,4	12,9	1,9	.	100,0
	Gipuzkoa	N	61.741	179.144	42.011	8.975	1.940	293.812
		%	21,0	61,0	14,3	3,1	0,7	100,0
	Bizkaia	N	132.222	272.540	66.073	15.137	1.590	487.561
		%	27,1	55,9	13,6	3,1	0,3	100,0
15-24	CAPV	N	53.191	38.143	2.608	517	.	94.458
		%	56,3	40,4	2,8	0,5	.	100,0
	Araba	N	9.313	4.848	514	194	.	14.869
		%	62,6	32,6	3,5	1,3	.	100,0
	Gipuzkoa	N	16.627	12.879	1.477	323	.	31.305
		%	53,1	41,1	4,7	1,0	.	100,0
	Bizkaia	N	27.251	20.416	617	.	.	48.284
		%	56,4	42,3	1,3	.	.	100,0
25-44	CAPV	N	117.971	189.005	24.888	3.925	519	336.309
		%	35,1	56,2	7,4	1,2	0,2	100,0
	Araba	N	18.706	28.496	4.309	551	.	52.062
		%	35,9	54,7	8,3	1,1	.	100,0
	Gipuzkoa	N	30.612	66.453	7.815	1.390	519	106.790
		%	28,7	62,2	7,3	1,3	0,5	100,0
	Bizkaia	N	68.653	94.056	12.764	1.985	.	177.458
		%	38,7	53,0	7,2	1,1	.	100,0
45-64	CAPV	N	48.201	198.134	47.398	8.149	774	302.655
		%	15,9	65,5	15,7	2,7	0,3	100,0
	Araba	N	9.513	26.947	5.729	562	.	42.751
		%	22,3	63,0	13,4	1,3	.	100,0
	Gipuzkoa	N	10.418	66.882	16.462	3.068	590	97.419
		%	10,7	68,7	16,9	3,1	0,6	100,0
	Bizkaia	N	28.270	104.305	25.207	4.520	184	162.485
		%	17,4	64,2	15,5	2,8	0,1	100,0
65-74	CAPV	N	9.512	58.235	24.172	3.051	764	95.733
		%	9,9	60,8	25,2	3,2	0,8	100,0
	Araba	N	1.644	7.519	3.634	367	.	13.163
		%	12,5	57,1	27,6	2,8	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 1. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y territorio histórico

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total			
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	3.338	19.732	7.303	1.251	506	32.130		
			%	10,4	61,4	22,7	3,9	1,6	100,0		
		Bizkaia	N	4.531	30.985	13.235	1.432	257	50.440		
			%	9,0	61,4	26,2	2,8	0,5	100,0		
	>=75	CAPV	N	4.999	42.262	26.236	10.997	1.474	85.968		
			%	5,8	49,2	30,5	12,8	1,7	100,0		
		Araba	N	734	6.286	3.031	853	.	10.905		
			%	6,7	57,6	27,8	7,8	.	100,0		
		Gipuzkoa	N	747	13.198	8.954	2.944	325	26.168		
			%	2,9	50,4	34,2	11,2	1,2	100,0		
		Bizkaia	N	3.517	22.777	14.251	7.200	1.149	48.895		
			%	7,2	46,6	29,1	14,7	2,4	100,0		
		Mujeres	Total	CAPV	N	200.011	548.265	184.214	37.431	5.962	975.882
					%	20,5	56,2	18,9	3,8	0,6	100,0
				Araba	N	35.924	73.985	23.301	2.969	592	136.772
					%	26,3	54,1	17,0	2,2	0,4	100,0
	Gipuzkoa		N	56.155	194.215	49.379	10.598	2.338	312.686		
			%	18,0	62,1	15,8	3,4	0,7	100,0		
Bizkaia	N		107.931	280.065	111.534	23.864	3.031	526.425			
	%		20,5	53,2	21,2	4,5	0,6	100,0			
15-24	CAPV		N	43.220	43.071	3.207	.	.	89.499		
			%	48,3	48,1	3,6	.	.	100,0		
	Araba		N	7.098	5.745	367	.	.	13.210		
			%	53,7	43,5	2,8	.	.	100,0		
	Gipuzkoa		N	13.532	15.487	425	.	.	29.443		
			%	46,0	52,6	1,4	.	.	100,0		
	Bizkaia		N	22.591	21.840	2.416	.	.	46.846		
			%	48,2	46,6	5,2	.	.	100,0		
	25-44		CAPV	N	95.683	191.971	30.416	2.450	306	320.826	
				%	29,8	59,8	9,5	0,8	0,1	100,0	
		Araba	N	18.657	24.983	3.846	382	.	47.869		
			%	39,0	52,2	8,0	0,8	.	100,0		
Gipuzkoa		N	25.513	67.156	8.010	1.225	.	101.905			
		%	25,0	65,9	7,9	1,2	.	100,0			
Bizkaia		N	51.512	99.831	18.560	843	306	171.052			
		%	30,1	58,4	10,9	0,5	0,2	100,0			

(continuación)

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 1. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y territorio histórico

				Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	49.930	197.125	56.997	8.492	1.225	313.769
			%	15,9	62,8	18,2	2,7	0,4	100,0
		Araba	N	7.994	28.275	6.797	920	278	44.263
			%	18,1	63,9	15,4	2,1	0,6	100,0
		Gipuzkoa	N	13.421	68.666	14.966	2.461	148	99.662
			%	13,5	68,9	15,0	2,5	0,1	100,0
	Bizkaia	N	28.516	100.184	35.233	5.112	799	169.843	
		%	16,8	59,0	20,7	3,0	0,5	100,0	
	65-74	CAPV	N	5.913	62.505	35.374	5.596	537	109.925
			%	5,4	56,9	32,2	5,1	0,5	100,0
		Araba	N	1.140	7.961	4.787	433	.	14.320
			%	8,0	55,6	33,4	3,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.760	22.112	9.712	1.435	102	36.120
			%	7,6	61,2	26,9	4,0	0,3	100,0
	Bizkaia	N	2.014	32.433	20.875	3.728	434	59.484	
		%	3,4	54,5	35,1	6,3	0,7	100,0	
	>=75	CAPV	N	5.265	53.593	58.219	20.893	3.895	141.864
			%	3,7	37,8	41,0	14,7	2,7	100,0
Araba		N	1.036	7.022	7.503	1.235	315	17.110	
		%	6,1	41,0	43,9	7,2	1,8	100,0	
Gipuzkoa		N	930	20.794	16.267	5.477	2.087	45.555	
		%	2,0	45,6	35,7	12,0	4,6	100,0	
Bizkaia	N	3.299	25.777	34.449	14.181	1.493	79.200		
	%	4,2	32,5	43,5	17,9	1,9	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	433.885	1.074.044	309.515	64.070	9.492	1.891.006
			%	22,9	56,8	16,4	3,4	0,5	100,0
	Araba	N	75.835	148.081	40.518	5.496	592	270.523	
		%	28,0	54,7	15,0	2,0	0,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	117.897	373.359	91.390	19.574	4.278	606.497	
		%	19,4	61,6	15,1	3,2	0,7	100,0	
	Bizkaia	N	240.154	552.604	177.606	39.000	4.622	1.013.987	
		%	23,7	54,5	17,5	3,8	0,5	100,0	
	15-24	CAPV	N	96.412	81.214	5.815	517	.	183.958
			%	52,4	44,1	3,2	0,3	.	100,0
		Araba	N	16.411	10.593	881	194	.	28.079
			%	58,4	37,7	3,1	0,7	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 1. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y territorio histórico

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	30.159	28.366	1.901	323	.	60.748
			%	49,6	46,7	3,1	0,5	.	100,0
		Bizkaia	N	49.842	42.256	3.032	.	.	95.130
			%	52,4	44,4	3,2	.	.	100,0
	25-44	CAPV	N	213.654	380.975	55.305	6.376	825	657.135
				%	32,5	58,0	8,4	1,0	0,1
		Araba	N	37.363	53.479	8.156	933	.	99.930
			%	37,4	53,5	8,2	0,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	56.125	133.609	15.825	2.616	519	208.695
			%	26,9	64,0	7,6	1,3	0,2	100,0
		Bizkaia	N	120.165	193.887	31.324	2.828	306	348.509
			%	34,5	55,6	9,0	0,8	0,1	100,0
	45-64	CAPV	N	98.131	395.259	104.394	16.641	1.999	616.424
				%	15,9	64,1	16,9	2,7	0,3
		Araba	N	17.507	55.222	12.527	1.482	278	87.015
			%	20,1	63,5	14,4	1,7	0,3	100,0
		Gipuzkoa	N	23.839	135.548	31.428	5.528	738	197.081
			%	12,1	68,8	15,9	2,8	0,4	100,0
		Bizkaia	N	56.785	204.489	60.440	9.631	983	332.328
			%	17,1	61,5	18,2	2,9	0,3	100,0
	65-74	CAPV	N	15.425	120.741	59.546	8.647	1.300	205.658
				%	7,5	58,7	29,0	4,2	0,6
		Araba	N	2.783	15.479	8.421	800	.	27.483
			%	10,1	56,3	30,6	2,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	6.097	41.844	17.015	2.686	608	68.251
			%	8,9	61,3	24,9	3,9	0,9	100,0
		Bizkaia	N	6.544	63.418	34.110	5.160	692	109.924
			%	6,0	57,7	31,0	4,7	0,6	100,0
	>=75	CAPV	N	10.263	95.855	84.455	31.890	5.369	227.832
				%	4,5	42,1	37,1	14,0	2,4
		Araba	N	1.770	13.308	10.534	2.088	315	28.015
			%	6,3	47,5	37,6	7,5	1,1	100,0
		Gipuzkoa	N	1.676	33.993	25.221	8.421	2.412	71.723
			%	2,3	47,4	35,2	11,7	3,4	100,0
		Bizkaia	N	6.817	48.554	48.700	21.381	2.642	128.094
			%	5,3	37,9	38,0	16,7	2,1	100,0

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 2. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y clase social

		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
Hombres Total	Total	N	233.614	525.293	124.787	26.639	3.531	913.863
		%	25,6	57,5	13,7	2,9	0,4	100,0
	I	N	37.887	66.422	7.732	1.305	343	113.690
		%	33,3	58,4	6,8	1,1	0,3	100,0
	II	N	28.461	41.280	6.298	1.629	537	78.206
		%	36,4	52,8	8,1	2,1	0,7	100,0
	III	N	53.103	104.460	24.224	5.743	825	188.355
		%	28,2	55,5	12,9	3,0	0,4	100,0
	IV	N	97.717	264.688	71.387	14.945	1.569	450.306
		%	21,7	58,8	15,9	3,3	0,3	100,0
	V	N	16.445	48.442	15.146	3.017	257	83.307
		%	19,7	58,1	18,2	3,6	0,3	100,0
15-24	Total	N	52.931	37.845	2.608	517	.	93.900
		%	56,4	40,3	2,8	0,6	.	100,0
	I	N	8.768	5.019	848	.	.	14.634
		%	59,9	34,3	5,8	.	.	100,0
	II	N	6.502	4.339	147	.	.	10.988
		%	59,2	39,5	1,3	.	.	100,0
	III	N	10.223	6.108	304	194	.	16.830
		%	60,7	36,3	1,8	1,2	.	100,0
	IV	N	23.352	18.370	692	323	.	42.737
		%	54,6	43,0	1,6	0,8	.	100,0
	V	N	4.085	4.009	617	.	.	8.711
		%	46,9	46,0	7,1	.	.	100,0
25-44	Total	N	117.971	189.005	24.888	3.925	519	336.309
		%	35,1	56,2	7,4	1,2	0,2	100,0
	I	N	17.685	24.806	1.024	.	217	43.732
		%	40,4	56,7	2,3	.	0,5	100,0
	II	N	14.904	16.987	606	.	.	32.496
		%	45,9	52,3	1,9	.	.	100,0
	III	N	24.866	30.418	6.317	354	302	62.257
		%	39,9	48,9	10,1	0,6	0,5	100,0
	IV	N	49.915	94.900	12.553	3.024	.	160.392
		%	31,1	59,2	7,8	1,9	.	100,0
	V	N	10.602	21.893	4.389	547	.	37.432
		%	28,3	58,5	11,7	1,5	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 2. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y clase social

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
Hombres 45-64	Total	N	48.201	197.945	47.299	8.149	774	302.368	
		%	15,9	65,5	15,6	2,7	0,3	100,0	
	I	N	9.558	24.887	2.846	490	126	37.907	
		%	25,2	65,7	7,5	1,3	0,3	100,0	
	II	N	5.347	14.886	2.715	288	184	23.419	
		%	22,8	63,6	11,6	1,2	0,8	100,0	
	III	N	14.274	43.326	6.903	1.650	168	66.322	
		%	21,5	65,3	10,4	2,5	0,3	100,0	
	IV	N	18.034	98.680	28.964	4.641	296	150.614	
		%	12,0	65,5	19,2	3,1	0,2	100,0	
	V	N	989	16.167	5.871	1.080	.	24.106	
		%	4,1	67,1	24,4	4,5	.	100,0	
	65-74	Total	N	9.512	58.235	24.172	3.051	764	95.733
			%	9,9	60,8	25,2	3,2	0,8	100,0
	I	N	1.297	9.817	2.402	237	.	13.753	
		%	9,4	71,4	17,5	1,7	.	100,0	
	II	N	1.254	3.799	1.375	309	125	6.862	
		%	18,3	55,4	20,0	4,5	1,8	100,0	
	III	N	1.854	13.341	5.414	1.168	.	21.777	
		%	8,5	61,3	24,9	5,4	.	100,0	
	IV	N	4.825	28.236	13.123	1.188	381	47.753	
		%	10,1	59,1	27,5	2,5	0,8	100,0	
	V	N	281	3.043	1.858	149	257	5.588	
		%	5,0	54,5	33,2	2,7	4,6	100,0	
	>=75	Total	N	4.999	42.262	25.821	10.997	1.474	85.553
			%	5,8	49,4	30,2	12,9	1,7	100,0
	I	N	580	1.893	613	577	.	3.663	
		%	15,8	51,7	16,7	15,8	.	100,0	
	II	N	454	1.270	1.456	1.032	227	4.440	
		%	10,2	28,6	32,8	23,2	5,1	100,0	
	III	N	1.886	11.267	5.286	2.376	355	21.169	
		%	8,9	53,2	25,0	11,2	1,7	100,0	
	IV	N	1.591	24.502	16.055	5.770	892	48.810	
		%	3,3	50,2	32,9	11,8	1,8	100,0	
	V	N	488	3.330	2.411	1.242	.	7.470	
		%	6,5	44,6	32,3	16,6	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 2. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y clase social

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
Mujeres	Total	Total	N	199.508	546.678	183.914	37.431	5.962	973.492
			%	20,5	56,2	18,9	3,8	0,6	100,0
		I	N	34.733	58.196	11.247	662	.	104.838
			%	33,1	55,5	10,7	0,6	.	100,0
		II	N	28.260	52.157	11.695	2.654	262	95.028
			%	29,7	54,9	12,3	2,8	0,3	100,0
		III	N	52.915	144.953	35.341	7.989	909	242.107
			%	21,9	59,9	14,6	3,3	0,4	100,0
		IV	N	58.637	206.283	76.735	15.650	3.136	360.441
			%	16,3	57,2	21,3	4,3	0,9	100,0
		V	N	24.963	85.089	48.896	10.475	1.655	171.077
			%	14,6	49,7	28,6	6,1	1,0	100,0
	15-24	Total	N	42.718	42.609	3.207	.	.	88.533
			%	48,3	48,1	3,6	.	.	100,0
		I	N	8.113	6.449	.	.	.	14.562
			%	55,7	44,3	.	.	.	100,0
		II	N	6.937	6.121	438	.	.	13.497
			%	51,4	45,4	3,2	.	.	100,0
		III	N	10.670	9.400	.	.	.	20.069
			%	53,2	46,8	.	.	.	100,0
		IV	N	12.314	17.121	2.179	.	.	31.614
			%	39,0	54,2	6,9	.	.	100,0
		V	N	4.683	3.518	591	.	.	8.792
			%	53,3	40,0	6,7	.	.	100,0
	25-44	Total	N	95.683	191.476	30.416	2.450	306	320.330
			%	29,9	59,8	9,5	0,8	0,1	100,0
		I	N	17.689	22.859	4.537	.	.	45.086
			%	39,2	50,7	10,1	.	.	100,0
		II	N	14.329	20.242	2.239	413	.	37.223
			%	38,5	54,4	6,0	1,1	.	100,0
		III	N	24.493	51.176	6.154	205	.	82.029
			%	29,9	62,4	7,5	0,3	.	100,0
		IV	N	28.081	70.929	10.050	1.359	306	110.725
			%	25,4	64,1	9,1	1,2	0,3	100,0
		V	N	11.090	26.269	7.436	473	.	45.267
			%	24,5	58,0	16,4	1,0	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 2. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y clase social

		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total		
Mujeres	45-64	Total	N	49.930	196.954	56.997	8.492	1.225	313.598
			%	15,9	62,8	18,2	2,7	0,4	100,0
		I	N	7.426	21.237	3.454	.	.	32.116
			%	23,1	66,1	10,8	.	.	100,0
		II	N	5.919	15.891	3.974	747	262	26.792
			%	22,1	59,3	14,8	2,8	1,0	100,0
		III	N	14.768	59.075	12.562	2.118	117	88.641
			%	16,7	66,6	14,2	2,4	0,1	100,0
		IV	N	14.731	66.422	20.104	2.535	309	104.102
			%	14,2	63,8	19,3	2,4	0,3	100,0
		V	N	7.086	34.329	16.902	3.092	537	61.946
			%	11,4	55,4	27,3	5,0	0,9	100,0
	65-74	Total	N	5.913	62.350	35.374	5.596	537	109.770
			%	5,4	56,8	32,2	5,1	0,5	100,0
		I	N	740	5.102	975	382	.	7.199
			%	10,3	70,9	13,5	5,3	.	100,0
		II	N	462	4.992	1.560	211	.	7.225
			%	6,4	69,1	21,6	2,9	.	100,0
		III	N	1.632	13.766	7.094	305	102	22.899
			%	7,1	60,1	31,0	1,3	0,4	100,0
		IV	N	2.164	27.582	17.598	2.565	225	50.134
			%	4,3	55,0	35,1	5,1	0,4	100,0
		V	N	915	10.909	8.146	2.133	209	22.312
			%	4,1	48,9	36,5	9,6	0,9	100,0
	>=75	Total	N	5.265	53.290	57.919	20.893	3.895	141.261
			%	3,7	37,7	41,0	14,8	2,8	100,0
		I	N	765	2.549	2.280	280	.	5.875
			%	13,0	43,4	38,8	4,8	.	100,0
		II	N	612	4.911	3.484	1.285	.	10.292
			%	5,9	47,7	33,8	12,5	.	100,0
		III	N	1.351	11.536	9.531	5.360	690	28.468
			%	4,7	40,5	33,5	18,8	2,4	100,0
		IV	N	1.347	24.229	26.803	9.191	2.295	63.866
			%	2,1	37,9	42,0	14,4	3,6	100,0
		V	N	1.189	10.064	15.821	4.777	909	32.760
			%	3,6	30,7	48,3	14,6	2,8	100,0

(continuación)

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 2. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y clase social

				Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Ambos	Total	Total	N	433.122	1.071.971	308.701	64.070	9.492	1.887.356
			%	22,9	56,8	16,4	3,4	0,5	100,0
		I	N	72.620	124.618	18.979	1.967	343	218.528
			%	33,2	57,0	8,7	0,9	0,2	100,0
		II	N	56.721	93.438	17.993	4.283	798	173.234
			%	32,7	53,9	10,4	2,5	0,5	100,0
		III	N	106.018	249.413	59.565	13.732	1.734	430.462
			%	24,6	57,9	13,8	3,2	0,4	100,0
		IV	N	156.355	470.971	148.121	30.595	4.705	810.747
			%	19,3	58,1	18,3	3,8	0,6	100,0
		V	N	41.407	133.530	64.042	13.493	1.912	254.385
			%	16,3	52,5	25,2	5,3	0,8	100,0
	15-24	Total	N	95.648	80.454	5.815	517	.	182.434
			%	52,4	44,1	3,2	0,3	.	100,0
		I	N	16.881	11.467	848	.	.	29.196
			%	57,8	39,3	2,9	.	.	100,0
		II	N	13.440	10.460	585	.	.	24.485
			%	54,9	42,7	2,4	.	.	100,0
		III	N	20.893	15.508	304	194	.	36.900
			%	56,6	42,0	0,8	0,5	.	100,0
		IV	N	35.667	35.491	2.871	323	.	74.351
			%	48,0	47,7	3,9	0,4	.	100,0
		V	N	8.768	7.528	1.207	.	.	17.503
			%	50,1	43,0	6,9	.	.	100,0
	25-44	Total	N	213.654	380.480	55.305	6.376	825	656.640
			%	32,5	57,9	8,4	1,0	0,1	100,0
		I	N	35.374	47.666	5.561	.	217	88.818
			%	39,8	53,7	6,3	.	0,2	100,0
		II	N	29.233	37.230	2.844	413	.	69.719
			%	41,9	53,4	4,1	0,6	.	100,0
		III	N	49.359	81.594	12.471	560	302	144.286
			%	34,2	56,6	8,6	0,4	0,2	100,0
		IV	N	77.996	165.829	22.603	4.383	306	271.117
			%	28,8	61,2	8,3	1,6	0,1	100,0
		V	N	21.692	48.162	11.825	1.020	.	82.699
			%	26,2	58,2	14,3	1,2	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 2. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y clase social

		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total		
Ambos	45-64	Total	N	98.131	394.899	104.295	16.641	1.999	615.965
			%	15,9	64,1	16,9	2,7	0,3	100,0
	I	N		16.984	46.124	6.300	490	126	70.023
		%		24,3	65,9	9,0	0,7	0,2	100,0
	II	N		11.266	30.777	6.689	1.035	446	50.212
		%		22,4	61,3	13,3	2,1	0,9	100,0
	III	N		29.042	102.401	19.466	3.768	285	154.963
		%		18,7	66,1	12,6	2,4	0,2	100,0
	IV	N		32.765	165.102	49.068	7.176	606	254.716
		%		12,9	64,8	19,3	2,8	0,2	100,0
	V	N		8.074	50.496	22.773	4.172	537	86.052
		%		9,4	58,7	26,5	4,8	0,6	100,0
	65-74	Total	N	15.425	120.586	59.546	8.647	1.300	205.503
				%	7,5	58,7	29,0	4,2	0,6
	I	N		2.037	14.919	3.377	619	.	20.952
		%		9,7	71,2	16,1	3,0	.	100,0
	II	N		1.717	8.790	2.936	519	125	14.087
		%		12,2	62,4	20,8	3,7	0,9	100,0
	III	N		3.486	27.107	12.507	1.473	102	44.676
		%		7,8	60,7	28,0	3,3	0,2	100,0
	IV	N		6.989	55.818	30.721	3.753	606	97.887
		%		7,1	57,0	31,4	3,8	0,6	100,0
	V	N		1.196	13.952	10.005	2.282	466	27.901
		%		4,3	50,0	35,9	8,2	1,7	100,0
	>=75	Total	N	10.263	95.552	83.740	31.890	5.369	226.814
				%	4,5	42,1	36,9	14,1	2,4
	I	N		1.345	4.442	2.893	858	.	9.538
		%		14,1	46,6	30,3	9,0	.	100,0
	II	N		1.066	6.182	4.939	2.316	227	14.731
		%		7,2	42,0	33,5	15,7	1,5	100,0
	III	N		3.237	22.803	14.817	7.736	1.045	49.638
		%		6,5	45,9	29,8	15,6	2,1	100,0
	IV	N		2.938	48.731	42.858	14.961	3.187	112.676
		%		2,6	43,2	38,0	13,3	2,8	100,0
	V	N		1.677	13.394	18.232	6.019	909	40.231
		%		4,2	33,3	45,3	15,0	2,3	100,0

Tabla 3. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Hombres Total	Total	N	233.874	525.779	125.301	26.639	3.531	915.124
		%	25,6	57,5	13,7	2,9	0,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	30.330	118.728	48.580	11.262	1.700	210.600
		%	14,4	56,4	23,1	5,3	0,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	42.999	93.347	24.081	6.325	702	167.454
		%	25,7	55,7	14,4	3,8	0,4	100,0
	Secundaria, superior	N	99.900	213.348	38.930	7.707	786	360.670
		%	27,7	59,2	10,8	2,1	0,2	100,0
	Terciaria	N	60.646	100.357	13.709	1.345	343	176.400
		%	34,4	56,9	7,8	0,8	0,2	100,0
15-24	Total	N	53.191	38.143	2.608	517	.	94.458
		%	56,3	40,4	2,8	0,5	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.945	4.717	256	.	.	9.918
		%	49,9	47,6	2,6	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	18.967	10.873	1.288	.	.	31.129
		%	60,9	34,9	4,1	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	23.369	18.518	437	517	.	42.840
		%	54,5	43,2	1,0	1,2	.	100,0
	Terciaria	N	5.910	4.036	626	.	.	10.572
		%	55,9	38,2	5,9	.	.	100,0
25-44	Total	N	117.971	189.005	24.888	3.925	519	336.309
		%	35,1	56,2	7,4	1,2	0,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	11.613	20.010	5.805	348	.	37.776
		%	30,7	53,0	15,4	0,9	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	14.880	31.502	4.774	1.653	.	52.808
		%	28,2	59,7	9,0	3,1	.	100,0
	Secundaria, superior	N	55.453	94.839	11.756	1.924	302	164.274
		%	33,8	57,7	7,2	1,2	0,2	100,0
	Terciaria	N	36.025	42.655	2.554	.	217	81.451
		%	44,2	52,4	3,1	.	0,3	100,0
45-64	Total	N	48.201	198.134	47.398	8.149	774	302.655
		%	15,9	65,5	15,7	2,7	0,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	7.778	46.405	14.011	2.037	168	70.400
		%	11,0	65,9	19,9	2,9	0,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	7.194	33.308	9.670	2.952	121	53.244
		%	13,5	62,6	18,2	5,5	0,2	100,0

(continuación)

Tabla 3. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	16.925	78.803	18.280	2.763	359	117.130
			%	14,5	67,3	15,6	2,4	0,3	100,0
		Terciaria	N	16.303	39.618	5.437	397	126	61.881
			%	26,3	64,0	8,8	0,6	0,2	100,0
	65-74	Total	N	9.512	58.235	24.172	3.051	764	95.733
			%	9,9	60,8	25,2	3,2	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.380	22.291	11.089	875	382	38.017
			%	8,9	58,6	29,2	2,3	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.743	8.910	4.988	395	256	16.291
			%	10,7	54,7	30,6	2,4	1,6	100,0
		Secundaria, superior	N	3.259	16.225	5.006	1.332	125	25.948
			%	12,6	62,5	19,3	5,1	0,5	100,0
		Terciaria	N	1.130	10.810	3.089	448	.	15.477
			%	7,3	69,8	20,0	2,9	.	100,0
	>=75	Total	N	4.999	42.262	26.236	10.997	1.474	85.968
			%	5,8	49,2	30,5	12,8	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.614	25.305	17.419	8.001	1.149	54.489
			%	4,8	46,4	32,0	14,7	2,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	215	8.754	3.361	1.325	325	13.981
			%	1,5	62,6	24,0	9,5	2,3	100,0
		Secundaria, superior	N	893	4.963	3.452	1.170	.	10.478
			%	8,5	47,4	32,9	11,2	.	100,0
		Terciaria	N	1.277	3.240	2.003	500	.	7.020
			%	18,2	46,1	28,5	7,1	.	100,0
Mujeres	Total	Total	N	200.011	548.265	184.214	37.431	5.962	975.882
			%	20,5	56,2	18,9	3,8	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	25.827	136.721	88.286	23.519	3.975	278.327
			%	9,3	49,1	31,7	8,5	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	29.615	95.537	36.395	7.426	793	169.766
			%	17,4	56,3	21,4	4,4	0,5	100,0
		Secundaria, superior	N	78.280	184.298	39.197	4.897	1.194	307.866
			%	25,4	59,9	12,7	1,6	0,4	100,0
		Terciaria	N	66.289	131.709	20.336	1.589	.	219.923
			%	30,1	59,9	9,2	0,7	.	100,0
	15-24	Total	N	43.220	43.071	3.207	.	.	89.499
			%	48,3	48,1	3,6	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 3. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total		
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	6.087	4.559	741	.	.	11.386	
			%	53,5	40,0	6,5	.	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	6.725	9.537	501	.	.	16.763	
			%	40,1	56,9	3,0	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	22.544	20.933	1.966	.	.	45.443	
			%	49,6	46,1	4,3	.	.	100,0	
	Terciaria	N	7.865	8.042	.	.	.	15.907		
		%	49,4	50,6	.	.	.	100,0		
	25-44	Total	N	95.683	191.971	30.416	2.450	306	320.826	
			%	29,8	59,8	9,5	0,8	0,1	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	7.311	15.865	2.240	268	306	25.990	
			%	28,1	61,0	8,6	1,0	1,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	8.839	24.934	4.692	473	.	38.937	
			%	22,7	64,0	12,1	1,2	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	36.945	77.322	14.924	1.297	.	130.487	
			%	28,3	59,3	11,4	1,0	.	100,0	
		Terciaria	N	42.588	73.850	8.560	413	.	125.412	
			%	34,0	58,9	6,8	0,3	.	100,0	
		45-64	Total	N	49.930	197.125	56.997	8.492	1.225	313.769
				%	15,9	62,8	18,2	2,7	0,4	100,0
	Sin estudios, primaria		N	7.031	47.471	19.979	3.113	368	77.963	
			%	9,0	60,9	25,6	4,0	0,5	100,0	
	Secundaria, inferior		N	11.239	34.719	13.310	2.298	169	61.735	
			%	18,2	56,2	21,6	3,7	0,3	100,0	
Secundaria, superior	N		17.798	73.532	15.658	2.646	688	110.322		
	%		16,1	66,7	14,2	2,4	0,6	100,0		
Terciaria	N		13.862	41.402	8.050	434	.	63.749		
	%		21,7	64,9	12,6	0,7	.	100,0		
65-74	Total		N	5.913	62.505	35.374	5.596	537	109.925	
			%	5,4	56,9	32,2	5,1	0,5	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	3.049	32.585	20.843	4.839	537	61.852		
		%	4,9	52,7	33,7	7,8	0,9	100,0		
	Secundaria, inferior	N	1.410	16.109	9.176	757	.	27.452		
		%	5,1	58,7	33,4	2,8	.	100,0		
	Secundaria, superior	N	330	7.853	3.711	.	.	11.893		
		%	2,8	66,0	31,2	.	.	100,0		

(continuación)

Tabla 3. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N	1.124	5.959	1.644	.	.	8.727	
			%	12,9	68,3	18,8	.	.	100,0	
	>=75	Total	N	5.265	53.593	58.219	20.893	3.895	141.864	
			%	3,7	37,8	41,0	14,7	2,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.349	36.241	44.483	15.299	2.764	101.136	
			%	2,3	35,8	44,0	15,1	2,7	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.403	10.238	8.717	3.898	624	24.879	
			%	5,6	41,2	35,0	15,7	2,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	663	4.658	2.938	955	506	9.720	
			%	6,8	47,9	30,2	9,8	5,2	100,0	
		Terciaria	N	850	2.455	2.082	742	.	6.129	
			%	13,9	40,1	34,0	12,1	.	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	433.885	1.074.044	309.515	64.070	9.492	1.891.006
				%	22,9	56,8	16,4	3,4	0,5	100,0
			Sin estudios, primaria	N	56.157	255.448	136.866	34.781	5.675	488.927
				%	11,5	52,2	28,0	7,1	1,2	100,0
			Secundaria, inferior	N	72.614	188.884	60.476	13.751	1.495	337.220
				%	21,5	56,0	17,9	4,1	0,4	100,0
		Secundaria, superior	N	178.180	397.646	78.127	12.604	1.980	668.536	
			%	26,7	59,5	11,7	1,9	0,3	100,0	
		Terciaria	N	126.935	232.066	34.045	2.934	343	396.323	
			%	32,0	58,6	8,6	0,7	0,1	100,0	
		15-24	Total	N	96.412	81.214	5.815	517	.	183.958
				%	52,4	44,1	3,2	0,3	.	100,0
			Sin estudios, primaria	N	11.031	9.276	997	.	.	21.304
				%	51,8	43,5	4,7	.	.	100,0
			Secundaria, inferior	N	25.692	20.410	1.789	.	.	47.891
				%	53,6	42,6	3,7	.	.	100,0
			Secundaria, superior	N	45.913	39.451	2.403	517	.	88.283
				%	52,0	44,7	2,7	0,6	.	100,0
		Terciaria	N	13.775	12.078	626	.	.	26.479	
			%	52,0	45,6	2,4	.	.	100,0	
	25-44	Total	N	213.654	380.975	55.305	6.376	825	657.135	
			%	32,5	58,0	8,4	1,0	0,1	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	18.924	35.874	8.045	616	306	63.765	
			%	29,7	56,3	12,6	1,0	0,5	100,0	

(continuación)

Tabla 3. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	23.719	56.435	9.466	2.126	.	91.745
			%	25,9	61,5	10,3	2,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N	92.398	172.161	26.680	3.221	302	294.762
			%	31,3	58,4	9,1	1,1	0,1	100,0
		Terciaria	N	78.613	116.505	11.114	413	217	206.862
			%	38,0	56,3	5,4	0,2	0,1	100,0
	45-64	Total	N	98.131	395.259	104.394	16.641	1.999	616.424
			%	15,9	64,1	16,9	2,7	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	14.809	93.877	33.990	5.150	537	148.363
			%	10,0	63,3	22,9	3,5	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	18.433	68.027	22.979	5.251	290	114.979
			%	16,0	59,2	20,0	4,6	0,3	100,0
		Secundaria, superior	N	34.724	152.335	33.938	5.409	1.047	227.452
			%	15,3	67,0	14,9	2,4	0,5	100,0
		Terciaria	N	30.165	81.020	13.488	831	126	125.630
			%	24,0	64,5	10,7	0,7	0,1	100,0
	65-74	Total	N	15.425	120.741	59.546	8.647	1.300	205.658
			%	7,5	58,7	29,0	4,2	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.429	54.875	31.932	5.714	919	99.869
			%	6,4	54,9	32,0	5,7	0,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.153	25.019	14.164	1.152	256	43.744
			%	7,2	57,2	32,4	2,6	0,6	100,0
		Secundaria, superior	N	3.589	24.078	8.717	1.332	125	37.841
			%	9,5	63,6	23,0	3,5	0,3	100,0
		Terciaria	N	2.254	16.769	4.733	448	.	24.204
			%	9,3	69,3	19,6	1,9	.	100,0
	>=75	Total	N	10.263	95.855	84.455	31.890	5.369	227.832
			%	4,5	42,1	37,1	14,0	2,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.963	61.546	61.903	23.300	3.913	155.625
			%	3,2	39,5	39,8	15,0	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.618	18.993	12.078	5.223	949	38.860
			%	4,2	48,9	31,1	13,4	2,4	100,0
		Secundaria, superior	N	1.556	9.621	6.389	2.125	506	20.198
			%	7,7	47,6	31,6	10,5	2,5	100,0
		Terciaria	N	2.127	5.695	4.085	1.242	.	13.149
			%	16,2	43,3	31,1	9,4	.	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 4. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	77,5	16,6	80,0	70,0	90,0
		Araba	78,3	12,5	80,0	70,0	90,0
		Gipuzkoa	77,4	16,2	80,0	70,0	90,0
		Bizkaia	77,3	18,7	80,0	70,0	90,0
	15-24	CAPV	87,7	11,7	90,0	80,0	95,0
		Araba	88,5	9,0	90,0	85,0	95,0
		Gipuzkoa	87,5	10,8	90,0	80,0	95,0
		Bizkaia	87,5	13,6	90,0	80,0	95,0
	25-44	CAPV	82,5	15,9	85,0	75,0	90,0
		Araba	81,0	14,1	83,0	75,0	90,0
		Gipuzkoa	82,2	15,4	85,0	75,0	90,0
		Bizkaia	83,1	17,0	85,0	77,0	90,0
	45-64	CAPV	75,4	14,8	80,0	70,0	85,0
		Araba	76,3	11,2	80,0	70,0	85,0
		Gipuzkoa	75,3	14,4	80,0	70,0	85,0
		Bizkaia	75,3	16,5	80,0	70,0	85,0
	65-74	CAPV	70,0	13,7	70,0	60,0	80,0
		Araba	71,5	10,1	72,0	60,0	80,0
		Gipuzkoa	71,1	14,1	75,0	62,0	80,0
		Bizkaia	69,0	14,8	70,0	60,0	80,0
>=75	CAPV	62,0	17,3	65,0	50,0	80,0	
	Araba	67,7	10,6	70,0	50,0	80,0	
	Gipuzkoa	60,8	16,4	62,0	50,0	75,0	
	Bizkaia	61,5	20,0	60,0	50,0	76,0	
Mujeres	Total	CAPV	74,0	18,1	80,0	60,0	90,0
		Araba	75,4	14,2	80,0	65,0	90,0
		Gipuzkoa	75,5	16,5	80,0	68,0	90,0
		Bizkaia	72,8	20,8	80,0	60,0	90,0
	15-24	CAPV	86,5	12,2	90,0	80,0	95,0
		Araba	87,2	11,7	90,0	80,0	95,0
		Gipuzkoa	88,0	9,9	90,0	85,0	95,0
		Bizkaia	85,3	14,0	90,0	80,0	95,0
	25-44	CAPV	80,7	16,8	80,0	75,0	90,0
		Araba	82,5	13,9	85,0	75,0	90,0
		Gipuzkoa	80,4	17,5	80,0	70,0	90,0
		Bizkaia	80,4	17,6	80,0	73,0	90,0

(continuación)

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 4. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	45-64	CAPV	74,3	15,4	80,0	65,0	88,0
		Araba	74,1	11,3	80,0	70,0	85,0
		Gipuzkoa	76,0	14,0	80,0	70,0	90,0
		Bizkaia	73,3	18,1	75,0	60,0	87,0
	65-74	CAPV	66,3	14,9	70,0	50,0	80,0
		Araba	65,7	12,0	70,0	50,0	80,0
		Gipuzkoa	70,1	13,4	70,0	60,0	80,0
		Bizkaia	64,1	16,5	65,0	50,0	80,0
	>=75	CAPV	56,6	17,7	55,0	45,0	70,0
		Araba	57,5	11,8	60,0	50,0	70,0
		Gipuzkoa	59,3	15,6	60,0	50,0	75,0
		Bizkaia	54,8	21,0	50,0	40,0	70,0
Ambos sexos	Total	CAPV	75,7	17,5	80,0	70,0	90,0
		Araba	76,8	13,4	80,0	70,0	90,0
		Gipuzkoa	76,4	16,4	80,0	70,0	90,0
		Bizkaia	75,0	20,0	80,0	65,0	90,0
	15-24	CAPV	87,1	12,0	90,0	80,0	95,0
		Araba	87,9	10,4	90,0	83,0	95,0
		Gipuzkoa	87,8	10,4	90,0	85,0	95,0
		Bizkaia	86,4	13,9	90,0	80,0	95,0
	25-44	CAPV	81,6	16,4	85,0	75,0	90,0
		Araba	81,7	14,0	85,0	75,0	90,0
		Gipuzkoa	81,3	16,5	85,0	75,0	90,0
		Bizkaia	81,7	17,4	85,0	75,0	90,0
	45-64	CAPV	74,9	15,1	80,0	69,0	85,0
		Araba	75,2	11,3	80,0	70,0	85,0
		Gipuzkoa	75,7	14,2	80,0	70,0	90,0
		Bizkaia	74,3	17,4	80,0	65,0	85,0
	65-74	CAPV	68,0	14,4	70,0	59,0	80,0
		Araba	68,5	11,2	70,0	60,0	80,0
		Gipuzkoa	70,6	13,7	75,0	60,0	80,0
		Bizkaia	66,3	15,9	70,0	50,0	80,0
	>=75	CAPV	58,7	17,7	60,0	50,0	75,0
		Araba	61,4	11,9	60,0	50,0	75,0
		Gipuzkoa	59,9	15,9	60,0	50,0	75,0
		Bizkaia	57,4	20,9	60,0	45,0	71,0

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 5. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Hombres	Total	Total	77,5	16,6	80,0	70,0	90,0	
		I	81,5	12,9	85,0	75,0	90,0	
		II	79,6	16,5	83,0	75,0	90,0	
		III	78,0	15,8	80,0	70,0	90,0	
		IV	76,3	17,2	80,0	70,0	90,0	
		V	75,0	18,6	80,0	65,0	90,0	
		15-24	Total	87,7	11,7	90,0	80,0	95,0
			I	88,4	11,2	90,0	80,0	98,0
			II	86,7	12,0	90,0	80,0	95,0
			III	89,3	10,1	90,0	85,0	95,0
			IV	87,3	12,7	90,0	80,0	95,0
			V	86,5	10,2	90,0	80,0	95,0
		25-44	Total	82,5	15,9	85,0	75,0	90,0
			I	84,3	12,4	85,0	80,0	90,0
			II	83,7	12,4	85,0	80,0	90,0
			III	82,4	16,6	85,0	75,0	90,0
			IV	82,4	16,2	85,0	75,0	90,0
			V	79,7	19,0	80,0	72,0	90,0
		45-64	Total	75,4	14,8	80,0	70,0	85,0
			I	78,8	12,7	80,0	70,0	90,0
			II	77,2	15,6	80,0	70,0	90,0
			III	77,2	13,3	80,0	70,0	87,0
			IV	74,2	15,3	80,0	65,0	85,0
			V	71,2	16,0	75,0	60,0	80,0
		65-74	Total	70,0	13,7	70,0	60,0	80,0
			I	76,1	10,7	80,0	70,0	85,0
			II	73,4	13,6	75,0	65,0	85,0
			III	71,0	13,3	75,0	60,0	80,0
			IV	68,3	13,8	70,0	60,0	80,0
		V	61,7	16,4	60,0	55,0	72,0	
	>=75	Total	62,2	17,3	65,0	50,0	80,0	
		I	69,3	12,4	70,0	60,0	80,0	
		II	54,0	20,5	50,0	40,0	70,0	
		III	65,7	16,7	70,0	55,0	80,0	
		IV	61,1	17,3	60,0	50,0	75,0	
		V	60,8	17,0	70,0	50,0	75,0	

(continuación)

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 5. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Mujeres	Total	Total	74,0	18,1	80,0	60,0	90,0	
		I	80,5	15,4	80,0	74,0	90,0	
		II	78,1	16,6	80,0	70,0	90,0	
		III	76,0	16,8	80,0	70,0	90,0	
		IV	72,1	18,5	75,0	60,0	90,0	
		V	69,3	19,2	70,0	50,0	85,0	
		15-24	Total	86,4	12,3	90,0	80,0	95,0
			I	88,3	10,8	90,0	80,0	95,0
			II	89,0	9,1	90,0	85,0	95,0
			III	86,3	11,8	90,0	80,0	95,0
			IV	85,1	13,9	90,0	80,0	95,0
			V	84,6	13,3	90,0	80,0	93,0
		25-44	Total	80,7	16,8	80,0	75,0	90,0
			I	82,4	16,1	85,0	75,0	95,0
			II	82,2	15,1	81,0	80,0	90,0
			III	80,8	16,0	80,0	70,0	90,0
			IV	80,4	17,2	80,0	75,0	90,0
			V	78,3	18,8	80,0	70,0	90,0
		45-64	Total	74,3	15,5	80,0	65,0	88,0
			I	78,9	12,1	80,0	70,0	90,0
			II	74,7	15,0	75,0	65,0	89,0
			III	76,6	14,5	80,0	70,0	90,0
			IV	73,0	15,3	75,0	60,0	85,0
			V	70,7	17,6	75,0	60,0	85,0
		65-74	Total	66,3	14,9	70,0	50,0	80,0
			I	74,5	15,4	80,0	70,0	80,0
			II	68,4	14,4	70,0	50,0	80,0
			III	70,2	13,5	75,0	60,0	80,0
			IV	65,4	14,4	70,0	50,0	80,0
		V	60,9	15,9	60,0	50,0	75,0	
	>=75	Total	56,6	17,8	55,0	45,0	70,0	
		I	62,5	19,9	70,0	50,0	80,0	
		II	64,4	18,3	70,0	50,0	80,0	
		III	57,5	17,5	60,0	45,0	71,0	
		IV	54,9	17,7	55,0	40,0	70,0	
		V	55,6	17,1	50,0	45,0	70,0	

(continuación)

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 5. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Ambos sexos	Total	Total	75,7	17,5	80,0	70,0	90,0	
		I	81,0	14,2	80,0	75,0	90,0	
		II	78,7	16,6	80,0	70,0	90,0	
		III	76,9	16,4	80,0	70,0	90,0	
		IV	74,4	18,0	80,0	65,0	90,0	
		V	71,2	19,2	75,0	60,0	86,0	
		15-24 Total	Total	87,1	12,0	90,0	80,0	95,0
			I	88,3	10,9	90,0	80,0	95,0
			II	87,9	10,4	90,0	85,0	95,0
			III	87,7	11,2	90,0	80,0	95,0
			IV	86,4	13,3	90,0	80,0	95,0
			V	85,6	11,8	90,0	80,0	95,0
		25-44 Total	Total	81,6	16,4	85,0	75,0	90,0
			I	83,3	14,4	85,0	80,0	90,0
			II	82,9	14,0	85,0	80,0	90,0
			III	81,5	16,2	85,0	75,0	90,0
			IV	81,6	16,6	85,0	75,0	90,0
			V	79,0	18,9	80,0	70,0	90,0
		45-64 Total	Total	74,9	15,1	80,0	69,0	85,0
			I	78,8	12,4	80,0	70,0	90,0
			II	75,8	15,3	80,0	70,0	90,0
			III	76,9	14,0	80,0	70,0	90,0
			IV	73,7	15,3	76,0	65,0	85,0
			V	70,8	17,2	75,0	60,0	85,0
		65-74 Total	Total	68,0	14,4	70,0	59,0	80,0
		I	75,5	12,2	80,0	70,0	85,0	
		II	70,9	14,1	71,0	60,0	85,0	
		III	70,6	13,4	75,0	60,0	80,0	
		IV	66,8	14,1	70,0	55,0	80,0	
		V	61,1	15,9	60,0	50,0	75,0	
	>=75 Total	Total	58,7	17,7	60,0	50,0	75,0	
		I	65,1	17,4	70,0	50,0	80,0	
		II	61,3	19,4	61,0	45,0	80,0	
		III	61,0	17,5	60,0	50,0	80,0	
		IV	57,6	17,7	60,0	45,0	70,0	
		V	56,6	17,1	55,0	45,0	70,0	

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 6. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	Total	77,5	16,6	80,0	70,0	90,0
		Sin estudios, primaria	71,3	17,7	75,0	60,0	85,0
		Secundaria, inferior	76,6	17,7	80,0	70,0	90,0
		Secundaria, superior	79,8	15,5	80,0	72,0	90,0
		Terciaria	80,9	13,5	85,0	75,0	90,0
	15-24	Total	87,7	11,7	90,0	80,0	95,0
		Sin estudios, primaria	90,3	9,6	90,0	90,0	95,0
		Secundaria, inferior	88,4	10,2	90,0	85,0	95,0
		Secundaria, superior	86,6	12,8	90,0	80,0	95,0
		Terciaria	87,1	12,6	90,0	80,0	95,0
	25-44	Total	82,5	15,9	85,0	75,0	90,0
		Sin estudios, primaria	81,8	15,9	80,0	75,0	90,0
		Secundaria, inferior	80,0	19,0	80,0	75,0	90,0
		Secundaria, superior	82,8	15,9	85,0	75,0	90,0
		Terciaria	83,7	13,4	85,0	80,0	90,0
	45-64	Total	75,4	14,8	80,0	70,0	85,0
		Sin estudios, primaria	73,2	15,6	75,0	65,0	80,0
		Secundaria, inferior	72,4	16,3	75,0	60,0	85,0
		Secundaria, superior	75,9	14,0	80,0	70,0	85,0
		Terciaria	79,6	12,7	80,0	70,0	90,0
	65-74	Total	70,0	13,7	70,0	60,0	80,0
		Sin estudios, primaria	67,8	14,4	70,0	60,0	80,0
		Secundaria, inferior	67,4	14,4	70,0	59,0	80,0
		Secundaria, superior	72,5	13,4	75,0	60,0	80,0
		Terciaria	74,0	9,9	75,0	70,0	80,0
>=75	Total	62,0	17,3	65,0	50,0	80,0	
	Sin estudios, primaria	60,5	17,9	60,0	50,0	75,0	
	Secundaria, inferior	63,5	17,0	70,0	50,0	76,0	
	Secundaria, superior	65,8	16,4	68,0	60,0	80,0	
	Terciaria	65,4	14,7	70,0	55,0	80,0	
Mujeres	Total	Total	74,0	18,1	80,0	60,0	90,0
		Sin estudios, primaria	64,6	18,6	70,0	50,0	80,0
		Secundaria, inferior	72,9	17,4	75,0	60,0	90,0
		Secundaria, superior	78,3	16,0	80,0	70,0	90,0
		Terciaria	80,8	15,0	80,0	75,0	90,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 6. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	15-24	Total	86,5	12,2	90,0	80,0	95,0
		Sin estudios, primaria	86,5	14,8	90,0	80,0	95,0
		Secundaria, inferior	84,3	13,3	90,0	80,0	93,0
		Secundaria, superior	86,9	11,2	90,0	80,0	95,0
		Terciaria	87,6	11,7	90,0	80,0	95,0
	25-44	Total	80,7	16,8	80,0	75,0	90,0
		Sin estudios, primaria	80,0	17,4	80,0	70,0	90,0
		Secundaria, inferior	80,1	19,4	85,0	70,0	90,0
		Secundaria, superior	79,7	16,5	80,0	70,0	90,0
		Terciaria	82,0	16,0	85,0	80,0	90,0
	45-64	Total	74,3	15,4	80,0	65,0	88,0
		Sin estudios, primaria	69,5	16,3	72,0	55,0	80,0
		Secundaria, inferior	73,6	15,6	75,0	60,0	85,0
		Secundaria, superior	75,4	15,4	80,0	70,0	90,0
		Terciaria	79,0	12,6	80,0	70,0	90,0
	65-74	Total	66,3	14,9	70,0	50,0	80,0
		Sin estudios, primaria	64,2	15,2	67,0	50,0	80,0
		Secundaria, inferior	66,3	14,5	70,0	50,0	80,0
		Secundaria, superior	70,1	11,5	70,0	60,0	80,0
		Terciaria	76,0	13,9	80,0	65,0	90,0
>=75	Total	56,6	17,7	55,0	45,0	70,0	
	Sin estudios, primaria	54,7	17,9	50,0	40,0	70,0	
	Secundaria, inferior	59,4	15,8	60,0	50,0	71,0	
	Secundaria, superior	63,9	17,6	70,0	50,0	80,0	
	Terciaria	64,4	17,6	70,0	45,0	80,0	
Ambos sexos	Total	Total	75,7	17,5	80,0	70,0	90,0
		Sin estudios, primaria	67,5	18,5	70,0	50,0	80,0
		Secundaria, inferior	74,7	17,6	80,0	65,0	90,0
		Secundaria, superior	79,1	15,8	80,0	70,0	90,0
		Terciaria	80,9	14,3	80,0	75,0	90,0
	15-24	Total	87,1	12,0	90,0	80,0	95,0
		Sin estudios, primaria	88,3	12,9	90,0	85,0	95,0
		Secundaria, inferior	87,0	11,7	90,0	80,0	95,0
		Secundaria, superior	86,8	12,0	90,0	80,0	95,0
		Terciaria	87,4	12,0	90,0	80,0	95,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 6. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	25-44 Total	81,6	16,4	85,0	75,0	90,0
	Sin estudios, primaria	81,1	16,6	80,0	75,0	90,0
	Secundaria, inferior	80,1	19,2	80,0	75,0	90,0
	Secundaria, superior	81,4	16,3	82,0	75,0	90,0
	Terciaria	82,7	15,1	85,0	80,0	90,0
45-64	Total	74,9	15,1	80,0	69,0	85,0
	Sin estudios, primaria	71,3	16,0	75,0	60,0	80,0
	Secundaria, inferior	73,0	15,9	75,0	60,0	85,0
	Secundaria, superior	75,7	14,7	80,0	70,0	85,0
	Terciaria	79,3	12,6	80,0	70,0	90,0
65-74	Total	68,0	14,4	70,0	59,0	80,0
	Sin estudios, primaria	65,5	15,0	70,0	50,0	80,0
	Secundaria, inferior	66,7	14,4	70,0	50,0	80,0
	Secundaria, superior	71,8	12,9	75,0	60,0	80,0
	Terciaria	74,8	11,4	75,0	70,0	85,0
>=75	Total	58,7	17,7	60,0	50,0	75,0
	Sin estudios, primaria	56,7	18,1	60,0	45,0	70,0
	Secundaria, inferior	60,9	16,3	60,0	50,0	75,0
	Secundaria, superior	64,9	16,9	70,0	50,0	80,0
	Terciaria	64,9	16,1	70,0	50,0	80,0

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 7. Distribución de la población según las dimensiones del Euroqol EQ-5D-5L por sexo y edad

	Total		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75 y más	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Movilidad																
Hombres																
. Sin problemas	788.304	86,1	91.333	96,7	143.825	95,3	170.857	92,2	150.823	89,9	110.215	81,7	73.019	76,3	48.232	56,1
. Problemas leves	71.269	7,8	2.614	2,8	5.506	3,6	8.777	4,7	10.462	6,2	13.844	10,3	13.249	13,8	16.817	19,6
. Problemas moderados	35.815	3,9	511	0,5	897	0,6	4.481	2,4	4.847	2,9	8.063	6,0	6.130	6,4	10.886	12,7
. Problemas graves	16.642	1,8	.	.	199	0,1	898	0,5	1.662	1,0	2.741	2,0	2.607	2,7	8.536	9,9
. Incapaz	3.094	0,3	.	.	493	0,3	375	0,2	728	0,8	1.498	1,7
Cuidado personal																
. Sin problemas	869.621	95,0	92.670	98,1	148.435	98,4	179.820	97,0	163.368	97,4	125.887	93,3	90.719	94,8	68.722	79,9
. Problemas leves	24.138	2,6	1.472	1,6	1.581	1,0	3.319	1,8	3.107	1,9	5.111	3,8	3.085	3,2	6.463	7,5
. Problemas moderados	12.968	1,4	317	0,3	904	0,6	1.894	1,0	1.317	0,8	2.997	2,2	780	0,8	4.758	5,5
. Problemas graves	5.277	0,6	355	0,2	.	.	867	0,6	382	0,4	3.672	4,3
. Incapaz	3.120	0,3	767	0,8	2.353	2,7
Actividades cotidianas																
. Sin problemas	822.059	89,8	90.052	95,3	142.220	94,2	169.264	91,3	155.284	92,5	120.579	89,4	83.841	87,6	60.820	70,7
. Problemas leves	46.043	5,0	3.581	3,8	4.826	3,2	8.117	4,4	6.033	3,6	6.425	4,8	7.240	7,6	9.821	11,4
. Problemas moderados	30.323	3,3	508	0,5	2.970	2,0	6.003	3,2	5.468	3,3	6.437	4,8	2.747	2,9	6.189	7,2
. Problemas graves	8.458	0,9	317	0,3	199	0,1	1.549	0,8	515	0,3	970	0,7	871	0,9	4.037	4,7
. Incapaz	8.240	0,9	.	.	705	0,5	454	0,2	493	0,3	451	0,3	1.034	1,1	5.101	5,9
Dolor/malestar																
. No	644.890	70,5	80.343	85,1	121.533	80,5	142.358	76,8	113.000	67,3	87.237	64,7	59.407	62,1	41.013	47,7
. Leve	182.029	19,9	11.837	12,5	24.649	16,3	28.615	15,4	41.298	24,6	29.449	21,8	23.054	24,1	23.128	26,9
. Moderado	68.078	7,4	1.652	1,7	3.770	2,5	9.992	5,4	11.233	6,7	14.984	11,1	10.506	11,0	15.942	18,5
. Grave	17.982	2,0	323	0,3	969	0,6	4.123	2,2	2.262	1,3	2.863	2,1	2.336	2,4	5.107	5,9

(continuación)

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 7. Distribución de la población según las dimensiones del Euroqol EQ-5D-5L por sexo y edad

		Total		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75 y más	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dolor/malestar																	
Hombres	. Extremo	2.144	0,2	304	0,3	.	.	302	0,2	.	.	330	0,2	431	0,5	778	0,9
Ansiedad/depresión																	
	. No	749.858	81,9	84.204	89,1	126.910	84,1	151.432	81,7	131.161	78,2	110.847	82,2	79.351	82,9	65.953	76,7
	. Leve	115.904	12,7	8.081	8,6	16.491	10,9	24.603	13,3	25.602	15,3	17.265	12,8	12.672	13,2	11.191	13,0
	. Moderada	37.163	4,1	1.574	1,7	4.720	3,1	7.579	4,1	8.887	5,3	5.611	4,2	2.374	2,5	6.418	7,5
	. Grave	10.444	1,1	599	0,6	2.599	1,7	1.176	0,6	1.829	1,1	1.140	0,8	1.337	1,4	1.766	2,1
	. Extrema	1.754	0,2	.	.	201	0,1	599	0,3	314	0,2	641	0,7
Mujeres	Movilidad																
	. Sin problemas	798.426	81,8	87.194	97,4	139.355	96,7	167.312	94,7	153.674	89,5	114.793	80,8	75.731	68,9	60.366	42,6
	. Problemas leves	87.460	9,0	1.710	1,9	2.802	1,9	5.924	3,4	10.866	6,3	16.926	11,9	18.984	17,3	30.248	21,3
	. Problemas moderados	59.600	6,1	350	0,4	1.085	0,8	2.075	1,2	6.321	3,7	7.744	5,5	11.379	10,4	30.645	21,6
	. Problemas graves	24.650	2,5	.	.	930	0,6	1.057	0,6	482	0,3	2.482	1,7	3.697	3,4	16.002	11,3
	. Incapaz	5.746	0,6	245	0,3	.	.	286	0,2	337	0,2	142	0,1	134	0,1	4.603	3,2
Cuidado personal																	
	. Sin problemas	906.132	92,9	89.243	99,7	143.329	99,4	174.706	98,9	165.876	96,6	135.582	95,4	100.091	91,1	97.305	68,6
	. Problemas leves	30.721	3,1	256	0,3	370	0,3	779	0,4	4.490	2,6	4.109	2,9	5.225	4,8	15.492	10,9
	. Problemas moderados	21.323	2,2	1.168	0,7	861	0,5	1.393	1,0	2.679	2,4	15.222	10,7
	. Problemas graves	9.116	0,9	.	.	473	0,3	.	.	453	0,3	1.004	0,7	1.365	1,2	5.821	4,1
	. Incapaz	8.590	0,9	566	0,5	8.024	5,7
Actividades cotidianas																	
	. Sin problemas	827.719	84,8	86.673	96,8	138.642	96,2	165.711	93,8	153.137	89,2	122.776	86,4	87.382	79,5	73.397	51,7
	. Problemas leves	72.835	7,5	1.925	2,2	3.355	2,3	6.511	3,7	12.531	7,3	11.827	8,3	12.953	11,8	23.732	16,7
	. Problemas moderados	46.471	4,8	550	0,6	1.702	1,2	3.166	1,8	4.829	2,8	5.775	4,1	5.945	5,4	24.505	17,3
	. Problemas graves	12.956	1,3	350	0,4	.	.	1.057	0,6	848	0,5	1.341	0,9	1.851	1,7	7.508	5,3

(continuación)

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 7. Distribución de la población según las dimensiones del Euroqol EQ-5D-5L por sexo y edad

	Total		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75 y más	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Actividades cotidianas																
Mujeres																
. Incapaz	15.901	1,6	.	.	473	0,3	207	0,1	337	0,2	368	0,3	1.794	1,6	12.722	9,0
Dolor/malestar																
. No	581.244	59,6	75.125	83,9	111.750	77,5	124.237	70,3	104.724	61,0	72.196	50,8	48.199	43,8	45.013	31,7
. Leve	233.109	23,9	12.369	13,8	24.313	16,9	40.573	23,0	44.424	25,9	41.492	29,2	30.615	27,9	39.322	27,7
. Moderado	117.276	12,0	1.839	2,1	6.550	4,5	8.527	4,8	17.511	10,2	21.442	15,1	23.506	21,4	37.900	26,7
. Grave	39.626	4,1	166	0,2	1.559	1,1	2.738	1,5	4.201	2,4	6.044	4,3	7.246	6,6	17.672	12,5
. Extremo	4.627	0,5	577	0,3	821	0,5	913	0,6	359	0,3	1.957	1,4
Ansiedad/depresión																
. No	709.220	72,7	75.747	84,6	115.666	80,2	136.678	77,4	123.995	72,2	98.909	69,6	73.555	66,9	84.671	59,7
. Leve	169.298	17,3	10.008	11,2	19.683	13,7	28.710	16,3	31.351	18,3	26.089	18,4	23.220	21,1	30.236	21,3
. Moderada	71.466	7,3	3.262	3,6	8.302	5,8	8.614	4,9	13.333	7,8	12.176	8,6	7.677	7,0	18.103	12,8
. Grave	22.530	2,3	202	0,2	522	0,4	2.238	1,3	3.003	1,7	4.268	3,0	4.370	4,0	7.928	5,6
. Extrema	3.369	0,3	280	0,3	.	.	413	0,2	.	.	646	0,5	1.103	1,0	927	0,7
Ambos																
Movilidad																
. Sin problemas	1.586.730	83,9	178.527	97,0	283.180	96,0	338.168	93,4	304.497	89,7	225.009	81,2	148.751	72,3	108.598	47,7
. Problemas leves	158.729	8,4	4.324	2,4	8.309	2,8	14.701	4,1	21.328	6,3	30.769	11,1	32.233	15,7	47.064	20,7
. Problemas moderados	95.415	5,0	862	0,5	1.982	0,7	6.556	1,8	11.168	3,3	15.807	5,7	17.508	8,5	41.531	18,2
. Problemas graves	41.293	2,2	.	.	1.129	0,4	1.956	0,5	2.144	0,6	5.223	1,9	6.304	3,1	24.538	10,8
. Incapaz	8.840	0,5	245	0,1	493	0,2	661	0,2	337	0,1	142	0,1	862	0,4	6.101	2,7
Cuidado personal																
. Sin problemas	1.775.753	93,9	181.913	98,9	291.765	98,9	354.526	97,9	329.244	97,0	261.469	94,4	190.809	92,8	166.027	72,9
. Problemas leves	54.860	2,9	1.728	0,9	1.951	0,7	4.098	1,1	7.598	2,2	9.221	3,3	8.310	4,0	21.955	9,6
. Problemas moderados	34.291	1,8	317	0,2	904	0,3	3.062	0,8	2.178	0,6	4.390	1,6	3.459	1,7	19.980	8,8
. Problemas graves	14.393	0,8	.	.	473	0,2	355	0,1	453	0,1	1.871	0,7	1.747	0,8	9.493	4,2

(continuación)

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 7. Distribución de la población según las dimensiones del Euroqol EQ-5D-5L por sexo y edad

	Total		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75 y más	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Cuidado personal																
Ambos . Incapaz	11.710	0,6	1.333	0,6	10.377	4,6
Actividades cotidianas																
. Sin problemas	1.649.778	87,2	176.725	96,1	280.862	95,2	334.975	92,5	308.421	90,9	243.355	87,9	171.223	83,3	134.216	58,9
. Problemas leves	118.878	6,3	5.506	3,0	8.181	2,8	14.628	4,0	18.564	5,5	18.252	6,6	20.193	9,8	33.554	14,7
. Problemas moderados	76.795	4,1	1.058	0,6	4.672	1,6	9.170	2,5	10.297	3,0	12.212	4,4	8.692	4,2	30.693	13,5
. Problemas graves	21.414	1,1	668	0,4	199	0,1	2.607	0,7	1.362	0,4	2.311	0,8	2.722	1,3	11.545	5,1
. Incapaz	24.141	1,3	.	.	1.178	0,4	661	0,2	830	0,2	820	0,3	2.828	1,4	17.824	7,8
Dolor/malestar																
. No	1.226.134	64,8	155.468	84,5	233.283	79,1	266.595	73,6	217.723	64,1	159.433	57,6	107.606	52,3	86.025	37,8
. Leve	415.139	22,0	24.206	13,2	48.961	16,6	69.188	19,1	85.722	25,3	70.941	25,6	53.669	26,1	62.451	27,4
. Moderado	185.354	9,8	3.491	1,9	10.320	3,5	18.519	5,1	28.744	8,5	36.426	13,2	34.012	16,5	53.842	23,6
. Grave	57.608	3,0	489	0,3	2.528	0,9	6.861	1,9	6.463	1,9	8.907	3,2	9.582	4,7	22.779	10,0
. Extremo	6.771	0,4	304	0,2	.	.	879	0,2	821	0,2	1.243	0,4	790	0,4	2.735	1,2
Ansiedad/depresión																
. No	1.459.078	77,2	159.951	87,0	242.576	82,2	288.110	79,6	255.155	75,2	209.756	75,7	152.906	74,3	150.624	66,1
. Leve	285.202	15,1	18.089	9,8	36.174	12,3	53.313	14,7	56.953	16,8	43.354	15,7	35.892	17,5	41.426	18,2
. Moderada	108.629	5,7	4.836	2,6	13.022	4,4	16.193	4,5	22.220	6,5	17.787	6,4	10.050	4,9	24.521	10,8
. Grave	32.975	1,7	800	0,4	3.121	1,1	3.414	0,9	4.832	1,4	5.408	2,0	5.707	2,8	9.694	4,3
. Extrema	5.123	0,3	280	0,2	201	0,1	1.011	0,3	314	0,1	646	0,2	1.103	0,5	1.567	0,7

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 8. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	13,9	10,3	15,4	13,9
	15-24	3,3	2,7	2,3	4,1
	25-44	6,4	6,8	5,9	6,6
	45-64	13,8	9,6	15,6	13,8
	65-74	23,7	18,3	28,8	21,9
	>=75	43,9	29,8	52,3	42,6
Mujeres	Total	18,2	15,2	17,0	19,6
	15-24	2,6	3,7	0,0	3,9
	25-44	4,4	4,1	3,3	5,1
	45-64	14,4	11,7	14,6	15,1
	65-74	31,1	29,2	28,0	33,5
	>=75	57,4	52,1	55,4	59,8
Ambos sexos	Total	16,1	12,7	16,2	16,9
	15-24	3,0	3,2	1,2	4,0
	25-44	5,4	5,5	4,7	5,9
	45-64	14,1	10,6	15,1	14,4
	65-74	27,7	24,0	28,4	28,2
	>=75	52,3	43,4	54,3	53,2

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 9. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	13,8	7,3	12,0	13,6	15,6	15,2
	15-24	3,3	9,9	0,0	1,2	1,7	8,8
	25-44	6,4	1,6	5,0	5,4	8,1	7,7
	45-64	13,8	7,6	13,5	11,5	15,4	19,9
	65-74	23,7	17,5	24,3	26,6	25,2	14,8
	>=75	43,6	25,2	65,7	41,2	43,8	45,2
	Mujeres	Total	18,2	10,6	11,3	16,0	20,2
	15-24	2,4	3,6	2,0	4,0	0,0	5,7
	25-44	4,4	2,8	1,9	3,2	3,2	13,3
	45-64	14,4	13,3	14,5	14,8	13,8	15,6
	65-74	31,0	30,1	20,3	24,8	35,7	30,6
	>=75	57,6	48,9	42,9	57,9	58,1	62,3
Ambos sexos	Total	16,1	8,9	11,6	15,0	17,7	22,0
	15-24	2,9	6,7	1,1	2,7	1,0	7,2
	25-44	5,4	2,2	3,4	4,2	6,1	10,7
	45-64	14,1	10,2	14,0	13,4	14,8	16,8
	65-74	27,6	21,8	22,2	25,7	30,6	27,4
	>=75	52,3	39,8	49,7	50,8	51,9	59,1

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 10. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	Terciaria
Hombres	Total	13,9	22,7	17,0	10,2	7,8
	15-24	3,3	0,0	4,3	4,2	0,0
	25-44	6,4	7,3	11,0	6,2	3,6
	45-64	13,8	18,3	17,5	12,2	8,3
	65-74	23,7	21,4	35,0	20,0	23,8
	>=75	43,9	44,2	45,4	49,9	29,3
Mujeres	Total	18,2	34,7	18,8	9,8	8,5
	15-24	2,6	6,2	2,1	2,1	1,7
	25-44	4,4	6,0	5,6	5,2	2,9
	45-64	14,4	18,0	12,1	12,6	15,6
	65-74	31,1	30,9	32,6	36,5	20,3
	>=75	57,4	60,5	52,0	43,9	51,5
Ambos sexos	Total	16,1	29,5	17,9	10,0	8,2
	15-24	3,0	3,3	3,5	3,1	1,0
	25-44	5,4	6,8	8,7	5,7	3,2
	45-64	14,1	18,1	14,6	12,4	12,0
	65-74	27,7	27,3	33,5	25,2	22,5
	>=75	52,3	54,8	49,6	47,0	39,6

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 11. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	5,0	2,9	4,8	5,6
	15-24	1,9	0,0	2,0	2,4
	25-44	2,4	1,7	2,7	2,4
	45-64	4,4	2,5	4,4	4,9
	65-74	5,2	5,8	4,7	5,5
	>=75	20,1	11,4	18,1	23,0
Mujeres	Total	7,1	5,4	6,4	8,0
	15-24	0,3	0,0	0,0	0,5
	25-44	0,9	1,1	0,7	0,9
	45-64	3,9	4,5	3,8	3,9
	65-74	8,9	5,5	7,4	10,7
	>=75	31,4	24,1	28,3	34,7
Ambos sexos	Total	6,1	4,2	5,6	6,9
	15-24	1,1	0,0	1,0	1,5
	25-44	1,7	1,4	1,7	1,7
	45-64	4,2	3,5	4,1	4,4
	65-74	7,2	5,6	6,1	8,3
	>=75	27,1	19,2	24,6	30,3

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 12. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	4,9	1,5	3,5	4,2	5,6	8,9
	15-24	1,9	0,0	2,7	2,4	0,8	8,8
	25-44	2,4	0,4	0,0	1,7	3,0	5,5
	45-64	4,4	1,6	2,6	2,0	5,8	9,3
	65-74	5,2	5,1	4,5	6,6	3,8	13,1
	>=75	19,7	5,8	35,0	17,3	20,1	21,3
	Mujeres	Total	7,1	3,1	4,2	5,6	8,2
	15-24	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	25-44	0,9	0,0	2,2	0,2	1,2	1,0
	45-64	3,9	0,5	3,5	3,0	4,1	6,9
	65-74	9,0	7,2	5,0	5,3	11,1	9,8
	>=75	31,4	42,6	17,9	33,5	29,1	36,3
Ambos sexos	Total	6,1	2,2	3,9	5,0	6,8	10,4
	15-24	1,1	0,0	1,2	1,1	0,4	5,8
	25-44	1,7	0,2	1,2	0,9	2,2	3,1
	45-64	4,2	1,1	3,0	2,6	5,1	7,6
	65-74	7,2	5,8	4,8	5,9	7,5	10,5
	>=75	27,0	28,5	23,1	26,6	25,2	33,6

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 13. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	Terciaria
Hombres	Total	5,0	9,9	6,3	2,6	2,7
	15-24	1,9	0,0	1,4	1,5	6,6
	25-44	2,4	4,5	5,3	1,6	1,1
	45-64	4,4	7,3	6,9	2,9	1,9
	65-74	5,2	5,5	5,5	3,7	6,9
	>=75	20,1	22,0	19,6	15,1	13,5
Mujeres	Total	7,1	16,5	7,1	2,5	2,0
	15-24	0,3	0,0	0,0	0,6	0,0
	25-44	0,9	0,0	2,2	1,2	0,3
	45-64	3,9	7,9	1,9	3,1	2,5
	65-74	8,9	11,3	7,3	2,9	5,4
	>=75	31,4	32,3	32,0	21,1	29,9
Ambos sexos	Total	6,1	13,7	6,7	2,5	2,3
	15-24	1,1	0,0	0,9	1,0	2,6
	25-44	1,7	2,6	4,0	1,4	0,6
	45-64	4,2	7,6	4,2	3,0	2,2
	65-74	7,2	9,1	6,7	3,4	6,4
	>=75	27,1	28,7	27,5	18,0	21,2

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 14. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	10,2	7,0	11,4	10,3
	15-24	4,7	4,2	4,9	4,7
	25-44	7,4	6,4	7,8	7,4
	45-64	8,9	4,7	11,0	8,7
	65-74	12,4	13,4	12,2	12,3
	>=75	29,3	14,8	34,7	29,6
	Mujeres	Total	15,2	13,2	13,7
	15-24	3,2	3,0	3,8	2,8
	25-44	5,1	6,5	3,1	5,9
	45-64	12,1	10,5	12,1	12,5
	65-74	20,5	20,5	17,9	22,1
	>=75	48,3	40,6	43,8	52,5
Ambos sexos	Total	12,8	10,1	12,6	13,6
	15-24	3,9	3,6	4,4	3,8
	25-44	6,3	6,5	5,5	6,7
	45-64	10,5	7,7	11,5	10,6
	65-74	16,7	17,1	15,2	17,6
	>=75	41,1	30,5	40,4	43,8

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 15. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	10,1	3,7	6,2	9,5	12,0	14,0
	15-24	4,7	3,7	2,7	3,6	4,5	12,2
	25-44	7,4	3,1	3,9	6,5	9,2	9,2
	45-64	8,9	2,8	3,5	6,0	11,1	17,6
	65-74	12,4	5,9	4,5	17,3	11,9	23,8
	>=75	28,9	12,8	49,5	26,3	30,6	21,0
	Mujeres	Total	15,2	6,5	12,2	13,1	17,6
	15-24	3,2	0,0	3,9	2,8	2,6	10,4
	25-44	5,1	2,0	4,5	3,6	6,8	7,4
	45-64	12,1	6,5	13,4	12,1	11,8	14,7
	65-74	20,5	16,2	16,7	16,5	23,8	20,0
	>=75	48,2	44,3	44,4	48,0	48,2	50,3
Ambos sexos	Total	12,7	5,1	9,5	11,5	14,5	18,1
	15-24	4,0	1,8	3,3	3,2	3,7	11,3
	25-44	6,3	2,6	4,2	4,9	8,2	8,2
	45-64	10,5	4,5	8,8	9,5	11,4	15,5
	65-74	16,8	9,5	10,8	16,9	18,0	20,8
	>=75	40,9	32,2	45,9	38,8	40,6	44,8

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 16. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	10,2	15,2	13,5	7,7	6,0
	15-24	4,7	0,0	7,5	2,5	9,8
	25-44	7,4	7,8	11,2	7,4	4,5
	45-64	8,9	11,9	13,5	7,2	4,5
	65-74	12,4	12,7	19,0	10,1	8,6
	>=75	29,3	29,2	29,5	32,7	23,8
Mujeres	Total	15,2	27,8	15,5	9,8	6,5
	15-24	3,2	6,5	2,1	3,8	0,0
	25-44	5,1	5,8	5,5	7,0	2,9
	45-64	12,1	15,0	10,6	12,3	9,5
	65-74	20,5	22,7	18,9	17,3	14,3
	>=75	48,3	48,8	48,6	37,4	55,3
Ambos sexos	Total	12,8	22,4	14,5	8,7	6,3
	15-24	3,9	3,5	5,6	3,2	3,9
	25-44	6,3	7,0	8,8	7,2	3,6
	45-64	10,5	13,5	12,0	9,7	7,0
	65-74	16,7	18,9	18,9	12,4	10,6
	>=75	41,1	42,0	41,7	35,0	38,5

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 17. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	29,5	25,5	32,0	29,1
	15-24	14,9	16,3	12,7	16,0
	25-44	21,5	18,7	25,0	20,3
	45-64	33,8	28,8	36,4	33,6
	65-74	37,9	37,1	39,6	37,1
	>=75	52,3	43,5	58,2	51,1
Mujeres	Total	40,4	37,1	40,2	41,4
	15-24	16,1	11,0	16,5	17,2
	25-44	26,4	30,9	28,1	24,2
	45-64	43,6	33,6	44,4	45,8
	65-74	56,2	54,0	52,4	59,0
	>=75	68,3	69,7	64,0	70,4
Ambos sexos	Total	35,2	31,4	36,3	35,5
	15-24	15,5	13,8	14,6	16,6
	25-44	23,9	24,5	26,5	22,2
	45-64	38,8	31,3	40,5	39,8
	65-74	47,7	45,9	46,4	48,9
	>=75	62,2	59,5	61,9	63,1

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 18. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	29,5	18,4	23,1	31,7	32,4	30,3
	15-24	15,0	9,2	12,4	17,8	13,6	30,1
	25-44	21,5	11,5	15,1	23,4	25,3	19,5
	45-64	33,9	23,6	26,5	34,5	36,8	37,4
	65-74	37,9	31,1	41,2	37,1	39,6	39,6
	>=75	52,1	35,4	61,8	52,7	51,7	55,1
Mujeres	Total	40,4	28,5	33,5	35,9	43,6	51,2
	15-24	16,0	10,0	12,3	16,3	18,4	22,3
	25-44	26,4	19,9	21,3	25,5	26,6	38,3
	45-64	43,6	39,1	51,2	36,8	46,0	48,4
	65-74	56,1	46,3	41,5	50,8	60,4	59,7
	>=75	68,3	61,7	53,8	65,2	68,5	76,3
Ambos sexos	Total	35,2	23,2	28,8	34,1	37,4	44,4
	15-24	15,5	9,6	12,4	17,0	15,6	26,2
	25-44	23,9	15,7	18,5	24,6	25,8	29,8
	45-64	38,8	30,7	39,7	35,8	40,5	45,3
	65-74	47,6	36,3	41,4	44,1	50,3	55,7
	>=75	62,2	51,6	56,2	59,9	61,2	72,4

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 19. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	29,5	38,2	32,7	25,9	23,6
	15-24	14,9	10,9	15,5	15,8	13,7
	25-44	21,5	22,5	28,7	21,3	16,8
	45-64	33,8	38,6	38,1	31,3	29,5
	65-74	37,9	38,4	46,0	34,2	34,8
	>=75	52,3	53,5	49,9	56,7	41,3
Mujeres	Total	40,4	55,9	42,2	34,8	27,4
	15-24	16,1	16,1	8,4	21,4	8,8
	25-44	26,4	22,8	33,3	30,6	20,7
	45-64	43,6	51,1	42,3	39,8	42,4
	65-74	56,2	59,1	56,1	60,6	29,7
	>=75	68,3	70,7	63,6	63,9	54,4
Ambos sexos	Total	35,2	48,3	37,5	30,0	25,7
	15-24	15,5	13,7	13,0	18,7	10,7
	25-44	23,9	22,6	30,7	25,4	19,2
	45-64	38,8	45,2	40,3	35,5	36,0
	65-74	47,7	51,2	52,3	42,5	33,0
	>=75	62,2	64,7	58,7	60,1	47,4

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 20. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	18,1	14,8	19,8	17,9
	15-24	10,9	18,3	15,0	5,9
	25-44	17,2	16,1	18,6	16,7
	45-64	20,0	14,0	21,7	20,6
	65-74	17,1	12,3	18,0	17,8
	>=75	23,3	10,2	25,1	25,2
	Mujeres	Total	27,3	22,2	27,7
	15-24	15,4	9,8	15,1	17,1
	25-44	21,3	23,1	23,5	19,6
	45-64	29,0	22,2	29,8	30,2
	65-74	33,1	21,9	33,3	35,6
	>=75	40,3	29,7	35,9	45,2
Ambos sexos	Total	22,8	18,5	23,8	23,4
	15-24	13,0	14,3	15,1	11,4
	25-44	19,2	19,4	21,0	18,1
	45-64	24,6	18,2	25,8	25,5
	65-74	25,7	17,3	26,1	27,4
	>=75	33,9	22,1	32,0	37,6

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 21. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	18,1	12,7	21,6	18,8	17,5	23,5
	15-24	10,9	7,7	11,7	9,8	10,3	20,6
	25-44	17,2	9,3	23,3	18,8	15,7	25,3
	45-64	20,0	17,9	19,7	20,3	19,9	23,7
	65-74	17,1	15,4	21,7	16,6	16,7	21,2
	>=75	23,4	10,1	42,9	24,0	22,9	19,5
	Mujeres	Total	27,4	22,9	18,1	25,4	29,4
	15-24	15,5	21,0	7,3	16,3	16,7	13,3
	25-44	21,4	15,7	15,4	19,1	24,8	27,8
	45-64	29,0	29,8	21,9	27,8	28,4	34,3
	65-74	33,1	21,9	16,2	32,7	34,0	40,7
	>=75	40,5	46,3	33,7	36,5	41,6	42,8
Ambos sexos	Total	22,9	17,6	19,7	22,5	22,8	30,5
	15-24	13,2	14,3	9,3	13,4	13,0	17,0
	25-44	19,3	12,5	19,1	18,9	19,4	26,6
	45-64	24,6	23,3	20,9	24,6	23,4	31,3
	65-74	25,7	17,7	18,9	24,8	25,6	36,8
	>=75	34,0	32,4	36,5	31,2	33,5	38,4

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 22. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	18,1	18,9	17,8	17,4	18,6
	15-24	10,9	5,3	7,9	12,5	18,2
	25-44	17,2	16,0	17,6	18,1	15,9
	45-64	20,0	19,9	20,7	18,6	22,4
	65-74	17,1	16,5	21,8	13,6	19,6
	>=75	23,3	23,9	24,2	24,7	14,1
Mujeres	Total	27,3	33,9	28,6	27,0	18,5
	15-24	15,4	17,4	13,9	15,8	14,3
	25-44	21,3	25,9	24,5	25,3	15,3
	45-64	29,0	29,7	29,1	30,5	25,2
	65-74	33,1	34,1	29,8	46,4	18,0
	>=75	40,3	40,9	42,2	39,3	24,3
Ambos sexos	Total	22,8	27,5	23,2	21,9	18,5
	15-24	13,0	11,8	10,0	14,2	15,9
	25-44	19,2	20,1	20,5	21,3	15,5
	45-64	24,6	25,0	25,2	24,4	23,9
	65-74	25,7	27,4	26,9	23,9	19,0
	>=75	33,9	35,0	35,7	31,8	18,8

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 23. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) *por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	73,7	19,0	76,0	60,0	88,0
		Araba	77,3	15,0	80,0	68,0	92,0
		Gipuzkoa	71,9	18,6	76,0	60,0	88,0
		Bizkaia	73,8	20,8	76,0	60,0	88,0
	15-24	CAPV	77,5	18,7	80,0	68,0	88,0
		Araba	77,0	14,6	80,0	72,0	84,0
		Gipuzkoa	73,4	21,5	76,0	64,0	88,0
		Bizkaia	80,2	17,3	80,0	72,0	92,0
	25-44	CAPV	74,2	22,6	76,0	64,0	88,0
		Araba	78,9	19,1	84,0	68,0	92,0
		Gipuzkoa	72,9	21,3	76,0	60,0	88,0
		Bizkaia	73,6	25,0	76,0	60,0	88,0
	45-64	CAPV	72,7	18,0	76,0	60,0	88,0
		Araba	77,1	13,7	80,0	68,0	88,0
		Gipuzkoa	70,5	17,3	72,0	56,0	84,0
		Bizkaia	72,8	20,1	76,0	60,0	88,0
	65-74	CAPV	75,4	14,8	80,0	64,0	88,0
		Araba	74,6	12,0	76,0	64,0	88,0
		Gipuzkoa	75,0	15,7	80,0	64,0	92,0
		Bizkaia	75,9	15,4	80,0	68,0	88,0
>=75	CAPV	69,7	17,8	72,0	56,0	84,0	
	Araba	74,4	12,6	76,0	64,0	88,0	
	Gipuzkoa	68,0	17,0	72,0	52,0	84,0	
	Bizkaia	69,6	20,1	72,0	52,0	84,0	
Mujeres	Total	CAPV	68,0	19,8	72,0	56,0	84,0
		Araba	71,5	15,7	72,0	60,0	88,0
		Gipuzkoa	68,1	19,0	72,0	56,0	84,0
		Bizkaia	67,0	21,9	68,0	52,0	80,0
	15-24	CAPV	71,4	19,0	72,0	60,0	84,0
		Araba	77,3	16,0	80,0	68,0	92,0
		Gipuzkoa	73,0	17,4	76,0	60,0	88,0
		Bizkaia	68,7	20,9	72,0	56,0	84,0
	25-44	CAPV	69,9	23,6	72,0	60,0	84,0
		Araba	73,1	19,1	76,0	60,0	88,0
		Gipuzkoa	68,1	23,8	72,0	56,0	84,0
		Bizkaia	70,0	25,3	72,0	60,0	84,0

(continuación)

*El rango de los valores va de 0 a 100. Mayores valores indican mejor salud mental

Tabla 23. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) *por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	45-64	CAPV	68,0	18,3	68,0	56,0	84,0
		Araba	72,2	14,0	76,0	60,0	84,0
		Gipuzkoa	68,1	17,3	68,0	56,0	84,0
		Bizkaia	66,8	20,7	68,0	56,0	80,0
	65-74	CAPV	65,6	18,0	68,0	52,0	84,0
		Araba	66,0	14,1	68,0	52,0	80,0
		Gipuzkoa	66,8	18,5	68,0	52,0	84,0
		Bizkaia	64,8	19,0	68,0	52,0	80,0
	>=75	CAPV	63,2	18,9	64,0	48,0	80,0
		Araba	65,6	14,2	68,0	52,0	80,0
		Gipuzkoa	65,5	17,3	68,0	52,0	80,0
		Bizkaia	61,3	21,6	64,0	44,0	76,0
Ambos sexos	Total	CAPV	70,7	19,6	72,0	60,0	84,0
		Araba	74,4	15,6	76,0	64,0	88,0
		Gipuzkoa	69,9	18,9	72,0	56,0	84,0
		Bizkaia	70,3	21,7	72,0	56,0	84,0
	15-24	CAPV	74,5	19,2	76,0	64,0	88,0
		Araba	77,2	15,2	80,0	68,0	88,0
		Gipuzkoa	73,2	19,5	76,0	64,0	88,0
		Bizkaia	74,6	20,5	76,0	64,0	88,0
	25-44	CAPV	72,1	23,3	76,0	60,0	88,0
		Araba	76,1	19,3	80,0	64,0	92,0
		Gipuzkoa	70,6	22,7	72,0	60,0	84,0
		Bizkaia	71,8	25,2	72,0	60,0	84,0
	45-64	CAPV	70,3	18,3	72,0	56,0	84,0
		Araba	74,6	14,0	76,0	64,0	88,0
		Gipuzkoa	69,3	17,3	72,0	56,0	84,0
		Bizkaia	69,7	20,7	72,0	56,0	84,0
	65-74	CAPV	70,2	17,0	72,0	56,0	84,0
		Araba	70,1	13,3	72,0	56,0	84,0
		Gipuzkoa	70,7	17,6	76,0	56,0	88,0
		Bizkaia	69,9	18,1	72,0	56,0	84,0
>=75	CAPV	65,7	18,7	68,0	52,0	80,0	
	Araba	69,1	13,9	72,0	56,0	84,0	
	Gipuzkoa	66,4	17,2	68,0	52,0	80,0	
	Bizkaia	64,5	21,3	68,0	48,0	80,0	

* El rango de los valores va de 0 a 100. Mayores valores indican mejor salud mental.

Tabla 24. Distribución del índice de salud mental (MHI-5)*por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Hombres	Total	Total	73,7	19,0	76,0	60,0	88,0	
		I	76,9	17,2	76,0	68,0	88,0	
		II	73,2	17,4	76,0	60,0	84,0	
		III	74,4	18,0	76,0	64,0	88,0	
		IV	73,2	19,4	76,0	60,0	88,0	
		V	70,9	21,8	72,0	56,0	88,0	
		15-24 Total	Total	77,5	18,8	80,0	68,0	88,0
			I	77,5	18,3	76,0	76,0	88,0
			II	74,4	16,8	76,0	64,0	88,0
			III	79,8	21,4	84,0	72,0	92,0
			IV	77,5	18,5	80,0	68,0	92,0
			V	77,0	18,3	80,0	68,0	92,0
		25-44 Total	Total	74,2	22,6	76,0	64,0	88,0
			I	77,7	18,9	80,0	68,0	88,0
			II	73,0	19,7	76,0	60,0	84,0
			III	73,3	20,6	72,0	60,0	88,0
			IV	74,1	23,7	76,0	64,0	88,0
			V	72,9	27,3	76,0	56,0	92,0
		45-64 Total	Total	72,7	18,0	76,0	60,0	88,0
			I	75,8	16,8	76,0	68,0	88,0
			II	73,5	16,1	76,0	60,0	84,0
			III	74,3	17,0	76,0	64,0	88,0
			IV	72,0	18,6	72,0	56,0	88,0
			V	66,9	19,2	68,0	52,0	84,0
		65-74 Total	Total	75,4	14,8	80,0	64,0	88,0
			I	78,1	13,6	84,0	68,0	88,0
			II	76,1	16,1	80,0	64,0	92,0
			III	75,9	15,9	80,0	64,0	92,0
			IV	74,6	14,6	76,0	64,0	88,0
			V	72,9	13,8	76,0	64,0	84,0
	>=75 Total	Total	69,6	17,8	72,0	56,0	84,0	
		I	73,3	20,0	76,0	64,0	88,0	
		II	66,7	17,4	60,0	52,0	84,0	
		III	72,2	16,6	76,0	56,0	88,0	
		IV	69,2	18,0	72,0	56,0	84,0	
		V	65,0	18,4	64,0	52,0	80,0	

(continuación)

*El rango de los valores va de 0 a 100. Mayores valores indican mejor salud mental.

Tabla 24. Distribución del índice de salud mental (MHI-5)* por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Mujeres	Total	Total	67,9	19,8	72,0	56,0	84,0	
		I	70,4	19,3	72,0	60,0	84,0	
		II	72,3	18,2	76,0	60,0	84,0	
		III	69,0	18,9	72,0	56,0	84,0	
		IV	66,3	20,1	68,0	52,0	80,0	
		V	66,0	20,9	68,0	52,0	84,0	
		15-24 Total	Total	71,3	19,1	72,0	60,0	84,0
			I	69,7	21,2	76,0	56,0	88,0
			II	74,0	18,3	76,0	64,0	88,0
			III	71,2	17,2	72,0	64,0	84,0
			IV	71,1	19,7	72,0	60,0	84,0
			V	70,9	19,3	72,0	56,0	88,0
		25-44 Total	Total	69,9	23,6	72,0	60,0	84,0
			I	71,0	22,2	72,0	60,0	84,0
			II	72,8	20,9	76,0	60,0	84,0
			III	70,7	22,2	72,0	60,0	84,0
			IV	68,0	24,7	72,0	52,0	84,0
			V	69,4	26,4	72,0	56,0	88,0
		45-64 Total	Total	68,0	18,3	68,0	56,0	84,0
			I	70,0	16,6	68,0	56,0	84,0
			II	72,2	16,4	72,0	64,0	84,0
			III	68,7	18,1	72,0	56,0	84,0
			IV	66,8	18,5	68,0	52,0	84,0
			V	66,0	19,4	68,0	52,0	84,0
		65-74 Total	Total	65,6	18,0	68,0	52,0	84,0
			I	71,5	18,6	72,0	56,0	84,0
			II	72,5	16,9	76,0	60,0	88,0
			III	67,7	16,1	68,0	52,0	84,0
			IV	64,9	18,1	68,0	52,0	80,0
			V	60,7	19,1	60,0	48,0	80,0
	>=75 Total	Total	63,2	18,9	64,0	48,0	80,0	
		I	68,0	18,5	72,0	48,0	88,0	
		II	68,3	17,6	72,0	56,0	84,0	
		III	64,4	18,4	68,0	52,0	80,0	
		IV	61,4	18,9	64,0	44,0	80,0	
		V	63,4	19,6	64,0	48,0	80,0	

(continuación)

*El rango de los valores va de 0 a 100. Mayores valores indican mejor salud mental.

Tabla 24. Distribución del índice de salud mental (MHI-5)* por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	Total	70,7	19,7	72,0	60,0	84,0
	I	73,8	18,5	76,0	64,0	88,0
	II	72,7	17,9	76,0	60,0	84,0
	III	71,4	18,7	72,0	60,0	84,0
	IV	70,2	20,0	72,0	56,0	84,0
	V	67,6	21,3	68,0	52,0	84,0
	15-24 Total	74,5	19,2	76,0	64,0	88,0
	I	73,6	20,2	76,0	64,0	88,0
	II	74,2	17,6	76,0	64,0	88,0
	III	75,2	19,6	80,0	64,0	88,0
	IV	74,8	19,3	76,0	64,0	88,0
	V	73,9	18,9	76,0	60,0	88,0
	25-44 Total	72,1	23,3	76,0	60,0	88,0
	I	74,3	21,0	76,0	64,0	88,0
	II	72,9	20,3	76,0	60,0	84,0
	III	71,8	21,6	72,0	60,0	84,0
	IV	71,6	24,4	72,0	60,0	88,0
	V	71,0	26,8	72,0	56,0	88,0
	45-64 Total	70,3	18,3	72,0	56,0	84,0
	I	73,1	16,9	72,0	64,0	88,0
	II	72,8	16,3	76,0	64,0	84,0
	III	71,1	17,8	72,0	60,0	84,0
	IV	69,8	18,7	72,0	56,0	84,0
	V	66,3	19,3	68,0	52,0	84,0
	65-74 Total	70,2	17,0	72,0	56,0	84,0
I	75,8	15,4	80,0	68,0	88,0	
II	74,2	16,5	76,0	60,0	88,0	
III	71,7	16,3	76,0	60,0	88,0	
IV	69,7	16,9	72,0	56,0	84,0	
V	63,2	18,6	64,0	48,0	80,0	
>=75 Total	65,7	18,7	68,0	52,0	80,0	
I	70,1	19,1	76,0	52,0	88,0	
II	67,8	17,5	68,0	52,0	84,0	
III	67,8	17,9	72,0	52,0	84,0	
IV	64,8	18,8	68,0	52,0	80,0	
V	63,7	19,4	64,0	52,0	80,0	

*El rango de los valores va de 0 a 100. Mayores valores indican mejor salud mental.

Tabla 25. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) **por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	Total	73,7	19,0	76,0	60,0	88,0
		Sin estudios, primaria	72,3	18,0	76,0	60,0	88,0
		Secundaria, inferior	72,8	21,0	76,0	60,0	88,0
		Secundaria, superior	73,9	19,2	76,0	64,0	88,0
		Terciaria	76,0	17,7	80,0	68,0	88,0
	15-24	Total	77,5	18,7	80,0	68,0	88,0
		Sin estudios, primaria	77,7	18,7	80,0	64,0	88,0
		Secundaria, inferior	77,5	20,1	80,0	72,0	92,0
		Secundaria, superior	77,5	17,5	80,0	68,0	88,0
		Terciaria	77,0	20,4	80,0	68,0	88,0
	25-44	Total	74,2	22,6	76,0	64,0	88,0
		Sin estudios, primaria	74,1	26,0	76,0	64,0	88,0
		Secundaria, inferior	72,6	26,6	76,0	60,0	88,0
		Secundaria, superior	73,7	21,8	76,0	60,0	88,0
		Terciaria	76,2	20,1	76,0	64,0	88,0
	45-64	Total	72,7	18,0	76,0	60,0	88,0
		Sin estudios, primaria	72,2	16,8	72,0	60,0	84,0
		Secundaria, inferior	70,6	20,0	72,0	52,0	88,0
		Secundaria, superior	72,6	18,2	76,0	60,0	88,0
		Terciaria	75,0	16,9	76,0	64,0	88,0
	65-74	Total	75,4	14,8	80,0	64,0	88,0
		Sin estudios, primaria	74,5	15,1	76,0	60,0	88,0
		Secundaria, inferior	73,7	15,9	76,0	60,0	88,0
		Secundaria, superior	76,2	14,4	80,0	64,0	88,0
Terciaria		78,2	13,4	80,0	68,0	92,0	
>=75	Total	69,7	17,8	72,0	56,0	84,0	
	Sin estudios, primaria	68,7	17,6	72,0	52,0	84,0	
	Secundaria, inferior	70,7	19,3	72,0	60,0	84,0	
	Secundaria, superior	70,2	18,3	72,0	60,0	88,0	
	Terciaria	74,9	15,2	80,0	68,0	88,0	
Mujeres	Total	Total	68,0	19,8	72,0	56,0	84,0
		Sin estudios, primaria	64,1	19,0	68,0	52,0	80,0
		Secundaria, inferior	67,9	20,8	72,0	52,0	84,0
		Secundaria, superior	68,9	20,6	72,0	56,0	84,0
		Terciaria	71,5	18,1	72,0	60,0	84,0

(continuación)

****El rango de los valores va de 0 a 100. Mayores valores indican mejor salud mental**

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 25. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) **por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	15-24	Total	71,4	19,0	72,0	60,0	84,0
		Sin estudios, primaria	71,3	19,6	72,0	56,0	88,0
		Secundaria, inferior	69,9	18,7	72,0	60,0	84,0
		Secundaria, superior	72,9	18,9	76,0	60,0	88,0
		Terciaria	69,1	19,4	72,0	56,0	84,0
	25-44	Total	69,9	23,6	72,0	60,0	84,0
		Sin estudios, primaria	66,3	26,6	68,0	52,0	84,0
		Secundaria, inferior	69,1	28,2	76,0	52,0	84,0
		Secundaria, superior	68,8	24,5	72,0	52,0	84,0
		Terciaria	71,9	20,0	72,0	60,0	84,0
	45-64	Total	68,0	18,3	68,0	56,0	84,0
		Sin estudios, primaria	64,7	18,6	68,0	52,0	80,0
		Secundaria, inferior	69,1	19,4	72,0	52,0	88,0
		Secundaria, superior	68,3	18,5	72,0	56,0	84,0
		Terciaria	70,4	15,9	72,0	60,0	84,0
	65-74	Total	65,6	18,0	68,0	52,0	84,0
		Sin estudios, primaria	63,5	18,0	64,0	48,0	80,0
		Secundaria, inferior	66,9	18,6	68,0	52,0	84,0
		Secundaria, superior	64,0	16,3	64,0	48,0	80,0
		Terciaria	78,5	14,7	84,0	68,0	92,0
>=75	Total	63,2	18,9	64,0	48,0	80,0	
	Sin estudios, primaria	62,5	18,7	64,0	48,0	80,0	
	Secundaria, inferior	62,8	20,1	64,0	52,0	80,0	
	Secundaria, superior	66,1	17,8	68,0	52,0	80,0	
	Terciaria	71,5	17,6	80,0	60,0	84,0	
Ambos sexos	Total	Total	70,7	19,6	72,0	60,0	84,0
		Sin estudios, primaria	67,6	19,0	72,0	52,0	84,0
		Secundaria, inferior	70,4	21,0	72,0	56,0	88,0
		Secundaria, superior	71,6	20,0	72,0	60,0	84,0
		Terciaria	73,5	18,1	76,0	64,0	88,0
	15-24	Total	74,5	19,2	76,0	64,0	88,0
		Sin estudios, primaria	74,3	19,4	80,0	64,0	88,0
		Secundaria, inferior	74,9	19,9	76,0	64,0	88,0
		Secundaria, superior	75,1	18,4	76,0	64,0	88,0
		Terciaria	72,3	20,1	76,0	60,0	88,0

(continuación)

**El rango de los valores va de 0 a 100. Mayores valores indican mejor salud mental.

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 25. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) **por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	25-44 Total	72,1	23,3	76,0	60,0	88,0
	Sin estudios, primaria	70,9	26,6	72,0	56,0	88,0
	Secundaria, inferior	71,1	27,4	76,0	60,0	88,0
	Secundaria, superior	71,5	23,2	72,0	60,0	84,0
	Terciaria	73,6	20,2	76,0	64,0	84,0
45-64	Total	70,3	18,3	72,0	56,0	84,0
	Sin estudios, primaria	68,3	18,1	72,0	56,0	84,0
	Secundaria, inferior	69,8	19,6	72,0	52,0	88,0
	Secundaria, superior	70,5	18,5	72,0	60,0	84,0
	Terciaria	72,7	16,5	72,0	64,0	84,0
65-74	Total	70,2	17,0	72,0	56,0	84,0
	Sin estudios, primaria	67,7	17,4	72,0	52,0	84,0
	Secundaria, inferior	69,5	17,7	76,0	56,0	88,0
	Secundaria, superior	72,4	15,7	76,0	64,0	84,0
	Terciaria	78,3	13,8	84,0	68,0	92,0
>=75	Total	65,7	18,7	68,0	52,0	80,0
	Sin estudios, primaria	64,7	18,5	68,0	52,0	80,0
	Secundaria, inferior	65,6	20,0	68,0	52,0	80,0
	Secundaria, superior	68,2	18,1	72,0	56,0	84,0
	Terciaria	73,3	16,3	80,0	64,0	84,0

**El rango de los valores va de 0 a 100. Mayores valores indican mejor salud mental.

Tabla 26. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	15,5	12,3	17,3	15,3
	15-24	10,0	10,8	17,3	5,0
	25-44	13,9	11,3	14,2	14,5
	45-64	16,8	12,5	18,8	16,7
	65-74	14,9	17,6	15,7	13,8
	>=75	23,9	11,6	26,6	25,2
	Mujeres	Total	24,3	19,6	24,0
	15-24	18,4	11,2	17,8	20,8
	25-44	21,5	20,4	21,7	21,8
	45-64	23,1	16,5	24,3	24,1
	65-74	29,7	26,7	28,3	31,3
	>=75	32,7	25,8	29,6	35,9
Ambos sexos	Total	20,0	16,0	20,8	20,7
	15-24	14,1	11,0	17,5	12,8
	25-44	17,6	15,6	17,8	18,0
	45-64	20,0	14,5	21,6	20,5
	65-74	22,8	22,3	22,4	23,2
	>=75	29,3	20,3	28,5	31,8

Tabla 27. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	15,5	8,7	13,8	15,1	16,2	23,4
	15-24	10,1	6,9	7,2	9,7	10,9	15,8
	25-44	13,9	8,4	13,7	13,7	13,7	21,6
	45-64	16,8	9,2	12,3	15,6	18,4	25,8
	65-74	14,9	8,5	18,4	15,9	15,2	20,6
	>=75	24,0	15,3	32,2	20,9	23,5	35,7
	Mujeres	Total	24,3	19,3	16,7	21,6	27,2
	15-24	18,6	21,8	18,5	17,0	16,5	24,8
	25-44	21,6	17,8	15,4	20,4	25,3	23,5
	45-64	23,1	18,8	13,3	20,5	25,6	29,2
	65-74	29,7	14,7	21,4	25,9	30,4	39,6
	>=75	32,4	33,3	24,4	28,7	35,9	31,3
Ambos sexos	Total	20,0	13,8	15,4	18,8	21,1	27,3
	15-24	14,2	14,3	13,4	13,7	13,3	20,3
	25-44	17,6	13,2	14,6	17,5	18,4	22,6
	45-64	20,0	13,6	12,8	18,4	21,3	28,2
	65-74	22,8	10,7	19,9	21,0	23,0	35,8
	>=75	29,3	26,4	26,8	25,4	30,5	32,2

Tabla 28. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	15,5	18,4	19,1	14,2	11,2
	15-24	10,0	7,1	10,4	11,4	6,3
	25-44	13,9	16,8	18,4	13,2	10,9
	45-64	16,8	14,6	25,4	16,5	12,4
	65-74	14,9	18,1	18,1	11,6	9,7
	>=75	23,9	26,7	18,2	23,3	14,3
Mujeres	Total	24,3	31,4	26,3	22,9	15,7
	15-24	18,4	20,0	20,4	15,7	22,8
	25-44	21,5	30,6	25,3	25,1	14,8
	45-64	23,1	28,8	25,3	21,7	16,3
	65-74	29,7	33,3	26,3	34,3	8,3
	>=75	32,7	33,7	34,3	26,3	19,3
Ambos sexos	Total	20,0	25,8	22,7	18,2	13,7
	15-24	14,1	14,0	13,9	13,6	16,2
	25-44	17,6	22,4	21,3	18,5	13,3
	45-64	20,0	22,1	25,4	19,0	14,4
	65-74	22,8	27,5	23,2	18,7	9,2
	>=75	29,3	31,2	28,5	24,8	16,7

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 29. Proporción (%) de personas que han pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	3,6	3,8	3,8	3,5
	15-24	2,0	5,6	0,0	2,1
	25-44	4,4	5,5	4,7	3,9
	45-64	4,4	2,9	5,1	4,4
	65-74	2,1	0,8	3,0	1,8
	>=75	1,6	0,7	1,4	2,0
	Mujeres	Total	5,1	2,9	5,7
	15-24	3,8	8,4	1,6	4,0
	25-44	5,4	2,8	8,8	4,1
	45-64	6,1	1,9	6,2	7,1
	65-74	4,7	3,9	3,1	6,0
	>=75	3,1	1,0	2,1	4,2
Ambos sexos	Total	4,4	3,4	4,8	4,4
	15-24	2,9	6,9	0,8	3,0
	25-44	4,9	4,2	6,7	4,0
	45-64	5,3	2,4	5,7	5,8
	65-74	3,5	2,4	3,0	4,0
	>=75	2,6	0,9	1,9	3,3

Tabla 30. Proporción (%) de personas que han pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	3,6	4,0	4,0	3,1	3,1	6,9
	15-24	2,0	0,0	0,0	3,8	1,1	8,6
	25-44	4,4	3,9	3,3	3,7	3,9	9,2
	45-64	4,4	6,9	5,9	3,3	3,8	5,9
	65-74	2,1	1,6	4,0	1,7	2,0	3,0
	>=75	1,7	0,0	9,2	1,7	1,3	0,0
	Mujeres	Total	5,1	2,6	4,8	4,6	5,6
	15-24	3,9	2,6	5,0	2,8	4,4	5,0
	25-44	5,4	0,0	6,3	6,1	5,5	8,5
	45-64	6,1	6,8	5,7	4,7	5,9	8,1
	65-74	4,8	0,0	0,0	4,5	6,4	4,4
	>=75	3,1	2,7	0,0	1,0	4,9	2,5
Ambos sexos	Total	4,4	3,3	4,4	3,9	4,2	6,6
	15-24	2,9	1,3	2,7	3,3	2,5	6,8
	25-44	4,9	1,9	4,9	5,1	4,5	8,8
	45-64	5,3	6,9	5,8	4,1	4,7	7,5
	65-74	3,5	1,0	1,9	3,1	4,2	4,1
	>=75	2,6	1,7	2,8	1,3	3,4	2,1

Tabla 31. Proporción (%) de personas que han pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	Terciaria
Hombres	Total	3,6	2,8	5,0	3,3	4,0
	15-24	2,0	0,0	2,9	2,2	0,0
	25-44	4,4	4,2	6,9	3,8	4,0
	45-64	4,4	4,7	5,1	3,6	5,0
	65-74	2,1	0,6	5,5	1,8	2,5
	>=75	1,6	1,2	1,9	1,7	4,4
Mujeres	Total	5,1	5,6	5,0	5,4	3,9
	15-24	3,8	10,6	2,3	3,6	1,4
	25-44	5,4	10,5	6,0	6,6	2,9
	45-64	6,1	6,8	5,4	5,4	6,9
	65-74	4,7	4,9	5,5	2,6	4,2
	>=75	3,1	3,3	3,6	1,7	0,0
Ambos sexos	Total	4,4	4,4	5,0	4,3	4,0
	15-24	2,9	5,6	2,7	2,9	0,9
	25-44	4,9	6,8	6,5	5,0	3,3
	45-64	5,3	5,8	5,3	4,5	6,0
	65-74	3,5	3,3	5,5	2,0	3,1
	>=75	2,6	2,6	3,0	1,7	2,3

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 32. Proporción (%) de personas que han pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	1,2	1,6	1,2	1,1
	15-24	0,8	0,9	0,0	1,3
	25-44	1,2	2,9	1,0	0,8
	45-64	1,7	1,1	1,9	1,7
	65-74	0,8	0,0	1,6	0,5
	>=75	0,2	0,0	0,0	0,3
	Mujeres	Total	1,6	0,7	1,6
	15-24	1,1	1,4	0,0	1,7
	25-44	1,6	0,6	2,3	1,4
	45-64	1,7	0,7	1,4	2,1
	65-74	1,3	1,2	1,6	1,2
	>=75	1,8	0,0	1,2	2,6
Ambos sexos	Total	1,4	1,1	1,4	1,5
	15-24	0,9	1,1	0,0	1,5
	25-44	1,4	1,8	1,6	1,1
	45-64	1,7	0,9	1,7	1,9
	65-74	1,1	0,6	1,6	0,9
	>=75	1,2	0,0	0,8	1,7

Tabla 33. Proporción (%) de personas que han pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	1,2	1,2	0,9	1,1	1,1	2,4
	15-24	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
	25-44	1,2	0,4	0,0	0,8	1,6	2,3
	45-64	1,7	2,7	1,7	1,8	1,4	1,7
	65-74	0,8	0,8	4,0	1,1	0,3	0,0
	>=75	0,2	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
	Mujeres	Total	1,6	0,9	1,5	0,9	1,9
	15-24	1,1	2,6	3,2	0,0	0,6	0,0
	25-44	1,6	0,0	1,3	1,3	1,8	3,5
	45-64	1,7	1,6	1,8	0,9	1,9	2,5
	65-74	1,3	0,0	0,0	0,0	1,8	2,6
	>=75	1,8	0,0	0,0	1,0	3,1	1,0
Ambos sexos	Total	1,4	1,0	1,2	1,0	1,5	2,4
	15-24	1,0	1,3	1,8	0,0	0,2	4,3
	25-44	1,4	0,2	0,7	1,1	1,7	2,9
	45-64	1,7	2,2	1,7	1,3	1,6	2,3
	65-74	1,1	0,5	1,9	0,5	1,1	2,1
	>=75	1,2	0,0	0,0	0,9	1,7	0,8

Tabla 34. Proporción (%) de personas que han pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	Terciaria
Hombres	Total	1,2	0,7	2,0	1,0	1,4
	15-24	0,8	0,0	2,4	0,0	0,0
	25-44	1,2	0,0	2,2	1,3	0,9
	45-64	1,7	1,4	2,4	1,3	2,1
	65-74	0,8	0,6	1,0	0,0	2,5
	>=75	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Mujeres	Total	1,6	2,4	1,8	1,5	0,5
	15-24	1,1	0,0	1,1	1,8	0,0
	25-44	1,6	5,0	2,9	1,8	0,3
	45-64	1,7	3,1	1,1	1,5	1,0
	65-74	1,3	1,4	2,1	0,0	0,0
	>=75	1,8	2,1	1,8	0,0	0,0
Ambos sexos	Total	1,4	1,7	1,9	1,3	0,9
	15-24	0,9	0,0	1,9	0,9	0,0
	25-44	1,4	2,0	2,5	1,5	0,5
	45-64	1,7	2,3	1,7	1,4	1,5
	65-74	1,1	1,1	1,7	0,0	1,6
	>=75	1,2	1,5	1,2	0,0	0,0

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 35. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y territorio histórico

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Hombres Total	CAPV	N	51.596	195.357	442.665	176.332	49.174	915.124
		%	5,6	21,3	48,4	19,3	5,4	100,0
	Araba	N	10.893	29.931	67.566	21.725	3.635	133.751
		%	8,1	22,4	50,5	16,2	2,7	100,0
	Gipuzkoa	N	11.451	59.000	142.595	62.633	18.132	293.812
		%	3,9	20,1	48,5	21,3	6,2	100,0
	Bizkaia	N	29.251	106.426	232.505	91.973	27.406	487.561
		%	6,0	21,8	47,7	18,9	5,6	100,0
15-24	CAPV	N	16.001	38.549	32.985	6.082	841	94.458
		%	16,9	40,8	34,9	6,4	0,9	100,0
	Araba	N	3.236	5.395	5.221	872	146	14.869
		%	21,8	36,3	35,1	5,9	1,0	100,0
	Gipuzkoa	N	3.803	12.944	11.290	2.973	295	31.305
		%	12,1	41,3	36,1	9,5	0,9	100,0
	Bizkaia	N	8.961	20.210	16.475	2.237	401	48.284
		%	18,6	41,9	34,1	4,6	0,8	100,0
25-44	CAPV	N	20.303	93.603	155.951	54.181	12.270	336.309
		%	6,0	27,8	46,4	16,1	3,6	100,0
	Araba	N	5.280	11.620	28.929	5.819	415	52.062
		%	10,1	22,3	55,6	11,2	0,8	100,0
	Gipuzkoa	N	4.795	28.531	44.607	23.206	5.650	106.790
		%	4,5	26,7	41,8	21,7	5,3	100,0
	Bizkaia	N	10.228	53.452	82.416	25.156	6.205	177.458
		%	5,8	30,1	46,4	14,2	3,5	100,0
45-64	CAPV	N	9.950	47.879	155.997	68.298	20.532	302.655
		%	3,3	15,8	51,5	22,6	6,8	100,0
	Araba	N	2.217	9.553	21.637	8.224	1.121	42.751
		%	5,2	22,3	50,6	19,2	2,6	100,0
	Gipuzkoa	N	1.911	13.472	53.087	21.776	7.172	97.419
		%	2,0	13,8	54,5	22,4	7,4	100,0
	Bizkaia	N	5.822	24.853	81.273	38.298	12.239	162.485
		%	3,6	15,3	50,0	23,6	7,5	100,0
65-74	CAPV	N	2.735	8.928	50.758	26.163	7.150	95.733
		%	2,9	9,3	53,0	27,3	7,5	100,0
	Araba	N	.	1.654	7.001	3.762	746	13.163
		%	.	12,6	53,2	28,6	5,7	100,0

(continuación)

Tabla 35. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	550	2.780	19.245	7.126	2.430	32.130		
			%	1,7	8,7	59,9	22,2	7,6	100,0		
		Bizkaia	N	2.185	4.494	24.512	15.275	3.974	50.440		
			%	4,3	8,9	48,6	30,3	7,9	100,0		
	>=75	CAPV	N	2.607	6.399	46.974	21.607	8.380	85.968		
			%	3,0	7,4	54,6	25,1	9,7	100,0		
		Araba	N	160	1.710	4.778	3.048	1.208	10.905		
			%	1,5	15,7	43,8	28,0	11,1	100,0		
		Gipuzkoa	N	392	1.273	14.367	7.552	2.584	26.168		
			%	1,5	4,9	54,9	28,9	9,9	100,0		
		Bizkaia	N	2.055	3.416	27.829	11.007	4.587	48.895		
			%	4,2	7,0	56,9	22,5	9,4	100,0		
		Mujeres	Total	CAPV	N	57.331	192.143	461.644	217.032	47.732	975.882
					%	5,9	19,7	47,3	22,2	4,9	100,0
	Araba		N	10.780	33.049	65.875	23.019	4.048	136.772		
			%	7,9	24,2	48,2	16,8	3,0	100,0		
Gipuzkoa	N		16.143	59.740	148.357	74.490	13.955	312.686			
	%		5,2	19,1	47,4	23,8	4,5	100,0			
Bizkaia	N		30.408	99.354	247.412	119.523	29.729	526.425			
	%		5,8	18,9	47,0	22,7	5,6	100,0			
15-24	CAPV		N	19.518	30.348	30.326	8.005	1.302	89.499		
			%	21,8	33,9	33,9	8,9	1,5	100,0		
	Araba		N	2.958	6.332	3.790	130	.	13.210		
			%	22,4	47,9	28,7	1,0	.	100,0		
	Gipuzkoa		N	4.718	10.955	10.465	2.339	967	29.443		
			%	16,0	37,2	35,5	7,9	3,3	100,0		
	Bizkaia	N	11.843	13.061	16.071	5.535	335	46.846			
		%	25,3	27,9	34,3	11,8	0,7	100,0			
	25-44	CAPV	N	23.359	89.465	140.611	58.623	8.767	320.826		
			%	7,3	27,9	43,8	18,3	2,7	100,0		
Araba		N	5.555	14.499	19.107	7.559	1.149	47.869			
		%	11,6	30,3	39,9	15,8	2,4	100,0			
Gipuzkoa		N	5.760	25.079	47.493	21.085	2.488	101.905			
		%	5,7	24,6	46,6	20,7	2,4	100,0			
Bizkaia		N	12.044	49.887	74.011	29.980	5.130	171.052			
		%	7,0	29,2	43,3	17,5	3,0	100,0			

(continuación)

Tabla 35. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	9.432	49.627	158.916	76.316	19.477	313.769
			%	3,0	15,8	50,6	24,3	6,2	100,0
		Araba	N	1.970	8.232	23.704	9.358	999	44.263
			%	4,5	18,6	53,6	21,1	2,3	100,0
		Gipuzkoa	N	3.853	15.735	49.083	24.885	6.106	99.662
			%	3,9	15,8	49,2	25,0	6,1	100,0
	Bizkaia	N	3.609	25.660	86.129	42.073	12.373	169.843	
		%	2,1	15,1	50,7	24,8	7,3	100,0	
	65-74	CAPV	N	1.555	12.001	58.451	30.530	7.387	109.925
			%	1,4	10,9	53,2	27,8	6,7	100,0
		Araba	N	95	2.351	8.839	2.551	484	14.320
			%	0,7	16,4	61,7	17,8	3,4	100,0
		Gipuzkoa	N	753	3.726	17.678	12.053	1.911	36.120
			%	2,1	10,3	48,9	33,4	5,3	100,0
	Bizkaia	N	707	5.923	31.935	15.927	4.992	59.484	
		%	1,2	10,0	53,7	26,8	8,4	100,0	
	>=75	CAPV	N	3.467	10.703	73.340	43.557	10.798	141.864
			%	2,4	7,5	51,7	30,7	7,6	100,0
Araba		N	202	1.635	10.436	3.421	1.416	17.110	
		%	1,2	9,6	61,0	20,0	8,3	100,0	
Gipuzkoa		N	1.059	4.245	23.639	14.128	2.484	45.555	
		%	2,3	9,3	51,9	31,0	5,5	100,0	
Bizkaia	N	2.206	4.822	39.266	26.008	6.898	79.200		
	%	2,8	6,1	49,6	32,8	8,7	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	108.927	387.500	904.309	393.364	96.906	1.891.006
			%	5,8	20,5	47,8	20,8	5,1	100,0
	Araba	N	21.674	62.981	133.441	44.744	7.683	270.523	
		%	8,0	23,3	49,3	16,5	2,8	100,0	
	Gipuzkoa	N	27.595	118.740	290.952	137.123	32.087	606.497	
		%	4,5	19,6	48,0	22,6	5,3	100,0	
	Bizkaia	N	59.659	205.780	479.917	211.496	57.135	1.013.987	
		%	5,9	20,3	47,3	20,9	5,6	100,0	
	15-24	CAPV	N	35.519	68.897	63.312	14.087	2.143	183.958
			%	19,3	37,5	34,4	7,7	1,2	100,0
		Araba	N	6.194	11.726	9.011	1.003	146	28.079
			%	22,1	41,8	32,1	3,6	0,5	100,0

(continuación)

Tabla 35. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y territorio histórico

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa N	8.521	23.899	21.755	5.312	1.262	60.748
		%	14,0	39,3	35,8	8,7	2,1	100,0
		Bizkaia N	20.804	33.272	32.546	7.772	736	95.130
		%	21,9	35,0	34,2	8,2	0,8	100,0
	25-44	CAPV N	43.662	183.068	296.562	112.805	21.037	657.135
		%	6,6	27,9	45,1	17,2	3,2	100,0
		Araba N	10.835	26.119	48.035	13.378	1.563	99.930
		%	10,8	26,1	48,1	13,4	1,6	100,0
		Gipuzkoa N	10.555	53.610	92.100	44.291	8.139	208.695
		%	5,1	25,7	44,1	21,2	3,9	100,0
		Bizkaia N	22.272	103.340	156.427	55.136	11.335	348.509
		%	6,4	29,7	44,9	15,8	3,3	100,0
	45-64	CAPV N	19.382	97.506	314.912	144.614	40.010	616.424
		%	3,1	15,8	51,1	23,5	6,5	100,0
		Araba N	4.187	17.785	45.341	17.582	2.120	87.015
		%	4,8	20,4	52,1	20,2	2,4	100,0
		Gipuzkoa N	5.764	29.207	102.170	46.661	13.278	197.081
		%	2,9	14,8	51,8	23,7	6,7	100,0
		Bizkaia N	9.431	50.513	167.402	80.371	24.612	332.328
		%	2,8	15,2	50,4	24,2	7,4	100,0
	65-74	CAPV N	4.290	20.928	109.209	56.694	14.538	205.658
		%	2,1	10,2	53,1	27,6	7,1	100,0
		Araba N	95	4.006	15.840	6.313	1.230	27.483
		%	0,3	14,6	57,6	23,0	4,5	100,0
		Gipuzkoa N	1.303	6.506	36.922	19.179	4.341	68.251
		%	1,9	9,5	54,1	28,1	6,4	100,0
		Bizkaia N	2.892	10.417	56.447	31.202	8.967	109.924
		%	2,6	9,5	51,4	28,4	8,2	100,0
	>=75	CAPV N	6.074	17.102	120.314	65.164	19.178	227.832
		%	2,7	7,5	52,8	28,6	8,4	100,0
		Araba N	362	3.345	15.214	6.469	2.625	28.015
		%	1,3	11,9	54,3	23,1	9,4	100,0
		Gipuzkoa N	1.451	5.518	38.005	21.680	5.068	71.723
		%	2,0	7,7	53,0	30,2	7,1	100,0
		Bizkaia N	4.261	8.238	67.095	37.015	11.485	128.094
		%	3,3	6,4	52,4	28,9	9,0	100,0

Tabla 36. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y clase social

		Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Hombres	Total	N 51.596	194.799	441.963	176.332	49.174	913.863
		% 5,6	21,3	48,4	19,3	5,4	100,0
	I	N 11.423	34.573	49.388	16.866	1.439	113.690
		% 10,0	30,4	43,4	14,8	1,3	100,0
	II	N 6.869	21.515	37.836	9.505	2.481	78.206
		% 8,8	27,5	48,4	12,2	3,2	100,0
	III	N 12.042	39.631	91.189	32.830	12.663	188.355
		% 6,4	21,0	48,4	17,4	6,7	100,0
	IV	N 17.415	85.373	225.746	94.904	26.867	450.306
		% 3,9	19,0	50,1	21,1	6,0	100,0
	V	N 3.848	13.707	37.803	22.226	5.724	83.307
		% 4,6	16,5	45,4	26,7	6,9	100,0
	15-24 Total	N 16.001	37.991	32.985	6.082	841	93.900
		% 17,0	40,5	35,1	6,5	0,9	100,0
	I	N 4.953	4.368	3.603	1.710	.	14.634
		% 33,8	29,8	24,6	11,7	.	100,0
	II	N 2.294	4.509	3.978	207	.	10.988
		% 20,9	41,0	36,2	1,9	.	100,0
	III	N 3.339	7.061	5.510	520	401	16.830
		% 19,8	42,0	32,7	3,1	2,4	100,0
	IV	N 4.660	19.182	15.433	3.316	146	42.737
		% 10,9	44,9	36,1	7,8	0,3	100,0
	V	N 755	2.870	4.461	329	295	8.711
		% 8,7	32,9	51,2	3,8	3,4	100,0
	25-44 Total	N 20.303	93.603	155.951	54.181	12.270	336.309
		% 6,0	27,8	46,4	16,1	3,6	100,0
	I	N 2.839	16.444	18.488	5.785	176	43.732
		% 6,5	37,6	42,3	13,2	0,4	100,0
	II	N 3.124	12.458	14.433	1.909	572	32.496
		% 9,6	38,3	44,4	5,9	1,8	100,0
	III	N 4.521	17.698	27.505	9.876	2.657	62.257
		% 7,3	28,4	44,2	15,9	4,3	100,0
	IV	N 7.357	39.211	81.280	25.961	6.584	160.392
		% 4,6	24,4	50,7	16,2	4,1	100,0
	V	N 2.463	7.793	14.245	10.650	2.281	37.432
		% 6,6	20,8	38,1	28,5	6,1	100,0

(continuación)

Tabla 36. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y clase social

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres 45-64	Total	N	9.950	47.879	155.709	68.298	20.532	302.368	
		%	3,3	15,8	51,5	22,6	6,8	100,0	
	I	N	2.523	11.092	18.421	5.493	377	37.907	
		%	6,7	29,3	48,6	14,5	1,0	100,0	
	II	N	1.145	3.280	14.352	3.704	939	23.419	
		%	4,9	14,0	61,3	15,8	4,0	100,0	
	III	N	3.243	11.694	32.401	13.934	5.049	66.322	
		%	4,9	17,6	48,9	21,0	7,6	100,0	
	IV	N	2.927	19.143	78.082	38.578	11.884	150.614	
		%	1,9	12,7	51,8	25,6	7,9	100,0	
	V	N	112	2.670	12.452	6.588	2.283	24.106	
		%	0,5	11,1	51,7	27,3	9,5	100,0	
	65-74	Total	N	2.735	8.928	50.758	26.163	7.150	95.733
			%	2,9	9,3	53,0	27,3	7,5	100,0
	I	N	821	2.353	7.005	2.981	592	13.753	
		%	6,0	17,1	50,9	21,7	4,3	100,0	
	II	N	137	150	3.324	2.435	816	6.862	
		%	2,0	2,2	48,4	35,5	11,9	100,0	
	III	N	442	1.719	13.130	4.186	2.301	21.777	
		%	2,0	7,9	60,3	19,2	10,6	100,0	
	IV	N	1.335	4.403	24.633	14.207	3.175	47.753	
		%	2,8	9,2	51,6	29,8	6,6	100,0	
	V	N	.	302	2.665	2.354	267	5.588	
		%	.	5,4	47,7	42,1	4,8	100,0	
	>=75	Total	N	2.607	6.399	46.559	21.607	8.380	85.553
			%	3,0	7,5	54,4	25,3	9,8	100,0
	I	N	286	316	1.871	897	294	3.663	
		%	7,8	8,6	51,1	24,5	8,0	100,0	
	II	N	169	1.117	1.749	1.249	155	4.440	
		%	3,8	25,2	39,4	28,1	3,5	100,0	
	III	N	497	1.459	12.643	4.315	2.255	21.169	
		%	2,3	6,9	59,7	20,4	10,7	100,0	
	IV	N	1.136	3.435	26.317	12.843	5.079	48.810	
		%	2,3	7,0	53,9	26,3	10,4	100,0	
	V	N	518	72	3.980	2.303	597	7.470	
		%	6,9	1,0	53,3	30,8	8,0	100,0	

(continuación)

Tabla 36. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y clase social

		Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Mujeres	Total	N 57.331	191.790	459.607	217.032	47.732	973.492
		% 5,9	19,7	47,2	22,3	4,9	100,0
	I	N 9.531	33.809	41.270	17.884	2.343	104.838
		% 9,1	32,2	39,4	17,1	2,2	100,0
	II	N 8.951	26.144	40.275	17.379	2.279	95.028
		% 9,4	27,5	42,4	18,3	2,4	100,0
	III	N 12.249	49.104	119.066	51.769	9.920	242.107
		% 5,1	20,3	49,2	21,4	4,1	100,0
	IV	N 18.455	61.238	179.172	81.626	19.949	360.441
		% 5,1	17,0	49,7	22,6	5,5	100,0
	V	N 8.145	21.494	79.824	48.375	13.240	171.077
		% 4,8	12,6	46,7	28,3	7,7	100,0
	15-24 Total	N 19.518	30.094	29.614	8.005	1.302	88.533
		% 22,0	34,0	33,4	9,0	1,5	100,0
	I	N 4.154	5.229	4.880	298	.	14.562
		% 28,5	35,9	33,5	2,0	.	100,0
	II	N 3.135	5.338	4.168	855	.	13.497
		% 23,2	39,6	30,9	6,3	.	100,0
	III	N 3.997	7.779	5.792	2.501	.	20.069
		% 19,9	38,8	28,9	12,5	.	100,0
	IV	N 7.148	8.419	13.131	2.657	259	31.614
		% 22,6	26,6	41,5	8,4	0,8	100,0
	V	N 1.084	3.328	1.643	1.694	1.044	8.792
		% 12,3	37,9	18,7	19,3	11,9	100,0
	25-44 Total	N 23.359	89.465	140.116	58.623	8.767	320.330
		% 7,3	27,9	43,7	18,3	2,7	100,0
	I	N 4.376	19.435	13.793	6.527	955	45.086
		% 9,7	43,1	30,6	14,5	2,1	100,0
	II	N 3.959	13.944	12.674	5.808	838	37.223
		% 10,6	37,5	34,0	15,6	2,3	100,0
	III	N 4.207	22.577	40.224	13.143	1.877	82.029
		% 5,1	27,5	49,0	16,0	2,3	100,0
	IV	N 7.649	26.511	51.526	21.064	3.976	110.725
		% 6,9	23,9	46,5	19,0	3,6	100,0
	V	N 3.167	6.997	21.899	12.082	1.121	45.267
		% 7,0	15,5	48,4	26,7	2,5	100,0

(continuación)

Tabla 36. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y clase social

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Mujeres	45-64	Total	N	9.432	49.627	158.745	76.316	19.477	313.598
			%	3,0	15,8	50,6	24,3	6,2	100,0
		I	N	668	7.564	14.840	8.067	977	32.116
			%	2,1	23,6	46,2	25,1	3,0	100,0
		II	N	1.288	3.583	14.484	6.447	991	26.792
			%	4,8	13,4	54,1	24,1	3,7	100,0
		III	N	2.583	15.577	45.033	20.114	5.333	88.641
			%	2,9	17,6	50,8	22,7	6,0	100,0
		IV	N	2.483	15.978	54.977	24.836	5.828	104.102
			%	2,4	15,3	52,8	23,9	5,6	100,0
		V	N	2.411	6.925	29.410	16.852	6.348	61.946
			%	3,9	11,2	47,5	27,2	10,2	100,0
	65-74	Total	N	1.555	12.001	58.296	30.530	7.387	109.770
			%	1,4	10,9	53,1	27,8	6,7	100,0
		I	N	.	701	4.256	2.242	.	7.199
			%	.	9,7	59,1	31,1	.	100,0
		II	N	.	1.826	4.565	749	85	7.225
			%	.	25,3	63,2	10,4	1,2	100,0
		III	N	805	1.970	12.990	6.386	748	22.899
			%	3,5	8,6	56,7	27,9	3,3	100,0
		IV	N	303	5.161	26.231	14.403	4.035	50.134
			%	0,6	10,3	52,3	28,7	8,0	100,0
		V	N	447	2.343	10.254	6.750	2.519	22.312
			%	2,0	10,5	46,0	30,3	11,3	100,0
	>=75	Total	N	3.467	10.603	72.836	43.557	10.798	141.261
			%	2,5	7,5	51,6	30,8	7,6	100,0
		I	N	333	880	3.501	750	412	5.875
			%	5,7	15,0	59,6	12,8	7,0	100,0
		II	N	569	1.453	4.384	3.520	366	10.292
			%	5,5	14,1	42,6	34,2	3,6	100,0
		III	N	657	1.200	15.027	9.623	1.961	28.468
			%	2,3	4,2	52,8	33,8	6,9	100,0
		IV	N	873	5.169	33.307	18.666	5.851	63.866
			%	1,4	8,1	52,2	29,2	9,2	100,0
		V	N	1.036	1.901	16.618	10.997	2.208	32.760
			%	3,2	5,8	50,7	33,6	6,7	100,0

(continuación)

Tabla 36. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	Total	Total	N	108.927	386.589	901.570	393.364	96.906	1.887.356
			%	5,8	20,5	47,8	20,8	5,1	100,0
	I	N		20.954	68.383	90.659	34.750	3.782	218.528
			%	9,6	31,3	41,5	15,9	1,7	100,0
	II	N		15.820	47.659	78.111	26.884	4.760	173.234
			%	9,1	27,5	45,1	15,5	2,7	100,0
	III	N		24.290	88.735	210.255	84.599	22.583	430.462
			%	5,6	20,6	48,8	19,7	5,2	100,0
	IV	N		35.870	146.612	404.919	176.530	46.817	810.747
			%	4,4	18,1	49,9	21,8	5,8	100,0
	V	N		11.993	35.200	117.627	70.601	18.964	254.385
			%	4,7	13,8	46,2	27,8	7,5	100,0
	15-24	Total	N	35.519	68.085	62.600	14.087	2.143	182.434
			%	19,5	37,3	34,3	7,7	1,2	100,0
	I	N		9.108	9.597	8.483	2.008	.	29.196
			%	31,2	32,9	29,1	6,9	.	100,0
	II	N		5.429	9.847	8.146	1.062	.	24.485
			%	22,2	40,2	33,3	4,3	.	100,0
	III	N		7.336	14.840	11.302	3.021	401	36.900
			%	19,9	40,2	30,6	8,2	1,1	100,0
	IV	N		11.808	27.602	28.565	5.973	404	74.351
			%	15,9	37,1	38,4	8,0	0,5	100,0
	V	N		1.839	6.198	6.104	2.023	1.338	17.503
			%	10,5	35,4	34,9	11,6	7,6	100,0
	25-44	Total	N	43.662	183.068	296.067	112.805	21.037	656.640
			%	6,6	27,9	45,1	17,2	3,2	100,0
	I	N		7.215	35.879	32.281	12.312	1.131	88.818
			%	8,1	40,4	36,3	13,9	1,3	100,0
	II	N		7.083	26.402	27.107	7.717	1.410	69.719
			%	10,2	37,9	38,9	11,1	2,0	100,0
	III	N		8.728	40.276	67.728	23.019	4.534	144.286
			%	6,0	27,9	46,9	16,0	3,1	100,0
	IV	N		15.005	65.721	132.807	47.024	10.560	271.117
			%	5,5	24,2	49,0	17,3	3,9	100,0
	V	N		5.630	14.790	36.144	22.733	3.402	82.699
			%	6,8	17,9	43,7	27,5	4,1	100,0

(continuación)

Tabla 36. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y clase social

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Ambos	45-64	Total	N	19.382	97.506	314.454	144.614	40.010	615.965
			%	3,1	15,8	51,1	23,5	6,5	100,0
		I	N	3.192	18.656	33.262	13.561	1.354	70.023
			%	4,6	26,6	47,5	19,4	1,9	100,0
		II	N	2.432	6.863	28.836	10.151	1.930	50.212
			%	4,8	13,7	57,4	20,2	3,8	100,0
		III	N	5.826	27.271	77.435	34.048	10.382	154.963
			%	3,8	17,6	50,0	22,0	6,7	100,0
		IV	N	5.409	35.121	133.059	63.414	17.712	254.716
			%	2,1	13,8	52,2	24,9	7,0	100,0
		V	N	2.523	9.595	41.862	23.440	8.632	86.052
			%	2,9	11,1	48,6	27,2	10,0	100,0
	65-74	Total	N	4.290	20.928	109.054	56.694	14.538	205.503
			%	2,1	10,2	53,1	27,6	7,1	100,0
		I	N	821	3.054	11.262	5.223	592	20.952
			%	3,9	14,6	53,7	24,9	2,8	100,0
		II	N	137	1.976	7.890	3.184	900	14.087
			%	1,0	14,0	56,0	22,6	6,4	100,0
		III	N	1.246	3.689	26.119	10.572	3.049	44.676
			%	2,8	8,3	58,5	23,7	6,8	100,0
		IV	N	1.638	9.564	50.864	28.610	7.210	97.887
			%	1,7	9,8	52,0	29,2	7,4	100,0
		V	N	447	2.645	12.919	9.104	2.786	27.901
			%	1,6	9,5	46,3	32,6	10,0	100,0
	>=75	Total	N	6.074	17.002	119.396	65.164	19.178	226.814
			%	2,7	7,5	52,6	28,7	8,5	100,0
		I	N	619	1.196	5.371	1.647	705	9.538
			%	6,5	12,5	56,3	17,3	7,4	100,0
		II	N	738	2.570	6.132	4.769	521	14.731
			%	5,0	17,4	41,6	32,4	3,5	100,0
		III	N	1.154	2.659	27.670	13.939	4.216	49.638
			%	2,3	5,4	55,7	28,1	8,5	100,0
		IV	N	2.009	8.604	59.624	31.509	10.930	112.676
			%	1,8	7,6	52,9	28,0	9,7	100,0
		V	N	1.554	1.973	20.598	13.300	2.806	40.231
			%	3,9	4,9	51,2	33,1	7,0	100,0

Tabla 37. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y nivel de estudios*

		Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres	Total	N	51.596	195.357	442.665	176.332	49.174	915.124
		%	5,6	21,3	48,4	19,3	5,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	5.891	23.846	111.355	52.126	17.382	210.600
		%	2,8	11,3	52,9	24,8	8,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	10.373	31.350	73.658	40.463	11.610	167.454
		%	6,2	18,7	44,0	24,2	6,9	100,0
	Secundaria, superior	N	19.983	84.439	180.351	60.172	15.725	360.670
		%	5,5	23,4	50,0	16,7	4,4	100,0
	Terciaria	N	15.349	55.723	77.301	23.571	4.457	176.400
		%	8,7	31,6	43,8	13,4	2,5	100,0
15-24	Total	N	16.001	38.549	32.985	6.082	841	94.458
		%	16,9	40,8	34,9	6,4	0,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.247	2.589	4.832	1.250	.	9.918
		%	12,6	26,1	48,7	12,6	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	5.315	13.149	10.424	2.095	146	31.129
		%	17,1	42,2	33,5	6,7	0,5	100,0
	Secundaria, superior	N	6.647	17.930	15.125	2.442	695	42.840
		%	15,5	41,9	35,3	5,7	1,6	100,0
	Terciaria	N	2.792	4.881	2.604	294	.	10.572
		%	26,4	46,2	24,6	2,8	.	100,0
25-44	Total	N	20.303	93.603	155.951	54.181	12.270	336.309
		%	6,0	27,8	46,4	16,1	3,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.059	7.306	19.260	6.631	3.519	37.776
		%	2,8	19,3	51,0	17,6	9,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.915	9.131	23.436	14.418	2.909	52.808
		%	5,5	17,3	44,4	27,3	5,5	100,0
	Secundaria, superior	N	8.370	44.187	83.690	23.447	4.581	164.274
		%	5,1	26,9	50,9	14,3	2,8	100,0
	Terciaria	N	7.959	32.980	29.565	9.685	1.261	81.451
		%	9,8	40,5	36,3	11,9	1,5	100,0
45-64	Total	N	9.950	47.879	155.997	68.298	20.532	302.655
		%	3,3	15,8	51,5	22,6	6,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.537	7.707	36.934	17.963	6.258	70.400
		%	2,2	10,9	52,5	25,5	8,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.383	6.967	23.993	15.797	5.105	53.244
		%	2,6	13,1	45,1	29,7	9,6	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 37. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	3.221	18.057	62.994	25.886	6.972	117.130
			%	2,8	15,4	53,8	22,1	6,0	100,0
		Terciaria	N	3.809	15.147	32.075	8.652	2.197	61.881
			%	6,2	24,5	51,8	14,0	3,6	100,0
	65-74	Total	N	2.735	8.928	50.758	26.163	7.150	95.733
			%	2,9	9,3	53,0	27,3	7,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	264	2.847	21.060	11.404	2.443	38.017
			%	0,7	7,5	55,4	30,0	6,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	761	1.000	8.087	4.674	1.770	16.291
			%	4,7	6,1	49,6	28,7	10,9	100,0
		Secundaria, superior	N	1.208	3.294	12.785	6.573	2.087	25.948
			%	4,7	12,7	49,3	25,3	8,0	100,0
		Terciaria	N	502	1.787	8.824	3.513	851	15.477
			%	3,2	11,5	57,0	22,7	5,5	100,0
	>=75	Total	N	2.607	6.399	46.974	21.607	8.380	85.968
			%	3,0	7,4	54,6	25,1	9,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.785	3.397	29.267	14.878	5.162	54.489
			%	3,3	6,2	53,7	27,3	9,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	1.103	7.717	3.479	1.682	13.981
			%	.	7,9	55,2	24,9	12,0	100,0
		Secundaria, superior	N	536	972	5.757	1.823	1.389	10.478
			%	5,1	9,3	54,9	17,4	13,3	100,0
		Terciaria	N	286	927	4.232	1.426	147	7.020
			%	4,1	13,2	60,3	20,3	2,1	100,0
Mujeres	Total	Total	N	57.331	192.143	461.644	217.032	47.732	975.882
			%	5,9	19,7	47,3	22,2	4,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.305	27.862	143.069	75.524	23.568	278.327
			%	3,0	10,0	51,4	27,1	8,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.235	25.840	81.408	45.098	10.185	169.766
			%	4,3	15,2	48,0	26,6	6,0	100,0
		Secundaria, superior	N	22.466	69.908	143.945	61.296	10.252	307.866
			%	7,3	22,7	46,8	19,9	3,3	100,0
		Terciaria	N	19.325	68.534	93.223	35.114	3.727	219.923
			%	8,8	31,2	42,4	16,0	1,7	100,0
	15-24	Total	N	19.518	30.348	30.326	8.005	1.302	89.499
			%	21,8	33,9	33,9	8,9	1,5	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 37. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	1.876	2.857	4.640	1.305	708	11.386	
			%	16,5	25,1	40,7	11,5	6,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.516	5.208	6.132	2.571	335	16.763	
			%	15,0	31,1	36,6	15,3	2,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	11.056	17.086	13.379	3.663	259	45.443	
			%	24,3	37,6	29,4	8,1	0,6	100,0	
	Terciaria	N	4.069	5.196	6.176	466	.	15.907		
		%	25,6	32,7	38,8	2,9	.	100,0		
	25-44	Total	N	23.359	89.465	140.611	58.623	8.767	320.826	
			%	7,3	27,9	43,8	18,3	2,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	1.622	4.136	12.865	5.375	1.992	25.990	
			%	6,2	15,9	49,5	20,7	7,7	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.222	5.917	16.501	12.677	1.619	38.937	
			%	5,7	15,2	42,4	32,6	4,2	100,0	
		Secundaria, superior	N	7.225	32.424	63.292	23.637	3.909	130.487	
			%	5,5	24,8	48,5	18,1	3,0	100,0	
		Terciaria	N	12.290	46.987	47.953	16.934	1.247	125.412	
			%	9,8	37,5	38,2	13,5	1,0	100,0	
		45-64	Total	N	9.432	49.627	158.916	76.316	19.477	313.769
				%	3,0	15,8	50,6	24,3	6,2	100,0
	Sin estudios, primaria		N	1.447	7.164	42.636	20.798	5.918	77.963	
			%	1,9	9,2	54,7	26,7	7,6	100,0	
	Secundaria, inferior		N	1.992	10.924	28.741	14.100	5.978	61.735	
			%	3,2	17,7	46,6	22,8	9,7	100,0	
Secundaria, superior	N		3.825	17.920	55.881	27.143	5.553	110.322		
	%		3,5	16,2	50,7	24,6	5,0	100,0		
Terciaria	N		2.168	13.620	31.658	14.275	2.028	63.749		
	%		3,4	21,4	49,7	22,4	3,2	100,0		
65-74	Total		N	1.555	12.001	58.451	30.530	7.387	109.925	
			%	1,4	10,9	53,2	27,8	6,7	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.061	7.050	30.107	17.744	5.890	61.852		
		%	1,7	11,4	48,7	28,7	9,5	100,0		
	Secundaria, inferior	N	.	1.678	16.833	7.815	1.127	27.452		
		%	.	6,1	61,3	28,5	4,1	100,0		
	Secundaria, superior	N	95	1.692	6.248	3.488	370	11.893		
		%	0,8	14,2	52,5	29,3	3,1	100,0		

(continuación)

Tabla 37. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Mujeres	65-74	Terciaria	N	399	1.581	5.264	1.483	.	8.727	
			%	4,6	18,1	60,3	17,0	.	100,0	
	>=75	Total	N	3.467	10.703	73.340	43.557	10.798	141.864	
			%	2,4	7,5	51,7	30,7	7,6	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.299	6.655	52.821	30.302	9.059	101.136	
			%	2,3	6,6	52,2	30,0	9,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	505	2.112	13.201	7.935	1.125	24.879	
			%	2,0	8,5	53,1	31,9	4,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	263	785	5.146	3.365	161	9.720	
			%	2,7	8,1	52,9	34,6	1,7	100,0	
		Terciaria	N	399	1.150	2.172	1.955	453	6.129	
			%	6,5	18,8	35,4	31,9	7,4	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	108.927	387.500	904.309	393.364	96.906	1.891.006
				%	5,8	20,5	47,8	20,8	5,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	14.196	51.707	254.423	127.651	40.949	488.927	
			%	2,9	10,6	52,0	26,1	8,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N	17.609	57.190	155.066	85.561	21.795	337.220	
			%	5,2	17,0	46,0	25,4	6,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	42.448	154.347	324.296	121.467	25.977	668.536	
			%	6,3	23,1	48,5	18,2	3,9	100,0	
		Terciaria	N	34.674	124.257	170.524	58.684	8.184	396.323	
			%	8,7	31,4	43,0	14,8	2,1	100,0	
		15-24	Total	N	35.519	68.897	63.312	14.087	2.143	183.958
			%	19,3	37,5	34,4	7,7	1,2	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	3.123	5.446	9.472	2.555	708	21.304
				%	14,7	25,6	44,5	12,0	3,3	100,0
			Secundaria, inferior	N	7.831	18.357	16.556	4.666	481	47.891
				%	16,4	38,3	34,6	9,7	1,0	100,0
			Secundaria, superior	N	17.704	35.016	28.504	6.105	954	88.283
				%	20,1	39,7	32,3	6,9	1,1	100,0
			Terciaria	N	6.861	10.077	8.779	760	.	26.479
				%	25,9	38,1	33,2	2,9	.	100,0
		25-44	Total	N	43.662	183.068	296.562	112.805	21.037	657.135
				%	6,6	27,9	45,1	17,2	3,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.681	11.442	32.125	12.005	5.511	63.765	
			%	4,2	17,9	50,4	18,8	8,6	100,0	

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 37. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	5.137	15.049	39.937	27.095	4.528	91.745
			%	5,6	16,4	43,5	29,5	4,9	100,0
		Secundaria, superior	N	15.595	76.611	146.982	47.085	8.490	294.762
			%	5,3	26,0	49,9	16,0	2,9	100,0
		Terciaria	N	20.250	79.967	77.519	26.620	2.508	206.862
			%	9,8	38,7	37,5	12,9	1,2	100,0
	45-64	Total	N	19.382	97.506	314.912	144.614	40.010	616.424
			%	3,1	15,8	51,1	23,5	6,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.984	14.871	79.571	38.762	12.176	148.363
			%	2,0	10,0	53,6	26,1	8,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.375	17.891	52.734	29.897	11.083	114.979
			%	2,9	15,6	45,9	26,0	9,6	100,0
		Secundaria, superior	N	7.047	35.977	118.874	53.028	12.526	227.452
			%	3,1	15,8	52,3	23,3	5,5	100,0
		Terciaria	N	5.977	28.767	63.733	22.927	4.225	125.630
			%	4,8	22,9	50,7	18,2	3,4	100,0
	65-74	Total	N	4.290	20.928	109.209	56.694	14.538	205.658
			%	2,1	10,2	53,1	27,6	7,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.325	9.896	51.167	29.148	8.333	99.869
			%	1,3	9,9	51,2	29,2	8,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	761	2.678	24.920	12.488	2.897	43.744
			%	1,7	6,1	57,0	28,5	6,6	100,0
		Secundaria, superior	N	1.303	4.986	19.033	10.061	2.457	37.841
			%	3,4	13,2	50,3	26,6	6,5	100,0
		Terciaria	N	901	3.368	14.088	4.997	851	24.204
			%	3,7	13,9	58,2	20,6	3,5	100,0
	>=75	Total	N	6.074	17.102	120.314	65.164	19.178	227.832
			%	2,7	7,5	52,8	28,6	8,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.083	10.052	82.088	45.181	14.221	155.625
			%	2,6	6,5	52,7	29,0	9,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	505	3.215	20.919	11.415	2.807	38.860
			%	1,3	8,3	53,8	29,4	7,2	100,0
		Secundaria, superior	N	800	1.757	10.903	5.188	1.550	20.198
			%	4,0	8,7	54,0	25,7	7,7	100,0
		Terciaria	N	686	2.078	6.404	3.381	600	13.149
			%	5,2	15,8	48,7	25,7	4,6	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 38. Proporción (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	8,0	5,8	9,2	7,9
	0-14	12,7	7,7	13,4	13,6
	15-24	6,6	3,7	7,2	7,1
	25-44	6,6	5,8	10,1	4,7
	45-64	7,0	3,4	7,4	7,7
	65-74	6,6	3,9	6,0	7,8
	>=75	11,7	15,9	9,7	11,9
	Mujeres	Total	10,3	6,9	9,9
	0-14	12,8	8,4	17,4	10,9
	15-24	4,7	3,4	4,5	5,1
	25-44	8,1	4,4	9,2	8,5
	45-64	8,8	6,7	6,9	10,4
	65-74	11,9	9,1	7,9	15,1
	>=75	18,5	13,9	15,0	21,5
Ambos sexos	Total	9,2	6,4	9,5	9,7
	0-14	12,7	8,1	15,3	12,3
	15-24	5,7	3,6	5,9	6,1
	25-44	7,3	5,1	9,7	6,6
	45-64	7,9	5,1	7,2	9,1
	65-74	9,5	6,6	7,0	11,8
	>=75	16,0	14,7	13,1	17,9

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 39. Proporción (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	8,0	7,3	7,4	6,9	8,5	9,4
	0-14	12,5	11,7	12,0	9,5	15,6	13,9
	15-24	6,7	2,6	5,1	12,6	5,5	9,4
	25-44	6,6	6,2	4,4	5,4	7,6	6,5
	45-64	7,0	7,8	7,7	4,7	6,9	12,4
	65-74	6,6	5,4	8,4	5,4	6,7	11,3
	>=75	11,7	5,0	11,0	10,1	13,3	9,9
Mujeres	Total	10,3	8,9	10,0	9,9	10,5	12,0
	0-14	12,8	13,1	13,6	10,1	14,4	17,3
	15-24	4,7	1,7	5,3	6,2	4,9	4,3
	25-44	8,1	6,6	9,1	8,2	7,8	9,2
	45-64	8,8	9,9	8,3	8,9	8,5	8,8
	65-74	12,0	11,3	8,0	11,6	11,3	15,7
	>=75	18,6	14,3	18,1	18,3	18,0	20,8
Ambos sexos	Total	9,2	8,1	8,8	8,6	9,4	11,1
	0-14	12,7	12,4	12,8	9,8	15,0	15,6
	15-24	5,7	2,2	5,2	8,9	5,3	7,1
	25-44	7,3	6,4	6,9	6,9	7,7	7,9
	45-64	7,9	8,7	8,0	7,1	7,6	9,8
	65-74	9,5	7,5	8,2	8,9	8,9	14,7
	>=75	16,0	10,4	15,7	15,0	16,0	18,8

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 40. Proporción (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	Terciaria
Hombres	Total	7,3	9,3	8,6	6,3	5,3
	0-14	8,9	9,8	1,6	.	.
	15-24	6,6	4,7	12,1	3,7	3,8
	25-44	6,6	12,0	5,8	6,4	4,9
	45-64	7,0	6,2	10,9	6,7	5,2
	65-74	6,6	7,0	6,0	5,2	8,9
	>=75	11,7	13,4	7,7	12,4	5,5
Mujeres	Total	9,9	11,9	10,2	8,4	8,7
	0-14	8,3	7,4	16,2	0,0	.
	15-24	4,7	10,5	4,4	3,7	3,4
	25-44	8,1	8,2	7,0	8,0	8,7
	45-64	8,8	7,9	7,3	9,8	9,7
	65-74	11,9	12,3	13,0	11,2	7,3
	>=75	18,5	18,0	22,9	15,9	14,8
Ambos sexos	Total	8,6	10,7	9,4	7,2	7,2
	0-14	8,6	8,7	8,0	0,0	.
	15-24	5,7	7,6	9,1	3,7	3,5
	25-44	7,3	10,4	6,3	7,1	7,1
	45-64	7,9	7,1	8,9	8,1	7,5
	65-74	9,5	10,3	10,2	7,3	8,3
	>=75	16,0	16,4	17,5	14,2	9,8

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 41. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	7,9	4,9	7,0	4,0	14,0
		Araba	7,5	4,0	6,0	3,0	14,0
		Gipuzkoa	7,6	4,7	7,0	3,0	14,0
		Bizkaia	8,1	5,3	7,0	4,0	14,0
	0-14	CAPV	6,4	4,7	5,0	3,0	9,0
		Araba	4,0	2,8	3,0	2,0	5,0
		Gipuzkoa	6,4	4,5	4,0	3,0	9,0
		Bizkaia	6,7	5,3	5,0	4,0	10,0
	15-24	CAPV	5,3	3,2	4,0	3,0	6,0
		Araba	4,2	2,5	4,0	2,0	5,0
		Gipuzkoa	6,0	3,6	4,0	4,0	7,0
		Bizkaia	4,9	3,1	4,0	3,0	6,0
	25-44	CAPV	7,7	5,6	6,0	4,0	14,0
		Araba	7,0	4,4	5,0	3,0	12,0
		Gipuzkoa	7,1	5,4	5,0	3,0	14,0
		Bizkaia	8,7	6,4	8,0	4,0	14,0
	45-64	CAPV	9,0	4,8	10,0	4,0	14,0
		Araba	10,8	3,0	12,0	7,0	14,0
		Gipuzkoa	9,0	4,8	10,0	4,0	14,0
		Bizkaia	8,9	5,2	9,0	3,0	14,0
	65-74	CAPV	8,2	3,9	8,0	4,0	14,0
		Araba	8,4	3,1	8,0	4,0	14,0
		Gipuzkoa	8,3	3,8	7,0	4,0	14,0
		Bizkaia	8,1	4,2	9,0	4,0	12,0
	>=75	CAPV	9,9	4,2	12,0	6,0	14,0
		Araba	9,5	3,9	12,0	5,0	14,0
		Gipuzkoa	9,5	3,9	10,0	6,0	14,0
		Bizkaia	10,2	4,6	14,0	6,0	14,0
Mujeres	Total	CAPV	7,4	4,5	6,0	3,0	12,0
		Araba	7,8	3,9	6,0	4,0	14,0
		Gipuzkoa	6,7	4,3	5,0	3,0	11,0
		Bizkaia	7,7	4,7	7,0	4,0	12,0
	0-14	CAPV	5,6	4,3	4,0	3,0	8,0
		Araba	6,6	4,1	5,0	3,0	8,0
		Gipuzkoa	5,6	4,7	4,0	2,0	8,0
		Bizkaia	5,3	3,9	4,0	3,0	8,0

(continuación)

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 41. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	15-24	CAPV	4,9	3,8	3,0	2,0	6,0
		Araba	3,3	1,3	3,0	2,0	5,0
		Gipuzkoa	4,4	2,9	3,0	2,0	6,0
		Bizkaia	5,4	5,0	4,0	2,0	7,0
	25-44	CAPV	5,7	4,6	4,0	3,0	8,0
		Araba	6,9	5,1	5,0	3,0	12,0
		Gipuzkoa	5,4	4,5	4,0	2,0	8,0
		Bizkaia	5,7	4,7	4,0	3,0	8,0
	45-64	CAPV	8,5	4,3	9,0	4,0	14,0
		Araba	7,9	3,9	7,0	3,0	14,0
		Gipuzkoa	8,4	4,2	8,0	3,0	14,0
		Bizkaia	8,6	4,4	9,0	4,0	14,0
	65-74	CAPV	8,8	4,0	8,0	4,0	14,0
		Araba	9,4	3,3	12,0	5,0	14,0
		Gipuzkoa	8,9	3,6	8,0	4,0	14,0
		Bizkaia	8,7	4,3	8,0	4,0	14,0
	>=75	CAPV	9,1	4,1	8,0	5,0	14,0
		Araba	9,4	3,4	11,0	4,0	14,0
		Gipuzkoa	7,5	3,6	6,0	4,0	14,0
		Bizkaia	9,7	4,3	11,0	6,0	14,0
Ambos sexos	Total	CAPV	7,6	4,7	7,0	3,0	14,0
		Araba	7,7	3,9	6,0	3,0	14,0
		Gipuzkoa	7,1	4,5	6,0	3,0	12,0
		Bizkaia	7,9	4,9	7,0	4,0	14,0
	0-14	CAPV	6,0	4,5	5,0	3,0	8,0
		Araba	5,3	3,5	4,0	2,0	6,0
		Gipuzkoa	5,9	4,6	4,0	3,0	8,0
		Bizkaia	6,1	4,7	5,0	3,0	8,0
	15-24	CAPV	5,1	3,5	4,0	3,0	6,0
		Araba	3,8	2,1	3,0	2,0	5,0
		Gipuzkoa	5,4	3,4	4,0	3,0	7,0
		Bizkaia	5,1	3,9	4,0	3,0	6,0
	25-44	CAPV	6,6	5,2	5,0	3,0	11,0
		Araba	7,0	4,6	5,0	3,0	12,0
		Gipuzkoa	6,4	5,1	5,0	3,0	10,0
		Bizkaia	6,8	5,6	5,0	3,0	12,0

(continuación)

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 41. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos 45-64	CAPV		8,7	4,5	9,0	4,0	14,0
	Araba		8,9	3,7	10,0	4,0	14,0
	Gipuzkoa		8,7	4,5	10,0	3,0	14,0
	Bizkaia		8,7	4,7	9,0	4,0	14,0
65-74	CAPV		8,6	4,0	8,0	4,0	14,0
	Araba		9,1	3,2	8,0	5,0	14,0
	Gipuzkoa		8,7	3,7	8,0	4,0	14,0
	Bizkaia		8,5	4,3	8,0	4,0	14,0
>=75	CAPV		9,3	4,1	10,0	5,0	14,0
	Araba		9,5	3,5	12,0	5,0	14,0
	Gipuzkoa		8,0	3,7	7,0	4,0	14,0
	Bizkaia		9,8	4,4	11,0	6,0	14,0

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 42. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Hombres	Total	Total	7,9	4,9	7,0	4,0	14,0	
		I	7,0	4,9	5,0	3,0	14,0	
		II	7,4	4,9	7,0	3,0	14,0	
		III	7,1	4,7	5,0	3,0	14,0	
		IV	8,4	4,9	8,0	4,0	14,0	
		V	7,7	5,0	7,0	4,0	14,0	
		0-14	Total	6,3	4,6	5,0	3,0	8,0
			I	5,5	4,0	5,0	3,0	6,0
			II	6,5	4,1	6,0	3,0	10,0
			III	5,6	4,8	4,0	3,0	6,0
			IV	7,1	5,2	6,0	3,0	10,0
			V	5,0	3,1	5,0	5,0	7,0
		15-24	Total	5,3	3,2	4,0	3,0	6,0
			I	8,5	5,4	7,0	2,0	14,0
			II	4,3	3,1	3,0	2,0	9,0
			III	5,1	2,8	4,0	4,0	5,0
			IV	4,4	2,1	4,0	3,0	5,0
			V	7,0	4,9	8,0	4,0	12,0
		25-44	Total	7,7	5,6	6,0	4,0	14,0
			I	7,8	6,0	5,0	4,0	14,0
			II	7,0	5,9	5,0	2,0	14,0
			III	7,7	5,9	7,0	3,0	14,0
			IV	8,2	5,5	8,0	4,0	14,0
			V	6,0	5,7	4,0	3,0	12,0
		45-64	Total	9,0	4,8	10,0	4,0	14,0
			I	7,8	5,4	8,0	3,0	14,0
			II	10,0	5,7	14,0	4,0	14,0
			III	8,6	4,5	7,0	6,0	14,0
			IV	9,2	4,7	11,0	3,0	14,0
			V	9,7	4,8	11,0	7,0	14,0
	65-74	Total	8,2	3,9	8,0	4,0	14,0	
		I	8,0	4,1	8,0	6,0	10,0	
		II	5,1	3,3	6,0	2,0	7,0	
		III	7,2	4,2	4,0	4,0	14,0	
		IV	9,3	3,7	9,0	5,0	14,0	
		V	7,7	4,2	8,0	4,0	8,0	

(continuación)

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 42. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	>=75	Total	9,9	4,2	12,0	6,0	14,0
		I	8,1	6,7	14,0	2,0	14,0
		II	10,0	4,7	14,0	6,0	14,0
		III	9,0	4,6	10,0	5,0	14,0
		IV	10,2	4,1	12,0	6,0	14,0
		V	10,0	4,3	14,0	6,0	14,0
Mujeres	Total	Total	7,4	4,5	6,0	3,0	12,0
		I	6,3	4,3	5,0	4,0	9,0
		II	6,3	4,7	5,0	3,0	11,0
		III	6,8	4,7	5,0	3,0	12,0
		IV	8,0	4,4	8,0	4,0	14,0
		V	8,3	4,2	8,0	4,0	14,0
	0-14	Total	5,6	4,3	4,0	3,0	8,0
		I	6,2	3,9	6,0	3,0	8,0
		II	3,7	3,6	3,0	2,0	3,0
		III	3,6	2,7	3,0	2,0	4,0
		IV	6,5	4,5	6,0	3,0	9,0
		V	9,7	5,4	9,0	5,0	14,0
	15-24	Total	4,9	3,8	3,0	2,0	6,0
		I	4,0	.	4,0	4,0	4,0
		II	2,5	0,6	2,0	2,0	3,0
		III	3,8	3,3	3,0	2,0	3,0
		IV	6,9	4,8	5,0	4,0	14,0
		V	4,7	2,0	6,0	3,0	6,0
	25-44	Total	5,8	4,6	4,0	3,0	8,0
		I	4,3	3,0	4,0	2,0	6,0
		II	4,7	3,7	5,0	3,0	6,0
		III	5,0	4,2	3,0	3,0	7,0
		IV	6,5	4,9	5,0	4,0	8,0
		V	7,3	5,5	7,0	3,0	12,0
	45-64	Total	8,5	4,3	9,0	4,0	14,0
		I	8,3	4,3	10,0	4,0	12,0
		II	8,9	4,2	8,0	5,0	14,0
		III	7,8	4,4	8,0	3,0	14,0
		IV	8,4	4,2	9,0	4,0	14,0
		V	9,2	4,2	10,0	4,0	14,0

(continuación)

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 42. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Mujeres	65-74	Total	8,8	4,0	8,0	4,0	14,0	
		I	7,5	6,0	4,0	2,0	14,0	
		II	9,0	5,2	13,0	3,0	14,0	
		III	8,5	4,1	8,0	4,0	14,0	
		IV	9,6	3,9	11,0	4,0	14,0	
		V	8,0	3,5	7,0	4,0	14,0	
	>=75	Total	9,0	4,0	8,0	5,0	14,0	
		I	6,7	5,1	4,0	3,0	14,0	
		II	10,4	3,9	11,0	8,0	14,0	
		III	10,0	4,3	14,0	5,0	14,0	
		IV	9,0	3,9	8,0	5,0	14,0	
		V	8,3	3,9	7,0	4,0	14,0	
	Ambos sexos	Total	Total	7,6	4,6	7,0	3,0	14,0
			I	6,7	4,6	5,0	4,0	10,0
			II	6,7	4,8	5,0	3,0	11,0
III			6,9	4,7	5,0	3,0	12,0	
IV			8,2	4,6	8,0	4,0	14,0	
V			8,2	4,4	7,0	4,0	14,0	
0-14		Total	5,9	4,5	5,0	3,0	8,0	
		I	5,8	3,9	5,0	3,0	8,0	
		II	5,1	4,1	3,0	3,0	7,0	
		III	4,6	4,0	3,0	3,0	5,0	
		IV	6,8	4,9	6,0	3,0	10,0	
		V	7,6	5,4	7,0	5,0	14,0	
15-24		Total	5,1	3,5	4,0	3,0	6,0	
		I	6,8	5,1	4,0	4,0	14,0	
		II	3,4	2,4	3,0	2,0	3,0	
		III	4,6	3,0	4,0	3,0	5,0	
		IV	5,4	3,7	4,0	3,0	7,0	
		V	6,4	4,0	6,0	3,0	8,0	
25-44		Total	6,7	5,2	5,0	3,0	11,0	
		I	6,0	5,0	4,0	2,0	8,0	
		II	5,4	4,6	5,0	3,0	7,0	
		III	5,9	5,1	4,0	3,0	8,0	
		IV	7,4	5,4	6,0	4,0	12,0	
		V	6,8	5,5	5,0	3,0	12,0	

(continuación)

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 42. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	45-64	Total	8,7	4,5	9,0	4,0	14,0
		I	8,1	4,8	8,0	4,0	14,0
		II	9,4	4,8	11,0	4,0	14,0
		III	8,1	4,4	7,0	4,0	14,0
		IV	8,8	4,5	10,0	4,0	14,0
		V	9,4	4,3	10,0	6,0	14,0
	65-74	Total	8,6	4,0	8,0	4,0	14,0
		I	7,7	4,9	8,0	2,0	14,0
		II	7,0	4,5	7,0	2,0	13,0
		III	8,1	4,1	8,0	4,0	14,0
		IV	9,5	3,8	11,0	4,0	14,0
		V	7,9	3,5	7,0	4,0	14,0
	>=75	Total	9,3	4,1	10,0	5,0	14,0
		I	7,0	5,0	4,0	3,0	14,0
		II	10,3	3,9	11,0	6,0	14,0
III		9,7	4,4	14,0	5,0	14,0	
IV		9,4	4,0	10,0	6,0	14,0	
	V	8,5	3,9	7,0	4,0	14,0	

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 43. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Hombres	Total	Total	8,2	4,9	8,0	4,0	14,0	
		Sin estudios, primaria	8,6	4,8	8,0	3,0	14,0	
		Secundaria, inferior	8,1	4,9	8,0	4,0	14,0	
		Secundaria, superior	8,4	5,0	8,0	4,0	14,0	
		Terciaria	6,8	4,8	5,0	2,0	12,0	
	0-14	Total	6,8	5,8	3,0	3,0	14,0	
		Sin estudios, primaria	6,8	5,9	4,0	3,0	14,0	
		Secundaria, inferior	3,0	.	3,0	3,0	3,0	
		15-24	Total	5,3	3,2	4,0	3,0	6,0
			Sin estudios, primaria	6,7	6,2	4,0	3,0	14,0
	Secundaria, inferior		5,6	3,4	4,0	3,0	8,0	
	Secundaria, superior		3,8	1,4	4,0	3,0	5,0	
	25-44	Terciaria	6,3	2,6	5,0	5,0	9,0	
		Total	7,7	5,6	6,0	4,0	14,0	
		Sin estudios, primaria	6,8	6,1	4,0	3,0	14,0	
		Secundaria, inferior	7,2	5,2	4,0	4,0	12,0	
		Secundaria, superior	8,8	5,6	8,0	4,0	14,0	
	45-64	Terciaria	6,5	5,3	5,0	3,0	12,0	
		Total	9,0	4,8	10,0	4,0	14,0	
		Sin estudios, primaria	10,2	4,3	14,0	7,0	14,0	
		Secundaria, inferior	9,7	5,1	12,0	4,0	14,0	
		Secundaria, superior	8,3	4,8	8,0	3,0	14,0	
	65-74	Terciaria	8,2	5,1	9,0	2,0	14,0	
		Total	8,2	3,9	8,0	4,0	14,0	
		Sin estudios, primaria	9,0	3,7	9,0	5,0	14,0	
		Secundaria, inferior	7,7	4,3	8,0	3,0	14,0	
		Secundaria, superior	10,5	3,3	11,0	8,0	14,0	
	>=75	Terciaria	4,8	3,1	4,0	2,0	8,0	
		Total	9,9	4,2	12,0	6,0	14,0	
		Sin estudios, primaria	9,9	4,0	12,0	6,0	14,0	
		Secundaria, inferior	12,0	4,2	14,0	14,0	14,0	
		Secundaria, superior	9,1	4,6	10,0	3,0	14,0	
		Terciaria	6,4	6,6	2,0	1,0	14,0	

(continuación)

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 43. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y nivel de estudios*

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	
			Media	estándar		25	75	
Mujeres	Total	Total	7,7	4,5	7,0	4,0	14,0	
		Sin estudios, primaria	8,5	4,2	8,0	4,0	14,0	
		Secundaria, inferior	7,8	4,4	7,0	4,0	14,0	
		Secundaria, superior	7,5	4,8	7,0	3,0	12,0	
		Terciaria	6,2	4,4	5,0	3,0	8,0	
	0-14	Total	5,4	4,8	4,0	2,0	6,0	
		Sin estudios, primaria	4,2	3,6	3,0	2,0	6,0	
		Secundaria, inferior	10,7	5,4	14,0	6,0	14,0	
		15-24	Total	4,9	3,8	3,0	2,0	6,0
			Sin estudios, primaria	6,3	5,1	3,0	3,0	10,0
	Secundaria, inferior		4,3	3,2	4,0	2,0	6,0	
	Secundaria, superior		3,6	2,2	3,0	2,0	6,0	
	25-44	Terciaria	6,4	5,7	4,0	4,0	14,0	
		Total	5,7	4,6	4,0	3,0	8,0	
		Sin estudios, primaria	7,5	6,1	7,0	3,0	14,0	
		Secundaria, inferior	6,0	4,9	5,0	3,0	6,0	
		Secundaria, superior	6,2	4,9	4,0	3,0	9,0	
	45-64	Terciaria	4,8	3,6	4,0	3,0	6,0	
		Total	8,5	4,3	9,0	4,0	14,0	
		Sin estudios, primaria	9,1	3,8	9,0	5,0	14,0	
		Secundaria, inferior	8,1	4,5	7,0	4,0	14,0	
		Secundaria, superior	8,7	4,4	10,0	4,0	14,0	
	65-74	Terciaria	7,7	4,4	7,0	4,0	12,0	
		Total	8,8	4,0	8,0	4,0	14,0	
		Sin estudios, primaria	8,8	3,9	8,0	4,0	14,0	
		Secundaria, inferior	8,0	4,2	7,0	3,0	14,0	
		Secundaria, superior	10,1	4,1	13,0	6,0	14,0	
	>=75	Terciaria	10,0	4,4	12,0	5,0	14,0	
		Total	9,1	4,1	8,0	5,0	14,0	
		Sin estudios, primaria	9,1	4,0	9,0	5,0	14,0	
		Secundaria, inferior	8,5	4,1	7,0	5,0	14,0	
		Secundaria, superior	10,6	4,4	14,0	6,0	14,0	
		Terciaria	8,7	3,7	8,0	6,0	14,0	

(continuación)

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 43. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Ambos sexos	Total	Total	7,9	4,6	7,0	4,0	14,0
		Sin estudios, primaria	8,5	4,4	8,0	4,0	14,0
		Secundaria, inferior	8,0	4,6	7,0	4,0	14,0
		Secundaria, superior	7,9	4,9	7,0	3,0	14,0
		Terciaria	6,4	4,5	5,0	3,0	10,0
0-14	Total	Total	6,2	5,3	4,0	3,0	10,0
		Sin estudios, primaria	5,8	5,2	3,0	2,0	8,0
		Secundaria, inferior	9,8	5,5	14,0	4,0	14,0
15-24	Total	Total	5,1	3,5	4,0	3,0	6,0
		Sin estudios, primaria	6,4	5,1	4,0	3,0	14,0
		Secundaria, inferior	5,3	3,4	4,0	3,0	8,0
		Secundaria, superior	3,7	1,8	3,0	2,0	5,0
		Terciaria	6,4	4,2	5,0	4,0	9,0
25-44	Total	Total	6,6	5,2	5,0	3,0	11,0
		Sin estudios, primaria	7,1	6,0	5,0	3,0	14,0
		Secundaria, inferior	6,6	5,0	4,0	4,0	10,0
		Secundaria, superior	7,4	5,5	7,0	3,0	12,0
		Terciaria	5,3	4,3	4,0	3,0	6,0
45-64	Total	Total	8,7	4,5	9,0	4,0	14,0
		Sin estudios, primaria	9,5	4,0	10,0	7,0	14,0
		Secundaria, inferior	9,0	4,8	9,0	4,0	14,0
		Secundaria, superior	8,5	4,6	9,0	4,0	14,0
		Terciaria	7,8	4,6	8,0	4,0	13,0
65-74	Total	Total	8,6	4,0	8,0	4,0	14,0
		Sin estudios, primaria	8,8	3,8	8,0	4,0	14,0
		Secundaria, inferior	7,9	4,1	8,0	3,0	14,0
		Secundaria, superior	10,3	3,6	12,0	7,0	14,0
		Terciaria	6,6	4,1	5,0	2,0	10,0
>=75	Total	Total	9,3	4,1	10,0	5,0	14,0
		Sin estudios, primaria	9,4	4,0	10,0	5,0	14,0
		Secundaria, inferior	9,0	4,2	8,0	5,0	14,0
		Secundaria, superior	9,9	4,4	12,0	6,0	14,0
		Terciaria	8,0	4,5	8,0	3,0	14,0

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 44. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	8,6	6,8	10,5	8,0
	0-14	3,1	3,3	2,8	3,3
	15-24	1,1	0,0	1,3	1,3
	25-44	5,7	7,3	5,2	5,5
	45-64	11,1	6,8	15,5	9,5
	65-74	15,5	10,6	22,3	12,5
	>=75	21,8	15,7	24,7	21,7
Mujeres	Total	10,7	7,4	11,5	11,1
	0-14	1,2	3,7	0,9	0,7
	15-24	2,0	1,5	2,3	2,0
	25-44	4,9	5,2	5,5	4,5
	45-64	10,8	6,6	13,1	10,5
	65-74	14,8	8,3	15,9	15,7
	>=75	35,9	24,1	35,4	38,7
Ambos sexos	Total	9,7	7,1	11,0	9,6
	0-14	2,2	3,5	1,9	2,0
	15-24	1,5	0,7	1,8	1,6
	25-44	5,3	6,3	5,4	5,0
	45-64	10,9	6,7	14,3	10,0
	65-74	15,1	9,4	18,9	14,2
	>=75	30,6	20,8	31,4	32,3

Tabla 45. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	8,6	4,1	6,1	7,4	9,8	15,5
	0-14	3,1	0,4	1,8	3,5	4,4	8,4
	15-24	1,1	0,0	0,0	2,3	0,6	4,7
	25-44	5,7	3,1	4,2	4,6	5,5	12,4
	45-64	11,1	7,6	7,9	6,5	12,3	24,5
	65-74	15,5	9,8	15,8	17,2	15,9	18,1
	>=75	21,9	8,7	29,3	22,1	22,5	20,1
Mujeres	Total	10,7	4,0	7,5	9,0	12,1	17,3
	0-14	1,2	0,7	1,2	1,7	0,7	3,9
	15-24	2,0	0,0	1,1	1,8	2,7	5,6
	25-44	4,9	1,5	4,3	3,2	4,7	12,4
	45-64	10,7	6,4	7,4	8,9	12,2	14,0
	65-74	14,8	12,0	11,6	9,0	17,2	18,3
	>=75	35,9	31,6	37,4	41,1	34,0	35,1
Ambos sexos	Total	9,7	4,1	6,8	8,3	10,8	16,7
	0-14	2,2	0,5	1,5	2,6	2,7	6,2
	15-24	1,6	0,0	0,6	2,0	1,5	5,1
	25-44	5,3	2,3	4,3	3,8	5,2	12,4
	45-64	10,9	7,1	7,6	7,9	12,3	16,8
	65-74	15,1	10,6	13,6	12,7	16,6	18,2
	>=75	30,6	21,8	34,7	33,5	29,0	32,4

Tabla 46. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	9,2	15,1	11,7	6,0	4,6
	0-14	3,7	4,0	2,1	.	.
	15-24	1,1	2,2	2,5	0,0	0,0
	25-44	5,7	16,2	7,9	3,6	3,4
	45-64	11,1	18,2	15,8	8,3	4,2
	65-74	15,5	15,0	22,2	13,7	12,1
	>=75	21,8	22,9	21,5	23,4	12,0
Mujeres	Total	11,6	19,6	13,9	7,4	3,9
	0-14	1,6	1,4	3,4	0,0	.
	15-24	2,0	11,4	2,0	0,0	0,9
	25-44	4,9	10,2	9,3	5,5	1,5
	45-64	10,8	14,5	13,3	9,6	5,6
	65-74	14,8	17,7	10,8	11,8	10,2
	>=75	35,9	36,1	37,3	34,1	29,9
Ambos sexos	Total	10,5	17,6	12,8	6,6	4,2
	0-14	2,7	2,8	2,6	0,0	.
	15-24	1,5	6,7	2,3	0,0	0,6
	25-44	5,3	13,7	8,5	4,5	2,3
	45-64	10,9	16,2	14,5	8,9	4,9
	65-74	15,1	16,7	15,4	13,0	11,4
	>=75	30,6	31,5	31,6	28,7	20,3

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 47. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	976.447	48.832	32.245	11.056	1.068.580	
			%	91,4	4,6	3,0	1,0	100,0	
		Araba	N	144.335	4.942	4.229	1.391	154.896	
			%	93,2	3,2	2,7	0,9	100,0	
		Gipuzkoa	N	310.520	19.569	13.218	3.516	346.823	
			%	89,5	5,6	3,8	1,0	100,0	
		Bizkaia	N	521.592	24.322	14.798	6.149	566.861	
			%	92,0	4,3	2,6	1,1	100,0	
		0-14	CAPV	N	148.665	2.984	1.007	799	153.456
				%	96,9	1,9	0,7	0,5	100,0
		Araba	N	21.440	613	.	123	22.176	
			%	96,7	2,8	.	0,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	50.582	630	399	413	52.024	
			%	97,2	1,2	0,8	0,8	100,0	
		Bizkaia	N	76.643	1.740	609	264	79.256	
			%	96,7	2,2	0,8	0,3	100,0	
		15-24	CAPV	N	93.420	361	153	525	94.458
				%	98,9	0,4	0,2	0,6	100,0
		Araba	N	14.247	.	.	.	14.247	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	30.731	124	.	291	31.146	
			%	98,7	0,4	.	0,9	100,0	
		Bizkaia	N	48.442	236	153	235	49.066	
			%	98,7	0,5	0,3	0,5	100,0	
	25-44	CAPV	N	317.149	5.322	11.448	2.390	336.309	
			%	94,3	1,6	3,4	0,7	100,0	
	Araba	N	46.995	923	2.503	269	50.690		
		%	92,7	1,8	4,9	0,5	100,0		
	Gipuzkoa	N	101.742	1.905	3.525	196	107.367		
		%	94,8	1,8	3,3	0,2	100,0		
	Bizkaia	N	168.412	2.494	5.420	1.925	178.252		
		%	94,5	1,4	3,0	1,1	100,0		
	45-64	CAPV	N	269.139	18.265	13.264	1.988	302.655	
			%	88,9	6,0	4,4	0,7	100,0	

(continuación)

Tabla 47. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total	
Hombres	45-64	Araba	N	40.258	1.275	1.330	347	43.210	
			%	93,2	2,9	3,1	0,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	82.569	8.397	6.251	479	97.697	
			%	84,5	8,6	6,4	0,5	100,0	
		Bizkaia	N	146.312	8.593	5.683	1.162	161.749	
			%	90,5	5,3	3,5	0,7	100,0	
	65-74	CAPV	N	80.874	9.813	2.758	2.288	95.733	
			%	84,5	10,3	2,9	2,4	100,0	
			Araba	N	11.948	968	222	229	13.368
				%	89,4	7,2	1,7	1,7	100,0
			Gipuzkoa	N	24.984	4.752	1.439	984	32.159
				%	77,7	14,8	4,5	3,1	100,0
		Bizkaia	N	43.942	4.093	1.097	1.074	50.206	
			%	87,5	8,2	2,2	2,1	100,0	
>=75		CAPV	N	67.200	12.088	3.615	3.065	85.968	
			%	78,2	14,1	4,2	3,6	100,0	
			Araba	N	9.447	1.163	173	422	11.206
				%	84,3	10,4	1,5	3,8	100,0
		Gipuzkoa	N	19.912	3.760	1.605	1.154	26.430	
			%	75,3	14,2	6,1	4,4	100,0	
		Bizkaia	N	37.841	7.165	1.837	1.489	48.332	
			%	78,3	14,8	3,8	3,1	100,0	
	Mujeres	Total	CAPV	N	1.001.305	71.378	40.244	8.566	1.121.492
			%	89,3	6,4	3,6	0,8	100,0	
			Araba	N	145.336	6.938	4.153	594	157.021
				%	92,6	4,4	2,6	0,4	100,0
		Gipuzkoa	N	319.542	23.762	14.309	3.313	360.926	
			%	88,5	6,6	4,0	0,9	100,0	
		Bizkaia	N	536.427	40.678	21.782	4.659	603.545	
			%	88,9	6,7	3,6	0,8	100,0	
0-14		CAPV	N	143.896	1.334	380	.	145.610	
			%	98,8	0,9	0,3	.	100,0	
		Araba	N	20.152	606	164	.	20.921	
			%	96,3	2,9	0,8	.	100,0	

(continuación)

Tabla 47. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total	
Mujeres	0-14	Gipuzkoa	N	49.235	230	217	.	49.682
			%	99,1	0,5	0,4	.	100,0
		Bizkaia	N	74.509	498	.	.	75.007
			%	99,3	0,7	.	.	100,0
	15-24	CAPV	N	87.698	399	809	593	89.499
			%	98,0	0,4	0,9	0,7	100,0
		Araba	N	12.796	.	.	199	12.995
			%	98,5	.	.	1,5	100,0
		Gipuzkoa	N	28.701	134	406	129	29.369
			%	97,7	0,5	1,4	0,4	100,0
		Bizkaia	N	46.201	265	403	265	47.134
			%	98,0	0,6	0,9	0,6	100,0
	25-44	CAPV	N	305.121	6.034	8.367	1.303	320.826
			%	95,1	1,9	2,6	0,4	100,0
		Araba	N	45.255	862	1.504	127	47.748
			%	94,8	1,8	3,2	0,3	100,0
		Gipuzkoa	N	95.155	1.651	3.260	603	100.669
			%	94,5	1,6	3,2	0,6	100,0
		Bizkaia	N	164.711	3.521	3.603	573	172.408
			%	95,5	2,0	2,1	0,3	100,0
	45-64	CAPV	N	279.980	17.462	14.965	1.361	313.769
			%	89,2	5,6	4,8	0,4	100,0
		Araba	N	40.811	1.827	1.061	.	43.698
			%	93,4	4,2	2,4	.	100,0
		Gipuzkoa	N	87.031	6.604	5.510	956	100.102
			%	86,9	6,6	5,5	1,0	100,0
		Bizkaia	N	152.138	9.031	8.394	405	169.969
			%	89,5	5,3	4,9	0,2	100,0
	65-74	CAPV	N	93.658	11.495	2.693	2.080	109.925
			%	85,2	10,5	2,4	1,9	100,0
		Araba	N	13.263	1.019	176	.	14.458
			%	91,7	7,0	1,2	.	100,0
		Gipuzkoa	N	30.261	3.877	1.192	651	35.981
			%	84,1	10,8	3,3	1,8	100,0

(continuación)

Tabla 47. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total		
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	50.134	6.599	1.324	1.429	59.485		
			%	84,3	11,1	2,2	2,4	100,0		
	>=75	CAPV	N	90.953	34.654	13.029	3.229	141.864		
			%	64,1	24,4	9,2	2,3	100,0		
		Araba	N	13.060	2.624	1.248	268	17.200		
			%	75,9	15,3	7,3	1,6	100,0		
		Gipuzkoa	N	29.160	11.266	3.724	974	45.124		
			%	64,6	25,0	8,3	2,2	100,0		
		Bizkaia	N	48.733	20.763	8.057	1.987	79.541		
			%	61,3	26,1	10,1	2,5	100,0		
		Ambos	Total	CAPV	N	1.977.752	120.210	72.489	19.622	2.190.072
				%	90,3	5,5	3,3	0,9	100,0	
Araba	N		289.671	11.880	8.382	1.984	311.917			
	%		92,9	3,8	2,7	0,6	100,0			
Gipuzkoa	N		630.062	43.331	27.527	6.830	707.749			
	%		89,0	6,1	3,9	1,0	100,0			
Bizkaia	N		1.058.019	64.999	36.580	10.807	1.170.406			
	%		90,4	5,6	3,1	0,9	100,0			
0-14	CAPV		N	292.561	4.318	1.388	799	299.066		
			%	97,8	1,4	0,5	0,3	100,0		
	Araba		N	41.591	1.219	164	123	43.097		
			%	96,5	2,8	0,4	0,3	100,0		
	Gipuzkoa		N	99.816	860	615	413	101.706		
			%	98,1	0,8	0,6	0,4	100,0		
	Bizkaia		N	151.153	2.239	609	264	154.263		
			%	98,0	1,5	0,4	0,2	100,0		
	15-24		CAPV	N	181.118	759	962	1.118	183.958	
				%	98,5	0,4	0,5	0,6	100,0	
Araba		N	27.043	.	.	199	27.242			
		%	99,3	.	.	0,7	100,0			
Gipuzkoa		N	59.432	258	406	419	60.515			
		%	98,2	0,4	0,7	0,7	100,0			
Bizkaia		N	94.643	501	556	499	96.200			
		%	98,4	0,5	0,6	0,5	100,0			
25-44		CAPV	N	622.270	11.356	19.815	3.693	657.135		

(continuación)

Tabla 47. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total	
Ambos	25-44	CAPV	%	94,7	1,7	3,0	0,6	100,0	
			Araba	N	92.250	1.785	4.007	396	98.439
			%	93,7	1,8	4,1	0,4	100,0	
			Gipuzkoa	N	196.897	3.556	6.785	799	208.036
			%	94,6	1,7	3,3	0,4	100,0	
			Bizkaia	N	333.123	6.015	9.023	2.498	350.660
		%	95,0	1,7	2,6	0,7	100,0		
	45-64	CAPV	N	549.119	35.727	28.229	3.350	616.424	
			%	89,1	5,8	4,6	0,5	100,0	
			Araba	N	81.069	3.101	2.391	347	86.908
			%	93,3	3,6	2,8	0,4	100,0	
			Gipuzkoa	N	169.600	15.001	11.761	1.435	197.798
			%	85,7	7,6	5,9	0,7	100,0	
	65-74	CAPV	N	298.450	17.624	14.077	1.567	331.718	
			%	90,0	5,3	4,2	0,5	100,0	
			Araba	N	174.532	21.308	5.451	4.368	205.658
			%	84,9	10,4	2,7	2,1	100,0	
			Araba	N	25.211	1.987	399	229	27.826
		%	90,6	7,1	1,4	0,8	100,0		
65-74	CAPV	N	55.245	8.629	2.631	1.635	68.140		
		%	81,1	12,7	3,9	2,4	100,0		
		Bizkaia	N	94.076	10.692	2.421	2.503	109.692	
		%	85,8	9,7	2,2	2,3	100,0		
	>=75	CAPV	N	158.152	46.742	16.644	6.294	227.832	
			%	69,4	20,5	7,3	2,8	100,0	
		Araba	N	22.507	3.788	1.421	690	28.406	
		%	79,2	13,3	5,0	2,4	100,0		
		Gipuzkoa	N	49.072	15.025	5.328	2.128	71.553	
		%	68,6	21,0	7,4	3,0	100,0		
	Bizkaia	N	86.574	27.929	9.894	3.476	127.873		
	%	67,7	21,8	7,7	2,7	100,0			

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

		Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total	
Hombres	Total	N 974.380	48.735	32.245	11.056	1.066.417	
		% 91,4	4,6	3,0	1,0	100,0	
	I	N 137.210	2.703	2.339	791	143.043	
		% 95,9	1,9	1,6	0,6	100,0	
	II	N 95.442	2.847	2.764	596	101.649	
		% 93,9	2,8	2,7	0,6	100,0	
	III	N 211.336	8.150	6.078	2.700	228.264	
		% 92,6	3,6	2,7	1,2	100,0	
	IV	N 454.838	28.406	16.357	4.474	504.074	
		% 90,2	5,6	3,2	0,9	100,0	
	V	N 75.555	6.630	4.707	2.494	89.386	
		% 84,5	7,4	5,3	2,8	100,0	
	0-14	Total	N 147.780	2.984	1.007	799	152.571
		% 96,9	2,0	0,7	0,5	100,0	
	I	N 31.439	111	.	.	31.550	
		% 99,6	0,4	.	.	100,0	
	II	N 20.080	375	.	.	20.455	
		% 98,2	1,8	.	.	100,0	
	III	N 40.607	872	201	413	42.094	
		% 96,5	2,1	0,5	1,0	100,0	
	IV	N 49.934	1.363	806	123	52.226	
		% 95,6	2,6	1,5	0,2	100,0	
	V	N 5.720	263	.	264	6.246	
		% 91,6	4,2	.	4,2	100,0	
	15-24	Total	N 92.772	361	153	525	93.810
		% 98,9	0,4	0,2	0,6	100,0	
	I	N 15.209	.	.	.	15.209	
		% 100,0	.	.	.	100,0	
	II	N 12.260	.	.	.	12.260	
		% 100,0	.	.	.	100,0	
	III	N 17.124	.	.	397	17.521	
		% 97,7	.	.	2,3	100,0	
	IV	N 40.296	124	.	128	40.549	
		% 99,4	0,3	.	0,3	100,0	

(continuación)

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

		Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Hombres 15-24 V	N	7.881	236	153	.	8.270
	%	95,3	2,9	1,8	.	100,0
25-44 Total	N	316.964	5.322	11.448	2.390	336.124
	%	94,3	1,6	3,4	0,7	100,0
I	N	41.606	905	185	263	42.959
	%	96,9	2,1	0,4	0,6	100,0
II	N	30.871	.	1.153	196	32.220
	%	95,8	.	3,6	0,6	100,0
III	N	59.856	878	1.744	236	62.714
	%	95,4	1,4	2,8	0,4	100,0
IV	N	150.399	2.203	6.294	269	159.166
	%	94,5	1,4	4,0	0,2	100,0
V	N	34.231	1.335	2.072	1.427	39.065
	%	87,6	3,4	5,3	3,7	100,0
45-64 Total	N	269.020	18.168	13.264	1.988	302.440
	%	88,9	6,0	4,4	0,7	100,0
I	N	33.862	877	1.635	271	36.646
	%	92,4	2,4	4,5	0,7	100,0
II	N	22.830	1.033	795	132	24.792
	%	92,1	4,2	3,2	0,5	100,0
III	N	61.272	1.896	1.826	518	65.513
	%	93,5	2,9	2,8	0,8	100,0
IV	N	133.856	11.504	6.877	473	152.710
	%	87,7	7,5	4,5	0,3	100,0
V	N	17.199	2.857	2.131	593	22.779
	%	75,5	12,5	9,4	2,6	100,0
65-74 Total	N	80.874	9.813	2.758	2.288	95.733
	%	84,5	10,3	2,9	2,4	100,0
I	N	11.240	599	364	257	12.460
	%	90,2	4,8	2,9	2,1	100,0
II	N	6.054	619	384	133	7.189
	%	84,2	8,6	5,3	1,8	100,0
III	N	16.971	2.065	987	483	20.506
	%	82,8	10,1	4,8	2,4	100,0

(continuación)

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total		
Hombres	65-74	IV	N	41.805	5.688	880	1.338	49.711	
			%	84,1	11,4	1,8	2,7	100,0	
		V	N	4.806	842	144	76	5.867	
			%	81,9	14,4	2,5	1,3	100,0	
	>=75	Total	N	66.971	12.088	3.615	3.065	85.739	
			%	78,1	14,1	4,2	3,6	100,0	
		I	N	3.853	210	155	.	4.219	
			%	91,3	5,0	3,7	.	100,0	
		II	N	3.347	820	431	135	4.733	
			%	70,7	17,3	9,1	2,9	100,0	
		III	N	15.506	2.438	1.320	653	19.917	
			%	77,9	12,2	6,6	3,3	100,0	
		IV	N	38.547	7.523	1.500	2.143	49.713	
			%	77,5	15,1	3,0	4,3	100,0	
		V	N	5.718	1.097	208	135	7.158	
			%	79,9	15,3	2,9	1,9	100,0	
	Mujeres	Total	Total	N	998.425	70.795	40.069	8.566	1.117.854
				%	89,3	6,3	3,6	0,8	100,0
		I	N	129.801	2.423	2.828	209	135.260	
			%	96,0	1,8	2,1	0,2	100,0	
		II	N	104.224	4.783	2.785	843	112.634	
			%	92,5	4,2	2,5	0,7	100,0	
		III	N	258.628	15.966	8.291	1.458	284.344	
			%	91,0	5,6	2,9	0,5	100,0	
		IV	N	362.329	29.579	15.780	4.516	412.204	
			%	87,9	7,2	3,8	1,1	100,0	
		V	N	143.444	18.043	10.385	1.539	173.412	
			%	82,7	10,4	6,0	0,9	100,0	
0-14		Total	N	143.225	1.334	380	.	144.940	
			%	98,8	0,9	0,3	.	100,0	
		I	N	31.834	.	217	.	32.050	
			%	99,3	.	0,7	.	100,0	
		II	N	18.855	230	.	.	19.085	
			%	98,8	1,2	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Mujeres	0-14	III	N	41.864	563	164	.	42.591
			%	98,3	1,3	0,4	.	100,0
		IV	N	44.802	304	.	.	45.106
			%	99,3	0,7	.	.	100,0
		V	N	5.871	237	.	.	6.108
			%	96,1	3,9	.	.	100,0
	15-24	Total	N	86.909	399	809	593	88.710
			%	98,0	0,4	0,9	0,7	100,0
		I	N	14.848	.	.	.	14.848
			%	100,0	.	.	.	100,0
		II	N	11.686	134	.	.	11.820
			%	98,9	1,1	.	.	100,0
		III	N	22.301	.	398	.	22.699
			%	98,2	.	1,8	.	100,0
		IV	N	31.267	265	138	464	32.135
			%	97,3	0,8	0,4	1,4	100,0
		V	N	6.806	.	273	129	7.208
			%	94,4	.	3,8	1,8	100,0
	25-44	Total	N	304.705	6.034	8.367	1.303	320.409
			%	95,1	1,9	2,6	0,4	100,0
		I	N	45.036	215	267	209	45.726
			%	98,5	0,5	0,6	0,5	100,0
		II	N	36.095	778	659	194	37.726
			%	95,7	2,1	1,7	0,5	100,0
		III	N	75.374	891	1.584	.	77.849
			%	96,8	1,1	2,0	.	100,0
		IV	N	109.061	1.968	2.810	573	114.412
			%	95,3	1,7	2,5	0,5	100,0
		V	N	39.139	2.183	3.048	327	44.697
			%	87,6	4,9	6,8	0,7	100,0
	45-64	Total	N	279.823	17.139	14.965	1.361	313.289
			%	89,3	5,5	4,8	0,4	100,0
		I	N	28.236	578	1.368	.	30.183
			%	93,6	1,9	4,5	.	100,0

(continuación)

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total	
Mujeres	45-64	II	N	24.942	456	1.314	218	26.929	
			%	92,6	1,7	4,9	0,8	100,0	
		III	N	78.582	4.082	3.192	409	86.265	
			%	91,1	4,7	3,7	0,5	100,0	
		IV	N	94.155	7.436	5.205	430	107.225	
			%	87,8	6,9	4,9	0,4	100,0	
	V	N	53.907	4.588	3.887	304	62.687		
		%	86,0	7,3	6,2	0,5	100,0		
	65-74	Total	N	93.514	11.495	2.693	2.080	109.781	
			%	85,2	10,5	2,5	1,9	100,0	
		I	N	5.961	435	374	.	6.770	
			%	88,0	6,4	5,5	.	100,0	
		II	N	6.697	625	109	145	7.575	
			%	88,4	8,2	1,4	1,9	100,0	
		III	N	23.127	1.665	270	363	25.424	
			%	91,0	6,5	1,1	1,4	100,0	
		IV	N	40.656	5.918	1.331	1.220	49.125	
			%	82,8	12,0	2,7	2,5	100,0	
		V	N	17.074	2.852	609	352	20.887	
			%	81,7	13,7	2,9	1,7	100,0	
		>=75	Total	N	90.249	34.393	12.854	3.229	140.726
				%	64,1	24,4	9,1	2,3	100,0
			I	N	3.886	1.195	602	.	5.683
				%	68,4	21,0	10,6	.	100,0
II			N	5.950	2.560	704	286	9.500	
			%	62,6	27,0	7,4	3,0	100,0	
III	N		17.380	8.766	2.684	687	29.516		
	%		58,9	29,7	9,1	2,3	100,0		
IV	N		42.388	13.688	6.296	1.829	64.201		
	%		66,0	21,3	9,8	2,8	100,0		
V	N		20.646	8.184	2.568	427	31.826		
	%		64,9	25,7	8,1	1,3	100,0		
Ambos	Total	Total N	1.972.806	119.530	72.314	19.622	2.184.271		
		%	90,3	5,5	3,3	0,9	100,0		

(continuación)

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Ambos	Total	I	N	267.010	5.126	5.166	1.000	278.303
			%	95,9	1,8	1,9	0,4	100,0
		II	N	199.666	7.630	5.549	1.439	214.283
			%	93,2	3,6	2,6	0,7	100,0
		III	N	469.964	24.116	14.369	4.159	512.608
			%	91,7	4,7	2,8	0,8	100,0
		IV	N	817.167	57.985	32.137	8.990	916.279
			%	89,2	6,3	3,5	1,0	100,0
		V	N	218.999	24.674	15.092	4.033	262.798
			%	83,3	9,4	5,7	1,5	100,0
	0-14	Total	N	291.005	4.318	1.388	799	297.510
			%	97,8	1,5	0,5	0,3	100,0
		I	N	63.273	111	217	.	63.600
			%	99,5	0,2	0,3	.	100,0
		II	N	38.934	605	.	.	39.539
			%	98,5	1,5	.	.	100,0
		III	N	82.471	1.435	365	413	84.684
			%	97,4	1,7	0,4	0,5	100,0
		IV	N	94.737	1.667	806	123	97.332
			%	97,3	1,7	0,8	0,1	100,0
		V	N	11.590	500	.	264	12.354
			%	93,8	4,0	.	2,1	100,0
	15-24	Total	N	179.681	759	962	1.118	182.520
			%	98,4	0,4	0,5	0,6	100,0
		I	N	30.058	.	.	.	30.058
			%	100,0	.	.	.	100,0
		II	N	23.946	134	.	.	24.080
			%	99,4	0,6	.	.	100,0
		III	N	39.425	.	398	397	40.220
			%	98,0	.	1,0	1,0	100,0
		IV	N	71.564	389	138	592	72.684
			%	98,5	0,5	0,2	0,8	100,0
		V	N	14.688	236	426	129	15.478
			%	94,9	1,5	2,8	0,8	100,0

(continuación)

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Ambos	25-44	Total	N 621.669	11.356	19.815	3.693	656.533
			% 94,7	1,7	3,0	0,6	100,0
		I	N 86.642	1.120	451	472	88.685
			% 97,7	1,3	0,5	0,5	100,0
		II	N 66.966	778	1.812	390	69.946
			% 95,7	1,1	2,6	0,6	100,0
		III	N 135.231	1.769	3.328	236	140.563
			% 96,2	1,3	2,4	0,2	100,0
		IV	N 259.461	4.171	9.104	842	273.578
			% 94,8	1,5	3,3	0,3	100,0
		V	N 73.369	3.518	5.120	1.754	83.762
			% 87,6	4,2	6,1	2,1	100,0
	45-64	Total	N 548.842	35.307	28.229	3.350	615.728
			% 89,1	5,7	4,6	0,5	100,0
		I	N 62.099	1.456	3.003	271	66.829
			% 92,9	2,2	4,5	0,4	100,0
		II	N 47.772	1.489	2.109	350	51.721
			% 92,4	2,9	4,1	0,7	100,0
		III	N 139.854	5.978	5.018	927	151.777
			% 92,1	3,9	3,3	0,6	100,0
		IV	N 228.011	18.940	12.082	903	259.935
			% 87,7	7,3	4,6	0,3	100,0
		V	N 71.106	7.445	6.017	898	85.466
			% 83,2	8,7	7,0	1,1	100,0
	65-74	Total	N 174.389	21.308	5.451	4.368	205.514
			% 84,9	10,4	2,7	2,1	100,0
		I	N 17.200	1.034	737	257	19.230
			% 89,4	5,4	3,8	1,3	100,0
		II	N 12.751	1.243	493	278	14.765
			% 86,4	8,4	3,3	1,9	100,0
		III	N 40.097	3.730	1.256	847	45.930
			% 87,3	8,1	2,7	1,8	100,0
		IV	N 82.460	11.606	2.211	2.558	98.836
			% 83,4	11,7	2,2	2,6	100,0

(continuación)

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total	
Ambos	65-74	V	N	21.880	3.694	753	427	26.754
			%	81,8	13,8	2,8	1,6	100,0
	>=75	Total	N	157.221	46.481	16.469	6.294	226.465
			%	69,4	20,5	7,3	2,8	100,0
		I	N	7.738	1.405	758	.	9.902
			%	78,2	14,2	7,7	.	100,0
		II	N	9.297	3.380	1.135	421	14.233
			%	65,3	23,7	8,0	3,0	100,0
		III	N	32.886	11.204	4.004	1.339	49.433
			%	66,5	22,7	8,1	2,7	100,0
		IV	N	80.935	21.211	7.796	3.972	113.914
			%	71,0	18,6	6,8	3,5	100,0
		V	N	26.365	9.281	2.776	562	38.983
			%	67,6	23,8	7,1	1,4	100,0

Tabla 49. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Hombres Total	Total	N	879.833	46.483	32.245	10.643	969.203
		%	90,8	4,8	3,3	1,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	222.246	23.431	11.605	4.464	261.746
		%	84,9	9,0	4,4	1,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	152.160	10.789	6.833	2.571	172.354
		%	88,3	6,3	4,0	1,5	100,0
	Secundaria, superior	N	339.850	9.428	10.023	2.290	361.590
		%	94,0	2,6	2,8	0,6	100,0
	Terciaria	N	165.577	2.834	3.784	1.317	173.513
		%	95,4	1,6	2,2	0,8	100,0
0-14	Total	N	52.051	634	1.007	386	54.079
		%	96,3	1,2	1,9	0,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	45.881	503	1.007	386	47.778
		%	96,0	1,1	2,1	0,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	6.170	131	.	.	6.301
		%	97,9	2,1	.	.	100,0
15-24	Total	N	93.420	361	153	525	94.458
		%	98,9	0,4	0,2	0,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	11.278	124	.	128	11.531
		%	97,8	1,1	.	1,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	30.765	236	153	397	31.551
		%	97,5	0,7	0,5	1,3	100,0
	Secundaria, superior	N	42.767	.	.	.	42.767
		%	100,0	.	.	.	100,0
	Terciaria	N	8.610	.	.	.	8.610
		%	100,0	.	.	.	100,0
25-44	Total	N	317.149	5.322	11.448	2.390	336.309
		%	94,3	1,6	3,4	0,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	33.494	2.027	3.687	772	39.979
		%	83,8	5,1	9,2	1,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	45.185	1.421	2.184	294	49.084
		%	92,1	2,9	4,4	0,6	100,0
	Secundaria, superior	N	158.237	913	4.509	557	164.217
		%	96,4	0,6	2,7	0,3	100,0

(continuación)

Tabla 49. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Hombres	25-44	Terciaria	N 80.233	961	1.068	767	83.029
			% 96,6	1,2	1,3	0,9	100,0
	45-64	Total	N 269.139	18.265	13.264	1.988	302.655
			% 88,9	6,0	4,4	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N 55.616	7.839	3.868	692	68.014
			% 81,8	11,5	5,7	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	N 45.895	4.802	3.309	503	54.510
			% 84,2	8,8	6,1	0,9	100,0
		Secundaria, superior	N 109.988	4.936	4.526	521	119.971
			% 91,7	4,1	3,8	0,4	100,0
		Terciaria	N 57.641	688	1.561	271	60.161
			% 95,8	1,1	2,6	0,5	100,0
	65-74	Total	N 80.874	9.813	2.758	2.288	95.733
			% 84,5	10,3	2,9	2,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N 33.753	4.265	693	988	39.699
			% 85,0	10,7	1,7	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	N 13.508	2.850	456	544	17.359
			% 77,8	16,4	2,6	3,1	100,0
		Secundaria, superior	N 20.739	1.945	738	612	24.034
			% 86,3	8,1	3,1	2,5	100,0
		Terciaria	N 12.874	753	871	144	14.641
			% 87,9	5,1	5,9	1,0	100,0
	>=75	Total	N 67.200	12.088	3.615	3.065	85.968
			% 78,2	14,1	4,2	3,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N 42.223	8.673	2.350	1.499	54.745
			% 77,1	15,8	4,3	2,7	100,0
		Secundaria, inferior	N 10.637	1.348	731	833	13.549
			% 78,5	10,0	5,4	6,1	100,0
		Secundaria, superior	N 8.120	1.634	249	599	10.602
			% 76,6	15,4	2,3	5,7	100,0
		Terciaria	N 6.220	432	285	135	7.072
			% 88,0	6,1	4,0	1,9	100,0
Mujeres	Total	Total	N 904.687	70.437	40.244	8.566	1.023.933
			% 88,4	6,9	3,9	0,8	100,0

(continuación)

Tabla 49. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Mujeres	Total	Sin estudios, primaria	N 262.876	40.584	18.080	5.371	326.911
			% 80,4	12,4	5,5	1,6	100,0
		Secundaria, inferior	N 149.668	15.532	7.708	830	173.739
			% 86,1	8,9	4,4	0,5	100,0
		Secundaria, superior	N 286.952	11.111	10.536	1.197	309.797
			% 92,6	3,6	3,4	0,4	100,0
		Terciaria	N 205.190	3.210	3.919	1.167	213.486
			% 96,1	1,5	1,8	0,5	100,0
0-14	Total		N 47.277	394	380	.	48.051
			% 98,4	0,8	0,8	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N 42.436	394	217	.	43.046
			% 98,6	0,9	0,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	N 4.678	.	164	.	4.841
			% 96,6	.	3,4	.	100,0
		Secundaria, superior	N 164	.	.	.	164
			% 100,0	.	.	.	100,0
15-24	Total		N 87.698	399	809	593	89.499
			% 98,0	0,4	0,9	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N 9.822	399	273	593	11.087
			% 88,6	3,6	2,5	5,3	100,0
		Secundaria, inferior	N 19.452	.	398	.	19.850
			% 98,0	.	2,0	.	100,0
		Secundaria, superior	N 42.905	.	.	.	42.905
			% 100,0	.	.	.	100,0
		Terciaria	N 15.519	.	138	.	15.657
			% 99,1	.	0,9	.	100,0
25-44	Total		N 305.121	6.034	8.367	1.303	320.826
			% 95,1	1,9	2,6	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N 26.623	1.593	1.318	127	29.661
			% 89,8	5,4	4,4	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	N 33.375	1.778	1.626	.	36.779
			% 90,7	4,8	4,4	.	100,0
		Secundaria, superior	N 128.031	2.420	4.443	573	135.466
			% 94,5	1,8	3,3	0,4	100,0

(continuación)

Tabla 49. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Mujeres	25-44	Terciaria	N 117.092	244	981	603	118.919
			% 98,5	0,2	0,8	0,5	100,0
	45-64	Total	N 279.980	17.462	14.965	1.361	313.769
		% 89,2	5,6	4,8	0,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N 68.094	6.274	4.836	444	79.648
			% 85,5	7,9	6,1	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	N 54.221	5.319	2.985	.	62.525
			% 86,7	8,5	4,8	.	100,0
		Secundaria, superior	N 97.511	4.728	5.124	498	107.861
			% 90,4	4,4	4,8	0,5	100,0
		Terciaria	N 60.154	1.141	2.020	419	63.734
			% 94,4	1,8	3,2	0,7	100,0
	65-74	Total	N 93.658	11.495	2.693	2.080	109.925
		% 85,2	10,5	2,4	1,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N 51.307	7.546	1.945	1.578	62.377
			% 82,3	12,1	3,1	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	N 22.677	1.946	432	357	25.412
			% 89,2	7,7	1,7	1,4	100,0
		Secundaria, superior	N 11.531	1.450	87	.	13.068
			% 88,2	11,1	0,7	.	100,0
		Terciaria	N 8.142	552	228	145	9.068
			% 89,8	6,1	2,5	1,6	100,0
	>=75	Total	N 90.953	34.654	13.029	3.229	141.864
		% 64,1	24,4	9,2	2,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N 64.593	24.377	9.492	2.629	101.092
			% 63,9	24,1	9,4	2,6	100,0
		Secundaria, inferior	N 15.266	6.489	2.103	473	24.331
			% 62,7	26,7	8,6	1,9	100,0
		Secundaria, superior	N 6.811	2.514	882	126	10.333
			% 65,9	24,3	8,5	1,2	100,0
		Terciaria	N 4.283	1.273	552	.	6.108
			% 70,1	20,8	9,0	.	100,0
Ambos	Total	Total	N 1.784.520	116.920	72.489	19.208	1.993.136
			% 89,5	5,9	3,6	1,0	100,0

(continuación)

Tabla 49. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Ambos	Total	Sin estudios, primaria	N 485.122	64.015	29.685	9.835	588.657
			% 82,4	10,9	5,0	1,7	100,0
		Secundaria, inferior	N 301.829	26.321	14.542	3.402	346.093
			% 87,2	7,6	4,2	1,0	100,0
		Secundaria, superior	N 626.802	20.539	20.559	3.487	671.388
			% 93,4	3,1	3,1	0,5	100,0
		Terciaria	N 370.767	6.045	7.703	2.485	386.999
			% 95,8	1,6	2,0	0,6	100,0
0-14	Total		N 99.328	1.028	1.388	386	102.130
			% 97,3	1,0	1,4	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N 88.317	897	1.224	386	90.824
			% 97,2	1,0	1,3	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	N 10.848	131	164	.	11.142
			% 97,4	1,2	1,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N 164	.	.	.	164
			% 100,0	.	.	.	100,0
15-24	Total		N 181.118	759	962	1.118	183.958
			% 98,5	0,4	0,5	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N 21.100	523	273	721	22.618
			% 93,3	2,3	1,2	3,2	100,0
		Secundaria, inferior	N 50.217	236	551	397	51.401
			% 97,7	0,5	1,1	0,8	100,0
		Secundaria, superior	N 85.672	.	.	.	85.672
			% 100,0	.	.	.	100,0
		Terciaria	N 24.129	.	138	.	24.267
			% 99,4	.	0,6	.	100,0
25-44	Total		N 622.270	11.356	19.815	3.693	657.135
			% 94,7	1,7	3,0	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N 60.117	3.620	5.004	899	69.640
			% 86,3	5,2	7,2	1,3	100,0
		Secundaria, inferior	N 78.560	3.199	3.810	294	85.863
			% 91,5	3,7	4,4	0,3	100,0
		Secundaria, superior	N 286.268	3.333	8.952	1.130	299.683
			% 95,5	1,1	3,0	0,4	100,0

(continuación)

Tabla 49. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Ambos	25-44	Terciaria	N 197.325	1.205	2.049	1.370	201.949
			% 97,7	0,6	1,0	0,7	100,0
	45-64	Total	N 549.119	35.727	28.229	3.350	616.424
			% 89,1	5,8	4,6	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N 123.710	14.113	8.704	1.135	147.663
			% 83,8	9,6	5,9	0,8	100,0
		Secundaria, inferior	N 100.116	10.121	6.294	503	117.034
			% 85,5	8,6	5,4	0,4	100,0
		Secundaria, superior	N 207.498	9.664	9.650	1.020	227.832
			% 91,1	4,2	4,2	0,4	100,0
		Terciaria	N 117.795	1.829	3.581	691	123.895
			% 95,1	1,5	2,9	0,6	100,0
	65-74	Total	N 174.532	21.308	5.451	4.368	205.658
			% 84,9	10,4	2,7	2,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N 85.061	11.811	2.638	2.566	102.075
			% 83,3	11,6	2,6	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	N 36.186	4.796	889	901	42.772
			% 84,6	11,2	2,1	2,1	100,0
		Secundaria, superior	N 32.270	3.395	826	612	37.102
			% 87,0	9,1	2,2	1,6	100,0
		Terciaria	N 21.016	1.306	1.099	288	23.709
			% 88,6	5,5	4,6	1,2	100,0
	>=75	Total	N 158.152	46.742	16.644	6.294	227.832
			% 69,4	20,5	7,3	2,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N 106.817	33.051	11.842	4.128	155.837
			% 68,5	21,2	7,6	2,6	100,0
		Secundaria, inferior	N 25.903	7.838	2.834	1.306	37.881
			% 68,4	20,7	7,5	3,4	100,0
		Secundaria, superior	N 14.931	4.148	1.131	725	20.935
			% 71,3	19,8	5,4	3,5	100,0
		Terciaria	N 10.502	1.706	836	135	13.179
			% 79,7	12,9	6,3	1,0	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total		
Hombres	Total	CAPV	N	4.601	4.143	674	1.924	72.681	7.686	179	244	92.133	
			%	5,0	4,5	0,7	2,1	78,9	8,3	0,2	0,3	100,0	
		Araba	N	880	366	94	369	8.061	613	179	.	10.561	
			%	8,3	3,5	0,9	3,5	76,3	5,8	1,7	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	2.062	1.529	425	740	28.121	3.426	.	.	36.303	
			%	5,7	4,2	1,2	2,0	77,5	9,4	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	1.660	2.247	156	814	36.499	3.648	.	244	45.269	
			%	3,7	5,0	0,3	1,8	80,6	8,1	.	0,5	100,0	
	0-14	CAPV	N	.	.	.	197	4.593	.	.	.	4.791	
			%	.	.	.	4,1	95,9	.	.	.	100,0	
			Araba	N	736	.	.	.	736
				%	100,0	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	.	197	1.245	.	.	.	1.442	
			%	.	.	.	13,7	86,3	.	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	2.613	.	.	.	2.613	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
15-24		CAPV	N	.	.	.	236	802	.	.	.	1.038	
			%	.	.	.	22,7	77,3	.	.	.	100,0	
			Gipuzkoa	N	415	.	.	.	415
				%	100,0	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	.	.	236	387	.	.	.	624	
			%	.	.	.	37,9	62,1	.	.	.	100,0	
25-44	CAPV	N	1.327	1.991	.	171	14.047	1.445	179	.	19.160		

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total		
Hombres	25-44	CAPV	%	6,9	10,4	.	0,9	73,3	7,5	0,9	.	100,0	
		Araba	N	334	366	.	171	2.483	162	179	.	3.695	
			%	9,0	9,9	.	4,6	67,2	4,4	4,8	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	204	788	.	.	3.986	648	.	.	5.625	
			%	3,6	14,0	.	.	70,9	11,5	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	789	837	.	.	7.579	636	.	.	9.840	
			%	8,0	8,5	.	.	77,0	6,5	.	.	100,0	
		45-64	CAPV	N	1.942	1.729	156	647	24.569	4.474	.	.	33.517
			%	5,8	5,2	0,5	1,9	73,3	13,3	.	.	100,0	
		Araba	N	316	.	.	198	1.987	451	.	.	2.952	
			%	10,7	.	.	6,7	67,3	15,3	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.209	634	.	.	11.171	2.113	.	.	15.128	
	%		8,0	4,2	.	.	73,8	14,0	.	.	100,0		
	Bizkaia	N	417	1.094	156	450	11.411	1.909	.	.	15.437		
		%	2,7	7,1	1,0	2,9	73,9	12,4	.	.	100,0		
	65-74	CAPV	N	907	246	.	358	12.384	963	.	.	14.859	
		%	6,1	1,7	.	2,4	83,3	6,5	.	.	100,0		
	Araba	N	230	.	.	.	1.190	.	.	.	1.420		
		%	16,2	.	.	.	83,8	.	.	.	100,0		
	Gipuzkoa	N	545	107	.	229	5.732	562	.	.	7.175		
		%	7,6	1,5	.	3,2	79,9	7,8	.	.	100,0		
	Bizkaia	N	133	139	.	129	5.462	401	.	.	6.264		
		%	2,1	2,2	.	2,1	87,2	6,4	.	.	100,0		

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total	
Hombres >=75	CAPV	N	426	177	518	313	16.285	804	.	244	18.768	
		%	2,3	0,9	2,8	1,7	86,8	4,3	.	1,3	100,0	
	Araba	N	.	.	94	.	1.665	.	.	.	1.759	
		%	.	.	5,3	.	94,7	.	.	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	105	.	425	313	5.573	103	.	.	6.518	
		%	1,6	.	6,5	4,8	85,5	1,6	.	.	100,0	
	Bizkaia	N	321	177	.	.	9.048	701	.	244	10.491	
		%	3,1	1,7	.	.	86,2	6,7	.	2,3	100,0	
	Mujeres	Total CAPV	N	914	2.291	4.449	3.036	104.134	4.922	213	229	120.187
			%	0,8	1,9	3,7	2,5	86,6	4,1	0,2	0,2	100,0
		Araba	N	107	122	436	95	10.328	596	.	.	11.685
			%	0,9	1,0	3,7	0,8	88,4	5,1	.	.	100,0
Gipuzkoa		N	689	927	1.703	1.521	35.003	1.540	.	.	41.384	
		%	1,7	2,2	4,1	3,7	84,6	3,7	.	.	100,0	
Bizkaia		N	117	1.242	2.310	1.420	58.802	2.786	213	229	67.118	
		%	0,2	1,9	3,4	2,1	87,6	4,2	0,3	0,3	100,0	
0-14		CAPV	N	1.714	.	.	.	1.714
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Araba	N	769	.	.	.	769
			%	100,0	.	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	447	.	.	.	447	
		%	100,0	.	.	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Mujeres	0-14	Bizkaia	N	498	.	.	.	498
			%	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	CAPV	N	.	138	.	.	1.663	.	.	.	1.801
			%	.	7,7	.	.	92,3	.	.	.	100,0
		Araba	N	199	.	.	.	199
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	669	.	.	.	669
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	138	.	.	795	.	.	.	933
			%	.	14,8	.	.	85,2	.	.	.	100,0
	25-44	CAPV	N	.	792	.	209	13.032	1.443	.	229	15.704
			%	.	5,0	.	1,3	83,0	9,2	.	1,5	100,0
		Araba	N	.	122	.	.	2.141	230	.	.	2.493
			%	.	4,9	.	.	85,9	9,2	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	443	.	209	4.451	412	.	.	5.514
			%	.	8,0	.	3,8	80,7	7,5	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	227	.	.	6.440	801	.	229	7.697
			%	.	2,9	.	.	83,7	10,4	.	3,0	100,0
	45-64	CAPV	N	688	528	956	670	27.666	3.067	213	.	33.789
			%	2,0	1,6	2,8	2,0	81,9	9,1	0,6	.	100,0
		Araba	N	107	.	83	.	2.420	277	.	.	2.887
			%	3,7	.	2,9	.	83,8	9,6	.	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total	
Mujeres	45-64	Gipuzkoa	N	581	380	237	670	10.074	1.129	.	.	13.070
			%	4,4	2,9	1,8	5,1	77,1	8,6	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	148	636	.	15.172	1.661	213	.	17.831
			%	.	0,8	3,6	.	85,1	9,3	1,2	.	100,0
		65-74	CAPV	N	225	104	867	667	14.404	.	.	16.267
			%	1,4	0,6	5,3	4,1	88,5	.	.	.	100,0
			Araba	N	1.195	.	.	1.195
				%	100,0	.	.	100,0
			Gipuzkoa	N	108	104	540	114	4.854	.	.	5.720
				%	1,9	1,8	9,4	2,0	84,9	.	.	100,0
			Bizkaia	N	117	.	327	553	8.354	.	.	9.352
				%	1,3	.	3,5	5,9	89,3	.	.	100,0
		>=75	CAPV	N	.	728	2.626	1.490	45.655	412	.	50.912
				%	.	1,4	5,2	2,9	89,7	0,8	.	100,0
			Araba	N	.	.	353	95	3.604	88	.	4.140
				%	.	.	8,5	2,3	87,0	2,1	.	100,0
			Gipuzkoa	N	.	.	926	528	14.509	.	.	15.964
				%	.	.	5,8	3,3	90,9	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	728	1.346	867	27.543	324	.	30.808	
			%	.	2,4	4,4	2,8	89,4	1,1	.	100,0	
Ambos	Total	CAPV	N	5.515	6.434	5.123	4.960	176.815	12.608	392	473	212.320
			%	2,6	3,0	2,4	2,3	83,3	5,9	0,2	0,2	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Ambos	Total	Araba	N	987	489	530	464	18.390	1.208	179	.	22.246
			%	4,4	2,2	2,4	2,1	82,7	5,4	0,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.752	2.456	2.127	2.262	63.125	4.966	.	.	77.687
			%	3,5	3,2	2,7	2,9	81,3	6,4	.	.	100,0
		Bizkaia	N	1.777	3.489	2.466	2.234	95.301	6.434	213	473	112.387
			%	1,6	3,1	2,2	2,0	84,8	5,7	0,2	0,4	100,0
0-14	CAPV		N	.	.	.	197	6.308	.	.	.	6.505
			%	.	.	.	3,0	97,0	.	.	.	100,0
		Araba	N	1.505	.	.	.	1.505
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	.	197	1.692	.	.	.	1.889
			%	.	.	.	10,5	89,5	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	3.111	.	.	.	3.111
			%	100,0	.	.	.	100,0
15-24	CAPV		N	.	138	.	236	2.465	.	.	.	2.840
			%	.	4,9	.	8,3	86,8	.	.	.	100,0
		Araba	N	199	.	.	.	199
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.084	.	.	.	1.084
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	138	.	236	1.182	.	.	.	1.557
			%	.	8,9	.	15,2	75,9	.	.	.	100,0
25-44	CAPV		N	1.327	2.783	.	380	27.079	2.888	179	229	34.865

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total	
Ambos	25-44	CAPV	%	3,8	8,0	.	1,1	77,7	8,3	0,5	0,7	100,0	
		Araba	N	334	489	.	171	4.623	392	179	.	6.188	
			%	5,4	7,9	.	2,8	74,7	6,3	2,9	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	204	1.231	.	209	8.437	1.059	.	.	11.140	
			%	1,8	11,0	.	1,9	75,7	9,5	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	789	1.064	.	.	14.019	1.436	.	229	17.537	
			%	4,5	6,1	.	.	79,9	8,2	.	1,3	100,0	
		45-64	CAPV	N	2.630	2.257	1.112	1.318	52.235	7.541	213	.	67.305
			%	3,9	3,4	1,7	2,0	77,6	11,2	0,3	.	100,0	
		Araba	N	423	.	83	198	4.407	728	.	.	5.839	
			%	7,2	.	1,4	3,4	75,5	12,5	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.790	1.014	237	670	21.245	3.242	.	.	28.198	
	%		6,3	3,6	0,8	2,4	75,3	11,5	.	.	100,0		
	Bizkaia	N	417	1.242	792	450	26.583	3.571	213	.	33.268		
		%	1,3	3,7	2,4	1,4	79,9	10,7	0,6	.	100,0		
	65-74	CAPV	N	1.133	350	867	1.025	26.788	963	.	.	31.126	
		%	3,6	1,1	2,8	3,3	86,1	3,1	.	.	100,0		
	Araba	N	230	.	.	.	2.386	.	.	.	2.615		
		%	8,8	.	.	.	91,2	.	.	.	100,0		
	Gipuzkoa	N	653	211	540	343	10.586	562	.	.	12.895		
		%	5,1	1,6	4,2	2,7	82,1	4,4	.	.	100,0		
	Bizkaia	N	250	139	327	682	13.816	401	.	.	15.616		
		%	1,6	0,9	2,1	4,4	88,5	2,6	.	.	100,0		

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total	
Ambos	>=75	CAPV	N	426	905	3.144	1.803	61.941	1.216	.	244	69.680
			%	0,6	1,3	4,5	2,6	88,9	1,7	.	0,4	100,0
		Araba	N	.	.	447	95	5.269	88	.	.	5.899
			%	.	.	7,6	1,6	89,3	1,5	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	105	.	1.351	842	20.081	103	.	.	22.482
			%	0,5	.	6,0	3,7	89,3	0,5	.	.	100,0
		Bizkaia	N	321	905	1.346	867	36.590	1.025	.	244	41.299
			%	0,8	2,2	3,3	2,1	88,6	2,5	.	0,6	100,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

		Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total			
Hombres	Total	Total	N	4.601	4.143	674	1.924	72.585	7.686	179	244	92.036	
			%	5,0	4,5	0,7	2,1	78,9	8,4	0,2	0,3	100,0	
		I	N	.	344	.	379	4.476	635	.	.	5.833	
			%	.	5,9	.	6,5	76,7	10,9	.	.	100,0	
		II	N	110	.	.	.	5.624	473	.	.	6.207	
			%	1,8	.	.	.	90,6	7,6	.	.	100,0	
		III	N	643	556	98	546	14.104	981	.	.	16.928	
			%	3,8	3,3	0,6	3,2	83,3	5,8	.	.	100,0	
		IV	N	3.271	2.706	420	763	36.981	4.672	179	244	49.236	
			%	6,6	5,5	0,9	1,5	75,1	9,5	0,4	0,5	100,0	
		V	N	578	537	156	236	11.400	925	.	.	13.831	
			%	4,2	3,9	1,1	1,7	82,4	6,7	.	.	100,0	
		0-14	Total	N	.	.	.	197	4.593	.	.	.	4.791
				%	.	.	.	4,1	95,9	.	.	.	100,0
			I	N	111	.	.	.	111
				%	100,0	.	.	.	100,0
			II	N	375	.	.	.	375
				%	100,0	.	.	.	100,0
		III	N	1.487	.	.	.	1.487	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
		IV	N	.	.	.	197	2.094	.	.	.	2.292	
			%	.	.	.	8,6	91,4	.	.	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Hombres 0-14	V	N	527	.	.	.	527
		%	100,0	.	.	.	100,0
15-24	Total	N	.	.	.	236	802	.	.	.	1.038
		%	.	.	.	22,7	77,3	.	.	.	100,0
	III	N	397	.	.	.	397
		%	100,0	.	.	.	100,0
	IV	N	253	.	.	.	253
		%	100,0	.	.	.	100,0
	V	N	.	.	.	236	153	.	.	.	389
		%	.	.	.	60,7	39,3	.	.	.	100,0
25-44	Total	N	1.327	1.991	.	171	14.047	1.445	179	.	19.160
		%	6,9	10,4	.	0,9	73,3	7,5	0,9	.	100,0
	I	N	1.353	.	.	.	1.353
		%	100,0	.	.	.	100,0
	II	N	1.349	.	.	.	1.349
		%	100,0	.	.	.	100,0
	III	N	535	338	.	.	1.300	684	.	.	2.858
		%	18,7	11,8	.	.	45,5	24,0	.	.	100,0
	IV	N	792	1.291	.	171	5.790	543	179	.	8.766
		%	9,0	14,7	.	2,0	66,1	6,2	2,0	.	100,0
	V	N	.	362	.	.	4.255	218	.	.	4.834
		%	.	7,5	.	.	88,0	4,5	.	.	100,0
45-64	Total	N	1.942	1.729	156	647	24.472	4.474	.	.	33.420

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

		Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Hombres 45-64	Total	5,8	5,2	0,5	1,9	73,2	13,4	.	.	100,0
	I	.	344	.	271	1.645	523	.	.	2.784
		%	.	12,4	.	9,7	59,1	18,8	.	100,0
	II	1.488	473	.	.	1.961
		%	75,9	24,1	.	100,0
	III	.	218	.	90	3.754	180	.	.	4.241
		%	.	5,1	.	2,1	88,5	4,2	.	100,0
	IV	N	1.472	992	.	286	13.336	2.768	.	18.854
		%	7,8	5,3	.	1,5	70,7	14,7	.	100,0
		V	469	175	156	.	4.249	530	.	5.580
	%	8,4	3,1	2,8	.	76,1	9,5	.	100,0	
65-74	Total	907	246	.	358	12.384	963	.	.	14.859
		%	6,1	1,7	.	2,4	83,3	6,5	.	100,0
	I	1.108	112	.	.	1.220
		%	90,8	9,2	.	100,0
	II	N	110	.	.	.	1.026	.	.	1.136
		%	9,7	.	.	.	90,3	.	.	100,0
	III	N	108	.	.	250	3.060	117	.	3.535
		%	3,1	.	.	7,1	86,6	3,3	.	100,0
	IV	N	581	246	.	108	6.236	735	.	7.906
		%	7,4	3,1	.	1,4	78,9	9,3	.	100,0
	V	108	.	.	.	954	.	.	1.062	
	%	10,2	.	.	.	89,8	.	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

		Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total		
Hombres >=75	Total	N	426	177	518	313	16.285	804	.	244	18.768	
		%	2,3	0,9	2,8	1,7	86,8	4,3	.	1,3	100,0	
	I	N	.	.	.	107	258	.	.	.	366	
		%	.	.	.	29,3	70,7	.	.	.	100,0	
	II	N	1.386	.	.	.	1.386	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
	III	N	.	.	98	206	4.107	.	.	.	4.411	
		%	.	.	2,2	4,7	93,1	.	.	.	100,0	
	IV	N	426	177	420	.	9.271	627	.	244	11.165	
		%	3,8	1,6	3,8	.	83,0	5,6	.	2,2	100,0	
	V	N	1.262	177	.	.	1.439	
		%	87,7	12,3	.	.	100,0	
	Mujeres	Total	Total N	914	2.291	4.449	3.036	103.376	4.922	213	229	119.429
			%	0,8	1,9	3,7	2,5	86,6	4,1	0,2	0,2	100,0
I		N	.	122	83	267	4.843	144	.	.	5.460	
		%	.	2,2	1,5	4,9	88,7	2,6	.	.	100,0	
II		N	.	.	196	494	6.914	807	.	.	8.411	
		%	.	.	2,3	5,9	82,2	9,6	.	.	100,0	
III		N	285	392	994	428	22.443	1.173	.	.	25.716	
		%	1,1	1,5	3,9	1,7	87,3	4,6	.	.	100,0	
IV		N	265	1.428	1.738	1.283	43.896	1.037	.	229	49.875	
		%	0,5	2,9	3,5	2,6	88,0	2,1	.	0,5	100,0	
V		N	364	348	1.438	564	25.280	1.761	213	.	29.968	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Mujeres	Total	V	%	1,2	1,2	4,8	1,9	84,4	5,9	0,7	.	100,0
	0-14	Total	N	1.714	.	.	.	1.714
			%	100,0	.	.	.	100,0
		I	N	217	.	.	.	217
			%	100,0	.	.	.	100,0
		II	N	230	.	.	.	230
			%	100,0	.	.	.	100,0
		III	N	727	.	.	.	727
			%	100,0	.	.	.	100,0
		IV	N	304	.	.	.	304
			%	100,0	.	.	.	100,0
		V	N	237	.	.	.	237
			%	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	Total	N	.	138	.	.	1.663	.	.	.	1.801
			%	.	7,7	.	.	92,3	.	.	.	100,0
		II	N	134	.	.	.	134
			%	100,0	.	.	.	100,0
		III	N	398	.	.	.	398
			%	100,0	.	.	.	100,0
		IV	N	.	138	.	.	729	.	.	.	868
			%	.	16,0	.	.	84,0	.	.	.	100,0
		V	N	402	.	.	.	402
			%	100,0	.	.	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total		
Mujeres	25-44	Total	N	.	792	.	209	13.032	1.443	.	229	15.704	
			%	.	5,0	.	1,3	83,0	9,2	.	1,5	100,0	
		I	N	.	122	.	.	568	.	.	.	690	
			%	.	17,7	.	.	82,3	.	.	.	100,0	
		II	N	.	.	.	209	1.168	254	.	.	1.631	
			%	.	.	.	12,8	71,6	15,6	.	.	100,0	
		III	N	.	244	.	.	1.958	272	.	.	2.474	
			%	.	9,9	.	.	79,1	11,0	.	.	100,0	
		IV	N	.	227	.	.	4.665	230	.	229	5.351	
			%	.	4,2	.	.	87,2	4,3	.	4,3	100,0	
		V	N	.	198	.	.	4.673	687	.	.	5.558	
			%	.	3,6	.	.	84,1	12,4	.	.	100,0	
		45-64	Total	N	688	528	956	670	27.344	3.067	213	.	33.466
			%		2,1	1,6	2,9	2,0	81,7	9,2	0,6	.	100,0
			I	N	.	.	83	.	1.719	144	.	.	1.946
				%	.	.	4,3	.	88,3	7,4	.	.	100,0
			II	N	1.434	553	.	.	1.987
				%	72,2	27,8	.	.	100,0
		III	N	285	148	119	117	6.282	731	.	.	7.682	
			%	3,7	1,9	1,5	1,5	81,8	9,5	.	.	100,0	
		IV	N	148	230	477	214	11.348	653	.	.	13.071	
			%	1,1	1,8	3,7	1,6	86,8	5,0	.	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total	
Mujeres	45-64	V	N	255	150	276	339	6.559	986	213	.	8.780
			%	2,9	1,7	3,1	3,9	74,7	11,2	2,4	.	100,0
	65-74	Total	N	225	104	867	667	14.404	.	.	.	16.267
			%	1,4	0,6	5,3	4,1	88,5	.	.	.	100,0
		I	N	809	.	.	.	809
			%	100,0	.	.	.	100,0
		II	N	.	.	.	114	765	.	.	.	878
			%	.	.	.	12,9	87,1	.	.	.	100,0
		III	N	.	.	387	156	1.755	.	.	.	2.298
			%	.	.	16,9	6,8	76,4	.	.	.	100,0
		IV	N	117	104	263	271	7.714	.	.	.	8.469
			%	1,4	1,2	3,1	3,2	91,1	.	.	.	100,0
		V	N	108	.	217	126	3.361	.	.	.	3.812
			%	2,8	.	5,7	3,3	88,2	.	.	.	100,0
	>=75	Total	N	.	728	2.626	1.490	45.220	412	.	.	50.476
			%	.	1,4	5,2	3,0	89,6	0,8	.	.	100,0
		I	N	.	.	.	267	1.530	.	.	.	1.797
			%	.	.	.	14,9	85,1	.	.	.	100,0
		II	N	.	.	196	171	3.183	.	.	.	3.550
			%	.	.	5,5	4,8	89,7	.	.	.	100,0
		III	N	.	.	487	156	11.323	170	.	.	12.136
			%	.	.	4,0	1,3	93,3	1,4	.	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Mujeres	>=75	IV	N	.	728	998	797	19.136	154	.	.	21.813
			%	.	3,3	4,6	3,7	87,7	0,7	.	.	100,0
	V	N	.	.	945	99	10.048	88	.	.	11.179	
		%	.	.	8,5	0,9	89,9	0,8	.	.	100,0	
Ambos	Total	Total	N	5.515	6.434	5.123	4.960	175.961	12.608	392	473	211.465
			%	2,6	3,0	2,4	2,3	83,2	6,0	0,2	0,2	100,0
	I	N	.	466	83	646	9.319	779	.	.	11.293	
		%	.	4,1	0,7	5,7	82,5	6,9	.	.	100,0	
	II	N	110	.	196	494	12.538	1.280	.	.	14.618	
		%	0,8	.	1,3	3,4	85,8	8,8	.	.	100,0	
	III	N	928	948	1.092	974	36.547	2.154	.	.	42.644	
		%	2,2	2,2	2,6	2,3	85,7	5,1	.	.	100,0	
	IV	N	3.536	4.134	2.158	2.046	80.877	5.709	179	473	99.111	
		%	3,6	4,2	2,2	2,1	81,6	5,8	0,2	0,5	100,0	
	V	N	941	885	1.594	800	36.680	2.686	213	.	43.799	
		%	2,1	2,0	3,6	1,8	83,7	6,1	0,5	.	100,0	
	0-14	Total	N	.	.	.	197	6.308	.	.	.	6.505
			%	.	.	.	3,0	97,0	.	.	.	100,0
I		N	328	.	.	.	328	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
II		N	605	.	.	.	605	
		%	100,0	.	.	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total	
Ambos	0-14	III	N	2.213	.	.	.	2.213	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
		IV	N	.	.	.	197	2.398	.	.	.	2.595	
			%	.	.	.	7,6	92,4	.	.	.	100,0	
		V	N	764	.	.	.	764	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
	15-24	Total	N	.	138	.	236	2.465	.	.	.	2.840	
			%	.	4,9	.	8,3	86,8	.	.	.	100,0	
			II	N	134	.	.	.	134
				%	100,0	.	.	.	100,0
			III	N	795	.	.	.	795
				%	100,0	.	.	.	100,0
		IV	N	.	138	.	.	982	.	.	.	1.120	
			%	.	12,4	.	.	87,6	.	.	.	100,0	
		V	N	.	.	.	236	554	.	.	.	791	
			%	.	.	.	29,9	70,1	.	.	.	100,0	
25-44		Total	N	1.327	2.783	.	380	27.079	2.888	179	229	34.865	
			%	3,8	8,0	.	1,1	77,7	8,3	0,5	0,7	100,0	
		I	N	.	122	.	.	1.920	.	.	.	2.043	
			%	.	6,0	.	.	94,0	.	.	.	100,0	
		II	N	.	.	.	209	2.517	254	.	.	2.980	
			%	.	.	.	7,0	84,5	8,5	.	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Ambos	25-44	III	N	535	583	.	.	3.258	956	.	.	5.332
			%	10,0	10,9	.	.	61,1	17,9	.	.	100,0
		IV	N	792	1.518	.	171	10.455	773	179	229	14.117
			%	5,6	10,8	.	1,2	74,1	5,5	1,3	1,6	100,0
		V	N	.	560	.	.	8.928	904	.	.	10.392
			%	.	5,4	.	.	85,9	8,7	.	.	100,0
	45-64	Total	N	2.630	2.257	1.112	1.318	51.816	7.541	213	.	66.886
			%	3,9	3,4	1,7	2,0	77,5	11,3	0,3	.	100,0
		I	N	.	344	83	271	3.365	667	.	.	4.730
			%	.	7,3	1,8	5,7	71,1	14,1	.	.	100,0
		II	N	2.923	1.026	.	.	3.948
			%	74,0	26,0	.	.	100,0
III		N	285	366	119	207	10.036	911	.	.	11.923	
		%	2,4	3,1	1,0	1,7	84,2	7,6	.	.	100,0	
IV		N	1.620	1.222	477	500	24.684	3.420	.	.	31.925	
		%	5,1	3,8	1,5	1,6	77,3	10,7	.	.	100,0	
V		N	725	325	432	339	10.809	1.516	213	.	14.360	
		%	5,0	2,3	3,0	2,4	75,3	10,6	1,5	.	100,0	
65-74	Total	N	1.133	350	867	1.025	26.788	963	.	.	31.126	
		%	3,6	1,1	2,8	3,3	86,1	3,1	.	.	100,0	
	I	N	1.917	112	.	.	2.029	
		%	94,5	5,5	.	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Ambos	65-74	II	N	110	.	.	114	1.790	.	.	.	2.014
			%	5,5	.	.	5,6	88,9	.	.	.	100,0
		III	N	108	.	387	406	4.815	117	.	.	5.833
			%	1,9	.	6,6	7,0	82,5	2,0	.	.	100,0
		IV	N	698	350	263	379	13.950	735	.	.	16.376
			%	4,3	2,1	1,6	2,3	85,2	4,5	.	.	100,0
		V	N	216	.	217	126	4.315	.	.	.	4.874
			%	4,4	.	4,4	2,6	88,5	.	.	.	100,0
	>=75	Total	N	426	905	3.144	1.803	61.505	1.216	.	244	69.244
			%	0,6	1,3	4,5	2,6	88,8	1,8	.	0,4	100,0
		I	N	.	.	.	374	1.789	.	.	.	2.163
			%	.	.	.	17,3	82,7	.	.	.	100,0
		II	N	.	.	196	171	4.569	.	.	.	4.936
			%	.	.	4,0	3,5	92,6	.	.	.	100,0
		III	N	.	.	586	362	15.430	170	.	.	16.547
			%	.	.	3,5	2,2	93,2	1,0	.	.	100,0
		IV	N	426	905	1.418	797	28.407	781	.	244	32.979
			%	1,3	2,7	4,3	2,4	86,1	2,4	.	0,7	100,0
		V	N	.	.	945	99	11.310	265	.	.	12.619
			%	.	.	7,5	0,8	89,6	2,1	.	.	100,0

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Hombres	Total	N	4.601	4.143	674	1.924	69.918	7.686	179	244	89.370
		%	5,1	4,6	0,8	2,2	78,2	8,6	0,2	0,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.874	1.113	482	690	32.310	3.031	.	.	39.500
		%	4,7	2,8	1,2	1,7	81,8	7,7	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.331	676	98	236	15.919	1.689	.	244	20.194
		%	6,6	3,3	0,5	1,2	78,8	8,4	.	1,2	100,0
	Secundaria, superior	N	1.175	2.137	94	476	15.170	2.509	179	.	21.740
		%	5,4	9,8	0,4	2,2	69,8	11,5	0,8	.	100,0
	Terciaria	N	221	218	.	522	6.520	456	.	.	7.936
		%	2,8	2,7	.	6,6	82,2	5,8	.	.	100,0
0-14	Total	N	.	.	.	197	1.830	.	.	.	2.028
		%	.	.	.	9,7	90,3	.	.	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	.	.	197	1.699	.	.	.	1.897
		%	.	.	.	10,4	89,6	.	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	131	.	.	.	131
		%	100,0	.	.	.	100,0
15-24	Total	N	.	.	.	236	802	.	.	.	1.038
		%	.	.	.	22,7	77,3	.	.	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	253	.	.	.	253
		%	100,0	.	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	.	.	236	550	.	.	.	786
		%	.	.	.	30,1	69,9	.	.	.	100,0
25-44	Total	N	1.327	1.991	.	171	14.047	1.445	179	.	19.160

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

		Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Hombres 25-44 Total	%	6,9	10,4	.	0,9	73,3	7,5	0,9	.	100,0
Sin estudios, primaria	N	568	233	.	.	5.523	162	.	.	6.485
	%	8,8	3,6	.	.	85,2	2,5	.	.	100,0
Secundaria, inferior	N	204	338	.	.	2.857	500	.	.	3.899
	%	5,2	8,7	.	.	73,3	12,8	.	.	100,0
Secundaria, superior	N	334	1.420	.	171	3.092	783	179	.	5.980
	%	5,6	23,7	.	2,9	51,7	13,1	3,0	.	100,0
Terciaria	N	221	.	.	.	2.576	.	.	.	2.796
	%	7,9	.	.	.	92,1	.	.	.	100,0
45-64 Total	N	1.942	1.729	156	647	24.569	4.474	.	.	33.517
	%	5,8	5,2	0,5	1,9	73,3	13,3	.	.	100,0
Sin estudios, primaria	N	741	563	156	286	8.910	1.743	.	.	12.399
	%	6,0	4,5	1,3	2,3	71,9	14,1	.	.	100,0
Secundaria, inferior	N	583	231	.	.	6.891	910	.	.	8.614
	%	6,8	2,7	.	.	80,0	10,6	.	.	100,0
Secundaria, superior	N	617	718	.	90	7.193	1.365	.	.	9.983
	%	6,2	7,2	.	0,9	72,1	13,7	.	.	100,0
Terciaria	N	.	218	.	271	1.575	456	.	.	2.520
	%	.	8,6	.	10,8	62,5	18,1	.	.	100,0
65-74 Total	N	907	246	.	358	12.384	963	.	.	14.859
	%	6,1	1,7	.	2,4	83,3	6,5	.	.	100,0
Sin estudios, primaria	N	283	139	.	108	4.923	493	.	.	5.945
	%	4,8	2,3	.	1,8	82,8	8,3	.	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total		
Hombres	65-74	Secundaria, inferior	N	401	107	.	.	3.233	110	.	.	3.851	
			%	10,4	2,8	.	.	84,0	2,9	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	224	.	.	.	2.711	361	.	.	3.295	
			%	6,8	.	.	.	82,3	10,9	.	.	100,0	
		Terciaria	N	.	.	.	250	1.517	.	.	.	1.767	
			%	.	.	.	14,2	85,8	.	.	.	100,0	
	>=75	Total	N	426	177	518	313	16.285	804	.	244	18.768	
			%	2,3	0,9	2,8	1,7	86,8	4,3	.	1,3	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	282	177	326	99	11.003	634	.	.	12.522
				%	2,3	1,4	2,6	0,8	87,9	5,1	.	.	100,0
			Secundaria, inferior	N	144	.	98	.	2.256	170	.	244	2.913
				%	4,9	.	3,4	.	77,5	5,8	.	8,4	100,0
		Secundaria, superior	N	.	.	94	215	2.174	.	.	.	2.482	
			%	.	.	3,8	8,6	87,6	.	.	.	100,0	
		Terciaria	N	852	.	.	.	852	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
Mujeres		Total	Total	N	914	2.291	4.449	3.036	103.194	4.922	213	229	119.247
				%	0,8	1,9	3,7	2,5	86,5	4,1	0,2	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	373	517	2.595	1.304	57.976	1.270	.	.	64.035	
			%	0,6	0,8	4,1	2,0	90,5	2,0	.	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	255	518	842	874	20.268	1.099	213	.	24.070	
			%	1,1	2,2	3,5	3,6	84,2	4,6	0,9	.	100,0	

(continuación)

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Mujeres	Total	Secundaria, superior	N	285	995	419	494	18.359	2.065	.	229	22.845
			%	1,2	4,4	1,8	2,2	80,4	9,0	.	1,0	100,0
		Terciaria	N	.	261	592	364	6.590	489	.	.	8.296
			%	.	3,1	7,1	4,4	79,4	5,9	.	.	100,0
0-14	Total		N	774	.	.	.	774
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	610	.	.	.	610
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	164	.	.	.	164
			%	100,0	.	.	.	100,0
15-24	Total		N	.	138	.	.	1.663	.	.	.	1.801
			%	.	7,7	.	.	92,3	.	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.265	.	.	.	1.265
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	398	.	.	.	398
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	138	138
			%	.	100,0	100,0
25-44	Total		N	.	792	.	209	13.032	1.443	.	229	15.704
			%	.	5,0	.	1,3	83,0	9,2	.	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.038	.	.	.	3.038
			%	100,0	.	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Mujeres	25-44	Secundaria, inferior	N	3.129	275	.	.	3.404
			%	91,9	8,1	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	.	670	.	.	5.369	1.168	.	229	7.435
			%	.	9,0	.	.	72,2	15,7	.	3,1	100,0
		Terciaria	N	.	122	.	209	1.496	.	.	.	1.827
			%	.	6,7	.	11,4	81,9	.	.	.	100,0
	45-64	Total	N	688	528	956	670	27.666	3.067	213	.	33.789
			%	2,0	1,6	2,8	2,0	81,9	9,1	0,6	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	148	150	352	352	9.694	858	.	.	11.554
			%	1,3	1,3	3,1	3,0	83,9	7,4	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	255	263	118	106	6.524	824	213	.	8.304
			%	3,1	3,2	1,4	1,3	78,6	9,9	2,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N	285	115	284	212	8.558	897	.	.	10.350
			%	2,8	1,1	2,7	2,1	82,7	8,7	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	.	202	.	2.889	489	.	.	3.580
			%	.	.	5,6	.	80,7	13,6	.	.	100,0
	65-74	Total	N	225	104	867	667	14.404	.	.	.	16.267
			%	1,4	0,6	5,3	4,1	88,5	.	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	225	.	590	254	9.999	.	.	.	11.069
			%	2,0	.	5,3	2,3	90,3	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	104	106	299	2.226	.	.	.	2.735
			%	.	3,8	3,9	10,9	81,4	.	.	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total	
Mujeres	65-74	Secundaria, superior	N	.	.	.	114	1.423	.	.	.	1.537	
			%	.	.	.	7,4	92,6	.	.	.	100,0	
		Terciaria	N	.	.	170	.	755	.	.	.	925	
	%		.	.	18,4	.	81,6	.	.	.	100,0		
	>=75	Total	N	.	728	2.626	1.490	45.655	412	.	.	.	50.912
			%	.	1,4	5,2	2,9	89,7	0,8	.	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	367	1.652	697	33.370	412	.	.	.	36.499
	%		.	1,0	4,5	1,9	91,4	1,1	.	.	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	151	619	469	7.827	9.066
	%		.	1,7	6,8	5,2	86,3	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	210	135	168	3.009	3.522
	%		.	6,0	3,8	4,8	85,4	100,0	
		Terciaria	N	.	.	220	156	1.450	1.825
	%		.	.	12,0	8,5	79,4	100,0	
Ambos	Total	Total	N	5.515	6.434	5.123	4.960	173.112	12.608	392	473	208.617	
			%	2,6	3,1	2,5	2,4	83,0	6,0	0,2	0,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.247	1.630	3.077	1.994	90.286	4.300	.	.	103.535	
	%		2,2	1,6	3,0	1,9	87,2	4,2	.	.	100,0		
		Secundaria, inferior	N	1.587	1.194	941	1.110	36.187	2.788	213	244	44.264	
	%		3,6	2,7	2,1	2,5	81,8	6,3	0,5	0,6	100,0		
		Secundaria, superior	N	1.460	3.132	512	969	33.529	4.574	179	229	44.585	
	%		3,3	7,0	1,1	2,2	75,2	10,3	0,4	0,5	100,0		
		Terciaria	N	221	478	592	886	13.110	945	.	.	16.232	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Ambos	Total	Terciaria	%	1,4	2,9	3,6	5,5	80,8	5,8	.	.	100,0
	0-14	Total	N	.	.	.	197	2.604	.	.	.	2.802
			%	.	.	.	7,0	93,0	.	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	.	197	2.310	.	.	.	2.507
			%	.	.	.	7,9	92,1	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	295	.	.	.	295
			%	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	Total	N	.	138	.	236	2.465	.	.	.	2.840
			%	.	4,9	.	8,3	86,8	.	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.517	.	.	.	1.517
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	.	236	948	.	.	.	1.184
			%	.	.	.	19,9	80,1	.	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	138	138
			%	.	100,0	100,0
	25-44	Total	N	1.327	2.783	.	380	27.079	2.888	179	229	34.865
			%	3,8	8,0	.	1,1	77,7	8,3	0,5	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	568	233	.	.	8.560	162	.	.	9.523
			%	6,0	2,4	.	.	89,9	1,7	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	204	338	.	.	5.986	775	.	.	7.303
			%	2,8	4,6	.	.	82,0	10,6	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	334	2.089	.	171	8.461	1.951	179	229	13.415
			%	2,5	15,6	.	1,3	63,1	14,5	1,3	1,7	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Ambos	25-44	Terciaria	N	221	122	.	209	4.072	.	.	.	4.624
			%	4,8	2,6	.	4,5	88,1	.	.	.	100,0
	45-64	Total	N	2.630	2.257	1.112	1.318	52.235	7.541	213	.	67.305
			%	3,9	3,4	1,7	2,0	77,6	11,2	0,3	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	890	713	508	638	18.604	2.600	.	.	23.953
			%	3,7	3,0	2,1	2,7	77,7	10,9	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	838	494	118	106	13.416	1.734	213	.	16.918
			%	5,0	2,9	0,7	0,6	79,3	10,2	1,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N	902	833	284	302	15.751	2.262	.	.	20.334
			%	4,4	4,1	1,4	1,5	77,5	11,1	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	218	202	271	4.464	945	.	.	6.100
			%	.	3,6	3,3	4,4	73,2	15,5	.	.	100,0
	65-74	Total	N	1.133	350	867	1.025	26.788	963	.	.	31.126
			%	3,6	1,1	2,8	3,3	86,1	3,1	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	508	139	590	362	14.922	493	.	.	17.015
			%	3,0	0,8	3,5	2,1	87,7	2,9	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	401	211	106	299	5.460	110	.	.	6.586
			%	6,1	3,2	1,6	4,5	82,9	1,7	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	224	.	.	114	4.134	361	.	.	4.832
			%	4,6	.	.	2,4	85,6	7,5	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	.	170	250	2.272	.	.	.	2.693
			%	.	.	6,3	9,3	84,4	.	.	.	100,0
	>=75	Total	N	426	905	3.144	1.803	61.941	1.216	.	244	69.680

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad derivada del trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Ambos	>=75	Total	%	0,6	1,3	4,5	2,6	88,9	1,7	.	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	282	544	1.978	796	44.373	1.046	.	.	49.020
			%	0,6	1,1	4,0	1,6	90,5	2,1	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	144	151	717	469	10.083	170	.	244	11.978
			%	1,2	1,3	6,0	3,9	84,2	1,4	.	2,0	100,0
		Secundaria, superior	N	.	210	229	382	5.182	.	.	.	6.004
			%	.	3,5	3,8	6,4	86,3	.	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	.	220	156	2.302	.	.	.	2.677
			%	.	.	8,2	5,8	86,0	.	.	.	100,0

Tabla 53. Proporción (%) de personas de 70 y más años que necesitan ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	11,5	8,4	12,6	11,7
	70-74	5,9	4,2	9,0	4,7
	75-79	9,0	15,4	7,0	8,8
	80-84	13,8	5,5	13,6	16,4
	85 y más	26,1	11,0	31,1	26,7
Mujeres	Total	19,9	12,1	19,8	21,7
	70-74	5,8	1,7	4,5	7,5
	75-79	12,6	2,5	12,7	14,7
	80-84	19,8	16,1	19,3	20,8
	85 y más	44,5	30,7	45,9	46,7
Ambos sexos	Total	16,6	10,5	17,0	17,7
	70-74	5,9	3,0	6,5	6,2
	75-79	11,1	7,5	10,4	12,2
	80-84	17,4	10,9	17,1	19,1
	85 y más	39,2	25,0	41,7	40,9

Tabla 54. Proporción (%) de personas de 70 y más años que necesitan ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	11,6	3,9	12,4	10,6	12,5	13,6
	70-74	5,9	2,9	4,0	6,2	6,6	7,4
	75-79	9,0	4,2	25,5	10,8	7,1	8,3
	80-84	13,8	8,4	13,5	8,8	16,3	11,0
	85 y más	26,5	0,0	0,0	20,6	30,2	36,8
Mujeres	Total	19,9	16,4	21,0	23,1	17,6	22,1
	70-74	5,9	6,4	3,4	3,0	6,2	8,9
	75-79	12,6	12,6	3,7	15,7	11,1	16,1
	80-84	19,8	18,2	41,7	17,5	17,1	21,3
	85 y más	44,4	33,2	46,7	55,9	39,2	44,7
Ambos sexos	Total	16,6	9,9	17,8	18,0	15,3	20,6
	70-74	5,9	4,1	3,7	4,4	6,4	8,6
	75-79	11,1	8,0	11,5	13,5	9,3	14,2
	80-84	17,4	14,1	29,7	13,7	16,7	20,0
	85 y más	39,2	26,8	38,0	45,3	36,0	43,5

Tabla 55. Proporción (%) de personas de 70 y más años que necesitan ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	Terciaria
Hombres	Total	11,5	13,9	7,7	9,6	6,5
	70-74	5,9	8,4	3,4	1,5	6,9
	75-79	9,0	10,6	4,1	9,0	5,9
	80-84	13,8	14,3	7,8	24,0	8,5
	85 y más	26,1	29,5	26,5	18,0	0,0
Mujeres	Total	19,9	20,4	20,9	17,3	13,7
	70-74	5,8	7,3	4,9	2,7	0,0
	75-79	12,6	10,7	17,4	17,3	15,0
	80-84	19,8	18,7	26,5	18,9	8,1
	85 y más	44,5	46,9	38,1	38,8	40,4
Ambos sexos	Total	16,6	18,1	15,9	13,1	9,6
	70-74	5,9	7,7	4,2	1,9	4,3
	75-79	11,1	10,7	12,1	13,0	10,1
	80-84	17,4	17,1	19,3	21,9	8,4
	85 y más	39,2	42,1	35,0	30,1	27,2

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 56. Proporción (%) de personas de 70 y más años que necesitan ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	3,7	2,1	5,4	3,2
	70-74	1,4	2,9	2,0	0,7
	75-79	3,2	2,6	4,0	2,8
	80-84	6,9	0,0	9,1	8,1
	85 y más	6,0	4,1	12,6	3,0
Mujeres	Total	9,5	6,8	8,4	10,8
	70-74	2,8	1,7	2,3	3,3
	75-79	9,1	5,5	8,5	10,3
	80-84	12,0	15,1	8,1	13,6
	85 y más	18,8	6,8	20,3	21,5
Ambos sexos	Total	7,1	4,8	7,2	7,6
	70-74	2,1	2,3	2,1	2,1
	75-79	6,6	4,5	6,6	7,0
	80-84	9,9	7,3	8,5	11,4
	85 y más	14,3	5,8	17,7	14,7

Tabla 57. Proporción (%) de personas de 70 y más años que necesitan ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	3,8	1,8	6,8	6,4	2,8	2,6
	70-74	1,4	0,0	0,0	3,5	1,3	0,0
	75-79	3,2	0,0	6,3	3,8	3,1	3,0
	80-84	6,9	13,8	7,8	15,4	2,8	6,6
	85 y más	6,1	0,0	31,5	2,9	6,4	0,0
Mujeres	Total	9,4	10,0	8,1	9,8	9,6	9,1
	70-74	2,8	3,7	3,5	2,9	2,2	3,5
	75-79	8,9	5,4	6,5	10,0	8,2	10,9
	80-84	12,0	0,0	18,6	19,0	10,0	11,2
	85 y más	18,9	40,4	11,8	9,9	24,2	10,5
Ambos sexos	Total	7,0	5,5	7,6	8,3	6,4	7,8
	70-74	2,1	1,2	1,9	3,1	1,7	2,8
	75-79	6,4	2,4	6,4	7,2	5,8	8,8
	80-84	9,9	6,1	13,3	17,3	6,5	10,6
	85 y más	14,4	29,8	17,7	6,9	17,4	8,6

Tabla 58. Proporción (%) de personas de 70 y más años que necesitan ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	3,7	4,3	4,6	1,5	2,5
	70-74	1,4	2,1	2,1	0,0	0,0
	75-79	3,2	3,6	1,8	2,0	4,0
	80-84	6,9	6,1	9,7	6,4	7,2
	85 y más	6,0	7,1	9,6	0,0	0,0
Mujeres	Total	9,5	10,1	8,7	6,9	8,2
	70-74	2,8	3,5	1,9	0,0	3,4
	75-79	9,1	8,9	9,4	9,6	9,5
	80-84	12,0	12,8	7,3	15,4	12,0
	85 y más	18,8	19,0	22,2	10,7	15,8
Ambos sexos	Total	7,1	7,9	7,0	3,9	4,9
	70-74	2,1	2,9	2,0	0,0	1,3
	75-79	6,6	6,9	6,1	5,5	6,4
	80-84	9,9	10,3	8,4	10,4	8,9
	85 y más	14,3	15,0	18,2	5,5	8,7

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 59. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Hombres	Total	CAPV	N	8.347	19.838	2.489	7.809	1.029.555	1.068.037
			%	0,8	1,9	0,2	0,7	96,4	100,0
		Araba	N	1.122	2.317	401	1.038	150.018	154.896
			%	0,7	1,5	0,3	0,7	96,9	100,0
		Gipuzkoa	N	2.586	8.237	896	2.802	332.301	346.823
			%	0,7	2,4	0,3	0,8	95,8	100,0
		Bizkaia	N	4.638	9.284	1.191	3.970	547.236	566.318
			%	0,8	1,6	0,2	0,7	96,6	100,0
	0-14	CAPV	N	1.113	4.009	277	621	147.435	153.456
			%	0,7	2,6	0,2	0,4	96,1	100,0
		Araba	N	111	371	.	.	21.693	22.176
			%	0,5	1,7	.	.	97,8	100,0
		Gipuzkoa	N	198	2.292	.	.	49.535	52.024
			%	0,4	4,4	.	.	95,2	100,0
		Bizkaia	N	804	1.346	277	621	76.207	79.256
			%	1,0	1,7	0,3	0,8	96,2	100,0
	15-24	CAPV	N	124	236	.	.	94.098	94.458
			%	0,1	0,3	.	.	99,6	100,0
		Araba	N	14.247	14.247
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	124	.	.	.	31.021	31.146
			%	0,4	.	.	.	99,6	100,0
		Bizkaia	N	.	236	.	.	48.830	49.066
			%	.	0,5	.	.	99,5	100,0
	25-44	CAPV	N	1.113	2.722	340	373	331.761	336.309
			%	0,3	0,8	0,1	0,1	98,6	100,0
		Araba	N	185	803	137	150	49.415	50.690
			%	0,4	1,6	0,3	0,3	97,5	100,0
		Gipuzkoa	N	593	460	203	223	105.889	107.367
			%	0,6	0,4	0,2	0,2	98,6	100,0
		Bizkaia	N	336	1.459	.	.	176.457	178.252
			%	0,2	0,8	.	.	99,0	100,0

(continuación)

Tabla 59. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Hombres	45-64	CAPV	N	178	2.765	362	2.850	296.099	302.253
			%	0,1	0,9	0,1	0,9	98,0	100,0
		Araba	N	.	200	89	551	42.369	43.210
			%	.	0,5	0,2	1,3	98,1	100,0
		Gipuzkoa	N	.	963	272	1.364	95.097	97.697
			%	.	1,0	0,3	1,4	97,3	100,0
	Bizkaia	N	178	1.601	.	935	158.633	161.347	
		%	0,1	1,0	.	0,6	98,3	100,0	
	65-74	CAPV	N	1.314	2.419	411	1.150	90.300	95.593
			%	1,4	2,5	0,4	1,2	94,5	100,0
		Araba	N	155	445	.	74	12.694	13.368
			%	1,2	3,3	.	0,6	95,0	100,0
		Gipuzkoa	N	613	1.305	121	290	29.830	32.159
			%	1,9	4,1	0,4	0,9	92,8	100,0
	Bizkaia	N	546	669	289	786	47.776	50.066	
		%	1,1	1,3	0,6	1,6	95,4	100,0	
	>=75	CAPV	N	4.505	7.687	1.099	2.815	69.861	85.968
			%	5,2	8,9	1,3	3,3	81,3	100,0
		Araba	N	671	497	175	263	9.599	11.206
			%	6,0	4,4	1,6	2,3	85,7	100,0
		Gipuzkoa	N	1.059	3.218	299	924	20.930	26.430
			%	4,0	12,2	1,1	3,5	79,2	100,0
	Bizkaia	N	2.774	3.972	625	1.628	39.333	48.332	
		%	5,7	8,2	1,3	3,4	81,4	100,0	
Mujeres	Total	CAPV	N	15.410	34.238	11.071	16.732	1.043.953	1.121.405
			%	1,4	3,1	1,0	1,5	93,1	100,0
	Araba	N	851	3.695	565	2.021	149.890	157.021	
		%	0,5	2,4	0,4	1,3	95,5	100,0	
	Gipuzkoa	N	4.830	12.562	2.771	4.478	336.198	360.839	
		%	1,3	3,5	0,8	1,2	93,2	100,0	
	Bizkaia	N	9.730	17.982	7.735	10.233	557.865	603.545	
		%	1,6	3,0	1,3	1,7	92,4	100,0	

(continuación)

Tabla 59. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Mujeres	0-14	CAPV	N	230	3.590	.	620	141.169	145.610
			%	0,2	2,5	.	0,4	97,0	100,0
		Araba	N	.	304	.	139	20.479	20.921
			%	.	1,5	.	0,7	97,9	100,0
		Gipuzkoa	N	230	1.975	.	.	47.476	49.682
			%	0,5	4,0	.	.	95,6	100,0
		Bizkaia	N	.	1.311	.	482	73.215	75.007
			%	.	1,7	.	0,6	97,6	100,0
	15-24	CAPV	N	134	.	.	352	89.013	89.499
			%	0,1	.	.	0,4	99,5	100,0
		Araba	N	12.995	12.995
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	134	.	.	142	29.094	29.369
			%	0,5	.	.	0,5	99,1	100,0
		Bizkaia	N	.	.	.	211	46.924	47.134
			%	.	.	.	0,4	99,6	100,0
	25-44	CAPV	N	488	1.604	883	2.421	315.430	320.826
			%	0,2	0,5	0,3	0,8	98,3	100,0
		Araba	N	.	184	311	555	46.698	47.748
			%	.	0,4	0,7	1,2	97,8	100,0
		Gipuzkoa	N	.	629	.	898	99.142	100.669
			%	.	0,6	.	0,9	98,5	100,0
		Bizkaia	N	488	791	571	968	169.590	172.408
			%	0,3	0,5	0,3	0,6	98,4	100,0
	45-64	CAPV	N	1.297	2.905	967	3.234	305.366	313.769
			%	0,4	0,9	0,3	1,0	97,3	100,0
		Araba	N	.	245	.	272	43.181	43.698
			%	.	0,6	.	0,6	98,8	100,0
		Gipuzkoa	N	77	1.262	268	1.218	97.277	100.102
			%	0,1	1,3	0,3	1,2	97,2	100,0
		Bizkaia	N	1.220	1.398	699	1.744	164.908	169.969
			%	0,7	0,8	0,4	1,0	97,0	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 59. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Mujeres	65-74	CAPV	N	1.234	3.870	1.472	1.289	102.061	109.925
			%	1,1	3,5	1,3	1,2	92,8	100,0
		Araba	N	161	396	165	.	13.736	14.458
			%	1,1	2,7	1,1	.	95,0	100,0
		Gipuzkoa	N	222	1.166	410	212	33.971	35.981
			%	0,6	3,2	1,1	0,6	94,4	100,0
	Bizkaia	N	851	2.307	896	1.077	54.354	59.485	
		%	1,4	3,9	1,5	1,8	91,4	100,0	
	>=75	CAPV	N	12.026	22.271	7.750	8.815	90.915	141.777
			%	8,5	15,7	5,5	6,2	64,1	100,0
		Araba	N	690	2.566	88	1.056	12.801	17.200
			%	4,0	14,9	0,5	6,1	74,4	100,0
Gipuzkoa		N	4.166	7.530	2.093	2.007	29.239	45.036	
		%	9,3	16,7	4,6	4,5	64,9	100,0	
Bizkaia	N	7.170	12.175	5.569	5.752	48.875	79.541		
	%	9,0	15,3	7,0	7,2	61,4	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	23.757	54.076	13.560	24.542	2.073.508	2.189.442
			%	1,1	2,5	0,6	1,1	94,7	100,0
	Araba	N	1.973	6.011	966	3.059	299.908	311.917	
		%	0,6	1,9	0,3	1,0	96,1	100,0	
	Gipuzkoa	N	7.416	20.799	3.667	7.280	668.499	707.661	
		%	1,0	2,9	0,5	1,0	94,5	100,0	
	Bizkaia	N	14.368	27.266	8.927	14.203	1.105.101	1.169.864	
		%	1,2	2,3	0,8	1,2	94,5	100,0	
	0-14	CAPV	N	1.343	7.599	277	1.242	288.605	299.066
			%	0,4	2,5	0,1	0,4	96,5	100,0
		Araba	N	111	675	.	139	42.172	43.097
			%	0,3	1,6	.	0,3	97,9	100,0
		Gipuzkoa	N	428	4.267	.	.	97.011	101.706
			%	0,4	4,2	.	.	95,4	100,0
	Bizkaia	N	804	2.657	277	1.103	149.422	154.263	
		%	0,5	1,7	0,2	0,7	96,9	100,0	

(continuación)

Tabla 59. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Ambos	15-24	CAPV	N	258	236	.	352	183.111	183.958
			%	0,1	0,1	.	0,2	99,5	100,0
		Araba	N	27.242	27.242
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	258	.	.	142	60.115	60.515
			%	0,4	.	.	0,2	99,3	100,0
		Bizkaia	N	.	236	.	211	95.753	96.200
			%	.	0,2	.	0,2	99,5	100,0
	25-44	CAPV	N	1.602	4.325	1.223	2.794	647.191	657.135
			%	0,2	0,7	0,2	0,4	98,5	100,0
		Araba	N	185	987	448	705	96.114	98.439
			%	0,2	1,0	0,5	0,7	97,6	100,0
		Gipuzkoa	N	593	1.089	203	1.121	205.030	208.036
			%	0,3	0,5	0,1	0,5	98,6	100,0
		Bizkaia	N	824	2.249	571	968	346.047	350.660
			%	0,2	0,6	0,2	0,3	98,7	100,0
	45-64	CAPV	N	1.475	5.669	1.329	6.084	601.465	616.022
			%	0,2	0,9	0,2	1,0	97,6	100,0
		Araba	N	.	445	89	823	85.551	86.908
			%	.	0,5	0,1	0,9	98,4	100,0
		Gipuzkoa	N	77	2.225	540	2.583	192.374	197.798
			%	0,0	1,1	0,3	1,3	97,3	100,0
		Bizkaia	N	1.398	3.000	699	2.678	323.540	331.316
			%	0,4	0,9	0,2	0,8	97,7	100,0
	65-74	CAPV	N	2.548	6.288	1.882	2.439	192.361	205.518
			%	1,2	3,1	0,9	1,2	93,6	100,0
		Araba	N	317	841	165	74	26.430	27.826
			%	1,1	3,0	0,6	0,3	95,0	100,0
		Gipuzkoa	N	835	2.471	531	502	63.801	68.140
			%	1,2	3,6	0,8	0,7	93,6	100,0
		Bizkaia	N	1.396	2.976	1.186	1.863	102.130	109.552
			%	1,3	2,7	1,1	1,7	93,2	100,0

(continuación)

Tabla 59. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Ambos	>=75	CAPV	N	16.531	29.958	8.849	11.631	160.776	227.744
			%	7,3	13,2	3,9	5,1	70,6	100,0
		Araba	N	1.361	3.063	263	1.319	22.399	28.406
			%	4,8	10,8	0,9	4,6	78,9	100,0
		Gipuzkoa	N	5.225	10.748	2.392	2.932	50.169	71.466
			%	7,3	15,0	3,3	4,1	70,2	100,0
		Bizkaia	N	9.945	16.147	6.193	7.380	88.208	127.873
			%	7,8	12,6	4,8	5,8	69,0	100,0

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Hombres	Total	Total	N 8.347	19.838	2.489	7.809	1.027.392	1.065.874
			% 0,8	1,9	0,2	0,7	96,4	100,0
	I	N	399	1.241	203	.	141.200	143.043
			% 0,3	0,9	0,1	.	98,7	100,0
	II	N	298	1.039	427	489	99.396	101.649
			% 0,3	1,0	0,4	0,5	97,8	100,0
	III	N	1.347	4.387	606	1.230	220.694	228.264
			% 0,6	1,9	0,3	0,5	96,7	100,0
	IV	N	4.923	10.635	1.252	4.436	482.285	503.532
			% 1,0	2,1	0,2	0,9	95,8	100,0
	V	N	1.379	2.535	.	1.654	83.817	89.386
			% 1,5	2,8	.	1,9	93,8	100,0
	0-14	Total	N 1.113	4.009	277	621	146.550	152.571
			% 0,7	2,6	0,2	0,4	96,1	100,0
	I	N	111	388	.	.	31.051	31.550
			% 0,4	1,2	.	.	98,4	100,0
	II	N	.	635	277	.	19.543	20.455
			% .	3,1	1,4	.	95,5	100,0
	III	N	279	920	.	.	40.895	42.094
			% 0,7	2,2	.	.	97,2	100,0
	IV	N	459	2.066	.	358	49.342	52.226
			% 0,9	4,0	.	0,7	94,5	100,0
	V	N	264	.	.	263	5.720	6.246
			% 4,2	.	.	4,2	91,6	100,0
	15-24	Total	N 124	236	.	.	93.450	93.810
			% 0,1	0,3	.	.	99,6	100,0
	I	N	15.209	15.209
			%	100,0	100,0
	II	N	12.260	12.260
			%	100,0	100,0
	III	N	17.521	17.521
			%	100,0	100,0

(continuación)

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Hombres 15-24	IV	N	124	.	.	.	40.425	40.549
		%	0,3	.	.	.	99,7	100,0
	V	N	.	236	.	.	8.034	8.270
		%	.	2,9	.	.	97,1	100,0
25-44	Total	N	1.113	2.722	340	373	331.576	336.124
		%	0,3	0,8	0,1	0,1	98,6	100,0
	I	N	185	228	203	.	42.343	42.959
		%	0,4	0,5	0,5	.	98,6	100,0
	II	N	32.220	32.220
		%	100,0	100,0
	III	N	.	601	.	150	61.964	62.714
		%	.	1,0	.	0,2	98,8	100,0
	IV	N	484	882	137	.	157.663	159.166
		%	0,3	0,6	0,1	.	99,1	100,0
	V	N	445	1.011	.	223	37.386	39.065
		%	1,1	2,6	.	0,6	95,7	100,0
45-64	Total	N	178	2.765	362	2.850	295.883	302.037
		%	0,1	0,9	0,1	0,9	98,0	100,0
	I	N	36.646	36.646
		%	100,0	100,0
	II	N	.	153	.	.	24.638	24.792
		%	.	0,6	.	.	99,4	100,0
	III	N	.	.	.	363	65.149	65.513
		%	.	.	.	0,6	99,4	100,0
	IV	N	178	1.788	362	1.821	148.159	152.308
		%	0,1	1,2	0,2	1,2	97,3	100,0
	V	N	.	823	.	665	21.290	22.779
		%	.	3,6	.	2,9	93,5	100,0
65-74	Total	N	1.314	2.419	411	1.150	90.300	95.593
		%	1,4	2,5	0,4	1,2	94,5	100,0
	I	N	.	257	.	.	12.203	12.460
		%	.	2,1	.	.	97,9	100,0

(continuación)

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total	
Hombres	65-74	II	N	.	.	150	111	6.928	7.189
			%	.	.	2,1	1,5	96,4	100,0
		III	N	580	732	139	.	19.055	20.506
			%	2,8	3,6	0,7	.	92,9	100,0
		IV	N	660	1.213	121	882	46.694	49.571
			%	1,3	2,4	0,2	1,8	94,2	100,0
		V	N	74	217	.	157	5.420	5.867
			%	1,3	3,7	.	2,7	92,4	100,0
	>=75	Total	N	4.505	7.687	1.099	2.815	69.633	85.739
			%	5,3	9,0	1,3	3,3	81,2	100,0
		I	N	103	368	.	.	3.748	4.219
			%	2,4	8,7	.	.	88,8	100,0
		II	N	298	251	.	378	3.806	4.733
			%	6,3	5,3	.	8,0	80,4	100,0
		III	N	489	2.135	467	717	16.110	19.917
			%	2,5	10,7	2,3	3,6	80,9	100,0
		IV	N	3.018	4.686	632	1.374	40.002	49.713
			%	6,1	9,4	1,3	2,8	80,5	100,0
	V	N	597	247	.	346	5.967	7.158	
		%	8,3	3,5	.	4,8	83,4	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	15.410	33.978	11.071	16.361	1.040.947	1.117.767
			%	1,4	3,0	1,0	1,5	93,1	100,0
		I	N	484	2.910	165	648	131.053	135.260
			%	0,4	2,2	0,1	0,5	96,9	100,0
		II	N	1.810	2.205	1.045	1.289	106.284	112.634
			%	1,6	2,0	0,9	1,1	94,4	100,0
		III	N	3.985	7.074	2.004	4.205	267.075	284.344
			%	1,4	2,5	0,7	1,5	93,9	100,0
		IV	N	6.311	13.717	4.441	5.210	382.437	412.117
			%	1,5	3,3	1,1	1,3	92,8	100,0
		V	N	2.820	8.072	3.415	5.008	154.097	173.412
			%	1,6	4,7	2,0	2,9	88,9	100,0

(continuación)

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total	
Mujeres	0-14	Total	N	230	3.590	.	620	140.499	144.940
			%	0,2	2,5	.	0,4	96,9	100,0
		I	N	.	1.196	.	245	30.609	32.050
			%	.	3,7	.	0,8	95,5	100,0
		II	N	230	408	.	.	18.447	19.085
			%	1,2	2,1	.	.	96,7	100,0
		III	N	.	946	.	139	41.506	42.591
			%	.	2,2	.	0,3	97,5	100,0
		IV	N	.	727	.	.	44.379	45.106
			%	.	1,6	.	.	98,4	100,0
		V	N	.	312	.	237	5.559	6.108
			%	.	5,1	.	3,9	91,0	100,0
	15-24	Total	N	134	.	.	352	88.224	88.710
			%	0,2	.	.	0,4	99,5	100,0
		I	N	14.848	14.848
			%	100,0	100,0
		II	N	134	.	.	.	11.686	11.820
			%	1,1	.	.	.	98,9	100,0
		III	N	22.699	22.699
			%	100,0	100,0
		IV	N	.	.	.	211	31.924	32.135
			%	.	.	.	0,7	99,3	100,0
		V	N	.	.	.	142	7.066	7.208
			%	.	.	.	2,0	98,0	100,0
	25-44	Total	N	488	1.604	883	2.421	315.014	320.409
			%	0,2	0,5	0,3	0,8	98,3	100,0
		I	N	.	.	.	122	45.604	45.726
			%	.	.	.	0,3	99,7	100,0
		II	N	.	535	.	244	36.947	37.726
			%	.	1,4	.	0,6	97,9	100,0
		III	N	.	210	.	594	77.045	77.849
			%	.	0,3	.	0,8	99,0	100,0

(continuación)

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total	
Mujeres	25-44	IV	N	488	184	311	586	112.842	114.412
			%	0,4	0,2	0,3	0,5	98,6	100,0
		V	N	.	675	571	875	42.576	44.697
			%	.	1,5	1,3	2,0	95,3	100,0
	45-64	Total	N	1.297	2.905	967	3.038	305.082	313.289
			%	0,4	0,9	0,3	1,0	97,4	100,0
		I	N	30.183	30.183
			%	100,0	100,0
		II	N	194	218	.	447	26.071	26.929
			%	0,7	0,8	.	1,7	96,8	100,0
		III	N	173	458	310	1.185	84.139	86.265
			%	0,2	0,5	0,4	1,4	97,5	100,0
		IV	N	548	1.181	241	673	104.582	107.225
			%	0,5	1,1	0,2	0,6	97,5	100,0
		V	N	383	1.047	416	733	60.108	62.687
			%	0,6	1,7	0,7	1,2	95,9	100,0
	65-74	Total	N	1.234	3.870	1.472	1.289	101.917	109.781
			%	1,1	3,5	1,3	1,2	92,8	100,0
		I	N	166	248	.	.	6.357	6.770
			%	2,4	3,7	.	.	93,9	100,0
		II	N	.	135	109	108	7.223	7.575
			%	.	1,8	1,4	1,4	95,4	100,0
		III	N	306	639	359	422	23.699	25.424
			%	1,2	2,5	1,4	1,7	93,2	100,0
		IV	N	762	1.566	768	408	45.621	49.125
			%	1,6	3,2	1,6	0,8	92,9	100,0
		V	N	.	1.282	236	351	19.018	20.887
			%	.	6,1	1,1	1,7	91,1	100,0
	>=75	Total	N	12.026	22.010	7.750	8.640	90.211	140.638
			%	8,6	15,7	5,5	6,1	64,1	100,0
		I	N	319	1.466	165	281	3.452	5.683
			%	5,6	25,8	2,9	4,9	60,7	100,0

(continuación)

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total	
Mujeres	>=75	II	N	1.252	910	936	491	5.911	9.500	
			%	13,2	9,6	9,9	5,2	62,2	100,0	
		III	N	3.506	4.821	1.336	1.866	17.989	29.516	
			%	11,9	16,3	4,5	6,3	60,9	100,0	
		IV	N	4.513	10.059	3.120	3.332	43.089	64.114	
			%	7,0	15,7	4,9	5,2	67,2	100,0	
		V	N	2.437	4.755	2.193	2.670	19.771	31.826	
			%	7,7	14,9	6,9	8,4	62,1	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	23.757	53.815	13.560	24.170	2.068.338	2.183.641
				%	1,1	2,5	0,6	1,1	94,7	100,0
	I	N	883	4.151	368	648	272.252	278.303		
		%	0,3	1,5	0,1	0,2	97,8	100,0		
	II	N	2.108	3.245	1.472	1.778	205.680	214.283		
		%	1,0	1,5	0,7	0,8	96,0	100,0		
	III	N	5.332	11.461	2.610	5.435	487.769	512.608		
		%	1,0	2,2	0,5	1,1	95,2	100,0		
	IV	N	11.235	24.352	5.694	9.646	864.723	915.649		
		%	1,2	2,7	0,6	1,1	94,4	100,0		
	V	N	4.199	10.607	3.415	6.662	237.914	262.798		
		%	1,6	4,0	1,3	2,5	90,5	100,0		
	0-14	Total	N	1.343	7.599	277	1.242	287.049	297.510	
			%	0,5	2,6	0,1	0,4	96,5	100,0	
	I	N	111	1.584	.	245	61.660	63.600		
		%	0,2	2,5	.	0,4	96,9	100,0		
	II	N	230	1.043	277	.	37.989	39.539		
		%	0,6	2,6	0,7	.	96,1	100,0		
	III	N	279	1.866	.	139	82.401	84.684		
		%	0,3	2,2	.	0,2	97,3	100,0		
	IV	N	459	2.794	.	358	93.721	97.332		
		%	0,5	2,9	.	0,4	96,3	100,0		
	V	N	264	312	.	500	11.278	12.354		
		%	2,1	2,5	.	4,0	91,3	100,0		

(continuación)

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Ambos	15-24	Total	N 258	236	.	352	181.673	182.520
			% 0,1	0,1	.	0,2	99,5	100,0
		I	N	30.058	30.058
			%	100,0	100,0
		II	N 134	.	.	.	23.946	24.080
			% 0,6	.	.	.	99,4	100,0
		III	N	40.220	40.220
			%	100,0	100,0
		IV	N 124	.	.	211	72.349	72.684
			% 0,2	.	.	0,3	99,5	100,0
		V	N .	236	.	142	15.100	15.478
			% .	1,5	.	0,9	97,6	100,0
	25-44	Total	N 1.602	4.325	1.223	2.794	646.589	656.533
			% 0,2	0,7	0,2	0,4	98,5	100,0
		I	N 185	228	203	122	87.947	88.685
			% 0,2	0,3	0,2	0,1	99,2	100,0
		II	N .	535	.	244	69.168	69.946
			% .	0,8	.	0,3	98,9	100,0
		III	N .	810	.	744	139.008	140.563
			% .	0,6	.	0,5	98,9	100,0
		IV	N 972	1.066	448	586	270.505	273.578
			% 0,4	0,4	0,2	0,2	98,9	100,0
		V	N 445	1.687	571	1.097	79.961	83.762
			% 0,5	2,0	0,7	1,3	95,5	100,0
	45-64	Total	N 1.475	5.669	1.329	5.887	600.965	615.326
			% 0,2	0,9	0,2	1,0	97,7	100,0
		I	N	66.829	66.829
			%	100,0	100,0
		II	N 194	371	.	447	50.709	51.721
			% 0,4	0,7	.	0,9	98,0	100,0
		III	N 173	458	310	1.548	149.288	151.777
			% 0,1	0,3	0,2	1,0	98,4	100,0

(continuación)

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total	
Ambos	45-64	IV	N	726	2.969	603	2.494	252.742	259.533
			%	0,3	1,1	0,2	1,0	97,4	100,0
		V	N	383	1.871	416	1.399	81.398	85.466
			%	0,4	2,2	0,5	1,6	95,2	100,0
	65-74	Total	N	2.548	6.288	1.882	2.439	192.217	205.375
			%	1,2	3,1	0,9	1,2	93,6	100,0
		I	N	166	505	.	.	18.559	19.230
			%	0,9	2,6	.	.	96,5	100,0
		II	N	.	135	259	219	14.152	14.765
			%	.	0,9	1,8	1,5	95,8	100,0
		III	N	886	1.371	498	422	42.753	45.930
			%	1,9	3,0	1,1	0,9	93,1	100,0
		IV	N	1.422	2.778	889	1.291	92.315	98.696
			%	1,4	2,8	0,9	1,3	93,5	100,0
		V	N	74	1.499	236	508	24.438	26.754
			%	0,3	5,6	0,9	1,9	91,3	100,0
	>=75	Total	N	16.531	29.697	8.849	11.456	159.844	226.377
			%	7,3	13,1	3,9	5,1	70,6	100,0
		I	N	422	1.834	165	281	7.200	9.902
			%	4,3	18,5	1,7	2,8	72,7	100,0
		II	N	1.550	1.161	936	869	9.717	14.233
			%	10,9	8,2	6,6	6,1	68,3	100,0
		III	N	3.994	6.956	1.802	2.582	34.099	49.433
			%	8,1	14,1	3,6	5,2	69,0	100,0
		IV	N	7.531	14.745	3.753	4.707	83.091	113.826
			%	6,6	13,0	3,3	4,1	73,0	100,0
		V	N	3.034	5.002	2.193	3.017	25.738	38.983
			%	7,8	12,8	5,6	7,7	66,0	100,0

Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Hombres	Total	N	7.498	16.461	2.212	7.451	935.039	968.660
		%	0,8	1,7	0,2	0,8	96,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	6.098	9.198	1.057	4.689	240.704	261.746
		%	2,3	3,5	0,4	1,8	92,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	439	3.609	511	1.577	165.967	172.105
		%	0,3	2,1	0,3	0,9	96,4	100,0
	Secundaria, superior	N	595	2.620	441	922	356.720	361.297
		%	0,2	0,7	0,1	0,3	98,7	100,0
	Terciaria	N	365	1.034	203	263	171.648	173.513
		%	0,2	0,6	0,1	0,2	98,9	100,0
	0-14 Total	N	264	632	.	263	52.920	54.079
		%	0,5	1,2	.	0,5	97,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	264	501	.	263	46.750	47.778
		%	0,6	1,0	.	0,6	97,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	131	.	.	6.170	6.301
		%	.	2,1	.	.	97,9	100,0
	15-24 Total	N	124	236	.	.	94.098	94.458
		%	0,1	0,3	.	.	99,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	124	.	.	.	11.406	11.531
		%	1,1	.	.	.	98,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	236	.	.	31.315	31.551
		%	.	0,7	.	.	99,3	100,0
	Secundaria, superior	N	42.767	42.767
		%	100,0	100,0
	Terciaria	N	8.610	8.610
		%	100,0	100,0
	25-44 Total	N	1.113	2.722	340	373	331.761	336.309
		%	0,3	0,8	0,1	0,1	98,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.113	1.347	.	373	37.146	39.979
		%	2,8	3,4	.	0,9	92,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	501	137	.	48.445	49.084
		%	.	1,0	0,3	.	98,7	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Hombres 25-44	Secundaria, superior	N	.	409	.	.	163.808	164.217
		%	.	0,2	.	.	99,8	100,0
	Terciaria	N	.	464	203	.	82.362	83.029
		%	.	0,6	0,2	.	99,2	100,0
45-64	Total	N	178	2.765	362	2.850	296.099	302.253
		%	0,1	0,9	0,1	0,9	98,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	1.451	183	1.428	64.953	68.014
		%	.	2,1	0,3	2,1	95,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	178	581	89	1.013	52.399	54.260
		%	0,3	1,1	0,2	1,9	96,6	100,0
	Secundaria, superior	N	.	732	89	409	118.587	119.818
		%	.	0,6	0,1	0,3	99,0	100,0
	Terciaria	N	60.161	60.161
		%	100,0	100,0
65-74	Total	N	1.314	2.419	411	1.150	90.300	95.593
		%	1,4	2,5	0,4	1,2	94,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	607	1.187	121	768	37.016	39.699
		%	1,5	3,0	0,3	1,9	93,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	80	832	139	139	16.169	17.359
		%	0,5	4,8	0,8	0,8	93,1	100,0
	Secundaria, superior	N	365	265	150	132	22.982	23.894
		%	1,5	1,1	0,6	0,6	96,2	100,0
	Terciaria	N	262	135	.	111	14.133	14.641
		%	1,8	0,9	.	0,8	96,5	100,0
>=75	Total	N	4.505	7.687	1.099	2.815	69.861	85.968
		%	5,2	8,9	1,3	3,3	81,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.990	4.712	752	1.858	43.433	54.745
		%	7,3	8,6	1,4	3,4	79,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	182	1.327	146	425	11.469	13.549
		%	1,3	9,8	1,1	3,1	84,6	100,0
	Secundaria, superior	N	230	1.214	201	381	8.577	10.602
		%	2,2	11,4	1,9	3,6	80,9	100,0

(continuación)

Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total	
Hombres	>=75	Terciaria	N	103	435	.	152	6.382	7.072
			%	1,5	6,1	.	2,1	90,2	100,0
Mujeres	Total	Total	N	15.410	31.082	11.071	16.112	950.171	1.023.846
			%	1,5	3,0	1,1	1,6	92,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	11.135	20.190	6.833	9.767	278.899	326.823
			%	3,4	6,2	2,1	3,0	85,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.862	7.006	2.473	2.695	159.703	173.739
			%	1,1	4,0	1,4	1,6	91,9	100,0
		Secundaria, superior	N	2.333	2.566	939	2.825	301.134	309.797
			%	0,8	0,8	0,3	0,9	97,2	100,0
		Terciaria	N	80	1.320	826	825	210.435	213.486
			%	0,0	0,6	0,4	0,4	98,6	100,0
	0-14	Total	N	230	433	.	.	47.388	48.051
			%	0,5	0,9	.	.	98,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	230	433	.	.	42.383	43.046
			%	0,5	1,0	.	.	98,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.841	4.841
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	164	164
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	134	.	.	352	89.013	89.499
			%	0,1	.	.	0,4	99,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	134	.	.	142	10.811	11.087
			%	1,2	.	.	1,3	97,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	.	211	19.639	19.850
			%	.	.	.	1,1	98,9	100,0
		Secundaria, superior	N	42.905	42.905
			%	100,0	100,0
		Terciaria	N	15.657	15.657
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	488	1.604	883	2.421	315.430	320.826
			%	0,2	0,5	0,3	0,8	98,3	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total		
Mujeres	25-44	Sin estudios, primaria	N	261	650	186	905	27.659	29.661	
			%	0,9	2,2	0,6	3,1	93,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	280	697	355	35.447	36.779	
			%	.	0,8	1,9	1,0	96,4	100,0	
		Secundaria, superior	N	227	673	.	795	133.770	135.466	
			%	0,2	0,5	.	0,6	98,7	100,0	
		Terciaria	N	.	.	.	366	118.553	118.919	
			%	.	.	.	0,3	99,7	100,0	
		45-64	Total	N	1.297	2.905	967	3.234	305.366	313.769
			%	0,4	0,9	0,3	1,0	97,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	618	1.544	416	536	76.534	79.648	
			%	0,8	1,9	0,5	0,7	96,1	100,0	
			Secundaria, inferior	N	184	625	329	1.042	60.346	62.525
			%	0,3	1,0	0,5	1,7	96,5	100,0	
			Secundaria, superior	N	496	736	222	1.346	105.062	107.861
			%	0,5	0,7	0,2	1,2	97,4	100,0	
		Terciaria	N	.	.	.	311	63.423	63.734	
			%	.	.	.	0,5	99,5	100,0	
		65-74	Total	N	1.234	3.870	1.472	1.289	102.061	109.925
			%	1,1	3,5	1,3	1,2	92,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	842	2.390	763	820	57.563	62.377	
			%	1,3	3,8	1,2	1,3	92,3	100,0	
			Secundaria, inferior	N	392	1.023	228	156	23.614	25.412
			%	1,5	4,0	0,9	0,6	92,9	100,0	
	Secundaria, superior		N	.	344	202	165	12.357	13.068	
	%		.	2,6	1,5	1,3	94,6	100,0		
	Terciaria	N	.	113	279	149	8.527	9.068		
		%	.	1,2	3,1	1,6	94,0	100,0		
	>=75	Total	N	12.026	22.271	7.750	8.815	90.915	141.777	
		%	8,5	15,7	5,5	6,2	64,1	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	9.050	15.172	5.469	7.364	63.949	101.004		
		%	9,0	15,0	5,4	7,3	63,3	100,0		

(continuación)

Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Mujeres	>=75	Secundaria, inferior	N	1.286	5.079	1.219	932	15.815	24.331
			%	5,3	20,9	5,0	3,8	65,0	100,0
		Secundaria, superior	N	1.611	813	515	519	6.876	10.333
			%	15,6	7,9	5,0	5,0	66,5	100,0
		Terciaria	N	80	1.207	547	.	4.274	6.108
			%	1,3	19,8	9,0	.	70,0	100,0
Ambos	Total	Total	N	22.908	47.542	13.283	23.563	1.885.211	1.992.506
			%	1,1	2,4	0,7	1,2	94,6	100,0
	0-14	Sin estudios, primaria	N	17.233	29.387	7.889	14.456	519.604	588.569
			%	2,9	5,0	1,3	2,5	88,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.301	10.616	2.984	4.272	325.670	345.844
			%	0,7	3,1	0,9	1,2	94,2	100,0
		Secundaria, superior	N	2.928	5.186	1.380	3.747	657.854	671.095
			%	0,4	0,8	0,2	0,6	98,0	100,0
	Terciaria	N	445	2.354	1.029	1.088	382.083	386.999	
		%	0,1	0,6	0,3	0,3	98,7	100,0	
	15-24	Total	N	494	1.065	.	263	100.307	102.130
			%	0,5	1,0	.	0,3	98,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	494	934	.	263	89.133	90.824
			%	0,5	1,0	.	0,3	98,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	131	.	.	11.011	11.142
			%	.	1,2	.	.	98,8	100,0
	Secundaria, superior	N	164	164	
		%	100,0	100,0	
	15-24	Total	N	258	236	.	352	183.111	183.958
			%	0,1	0,1	.	0,2	99,5	100,0
Sin estudios, primaria		N	258	.	.	142	22.217	22.618	
		%	1,1	.	.	0,6	98,2	100,0	
Secundaria, inferior		N	.	236	.	211	50.954	51.401	
		%	.	0,5	.	0,4	99,1	100,0	
Secundaria, superior	N	85.672	85.672		
	%	100,0	100,0		

(continuación)

Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Ambos	15-24	Terciaria	N	24.267	24.267
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	1.602	4.325	1.223	2.794	647.191	657.135
			%	0,2	0,7	0,2	0,4	98,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.375	1.997	186	1.277	64.805	69.640
			%	2,0	2,9	0,3	1,8	93,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	782	834	355	83.892	85.863
			%	.	0,9	1,0	0,4	97,7	100,0
		Secundaria, superior	N	227	1.083	.	795	297.578	299.683
			%	0,1	0,4	.	0,3	99,3	100,0
		Terciaria	N	.	464	203	366	200.916	201.949
			%	.	0,2	0,1	0,2	99,5	100,0
	45-64	Total	N	1.475	5.669	1.329	6.084	601.465	616.022
			%	0,2	0,9	0,2	1,0	97,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	618	2.995	599	1.963	141.487	147.663
			%	0,4	2,0	0,4	1,3	95,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	361	1.206	419	2.055	112.745	116.785
			%	0,3	1,0	0,4	1,8	96,5	100,0
		Secundaria, superior	N	496	1.468	311	1.755	223.649	227.679
			%	0,2	0,6	0,1	0,8	98,2	100,0
		Terciaria	N	.	.	.	311	123.584	123.895
			%	.	.	.	0,3	99,7	100,0
	65-74	Total	N	2.548	6.288	1.882	2.439	192.361	205.518
			%	1,2	3,1	0,9	1,2	93,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.449	3.577	884	1.587	94.578	102.075
			%	1,4	3,5	0,9	1,6	92,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	472	1.854	367	295	39.784	42.772
			%	1,1	4,3	0,9	0,7	93,0	100,0
		Secundaria, superior	N	365	609	352	297	35.339	36.962
			%	1,0	1,6	1,0	0,8	95,6	100,0
		Terciaria	N	262	249	279	259	22.660	23.709
			%	1,1	1,0	1,2	1,1	95,6	100,0

(continuación)

Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Ambos	>=75	Total	N	16.531	29.958	8.849	11.631	160.776	227.744
			%	7,3	13,2	3,9	5,1	70,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	13.040	19.884	6.221	9.222	107.383	155.749
			%	8,4	12,8	4,0	5,9	68,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.468	6.406	1.365	1.357	27.285	37.881
			%	3,9	16,9	3,6	3,6	72,0	100,0
		Secundaria, superior	N	1.840	2.026	716	900	15.453	20.935
			%	8,8	9,7	3,4	4,3	73,8	100,0
		Terciaria	N	183	1.641	547	152	10.656	13.179
			%	1,4	12,5	4,1	1,2	80,9	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 62. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo y edad**

	Hombres							Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Familiar que convive	84,2	95,4	100,0	100,0	88,3	89,4	71,9	58,0	94,5	100,0	74,6	72,8	62,4	49,4
Familiar que no convive	9,3	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	17,7	27,4	14,1	0,0	23,4	19,0	23,1	31,2
Servicios sociales públicos	4,8	4,3	0,0	9,8	0,0	2,8	6,2	8,1	0,0	27,5	15,9	4,7	3,0	9,1
Servicios sanitarios públicos	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	0,0	4,3	0,9	0,0	0,4
Empleado/a con prestación LAPAD*	2,3	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	4,6	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,9
Empleado/a sin prestación LAPAD*	6,7	2,0	0,0	0,0	0,0	4,9	13,5	17,1	8,9	0,0	0,0	9,9	19,6	20,6
Empresa privada	3,0	9,2	0,0	5,7	0,0	0,0	2,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Voluntariado	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Vecino/a	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Otros	1,8	5,3	0,0	0,0	0,0	2,8	1,4	3,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,0	3,8

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 63. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y territorio histórico**

Hombres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Familiar que convive	84,1	83,8	84,5	100,0	100,0	90,9	.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Familiar que no convive	8,8	12,9	6,7	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicios sociales públicos	10,8	0,9	6,3	0,0	0,0	8,6	.	0,0	0,0	14,5	0,0	14,5
Servicios sanitarios públicos	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empleado/a con prestación LAPAD*	6,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empleado/a sin prestación LAPAD*	6,1	3,6	9,1	24,9	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empresa privada	0,0	0,7	5,6	0,0	0,0	18,2	.	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
Voluntariado	0,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vecino/a	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	0,0	0,7	3,2	0,0	0,0	10,5	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 63. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda** por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Familiar que convive	100,0	79,5	93,0	100,0	94,8	80,9	51,6	69,2	77,1
Familiar que no convive	0,0	20,7	7,0	0,0	0,0	0,0	26,9	24,3	12,0
Servicios sociales públicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	21,2	2,4	5,8
Servicios sanitarios públicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
Empleado/a con prestación LAPAD*	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	7,4	0,0
Empleado/a sin prestación LAPAD*	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	6,1	11,2	7,4	17,7
Empresa privada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,7
Voluntariado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,6
Vecino/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	1,8	1,5

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 63. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y territorio histórico**

Mujeres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Familiar que convive	63,3	58,1	57,0	100,0	100,0	86,3	.	100,0	100,0	82,3	72,8	72,8
Familiar que no convive	27,6	23,6	29,3	34,8	10,2	13,7	.	0,0	0,0	0,0	13,7	37,3
Servicios sociales públicos	13,6	7,1	7,7	0,0	0,0	0,0	.	48,6	0,0	17,7	27,2	9,1
Servicios sanitarios públicos	1,2	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
Empleado/a con prestación LAPAD*	4,7	6,7	2,6	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empleado/a sin prestación LAPAD*	15,5	16,7	17,6	33,8	0,0	13,7	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empresa privada	0,0	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voluntariado	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vecino/a	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	1,2	0,9	4,3	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 63. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y territorio histórico**

Mujeres

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Familiar que convive	70,4	81,2	68,4	65,9	58,1	63,6	53,8	46,0	50,6
Familiar que no convive	29,6	5,4	25,5	0,0	23,1	26,3	37,7	30,2	30,8
Servicios sociales públicos	0,0	0,0	7,7	0,0	3,7	3,1	17,9	7,1	8,9
Servicios sanitarios públicos	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,7	0,0
Empleado/a con prestación LAPAD*	0,0	0,0	0,0	11,2	3,6	0,0	5,8	10,0	3,8
Empleado/a sin prestación LAPAD*	0,0	9,6	11,0	11,4	20,6	20,3	19,9	21,8	20,2
Empresa privada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,6
Voluntariado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Vecino/a	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,1
Otros	0,0	3,8	0,0	11,4	0,0	3,0	0,0	0,8	5,9

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 64. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y clase social**

Hombres

	Total					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Familiar que convive	80,3	68,9	81,6	84,2	95,1	100,0	69,6	100,0	100,0	100,0	.	.	.	100,0	100,0	100,0	.	100,0	100,0	100,0
Familiar que no convive	0,0	18,4	8,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Servicios sociales públicos	10,0	7,4	1,1	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	30,0	.	0,0	17,4	0,0
Servicios sanitarios públicos	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Empleado/a con prestación LAPAD*	0,0	7,4	2,3	2,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Empleado/a sin prestación LAPAD*	14,0	5,8	11,6	4,8	4,9	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Empresa privada	0,0	12,3	3,7	2,8	0,0	0,0	30,4	23,3	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	17,4	0,0
Voluntariado	5,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Vecino/a	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Otros	0,0	6,7	1,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 64. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y clase social**

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Familiar que convive	. 100,0	100,0	82,6	100,0	100,0	42,4	90,4	90,6	100,0	22,8	70,4	67,1	75,6	77,3	
Familiar que no convive	. 0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,6	17,4	18,3	0,0	
Servicios sociales públicos	. 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	18,0	2,3	7,7	0,0	
Servicios sanitarios públicos	. 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	
Empleado/a con prestación LAPAD*	. 0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	4,6	3,2	7,2	
Empleado/a sin prestación LAPAD*	. 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	4,2	0,0	54,9	14,2	19,5	8,0	22,7	
Empresa privada	. 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	
Voluntariado	. 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	1,5	0,0	
Vecino/a	. 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	
Nadie	. 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Otros	. 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,4	0,0	

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 64. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y clase social**

Mujeres

	Total					0-14					15-24				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Familiar que convive	66,4	59,2	58,9	57,4	57,6	83,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Familiar que no convive	17,6	25,0	22,3	26,7	34,8	32,6	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicios sociales públicos	0,0	7,3	3,6	8,1	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicios sanitarios públicos	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empleado/a con prestación LAPAD*	4,0	4,6	3,4	2,8	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empleado/a sin prestación LAPAD*	21,4	16,8	26,1	18,3	6,1	17,0	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empresa privada	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voluntariado	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vecino/a	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	11,7	6,9	4,7	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 64. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y clase social**

Mujeres

	25-44					45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Familiar que convive	100,0	68,7	73,9	69,8	79,2	100,0	67,8	79,7	66,4	100,0	38,5	50,1	63,1	68,6	47,5	40,7	53,7	50,8	47,8	
Familiar que no convive	0,0	31,3	26,1	35,1	12,1	0,0	10,7	8,6	36,8	0,0	61,5	12,0	19,8	37,2	12,0	31,4	27,8	29,9	40,0	
Servicios sociales públicos	0,0	0,0	0,0	11,8	31,7	0,0	8,6	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	2,1	8,5	0,0	9,1	3,8	10,2	12,8	
Servicios sanitarios públicos	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	
Empleado/a con prestación LAPAD*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	3,9	7,5	8,2	4,4	4,0	9,9	
Empleado/a sin prestación LAPAD*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	16,0	5,6	4,8	38,4	0,0	24,2	27,5	0,0	22,2	23,6	32,5	19,8	8,7	
Empresa privada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,4	0,0	
Voluntariado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	
Vecino/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,7	
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	2,4	0,0	22,1	12,2	4,8	1,4	1,3	

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 65. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda* por sexo, edad y nivel de estudios****

Hombres

	Total				0-14		15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Familiar que convive	83,7	85,1	72,5	88,8	100,0	100,0	100,0	100,0	.	.
Familiar que no convive	11,6	11,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
Servicios sociales públicos	8,1	0,0	3,2	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	.	.
Servicios sanitarios públicos	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
Empleado/a con prestación LAPAD*	2,6	3,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
Empleado/a sin prestación LAPAD*	7,6	7,8	8,1	5,5	11,7	0,0	0,0	0,0	.	.
Empresa privada	1,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
Voluntariado	0,7	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
Vecino/a	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
Otros	0,0	1,6	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 65. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda*** por sexo, edad y nivel de estudios**

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Familiar que convive	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	89,8	79,0	.
Familiar que no convive	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	10,2	10,6	.
Servicios sociales públicos	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Servicios sanitarios públicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Empleado/a con prestación LAPAD*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	.
Empleado/a sin prestación LAPAD*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Empresa privada	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Voluntariado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Vecino/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 65. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda* por sexo, edad y nivel de estudios****

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Familiar que convive	95,5	88,3	67,3	100,0	73,1	71,9	65,4	69,8
Familiar que no convive	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	23,6	16,3	0,0
Servicios sociales públicos	0,0	0,0	16,2	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0
Servicios sanitarios públicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Empleado/a con prestación LAPAD*	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	9,2	0,0	0,0
Empleado/a sin prestación LAPAD*	4,5	11,7	0,0	0,0	12,1	16,4	18,3	14,9
Empresa privada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	11,8	0,0	0,0
Voluntariado	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	15,3
Vecino/a	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	4,6	6,7	0,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 65. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda* por sexo, edad y nivel de estudios****

Mujeres

	Total				0-14			15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Familiar que convive	56,5	59,4	54,9	39,1	100,0	.	.	100,0	100,0	.	.
Familiar que no convive	31,1	23,9	19,0	21,9	0,0	.	.	0,0	0,0	.	.
Servicios sociales públicos	10,3	9,3	0,0	0,0	0,0	.	.	48,6	0,0	.	.
Servicios sanitarios públicos	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	.	.
Empleado/a con prestación LAPAD*	5,0	3,5	1,1	5,5	0,0	.	.	0,0	0,0	.	.
Empleado/a sin prestación LAPAD*	14,9	15,9	28,1	34,1	0,0	.	.	0,0	0,0	.	.
Empresa privada	0,6	0,0	0,0	2,6	0,0	.	.	0,0	0,0	.	.
Voluntariado	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	.	.
Vecino/a	0,0	1,2	0,0	4,9	0,0	.	.	0,0	0,0	.	.
Nadie	0,7	0,0	2,1	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	.	.
Otros	1,7	3,6	5,9	15,0	0,0	.	.	0,0	0,0	.	.

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 65. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda* por sexo, edad y nivel de estudios****

	Mujeres							
	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Familiar que convive	64,6	84,5	87,6	33,4	76,6	61,5	74,5	100,0
Familiar que no convive	40,3	0,0	12,4	66,6	15,4	23,4	21,7	0,0
Servicios sociales públicos	32,5	15,5	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0
Servicios sanitarios públicos	11,7	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Empleado/a con prestación LAPAD*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empleado/a sin prestación LAPAD*	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	7,7	6,2	0,0
Empresa privada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voluntariado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vecino/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 65. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda* por sexo, edad y nivel de estudios****

	Mujeres							
	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Familiar que convive	63,1	78,7	48,4	20,9	52,4	49,8	24,5	35,2
Familiar que no convive	35,4	0,0	0,0	20,1	32,1	33,5	23,8	17,3
Servicios sociales públicos	4,8	0,0	0,0	0,0	9,5	12,9	0,0	0,0
Servicios sanitarios públicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Empleado/a con prestación LAPAD*	3,2	0,0	0,0	0,0	6,1	5,8	2,7	9,1
Empleado/a sin prestación LAPAD*	9,3	31,0	51,6	31,5	16,8	17,7	54,8	47,5
Empresa privada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	4,4
Voluntariado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Vecino/a	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	5,2	0,0
Otros	0,0	13,3	0,0	0,0	2,2	3,1	11,7	24,9

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 66. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y edad

	Hombres							Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Caries	3,4	1,3	2,5	4,0	4,0	4,2	2,9	2,6	0,3	2,2	3,7	2,7	2,7	2,2
Otros p. dentales	2,3	0,7	1,2	1,6	2,9	4,4	4,2	2,5	1,0	1,3	1,5	3,4	4,0	3,7
Hipertensión	15,5	0,2	0,5	1,4	20,8	51,0	56,3	16,3	0,0	0,0	1,3	14,8	41,7	61,2
Diabetes	5,5	0,0	0,0	0,7	7,2	18,9	19,6	4,6	0,4	0,4	0,5	4,3	12,3	15,2
Colesterol elevado	12,6	0,3	0,0	3,3	17,9	39,8	35,4	11,7	0,3	0,3	1,9	13,1	31,3	34,0
Fibromialgia	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,5	0,4	0,9	0,0	0,0	0,5	1,8	1,7	0,8
Artrosis	4,8	0,0	0,3	1,3	6,5	10,8	19,3	11,0	0,0	0,0	1,5	11,1	25,5	39,1
Dolor cervical	3,3	0,0	0,5	2,2	4,9	5,5	8,4	7,0	0,0	0,7	3,8	9,0	13,0	16,5
Dolor dorsal	6,0	0,0	1,6	5,6	8,5	9,1	10,6	8,6	0,5	1,4	3,9	11,2	16,9	20,1
Asma	4,3	6,7	6,5	4,9	1,9	4,0	4,0	4,0	4,4	6,6	4,1	2,5	4,4	4,4
Varices	2,2	0,0	0,2	1,2	2,8	6,0	5,8	5,7	0,0	0,0	3,0	6,8	10,7	14,6
Trombosis	1,3	0,1	0,0	0,3	1,1	3,5	6,3	1,1	0,2	0,2	0,1	0,6	0,7	6,4
Infarto agudo de miocardio	1,3	0,0	0,0	0,1	1,4	3,6	6,4	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,9	2,2
Otros p. crón. corazón	4,9	0,5	0,7	0,4	3,8	14,3	28,6	4,0	0,2	0,2	0,9	1,9	7,0	19,5
Alergia crónica	4,8	4,8	8,1	6,5	3,4	2,0	2,2	4,7	3,3	6,4	5,8	4,8	2,9	3,5
Bronquitis crónica	1,8	0,4	0,5	0,4	1,5	4,2	9,8	1,4	0,2	0,0	0,5	1,2	3,6	4,6
Úlcera estómago	1,4	0,0	0,1	0,7	2,2	3,2	2,6	1,0	0,0	0,3	0,5	1,1	2,0	2,5
Hemorroides	1,6	0,0	0,0	1,3	2,1	3,4	3,9	2,8	0,0	0,2	1,6	4,0	4,8	5,6
Cáncer	1,2	0,2	0,0	0,4	1,0	4,4	4,2	1,4	0,0	0,0	0,5	2,5	2,6	2,8
Ceguera	0,7	0,0	0,0	0,5	0,8	1,6	2,3	1,0	0,1	0,1	0,2	0,6	1,6	4,3
Cataratas	1,3	0,2	0,0	0,0	0,9	4,1	8,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,8	9,9
Sordera	2,7	0,1	0,0	0,6	2,9	6,8	12,7	2,6	0,0	0,3	0,8	1,4	5,9	11,1
Piel	2,2	1,7	2,2	1,8	2,3	2,2	3,9	2,1	1,0	2,5	2,2	1,7	3,1	2,5
Tiroides	0,7	0,2	0,2	0,5	0,8	1,4	1,6	5,2	0,1	0,7	4,3	8,0	8,5	6,9
Próstata	3,5	0,0	0,0	0,1	1,8	14,1	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 66. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y edad

	Hombres							Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Incontinencia urinaria	0,9	0,2	0,0	0,3	0,2	2,1	6,3	2,1	0,0	0,1	0,2	0,8	3,6	11,5
Demencia	0,7	0,0	0,2	0,3	0,1	0,3	6,6	1,3	0,1	0,4	0,1	0,1	0,9	8,4
Ansiedad	1,4	0,2	0,6	1,4	1,7	1,6	3,4	3,3	0,2	0,5	2,4	4,0	6,4	6,7
Depresión	1,3	0,0	0,2	1,3	1,6	1,9	2,5	3,8	0,0	0,4	2,1	4,6	7,1	8,9
Otros p. mentales	1,4	1,2	0,0	1,6	1,7	0,9	2,0	1,1	0,1	0,7	1,0	1,2	1,3	2,3
Migraña	1,4	0,3	1,5	1,6	1,7	1,3	1,1	4,0	0,6	2,4	5,3	4,8	2,6	4,7
Osteoporosis	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,7	4,3	0,0	0,0	0,1	4,2	13,5	13,9
Anemia	0,6	0,4	0,2	0,3	0,3	0,6	3,3	1,4	0,0	1,0	1,8	1,7	0,5	2,1
Estreñimiento	0,6	0,2	0,2	0,1	0,4	1,2	3,8	1,9	0,3	0,0	0,9	2,1	3,4	5,6
Pie diabético	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
Otros	6,6	3,3	3,9	4,3	9,0	10,1	11,4	6,3	1,8	2,5	5,0	7,5	8,9	11,8

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Caries	0,4	3,1	4,5	0,5	1,5	1,3	0,0	2,1	3,5	0,4	3,3	5,5
Otros p. dentales	0,4	1,7	3,2	0,0	0,4	1,0	0,0	0,4	2,1	0,6	1,2	2,1
Hipertensión	14,6	14,4	16,5	1,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	1,8	0,9	1,6
Diabetes	5,8	4,4	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,4	0,6
Colesterol elevado	10,0	10,0	14,8	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	3,0	2,4	3,9
Fibromialgia	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Artrosis	3,7	4,6	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,3	1,2	1,2
Dolor cervical	1,2	2,9	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	1,8	2,8
Dolor dorsal	3,1	5,7	7,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,5	1,9	2,8	5,1	6,8
Asma	2,8	4,2	4,8	4,1	8,2	6,5	3,7	7,2	6,8	3,0	4,0	6,0
Varices	0,9	2,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,3	1,4	1,3
Trombosis	1,1	1,4	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5
Infarto agudo de miocardio	1,4	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Otros p. crón. corazón	4,4	5,5	4,8	0,0	0,4	0,6	0,0	0,8	0,8	1,2	0,5	0,1
Alergia crónica	1,7	6,5	4,5	3,1	9,2	2,5	2,2	9,8	8,7	0,7	7,9	7,3
Bronquitis crónica	0,8	2,3	1,8	0,5	1,1	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,8	0,3
Úlcera estómago	1,4	1,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,4	0,4	0,7
Hemorroides	0,4	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,7
Cáncer	0,5	1,1	1,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6
Ceguera	0,5	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,8
Cataratas	0,3	1,2	1,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Sordera	1,1	3,0	2,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8
Piel	1,1	1,8	2,7	0,0	1,1	2,5	0,7	1,5	3,1	1,8	1,6	1,9
Tiroides	0,6	0,9	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0	0,3

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

	Hombres								
	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Caries	0,8	2,9	5,6	0,0	5,9	4,3	0,0	3,4	3,3
Otros p. dentales	0,4	1,8	4,3	0,6	3,5	6,0	0,0	4,8	4,9
Hipertensión	18,5	19,5	22,2	47,9	45,7	55,2	60,4	57,4	54,7
Diabetes	6,3	4,8	8,9	18,4	15,9	20,9	24,5	18,6	19,0
Colesterol elevado	12,3	15,3	20,9	36,7	29,5	47,3	33,5	29,4	39,2
Fibromialgia	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,8	0,0	0,0	0,7
Artrosis	4,2	6,7	6,9	10,7	9,3	11,8	12,2	19,7	20,8
Dolor cervical	1,4	4,9	5,9	3,5	5,5	6,0	1,5	6,2	11,2
Dolor dorsal	4,8	8,0	9,9	5,7	11,7	8,4	4,6	9,2	12,8
Asma	1,4	1,8	2,2	1,8	3,8	4,6	4,5	3,8	4,1
Varices	2,2	3,2	2,7	0,6	7,7	6,3	1,5	5,9	6,7
Trombosis	0,7	1,2	1,2	3,9	4,9	2,5	6,9	7,5	5,5
Infarto agudo de miocardio	1,4	1,2	1,5	2,3	6,1	2,4	8,5	5,3	6,5
Otros p. crón. corazón	2,5	4,3	3,9	13,1	17,2	12,8	29,7	31,2	27,0
Alergia crónica	1,7	4,7	3,1	3,3	3,7	0,5	1,5	2,3	2,3
Bronquitis crónica	0,4	1,9	1,6	2,3	5,6	3,7	6,1	9,2	11,0
Úlcera estómago	2,5	1,2	2,8	2,2	3,0	3,6	0,0	4,4	2,3
Hemorroides	0,5	2,1	2,5	1,7	5,2	2,6	1,6	4,6	4,1
Cáncer	0,7	1,1	1,1	3,2	5,3	4,0	0,8	3,5	5,4
Ceguera	0,7	0,8	0,9	0,6	2,1	1,6	1,5	3,5	1,7
Cataratas	0,2	0,9	1,1	1,1	2,7	5,7	2,2	7,8	9,7
Sordera	1,5	2,8	3,4	2,2	8,3	7,1	5,5	16,4	12,3
Piel	0,9	1,6	3,1	1,1	3,4	1,7	0,8	3,5	4,8
Tiroides	1,0	0,6	0,9	1,7	2,1	0,8	0,0	2,2	1,6

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Próstata	2,5	3,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Incontinencia urinaria	0,5	1,0	0,9	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
Demencia	0,4	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,6
Ansiedad	0,8	1,2	1,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,9	0,3	1,1	1,8
Depresión	0,5	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,2	1,7
Otros p. mentales	1,1	1,2	1,6	0,5	0,8	1,7	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,8
Migraña	0,4	1,1	1,8	0,0	0,4	0,3	0,0	1,1	2,2	0,7	1,5	1,9
Osteoporosis	0,2	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Anemia	0,2	0,4	0,8	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,3
Estreñimiento	0,4	0,8	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2	0,0
Pie diabético	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	5,8	7,2	6,4	4,7	3,6	2,8	2,3	3,6	4,6	3,2	5,2	4,1

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

	Hombres								
	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Próstata	1,3	1,2	2,3	11,8	14,2	14,7	15,9	19,4	22,8
Incontinencia urinaria	0,4	0,1	0,3	0,6	3,4	1,6	3,2	6,8	6,7
Demencia	0,0	0,0	0,1	0,6	0,7	0,0	5,4	6,6	6,9
Ansiedad	1,9	1,2	1,9	1,1	1,7	1,6	0,8	3,7	3,8
Depresión	0,9	1,4	1,9	0,5	2,8	1,7	1,6	2,5	2,7
Otros p. mentales	1,1	1,8	1,8	0,6	0,6	1,1	3,0	1,8	1,9
Migraña	0,5	1,3	2,3	0,0	0,9	1,9	0,8	0,8	1,4
Osteoporosis	0,2	0,6	0,4	0,0	0,7	1,6	0,8	2,9	1,3
Anemia	0,2	0,4	0,3	0,5	0,0	1,1	0,8	0,8	5,2
Estreñimiento	0,0	0,8	0,2	1,7	1,7	0,8	1,5	5,1	3,6
Pie diabético	0,0	0,1	0,1	0,0	1,8	0,3	0,0	2,9	0,6
Otros	7,1	9,5	9,3	10,3	10,7	9,7	14,0	14,4	9,1

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Caries	0,3	2,5	3,2	0,0	0,0	0,6	0,0	1,8	3,1	0,9	3,8	4,5
Otros p. dentales	0,7	2,1	3,2	0,7	0,0	1,8	0,0	0,9	1,9	0,7	1,4	1,9
Hipertensión	16,1	14,3	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	1,3
Diabetes	4,7	4,1	4,8	0,6	0,5	0,4	0,0	0,0	0,8	1,3	0,5	0,3
Colesterol elevado	9,5	9,3	13,7	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,5	1,0	0,9	2,8
Fibromialgia	0,7	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,6
Artrosis	8,3	9,4	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,6	1,6
Dolor cervical	2,2	4,6	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,0	2,9	4,8
Dolor dorsal	3,9	6,9	10,9	0,0	0,4	0,7	0,0	0,0	2,7	2,7	3,0	4,7
Asma	1,7	3,9	4,6	1,2	3,8	5,6	0,0	4,0	10,1	1,4	5,2	4,2
Varices	2,9	5,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,3	3,3
Trombosis	0,8	0,7	1,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0
Infarto agudo de miocardio	0,3	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Otros p. crón. corazón	3,0	3,6	4,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,6	0,7	1,1
Alergia crónica	1,3	6,3	4,6	0,7	5,6	2,4	0,9	8,0	6,9	1,2	8,3	5,6
Bronquitis crónica	0,7	1,0	1,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7
Úlcera estómago	1,4	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	0,4	0,5
Hemorroides	0,6	2,9	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	2,1	1,6
Cáncer	0,9	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3
Ceguera	0,4	1,4	0,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3
Cataratas	0,6	2,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sordera	1,4	2,7	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,9	0,8
Piel	0,5	2,5	2,2	0,0	0,9	1,4	1,0	1,9	3,3	0,0	3,9	1,9
Tiroides	6,3	5,8	4,6	0,7	0,0	0,0	1,9	0,5	0,4	5,2	4,5	3,9

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Caries	0,0	2,5	3,4	0,0	4,0	2,5	0,0	2,1	2,8
Otros p. dentales	1,1	2,5	4,6	0,6	3,9	4,9	0,0	4,4	4,2
Hipertensión	16,8	12,3	15,7	45,2	33,7	45,7	63,4	57,0	63,1
Diabetes	4,9	3,1	4,9	14,0	10,5	13,0	14,3	16,3	14,8
Colesterol elevado	12,9	10,2	14,9	30,4	25,6	35,0	25,4	29,0	38,7
Fibromialgia	1,3	0,9	2,4	1,7	1,2	2,1	1,1	0,4	1,0
Artrosis	9,2	8,1	13,4	18,0	21,8	29,6	34,8	36,0	41,9
Dolor cervical	2,6	5,3	12,8	4,9	7,7	18,3	4,0	12,5	21,5
Dolor dorsal	6,1	8,8	13,9	6,8	12,3	22,1	7,0	19,1	23,6
Asma	2,3	2,2	2,8	2,8	4,1	5,0	2,1	4,4	4,8
Varices	2,4	6,2	8,4	6,7	11,1	11,4	11,2	13,2	16,1
Trombosis	0,0	0,6	0,7	1,1	0,3	0,9	6,8	3,8	7,7
Infarto agudo de miocardio	0,4	0,0	0,1	1,1	1,1	0,7	0,5	3,0	2,2
Otros p. crón. corazón	1,7	1,9	2,0	5,3	6,3	7,8	16,4	18,2	21,0
Alergia crónica	1,7	6,4	4,6	1,8	2,1	3,7	1,1	4,6	3,4
Bronquitis crónica	1,0	0,8	1,5	1,1	2,2	5,0	3,0	3,5	5,6
Úlcera estómago	1,9	0,6	1,1	1,7	0,9	2,7	4,3	1,9	2,5
Hemorroides	0,8	3,9	4,8	1,1	5,4	5,4	1,5	5,4	6,6
Cáncer	1,9	2,5	2,7	1,8	3,0	2,6	2,0	2,4	3,2
Ceguera	0,2	1,0	0,5	0,6	2,0	1,6	3,0	6,8	3,2
Cataratas	0,5	0,8	1,0	0,6	5,2	5,6	3,5	10,4	11,0
Sordera	0,8	1,3	1,7	0,6	6,3	7,0	9,1	11,6	11,2
Piel	0,8	1,9	1,8	1,2	3,3	3,4	0,5	2,7	2,9
Tiroides	10,1	8,4	7,2	9,9	11,4	6,3	6,3	8,1	6,3

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	1,0	2,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Demencia	1,0	1,0	1,5	0,7	0,0	0,0	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2
Ansiedad	1,5	2,7	4,2	0,0	0,5	0,0	1,0	0,4	0,4	0,6	2,0	3,2
Depresión	2,6	2,9	4,6	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,4	0,5	1,1	3,1
Otros p. mentales	0,6	0,8	1,4	0,7	0,0	0,0	1,0	0,9	0,6	0,3	0,8	1,2
Migraña	1,5	3,7	4,8	0,0	1,3	0,3	1,0	1,8	3,2	1,1	5,3	6,5
Osteoporosis	3,4	3,6	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Anemia	1,1	1,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,0	0,9	1,5	2,2
Estreñimiento	0,4	2,4	2,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,5
Pie diabético	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	5,9	6,6	6,3	1,3	1,6	2,1	0,9	4,1	1,9	5,4	5,4	4,6

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,4	0,5	1,2	1,1	3,8	4,1	7,7	12,0	12,1
Demencia	0,0	0,0	0,3	0,6	0,6	1,1	6,6	7,5	9,2
Ansiedad	1,1	3,1	5,2	3,5	4,3	8,4	6,1	6,5	6,9
Depresión	3,6	3,3	5,7	2,3	5,3	9,4	10,4	8,9	8,7
Otros p. mentales	0,5	0,6	1,8	1,2	0,3	1,9	0,5	2,5	2,6
Migraña	3,0	3,8	5,8	0,0	2,7	3,2	2,6	4,8	5,2
Osteoporosis	3,3	3,8	4,7	13,1	10,0	15,7	12,1	12,3	15,2
Anemia	2,5	1,3	1,8	0,0	0,6	0,5	1,5	1,7	2,4
Estreñimiento	0,2	1,4	2,9	1,1	4,5	3,3	2,5	8,0	4,9
Pie diabético	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,7	0,0
Otros	7,4	7,7	7,3	7,3	10,1	8,6	11,9	10,8	12,4

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Caries	2,3	2,6	3,3	3,7	4,9	1,3	0,0	1,1	1,7	3,2	1,4	1,4	2,7	2,4	3,8	3,4	2,6	4,6	3,6	6,6
Otros p. dentales	2,0	1,5	2,2	2,6	2,3	0,6	0,0	0,6	1,1	0,0	2,7	1,4	1,3	0,9	0,0	1,3	1,4	1,2	1,8	1,9
Hipertensión	10,1	12,8	16,4	17,3	14,9	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,0	0,6	0,0	1,8	0,0	1,6	1,9	1,4	2,2
Diabetes	3,7	3,5	6,0	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	1,1
Colesterol elevado	9,1	9,0	12,7	14,3	11,9	0,0	0,0	0,5	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	2,7	3,0	3,2	4,3
Fibromialgia	0,0	0,4	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Artrosis	2,5	3,5	4,3	6,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,0	1,3	1,4	1,7	0,0
Dolor cervical	1,6	2,2	3,6	3,8	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,5	0,0	1,1	2,5	2,5	2,5	1,5
Dolor dorsal	3,7	4,1	6,6	6,4	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,9	0,0	3,8	5,4	7,9	4,6	8,6
Asma	4,5	4,3	3,7	4,5	4,4	4,3	3,2	7,1	7,8	19,4	4,7	11,6	7,7	5,0	4,8	6,5	5,9	4,2	5,2	2,2
Varices	1,0	2,6	2,0	2,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,6	2,6	0,7	1,2	1,3
Trombosis	0,9	1,1	1,5	1,2	1,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,2	0,8
Infarto agudo de miocardio	0,8	0,5	1,4	1,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0
Otros p. crón. corazón	3,8	4,3	4,8	5,6	4,0	0,0	1,2	0,5	0,5	0,0	2,7	1,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,6	0,8
Alergia crónica	6,2	6,2	5,0	3,9	5,0	5,5	5,7	7,6	1,4	9,3	8,2	7,5	8,5	7,1	10,6	8,3	7,6	7,2	5,9	5,1
Bronquitis crónica	0,4	1,2	1,4	2,4	2,6	0,0	0,7	0,8	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,4	3,4	0,0	0,0	0,7	0,4	0,7
Úlcera estómago	0,3	0,8	1,7	1,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	1,3	0,0
Hemorroides	0,8	0,7	1,8	2,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	1,4	1,5
Cáncer	0,5	1,2	1,1	1,3	1,5	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,5	0,0
Ceguera	0,1	0,8	0,5	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	0,3	2,2
Cataratas	1,2	1,3	1,2	1,4	1,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Sordera	1,2	2,4	2,8	3,2	1,9	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	0,7	0,6
Piel	2,4	3,0	2,6	1,8	1,9	3,8	1,0	2,0	0,7	0,0	1,7	0,0	4,1	2,3	2,0	1,1	3,5	1,5	1,9	1,4
Tiroides	0,7	0,3	0,6	0,8	0,8	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	0,6

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

Hombres

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Caries	2,5	3,3	4,5	4,3	4,1	2,9	11,7	2,4	4,4	2,7	0,0	0,0	1,5	4,0	2,5
Otros p. dentales	2,3	1,4	2,9	3,1	4,6	6,0	5,2	3,1	4,8	1,9	3,7	3,4	6,1	4,0	1,5
Hipertensión	19,3	21,0	20,4	20,9	23,2	42,2	57,9	53,5	51,4	49,6	51,7	61,1	59,0	54,7	57,7
Diabetes	6,4	6,2	7,2	7,5	7,9	14,9	19,3	19,8	17,9	31,6	26,0	13,9	21,8	18,7	20,9
Colesterol elevado	15,4	18,2	16,2	19,5	15,2	33,0	30,9	43,8	40,8	43,1	39,0	33,3	37,3	34,5	37,2
Fibromialgia	0,0	1,0	0,0	0,2	0,0	0,0	2,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,0
Artrosis	3,8	4,7	5,4	7,7	7,8	10,0	12,5	8,5	12,2	6,6	12,9	22,1	17,6	19,3	26,6
Dolor cervical	2,8	3,2	5,2	4,8	10,1	2,4	5,2	6,9	6,1	1,8	10,3	5,7	7,8	9,1	6,6
Dolor dorsal	5,6	5,6	7,8	9,4	12,9	6,4	10,3	11,2	9,6	1,9	20,4	5,3	11,4	9,9	11,8
Asma	2,3	0,0	1,2	2,3	2,5	2,4	1,9	3,1	4,6	7,0	9,2	5,7	1,0	4,3	6,4
Varices	1,9	1,4	3,3	2,9	3,6	3,9	12,7	4,8	6,2	4,4	0,0	11,4	4,5	7,1	0,0
Trombosis	1,4	0,6	1,9	0,7	2,0	0,6	5,3	2,2	4,9	0,0	9,5	10,3	7,6	4,7	9,4
Infarto agudo de miocardio	0,9	0,5	1,0	1,6	2,3	5,6	0,0	5,3	3,2	1,8	3,7	5,6	6,3	6,7	7,2
Otros p. crón. corazón	5,3	1,1	2,6	4,6	3,0	15,0	26,4	10,3	13,7	17,0	28,3	33,9	34,9	26,7	22,3
Alergia crónica	5,6	5,0	2,6	3,3	1,2	2,5	4,2	1,1	1,6	4,4	0,0	3,7	0,9	2,0	7,4
Bronquitis crónica	0,5	1,5	0,2	2,0	3,8	2,7	3,6	3,7	4,7	4,4	0,0	9,4	8,2	11,8	6,6
Úlcera estómago	0,3	2,0	2,7	2,2	4,5	0,8	3,4	5,4	3,2	0,0	0,0	0,0	4,5	2,5	1,5
Hemorroides	1,7	0,0	2,8	2,2	2,3	4,6	1,6	2,3	4,1	0,0	0,0	5,4	3,5	4,6	1,5
Cáncer	1,8	1,4	0,8	0,9	0,8	0,9	5,0	3,5	4,5	13,1	0,0	7,0	3,7	4,3	5,9
Ceguera	0,0	0,0	0,6	1,2	0,4	1,2	3,1	1,2	1,4	4,2	0,0	5,6	1,2	2,5	2,7
Cataratas	0,7	0,4	0,4	1,3	0,8	8,7	7,3	1,8	3,2	5,1	7,6	15,1	8,4	6,8	12,6
Sordera	1,6	2,4	1,8	3,9	2,7	6,4	7,8	6,8	7,1	4,4	6,2	21,1	15,9	11,8	8,6
Piel	2,8	2,8	2,5	2,2	1,3	3,8	4,9	3,5	0,8	2,5	0,0	14,0	4,8	2,4	7,3
Tiroides	1,6	0,0	0,4	1,1	0,0	1,9	0,0	0,9	1,3	4,4	0,0	6,0	1,2	1,2	3,4

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

	Hombres																				
	Total					0-14					15-24					25-44					
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
Próstata	2,5	1,9	3,3	4,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Incontinencia urinaria	0,3	0,3	1,0	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,6
Demencia	0,1	0,8	0,4	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	
Ansiedad	0,9	1,3	1,3	1,4	3,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,1	2,5	1,3	0,9	2,6	
Depresión	0,9	0,6	1,2	1,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,1	0,0	1,8	0,9	3,8	
Otros p. mentales	0,4	1,4	0,7	1,5	4,1	0,0	0,0	1,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,4	1,8	4,9	
Migraña	1,1	1,1	1,2	1,4	2,5	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,8	0,0	1,0	1,9	2,7	1,7	0,9	1,3	1,6	2,7	
Osteoporosis	0,2	0,1	0,2	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	
Anemia	0,5	0,4	0,9	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,4	5,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,6	
Estreñimiento	0,5	0,5	0,3	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	
Pie diabético	0,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Otros	3,9	5,1	7,1	7,3	7,1	2,4	1,7	4,2	3,8	4,2	1,8	3,9	6,0	4,3	1,8	1,7	3,7	4,3	4,8	5,3	

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

Hombres

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Próstata	1,3	0,6	2,0	2,1	1,6	18,8	10,3	11,1	14,9	13,7	18,0	22,2	20,4	22,2	14,3
Incontinencia urinaria	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	1,8	1,6	2,0	2,2	2,5	2,4	5,1	8,6	5,8	6,2
Demencia	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	4,1	14,0	4,7	7,1	5,2
Ansiedad	0,7	1,1	1,1	1,6	6,4	2,9	0,0	0,0	2,3	0,0	4,1	5,3	5,6	2,4	2,3
Depresión	0,7	1,2	0,9	1,8	4,5	1,8	1,5	2,1	1,8	2,4	6,8	5,3	2,9	2,1	0,0
Otros p. mentales	0,7	5,1	0,6	1,2	5,7	1,0	0,0	0,5	0,9	2,7	0,0	2,9	0,9	2,3	3,8
Migraña	0,8	1,9	1,4	1,8	3,4	2,3	1,5	0,6	1,5	0,0	0,0	5,7	0,8	0,7	2,5
Osteoporosis	0,5	0,0	0,0	0,5	1,0	0,9	0,0	0,0	1,5	2,7	0,0	2,4	2,0	1,2	5,3
Anemia	1,1	0,0	0,2	0,2	1,0	1,1	1,5	0,7	0,4	0,0	0,0	5,6	8,3	1,8	0,0
Estreñimiento	0,0	0,0	0,5	0,3	1,3	0,9	0,0	0,5	1,7	1,8	14,7	10,4	1,6	3,2	3,5
Pie diabético	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,9	1,6	1,2	0,5	0,0	0,0	6,9	0,5	1,1	1,5
Otros	7,1	7,5	9,1	9,7	9,3	5,7	5,6	11,3	10,7	16,0	11,3	18,6	12,1	10,4	11,3

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

	Total					0-14					15-24					25-44					
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
Caries	0,9	2,0	2,5	2,6	4,2	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,4	8,2	1,1	2,6	2,5	4,4	7,6
Otros p. dentales	1,5	2,6	2,8	2,5	3,0	0,5	2,9	0,0	1,8	0,0	1,4	3,3	0,0	1,3	1,8	1,0	2,7	1,8	1,0	1,9	1,9
Hipertensión	5,9	10,2	14,5	19,4	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	2,2	0,7	1,8
Diabetes	1,6	2,2	3,8	5,3	8,0	0,4	0,0	0,6	0,0	3,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,3	0,7	0,0
Colesterol elevado	5,5	7,9	11,2	13,4	15,7	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	1,1	1,4	1,4	2,2	3,5
Fibromialgia	0,2	0,5	1,2	0,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,3	1,2
Artrosis	4,0	7,3	9,4	12,8	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	1,5	1,8	2,8
Dolor cervical	4,0	5,5	7,0	7,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,6	2,8	1,8	5,6	3,8	3,3	5,4
Dolor dorsal	4,0	6,6	8,0	9,6	12,5	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	1,4	1,8	0,0	1,9	2,8	2,1	5,8	3,8	2,8	7,2	7,2
Asma	3,0	4,3	3,5	4,0	5,2	4,5	2,0	4,9	4,4	7,8	5,7	3,3	5,2	8,5	10,8	3,3	5,1	3,6	3,9	5,7	5,7
Varices	2,7	3,7	4,8	6,8	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,0	2,5	4,3	3,5
Trombosis	0,6	0,5	0,8	1,4	1,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Infarto agudo de miocardio	0,3	0,2	0,3	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros p. crón. corazón	1,7	2,7	3,0	4,8	6,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	0,7	1,2	0,7
Alergia crónica	6,2	5,0	4,2	4,1	5,5	4,6	2,7	2,2	3,1	7,3	3,0	5,5	7,9	6,4	10,7	9,1	6,9	4,7	4,6	6,6	6,6
Bronquitis crónica	0,5	1,2	1,4	1,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,4	0,5
Úlcera estómago	0,2	0,6	1,0	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,6	0,4	0,7	0,5	0,5
Hemorroides	1,4	2,3	2,7	3,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,1	1,8	1,2	1,4	3,1
Cáncer	0,9	0,9	1,7	1,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0
Ceguera	0,4	0,2	0,9	1,3	1,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7
Cataratas	0,6	1,0	2,0	2,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sordera	1,0	0,9	2,2	3,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,7	0,2	1,1	1,7	1,7
Piel	1,4	2,7	2,2	1,8	2,3	0,0	2,4	0,7	1,7	0,0	4,5	1,8	0,6	3,8	0,0	1,0	3,4	3,1	1,8	2,0	2,0
Tiroides	3,1	3,9	4,9	5,7	6,9	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	0,0	1,1	0,0	3,6	2,8	4,8	4,7	4,2	4,2

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Caries	1,8	3,4	4,1	1,4	2,9	0,0	0,0	1,7	3,9	2,9	2,5	3,5	2,2	1,8	2,7
Otros p. dentales	2,2	1,8	4,9	2,9	3,6	2,2	3,5	3,0	5,7	2,1	5,8	1,8	4,7	3,0	4,7
Hipertensión	9,6	11,4	14,8	14,5	18,6	32,3	43,2	37,5	45,2	40,8	41,6	51,0	58,7	64,4	64,6
Diabetes	2,9	2,5	3,2	4,5	7,0	13,4	5,3	8,1	13,5	16,2	4,7	10,7	17,2	14,7	18,4
Colesterol elevado	9,8	10,2	14,8	13,5	12,7	30,6	27,1	27,8	33,5	31,9	28,6	35,0	36,7	33,7	34,0
Fibromialgia	0,8	1,4	2,0	1,3	2,7	0,0	0,0	2,7	1,7	1,9	0,0	0,0	1,4	0,9	0,6
Artrosis	7,7	9,7	9,9	11,0	15,2	16,8	19,4	23,4	25,9	32,4	31,0	40,8	37,4	40,7	39,3
Dolor cervical	10,2	6,7	9,2	8,3	10,3	12,3	7,5	13,7	13,1	14,4	13,2	17,3	17,8	17,3	14,5
Dolor dorsal	7,7	9,4	11,3	11,6	12,9	8,6	8,9	14,4	18,9	20,9	18,7	19,8	20,4	21,4	18,4
Asma	1,1	3,3	2,2	2,6	3,3	0,0	3,0	5,9	3,3	7,0	0,0	11,1	1,7	4,5	5,5
Varices	6,6	5,3	5,2	7,2	9,4	6,7	1,1	10,5	11,9	13,0	13,1	20,4	15,1	15,0	12,5
Trombosis	1,2	0,0	0,1	1,0	0,6	0,0	2,0	0,3	0,4	1,8	8,4	4,9	6,6	6,7	5,9
Infarto agudo de miocardio	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,5	1,4	0,7	2,9	2,0	2,0	2,7	1,6
Otros p. crón. corazón	1,6	2,0	1,2	1,7	3,0	8,9	7,9	4,4	7,2	8,8	13,8	17,5	19,1	19,8	21,4
Alergia crónica	4,8	3,8	5,0	4,2	5,9	12,1	2,6	1,3	2,6	2,7	0,0	6,9	2,9	3,8	3,2
Bronquitis crónica	0,7	2,4	1,1	0,9	1,7	2,3	2,0	4,4	3,9	2,7	5,8	3,1	4,4	4,4	5,8
Úlcera estómago	0,7	1,4	1,4	0,7	1,2	0,0	0,0	1,9	2,3	2,4	1,8	0,0	2,8	2,7	2,2
Hemorroides	4,3	1,2	4,9	4,4	3,0	0,0	4,9	6,4	4,6	4,3	2,6	13,3	2,7	5,7	6,4
Cáncer	3,4	1,8	2,4	2,5	2,6	3,0	1,9	2,2	3,0	2,4	0,0	4,0	5,2	1,5	3,3
Ceguera	0,0	0,0	0,8	0,7	0,5	2,3	0,0	1,4	1,7	2,0	1,8	2,4	5,1	5,0	3,4
Cataratas	0,0	0,4	0,6	0,7	2,0	7,2	2,1	6,1	3,7	6,0	5,4	9,0	11,8	10,5	8,5
Sordera	2,1	0,0	1,6	1,5	1,6	2,3	3,8	6,3	6,2	6,8	10,1	4,2	11,0	11,1	13,1
Piel	1,7	1,1	1,4	1,3	2,6	2,5	3,6	4,2	1,8	3,9	1,8	5,0	4,2	1,8	2,1
Tiroides	5,0	8,0	7,3	9,0	8,4	6,6	10,0	7,9	7,9	10,6	9,0	1,4	7,0	6,7	8,1

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

Mujeres

	Total					0-14					15-24					25-44						
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Incontinencia urinaria	1,0	1,7	1,5	2,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6
Demencia	0,5	1,1	1,2	1,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	
Ansiedad	1,6	2,3	2,3	3,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,9	3,3	1,3	2,7	4,3		
Depresión	1,0	1,7	2,7	4,6	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,6	1,3	0,7	3,0	4,5		
Otros p. mentales	0,8	1,1	0,7	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,6	0,5	0,7	0,6	0,8	2,7		
Migraña	1,9	1,7	3,8	4,6	6,0	0,7	0,0	0,0	1,5	0,0	2,6	1,6	3,2	2,7	0,0	1,8	1,2	5,8	6,5	8,7		
Osteoporosis	2,2	2,9	3,6	5,1	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	
Anemia	0,5	1,6	1,1	1,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,2	0,4	2,8	1,2	2,2	0,8	2,3	2,2		
Estreñimiento	0,8	1,2	2,0	2,1	2,6	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,9	1,0	1,5		
Pie diabético	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Otros	4,6	7,2	5,6	6,0	8,9	0,0	6,9	0,4	1,1	11,2	0,9	3,3	3,8	1,0	6,7	4,9	5,1	5,6	5,0	3,9		

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

Mujeres

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,8	0,0	0,7	0,9	1,0	0,0	0,0	3,8	4,2	4,6	20,0	19,0	8,6	11,5	11,0
Demencia	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,7	11,9	9,0	10,7	6,8	8,2
Ansiedad	2,3	1,2	3,0	4,2	7,1	11,1	5,9	4,1	5,2	10,2	5,8	6,3	6,2	7,0	7,0
Depresión	1,6	1,9	3,5	5,5	7,3	2,4	1,6	4,9	7,9	10,7	7,5	8,8	9,9	8,2	10,2
Otros p. mentales	1,1	2,1	0,8	1,3	1,4	4,8	0,0	1,4	0,9	1,5	4,2	3,9	1,8	2,2	2,3
Migraña	3,7	3,9	4,9	4,7	5,6	0,0	2,0	1,6	1,9	6,6	0,0	1,0	3,0	6,5	4,9
Osteoporosis	5,9	3,6	3,0	4,4	4,7	6,3	13,7	16,2	14,0	11,5	14,7	13,5	12,3	14,0	14,9
Anemia	0,6	0,8	1,6	2,4	1,7	0,0	0,0	1,1	0,2	0,6	0,0	4,8	2,0	1,8	2,3
Estreñimiento	0,6	0,5	3,2	1,9	2,1	5,6	1,1	2,4	2,7	5,6	4,3	12,5	4,6	5,9	4,1
Pie diabético	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,6
Otros	6,9	7,4	7,1	6,6	9,3	9,2	13,5	4,9	9,3	11,1	20,9	14,5	11,0	10,0	14,1

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

	Hombres										
	Total				0-14			15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	
Caries	3,7	5,5	3,4	2,6	2,5	0,0	1,4	4,0	2,2	0,0	
Otros p. dentales	2,5	3,1	2,6	1,7	1,7	0,0	0,0	2,0	1,2	0,0	
Hipertensión	25,4	17,5	12,1	14,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	2,8	
Diabetes	10,2	5,9	4,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Colesterol elevado	19,9	14,6	10,3	11,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fibromialgia	0,4	0,3	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Artrosis	9,2	5,5	3,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	
Dolor cervical	4,7	4,9	2,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	0,0	
Dolor dorsal	7,9	8,7	5,5	4,9	0,0	0,0	0,0	2,8	1,5	0,0	
Asma	4,9	2,9	3,9	4,1	7,0	0,0	7,3	6,2	6,2	7,5	
Varices	3,6	2,0	2,2	1,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	
Trombosis	2,3	1,5	0,9	1,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Infarto agudo de miocardio	2,2	1,7	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Otros p. crón. corazón	8,7	5,4	3,7	3,8	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	0,0	
Alergia crónica	3,7	4,7	5,0	6,2	5,7	4,7	10,0	9,3	7,3	4,6	
Bronquitis crónica	4,3	1,6	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	0,0	
Úlcera estómago	1,8	1,6	1,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	
Hemorroides	1,7	1,9	2,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cáncer	1,9	2,2	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ceguera	1,3	1,1	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cataratas	2,9	1,3	0,8	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sordera	5,4	3,7	1,6	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Piel	2,6	2,0	2,1	2,3	2,1	3,9	0,0	1,8	3,5	0,0	

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Caries	7,1	7,1	2,7	3,4	3,8	6,2	4,3	1,9
Otros p. dentales	1,5	1,0	2,1	0,9	3,0	4,4	2,7	2,0
Hipertensión	2,5	1,5	1,2	1,2	24,6	21,8	18,5	20,1
Diabetes	1,7	1,1	0,6	0,4	8,8	7,7	7,4	4,7
Colesterol elevado	4,2	6,1	2,3	3,0	18,8	22,3	16,8	15,1
Fibromialgia	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0
Artrosis	2,4	1,4	1,0	1,5	8,3	8,9	6,0	3,1
Dolor cervical	4,0	3,0	1,9	1,4	5,7	8,0	3,6	3,8
Dolor dorsal	10,2	8,7	4,2	4,6	11,1	12,5	7,4	4,5
Asma	6,9	2,9	4,8	5,3	1,9	1,8	2,0	1,8
Varices	0,7	0,5	1,9	0,3	3,9	2,5	2,8	1,9
Trombosis	0,7	0,0	0,3	0,4	1,3	1,5	1,0	0,9
Infarto agudo de miocardio	0,0	0,3	0,1	0,0	1,5	2,4	1,1	1,1
Otros p. crón. corazón	0,7	0,5	0,4	0,3	4,9	3,3	3,8	3,3
Alergia crónica	4,4	6,3	6,2	8,2	2,3	3,2	3,2	5,3
Bronquitis crónica	1,3	0,0	0,4	0,3	3,6	1,7	0,9	0,3
Úlcera estómago	0,6	1,0	0,9	0,3	2,9	2,4	2,6	0,6
Hemorroides	0,0	1,6	1,8	0,7	1,2	1,8	3,1	1,4
Cáncer	0,7	1,7	0,0	0,3	1,1	2,0	0,7	0,8
Ceguera	2,1	0,9	0,1	0,4	1,1	1,9	0,5	0,0
Cataratas	0,4	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,9	0,4
Sordera	0,5	2,0	0,5	0,0	4,3	4,6	2,0	1,7
Piel	3,6	1,0	1,5	2,0	2,0	2,9	2,3	2,4

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Caries	4,0	4,8	4,0	4,6	2,3	3,8	6,7	0,0
Otros p. dentales	2,9	7,4	4,6	5,1	3,5	4,2	9,1	2,2
Hipertensión	47,2	54,8	53,7	52,5	55,0	58,6	60,2	55,9
Diabetes	22,0	18,9	17,3	13,1	20,7	15,5	20,9	17,4
Colesterol elevado	41,0	37,3	40,8	38,0	38,5	25,8	32,3	34,6
Fibromialgia	0,9	0,8	0,0	0,0	0,3	1,2	0,0	0,0
Artrosis	15,7	8,3	5,8	8,9	20,8	16,5	20,4	11,9
Dolor cervical	7,1	5,8	3,6	3,8	7,4	9,8	13,4	6,7
Dolor dorsal	9,5	9,2	8,3	9,2	9,6	10,4	16,5	9,8
Asma	5,4	2,4	3,6	2,5	4,6	1,7	1,3	8,0
Varices	7,7	5,2	4,1	5,4	5,8	6,8	5,2	3,9
Trombosis	4,1	4,2	2,7	2,4	6,0	6,3	7,4	7,1
Infarto agudo de miocardio	2,1	3,7	5,6	4,5	7,0	5,7	6,0	4,1
Otros p. crón. corazón	12,3	18,4	13,5	16,2	26,1	28,1	42,7	27,9
Alergia crónica	2,2	0,6	2,5	2,0	3,2	0,0	1,0	0,0
Bronquitis crónica	3,9	4,7	3,7	5,0	12,4	4,8	5,3	5,6
Úlcera estómago	2,6	2,6	4,4	3,2	2,4	3,9	2,6	2,1
Hemorroides	4,9	2,4	1,5	3,1	3,1	7,4	6,2	0,0
Cáncer	5,2	6,9	2,4	2,4	3,5	5,2	6,7	4,3
Ceguera	1,2	1,3	2,5	1,8	2,7	1,1	3,1	0,0
Cataratas	4,4	3,9	2,3	6,3	8,2	6,9	11,3	5,5
Sordera	7,4	8,5	5,1	6,3	14,5	10,2	12,4	4,0
Piel	2,3	2,1	0,9	4,1	3,6	2,0	6,6	5,5

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

	Hombres									
	Total				0-14			15-24		
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Tiroides	1,2	0,8	0,5	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Próstata	6,8	4,8	1,9	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	2,1	1,3	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demencia	1,8	0,9	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Ansiedad	2,0	1,9	1,2	1,3	0,5	0,0	1,4	0,0	0,9	0,0
Depresión	1,8	1,7	1,1	1,1	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
Otros p. mentales	2,8	1,6	1,0	0,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Migraña	1,1	2,5	1,6	1,0	0,5	0,0	0,0	3,1	0,5	2,6
Osteoporosis	0,8	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anemia	0,9	0,4	0,5	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
Estreñimiento	1,2	0,9	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Pie diabético	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	8,0	9,7	5,4	6,1	5,2	1,6	2,5	4,2	4,5	1,9

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Tiroides	0,5	0,6	0,6	0,3	1,4	0,8	0,5	0,9
Próstata	0,0	0,6	0,0	0,0	1,7	3,7	1,2	1,6
Incontinencia urinaria	0,9	0,6	0,1	0,3	0,3	1,0	0,0	0,0
Demencia	0,9	1,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Ansiedad	3,3	1,5	1,2	0,6	1,2	2,8	1,3	2,0
Depresión	3,9	2,0	0,8	0,7	0,9	2,5	1,8	1,3
Otros p. mentales	5,9	3,2	0,8	0,0	3,0	1,8	1,3	0,9
Migraña	1,9	2,8	1,4	1,1	1,1	2,8	2,2	0,3
Osteoporosis	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,5	0,3
Anemia	0,6	0,0	0,3	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3
Estreñimiento	0,6	0,0	0,0	0,2	0,5	0,6	0,2	0,3
Pie diabético	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0
Otros	5,5	9,3	3,4	2,4	8,6	12,7	7,4	9,6

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Tiroides	2,0	2,2	0,0	0,8	1,6	2,2	0,0	2,2
Próstata	13,1	16,0	13,0	16,5	20,9	23,3	20,8	16,5
Incontinencia urinaria	2,8	3,7	0,0	1,5	6,9	5,0	6,6	3,3
Demencia	0,5	0,0	0,0	0,8	7,1	5,7	4,5	7,8
Ansiedad	2,0	2,1	0,9	0,9	3,4	4,8	0,0	5,7
Depresión	1,7	2,9	1,8	1,3	2,9	1,0	0,0	6,1
Otros p. mentales	1,5	0,6	0,5	0,0	1,9	1,0	4,5	1,1
Migraña	1,2	1,4	0,6	2,8	1,0	0,7	3,1	0,0
Osteoporosis	1,8	0,6	0,5	0,8	1,6	0,7	3,6	1,5
Anemia	0,5	0,0	0,6	1,7	2,3	4,3	5,0	5,9
Estreñimiento	2,4	0,6	0,5	0,0	2,8	6,5	3,9	6,3
Pie diabético	0,9	0,7	0,5	0,8	1,6	0,0	1,9	0,0
Otros	8,9	15,1	7,7	11,3	11,7	8,4	10,7	14,9

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				0-14			15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Caries	2,1	4,0	2,8	2,6	0,0	0,0	0,0	3,5	2,0	1,4	4,0
Otros p. dentales	2,3	3,6	2,7	2,4	0,9	0,0	0,0	1,2	1,3	0,7	2,9
Hipertensión	33,5	20,1	8,8	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diabetes	10,0	5,9	1,7	1,4	1,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2
Colesterol elevado	22,1	15,1	6,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
Fibromialgia	1,3	1,4	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Artrosis	21,9	13,1	6,7	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dolor cervical	10,8	8,8	6,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,9	0,0
Dolor dorsal	13,3	10,5	7,3	5,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,9
Asma	3,9	3,3	4,2	4,0	2,8	9,0	0,0	6,4	3,6	7,9	7,1
Varices	9,4	6,8	4,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trombosis	2,5	1,2	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Infarto agudo de miocardio	0,8	0,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros p. crón. corazón	8,7	5,0	1,4	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Alergia crónica	3,6	3,6	5,5	7,0	4,6	8,8	0,0	0,9	7,1	7,1	7,2
Bronquitis crónica	3,0	1,1	1,2	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Úlcera estómago	1,4	1,4	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
Hemorroides	3,7	3,7	2,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Cáncer	1,8	2,0	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ceguera	1,8	1,5	0,5	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

	Mujeres							
	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Caries	4,0	7,9	3,4	2,6	1,6	3,0	3,0	3,0
Otros p. dentales	0,0	2,7	1,1	2,0	2,3	3,5	4,3	3,2
Hipertensión	1,2	1,5	1,2	1,4	22,1	15,7	13,5	6,7
Diabetes	0,5	1,9	0,2	0,3	7,1	6,2	2,4	2,1
Colesterol elevado	3,6	2,2	1,3	2,2	18,7	14,6	10,1	9,9
Fibromialgia	0,0	0,0	1,0	0,2	2,9	2,8	0,7	1,0
Artrosis	4,3	0,7	2,1	0,4	14,6	11,8	11,1	6,0
Dolor cervical	4,9	5,6	4,0	2,6	9,6	10,2	9,2	6,8
Dolor dorsal	3,6	4,7	3,9	3,7	12,2	12,5	11,7	7,7
Asma	5,3	3,0	3,5	4,9	3,2	1,9	2,9	1,7
Varices	5,0	2,6	4,0	1,5	7,3	9,0	6,5	4,7
Trombosis	0,0	0,0	0,2	0,0	0,7	1,2	0,3	0,3
Infarto agudo de miocardio	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0
Otros p. crón. corazón	1,5	0,0	1,0	0,9	2,5	2,9	1,0	1,9
Alergia crónica	3,3	3,8	5,5	7,5	4,6	2,9	5,1	6,3
Bronquitis crónica	0,0	1,4	0,6	0,2	2,0	1,0	1,3	0,2
Úlcera estómago	0,0	0,9	0,7	0,2	1,0	1,5	1,0	0,9
Hemorroides	1,4	1,5	2,0	1,2	4,4	5,2	4,0	2,3
Cáncer	0,0	0,7	0,9	0,0	2,5	1,8	3,5	1,7
Ceguera	0,9	0,8	0,0	0,0	0,8	0,5	0,6	0,4

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	65-74				≥75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Caries	3,0	4,3	0,0	0,0	2,2	2,5	2,8	0,0
Otros p. dentales	2,5	6,1	9,0	1,6	3,5	4,9	5,8	0,0
Hipertensión	43,9	39,9	42,6	30,3	63,5	59,5	52,7	43,9
Diabetes	15,9	8,8	5,5	7,6	16,5	13,8	13,3	4,0
Colesterol elevado	35,0	30,6	22,8	20,4	34,2	35,2	26,1	40,3
Fibromialgia	1,4	3,0	2,2	0,0	0,9	0,0	2,3	0,0
Artrosis	27,9	24,5	22,3	16,3	40,8	36,8	28,9	38,7
Dolor cervical	14,5	9,3	16,7	7,9	16,8	17,0	13,4	14,0
Dolor dorsal	18,8	15,4	13,9	12,3	20,1	19,4	21,3	22,5
Asma	3,9	5,3	7,3	0,9	4,0	3,9	7,1	7,2
Varices	13,0	8,3	8,9	4,3	15,2	12,8	12,2	16,4
Trombosis	0,9	0,4	1,1	0,0	6,8	5,0	3,9	8,6
Infarto agudo de miocardio	0,7	2,0	0,0	0,0	2,1	3,2	2,8	0,0
Otros p. crón. corazón	8,0	5,9	6,3	4,1	20,6	21,4	10,9	9,5
Alergia crónica	2,4	1,7	4,8	7,4	3,5	2,9	5,7	2,4
Bronquitis crónica	4,5	0,6	5,9	2,4	5,0	2,4	7,5	2,4
Úlcera estómago	2,3	1,0	3,8	0,0	2,4	3,9	1,5	1,4
Hemorroides	3,9	5,2	8,7	4,2	5,5	5,4	4,1	9,7
Cáncer	2,6	3,3	3,4	0,0	2,4	5,2	1,7	2,4
Ceguera	1,6	2,3	1,3	0,0	3,9	5,0	6,7	4,5

(continuación)

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				0-14				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Cataratas	4,4	2,5	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sordera	5,0	3,5	1,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
Piel	1,7	2,1	2,6	2,2	1,1	0,0	0,0	0,0	4,3	2,7	1,1	4,7
Tiroides	5,7	7,5	5,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	0,0
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	4,9	3,0	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Demencia	3,1	1,4	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Ansiedad	5,4	4,6	3,0	1,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,3	0,0
Depresión	6,5	5,8	2,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
Otros p. mentales	2,2	1,1	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,6	0,0	0,0
Migraña	3,6	4,8	5,6	3,3	1,0	4,4	0,0	0,0	2,9	2,7	1,8	3,4
Osteoporosis	7,9	6,0	2,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anemia	1,3	1,6	1,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,0	0,5	0,9
Estreñimiento	2,9	2,2	1,7	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pie diabético	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	7,6	8,8	6,0	5,0	2,7	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	1,8	1,7

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Cataratas	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,5	0,3	0,2
Sordera	0,9	0,7	1,4	0,0	1,9	1,0	1,5	1,3
Piel	0,7	1,3	2,8	2,2	1,9	2,0	1,8	0,8
Tiroides	6,2	4,2	3,6	4,6	7,0	9,3	8,5	7,0
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,9	1,4	0,0	0,0	1,0	1,4	0,8	0,1
Demencia	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5
Ansiedad	5,4	3,9	2,6	1,0	4,8	5,2	4,0	1,8
Depresión	5,1	5,2	1,9	0,6	6,3	7,2	3,6	1,7
Otros p. mentales	4,2	0,4	0,9	0,4	1,9	1,3	1,0	0,8
Migraña	3,1	7,7	6,9	3,4	4,5	5,7	5,4	3,2
Osteoporosis	1,0	0,0	0,0	0,0	6,0	4,0	3,5	3,4
Anemia	1,6	0,7	2,3	1,5	1,8	1,9	1,7	1,6
Estreñimiento	0,7	0,0	1,3	0,7	1,8	3,0	2,3	1,1
Pie diabético	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	5,1	6,7	5,5	3,8	7,4	8,6	7,7	6,1

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Cataratas	4,8	4,6	5,7	3,6	9,9	9,1	13,1	7,4
Sordera	6,1	6,1	5,3	5,0	10,6	15,0	8,6	7,7
Piel	1,6	3,7	6,6	6,1	1,8	1,8	10,3	5,1
Tiroides	7,5	10,8	11,0	4,6	6,3	11,2	3,6	4,3
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	4,3	3,3	3,1	0,0	12,0	12,0	7,0	8,5
Demencia	0,9	1,5	0,0	0,0	9,0	7,4	5,3	7,2
Ansiedad	6,6	7,4	7,2	1,2	7,7	4,8	2,8	3,8
Depresión	7,9	6,8	6,4	3,4	9,6	6,5	10,3	6,1
Otros p. mentales	1,6	1,8	0,0	0,0	2,8	1,2	0,0	1,6
Migraña	2,4	2,6	3,0	3,5	5,1	2,4	8,7	1,6
Osteoporosis	12,3	16,7	16,6	8,1	13,0	15,2	17,3	16,8
Anemia	0,6	0,0	1,0	0,0	1,9	4,0	0,0	0,0
Estreñimiento	3,6	3,4	2,1	3,8	5,3	4,4	8,4	9,4
Pie diabético	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0
Otros	7,1	13,4	7,4	11,2	11,3	13,3	10,0	17,2

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 70. Proporción (%) de personas con algún problema crónico por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	44,7	36,8	44,3	47,1
	0-14	15,9	12,5	16,4	16,6
	15-24	20,3	10,3	22,8	21,7
	25-44	29,2	21,7	28,9	31,5
	45-64	57,3	47,7	57,0	60,1
	65-74	85,9	79,6	83,3	89,2
	>=75	93,5	94,5	92,9	93,6
	Mujeres	Total	48,8	41,6	46,6
	0-14	11,2	6,0	11,6	12,5
	15-24	20,3	8,3	20,2	23,6
	25-44	33,4	21,9	34,4	36,1
	45-64	57,6	57,6	53,4	60,2
	65-74	83,6	77,6	77,2	88,9
	>=75	93,4	93,7	90,3	95,1
Ambos sexos	Total	46,8	39,2	45,5	49,6
	0-14	13,7	9,3	14,1	14,6
	15-24	20,3	9,3	21,6	22,6
	25-44	31,3	21,8	31,5	33,8
	45-64	57,5	52,7	55,2	60,1
	65-74	84,7	78,5	80,1	89,0
	>=75	93,4	94,0	91,2	94,5

Tabla 71. Proporción (%) de personas con algún problema crónico por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	44,8	35,3	36,3	46,2	48,3	45,9
	0-14	16,0	13,1	10,3	19,2	14,7	39,3
	15-24	20,2	17,3	19,3	23,7	19,5	23,3
	25-44	29,2	24,1	29,0	30,6	30,1	29,3
	45-64	57,3	51,7	51,3	56,6	59,6	60,2
	65-74	85,9	83,4	78,2	90,2	85,9	85,8
	>=75	93,5	94,4	100,0	92,8	93,6	89,7
Mujeres	Total	48,8	32,8	40,8	45,6	52,4	63,0
	0-14	11,3	10,0	14,0	9,4	11,4	22,6
	15-24	20,5	16,2	17,8	19,8	23,0	24,4
	25-44	33,4	28,3	32,7	32,5	33,5	40,8
	45-64	57,6	51,5	51,5	55,4	59,3	63,2
	65-74	83,6	76,6	85,6	82,9	83,9	85,1
	>=75	93,5	89,1	89,7	91,5	94,4	95,7
Ambos sexos	Total	46,8	34,1	38,7	45,9	50,2	57,2
	0-14	13,7	11,6	12,1	14,3	13,1	31,0
	15-24	20,3	16,8	18,5	21,5	21,0	23,8
	25-44	31,3	26,2	31,0	31,7	31,5	35,4
	45-64	57,5	51,6	51,4	55,9	59,4	62,4
	65-74	84,6	81,0	82,0	86,1	84,9	85,2
	>=75	93,5	91,3	93,1	92,0	94,0	94,6

Tabla 72. Proporción (%) de personas con algún problema crónico por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	47,8	58,5	51,1	41,3	42,1
	0-14	18,8	19,7	12,3	.	.
	15-24	20,3	16,5	22,0	20,8	16,7
	25-44	29,2	36,1	36,0	27,4	25,4
	45-64	57,3	62,4	64,2	53,8	52,3
	65-74	85,9	86,0	88,2	85,5	83,6
	>=75	93,5	93,1	91,4	96,1	96,7
Mujeres	Total	52,4	67,1	58,2	44,2	37,3
	0-14	13,1	12,3	20,4	0,0	.
	15-24	20,3	22,3	21,1	18,5	22,7
	25-44	33,4	42,3	32,9	35,4	29,2
	45-64	57,6	65,0	62,1	56,5	46,1
	65-74	83,6	83,2	87,5	85,0	73,3
	>=75	93,4	94,2	93,7	87,6	89,0
Ambos sexos	Total	50,2	63,3	54,7	42,6	39,5
	0-14	16,1	16,2	15,8	0,0	.
	15-24	20,3	19,4	21,7	19,6	20,6
	25-44	31,3	38,7	34,6	31,0	27,6
	45-64	57,5	63,8	63,1	55,1	49,1
	65-74	84,7	84,3	87,8	85,3	79,7
	>=75	93,4	93,8	92,9	91,9	93,1

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 73. Proporción (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	8,5	7,6	8,5	8,7
	0-14	11,5	6,2	12,2	12,6
	15-24	11,8	19,1	11,3	9,9
	25-44	9,4	8,3	10,2	9,2
	45-64	6,2	5,5	6,0	6,6
	65-74	4,9	3,9	3,9	5,8
	>=75	7,7	5,6	6,4	8,9
	Mujeres	Total	8,2	6,8	8,8
	0-14	8,7	8,1	11,2	7,2
	15-24	7,6	6,5	6,4	8,6
	25-44	5,4	4,4	7,1	4,6
	45-64	7,4	6,5	7,6	7,5
	65-74	9,0	9,4	7,9	9,5
	>=75	15,6	10,4	15,2	17,0
Ambos sexos	Total	8,3	7,2	8,7	8,4
	0-14	10,2	7,1	11,7	10,0
	15-24	9,7	13,1	8,9	9,3
	25-44	7,4	6,4	8,7	7,0
	45-64	6,8	6,0	6,8	7,0
	65-74	7,1	6,7	6,0	7,8
	>=75	12,6	8,5	11,9	13,9

Tabla 74. Proporción (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	8,5	8,9	8,9	9,4	8,1	7,5
	0-14	11,6	11,4	12,5	13,1	9,7	14,8
	15-24	11,8	8,1	9,9	17,2	11,6	11,4
	25-44	9,4	9,6	6,0	11,6	9,2	9,5
	45-64	6,2	5,7	9,2	5,5	6,6	3,8
	65-74	4,9	9,4	7,1	3,0	4,4	3,9
	>=75	7,7	13,5	11,0	7,5	8,0	0,0
	Mujeres	Total	8,2	6,9	8,2	8,1	8,3
	0-14	8,8	11,1	6,7	7,1	9,8	7,5
	15-24	7,4	4,8	8,6	6,6	9,8	2,9
	25-44	5,4	3,9	7,5	4,8	5,3	6,2
	45-64	7,4	5,6	6,4	8,7	6,4	8,5
	65-74	9,0	10,5	6,7	7,8	8,6	11,6
	>=75	15,8	16,7	19,7	17,9	14,8	14,3
Ambos sexos	Total	8,3	8,0	8,5	8,7	8,2	8,5
	0-14	10,2	11,2	9,7	10,1	9,8	11,2
	15-24	9,7	6,5	9,3	11,2	10,8	7,4
	25-44	7,4	6,6	6,8	7,8	7,6	7,7
	45-64	6,8	5,7	7,7	7,3	6,5	7,2
	65-74	7,1	9,8	6,9	5,7	6,5	9,9
	>=75	12,7	15,3	16,8	13,7	11,9	11,7

Tabla 75. Proporción (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	8,3	7,9	7,4	9,8	6,9
	0-14	14,4	14,9	11,1	.	.
	15-24	11,8	12,3	11,3	11,7	13,0
	25-44	9,4	6,9	7,3	12,4	5,9
	45-64	6,2	6,2	5,3	6,4	6,8
	65-74	4,9	5,0	3,3	5,4	6,1
	>=75	7,7	5,7	10,2	9,6	14,8
Mujeres	Total	8,3	10,4	8,4	6,5	7,6
	0-14	12,0	12,2	11,5	0,0	.
	15-24	7,6	8,8	10,5	6,3	6,5
	25-44	5,4	5,2	3,9	4,6	6,7
	45-64	7,4	8,3	6,4	7,0	7,8
	65-74	9,0	9,2	7,6	10,9	8,2
	>=75	15,6	13,7	19,0	20,4	25,8
Ambos sexos	Total	8,3	9,3	7,9	8,3	7,3
	0-14	13,3	13,6	11,3	0,0	.
	15-24	9,7	10,6	11,0	9,0	8,8
	25-44	7,4	6,2	5,8	8,9	6,3
	45-64	6,8	7,3	5,9	6,7	7,3
	65-74	7,1	7,6	5,8	7,3	6,9
	>=75	12,6	10,9	15,9	14,9	19,9

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población*según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Hombres Total	CAPV	N	18.741	1.044	6.223	17.880	3.191	23.746	19.309	90.135
		%	20,8	1,2	6,9	19,8	3,5	26,3	21,4	100,0
	Araba	N	1.442	289	1.367	2.362	442	3.983	1.746	11.632
		%	12,4	2,5	11,8	20,3	3,8	34,2	15,0	100,0
	Gipuzkoa	N	5.184	226	1.063	5.836	909	9.719	6.578	29.515
		%	17,6	0,8	3,6	19,8	3,1	32,9	22,3	100,0
	Bizkaia	N	12.115	529	3.794	9.682	1.840	10.043	10.986	48.988
		%	24,7	1,1	7,7	19,8	3,8	20,5	22,4	100,0
0-14	CAPV	N	3.362	.	.	.	2.560	5.897	5.867	17.686
		%	19,0	.	.	.	14,5	33,3	33,2	100,0
	Araba	N	111	.	.	.	340	375	547	1.373
		%	8,1	.	.	.	24,8	27,3	39,8	100,0
	Gipuzkoa	N	601	.	.	.	785	2.370	2.594	6.350
		%	9,5	.	.	.	12,4	37,3	40,9	100,0
	Bizkaia	N	2.651	.	.	.	1.435	3.153	2.726	9.964
		%	26,6	.	.	.	14,4	31,6	27,4	100,0
15-24	CAPV	N	576	.	706	751	631	7.138	1.299	11.101
		%	5,2	.	6,4	6,8	5,7	64,3	11,7	100,0
	Araba	N	413	.	201	104	102	1.797	97	2.714
		%	15,2	.	7,4	3,8	3,8	66,2	3,6	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población* según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Hombres 15-24	Gipuzkoa	N	162	.	.	647	125	2.264	326	3.524
		%	4,6	.	.	18,4	3,5	64,2	9,3	100,0
	Bizkaia	N	.	.	505	.	405	3.078	875	4.863
		%	.	.	10,4	.	8,3	63,3	18,0	100,0
25-44	CAPV	N	5.050	712	4.919	10.459	.	6.865	3.507	31.510
		%	16,0	2,3	15,6	33,2	.	21,8	11,1	100,0
	Araba	N	193	197	894	1.047	.	1.236	462	4.031
		%	4,8	4,9	22,2	26,0	.	30,7	11,5	100,0
	Gipuzkoa	N	2.120	226	870	3.479	.	3.337	967	10.999
		%	19,3	2,1	7,9	31,6	.	30,3	8,8	100,0
	Bizkaia	N	2.737	288	3.155	5.932	.	2.292	2.078	16.481
		%	16,6	1,7	19,1	36,0	.	13,9	12,6	100,0
45-64	CAPV	N	4.357	92	391	6.670	.	2.886	4.139	18.535
		%	23,5	0,5	2,1	36,0	.	15,6	22,3	100,0
	Araba	N	194	92	198	1.211	.	416	258	2.368
		%	8,2	3,9	8,4	51,1	.	17,6	10,9	100,0
	Gipuzkoa	N	1.166	.	193	1.710	.	1.221	1.400	5.691
		%	20,5	.	3,4	30,1	.	21,5	24,6	100,0
	Bizkaia	N	2.997	.	.	3.750	.	1.249	2.481	10.476
		%	28,6	.	.	35,8	.	11,9	23,7	100,0
65-74	CAPV	N	2.120	109	208	.	.	668	1.610	4.715

(continuación)

* Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población* según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total	
Hombres	65-74	CAPV	%	45,0	2,3	4,4	.	.	14,2	34,1	100,0
		Araba	N	80	.	74	.	.	74	295	522
			%	15,3	.	14,2	.	.	14,1	56,4	100,0
		Gipuzkoa	N	443	321	504	1.268
			%	35,0	25,3	39,7	100,0
		Bizkaia	N	1.597	109	134	.	.	273	812	2.925
		%	54,6	3,7	4,6	.	.	9,3	27,7	100,0	
		>=75	CAPV	N	3.276	131	.	.	292	2.888	6.588
			%	49,7	2,0	.	.	.	4,4	43,8	100,0
	Araba		N	451	86	88	625
			%	72,2	13,7	14,1	100,0
	Gipuzkoa		N	692	206	786	1.684
	%		41,1	12,2	46,7	100,0	
		Bizkaia	N	2.134	131	.	.	.	2.013	4.278	
			%	49,9	3,1	.	.	.	47,1	100,0	
Mujeres	Total	CAPV	N	35.407	1.783	4.940	8.226	3.578	8.798	28.677	91.409
			%	38,7	2,0	5,4	9,0	3,9	9,6	31,4	100,0
		Araba	N	3.655	339	903	944	154	1.557	2.994	10.545
		%	34,7	3,2	8,6	9,0	1,5	14,8	28,4	100,0	
		Gipuzkoa	N	10.458	519	1.697	2.508	1.766	3.884	11.000	31.831
		%	32,9	1,6	5,3	7,9	5,5	12,2	34,6	100,0	

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población* según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Total	Bizkaia	N	21.294	925	2.340	4.774	1.658	3.358	14.684	49.033
		%	43,4	1,9	4,8	9,7	3,4	6,8	29,9	100,0
0-14	CAPV	N	2.544	.	.	.	2.506	4.028	3.625	12.704
		%	20,0	.	.	.	19,7	31,7	28,5	100,0
	Araba	N	154	997	543	1.695
		%	9,1	58,8	32,1	100,0
	Gipuzkoa	N	1.501	.	.	.	1.556	1.233	1.290	5.580
		%	26,9	.	.	.	27,9	22,1	23,1	100,0
	Bizkaia	N	1.044	.	.	.	796	1.798	1.792	5.429
		%	19,2	.	.	.	14,7	33,1	33,0	100,0
15-24	CAPV	N	463	100	1.252	393	863	1.507	1.994	6.571
		%	7,0	1,5	19,0	6,0	13,1	22,9	30,3	100,0
	Araba	N	123	.	271	.	.	334	123	851
		%	14,4	.	31,9	.	.	39,2	14,4	100,0
	Gipuzkoa	N	131	100	399	131	.	521	599	1.881
		%	7,0	5,3	21,2	7,0	.	27,7	31,8	100,0
	Bizkaia	N	209	.	581	262	863	652	1.272	3.839
		%	5,4	.	15,1	6,8	22,5	17,0	33,1	100,0
	CAPV	N	4.191	158	2.361	4.797	210	1.297	4.175	17.187
		%	24,4	0,9	13,7	27,9	1,2	7,5	24,3	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población* según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total	
Mujeres	25-44	Araba	N	274	158	551	581	.	.	557	2.120	
			%	12,9	7,4	26,0	27,4	.	.	26,3	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.962	.	930	1.542	210	994	1.515	7.153	
	%		27,4	.	13,0	21,6	2,9	13,9	21,2	100,0		
		Bizkaia	N	1.955	.	880	2.674	.	302	2.103	7.914	
	%		24,7	.	11,1	33,8	.	3,8	26,6	100,0		
		45-64	CAPV	N	8.980	760	710	2.925	.	1.180	8.380	22.936
	%			39,2	3,3	3,1	12,8	.	5,1	36,5	100,0	
		Araba	N	1.095	181	.	363	.	225	867	2.732	
	%		40,1	6,6	.	13,3	.	8,2	31,7	100,0		
		Gipuzkoa	N	2.364	310	154	724	.	600	3.362	7.515	
	%		31,5	4,1	2,0	9,6	.	8,0	44,7	100,0		
	Bizkaia	N	5.521	269	556	1.839	.	354	4.151	12.689		
%		43,5	2,1	4,4	14,5	.	2,8	32,7	100,0			
	65-74	CAPV	N	4.586	506	81	111	.	436	4.123	9.842	
%			46,6	5,1	0,8	1,1	.	4,4	41,9	100,0		
	Araba	N	815	.	81	.	.	.	456	1.352		
%		60,3	.	6,0	.	.	.	33,8	100,0			
	Gipuzkoa	N	1.131	.	.	111	.	184	1.415	2.841		
%		39,8	.	.	3,9	.	6,5	49,8	100,0			

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población* según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total	
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	2.640	506	.	.	.	251	2.252	5.649	
			%	46,7	9,0	.	.	.	4,4	39,9	100,0	
	>=75	CAPV	N	14.642	260	536	.	.	351	6.381	22.169	
			%	66,0	1,2	2,4	.	.	1,6	28,8	100,0	
		Araba	N	1.348	447	1.795	
			%	75,1	24,9	100,0	
		Gipuzkoa	N	3.368	109	213	.	.	351	2.818	6.859	
			%	49,1	1,6	3,1	.	.	5,1	41,1	100,0	
	Bizkaia	N	9.927	151	323	.	.	.	3.115	13.515		
		%	73,4	1,1	2,4	.	.	.	23,0	100,0		
	Ambos	Total	CAPV	N	54.148	2.827	11.163	26.106	6.769	32.544	47.987	181.544
				%	29,8	1,6	6,1	14,4	3,7	17,9	26,4	100,0
Araba		N	5.098	628	2.270	3.306	596	5.540	4.740	22.177		
		%	23,0	2,8	10,2	14,9	2,7	25,0	21,4	100,0		
Gipuzkoa		N	15.642	745	2.760	8.344	2.675	13.603	17.577	61.346		
		%	25,5	1,2	4,5	13,6	4,4	22,2	28,7	100,0		
Bizkaia		N	33.409	1.454	6.134	14.456	3.498	13.401	25.669	98.021		
		%	34,1	1,5	6,3	14,7	3,6	13,7	26,2	100,0		
0-14		CAPV	N	5.907	.	.	.	5.066	9.926	9.492	30.390	
			%	19,4	.	.	.	16,7	32,7	31,2	100,0	

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población *según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Ambos	0-14	Araba	N	111	.	.	.	494	1.372	1.090	3.067
			%	3,6	.	.	.	16,1	44,7	35,5	100,0
		Gipuzkoa	N	2.102	.	.	.	2.341	3.603	3.885	11.930
			%	17,6	.	.	.	19,6	30,2	32,6	100,0
		Bizkaia	N	3.694	.	.	.	2.231	4.950	4.517	15.393
			%	24,0	.	.	.	14,5	32,2	29,3	100,0
	15-24	CAPV	N	1.039	100	1.958	1.144	1.494	8.645	3.292	17.671
			%	5,9	0,6	11,1	6,5	8,5	48,9	18,6	100,0
		Araba	N	536	.	472	104	102	2.130	220	3.565
			%	15,0	.	13,2	2,9	2,9	59,8	6,2	100,0
		Gipuzkoa	N	293	100	399	778	125	2.785	925	5.405
			%	5,4	1,9	7,4	14,4	2,3	51,5	17,1	100,0
		Bizkaia	N	209	.	1.086	262	1.267	3.730	2.147	8.701
			%	2,4	.	12,5	3,0	14,6	42,9	24,7	100,0
	25-44	CAPV	N	9.241	869	7.280	15.255	210	8.161	7.682	48.697
			%	19,0	1,8	14,9	31,3	0,4	16,8	15,8	100,0
		Araba	N	468	355	1.445	1.628	.	1.236	1.019	6.151
			%	7,6	5,8	23,5	26,5	.	20,1	16,6	100,0
		Gipuzkoa	N	4.082	226	1.800	5.021	210	4.331	2.482	18.152
			%	22,5	1,2	9,9	27,7	1,2	23,9	13,7	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población* según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Ambos	25-44	Bizkaia	N	4.691	288	4.035	8.606	.	2.594	4.181	24.395
			%	19,2	1,2	16,5	35,3	.	10,6	17,1	100,0
	45-64	CAPV	N	13.337	852	1.101	9.596	.	4.065	12.520	41.471
			%	32,2	2,1	2,7	23,1	.	9,8	30,2	100,0
		Araba	N	1.289	273	198	1.573	.	641	1.125	5.099
			%	25,3	5,3	3,9	30,9	.	12,6	22,1	100,0
		Gipuzkoa	N	3.531	310	347	2.434	.	1.822	4.762	13.206
			%	26,7	2,3	2,6	18,4	.	13,8	36,1	100,0
		Bizkaia	N	8.517	269	556	5.588	.	1.603	6.632	23.165
			%	36,8	1,2	2,4	24,1	.	6,9	28,6	100,0
	65-74	CAPV	N	6.707	615	289	111	.	1.103	5.733	14.557
			%	46,1	4,2	2,0	0,8	.	7,6	39,4	100,0
		Araba	N	895	.	155	.	.	74	751	1.875
			%	47,7	.	8,3	.	.	3,9	40,1	100,0
		Gipuzkoa	N	1.574	.	.	111	.	505	1.918	4.109
			%	38,3	.	.	2,7	.	12,3	46,7	100,0
		Bizkaia	N	4.237	615	134	.	.	524	3.063	8.574
			%	49,4	7,2	1,6	.	.	6,1	35,7	100,0
	>=75	CAPV	N	17.918	391	536	.	.	643	9.268	28.757
			%	62,3	1,4	1,9	.	.	2,2	32,2	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población* según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Ambos	>=75	Araba	N	1.799	86	535	2.420
			%	74,3	3,5	22,1	100,0
		Gipuzkoa	N	4.059	109	213	.	.	557	3.605	8.544
			%	47,5	1,3	2,5	.	.	6,5	42,2	100,0
		Bizkaia	N	12.060	282	323	.	.	.	5.129	17.793
			%	67,8	1,6	1,8	.	.	.	28,8	100,0

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población*según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Hombres	Total	Total	N 18.741	1.044	6.223	17.880	3.191	23.746	19.309	90.135
			% 20,8	1,2	6,9	19,8	3,5	26,3	21,4	100,0
	I	Total	N 2.392	555	479	526	758	4.903	3.167	12.779
			% 18,7	4,3	3,7	4,1	5,9	38,4	24,8	100,0
	II	Total	N 1.817	.	824	1.110	199	2.206	2.851	9.008
			% 20,2	.	9,1	12,3	2,2	24,5	31,7	100,0
	III	Total	N 3.913	92	1.524	3.235	495	7.723	4.163	21.145
			% 18,5	0,4	7,2	15,3	2,3	36,5	19,7	100,0
	IV	Total	N 9.805	109	2.247	10.943	1.477	8.293	7.664	40.539
			% 24,2	0,3	5,5	27,0	3,6	20,5	18,9	100,0
	V	Total	N 814	288	1.149	2.066	263	620	1.465	6.665
			% 12,2	4,3	17,2	31,0	3,9	9,3	22,0	100,0
	0-14	Total	N 3.362	.	.	.	2.560	5.897	5.867	17.686
			% 19,0	.	.	.	14,5	33,3	33,2	100,0
	I	Total	N 915	.	.	.	588	992	1.112	3.607
			% 25,4	.	.	.	16,3	27,5	30,8	100,0
	II	Total	N 111	.	.	.	199	473	1.764	2.547
			% 4,4	.	.	.	7,8	18,6	69,3	100,0
	III	Total	N 1.335	.	.	.	495	2.608	1.088	5.525
			% 24,2	.	.	.	9,0	47,2	19,7	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población * según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Hombres 0-14	IV	N	1.001	.	.	.	1.016	1.824	1.241	5.083
		%	19,7	.	.	.	20,0	35,9	24,4	100,0
	V	N	263	.	662	924
		%	28,4	.	71,6	100,0
15-24	Total	N	576	.	706	751	631	7.138	1.299	11.101
		%	5,2	.	6,4	6,8	5,7	64,3	11,7	100,0
	I	N	170	836	225	1.230
		%	13,8	67,9	18,3	100,0
	II	N	162	.	.	104	.	951	.	1.218
		%	13,3	.	.	8,6	.	78,1	.	100,0
	III	N	110	.	269	.	.	2.206	425	3.010
		%	3,7	.	8,9	.	.	73,3	14,1	100,0
	IV	N	303	.	.	487	462	2.895	552	4.699
		%	6,5	.	.	10,4	9,8	61,6	11,8	100,0
	V	N	.	.	437	160	.	251	97	944
		%	.	.	46,3	16,9	.	26,5	10,2	100,0
25-44	Total	N	5.050	712	4.919	10.459	.	6.865	3.507	31.510
		%	16,0	2,3	15,6	33,2	.	21,8	11,1	100,0
	I	N	431	423	479	416	.	1.841	519	4.110
		%	10,5	10,3	11,6	10,1	.	44,8	12,6	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población * según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total	
Hombres	25-44	II	N	197	.	824	235	.	394	290	1.941	
			%	10,2	.	42,5	12,1	.	20,3	14,9	100,0	
		III	N	828	.	954	2.056	.	2.473	783	7.093	
			%	11,7	.	13,4	29,0	.	34,9	11,0	100,0	
		IV	N	3.165	.	1.950	6.224	.	1.914	1.410	14.662	
			%	21,6	.	13,3	42,5	.	13,1	9,6	100,0	
		V	N	429	288	712	1.527	.	242	505	3.704	
			%	11,6	7,8	19,2	41,2	.	6,5	13,6	100,0	
		45-64	Total	N	4.357	92	391	6.670	.	2.886	4.139	18.535
				%	23,5	0,5	2,1	36,0	.	15,6	22,3	100,0
	I	N	465	.	.	110	.	970	543	2.088		
		%	22,3	.	.	5,3	.	46,5	26,0	100,0		
	II	N	606	.	.	771	.	387	504	2.269		
		%	26,7	.	.	34,0	.	17,1	22,2	100,0		
	III	N	732	92	302	1.179	.	252	847	3.405		
		%	21,5	2,7	8,9	34,6	.	7,4	24,9	100,0		
	IV	N	2.397	.	89	4.231	.	1.149	2.043	9.910		
		%	24,2	.	0,9	42,7	.	11,6	20,6	100,0		
	V	N	156	.	.	379	.	127	201	864		
		%	18,1	.	.	43,9	.	14,7	23,3	100,0		
65-74			Total	N	2.120	109	208	.	668	1.610	4.715	

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población * según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total	
Hombres	65-74	Total	%	45,0	2,3	4,4	.	.	14,2	34,1	100,0	
		I	N	249	156	768	1.173	
			%	21,2	13,3	65,5	100,0	
		II	N	360	150	511	
			%	70,6	29,4	100,0	
		III	N	504	112	616	
			%	81,9	18,1	100,0	
		IV	N	778	109	208	.	.	511	580	2.186	
			%	35,6	5,0	9,5	.	.	23,4	26,5	100,0	
		V	N	229	229	
			%	100,0	100,0	
		>=75	Total	N	3.276	131	.	.	.	292	2.888	6.588
			%	49,7	2,0	.	.	.	4,4	43,8	100,0	
		I	N	332	131	.	.	.	107	.	570	
			%	58,2	23,0	.	.	.	18,8	.	100,0	
		II	N	380	142	522	
			%	72,8	27,2	100,0	
		III	N	404	185	908	1.496	
		%	27,0	12,4	60,7	100,0		
	IV	N	2.161	1.838	3.999		
		%	54,0	46,0	100,0		

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población * según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Mujeres	Total	Total	N	35.198	1.783	4.940	8.226	3.578	8.798	28.677	91.200
			%	38,6	2,0	5,4	9,0	3,9	9,6	31,4	100,0
	I	N	N	2.444	147	596	859	225	1.783	3.107	9.161
			%	26,7	1,6	6,5	9,4	2,5	19,5	33,9	100,0
	II	N	N	2.249	209	1.252	720	644	1.821	2.341	9.237
			%	24,4	2,3	13,6	7,8	7,0	19,7	25,3	100,0
	III	N	N	9.658	163	482	1.391	252	2.911	8.047	22.904
			%	42,2	0,7	2,1	6,1	1,1	12,7	35,1	100,0
	IV	N	N	13.780	888	2.053	3.316	1.582	1.731	10.833	34.184
			%	40,3	2,6	6,0	9,7	4,6	5,1	31,7	100,0
	V	N	N	7.067	376	556	1.940	875	552	4.349	15.715
			%	45,0	2,4	3,5	12,3	5,6	3,5	27,7	100,0
	0-14	Total	N	2.544	.	.	.	2.506	4.028	3.625	12.704
			%	20,0	.	.	.	19,7	31,7	28,5	100,0
	I	N	N	669	.	.	.	225	1.022	1.626	3.542
			%	18,9	.	.	.	6,4	28,8	45,9	100,0
	II	N	N	212	.	.	.	379	400	287	1.278
			%	16,6	.	.	.	29,7	31,3	22,4	100,0
	III	N	N	650	.	.	.	252	1.355	753	3.010
			%	21,6	.	.	.	8,4	45,0	25,0	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población * según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Mujeres	0-14	IV	N	1.013	.	.	.	1.190	1.252	959	4.414
			%	22,9	.	.	.	26,9	28,4	21,7	100,0
		V	N	460	.	.	460
			%	100,0	.	.	100,0
	15-24	Total	N	254	100	1.252	393	863	1.507	1.994	6.362
			%	4,0	1,6	19,7	6,2	13,6	23,7	31,3	100,0
		I	N	315	186	501
			%	62,9	37,1	100,0
		II	N	123	100	129	.	265	399	.	1.015
			%	12,1	9,9	12,7	.	26,1	39,3	.	100,0
		III	N	.	.	196	.	.	468	825	1.488
			%	.	.	13,1	.	.	31,4	55,4	100,0
		IV	N	131	.	927	393	392	325	983	3.152
			%	4,2	.	29,4	12,5	12,4	10,3	31,2	100,0
		V	N	205	.	.	205
			%	100,0	.	.	100,0
	25-44	Total	N	4.191	158	2.361	4.797	210	1.297	4.175	17.187
			%	24,4	0,9	13,7	27,9	1,2	7,5	24,3	100,0
		I	N	.	.	396	649	.	217	505	1.767
			%	.	.	22,4	36,7	.	12,3	28,6	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población * según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Mujeres	25-44	II	N	301	.	847	326	.	866	491	2.832
			%	10,6	.	29,9	11,5	.	30,6	17,3	100,0
		III	N	1.055	.	.	877	.	214	1.554	3.700
			%	28,5	.	.	23,7	.	5,8	42,0	100,0
		IV	N	1.772	158	561	1.991	.	.	1.625	6.106
			%	29,0	2,6	9,2	32,6	.	.	26,6	100,0
		V	N	1.063	.	556	952	210	.	.	2.782
			%	38,2	.	20,0	34,2	7,5	.	.	100,0
	45-64	Total	N	8.980	760	710	2.925	.	1.180	8.380	22.936
			%	39,2	3,3	3,1	12,8	.	5,1	36,5	100,0
		I	N	409	147	199	210	.	229	494	1.689
			%	24,2	8,7	11,8	12,4	.	13,6	29,3	100,0
		II	N	682	.	.	393	.	156	494	1.725
			%	39,5	.	.	22,8	.	9,0	28,6	100,0
		III	N	3.526	163	206	514	.	313	2.698	7.420
			%	47,5	2,2	2,8	6,9	.	4,2	36,4	100,0
		IV	N	2.448	450	305	932	.	154	2.513	6.802
			%	36,0	6,6	4,5	13,7	.	2,3	36,9	100,0
		V	N	1.915	.	.	877	.	327	2.181	5.300
			%	36,1	.	.	16,5	.	6,2	41,1	100,0
	65-74	Total	N	4.586	506	81	111	.	436	4.123	9.842

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población * según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Mujeres	65-74	Total	%	46,6	5,1	0,8	1,1	.	4,4	41,9	100,0
		I	N	516	196	713
			%	72,4	27,6	100,0
		II	N	135	376	511
			%	26,5	73,5	100,0
		III	N	1.006	.	81	.	.	310	593	1.989
			%	50,6	.	4,1	.	.	15,6	29,8	100,0
		IV	N	1.669	280	2.258	4.207
			%	39,7	6,7	53,7	100,0
		V	N	1.260	225	.	111	.	126	700	2.422
			%	52,0	9,3	.	4,6	.	5,2	28,9	100,0
	>=75	Total	N	14.642	260	536	.	.	351	6.381	22.169
			%	66,0	1,2	2,4	.	.	1,6	28,8	100,0
		I	N	849	99	948
			%	89,5	10,5	100,0
		II	N	796	109	276	.	.	.	694	1.874
			%	42,4	5,8	14,7	.	.	.	37,0	100,0
		III	N	3.421	253	1.623	5.297
			%	64,6	4,8	30,6	100,0
		IV	N	6.747	.	260	.	.	.	2.496	9.503
			%	71,0	.	2,7	.	.	.	26,3	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población * según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total	
Mujeres	>=75	V	N	2.829	151	.	.	.	98	1.469	4.547
			%	62,2	3,3	.	.	.	2,2	32,3	100,0
Ambos	Total	Total	N	53.939	2.827	11.163	26.106	6.769	32.544	47.987	181.335
			%	29,7	1,6	6,2	14,4	3,7	17,9	26,5	100,0
		I	N	4.836	702	1.075	1.385	983	6.686	6.274	21.940
			%	22,0	3,2	4,9	6,3	4,5	30,5	28,6	100,0
		II	N	4.066	209	2.076	1.830	843	4.026	5.192	18.244
			%	22,3	1,1	11,4	10,0	4,6	22,1	28,5	100,0
		III	N	13.571	254	2.006	4.626	747	10.635	12.209	44.049
			%	30,8	0,6	4,6	10,5	1,7	24,1	27,7	100,0
		IV	N	23.585	997	4.300	14.259	3.059	10.025	18.497	74.722
			%	31,6	1,3	5,8	19,1	4,1	13,4	24,8	100,0
		V	N	7.880	664	1.706	4.006	1.138	1.172	5.814	22.380
			%	35,2	3,0	7,6	17,9	5,1	5,2	26,0	100,0
	0-14	Total	N	5.907	.	.	.	5.066	9.926	9.492	30.390
			%	19,4	.	.	.	16,7	32,7	31,2	100,0
		I	N	1.584	.	.	.	813	2.014	2.739	7.149
			%	22,2	.	.	.	11,4	28,2	38,3	100,0
		II	N	323	.	.	.	578	873	2.051	3.825
			%	8,4	.	.	.	15,1	22,8	53,6	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población * según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Ambos	0-14	III	N	1.986	.	.	.	747	3.963	1.840	8.535
			%	23,3	.	.	.	8,7	46,4	21,6	100,0
		IV	N	2.014	.	.	.	2.205	3.076	2.201	9.497
			%	21,2	.	.	.	23,2	32,4	23,2	100,0
		V	N	723	.	662	1.384
			%	52,2	.	47,8	100,0
	15-24	Total	N	830	100	1.958	1.144	1.494	8.645	3.292	17.462
			%	4,8	0,6	11,2	6,6	8,6	49,5	18,9	100,0
		I	N	170	1.151	410	1.731
			%	9,8	66,5	23,7	100,0
		II	N	285	100	129	104	265	1.350	.	2.234
			%	12,8	4,5	5,8	4,7	11,9	60,5	.	100,0
III	N	110	.	465	.	.	2.673	1.250	4.498		
	%	2,4	.	10,3	.	.	59,4	27,8	100,0		
IV	N	434	.	927	880	854	3.220	1.535	7.850		
	%	5,5	.	11,8	11,2	10,9	41,0	19,6	100,0		
V	N	.	.	437	160	205	251	97	1.149		
	%	.	.	38,0	13,9	17,9	21,8	8,4	100,0		
25-44	Total	N	9.241	869	7.280	15.255	210	8.161	7.682	48.697	
		%	19,0	1,8	14,9	31,3	0,4	16,8	15,8	100,0	

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población * según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Ambos	25-44	I	N	431	423	875	1.065	.	2.059	1.024	5.877
			%	7,3	7,2	14,9	18,1	.	35,0	17,4	100,0
		II	N	499	.	1.672	562	.	1.260	781	4.773
			%	10,4	.	35,0	11,8	.	26,4	16,4	100,0
		III	N	1.882	.	954	2.933	.	2.686	2.337	10.793
			%	17,4	.	8,8	27,2	.	24,9	21,7	100,0
		IV	N	4.936	158	2.511	8.216	.	1.914	3.034	20.768
			%	23,8	0,8	12,1	39,6	.	9,2	14,6	100,0
		V	N	1.492	288	1.269	2.480	210	242	505	6.486
			%	23,0	4,4	19,6	38,2	3,2	3,7	7,8	100,0
	45-64	Total	N	13.337	852	1.101	9.596	.	4.065	12.520	41.471
			%	32,2	2,1	2,7	23,1	.	9,8	30,2	100,0
		I	N	874	147	199	320	.	1.199	1.038	3.778
			%	23,1	3,9	5,3	8,5	.	31,8	27,5	100,0
		II	N	1.289	.	.	1.164	.	543	998	3.994
			%	32,3	.	.	29,1	.	13,6	25,0	100,0
		III	N	4.258	254	508	1.693	.	565	3.546	10.824
			%	39,3	2,4	4,7	15,6	.	5,2	32,8	100,0
		IV	N	4.845	450	394	5.163	.	1.303	4.556	16.711
			%	29,0	2,7	2,4	30,9	.	7,8	27,3	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población * según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total	
Ambos	45-64	V	N	2.071	.	.	1.256	.	454	2.382	6.163
			%	33,6	.	.	20,4	.	7,4	38,7	100,0
	65-74	Total	N	6.707	615	289	111	.	1.103	5.733	14.557
			%	46,1	4,2	2,0	0,8	.	7,6	39,4	100,0
		I	N	765	156	965	1.886
			%	40,6	8,3	51,1	100,0
		II	N	496	526	1.022
			%	48,5	51,5	100,0
		III	N	1.510	.	81	.	.	310	705	2.605
			%	58,0	.	3,1	.	.	11,9	27,1	100,0
		IV	N	2.447	390	208	.	.	511	2.838	6.394
			%	38,3	6,1	3,3	.	.	8,0	44,4	100,0
		V	N	1.489	225	.	111	.	126	700	2.651
			%	56,2	8,5	.	4,2	.	4,8	26,4	100,0
	>=75	Total	N	17.918	391	536	.	.	643	9.268	28.757
			%	62,3	1,4	1,9	.	.	2,2	32,2	100,0
		I	N	1.181	131	.	.	.	107	99	1.519
			%	77,7	8,6	.	.	.	7,1	6,5	100,0
		II	N	1.175	109	276	.	.	.	836	2.396
			%	49,0	4,6	11,5	.	.	.	34,9	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población * según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Ambos	>=75	III	N	3.825	438	2.531	6.794
			%	56,3	6,4	37,3	100,0
	IV	N	8.908	.	260	4.334	13.502
		%	66,0	.	1,9	32,1	100,0
	V	N	2.829	151	98	1.469	4.547
		%	62,2	3,3	2,2	32,3	100,0

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 78. Distribución de la población ** según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total	
Hombres	Total	N	16.167	1.044	6.223	17.880	1.521	22.012	15.407	80.254	
		%	20,1	1,3	7,8	22,3	1,9	27,4	19,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	4.317	398	208	3.298	1.184	5.786	5.410	20.600
		%	21,0	1,9	1,0	16,0	5,7	28,1	26,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.652	226	858	3.368	337	2.733	2.510	12.684
		%	20,9	1,8	6,8	26,6	2,7	21,5	19,8	100,0	
		Secundaria, superior	N	6.334	289	3.804	10.211	.	9.789	4.528	34.955
		%	18,1	0,8	10,9	29,2	.	28,0	13,0	100,0	
		Terciaria	N	2.865	131	1.354	1.003	.	3.704	2.959	12.015
		%	23,8	1,1	11,3	8,3	.	30,8	24,6	100,0	
		0-14 Total	N	788	.	.	.	890	4.163	1.964	7.805
		%	10,1	11,4	53,3	25,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	788	.	.	.	890	3.585	1.841	7.103
		%	11,1	12,5	50,5	25,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	579	124	702
		%	82,4	17,6	100,0
		15-24 Total	N	576	.	706	751	631	7.138	1.299	11.101
		%	5,2	.	6,4	6,8	5,7	64,3	11,7	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	198	.	.	.	295	766	160	1.419	
	%	14,0	20,8	54,0	11,3	100,0	

(continuación)

****Población que ha sufrido lesiones no intencionadas**

***Población de 10 y más años de edad**

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 78. Distribución de la población ** según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total	
Hombres	15-24	Secundaria, inferior	N	.	.	333	322	337	1.718	855	3.565
			%	.	.	9,3	9,0	9,5	48,2	24,0	100,0
		Secundaria, superior	N	377	.	373	429	.	3.533	284	4.996
			%	7,6	.	7,5	8,6	.	70,7	5,7	100,0
		Terciaria	N	1.121	.	1.121
			%	100,0	.	100,0
	25-44	Total	N	5.050	712	4.919	10.459	.	6.865	3.507	31.510
			%	16,0	2,3	15,6	33,2	.	21,8	11,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	307	288	.	1.366	.	.	809	2.770
			%	11,1	10,4	.	49,3	.	.	29,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.065	226	526	1.762	.	.	.	3.579
			%	29,8	6,3	14,7	49,2	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.725	197	3.040	6.897	.	5.343	2.065	20.268
			%	13,4	1,0	15,0	34,0	.	26,4	10,2	100,0
		Terciaria	N	953	.	1.354	433	.	1.522	633	4.894
			%	19,5	.	27,7	8,9	.	31,1	12,9	100,0
	45-64	Total	N	4.357	92	391	6.670	.	2.886	4.139	18.535
			%	23,5	0,5	2,1	36,0	.	15,6	22,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	706	.	.	1.932	.	915	647	4.200
			%	16,8	.	.	46,0	.	21,8	15,4	100,0

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 78. Distribución de la población ** según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N 579	.	.	1.283	.	436	591	2.889
			% 20,0	.	.	44,4	.	15,1	20,4	100,0
		Secundaria, superior	N 2.016	92	391	2.885	.	474	1.525	7.384
			% 27,3	1,2	5,3	39,1	.	6,4	20,7	100,0
		Terciaria	N 1.055	.	.	569	.	1.061	1.376	4.062
			% 26,0	.	.	14,0	.	26,1	33,9	100,0
		65-74 Total	N 2.120	109	208	.	.	668	1.610	4.715
			% 45,0	2,3	4,4	.	.	14,2	34,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N 880	109	208	.	.	336	434	1.967
			% 44,7	5,6	10,6	.	.	17,1	22,1	100,0
		Secundaria, inferior	N 465	105	570
			% 81,6	18,4	100,0
	Secundaria, superior	N 390	332	566	1.288	
		% 30,3	25,8	43,9	100,0	
	Terciaria	N 385	505	890	
		% 43,3	56,7	100,0	
	>=75 Total	N 3.276	131	.	.	.	292	2.888	6.588	
		% 49,7	2,0	.	.	.	4,4	43,8	100,0	
	Sin estudios, primaria	N 1.438	185	1.519	3.142	
		% 45,8	5,9	48,4	100,0	

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 78. Distribución de la población ** según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total	
Hombres >=75	Secundaria, inferior	N	542	836	1.378	
		%	39,4	60,6	100,0	
	Secundaria, superior	N	825	107	88	1.020	
		%	80,9	10,5	8,6	100,0	
	Terciaria	N	471	131	445	1.048	
		%	45,0	12,5	42,5	100,0	
Mujeres	Total	N	33.114	1.783	4.940	8.226	2.591	7.553	26.285	84.492	
		%	39,2	2,1	5,8	9,7	3,1	8,9	31,1	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	15.632	766	151	1.049	1.719	3.461	11.071	33.848	
		%	46,2	2,3	0,4	3,1	5,1	10,2	32,7	100,0	
	Secundaria, inferior	N	6.383	369	806	884	674	1.091	4.113	14.320	
		%	44,6	2,6	5,6	6,2	4,7	7,6	28,7	100,0	
	Secundaria, superior	N	6.970	502	2.210	3.433	198	1.006	5.770	20.089	
		%	34,7	2,5	11,0	17,1	1,0	5,0	28,7	100,0	
	Terciaria	N	4.129	147	1.773	2.860	.	1.995	5.331	16.235	
		%	25,4	0,9	10,9	17,6	.	12,3	32,8	100,0	
	0-14	Total	N	252	.	.	.	1.519	2.783	1.233	5.787
			%	4,3	.	.	.	26,2	48,1	21,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	252	.	.	.	1.304	2.443	1.233	5.232
			%	4,8	.	.	.	24,9	46,7	23,6	100,0

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 78. Distribución de la población ** según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total	
Mujeres	0-14	Secundaria, inferior	N	215	340	.	555
			%	38,7	61,3	.	100,0
	15-24	Total	N	463	100	1.252	393	863	1.507	1.994	6.571
			%	7,0	1,5	19,0	6,0	13,1	22,9	30,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	205	667	100	972
			%	21,1	68,6	10,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	209	100	392	.	459	523	196	1.879
			%	11,1	5,3	20,9	.	24,4	27,8	10,4	100,0
		Secundaria, superior	N	254	.	859	262	198	317	807	2.697
			%	9,4	.	31,9	9,7	7,3	11,8	29,9	100,0
		Terciaria	N	.	.	.	131	.	.	891	1.022
			%	.	.	.	12,8	.	.	87,2	100,0
	25-44	Total	N	4.191	158	2.361	4.797	210	1.297	4.175	17.187
			%	24,4	0,9	13,7	27,9	1,2	7,5	24,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	662	.	.	261	210	.	417	1.549
			%	42,7	.	.	16,8	13,5	.	26,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	753	.	.	411	.	.	274	1.438
			%	52,4	.	.	28,5	.	.	19,1	100,0
		Secundaria, superior	N	1.681	158	1.098	2.161	.	.	1.186	6.283
			%	26,7	2,5	17,5	34,4	.	.	18,9	100,0

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 78. Distribución de la población ** según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Mujeres	25-44	Terciaria	N	1.095	.	1.263	1.964	.	1.297	2.298	7.916
			%	13,8	.	16,0	24,8	.	16,4	29,0	100,0
	45-64	Total	N	8.980	760	710	2.925	.	1.180	8.380	22.936
			%	39,2	3,3	3,1	12,8	.	5,1	36,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.420	.	151	677	.	.	3.236	6.485
			%	37,3	.	2,3	10,4	.	.	49,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.622	269	154	474	.	117	1.264	3.899
			%	41,6	6,9	4,0	12,2	.	3,0	32,4	100,0
		Secundaria, superior	N	3.218	344	.	1.009	.	365	2.640	7.576
			%	42,5	4,5	.	13,3	.	4,8	34,8	100,0
		Terciaria	N	1.720	147	405	765	.	698	1.240	4.977
			%	34,6	3,0	8,1	15,4	.	14,0	24,9	100,0
	65-74	Total	N	4.586	506	81	111	.	436	4.123	9.842
				%	46,6	5,1	0,8	1,1	.	4,4	41,9
		Sin estudios, primaria	N	2.918	506	.	111	.	126	2.088	5.748
			%	50,8	8,8	.	1,9	.	2,2	36,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.076	111	734	1.922
			%	56,0	5,8	38,2	100,0
		Secundaria, superior	N	302	.	81	.	.	198	848	1.429
			%	21,1	.	5,6	.	.	13,9	59,3	100,0

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 78. Distribución de la población ** según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N 291	453	743	
			% 39,1	60,9	100,0	
	>=75	Total	N 14.642	260	536	.	.	351	6.381	22.169	
			% 66,0	1,2	2,4	.	.	1,6	28,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N 9.380	260	.	.	.	225	3.997	13.862	
			% 67,7	1,9	.	.	.	1,6	28,8	100,0	
		Secundaria, inferior	N 2.723	.	260	.	.	.	1.645	4.627	
			% 58,8	.	5,6	.	.	.	35,5	100,0	
		Secundaria, superior	N 1.516	.	172	.	.	126	290	2.104	
			% 72,0	.	8,2	.	.	6,0	13,8	100,0	
		Terciaria	N 1.023	.	104	.	.	.	449	1.576	
			% 64,9	.	6,6	.	.	.	28,5	100,0	
	Ambos	Total	Total	N 49.281	2.827	11.163	26.106	4.112	29.565	41.692	164.746
				% 29,9	1,7	6,8	15,8	2,5	17,9	25,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N 19.949	1.163	359	4.347	2.903	9.246	16.481	54.448	
			% 36,6	2,1	0,7	8,0	5,3	17,0	30,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N 9.035	595	1.664	4.252	1.011	3.824	6.623	27.004	
			% 33,5	2,2	6,2	15,7	3,7	14,2	24,5	100,0	
		Secundaria, superior	N 13.304	791	6.014	13.644	198	10.796	10.298	55.044	
			% 24,2	1,4	10,9	24,8	0,4	19,6	18,7	100,0	
	Terciaria	N 6.994	278	3.126	3.863	.	5.699	8.289	28.249		

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 78. Distribución de la población ** según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Ambos	Total	Terciaria	%	24,8	1,0	11,1	13,7	.	20,2	29,3	100,0
	0-14	Total	N	1.040	.	.	.	2.408	6.947	3.197	13.592
			%	7,6	.	.	.	17,7	51,1	23,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.040	.	.	.	2.194	6.028	3.074	12.335
			%	8,4	.	.	.	17,8	48,9	24,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	215	919	124	1.258
			%	17,1	73,1	9,8	100,0
	15-24	Total	N	1.039	100	1.958	1.144	1.494	8.645	3.292	17.671
			%	5,9	0,6	11,1	6,5	8,5	48,9	18,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	198	.	.	.	500	1.433	260	2.391
			%	8,3	.	.	.	20,9	59,9	10,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	209	100	725	322	796	2.241	1.051	5.444
			%	3,8	1,8	13,3	5,9	14,6	41,2	19,3	100,0
		Secundaria, superior	N	631	.	1.233	691	198	3.850	1.091	7.693
			%	8,2	.	16,0	9,0	2,6	50,0	14,2	100,0
		Terciaria	N	.	.	.	131	.	1.121	891	2.143
			%	.	.	.	6,1	.	52,3	41,6	100,0
	25-44	Total	N	9.241	869	7.280	15.255	210	8.161	7.682	48.697
			%	19,0	1,8	14,9	31,3	0,4	16,8	15,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	969	288	.	1.626	210	.	1.226	4.319
			%	22,4	6,7	.	37,7	4,9	.	28,4	100,0

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 78. Distribución de la población ** según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	1.818	226	526	2.173	.	.	274	5.017
			%	36,2	4,5	10,5	43,3	.	.	5,5	100,0
		Secundaria, superior	N	4.406	355	4.138	9.059	.	5.343	3.251	26.551
			%	16,6	1,3	15,6	34,1	.	20,1	12,2	100,0
		Terciaria	N	2.048	.	2.617	2.397	.	2.818	2.931	12.810
			%	16,0	.	20,4	18,7	.	22,0	22,9	100,0
	45-64	Total	N	13.337	852	1.101	9.596	.	4.065	12.520	41.471
			%	32,2	2,1	2,7	23,1	.	9,8	30,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.126	.	151	2.609	.	915	3.883	10.684
			%	29,3	.	1,4	24,4	.	8,6	36,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.201	269	154	1.757	.	553	1.855	6.788
			%	32,4	4,0	2,3	25,9	.	8,1	27,3	100,0
		Secundaria, superior	N	5.234	436	391	3.895	.	839	4.165	14.960
			%	35,0	2,9	2,6	26,0	.	5,6	27,8	100,0
		Terciaria	N	2.775	147	405	1.335	.	1.759	2.617	9.039
			%	30,7	1,6	4,5	14,8	.	19,5	29,0	100,0
	65-74	Total	N	6.707	615	289	111	.	1.103	5.733	14.557
			%	46,1	4,2	2,0	0,8	.	7,6	39,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.798	615	208	111	.	462	2.522	7.715
			%	49,2	8,0	2,7	1,4	.	6,0	32,7	100,0

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 78. Distribución de la población ** según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público	Total
Ambos	65-74	Secundaria, inferior	N 1.541	111	840	2.492
			% 61,8	4,5	33,7	100,0
		Secundaria, superior	N 692	.	81	.	.	530	1.414	2.717
			% 25,5	.	3,0	.	.	19,5	52,0	100,0
		Terciaria	N 676	958	1.633
			% 41,4	58,6	100,0
	>=75	Total	N 17.918	391	536	.	.	643	9.268	28.757
			% 62,3	1,4	1,9	.	.	2,2	32,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N 10.818	260	.	.	.	410	5.516	17.004
			% 63,6	1,5	.	.	.	2,4	32,4	100,0
		Secundaria, inferior	N 3.265	.	260	.	.	.	2.481	6.005
			% 54,4	.	4,3	.	.	.	41,3	100,0
		Secundaria, superior	N 2.340	.	172	.	.	234	378	3.124
			% 74,9	.	5,5	.	.	7,5	12,1	100,0
	Terciaria	N 1.495	131	104	.	.	.	894	2.624	
		% 57,0	5,0	4,0	.	.	.	34,1	100,0	

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 79. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias* por sexo y edad

	Hombres							Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Disminuir o suspender sus actividades	57,1	48,2	75,0	62,7	54,8	40,1	43,4	57,9	67,5	62,7	49,4	59,3	56,5	56,7
Consultar al/la médico/a	55,2	44,9	53,6	56,4	57,3	68,0	64,8	68,9	73,0	47,1	66,4	71,3	69,3	72,3
Asistencia en urgencias	67,9	76,1	69,0	70,5	59,0	59,1	64,0	58,3	63,3	72,6	60,4	52,3	47,7	60,2
Ingreso hospitalario	7,7	5,7	7,5	4,8	9,8	16,7	15,3	7,1	0,0	6,8	2,4	4,9	9,9	16,0
Ingreso en UCI	1,0	0,0	0,0	0,7	2,3	5,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,0
Secuelas físicas o mentales	8,3	1,1	8,5	10,1	11,1	14,8	5,9	12,4	1,8	4,9	13,0	12,8	13,7	19,2

*Las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 80. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias* por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			0-14			15-24		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Disminuir o suspender sus actividades	67,7	59,1	53,4	58,7	48,1	46,7	65,6	79,4	77,0
Consultar al/la médico/a	62,5	50,7	56,2	60,0	46,6	41,7	45,8	39,6	68,2
Asistencia en urgencias	66,5	66,8	69,0	49,8	81,4	76,4	76,8	75,7	59,8
Ingreso hospitalario	11,8	7,6	6,8	0,0	6,2	6,1	4,1	14,1	4,5
Ingreso en UCI	1,2	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	2,9	11,9	7,5	0,0	3,1	0,0	0,0	8,4	13,2

	25-44			45-64			65-74		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Disminuir o suspender sus actividades	69,5	67,1	57,9	67,3	50,9	54,1	85,9	49,3	27,9
Consultar al/la médico/a	74,0	52,8	54,2	65,2	51,6	58,7	56,9	69,2	69,5
Asistencia en urgencias	63,2	63,2	77,2	63,9	51,8	61,9	70,6	65,0	54,4
Ingreso hospitalario	16,2	3,4	2,9	7,3	4,5	13,2	27,5	17,2	14,6
Ingreso en UCI	0,0	1,9	0,0	0,0	2,2	2,9	27,5	0,0	4,6
Secuelas físicas o mentales	0,0	16,3	8,6	7,6	12,2	11,3	14,2	17,9	13,6

	>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Disminuir o suspender sus actividades	71,7	42,1	39,8
Consultar al/la médico/a	57,5	59,3	68,1
Asistencia en urgencias	86,3	70,9	58,0
Ingreso hospitalario	45,7	29,9	5,0
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	15,0	17,7	0,0

*Las categorías no son excluyentes

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 80. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias* por sexo, edad y territorio histórico

	Total			0-14			15-24		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Disminuir o suspender sus actividades	70,4	55,4	56,9	75,7	52,9	80,0	68,6	66,4	59,8
Consultar al/la médico/a	75,8	62,0	71,8	72,2	65,8	80,7	68,6	40,5	45,7
Asistencia en urgencias	64,4	55,7	58,6	84,4	54,1	66,0	60,3	65,3	78,6
Ingreso hospitalario	8,4	4,1	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	4,5	14,6	12,7	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	8,3

	25-44			45-64			65-74		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Disminuir o suspender sus actividades	65,4	54,0	41,0	66,3	58,0	58,6	74,5	47,8	56,5
Consultar al/la médico/a	70,6	54,3	76,2	79,2	63,9	74,1	87,0	59,6	69,9
Asistencia en urgencias	61,4	65,5	55,6	58,3	54,0	50,0	46,0	37,8	53,2
Ingreso hospitalario	0,0	5,7	0,0	8,6	3,4	4,9	21,7	0,0	12,1
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	6,0	25,7	3,4	6,1	14,3	13,5	0,0	12,0	17,9

	>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Disminuir o suspender sus actividades	75,4	56,1	54,5
Consultar al/la médico/a	74,8	71,9	72,2
Asistencia en urgencias	74,5	53,6	61,7
Ingreso hospitalario	20,0	9,3	18,8
Ingreso en UCI	0,0	0,0	1,6
Secuelas físicas o mentales	9,8	20,2	19,9

*Las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 81. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias* por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					0-14					15-24				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Disminuir o suspender sus actividades	55,6	56,9	59,0	56,5	58,3	44,9	39,6	50,6	47,9	71,6	86,8	71,9	85,8	63,0	89,0
Consultar al/la médico/a	51,3	51,7	63,3	52,3	58,9	41,9	27,7	50,4	48,9	49,0	27,8	61,8	38,5	63,6	75,1
Asistencia en urgencias	71,2	61,8	71,1	65,8	73,0	84,2	79,9	76,6	63,7	100,0	86,2	41,5	79,7	63,1	77,0
Ingreso hospitalario	14,4	7,0	6,4	6,9	5,4	15,1	0,0	0,0	9,0	0,0	35,9	0,0	12,9	0,0	0,0
Ingreso en UCI	1,1	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	8,1	8,5	8,7	8,9	3,6	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	0,0	4,3	8,7	0,0

	25-44					45-64					65-74				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Disminuir o suspender sus actividades	79,6	100,0	68,8	54,8	43,4	26,0	39,4	34,2	69,7	76,8	22,8	51,9	35,8	46,8	48,9
Consultar al/la médico/a	47,8	51,3	75,6	50,7	53,0	76,3	56,8	69,1	47,4	79,3	68,4	77,1	100,0	58,7	48,9
Asistencia en urgencias	70,6	79,1	75,5	66,7	70,9	37,2	42,8	52,7	71,0	41,4	64,1	74,8	46,2	52,0	100,0
Ingreso hospitalario	10,3	0,0	7,7	3,8	0,0	0,0	16,0	0,0	11,2	41,4	11,5	51,9	22,9	11,3	0,0
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	11,5	0,0	0,0	6,6	0,0
Secuelas físicas o mentales	7,5	11,4	17,1	8,2	6,5	0,0	12,3	5,5	16,2	0,0	11,9	51,9	18,1	8,4	0,0

	>=75				
	I	II	III	IV	V
Disminuir o suspender sus actividades	59,4	27,2	57,4	38,0	.
Consultar al/la médico/a	59,4	100,0	72,4	58,2	.
Asistencia en urgencias	100,0	27,2	66,9	62,5	.
Ingreso hospitalario	52,5	0,0	19,6	10,3	.
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Secuelas físicas o mentales	0,0	0,0	13,0	4,9	.

*Las categorías no son excluyentes

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 81. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias* por sexo, edad y clase social

	Total					0-14					15-24				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Mujeres															
Disminuir o suspender sus actividades	60,6	50,3	54,8	61,3	58,7	71,2	43,3	78,3	66,0	50,0	70,5	74,2	66,5	57,2	100,0
Consultar al/la médico/a	73,7	63,6	67,1	69,5	71,3	78,6	35,1	70,2	83,9	50,0	55,6	34,9	57,7	50,4	0,0
Asistencia en urgencias	56,3	71,3	51,4	61,5	54,2	61,2	100,0	67,0	58,3	0,0	52,3	86,8	64,6	72,8	100,0
Ingreso hospitalario	4,1	2,1	8,0	8,4	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	0,0	0,0
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	6,9	11,3	9,3	16,1	13,1	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	13,1	4,4	0,0
	25-44					45-64					65-74				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Disminuir o suspender sus actividades	42,9	50,4	38,6	56,2	52,0	52,5	65,7	56,4	62,1	60,0	84,2	23,5	44,6	59,1	60,5
Consultar al/la médico/a	73,7	69,4	67,0	62,7	65,8	77,4	70,3	68,5	66,9	79,6	62,5	23,5	66,1	67,4	86,8
Asistencia en urgencias	64,0	81,5	36,9	66,9	54,0	48,5	50,0	43,0	59,5	58,3	57,2	76,5	57,1	46,5	33,4
Ingreso hospitalario	12,3	0,0	0,0	3,2	0,0	4,9	6,8	1,2	5,5	8,8	11,7	0,0	0,0	18,3	5,2
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	13,2	24,5	7,4	12,6	9,7	24,2	9,0	4,0	20,4	13,2	0,0	0,0	5,6	21,8	13,3
						>=75									
						I	II	III	IV	V					
Disminuir o suspender sus actividades						43,1	34,9	51,2	64,2	59,2					
Consultar al/la médico/a						70,8	94,4	66,6	76,2	62,0					
Asistencia en urgencias						39,7	46,0	58,7	64,1	64,0					
Ingreso hospitalario						0,0	4,3	24,5	16,4	13,3					
Ingreso en UCI						0,0	0,0	0,0	2,3	0,0					
Secuelas físicas o mentales						0,0	10,1	23,7	21,5	16,8					

*Las categorías no son excluyentes

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 82. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios***

Hombres

	Total				0-14		15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Disminuir o suspender sus actividades	55,1	59,3	61,9	59,2	64,2	17,6	51,0	82,9	77,4	69,4
Consultar al/la médico/a	53,7	60,3	52,9	71,5	45,9	100,0	44,2	68,0	39,0	85,2
Asistencia en urgencias	62,5	62,7	72,5	57,3	69,0	53,1	39,0	75,2	74,0	64,5
Ingreso hospitalario	9,3	10,1	7,7	6,2	9,2	0,0	11,7	7,8	0,0	34,5
Ingreso en UCI	0,7	1,2	1,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	7,9	6,8	9,4	14,2	2,8	0,0	0,0	11,5	4,6	26,4

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 82. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios***

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Disminuir o suspender sus actividades	49,5	51,4	61,4	83,6	67,1	64,3	53,3	38,1
Consultar al/la médico/a	84,3	51,5	51,8	63,0	45,4	45,5	58,2	76,4
Asistencia en urgencias	66,4	56,3	73,1	72,2	56,8	59,6	70,7	38,7
Ingreso hospitalario	5,3	10,0	5,0	0,0	14,0	8,3	11,5	3,2
Ingreso en UCI	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	5,4	1,9	3,2
Secuelas físicas o mentales	9,2	0,0	10,1	18,0	17,8	5,4	10,1	10,3

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 82. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios***

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Disminuir o suspender sus actividades	45,4	32,2	42,3	30,0	31,5	40,6	86,8	40,6
Consultar al/la médico/a	73,3	57,6	62,0	71,7	47,6	75,3	91,4	76,8
Asistencia en urgencias	46,7	86,0	77,0	43,2	72,3	48,6	59,3	63,8
Ingreso hospitalario	13,1	18,2	22,6	15,2	3,1	21,6	50,7	8,8
Ingreso en UCI	7,3	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	22,3	0,0	11,7	12,5	0,0	21,6	9,2	0,0

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 82. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios***

Mujeres

	Total				0-14				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Disminuir o suspender sus actividades	66,7	54,2	58,3	47,1	91,3	100,0	.	.	86,2	57,9	61,9	52,5
Consultar al/la médico/a	73,2	66,9	65,9	63,8	74,5	61,6	.	.	41,0	39,6	58,0	39,6
Asistencia en urgencias	57,0	49,2	58,7	64,5	64,4	0,0	.	.	45,2	68,4	80,3	87,2
Ingreso hospitalario	9,6	8,3	5,4	6,0	0,0	0,0	.	.	0,0	9,4	0,0	26,1
Ingreso en UCI	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	17,2	10,3	10,4	12,0	4,4	0,0	.	.	0,0	9,4	0,0	13,5

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 82. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios***

	Mujeres							
	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Disminuir o suspender sus actividades	56,3	47,6	59,0	40,8	70,7	48,8	53,0	62,4
Consultar al/la médico/a	63,6	76,5	74,9	58,3	74,5	71,7	65,0	76,5
Asistencia en urgencias	57,1	42,6	53,5	69,8	53,5	44,8	53,2	55,5
Ingreso hospitalario	0,0	0,0	3,1	2,7	5,4	6,8	4,0	4,0
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	17,6	0,0	16,3	12,0	17,9	14,3	6,5	14,6

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 82. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios***

	Mujeres							
	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Disminuir o suspender sus actividades	63,2	46,0	56,5	31,3	56,8	57,2	72,2	33,8
Consultar al/la médico/a	74,4	74,5	53,4	46,5	74,8	69,5	60,3	75,1
Asistencia en urgencias	50,1	40,6	44,6	53,5	59,6	55,9	76,2	56,4
Ingreso hospitalario	11,9	15,2	0,0	0,0	15,9	10,0	27,6	18,3
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	19,2	0,0	17,5	0,0	22,0	16,0	15,9	8,4

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 83. Distribución de la población*según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Hombres Total	CAPV	N	44.845	24.022	13.651	1.959	591	410	259	922	3.305	89.964
		%	49,8	26,7	15,2	2,2	0,7	0,5	0,3	1,0	3,7	100,0
	Araba	N	6.197	3.759	1.412	80	102	11.550
		%	53,7	32,5	12,2	0,7	0,9	100,0
	Gipuzkoa	N	15.765	7.912	4.260	939	226	210	.	.	330	29.643
		%	53,2	26,7	14,4	3,2	0,8	0,7	.	.	1,1	100,0
	Bizkaia	N	22.882	12.351	7.979	940	263	201	259	922	2.975	48.772
		%	46,9	25,3	16,4	1,9	0,5	0,4	0,5	1,9	6,1	100,0
0-14	CAPV	N	9.707	5.501	1.344	260	.	.	259	.	615	17.686
		%	54,9	31,1	7,6	1,5	.	.	1,5	.	3,5	100,0
	Araba	N	875	498	1.373
		%	63,7	36,3	100,0
	Gipuzkoa	N	3.614	2.538	197	6.350
		%	56,9	40,0	3,1	100,0
	Bizkaia	N	5.218	2.466	1.147	260	.	.	259	.	615	9.964
		%	52,4	24,7	11,5	2,6	.	.	2,6	.	6,2	100,0
15-24	CAPV	N	4.695	4.714	1.062	162	102	.	.	.	365	11.101
		%	42,3	42,5	9,6	1,5	0,9	.	.	.	3,3	100,0
	Araba	N	1.253	1.051	308	.	102	2.714
		%	46,2	38,7	11,4	.	3,8	100,0
	Gipuzkoa	N	1.594	1.283	325	162	160	3.524
		%	45,2	36,4	9,2	4,6	4,5	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 83. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Hombres 15-24	Bizkaia	N	1.848	2.380	429	205	4.863
		%	38,0	48,9	8,8	4,2	100,0
25-44	CAPV	N	12.576	8.807	6.831	949	489	210	.	481	1.168	31.510
		%	39,9	28,0	21,7	3,0	1,6	0,7	.	1,5	3,7	100,0
	Araba	N	1.670	1.431	929	4.031
		%	41,4	35,5	23,0	100,0
	Gipuzkoa	N	5.243	2.567	2.106	647	226	210	.	.	.	10.999
		%	47,7	23,3	19,1	5,9	2,1	1,9	.	.	.	100,0
	Bizkaia	N	5.663	4.809	3.795	302	263	.	.	481	1.168	16.481
		%	34,4	29,2	23,0	1,8	1,6	.	.	2,9	7,1	100,0
45-64	CAPV	N	9.489	3.730	3.701	379	.	201	.	331	749	18.580
		%	51,1	20,1	19,9	2,0	.	1,1	.	1,8	4,0	100,0
	Araba	N	1.489	621	175	2.286
		%	65,2	27,2	7,6	100,0
	Gipuzkoa	N	3.217	1.100	1.202	129	171	5.818
		%	55,3	18,9	20,7	2,2	2,9	100,0
	Bizkaia	N	4.783	2.009	2.324	249	.	201	.	331	579	10.476
		%	45,7	19,2	22,2	2,4	.	1,9	.	3,2	5,5	100,0
65-74	CAPV	N	2.609	1.050	470	209	.	.	.	109	269	4.715
		%	55,3	22,3	10,0	4,4	.	.	.	2,3	5,7	100,0
	Araba	N	373	70	.	80	522
		%	71,4	13,3	.	15,3	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 83. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

		Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total		
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	516	425	327	1.268		
		%	40,7	33,5	25,8	100,0		
		Bizkaia	N	1.719	556	144	129	.	.	109	269	2.925	
		%	58,8	19,0	4,9	4,4	.	.	.	3,7	9,2	100,0	
	>=75	CAPV	N	5.769	220	243	140	6.372	
		%	90,5	3,5	3,8	2,2	100,0	
		Araba	N	537	88	625	
		%	85,9	14,1	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.582	.	103	1.684	
		%	93,9	.	6,1	100,0	
		Bizkaia	N	3.651	132	140	140	4.063	
		%	89,9	3,3	3,4	3,4	100,0	
Mujeres	Total	CAPV	N	59.795	17.256	5.495	5.391	.	396	563	1.063	1.034	90.993
		%	65,7	19,0	6,0	5,9	.	0,4	0,6	1,2	1,1	100,0	
		Araba	N	7.254	2.139	203	753	10.349
		%	70,1	20,7	2,0	7,3	100,0
		Gipuzkoa	N	22.033	5.041	1.959	1.773	.	396	.	419	.	31.622
		%	69,7	15,9	6,2	5,6	.	1,3	.	1,3	.	100,0	
		Bizkaia	N	30.508	10.076	3.332	2.865	.	.	563	644	1.034	49.023
		%	62,2	20,6	6,8	5,8	.	.	1,1	1,3	2,1	100,0	
	0-14	CAPV	N	8.470	2.761	764	500	12.495
		%	67,8	22,1	6,1	4,0	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 83. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total		
Mujeres	0-14	Araba	N	1.695	1.695		
			%	100,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	3.418	1.736	218	5.372	
			%	63,6	32,3	4,1	100,0	
		Bizkaia	N	3.358	1.025	545	500	5.429	
			%	61,9	18,9	10,0	9,2	100,0	
	15-24	CAPV		N	3.957	2.563	136	123	6.780
				%	58,4	37,8	2,0	1,8
			Araba	N	323	405	.	123	851
				%	38,0	47,6	.	14,4
			Gipuzkoa	N	1.090	655	136	1.881
				%	57,9	34,8	7,2
		Bizkaia	N	2.544	1.503	4.048	
			%	62,9	37,1	100,0
25-44		CAPV		N	6.391	6.147	2.243	1.277	.	169	.	.	209	594	17.030
				%	37,5	36,1	13,2	7,5	.	1,0	.	.	1,2	3,5	.
			Araba	N	784	1.031	.	147	1.963
				%	39,9	52,6	.	7,5
		Gipuzkoa	N	3.407	1.366	1.140	863	.	169	.	.	209	.	7.153	
			%	47,6	19,1	15,9	12,1	.	2,4	.	.	2,9	.	.	100,0
		Bizkaia	N	2.200	3.750	1.103	267	594	7.914	
			%	27,8	47,4	13,9	3,4	7,5	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 83. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	13.979	3.345	2.144	1.826	.	227	384	331	441	22.677
			%	61,6	14,8	9,5	8,1	.	1,0	1,7	1,5	1,9	100,0
		Araba	N	2.039	232	203	219	2.693
			%	75,7	8,6	7,5	8,1	100,0
		Gipuzkoa	N	5.305	992	257	734	.	227	.	.	.	7.515
			%	70,6	13,2	3,4	9,8	.	3,0	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	6.635	2.121	1.684	873	.	.	384	331	441	12.469
			%	53,2	17,0	13,5	7,0	.	.	3,1	2,7	3,5	100,0
	65-74	CAPV	N	7.208	1.190	111	1.333	9.842
			%	73,2	12,1	1,1	13,5	100,0
		Araba	N	711	377	.	264	1.352
			%	52,6	27,9	.	19,5	100,0
		Gipuzkoa	N	2.370	184	111	176	2.841
			%	83,4	6,5	3,9	6,2	100,0
		Bizkaia	N	4.127	628	.	894	5.649
			%	73,1	11,1	.	15,8	100,0
	>=75	CAPV	N	19.790	1.250	97	332	.	.	178	523	.	22.169
			%	89,3	5,6	0,4	1,5	.	.	0,8	2,4	.	100,0
		Araba	N	1.702	93	1.795
			%	94,8	5,2	100,0
		Gipuzkoa	N	6.443	109	97	210	.	6.859
			%	93,9	1,6	1,4	3,1	.	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 83. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Mujeres	>=75	Bizkaia	N	11.644	1.048	.	332	.	.	178	312	.	13.515
			%	86,2	7,8	.	2,5	.	.	1,3	2,3	.	100,0
Ambos	Total	CAPV	N	104.640	41.278	19.146	7.350	591	806	821	1.985	4.339	180.958
			%	57,8	22,8	10,6	4,1	0,3	0,4	0,5	1,1	2,4	100,0
		Araba	N	13.451	5.898	1.615	833	102	21.899
			%	61,4	26,9	7,4	3,8	0,5	100,0
		Gipuzkoa	N	37.799	12.954	6.219	2.712	226	606	.	419	330	61.265
			%	61,7	21,1	10,2	4,4	0,4	1,0	.	0,7	0,5	100,0
		Bizkaia	N	53.390	22.427	11.312	3.806	263	201	821	1.566	4.009	97.794
			%	54,6	22,9	11,6	3,9	0,3	0,2	0,8	1,6	4,1	100,0
	0-14	CAPV	N	18.177	8.262	2.108	760	.	.	259	.	615	30.182
			%	60,2	27,4	7,0	2,5	.	.	0,9	.	2,0	100,0
		Araba	N	2.570	498	3.067
			%	83,8	16,2	100,0
		Gipuzkoa	N	7.032	4.274	416	11.722
			%	60,0	36,5	3,5	100,0
		Bizkaia	N	8.576	3.491	1.692	760	.	.	259	.	615	15.393
			%	55,7	22,7	11,0	4,9	.	.	1,7	.	4,0	100,0
	15-24	CAPV	N	8.652	7.278	1.199	285	102	.	.	.	365	17.880
			%	48,4	40,7	6,7	1,6	0,6	.	.	.	2,0	100,0
		Araba	N	1.576	1.456	308	123	102	3.565
			%	44,2	40,8	8,6	3,4	2,9	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 83. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	2.684	1.938	461	162	160	5.405
			%	49,7	35,9	8,5	3,0	3,0	100,0
		Bizkaia	N	4.392	3.883	429	205	8.910
			%	49,3	43,6	4,8	2,3	100,0
	25-44	CAPV	N	18.967	14.954	9.073	2.226	489	379	.	690	1.761	48.540
			%	39,1	30,8	18,7	4,6	1,0	0,8	.	1,4	3,6	100,0
		Araba	N	2.454	2.463	929	147	5.993
			%	41,0	41,1	15,5	2,5	100,0
		Gipuzkoa	N	8.650	3.932	3.246	1.510	226	379	.	209	.	18.152
			%	47,7	21,7	17,9	8,3	1,2	2,1	.	1,2	.	100,0
		Bizkaia	N	7.863	8.559	4.899	569	263	.	.	481	1.761	24.395
			%	32,2	35,1	20,1	2,3	1,1	.	.	2,0	7,2	100,0
	45-64	CAPV	N	23.468	7.075	5.845	2.205	.	428	384	663	1.190	41.257
			%	56,9	17,1	14,2	5,3	.	1,0	0,9	1,6	2,9	100,0
		Araba	N	3.528	853	378	219	4.978
			%	70,9	17,1	7,6	4,4	100,0
		Gipuzkoa	N	8.522	2.092	1.459	863	.	227	.	.	171	13.334
			%	63,9	15,7	10,9	6,5	.	1,7	.	.	1,3	100,0
		Bizkaia	N	11.418	4.130	4.008	1.122	.	201	384	663	1.019	22.945
			%	49,8	18,0	17,5	4,9	.	0,9	1,7	2,9	4,4	100,0
	65-74	CAPV	N	9.817	2.239	581	1.542	.	.	.	109	269	14.557
			%	67,4	15,4	4,0	10,6	.	.	.	0,8	1,8	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 83. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total	
Ambos	65-74	Araba	N	1.084	447	.	343	1.875	
			%	57,8	23,8	.	18,3	100,0
		Gipuzkoa	N	2.886	609	438	176	4.109	
			%	70,3	14,8	10,7	4,3	100,0
		Bizkaia	N	5.846	1.184	144	1.022	.	.	.	109	269	8.574	
			%	68,2	13,8	1,7	11,9	.	.	.	1,3	3,1		100,0
	>=75	CAPV	N	25.559	1.470	340	332	.	.	178	523	140	28.541	
			%	89,5	5,2	1,2	1,2	.	.	0,6	1,8	0,5		100,0
		Araba	N	2.239	181	2.420
			%	92,5	7,5
		Gipuzkoa	N	8.025	109	199	210	.	8.544
			%	93,9	1,3	2,3	2,5	.	
		Bizkaia	N	15.295	1.180	140	332	.	.	178	312	140	17.578	
			%	87,0	6,7	0,8	1,9	.	.	1,0	1,8	0,8		100,0

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 84. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Hombres Total	Total	N	44.845	24.022	13.651	1.959	591	410	259	922	3.305	89.964
		%	49,8	26,7	15,2	2,2	0,7	0,5	0,3	1,0	3,7	100,0
I	N	6.781	3.633	1.222	291	852	12.779
	%	53,1	28,4	9,6	2,3	6,7	100,0
II	N	5.732	2.703	115	291	168	9.008
	%	63,6	30,0	1,3	3,2	1,9	100,0
III	N	9.157	6.056	3.424	1.021	.	210	259	249	769	21.145	
	%	43,3	28,6	16,2	4,8	.	1,0	1,2	1,2	3,6	100,0	
IV	N	20.651	9.183	7.879	647	365	201	.	382	1.060	40.368	
	%	51,2	22,7	19,5	1,6	0,9	0,5	.	0,9	2,6	100,0	
V	N	2.524	2.448	1.011	.	226	.	.	.	456	6.665	
	%	37,9	36,7	15,2	.	3,4	.	.	.	6,8	100,0	
0-14	Total	N	9.707	5.501	1.344	260	.	.	259	.	615	17.686
		%	54,9	31,1	7,6	1,5	.	.	1,5	.	3,5	100,0
I	N	2.168	821	356	262	3.607	
	%	60,1	22,8	9,9	7,3	100,0	
II	N	1.837	710	2.547	
	%	72,1	27,9	100,0	
III	N	2.377	1.819	458	260	.	.	259	.	353	5.525	
	%	43,0	32,9	8,3	4,7	.	.	4,7	.	6,4	100,0	
IV	N	3.116	1.698	269	5.083	
	%	61,3	33,4	5,3	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 84. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Hombres 0-14	V	N	209	453	263	924
		%	22,6	49,0	28,4	100,0
15-24	Total	N	4.695	4.714	1.062	162	102	.	.	.	365	11.101
		%	42,3	42,5	9,6	1,5	0,9	.	.	.	3,3	100,0
	I	N	673	557	1.230
		%	54,7	45,3	100,0
	II	N	404	652	.	162	1.218
		%	33,1	53,5	.	13,3	100,0
	III	N	1.050	1.629	331	3.010
		%	34,9	54,1	11,0	100,0
	IV	N	2.437	1.223	732	.	102	.	.	.	205	4.699
		%	51,9	26,0	15,6	.	2,2	.	.	.	4,4	100,0
	V	N	130	654	160	944
		%	13,8	69,3	16,9	100,0
25-44	Total	N	12.576	8.807	6.831	949	489	210	.	481	1.168	31.510
		%	39,9	28,0	21,7	3,0	1,6	0,7	.	.	1,5	3,7
	I	N	1.624	1.555	609	322	4.110
		%	39,5	37,8	14,8	7,8	100,0
	II	N	1.339	602	1.941
		%	69,0	31,0	100,0
	III	N	2.892	1.811	1.352	302	.	210	.	249	276	7.093
		%	40,8	25,5	19,1	4,3	.	3,0	.	3,5	3,9	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 84. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

		Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total	
Hombres 25-44	IV	N	4.967	3.826	4.455	647	263	.	.	232	273	14.662
		%	33,9	26,1	30,4	4,4	1,8	.	.	1,6	1,9	100,0
	V	N	1.755	1.013	414	.	226	.	.	.	296	3.704
		%	47,4	27,3	11,2	.	6,1	.	.	.	8,0	100,0
45-64	Total	N	9.489	3.730	3.701	379	.	201	.	331	749	18.580
		%	51,1	20,1	19,9	2,0	.	1,1	.	1,8	4,0	100,0
	I	N	1.478	278	150	182	.	2.088
		%	70,8	13,3	7,2	8,7	.	100,0
	II	N	1.495	606	168	2.269
		%	65,9	26,7	7,4	100,0
	III	N	1.288	598	1.140	379	3.405
		%	37,8	17,6	33,5	11,1	100,0
	IV	N	5.026	1.920	2.076	.	.	201	.	150	582	9.955
		%	50,5	19,3	20,9	.	.	2,0	.	1,5	5,8	100,0
	V	N	201	328	335	864
		%	23,3	37,9	38,8	100,0
65-74	Total	N	2.609	1.050	470	209	.	.	.	109	269	4.715
		%	55,3	22,3	10,0	4,4	.	.	.	2,3	5,7	100,0
	I	N	407	422	107	109	129	1.173
		%	34,7	35,9	9,1	9,3	11,0	100,0
	II	N	267	.	115	129	511
		%	52,3	.	22,5	25,2	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 84. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total	
Hombres	65-74	III	N	141	112	144	80	140	616	
			%	22,9	18,1	23,3	13,0	22,7	100,0	
		IV	N	1.565	516	105	2.186
			%	71,6	23,6	4,8	100,0
		V	N	229	229
			%	100,0	100,0
	>=75	Total	N	5.769	220	243	140	6.372
			%	90,5	3,5	3,8	2,2	100,0
		I	N	430	140	570
			%	75,5	24,5	100,0
		II	N	390	132	522
			%	74,7	25,3	100,0
		III	N	1.408	88	1.496
			%	94,1	5,9	100,0
	IV	N	3.541	.	243	3.783	
		%	93,6	.	6,4	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	59.586	17.256	5.495	5.391	.	396	563	1.063	1.034	90.784	
		%	65,6	19,0	6,1	5,9	.	0,4	0,6	1,2	1,1	100,0		
	I	N	5.842	2.953	.	417	9.212	
		%	63,4	32,1	.	4,5	100,0	
	II	N	5.757	2.308	438	258	.	.	.	149	326	9.237		
		%	62,3	25,0	4,7	2,8	.	.	.	1,6	3,5	100,0		

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 84. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Mujeres	Total	III	N	14.941	3.441	1.622	1.386	.	288	174	437	267	22.557
			%	66,2	15,3	7,2	6,1	.	1,3	0,8	1,9	1,2	100,0
		IV	N	22.127	6.608	2.378	1.820	.	108	389	345	289	34.063
			%	65,0	19,4	7,0	5,3	.	0,3	1,1	1,0	0,8	100,0
		V	N	10.920	1.945	1.057	1.509	.	.	.	132	151	15.715
			%	69,5	12,4	6,7	9,6	.	.	.	0,8	1,0	100,0
	0-14	Total	N	8.470	2.761	764	500	12.495
			%	67,8	22,1	6,1	4,0	100,0
		I	N	2.656	634	.	252	3.542
			%	75,0	17,9	.	7,1	100,0
		II	N	830	448	1.278
			%	64,9	35,1	100,0
		III	N	2.298	494	218	3.010
			%	76,3	16,4	7,3	100,0
		IV	N	2.686	725	545	249	4.205
			%	63,9	17,2	13,0	5,9	100,0
		V	N	.	460	460
			%	.	100,0	100,0
	15-24	Total	N	3.748	2.563	136	123	6.571
			%	57,0	39,0	2,1	1,9	100,0
		I	N	580	129	710
			%	81,8	18,2	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 84. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total	
Mujeres	15-24	II	N	630	262	.	123	1.015	
			%	62,1	25,8	.	12,1	100,0
		III	N	1.025	463	1.488
			%	68,9	31,1	100,0
		IV	N	1.307	1.709	136	3.152
			%	41,5	54,2	4,3	100,0
	V	N	205	205	
		%	100,0	100,0	
	25-44	Total	N	6.391	6.147	2.243	1.277	.	169	.	.	209	594	17.030
			%	37,5	36,1	13,2	7,5	.	1,0	.	.	1,2	3,5	100,0
		I	N	722	888	1.610
			%	44,8	55,2	100,0
		II	N	1.130	1.074	301	326	2.832
			%	39,9	37,9	10,6	11,5	100,0
		III	N	1.017	1.445	531	270	.	169	.	.	.	267	3.700
			%	27,5	39,1	14,4	7,3	.	4,6	.	.	.	7,2	100,0
		IV	N	2.825	1.678	801	593	209	.	6.106
			%	46,3	27,5	13,1	9,7	3,4	.	100,0
		V	N	697	1.062	609	414	2.782
			%	25,1	38,2	21,9	14,9	100,0
	45-64	Total	N	13.979	3.345	2.144	1.826	.	227	384	331	441	22.677	
			%	61,6	14,8	9,5	8,1	.	1,0	1,7	1,5	1,9	100,0	

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 84. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total	
Mujeres	45-64 I	N	807	883	1.689	
		%	47,8	52,2	100,0
	II	N	1.237	352	136	1.725
		%	71,7	20,4	7,9	100,0
	III	N	4.368	601	873	741	.	119	174	196	.	.	7.073
		%	61,8	8,5	12,3	10,5	.	1,7	2,5	2,8	.	.	100,0
	IV	N	3.801	1.223	798	326	.	108	210	135	289	.	6.890
		%	55,2	17,7	11,6	4,7	.	1,6	3,1	2,0	4,2	.	100,0
	V	N	3.765	287	337	759	151	5.300
		%	71,0	5,4	6,4	14,3	2,9	100,0
65-74	Total	N	7.208	1.190	111	1.333	9.842	
		%	73,2	12,1	1,1	13,5	100,0
	I	N	547	.	.	166	713
		%	76,8	.	.	23,2	100,0
	II	N	376	.	.	135	511
		%	73,5	.	.	26,5	100,0
	III	N	1.269	345	.	375	1.989
		%	63,8	17,3	.	18,9	100,0
	IV	N	3.178	709	.	321	4.207
		%	75,5	16,8	.	7,6	100,0
V	N	1.838	136	111	337	2.422	
	%	75,9	5,6	4,6	13,9	100,0	

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 84. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total	
Mujeres >=75	Total	N	19.790	1.250	97	332	.	.	178	523	.	22.169	
		%	89,3	5,6	0,4	1,5	.	.	0,8	2,4	.	100,0	
	I	N	529	419	948
		%	55,8	44,2	100,0
	II	N	1.553	172	149	.	.	1.874
		%	82,9	9,2	8,0	.	.	100,0
	III	N	4.963	93	241	.	5.297
		%	93,7	1,8	4,5	.	.	100,0
	IV	N	8.330	566	97	332	.	.	.	178	.	.	9.503
		%	87,7	6,0	1,0	3,5	.	.	.	1,9	.	.	100,0
	V	N	4.414	132	.	4.547
		%	97,1	2,9	.	100,0
	Ambos	Total	N	104.431	41.278	19.146	7.350	591	806	821	1.985	4.339	180.749
			%	57,8	22,8	10,6	4,1	0,3	0,4	0,5	1,1	2,4	100,0
I		N	12.623	6.586	1.222	417	.	.	.	291	852	.	21.991
		%	57,4	29,9	5,6	1,9	.	.	.	1,3	3,9	.	100,0
II		N	11.488	5.011	552	549	.	.	.	149	494	.	18.244
		%	63,0	27,5	3,0	3,0	.	.	.	0,8	2,7	.	100,0
III		N	24.098	9.497	5.046	2.407	.	498	433	686	1.036	.	43.702
		%	55,1	21,7	11,5	5,5	.	1,1	1,0	1,6	2,4	.	100,0
IV		N	42.778	15.791	10.257	2.467	365	309	389	726	1.350	.	74.432
		%	57,5	21,2	13,8	3,3	0,5	0,4	0,5	1,0	1,8	.	100,0
V		N	13.444	4.393	2.068	1.509	226	.	.	132	607	.	22.380

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 84. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Ambos	Total	V	%	60,1	19,6	9,2	6,7	1,0	.	.	0,6	2,7	100,0
	0-14	Total	N	18.177	8.262	2.108	760	.	.	259	.	615	30.182
			%	60,2	27,4	7,0	2,5	.	.	0,9	.	2,0	100,0
		I	N	4.825	1.455	356	252	262	7.149
			%	67,5	20,4	5,0	3,5	3,7	100,0
		II	N	2.667	1.159	3.825
			%	69,7	30,3	100,0
		III	N	4.675	2.313	676	260	.	.	259	.	353	8.535
			%	54,8	27,1	7,9	3,0	.	.	3,0	.	4,1	100,0
		IV	N	5.803	2.423	814	249	9.288
			%	62,5	26,1	8,8	2,7	100,0
		V	N	209	913	263	1.384
			%	15,1	66,0	19,0	100,0
	15-24	Total	N	8.443	7.278	1.199	285	102	.	.	.	365	17.671
			%	47,8	41,2	6,8	1,6	0,6	.	.	.	2,1	100,0
		I	N	1.254	686	1.940
			%	64,6	35,4	100,0
		II	N	1.034	915	.	285	2.234
			%	46,3	40,9	.	12,8	100,0
		III	N	2.076	2.092	331	4.498
			%	46,1	46,5	7,4	100,0
		IV	N	3.744	2.931	868	.	102	.	.	.	205	7.850
			%	47,7	37,3	11,1	.	1,3	.	.	.	2,6	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 84. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Ambos	15-24 V	N	336	654	160	1.149
		%	29,2	56,9	13,9	100,0
	25-44 Total	N	18.967	14.954	9.073	2.226	489	379	.	690	1.761	48.540
		%	39,1	30,8	18,7	4,6	1,0	0,8	.	1,4	3,6	100,0
	I	N	2.346	2.443	609	322	5.719
		%	41,0	42,7	10,7	5,6	100,0
	II	N	2.469	1.676	301	326	4.773
		%	51,7	35,1	6,3	6,8	100,0
	III	N	3.909	3.257	1.884	572	.	379	.	249	543	10.793
		%	36,2	30,2	17,5	5,3	.	3,5	.	2,3	5,0	100,0
	IV	N	7.792	5.503	5.256	1.240	263	.	.	441	273	20.768
		%	37,5	26,5	25,3	6,0	1,3	.	.	2,1	1,3	100,0
	V	N	2.452	2.075	1.023	414	226	.	.	.	296	6.486
		%	37,8	32,0	15,8	6,4	3,5	.	.	.	4,6	100,0
	45-64 Total	N	23.468	7.075	5.845	2.205	.	428	384	663	1.190	41.257
		%	56,9	17,1	14,2	5,3	.	1,0	0,9	1,6	2,9	100,0
	I	N	2.285	1.161	150	182	.	3.778
		%	60,5	30,7	4,0	4,8	.	100,0
	II	N	2.733	958	136	168	3.994
		%	68,4	24,0	3,4	4,2	100,0
	III	N	5.657	1.199	2.013	1.120	.	119	174	196	.	10.477
		%	54,0	11,4	19,2	10,7	.	1,1	1,7	1,9	.	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 84. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Ambos	45-64	IV	N	8.827	3.143	2.874	326	.	309	210	285	871	16.845
			%	52,4	18,7	17,1	1,9	.	1,8	1,2	1,7	5,2	100,0
		V	N	3.967	615	671	759	151	6.163
			%	64,4	10,0	10,9	12,3	2,5	100,0
	65-74	Total	N	9.817	2.239	581	1.542	.	.	.	109	269	14.557
			%	67,4	15,4	4,0	10,6	.	.	.	0,8	1,8	100,0
		I	N	954	422	107	166	.	.	.	109	129	1.886
			%	50,6	22,4	5,7	8,8	.	.	.	5,8	6,8	100,0
		II	N	643	.	115	264	1.022
			%	62,9	.	11,2	25,8	100,0
		III	N	1.410	456	144	455	140	2.605
			%	54,1	17,5	5,5	17,5	5,4	100,0
		IV	N	4.742	1.225	105	321	6.394
			%	74,2	19,2	1,6	5,0	100,0
		V	N	2.067	136	111	337	2.651
			%	78,0	5,1	4,2	12,7	100,0
	>=75	Total	N	25.559	1.470	340	332	.	.	178	523	140	28.541
			%	89,5	5,2	1,2	1,2	.	.	0,6	1,8	0,5	100,0
		I	N	959	419	140	1.519
			%	63,2	27,6	9,2	100,0
		II	N	1.943	304	149	.	2.396
			%	81,1	12,7	6,2	.	100,0

(continuación)

*Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 84. Distribución de la población * según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Ambos	>=75	III	N	6.372	181	241	.	6.794
			%	93,8	2,7	3,5	.	100,0
	IV	N	11.870	566	340	332	.	.	178	.	.	13.286	
		%	89,3	4,3	2,6	2,5	.	.	1,3	.	.	100,0	
	V	N	4.414	132	.	4.547
		%	97,1	2,9	.	100,0

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 85. Distribución de la población **según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Hombres Total	Total	N	38.266	21.793	12.838	1.699	591	410	259	922	3.305	80.083
		%	47,8	27,2	16,0	2,1	0,7	0,5	0,3	1,2	4,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	10.954	4.647	3.501	201	.	201	259	.	755	20.518
		%	53,4	22,6	17,1	1,0	.	1,0	1,3	.	3,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	4.614	4.421	1.945	80	102	.	.	431	1.091	12.684
		%	36,4	34,9	15,3	0,6	0,8	.	.	3,4	8,6	100,0
	Secundaria, superior	N	16.426	9.047	6.246	987	489	210	.	491	971	34.867
		%	47,1	25,9	17,9	2,8	1,4	0,6	.	1,4	2,8	100,0
	Terciaria	N	6.272	3.678	1.145	431	489	12.015
		%	52,2	30,6	9,5	3,6	4,1	100,0
0-14	Total	N	3.128	3.273	531	.	.	.	259	.	615	7.805
		%	40,1	41,9	6,8	.	.	.	3,3	.	7,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.681	3.018	531	.	.	.	259	.	615	7.103
		%	37,7	42,5	7,5	.	.	.	3,6	.	8,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	448	255	702
		%	63,7	36,3	100,0
15-24	Total	N	4.695	4.714	1.062	162	102	.	.	.	365	11.101
		%	42,3	42,5	9,6	1,5	0,9	.	.	.	3,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	947	273	198	1.419
		%	66,8	19,3	14,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.043	1.892	163	.	102	.	.	.	365	3.565
		%	29,3	53,1	4,6	.	2,9	.	.	.	10,2	100,0

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 85. Distribución de la población **según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Hombres	15-24	Secundaria, superior	N 2.438	1.915	481	162	4.996
			% 48,8	38,3	9,6	3,3
		Terciaria	N 267	633	221	1.121
			% 23,8	56,5	19,7
25-44	Total		N 12.576	8.807	6.831	949	489	210	.	481	1.168	31.510
			% 39,9	28,0	21,7	3,0	1,6	0,7	.	1,5	3,7	.
		Sin estudios, primaria	N 1.377	288	903	201	2.770
			% 49,7	10,4	32,6	7,3
		Secundaria, inferior	N .	1.722	1.038	249	570	3.579
			% .	48,1	29,0	7,0	15,9	.
		Secundaria, superior	N 9.344	5.008	4.263	446	489	210	.	232	276	20.268
			% 46,1	24,7	21,0	2,2	2,4	1,0	.	1,1	1,4	.
		Terciaria	N 1.855	1.789	627	302	322	4.894
			% 37,9	36,5	12,8	6,2	6,6	.
45-64	Total		N 9.489	3.730	3.701	379	.	201	.	331	749	18.580
			% 51,1	20,1	19,9	2,0	.	1,1	.	1,8	4,0	.
		Sin estudios, primaria	N 1.646	865	1.406	.	.	201	.	.	.	4.118
			% 40,0	21,0	34,2	.	.	4,9
		Secundaria, inferior	N 1.608	343	601	182	156	2.889
			% 55,6	11,9	20,8	6,3	5,4	.
		Secundaria, superior	N 3.385	1.776	1.396	379	.	.	.	150	426	7.511
			% 45,1	23,6	18,6	5,0	.	.	.	2,0	5,7	.

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 85. Distribución de la población ** según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total	
Hombres	45-64	Terciaria	N	2.850	747	298	168	4.062	
			%	70,2	18,4	7,3	4,1	100,0	
	65-74	Total	N	2.609	1.050	470	209	.	.	109	269	4.715	
			%	55,3	22,3	10,0	4,4	.	.	2,3	5,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	1.543	203	220	1.967	
			%	78,5	10,3	11,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	138	209	144	80	570	
			%	24,2	36,7	25,2	14,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	543	260	107	109	269	1.288
			%	42,2	20,2	8,3	8,5	20,9	100,0
		Terciaria	N	384	377	.	129	890
			%	43,2	42,4	.	14,5	100,0
	>=75	Total	N	5.769	220	243	140	6.372	
			%	90,5	3,5	3,8	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.759	.	243	140	3.142
			%	87,8	.	7,7	4,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.378	1.378	
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	716	88	804	
			%	89,1	10,9	100,0
		Terciaria	N	915	132	1.048	
			%	87,4	12,6	100,0
Mujeres	Total	Total	N	54.765	16.111	5.002	5.142	.	396	563	1.063	1.034	84.076

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 85. Distribución de la población ** según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Causas de lesiones						Aspiración de cuerpos extraños		Total	
				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Otros		
Mujeres	Total	Total	%	65,1	19,2	5,9	6,1	.	0,5	0,7	1,3	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	26.353	3.660	1.217	1.907	.	.	174	268	150	33.728
			%	78,1	10,9	3,6	5,7	.	.	0,5	0,8	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.728	2.842	921	1.228	.	.	210	241	140	14.309
			%	61,0	19,9	6,4	8,6	.	.	1,5	1,7	1,0	100,0
		Secundaria, superior	N	10.886	5.049	1.438	1.627	.	227	178	405	151	19.962
			%	54,5	25,3	7,2	8,1	.	1,1	0,9	2,0	0,8	100,0
		Terciaria	N	8.798	4.560	1.426	380	.	169	.	149	594	16.077
			%	54,7	28,4	8,9	2,4	.	1,1	.	0,9	3,7	100,0
		0-14 Total	N	3.440	1.616	271	252	5.578
			%	61,7	29,0	4,9	4,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.313	1.188	271	252	5.023
			%	65,9	23,6	5,4	5,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	127	428	555
			%	22,9	77,1	100,0
		15-24 Total	N	3.957	2.563	136	123	6.780
			%	58,4	37,8	2,0	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	640	333	972
		%	65,8	34,2	100,0	
	Secundaria, inferior	N	979	1.110	2.088	
		%	46,9	53,1	100,0	
	Secundaria, superior	N	1.317	1.121	136	123	2.697	
		%	48,8	41,6	5,1	4,6	100,0	

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 85. Distribución de la población ** según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Mujeres	15-24	Terciaria	N	1.022	1.022
			%	100,0
	25-44	Total	N	6.391	6.147	2.243	1.277	.	169	.	209	594	17.030
			%	37,5	36,1	13,2	7,5	.	1,0	.	1,2	3,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	675	533	194	147	1.549
			%	43,6	34,4	12,5	9,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	412	272	553	200	1.438
			%	28,7	18,9	38,5	13,9	100,0
		Secundaria, superior	N	2.111	2.619	415	929	.	.	.	209	.	6.283
			%	33,6	41,7	6,6	14,8	.	.	.	3,3	.	100,0
		Terciaria	N	3.192	2.723	1.081	.	.	169	.	.	594	7.759
			%	41,1	35,1	13,9	.	.	2,2	.	.	7,7	100,0
	45-64	Total	N	13.979	3.345	2.144	1.826	.	227	384	331	441	22.677
			%	61,6	14,8	9,5	8,1	.	1,0	1,7	1,5	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.515	597	544	458	.	.	174	135	150	6.573
			%	68,7	9,1	8,3	7,0	.	.	2,6	2,1	2,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.014	447	368	500	.	.	210	.	140	3.679
			%	54,7	12,1	10,0	13,6	.	.	5,7	.	3,8	100,0
		Secundaria, superior	N	4.752	748	887	488	.	227	.	196	151	7.448
			%	63,8	10,0	11,9	6,5	.	3,0	.	2,6	2,0	100,0
		Terciaria	N	2.698	1.553	345	380	4.977
			%	54,2	31,2	6,9	7,6	100,0
	65-74	Total	N	7.208	1.190	111	1.333	9.842

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 85. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios***

				Choque o	Objeto	Fuego,		Ingestión		Aspiración			
			Caída	colisión	cortante	líquidos	Electricidad	de	Ingestión de	de	Otros	Total	
						calientes		productos	medicamentos	cuerpos			
								tóxicos		extraños			
Mujeres	65-74	Total	%	73,2	12,1	1,1	13,5	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	4.351	568	111	719	5.748	
			%	75,7	9,9	1,9	12,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.068	326	.	527	1.922	
			%	55,6	17,0	.	27,4	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.188	154	.	87	1.429	
			%	83,1	10,8	.	6,1	100,0	
		Terciaria	N	601	142	743	
			%	80,9	19,1	100,0	
	>=75	Total	N	19.790	1.250	97	332	.	.	178	523	22.169	
			%	89,3	5,6	0,4	1,5	.	.	0,8	2,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	12.859	441	97	332	.	.	.	132	13.862	
			%	92,8	3,2	0,7	2,4	.	.	.	1,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	4.127	260	241	4.627	
			%	89,2	5,6	5,2	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.519	407	178	.	2.104	
			%	72,2	19,3	8,5	.	100,0	
		Terciaria	N	1.285	142	149	1.576	
			%	81,5	9,0	9,5	100,0	
Ambos	Total	Total	N	93.031	37.904	17.840	6.841	591	806	821	1.985	4.339	164.160
			%	56,7	23,1	10,9	4,2	0,4	0,5	0,5	1,2	2,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	37.307	8.307	4.718	2.109	.	201	433	268	904	54.246
			%	68,8	15,3	8,7	3,9	.	0,4	0,8	0,5	1,7	100,0

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 85. Distribución de la población ** según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Ambos	Total	Secundaria, inferior	N	13.342	7.263	2.866	1.308	102	.	210	672	1.230	26.993
			%	49,4	26,9	10,6	4,8	0,4	.	0,8	2,5	4,6	100,0
		Secundaria, superior	N	27.312	14.096	7.685	2.613	489	437	178	896	1.122	54.829
			%	49,8	25,7	14,0	4,8	0,9	0,8	0,3	1,6	2,0	100,0
		Terciaria	N	15.070	8.238	2.571	811	.	169	.	149	1.083	28.092
			%	53,6	29,3	9,2	2,9	.	0,6	.	0,5	3,9	100,0
0-14	Total		N	6.568	4.888	802	252	.	.	259	.	615	13.384
			%	49,1	36,5	6,0	1,9	.	.	1,9	.	4,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.993	4.206	802	252	.	.	259	.	615	12.126
			%	49,4	34,7	6,6	2,1	.	.	2,1	.	5,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	575	683	1.258
			%	45,7	54,3	100,0
15-24	Total		N	8.652	7.278	1.199	285	102	.	.	.	365	17.880
			%	48,4	40,7	6,7	1,6	0,6	.	.	.	2,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.587	606	198	2.391
			%	66,4	25,3	8,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.022	3.002	163	.	102	.	.	.	365	5.653
			%	35,8	53,1	2,9	.	1,8	.	.	.	6,5	100,0
		Secundaria, superior	N	3.755	3.037	617	285	7.693
			%	48,8	39,5	8,0	3,7	100,0
		Terciaria	N	1.289	633	221	2.143
			%	60,1	29,6	10,3	100,0
25-44	Total		N	18.967	14.954	9.073	2.226	489	379	.	690	1.761	48.540

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 85. Distribución de la población ** según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Ambos	25-44	Total	%	39,1	30,8	18,7	4,6	1,0	0,8	.	1,4	3,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.052	821	1.097	349
			%	47,5	19,0	25,4	8,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	412	1.995	1.591	200	.	.	.	249	570	5.017
			%	8,2	39,8	31,7	4,0	.	.	.	5,0	11,4	100,0
		Secundaria, superior	N	11.455	7.627	4.678	1.375	489	210	.	441	276	26.551
			%	43,1	28,7	17,6	5,2	1,8	0,8	.	1,7	1,0	100,0
		Terciaria	N	5.047	4.512	1.707	302	.	169	.	.	915	12.653
			%	39,9	35,7	13,5	2,4	.	1,3	.	.	7,2	100,0
	45-64	Total	N	23.468	7.075	5.845	2.205	.	428	384	663	1.190	41.257
			%	56,9	17,1	14,2	5,3	.	1,0	0,9	1,6	2,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.161	1.462	1.950	458	.	201	174	135	150	10.691
			%	57,6	13,7	18,2	4,3	.	1,9	1,6	1,3	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.622	789	969	500	.	.	210	182	296	6.568
			%	55,1	12,0	14,8	7,6	.	.	3,2	2,8	4,5	100,0
		Secundaria, superior	N	8.137	2.524	2.283	866	.	227	.	346	577	14.960
			%	54,4	16,9	15,3	5,8	.	1,5	.	2,3	3,9	100,0
		Terciaria	N	5.548	2.300	643	380	168	9.039
			%	61,4	25,4	7,1	4,2	1,9	100,0
	65-74	Total	N	9.817	2.239	581	1.542	.	.	.	109	269	14.557
			%	67,4	15,4	4,0	10,6	.	.	.	0,8	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.894	771	331	719	7.715
			%	76,4	10,0	4,3	9,3	100,0

(continuación)

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 85. Distribución de la población ** según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Caída	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Ambos	65-74	Secundaria, inferior	N	1.206	535	144	607	2.492
			%	48,4	21,5	5,8	24,4
		Secundaria, superior	N	1.730	414	107	87	.	.	.	109	269	2.717
			%	63,7	15,2	3,9	3,2	.	.	.	4,0	9,9	100,0
		Terciaria	N	986	519	.	129	1.633
			%	60,3	31,8	.	7,9	100,0
	>=75	Total	N	25.559	1.470	340	332	.	.	178	523	140	28.541
			%	89,5	5,2	1,2	1,2	.	.	0,6	1,8	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	15.619	441	340	332	.	.	.	132	140	17.004
			%	91,9	2,6	2,0	2,0	.	.	.	0,8	0,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.505	260	241	.	6.005
			%	91,7	4,3	4,0	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.235	495	178	.	.	2.908
			%	76,8	17,0	6,1	.	.	100,0
		Terciaria	N	2.200	274	149	.	2.624
			%	83,9	10,4	5,7	.	100,0

**Población que ha sufrido lesiones no intencionadas

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 86. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según la localización de la lesión* por sexo y edad

	Hombres							Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Cabeza y cuello	23,1	34,6	13,6	21,2	15,9	26,3	35,2	22,5	16,9	24,4	24,9	20,1	17,0	28,3
Torax, abdomen, espalda	12,0	4,7	10,6	17,6	6,8	12,5	21,4	15,1	7,1	15,6	19,6	9,8	8,0	24,5
Extremidades superiores	38,6	25,7	36,4	42,4	51,7	34,0	25,1	34,6	40,3	17,4	38,4	41,9	35,6	25,5
Extremidades inferiores	39,9	44,3	56,4	37,3	30,6	42,6	37,7	45,8	54,1	60,8	37,3	47,9	48,3	39,6

*Las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 87. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según la localización de la lesión* por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			0-14			15-24		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Cabeza y cuello	18,8	26,5	22,0	46,6	45,7	25,8	10,9	13,5	15,2
Torax, abdomen, espalda	10,6	8,4	14,5	9,6	3,1	5,1	3,6	4,6	18,8
Extremidades superiores	39,6	38,1	38,7	25,3	30,4	22,8	42,2	39,5	31,0
Extremidades inferiores	42,8	35,7	41,8	26,7	27,1	57,7	46,9	46,0	69,2

	25-44			45-64			65-74		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Cabeza y cuello	21,0	21,8	20,8	7,4	14,1	18,8	27,5	25,1	26,5
Torax, abdomen, espalda	13,5	11,7	22,7	12,2	9,1	4,3	14,5	8,2	14,0
Extremidades superiores	33,1	38,2	47,5	54,8	52,1	50,7	41,9	34,7	32,4
Extremidades inferiores	52,6	42,1	30,2	29,1	28,9	31,9	29,4	32,0	49,5

	>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Cabeza y cuello	12,9	57,0	29,8
Torax, abdomen, espalda	13,6	12,1	26,2
Extremidades superiores	43,4	18,1	25,2
Extremidades inferiores	58,8	30,5	37,4

*Las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 87. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según la localización de la lesión* por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	Total			0-14			15-24		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Cabeza y cuello	24,4	18,5	24,6	18,7	19,6	13,5	31,9	28,3	21,0
Torax, abdomen, espalda	10,3	11,8	18,2	0,0	3,8	12,7	16,2	6,8	19,5
Extremidades superiores	37,8	41,6	29,3	31,2	45,4	37,8	15,7	20,7	16,3
Extremidades inferiores	42,0	46,7	46,0	50,1	42,7	67,2	52,4	71,6	57,6

	25-44			45-64			65-74		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Cabeza y cuello	38,7	12,4	32,5	19,9	14,0	23,8	12,3	19,7	16,8
Torax, abdomen, espalda	13,2	17,1	23,7	12,0	5,5	12,0	12,1	7,6	7,2
Extremidades superiores	30,2	43,5	36,0	55,0	42,5	38,6	47,8	44,3	28,3
Extremidades inferiores	23,7	49,3	30,2	37,1	55,8	45,5	46,3	36,1	55,0

	>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Cabeza y cuello	25,7	26,1	29,7
Torax, abdomen, espalda	9,9	22,7	27,3
Extremidades superiores	29,2	40,2	17,6
Extremidades inferiores	55,3	34,5	40,1

*Las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 88. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según la localización de la lesión* por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					0-14					15-24				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Cabeza y cuello	27,0	11,1	24,8	23,5	23,4	41,8	27,5	35,1	30,9	43,2	13,2	0,0	16,7	8,8	45,5
Torax, abdomen, espalda	12,7	15,5	11,1	11,1	14,2	0,0	7,6	9,2	2,6	0,0	13,8	33,2	8,9	0,0	35,3
Extremidades superiores	35,4	35,0	35,6	41,4	42,9	29,6	34,0	21,8	22,5	28,4	45,5	19,8	38,3	41,0	16,9
Extremidades inferiores	43,3	53,4	39,5	36,8	35,8	37,1	30,8	46,7	56,4	28,4	41,3	86,7	61,7	52,9	37,6

	25-44					45-64					65-74				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Cabeza y cuello	23,8	0,0	26,2	21,1	19,7	0,0	7,9	12,8	23,5	0,0	56,2	22,9	18,1	16,0	0,0
Torax, abdomen, espalda	22,1	27,3	10,8	18,7	16,7	13,0	12,0	5,1	5,5	0,0	22,8	0,0	22,9	8,2	0,0
Extremidades superiores	23,1	64,7	30,7	47,3	55,5	63,9	24,1	63,5	51,8	43,9	32,5	47,7	23,3	38,3	0,0
Extremidades inferiores	63,8	39,0	37,2	31,9	28,6	21,6	68,1	18,5	26,2	56,1	34,4	29,4	35,7	46,0	100,0

	>=75				
	I	II	III	IV	V
Cabeza y cuello	24,5	0,0	27,8	44,0	.
Torax, abdomen, espalda	0,0	0,0	33,3	22,8	.
Extremidades superiores	39,1	0,0	42,8	19,8	.
Extremidades inferiores	36,4	100,0	31,8	31,9	.

*Las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 88. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según la localización de la lesión* por sexo, edad y clase social

Mujeres

	Total					0-14					15-24				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Cabeza y cuello	18,8	33,0	23,8	21,6	18,9	17,0	29,4	14,4	16,5	0,0	0,0	12,7	31,1	33,7	0,0
Torax, abdomen, espalda	15,6	14,5	12,4	17,8	13,3	6,7	0,0	0,0	15,1	0,0	29,5	12,7	13,1	16,6	0,0
Extremidades superiores	41,1	35,8	33,7	30,6	40,6	41,9	58,6	48,8	26,8	50,0	18,2	25,8	17,9	16,6	0,0
Extremidades inferiores	42,2	38,7	43,3	49,8	46,1	53,2	12,1	55,3	66,7	50,0	70,5	86,8	51,0	49,7	100,0

	25-44					45-64					65-74				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Cabeza y cuello	6,9	33,6	38,2	18,1	24,6	33,0	34,3	15,7	20,2	17,4	34,0	55,2	19,0	13,5	8,6
Torax, abdomen, espalda	22,4	14,8	33,0	17,8	9,0	17,3	6,8	3,8	17,5	7,0	0,0	23,5	17,5	5,1	4,4
Extremidades superiores	43,1	31,1	31,7	35,4	58,3	59,9	34,5	41,9	39,5	41,6	50,8	21,3	34,1	39,5	28,4
Extremidades inferiores	34,4	27,4	24,8	48,0	42,7	28,4	58,9	47,4	47,9	51,2	27,0	23,5	35,1	52,7	63,0

	>=75				
	I	II	III	IV	V
Cabeza y cuello	25,0	38,2	30,2	26,9	25,4
Torax, abdomen, espalda	34,6	29,5	15,1	25,1	29,9
Extremidades superiores	10,5	38,0	18,9	23,4	35,8
Extremidades inferiores	30,0	33,5	44,7	43,2	30,6

*Las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 89. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según la localización de la lesión por sexo, edad y nivel de estudios***

Hombres

	Total				0-14				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Cabeza y cuello	16,4	25,8	21,9	14,4	19,1	0,0	0,0	9,3	23,6	0,0		
Torax, abdomen, espalda	11,3	14,1	11,3	21,2	7,1	18,7	12,0	9,3	8,6	21,5		
Extremidades superiores	39,1	41,4	39,4	42,2	24,9	17,6	56,2	41,4	26,1	41,2		
Extremidades inferiores	44,9	34,2	37,6	51,8	60,9	63,7	43,8	49,3	59,7	80,3		

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Cabeza y cuello	6,5	38,0	21,0	17,9	2,2	27,6	24,9	4,9
Torax, abdomen, espalda	24,2	19,5	14,7	24,8	0,0	13,3	2,8	16,6
Extremidades superiores	46,9	55,8	39,4	42,4	55,2	43,3	55,5	46,6
Extremidades inferiores	31,6	18,9	37,1	54,9	40,8	32,2	18,3	42,3

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Cabeza y cuello	13,3	18,4	28,5	56,7	47,5	49,0	0,0	14,4
Torax, abdomen, espalda	3,8	18,2	10,9	30,0	28,9	9,8	21,2	14,5
Extremidades superiores	55,4	25,2	8,3	29,7	25,1	19,0	22,4	35,8
Extremidades inferiores	36,9	38,2	52,2	44,0	31,3	22,3	65,6	49,8

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 89. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según la localización de la lesión por sexo, edad y nivel de estudios***

Mujeres

	Total				0-14				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Cabeza y cuello	19,4	20,0	23,1	26,9	0,0	0,0	.	0,0	31,6	36,8	0,0	
Torax, abdomen, espalda	16,5	15,9	15,8	15,6	8,9	38,7	.	0,0	28,8	16,9	0,0	
Extremidades superiores	32,2	39,3	30,0	38,1	35,0	77,1	.	13,8	15,5	17,0	26,1	
Extremidades inferiores	48,8	46,3	48,4	39,4	75,6	61,3	.	86,2	49,1	55,8	73,9	

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 89. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según la localización de la lesión por sexo, edad y nivel de estudios***

	Mujeres							
	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Cabeza y cuello	38,3	0,0	23,1	28,2	16,6	20,0	19,1	26,2
Torax, abdomen, espalda	0,0	0,0	25,2	22,6	17,8	5,6	7,8	5,8
Extremidades superiores	52,4	62,0	28,8	39,1	40,4	44,1	36,3	50,6
Extremidades inferiores	22,9	38,0	42,3	36,1	46,2	54,8	53,7	35,7

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 89. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según la localización de la lesión por sexo, edad y nivel de estudios***

	Mujeres							
	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Cabeza y cuello	13,1	15,3	16,1	54,1	29,9	25,4	24,7	27,0
Torax, abdomen, espalda	5,4	13,9	14,9	0,0	26,2	22,0	15,5	28,5
Extremidades superiores	40,2	26,1	40,5	14,6	22,9	39,9	20,6	12,9
Extremidades inferiores	54,3	44,8	37,7	31,3	37,9	39,0	45,2	49,1

