

TABLAS GENERALES



ESTADO DE SALUD



TABLAS GENERALES

ÍNDICE

Estado de Salud

1. AUTOVALORACIÓN DE LA SALUD

Tabla 1. Distribución de la población (%) según su percepción de la salud general por sexo y territorio histórico	1
Tabla 2. Distribución de la población (%) según su percepción de la salud general por sexo y edad.....	2
Tabla 3. Distribución de la población (%) según su percepción de la salud general por sexo y clase social.....	3
Tabla 4. Distribución de la población (%) según su percepción de la salud general por sexo y nivel de estudios	4

2. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (EQ-5D-5L)

Tabla 5. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo y territorio histórico	5
Tabla 6. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo y edad.....	6
Tabla 7. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo y clase social.....	7
Tabla 8. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo y nivel de estudios.....	8
Tabla 9. Distribución de la población (%) según las dimensiones del Euroqol EQ-5D-5L por sexo	9
Tabla 10. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo y territorio histórico.....	10
Tabla 11. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo y edad	10
Tabla 12. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo y clase social	11
Tabla 13. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo y nivel de estudios	12
Tabla 14. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo y territorio histórico..	13
Tabla 15. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo y edad	14
Tabla 16. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo y clase social	15

Tabla 17. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo y nivel de estudios ...	16
Tabla 18. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo y territorio histórico.....	18
Tabla 19. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo y edad	19
Tabla 20. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo y clase social	20
Tabla 21. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo y nivel de estudios	21
Tabla 22. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo y territorio histórico	22
Tabla 23. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo y edad	23
Tabla 24. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo y clase social	24
Tabla 25. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo y nivel de estudios.....	25
Tabla 26. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo y territorio histórico.....	26
Tabla 27. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo y edad	27
Tabla 28. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo y clase social ...	28
Tabla 29. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo y nivel de estudios.....	29

3. SALUD MENTAL

Tabla 30. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo y territorio histórico.....	30
Tabla 31. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo y edad.....	31
Tabla 32. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo y clase social	32
Tabla 33. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo y nivel de estudios	33
Tabla 34. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo y territorio histórico	34
Tabla 35. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo y edad	35
Tabla 36. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo y clase social	36
Tabla 37. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo y nivel de estudios	37

Tabla 38. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo y territorio histórico	38
Tabla 39. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo y edad.....	39
Tabla 40. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo y clase social.....	40
Tabla 41. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo y nivel de estudios	41
Tabla 42. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo y territorio histórico	42
Tabla 43. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo y edad.....	43
Tabla 44. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo y clase social.....	44
Tabla 45. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo y nivel de estudios	45

4. SALUD BUCODENTAL

Tabla 46. Distribución de la población (%) según la percepción de la salud bucodental por sexo y territorio histórico	46
Tabla 47. Distribución de la población (%) según la percepción de la salud bucodental por sexo y edad.....	47
Tabla 48. Distribución de la población (%) según la percepción de la salud bucodental por sexo y clase social.....	48
Tabla 49. Distribución de la población (%) según la percepción de la salud bucodental por sexo y nivel de estudios	49

5. LIMITACIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD

Tabla 50. Prevalencia (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo y territorio histórico	50
Tabla 51. Prevalencia (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo y edad.....	51
Tabla 52. Prevalencia (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo y clase social.....	52
Tabla 53. Prevalencia (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo y nivel de estudios*	53

6. DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

Tabla 54. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo y territorio histórico	54
Tabla 55. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo y edad.....	55
Tabla 56. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo y clase social.....	56
Tabla 57. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo y nivel de estudios*	57
Tabla 58. Distribución de la población (%) según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo y territorio histórico	58
Tabla 59. Distribución de la población (%) según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo y edad.....	59
Tabla 60. Distribución de la población (%) según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo y clase social.....	60
Tabla 61. Distribución de la población (%) según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo y nivel de estudios*	61
Tabla 62. Distribución de la población (%) según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo y territorio histórico	62
Tabla 63. Distribución de la población (%) según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo y edad.....	63
Tabla 64. Distribución de la población (%) según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo y clase social.....	65
Tabla 65. Distribución de la población (%) según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo y nivel de estudios*67	
Tabla 66. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo y territorio histórico.....	69
Tabla 67. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo y edad	70
Tabla 68. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo y clase social.....	71
Tabla 69. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo y nivel de estudios.....	72
Tabla 70. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo y territorio histórico.....	73
Tabla 71. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo y edad	74
Tabla 72. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo y clase social	75

Tabla 73. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo y nivel de estudios	76
Tabla 74. Distribución de la población (%) según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo y territorio histórico	77
Tabla 75. Distribución de la población (%) según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo y edad.....	78
Tabla 76. Distribución de la población (%) según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo y clase social.....	79
Tabla 77. Distribución de la población (%) según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo y nivel de estudios*	80
Tabla 78. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda* por sexo y territorio histórico.....	81
Tabla 79. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo y edad	82
Tabla 80. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo y clase social	83
Tabla 81. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo y nivel de estudios	84

7. PROBLEMAS CRÓNICOS.

Tabla 82. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y territorio histórico	85
Tabla 83. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y edad	87
Tabla 84. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y clase social	89
Tabla 85. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y nivel de estudios*	91
Tabla 86. Prevalencia (%) de población con algún problema crónico por sexo y territorio histórico.....	95
Tabla 87. Prevalencia (%) de población con algún problema crónico por sexo y edad.....	96
Tabla 88. Prevalencia (%) de población con algún problema crónico por sexo y clase social	97
Tabla 89. Prevalencia (%) de población con algún problema crónico por sexo y nivel de estudios*	98

8. LESIONES NO INTENCIONADAS

Tabla 90. Prevalencia (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y territorio histórico.....	99
--	----

Tabla 91. Prevalencia (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y edad	100
Tabla 92. Prevalencia (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y clase social	101
Tabla 93. Prevalencia (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y nivel de estudios	102
Tabla 94. Distribución de la población (%) según el lugar donde ocurrió la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y territorio histórico	103
Tabla 95. Distribución de la población (%) según el lugar donde ocurrió la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y edad.....	104
Tabla 96. Distribución de la población (%) según el lugar donde ocurrió la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y clase social.....	105
Tabla 97. Distribución de la población (%) según el lugar donde ocurrió la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y nivel de estudios.....	106
Tabla 98. Distribución de la población (%) según el mecanismo de la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y territorio histórico	107
Tabla 99. Distribución de la población (%) según el mecanismo de la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y edad.....	108
Tabla 100. Distribución de la población (%) según el mecanismo de la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y clase social.....	109
Tabla 101. Distribución de la población (%) según el mecanismo de la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y nivel de estudios.....	110
Tabla 102. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo y territorio histórico	111
Tabla 103. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo y edad	112
Tabla 104. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo y clase social	113
Tabla 105. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios.....	114

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 1. Distribución de la población (%) según su percepción de la salud general por sexo y territorio histórico

		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Mujeres	Total	23,2	54,0	18,2	3,6	1,0	100,0
	Araba	15,0	62,6	18,3	2,4	1,7	100,0
	Gipuzkoa	23,5	53,6	19,7	2,7	0,5	100,0
	Bizkaia	25,2	52,0	17,3	4,5	1,1	100,0
Hombres	Total	27,6	55,3	14,6	2,2	0,3	100,0
	Araba	23,6	58,8	16,3	1,3	.	100,0
	Gipuzkoa	25,1	56,5	15,1	3,1	0,3	100,0
	Bizkaia	30,4	53,5	13,9	1,8	0,4	100,0
Ambos sexos	Total	25,3	54,6	16,5	2,9	0,7	100,0
	Araba	19,2	60,8	17,3	1,9	0,9	100,0
	Gipuzkoa	24,2	55,0	17,4	2,9	0,4	100,0
	Bizkaia	27,7	52,7	15,7	3,2	0,7	100,0

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 2. Distribución de la población (%) según su percepción de la salud general por sexo y edad

		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Mujeres	Total	23,2	54,0	18,2	3,6	1,0	100,0
	15-24	48,0	45,7	5,9	0,4	.	100,0
	25-34	43,9	46,0	9,5	0,6	.	100,0
	35-44	33,6	52,0	12,7	1,0	0,8	100,0
	45-54	20,0	63,2	12,9	3,1	0,7	100,0
	55-64	14,8	61,8	20,6	2,8	0,1	100,0
	65-74	10,2	59,4	25,7	4,1	0,5	100,0
	>=75	6,7	43,3	34,6	11,2	4,2	100,0
Hombres	Total	27,6	55,3	14,6	2,2	0,3	100,0
	15-24	64,4	28,9	5,1	1,7	.	100,0
	25-34	47,4	47,1	5,5	.	.	100,0
	35-44	35,7	53,8	9,8	0,5	0,2	100,0
	45-54	19,8	64,8	13,9	1,4	0,1	100,0
	55-64	14,3	63,0	19,2	3,0	0,5	100,0
	65-74	12,8	64,4	20,0	2,6	0,3	100,0
	>=75	7,4	54,5	29,8	7,1	1,3	100,0
Ambos sexos	Total	25,3	54,6	16,5	2,9	0,7	100,0
	15-24	56,4	37,1	5,5	1,1	.	100,0
	25-34	45,6	46,6	7,5	0,3	.	100,0
	35-44	34,6	52,9	11,3	0,8	0,5	100,0
	45-54	19,9	64,0	13,4	2,3	0,4	100,0
	55-64	14,5	62,4	19,9	2,9	0,3	100,0
	65-74	11,4	61,8	23,0	3,4	0,4	100,0
	>=75	7,0	47,7	32,7	9,6	3,0	100,0

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 3. Distribución de la población (%) según su percepción de la salud general por sexo y clase social

		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Mujeres	Total	23,3	54,0	18,2	3,6	1,0	100,0
	I	37,5	52,4	8,9	1,1	0,1	100,0
	II	28,1	57,3	13,0	0,7	0,9	100,0
	III	27,8	55,6	13,3	2,6	0,7	100,0
	IV	17,7	51,5	24,6	4,7	1,6	100,0
	V	12,2	56,6	23,2	6,9	1,1	100,0
Hombres	Total	27,7	55,2	14,6	2,1	0,3	100,0
	I	36,2	53,2	8,6	2,0	.	100,0
	II	33,0	53,5	12,1	1,2	0,3	100,0
	III	25,9	59,1	12,5	2,3	0,3	100,0
	IV	25,1	55,6	16,6	2,2	0,4	100,0
	V	22,9	50,7	23,1	2,8	0,5	100,0
Ambos sexos	Total	25,4	54,6	16,5	2,9	0,7	100,0
	I	36,8	52,8	8,8	1,6	0,0	100,0
	II	30,5	55,5	12,5	0,9	0,6	100,0
	III	27,0	57,2	12,9	2,4	0,5	100,0
	IV	21,7	53,7	20,3	3,4	0,9	100,0
	V	16,0	54,5	23,2	5,4	0,9	100,0

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 4. Distribución de la población (%) según su percepción de la salud general por sexo y nivel de estudios

		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Mujeres	Total	23,2	54,0	18,2	3,6	1,0	100,0
	Sin estudios, primaria	9,8	45,4	32,7	8,5	3,6	100,0
	Secundaria inferior	14,6	54,5	24,0	5,8	1,1	100,0
	Secundaria superior	26,0	56,3	15,1	2,1	0,5	100,0
	Terciaria	32,5	55,6	10,5	1,4	0,0	100,0
Hombres	Total	27,7	55,3	14,6	2,2	0,3	100,0
	Sin estudios, primaria	15,7	56,2	24,6	3,1	0,4	100,0
	Secundaria inferior	21,3	55,1	19,8	3,2	0,5	100,0
	Secundaria superior	30,1	55,3	12,8	1,6	0,3	100,0
	Terciaria	33,6	54,9	9,5	1,9	0,2	100,0
Ambos sexos	Total	25,3	54,6	16,5	2,9	0,7	100,0
	Sin estudios, primaria	12,1	49,6	29,6	6,4	2,4	100,0
	Secundaria inferior	17,9	54,8	21,9	4,5	0,9	100,0
	Secundaria superior	28,2	55,7	13,9	1,9	0,4	100,0
	Terciaria	33,0	55,3	10,0	1,6	0,1	100,0

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 5. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo y territorio histórico

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	CAPV	75,4	19,2	80,0	65,0	90,0
	Araba	74,1	19,7	78,0	66,0	89,0
	Gipuzkoa	77,0	17,0	80,0	69,0	90,0
	Bizkaia	74,7	20,4	80,0	63,0	90,0
Hombres	CAPV	78,6	17,6	81,0	70,0	91,0
	Araba	79,1	16,8	81,0	70,0	90,0
	Gipuzkoa	79,2	17,0	82,0	70,0	91,0
	Bizkaia	78,1	18,1	81,0	70,0	91,0
Ambos sexos	CAPV	76,9	18,5	80,0	68,0	90,0
	Araba	76,6	18,6	80,0	70,0	90,0
	Gipuzkoa	78,1	17,0	81,0	70,0	90,0
	Bizkaia	76,3	19,4	80,0	66,0	90,0

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 6. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo y edad

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	75,4	19,2	80,0	65,0	90,0
	15-24	85,4	15,3	87,0	80,0	95,0
	25-34	84,5	19,0	90,0	79,0	95,0
	35-44	80,5	18,6	85,0	71,0	93,0
	45-54	76,5	19,1	80,0	70,0	90,0
	55-64	74,6	16,2	80,0	65,0	87,0
	65-74	71,1	16,1	75,0	60,0	84,0
	>=75	60,8	18,5	63,0	50,0	77,0
Hombres	Total	78,6	17,6	81,0	70,0	91,0
	15-24	87,1	16,2	90,0	82,0	99,0
	25-34	86,1	17,0	90,0	80,0	95,0
	35-44	82,8	17,4	86,0	76,0	94,0
	45-54	77,4	18,8	81,0	70,0	90,0
	55-64	74,3	17,2	79,0	65,0	87,0
	65-74	74,1	13,3	76,0	64,0	86,0
	>=75	69,3	15,7	71,0	59,0	82,0
Ambos sexos	Total	76,9	18,5	80,0	68,0	90,0
	15-24	86,3	15,8	90,0	80,0	97,0
	25-34	85,3	18,1	90,0	80,0	95,0
	35-44	81,7	18,0	86,0	74,0	93,0
	45-54	76,9	19,0	81,0	70,0	90,0
	55-64	74,4	16,7	80,0	65,0	87,0
	65-74	72,5	14,9	75,0	60,0	85,0
	>=75	64,2	17,8	67,0	51,0	80,0

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 7. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	75,4	19,2	80,0	65,0	90,0
	I	81,6	16,6	85,0	74,0	92,0
	II	78,9	17,6	81,0	70,0	91,0
	III	77,5	18,0	80,0	70,0	90,0
	IV	72,5	19,9	78,0	60,0	88,0
	V	70,4	19,8	75,0	56,0	87,0
Hombres	Total	78,6	17,6	81,0	70,0	91,0
	I	82,2	16,9	85,0	75,0	94,0
	II	81,4	16,7	84,0	73,0	92,0
	III	78,6	18,2	84,0	70,0	90,0
	IV	76,7	17,6	80,0	66,0	90,0
	V	78,2	16,8	80,0	70,0	92,0
Ambos sexos	Total	76,9	18,5	80,0	68,0	90,0
	I	81,9	16,7	85,0	75,0	93,0
	II	80,1	17,2	83,0	71,0	91,0
	III	78,0	18,1	81,0	70,0	90,0
	IV	74,7	18,8	80,0	63,0	90,0
	V	73,2	19,2	77,0	60,0	90,0

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 8. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo y nivel de estudios

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	75,4	19,2	80,0	65,0	90,0
	Sin estudios, primaria	67,4	20,1	70,0	53,0	83,0
	Secundaria inferior	69,7	19,8	75,0	54,0	85,0
	Secundaria superior	77,5	18,3	80,0	70,0	90,0
	Terciaria	80,8	16,4	83,0	72,0	92,0
Hombres	Total	78,6	17,6	81,0	70,0	91,0
	Sin estudios, primaria	74,8	17,1	80,0	62,0	89,0
	Secundaria inferior	75,1	18,4	79,0	62,0	90,0
	Secundaria superior	79,9	16,5	83,0	70,0	92,0
	Terciaria	80,8	18,3	84,0	74,0	92,0
Ambos sexos	Total	76,9	18,5	80,0	68,0	90,0
	Sin estudios, primaria	70,3	19,3	74,0	59,0	86,0
	Secundaria inferior	72,3	19,3	76,0	60,0	88,0
	Secundaria superior	78,8	17,4	81,0	70,0	91,0
	Terciaria	80,8	17,2	84,0	73,0	92,0

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 9. Distribución de la población (%) según las dimensiones del Euroqol EQ-5D-5L por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Movilidad			
- Sin problemas	80,8	85,9	83,3
- Problemas leves	10,2	7,7	9,0
- Problemas moderados	5,0	4,9	4,9
- Problemas graves	3,0	1,1	2,1
- Incapaz	1,0	0,4	0,7
Cuidado personal			
- Sin problemas	90,7	94,3	92,4
- Problemas leves	4,8	3,0	3,9
- Problemas moderados	2,4	1,9	2,1
- Problemas graves	1,1	0,6	0,9
- Incapaz	1,0	0,3	0,6
Actividades cotidianas			
- Sin problemas	80,4	86,9	83,5
- Problemas leves	10,7	7,5	9,2
- Problemas moderados	5,2	3,8	4,5
- Problemas graves	1,7	1,1	1,4
- Incapaz	2,1	0,6	1,4
Dolor/malestar			
- No	60,6	70,0	65,1
- Leve	22,9	19,8	21,4
- Moderado	12,0	8,4	10,3
- Grave	3,8	1,5	2,7
- Extremo	0,7	0,2	0,5
Ansiedad/depresión			
- No	72,5	79,5	75,9
- Leve	15,7	13,3	14,5
- Moderada	8,7	5,3	7,1
- Grave	2,3	1,4	1,9
- Extrema	0,8	0,4	0,6

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 10. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	19,2	14,1	16,7
Araba	22,4	16,8	19,6
Gipuzkoa	19,1	16,3	17,8
Bizkaia	18,4	12,0	15,3

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 11. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	19,2	14,1	16,7
15-24	2,3	2,6	2,5
25-34	2,7	4,1	3,4
35-44	9,7	5,8	7,8
45-54	13,5	12,8	13,2
55-64	14,3	16,3	15,3
65-74	25,5	20,1	23,0
>=75	57,2	41,7	51,1

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 12. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	19,2	14,1	16,7
I	8,6	9,0	8,8
II	13,9	10,9	12,5
III	15,7	11,3	13,7
IV	23,4	16,5	19,7
V	28,3	21,0	25,7

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 13. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	19,2	14,1	16,8
Sin estudios, primaria	43,8	27,3	37,4
Secundaria inferior	25,1	17,2	21,2
Secundaria superior	12,8	12,9	12,9
Terciaria	10,1	8,2	9,3

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 14. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	9,3	5,7	7,6
Araba	8,8	5,7	7,3
Gipuzkoa	7,2	5,5	6,4
Bizkaia	10,7	5,9	8,4

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 15. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	9,3	5,7	7,6
15-24	0,4	4,3	2,4
25-34	2,6	0,8	1,7
35-44	3,1	1,8	2,4
45-54	4,7	6,4	5,6
55-64	4,0	5,0	4,5
65-74	8,8	4,1	6,6
>=75	37,3	20,5	30,7

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 16. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	9,3	5,8	7,6
I	2,4	3,7	3,1
II	4,0	4,4	4,2
III	5,7	6,2	5,9
IV	13,3	6,7	9,8
V	15,4	5,3	11,8

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 17. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	9,3	5,7	7,6
Sin estudios, primaria	25,0	11,3	19,7
Secundaria inferior	14,5	8,3	11,5
Secundaria superior	5,1	5,0	5,0
Terciaria	2,7	2,6	2,7

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 18. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	19,6	13,1	16,5
Araba	18,0	14,2	16,2
Gipuzkoa	17,6	13,3	15,5
Bizkaia	21,2	12,6	17,1

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 19. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	19,6	13,1	16,5
15-24	2,3	5,5	3,9
25-34	4,6	8,2	6,4
35-44	12,0	5,7	8,9
45-54	16,1	13,2	14,6
55-64	15,5	16,6	16,1
65-74	23,9	12,2	18,5
>=75	53,3	33,0	45,3

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 20. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	19,6	13,1	16,4
I	9,7	10,3	10,0
II	14,0	10,0	12,0
III	14,6	11,4	13,2
IV	24,9	14,9	19,5
V	28,0	16,2	23,8

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 21. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	19,6	13,1	16,5
Sin estudios, primaria	37,0	18,8	30,0
Secundaria inferior	30,7	18,2	24,6
Secundaria superior	12,8	11,6	12,2
Terciaria	11,3	9,1	10,3

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 22. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	39,4	30,0	34,9
Araba	51,2	42,0	46,7
Gipuzkoa	38,9	31,8	35,5
Bizkaia	36,5	25,5	31,3

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 23. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	39,4	30,0	34,9
15-24	23,2	15,4	19,2
25-34	22,9	16,0	19,4
35-44	30,8	25,6	28,2
45-54	39,7	33,0	36,3
55-64	41,5	38,9	40,2
65-74	44,9	36,1	40,8
>=75	62,3	41,1	54,0

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 24. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	39,3	30,1	34,9
I	28,7	24,1	26,4
II	37,2	26,4	32,0
III	35,6	26,6	31,6
IV	43,5	32,8	37,8
V	47,1	38,9	44,2

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 25. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	39,4	30,0	34,9
Sin estudios, primaria	53,9	37,1	47,4
Secundaria inferior	44,5	32,2	38,4
Secundaria superior	35,2	29,5	32,1
Terciaria	33,5	26,4	30,3

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 26. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	27,5	20,5	24,1
Araba	33,2	18,5	26,0
Gipuzkoa	24,8	21,5	23,2
Bizkaia	27,6	20,3	24,1

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 27. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	27,5	20,5	24,1
15-24	27,2	12,2	19,5
25-34	23,3	15,2	19,2
35-44	24,1	22,8	23,4
45-54	24,7	24,1	24,4
55-64	27,3	25,9	26,7
65-74	24,5	17,3	21,1
>=75	39,8	20,0	32,1

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 28. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	27,6	20,5	24,2
I	24,3	20,1	22,2
II	22,1	22,7	22,4
III	24,3	20,7	22,7
IV	32,0	19,8	25,4
V	29,3	21,8	26,6

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 29. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	27,5	20,5	24,1
Sin estudios, primaria	30,4	17,4	25,4
Secundaria inferior	33,7	22,2	28,1
Secundaria superior	24,2	19,1	21,5
Terciaria	25,8	22,7	24,4

Estado de salud

Salud mental

Tabla 30. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo y territorio histórico

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	CAPV	66,6	19,3	68,0	52,0	80,0
	Araba	65,8	22,7	68,0	52,0	80,0
	Gipuzkoa	69,1	18,5	68,0	56,0	84,0
	Bizkaia	65,3	18,8	68,0	52,0	80,0
Hombres	CAPV	71,7	18,2	76,0	60,0	84,0
	Araba	70,6	21,0	76,0	56,0	84,0
	Gipuzkoa	73,1	17,9	76,0	60,0	88,0
	Bizkaia	71,1	17,8	72,0	60,0	84,0
Ambos sexos	CAPV	69,0	19,0	72,0	56,0	84,0
	Araba	68,2	22,1	72,0	56,0	84,0
	Gipuzkoa	71,0	18,3	72,0	56,0	88,0
	Bizkaia	68,0	18,6	68,0	56,0	80,0

Estado de salud

Salud mental

Tabla 31. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo y edad

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	66,6	19,3	68,0	52,0	80,0
	15-24	66,8	23,9	68,0	52,0	80,0
	25-34	69,6	22,2	72,0	56,0	84,0
	35-44	67,4	21,1	68,0	56,0	80,0
	45-54	67,9	19,8	68,0	52,0	84,0
	55-64	65,5	17,0	68,0	52,0	80,0
	65-74	67,8	16,7	68,0	56,0	80,0
	>=75	62,2	18,2	64,0	48,0	80,0
Hombres	Total	71,7	18,2	76,0	60,0	84,0
	15-24	74,8	19,8	76,0	64,0	88,0
	25-34	74,3	21,5	76,0	64,0	88,0
	35-44	72,4	20,6	76,0	60,0	84,0
	45-54	69,5	18,7	68,0	56,0	84,0
	55-64	69,4	17,2	72,0	56,0	84,0
	65-74	73,2	15,9	76,0	60,0	88,0
	>=75	70,2	15,7	72,0	56,0	84,0
Ambos sexos	Total	69,0	19,0	72,0	56,0	84,0
	15-24	70,9	22,1	72,0	60,0	88,0
	25-34	72,0	22,0	76,0	60,0	84,0
	35-44	69,9	21,0	72,0	56,0	84,0
	45-54	68,7	19,2	68,0	56,0	84,0
	55-64	67,4	17,1	68,0	56,0	80,0
	65-74	70,3	16,5	72,0	56,0	84,0
	>=75	65,3	17,6	68,0	52,0	80,0

Estado de salud

Salud mental

Tabla 32. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo y clase social

		Desviación			Percentil	Percentil
		Media	estándar	Mediana	25	75
Mujeres	Total	66,5	19,3	68,0	52,0	80,0
	I	68,8	20,2	72,0	56,0	80,0
	II	67,8	19,2	68,0	56,0	80,0
	III	69,0	18,3	72,0	56,0	84,0
	IV	64,8	19,4	64,0	52,0	80,0
	V	63,5	19,1	64,0	48,0	80,0
Hombres	Total	71,7	18,2	76,0	60,0	84,0
	I	74,6	17,8	76,0	64,0	88,0
	II	72,7	18,0	76,0	64,0	84,0
	III	71,4	19,2	76,0	60,0	84,0
	IV	70,8	17,3	72,0	60,0	84,0
	V	70,3	20,6	72,0	56,0	88,0
Ambos sexos	Total	69,0	19,0	72,0	56,0	84,0
	I	71,7	19,3	76,0	60,0	84,0
	II	70,2	18,8	72,0	60,0	84,0
	III	70,1	18,7	72,0	56,0	84,0
	IV	68,0	18,5	68,0	56,0	80,0
	V	66,0	19,9	68,0	52,0	80,0

Estado de salud

Salud mental

Tabla 33. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo y nivel de estudios

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	66,6	19,3	68,0	52,0	80,0
	Sin estudios, primaria	63,7	19,3	64,0	48,0	80,0
	Secundaria inferior	64,1	18,9	64,0	48,0	80,0
	Secundaria superior	67,2	19,3	68,0	52,0	80,0
	Terciaria	68,9	19,3	72,0	56,0	84,0
Hombres	Total	71,7	18,2	76,0	60,0	84,0
	Sin estudios, primaria	72,3	17,5	76,0	60,0	88,0
	Secundaria inferior	70,3	18,1	72,0	56,0	84,0
	Secundaria superior	71,8	18,0	72,0	60,0	84,0
	Terciaria	72,4	19,1	76,0	60,0	84,0
Ambos sexos	Total	69,0	19,0	72,0	56,0	84,0
	Sin estudios, primaria	67,0	19,0	68,0	52,0	80,0
	Secundaria inferior	67,2	18,7	68,0	52,0	80,0
	Secundaria superior	69,6	18,8	72,0	56,0	84,0
	Terciaria	70,5	19,3	72,0	60,0	84,0

Estado de salud

Salud mental

Tabla 34. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	26,8	17,3	22,2
Araba	27,7	19,2	23,6
Gipuzkoa	24,2	14,9	19,7
Bizkaia	28,1	18,2	23,4

Estado de salud

Salud mental

Tabla 35. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	26,8	17,3	22,2
15-24	26,8	12,6	19,5
25-34	21,4	13,5	17,4
35-44	23,6	16,6	20,1
45-54	25,2	18,3	21,8
55-64	29,3	19,6	24,6
65-74	23,8	17,3	20,7
>=75	35,1	22,0	30,0

Estado de salud

Salud mental

Tabla 36. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	26,9	17,3	22,3
I	23,9	10,4	17,2
II	21,5	16,5	19,1
III	22,7	17,6	20,4
IV	30,2	18,4	23,8
V	32,1	24,5	29,4

Estado de salud

Salud mental

Tabla 37. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	26,8	17,3	22,2
Sin estudios, primaria	33,2	18,6	27,6
Secundaria inferior	32,7	21,0	27,0
Secundaria superior	25,1	16,1	20,4
Terciaria	21,5	15,7	18,9

Estado de salud

Salud mental

Tabla 38. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	6,7	5,3	6,0
Araba	10,1	5,4	7,8
Gipuzkoa	6,3	7,3	6,8
Bizkaia	6,0	4,1	5,1

Estado de salud

Salud mental

Tabla 39. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	6,7	5,3	6,0
15-24	15,4	6,2	10,6
25-34	6,6	3,0	4,8
35-44	8,1	5,2	6,7
45-54	6,9	7,5	7,2
55-64	5,4	6,9	6,2
65-74	3,4	4,4	3,9
>=75	3,9	1,6	2,9

Estado de salud

Salud mental

Tabla 40. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	6,7	5,3	6,0
I	5,8	6,3	6,0
II	3,4	4,4	3,9
III	8,0	7,2	7,6
IV	7,6	4,6	5,9
V	5,9	4,1	5,3

Estado de salud

Salud mental

Tabla 41. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	6,7	5,3	6,0
Sin estudios, primaria	6,5	5,6	6,2
Secundaria inferior	5,2	4,8	5,0
Secundaria superior	7,5	5,4	6,4
Terciaria	6,7	5,4	6,1

Estado de salud

Salud mental

Tabla 42. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	2,5	2,1	2,3
Araba	3,3	1,4	2,4
Gipuzkoa	2,2	2,6	2,4
Bizkaia	2,4	1,9	2,1

Estado de salud

Salud mental

Tabla 43. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	2,5	2,1	2,3
15-24	2,5	2,5	2,5
25-34	4,4	0,0	2,2
35-44	3,7	2,7	3,2
45-54	3,1	3,7	3,4
55-64	1,6	1,9	1,8
65-74	0,8	1,5	1,2
>=75	1,4	0,9	1,2

Estado de salud

Salud mental

Tabla 44. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	2,5	2,1	2,3
I	2,7	1,4	2,1
II	0,6	0,6	0,6
III	2,0	3,5	2,7
IV	3,6	2,3	2,9
V	1,6	0,7	1,3

Estado de salud

Salud mental

Tabla 45. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	2,5	2,1	2,3
Sin estudios, primaria	2,4	1,8	2,2
Secundaria inferior	2,5	1,4	2,0
Secundaria superior	2,4	2,8	2,6
Terciaria	2,5	1,4	2,0

Estado de salud

Salud bucodental

Tabla 46. Distribución de la población (%) según la percepción de la salud bucodental por sexo y territorio histórico

		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Mujeres	Total	16,3	54,8	20,7	6,2	2,0	100,0
	Araba	15,8	59,7	16,3	6,3	1,9	100,0
	Gipuzkoa	16,0	54,5	22,8	4,8	1,8	100,0
	Bizkaia	16,6	53,7	20,6	7,0	2,1	100,0
Hombres	Total	17,0	51,7	23,5	6,4	1,3	100,0
	Araba	13,7	55,6	23,0	6,3	1,4	100,0
	Gipuzkoa	13,9	53,3	25,2	5,6	1,9	100,0
	Bizkaia	19,9	49,6	22,6	6,9	0,9	100,0
Ambos sexos	Total	16,7	53,3	22,1	6,3	1,7	100,0
	Araba	14,8	57,7	19,6	6,3	1,6	100,0
	Gipuzkoa	15,0	53,9	24,0	5,2	1,9	100,0
	Bizkaia	18,2	51,8	21,6	7,0	1,5	100,0

Estado de salud

Salud bucodental

Tabla 47. Distribución de la población (%) según la percepción de la salud bucodental por sexo y edad

		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Mujeres	Total	16,3	54,8	20,7	6,2	2,0	100,0
	15-24	41,3	47,9	8,1	2,4	0,3	100,0
	25-34	31,5	51,6	13,4	1,0	2,4	100,0
	35-44	19,5	61,0	11,8	3,9	3,8	100,0
	45-54	12,9	59,1	22,2	5,0	0,8	100,0
	55-64	10,2	54,9	26,0	7,0	1,9	100,0
	65-74	7,9	60,4	23,9	6,6	1,1	100,0
	>=75	4,2	45,7	32,4	14,7	3,0	100,0
	Hombres	Total	17,0	51,7	23,5	6,4	1,3
15-24		42,0	47,5	8,2	2,0	0,2	100,0
25-34		25,8	60,5	10,5	3,1	. 100,0	
35-44		19,5	54,8	20,6	3,4	1,7	100,0
45-54		12,9	49,8	29,9	5,7	1,7	100,0
55-64		9,6	51,6	25,8	11,1	2,0	100,0
65-74		8,6	50,5	31,7	7,5	1,7	100,0
>=75		5,8	47,0	34,0	11,9	1,2	100,0
Ambos sexos		Total	16,7	53,3	22,1	6,3	1,7
	15-24	41,7	47,7	8,2	2,2	0,3	100,0
	25-34	28,7	56,1	12,0	2,1	1,2	100,0
	35-44	19,5	57,9	16,2	3,6	2,7	100,0
	45-54	12,9	54,4	26,1	5,3	1,3	100,0
	55-64	9,9	53,3	25,9	8,9	1,9	100,0
	65-74	8,2	55,8	27,5	7,0	1,4	100,0
	>=75	4,8	46,2	33,1	13,6	2,3	100,0

Estado de salud

Salud bucodental

Tabla 48. Distribución de la población (%) según la percepción de la salud bucodental por sexo y clase social

		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Mujeres	Total	16,4	54,7	20,8	6,2	2,0	100,0
	I	29,9	53,4	14,8	1,7	0,2	100,0
	II	18,9	63,0	13,5	3,8	0,8	100,0
	III	19,0	57,5	17,7	5,1	0,7	100,0
	IV	11,9	52,8	24,2	7,3	3,8	100,0
	V	7,6	51,2	27,8	11,1	2,3	100,0
Hombres	Total	17,1	51,7	23,6	6,4	1,3	100,0
	I	24,1	58,0	15,3	2,0	0,6	100,0
	II	17,8	59,0	19,5	3,4	0,3	100,0
	III	18,7	53,8	21,1	6,2	0,2	100,0
	IV	14,0	48,3	28,2	7,5	1,9	100,0
	V	14,6	43,9	26,2	12,3	3,0	100,0
Ambos sexos	Total	16,7	53,2	22,1	6,3	1,7	100,0
	I	27,0	55,7	15,0	1,8	0,4	100,0
	II	18,4	61,0	16,4	3,6	0,5	100,0
	III	18,9	55,9	19,2	5,6	0,5	100,0
	IV	13,0	50,4	26,3	7,5	2,8	100,0
	V	10,1	48,6	27,2	11,5	2,5	100,0

Estado de salud

Salud bucodental

Tabla 49. Distribución de la población (%) según la percepción de la salud bucodental por sexo y nivel de estudios

		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Mujeres	Total	16,3	54,8	20,7	6,2	2,0	100,0
	Sin estudios, primaria	5,9	45,3	30,9	13,5	4,3	100,0
	Secundaria inferior	10,5	52,3	24,4	10,5	2,4	100,0
	Secundaria superior	18,7	56,7	19,4	3,7	1,6	100,0
	Terciaria	22,8	59,1	14,5	2,6	0,9	100,0
Hombres	Total	17,0	51,7	23,5	6,4	1,3	100,0
	Sin estudios, primaria	8,5	47,3	27,4	13,5	3,2	100,0
	Secundaria inferior	14,1	43,7	31,0	10,1	1,1	100,0
	Secundaria superior	17,7	52,9	23,0	4,8	1,6	100,0
	Terciaria	21,7	57,9	16,8	3,2	0,4	100,0
Ambos sexos	Total	16,7	53,3	22,1	6,3	1,7	100,0
	Sin estudios, primaria	6,9	46,1	29,6	13,5	3,9	100,0
	Secundaria inferior	12,3	48,1	27,6	10,3	1,7	100,0
	Secundaria superior	18,2	54,7	21,3	4,3	1,6	100,0
	Terciaria	22,4	58,6	15,5	2,9	0,7	100,0

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 50. Prevalencia (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	12,0	10,1	11,1
Araba	12,6	11,0	11,8
Gipuzkoa	10,0	8,8	9,4
Bizkaia	13,1	10,6	11,9

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 51. Prevalencia (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	12,0	10,1	11,1
0-14	9,5	10,2	9,9
15-24	4,7	5,7	5,2
25-34	8,1	4,5	6,3
35-44	10,4	7,1	8,8
45-54	11,3	8,8	10,0
55-64	10,0	13,9	11,9
65-74	13,6	11,3	12,5
>=75	25,3	20,4	23,4

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 52. Prevalencia (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	12,0	10,1	11,1
I	9,3	7,8	8,5
II	10,8	10,1	10,5
III	10,1	9,3	9,7
IV	13,7	11,3	12,5
V	14,9	10,6	13,2

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 53. Prevalencia (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo y nivel de estudios*

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	12,0	9,9	11,0
Sin estudios, primaria	17,1	10,8	14,4
Secundaria inferior	13,4	12,9	13,2
Secundaria superior	10,3	9,6	9,9
Terciaria	9,5	7,3	8,5

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 54. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	14,0	12,5	13,3
Araba	11,5	11,9	11,7
Gipuzkoa	11,9	11,4	11,7
Bizkaia	15,9	13,5	14,7

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 55. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	14,0	12,5	13,3
0-14	3,8	5,8	4,8
15-24	3,3	4,8	4,1
25-34	4,1	4,6	4,4
35-44	7,2	5,5	6,3
45-54	11,3	11,1	11,2
55-64	15,4	22,8	19,0
65-74	19,3	17,7	18,6
>=75	40,5	30,3	36,5

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 56. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	13,9	12,6	13,3
I	5,3	5,8	5,6
II	8,4	9,9	9,1
III	10,8	11,5	11,1
IV	17,9	15,7	16,7
V	22,7	16,6	20,3

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 57. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo y nivel de estudios*

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	14,7	13,2	14,0
Sin estudios, primaria	26,8	19,8	23,8
Secundaria inferior	18,5	17,1	17,8
Secundaria superior	12,0	11,7	11,8
Terciaria	6,7	7,6	7,1

***Población de 10 y más años de edad**

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 58. Distribución de la población (%) según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo y territorio histórico

		Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Mujeres	Total	86,0	7,4	4,8	1,8	100,0
	Araba	88,5	6,3	3,8	1,4	100,0
	Gipuzkoa	88,1	6,0	4,5	1,4	100,0
	Bizkaia	84,1	8,5	5,2	2,2	100,0
Hombres	Total	87,5	6,4	4,2	1,9	100,0
	Araba	88,1	5,3	3,4	3,1	100,0
	Gipuzkoa	88,6	6,4	3,7	1,3	100,0
	Bizkaia	86,5	6,8	4,8	2,0	100,0
Ambos sexos	Total	86,7	6,9	4,5	1,9	100,0
	Araba	88,3	5,8	3,6	2,2	100,0
	Gipuzkoa	88,3	6,2	4,1	1,3	100,0
	Bizkaia	85,3	7,7	5,0	2,1	100,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 59. Distribución de la población (%) según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo y edad

		Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Mujeres	Total	86,0	7,4	4,8	1,8	100,0
	0-14	96,2	2,6	0,8	0,5	100,0
	15-24	96,7	2,4	0,4	0,5	100,0
	25-34	95,9	1,4	2,3	0,4	100,0
	35-44	92,8	3,2	3,2	0,8	100,0
	45-54	88,7	4,2	5,9	1,2	100,0
	55-64	84,6	7,4	6,3	1,7	100,0
	65-74	80,7	10,9	5,3	3,1	100,0
	>=75	59,5	23,8	11,1	5,6	100,0
Hombres	Total	87,5	6,4	4,2	1,9	100,0
	0-14	94,2	4,6	0,9	0,3	100,0
	15-24	95,2	1,5	2,4	0,9	100,0
	25-34	95,4	1,1	2,5	1,0	100,0
	35-44	94,5	2,4	2,6	0,5	100,0
	45-54	88,9	4,7	4,5	1,8	100,0
	55-64	77,2	12,8	8,0	2,1	100,0
	65-74	82,3	9,4	3,7	4,6	100,0
	>=75	69,7	15,9	9,4	5,1	100,0
Ambos sexos	Total	86,7	6,9	4,5	1,9	100,0
	0-14	95,2	3,6	0,8	0,4	100,0
	15-24	95,9	1,9	1,4	0,7	100,0
	25-34	95,6	1,2	2,4	0,7	100,0
	35-44	93,7	2,8	2,9	0,6	100,0
	45-54	88,8	4,4	5,2	1,5	100,0
	55-64	81,0	10,0	7,1	1,9	100,0
	65-74	81,4	10,2	4,6	3,8	100,0
	>=75	63,5	20,7	10,4	5,4	100,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 60. Distribución de la población (%) según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo y clase social

		Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Mujeres	Total	86,1	7,3	4,8	1,8	100,0
	I	94,7	2,3	2,6	0,5	100,0
	II	91,6	4,3	3,4	0,7	100,0
	III	89,2	5,0	3,9	1,9	100,0
	IV	82,1	9,4	6,0	2,5	100,0
	V	77,3	13,5	6,8	2,4	100,0
Hombres	Total	87,4	6,5	4,2	1,9	100,0
	I	94,2	2,6	2,3	0,9	100,0
	II	90,1	4,6	3,3	2,0	100,0
	III	88,5	5,5	4,1	1,9	100,0
	IV	84,3	8,1	5,2	2,4	100,0
	V	83,4	10,2	4,8	1,6	100,0
Ambos sexos	Total	86,7	6,9	4,5	1,9	100,0
	I	94,4	2,4	2,4	0,7	100,0
	II	90,9	4,4	3,4	1,3	100,0
	III	88,9	5,2	4,0	1,9	100,0
	IV	83,3	8,7	5,6	2,4	100,0
	V	79,7	12,2	6,0	2,0	100,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 61. Distribución de la población (%) según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo y nivel de estudios*

		Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Mujeres	Total	85,3	7,7	5,1	1,9	100,0
	Sin estudios, primaria	73,2	16,0	6,7	4,1	100,0
	Secundaria inferior	81,5	11,1	5,4	2,0	100,0
	Secundaria superior	88,0	5,7	5,1	1,3	100,0
	Terciaria	93,3	1,8	3,7	1,3	100,0
Hombres	Total	86,8	6,6	4,5	2,1	100,0
	Sin estudios, primaria	80,2	9,9	6,6	3,3	100,0
	Secundaria inferior	82,9	10,6	4,9	1,6	100,0
	Secundaria superior	88,3	5,5	4,5	1,7	100,0
	Terciaria	92,4	2,6	2,7	2,4	100,0
Ambos sexos	Total	86,0	7,2	4,8	2,0	100,0
	Sin estudios, primaria	76,2	13,4	6,7	3,7	100,0
	Secundaria inferior	82,2	10,8	5,2	1,8	100,0
	Secundaria superior	88,2	5,6	4,8	1,5	100,0
	Terciaria	92,9	2,1	3,2	1,7	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 62. Distribución de la población (%) según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo y territorio histórico

		Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo
Mujeres	Total	2,2	1,3	2,1	2,9	5,5
	Araba	2,0	1,3	2,2	1,4	10,7
	Gipuzkoa	2,1	1,4	2,9	2,0	6,6
	Bizkaia	2,3	1,3	1,7	3,7	3,9
Hombres	Total	4,5	2,0	1,1	3,1	10,8
	Araba	6,8	1,3	0,8	5,1	9,4
	Gipuzkoa	3,0	2,4	1,6	1,3	9,5
	Bizkaia	4,7	2,0	1,0	3,5	11,9
Ambos sexos	Total	3,3	1,7	1,7	3,0	7,9
	Araba	4,4	1,3	1,5	3,2	10,1
	Gipuzkoa	2,5	1,8	2,3	1,7	8,0
	Bizkaia	3,4	1,6	1,4	3,6	7,4

		Otras enfermedades no relacionadas con el trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Mujeres	Total	67,4	0,2	18,4	100,0
	Araba	51,8	.	30,5	100,0
	Gipuzkoa	59,7	0,7	24,6	100,0
	Bizkaia	74,1	.	13,0	100,0
Hombres	Total	61,7	0,2	16,5	100,0
	Araba	51,4	.	25,2	100,0
	Gipuzkoa	62,2	0,3	19,6	100,0
	Bizkaia	64,0	0,2	12,6	100,0
Ambos sexos	Total	64,8	0,2	17,5	100,0
	Araba	51,6	.	27,9	100,0
	Gipuzkoa	60,9	0,5	22,2	100,0
	Bizkaia	69,7	0,1	12,9	100,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 63. Distribución de la población (%) según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo y edad

		Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo
Mujeres	Total	2,2	1,3	2,1	2,9	5,5
	0-14	.	.	.	2,4	.
	15-24	.	.	.	3,9	.
	25-34	.	6,8	.	5,5	4,8
	35-44	8,0	1,9	.	.	5,6
	45-54	5,9	2,7	.	2,3	11,6
	55-64	3,8	2,5	1,4	1,0	14,1
	65-74	1,8	0,7	2,6	2,7	5,5
	>=75	.	0,4	3,7	4,4	0,6
Hombres	Total	4,5	2,0	1,1	3,1	10,8
	0-14
	15-24	.	4,5	3,2	6,9	.
	25-34	2,1	.	.	14,0	4,6
	35-44	13,0	.	6,2	6,2	15,8
	45-54	5,5	2,5	1,5	4,1	13,6
	55-64	6,2	2,3	.	1,5	19,9
	65-74	4,9	2,4	2,0	1,9	12,2
	>=75	1,7	2,2	0,5	2,7	1,8
Ambos sexos	Total	3,3	1,7	1,7	3,0	7,9
	0-14	.	.	.	0,9	.
	15-24	.	2,7	1,9	5,7	.
	25-34	1,1	3,1	.	10,0	4,7
	35-44	10,2	1,1	2,7	2,7	10,0
	45-54	5,7	2,6	0,8	3,2	12,6
	55-64	5,2	2,4	0,6	1,3	17,5
	65-74	3,2	1,5	2,3	2,3	8,5
	>=75	0,5	1,0	2,6	3,8	1,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 63. Distribución de la población (%) según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo y edad

		Otras enfermedades no relacionadas con el trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Mujeres	Total	67,4	0,2	18,4	100,0
	0-14	59,9	.	37,7	100,0
	15-24	49,2	.	47,0	100,0
	25-34	53,6	.	29,4	100,0
	35-44	62,7	1,2	20,6	100,0
	45-54	64,8	0,9	11,9	100,0
	55-64	62,3	.	14,9	100,0
	65-74	71,5	.	15,2	100,0
	>=75	72,1	.	18,9	100,0
Hombres	Total	61,7	0,2	16,5	100,0
	0-14	57,8	1,5	40,7	100,0
	15-24	54,9	.	30,5	100,0
	25-34	39,7	.	39,6	100,0
	35-44	49,8	.	9,1	100,0
	45-54	61,7	.	11,1	100,0
	55-64	62,8	.	7,2	100,0
	65-74	57,7	.	18,9	100,0
	>=75	72,1	0,5	18,6	100,0
Ambos sexos	Total	64,8	0,2	17,5	100,0
	0-14	58,7	0,9	39,5	100,0
	15-24	52,7	.	36,9	100,0
	25-34	46,2	.	34,9	100,0
	35-44	57,1	0,7	15,6	100,0
	45-54	63,2	0,4	11,5	100,0
	55-64	62,6	.	10,4	100,0
	65-74	65,3	.	16,8	100,0
	>=75	72,1	0,1	18,8	100,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 64. Distribución de la población (%) según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo y clase social

		Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo
Mujeres	Total	2,2	1,4	2,1	2,9	5,5
	I	.	0,9	1,0	4,3	5,6
	II	.	7,3	1,8	4,8	1,2
	III	1,8	.	4,1	1,4	4,6
	IV	2,6	1,6	2,0	2,3	6,2
	V	3,1	0,4	1,2	4,0	6,0
Hombres	Total	4,5	2,0	1,1	3,1	10,9
	I	4,3	.	1,3	2,4	7,8
	II	2,7	.	1,5	1,1	9,5
	III	3,0	1,7	0,7	2,8	14,1
	IV	5,1	2,2	1,5	3,6	11,8
	V	5,6	4,4	.	3,2	5,3
Ambos sexos	Total	3,3	1,7	1,7	3,0	8,0
	I	2,3	0,4	1,1	3,3	6,8
	II	1,4	3,5	1,6	2,9	5,5
	III	2,4	0,8	2,5	2,1	9,0
	IV	3,8	1,9	1,8	2,9	9,0
	V	3,9	1,7	0,8	3,7	5,8

		Otras enfermedades no relacionadas con el trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Mujeres	Total	67,4	0,2	18,3	100,0
	I	57,2	.	31,0	100,0
	II	63,5	.	21,5	100,0
	III	65,8	.	22,1	100,0
	IV	69,9	0,2	15,1	100,0
	V	67,6	0,3	17,4	100,0
Hombres	Total	61,6	0,2	16,5	100,0
	I	52,8	.	31,4	100,0
	II	64,8	.	20,5	100,0
	III	61,6	.	16,1	100,0
	IV	62,5	0,2	13,1	100,0
	V	61,6	0,7	19,1	100,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 64. Distribución de la población (%) según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo y clase social

		Otras enfermedades no relacionadas con el trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Ambos sexos	Total	64,7	0,2	17,5	100,0
	I	54,9	.	31,2	100,0
	II	64,2	.	20,9	100,0
	III	63,9	.	19,3	100,0
	IV	66,2	0,2	14,1	100,0
	V	65,7	0,4	18,0	100,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 65. Distribución de la población (%) según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo y nivel de estudios*

		Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	
Mujeres	Total	2,3	1,4	2,2	3,0	
	Sin estudios, primaria	1,0	0,2	3,4	2,9	
	Secundaria inferior	1,3	1,1	2,0	3,8	
	Secundaria superior	4,7	2,5	0,9	2,2	
	Terciaria	2,5	2,9	1,8	3,4	
Hombres	Total	4,7	2,1	1,2	3,2	
	Sin estudios, primaria	3,4	2,1	1,0	1,3	
	Secundaria inferior	5,7	2,7	1,5	1,4	
	Secundaria superior	5,1	2,2	1,2	4,9	
	Terciaria	4,0	0,7	0,9	5,7	
Ambos sexos	Total	3,4	1,7	1,7	3,1	
	Sin estudios, primaria	1,9	0,9	2,5	2,3	
	Secundaria inferior	3,3	1,8	1,8	2,7	
	Secundaria superior	4,9	2,3	1,1	3,6	
	Terciaria	3,2	1,9	1,4	4,5	

		Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades no relacionadas con el trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Mujeres	Total	5,6	67,5	0,2	17,9	100,0
	Sin estudios, primaria	3,3	65,1	.	24,1	100,0
	Secundaria inferior	5,9	76,1	0,3	9,7	100,0
	Secundaria superior	7,9	66,7	.	15,0	100,0
	Terciaria	6,2	57,3	0,9	25,0	100,0
Hombres	Total	11,3	61,3	0,2	15,9	100,0
	Sin estudios, primaria	7,3	59,4	0,4	25,0	100,0
	Secundaria inferior	12,2	68,1	.	8,3	100,0
	Secundaria superior	14,5	57,7	0,3	14,2	100,0
	Terciaria	7,3	60,9	.	20,5	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 65. Distribución de la población (%) según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo y nivel de estudios*

	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades no relacionadas con el trabajo	Violencia física	Otras causas	Total
Ambos sexos Total	8,2	64,7	0,2	17,0	100,0
Sin estudios, primaria	4,7	63,1	0,2	24,4	100,0
Secundaria inferior	8,8	72,4	0,2	9,1	100,0
Secundaria superior	11,4	61,9	0,2	14,6	100,0
Terciaria	6,7	59,0	0,5	22,9	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 66. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	18,0	11,6	15,4
Araba	17,0	11,8	15,0
Gipuzkoa	16,5	12,8	15,0
Bizkaia	19,1	10,8	15,8

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 67. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	18,0	11,6	15,4
70-74	4,7	3,5	4,2
75-79	5,7	6,4	6,0
80-84	19,7	17,0	18,5
85 y más	44,3	29,5	39,5

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 68. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	17,7	11,7	15,3
I	7,4	9,1	8,5
II	15,3	10,4	13,0
III	11,9	11,4	11,7
IV	18,3	11,7	15,4
V	24,3	16,2	22,4

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 69. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	18,0	11,6	15,4
Sin estudios, primaria	24,7	14,0	21,4
Secundaria inferior	16,5	11,8	14,7
Secundaria superior	8,4	10,6	9,6
Terciaria	6,2	7,8	7,1

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 70. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	11,2	7,6	9,7
Araba	9,4	4,4	7,4
Gipuzkoa	12,1	8,0	10,3
Bizkaia	11,1	8,2	9,8

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 71. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	11,2	7,6	9,7
70-74	5,0	1,8	3,6
75-79	8,8	5,0	7,2
80-84	13,8	8,4	11,4
85 y más	24,9	26,9	25,7

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 72. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	11,1	7,6	9,7
I	7,6	7,1	7,3
II	9,5	4,7	7,3
III	9,8	6,8	8,7
IV	12,4	8,8	10,7
V	11,2	6,1	9,9

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 73. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	11,1	7,6	9,6
Sin estudios, primaria	13,1	12,4	12,9
Secundaria inferior	10,1	6,3	8,5
Secundaria superior	9,3	4,2	6,5
Terciaria	9,4	7,7	8,6

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 74. Distribución de la población (%) según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo y territorio histórico

		Sí, todos los días, 24 horas al día.	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día.	Sí, varias veces por semana.	Sí, de vez en cuando.	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona.	Total
Mujeres	Total	2,5	2,6	0,9	1,3	92,6	100,0
	Araba	4,6	0,7	0,8	1,1	92,8	100,0
	Gipuzkoa	1,8	2,0	1,0	1,7	93,6	100,0
	Bizkaia	2,3	3,5	1,0	1,2	92,0	100,0
Hombres	Total	1,6	1,9	0,6	0,9	95,0	100,0
	Araba	3,2	1,0	0,4	0,9	94,5	100,0
	Gipuzkoa	1,3	2,0	0,7	1,2	94,8	100,0
	Bizkaia	1,3	2,1	0,6	0,7	95,3	100,0
Ambos sexos	Total	2,1	2,3	0,8	1,1	93,8	100,0
	Araba	3,9	0,8	0,6	1,0	93,6	100,0
	Gipuzkoa	1,6	2,0	0,8	1,4	94,2	100,0
	Bizkaia	1,8	2,8	0,8	1,0	93,6	100,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 75. Distribución de la población (%) según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo y edad

		Sí, todos los días, 24 horas al día.	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día.	Sí, varias veces por semana.	Sí, de vez en cuando.	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona.	Total
Mujeres	Total	2,5	2,6	0,9	1,3	92,6	100,0
	0-14	4,8	2,5	0,5	0,0	92,2	100,0
	15-24	0,2	0,5	.	.	99,3	100,0
	25-34	.	0,5	.	0,3	99,2	100,0
	35-44	0,1	0,8	0,1	.	99,0	100,0
	45-54	0,1	0,4	0,2	0,6	98,6	100,0
	55-64	0,4	0,9	0,5	0,3	97,9	100,0
	65-74	1,5	2,1	0,9	2,4	93,2	100,0
	>=75	11,7	12,2	4,9	6,5	64,7	100,0
Hombres	Total	1,6	1,9	0,6	0,9	95,0	100,0
	0-14	4,0	3,0	.	.	93,0	100,0
	15-24	0,9	0,8	.	0,5	97,9	100,0
	25-34	0,1	0,4	0,3	.	99,2	100,0
	35-44	.	0,6	0,1	.	99,3	100,0
	45-54	0,6	0,9	0,4	0,3	97,8	100,0
	55-64	0,7	1,2	0,6	1,4	96,1	100,0
	65-74	1,1	0,7	0,9	1,4	95,9	100,0
	>=75	6,8	9,3	3,1	4,8	75,9	100,0
Ambos sexos	Total	2,1	2,3	0,8	1,1	93,8	100,0
	0-14	4,4	2,7	0,2	0,0	92,6	100,0
	15-24	0,5	0,7	.	0,2	98,6	100,0
	25-34	0,1	0,4	0,2	0,1	99,2	100,0
	35-44	0,1	0,7	0,1	.	99,2	100,0
	45-54	0,3	0,7	0,3	0,5	98,2	100,0
	55-64	0,6	1,0	0,5	0,8	97,0	100,0
	65-74	1,3	1,5	0,9	1,9	94,4	100,0
	>=75	9,8	11,1	4,2	5,9	69,1	100,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 76. Distribución de la población (%) según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo y clase social

		Sí, todos los días, 24 horas al día.	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día.	Sí, varias veces por semana.	Sí, de vez en cuando.	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona.	Total
Mujeres	Total	2,5	2,6	0,9	1,4	92,7	100,0
	I	1,3	0,9	0,2	0,6	97,1	100,0
	II	1,8	1,6	0,6	0,6	95,5	100,0
	III	2,0	1,5	0,6	1,1	94,9	100,0
	IV	3,1	3,1	1,3	1,7	90,7	100,0
	V	3,4	5,4	1,7	2,3	87,2	100,0
Hombres	Total	1,6	1,9	0,6	0,9	95,0	100,0
	I	1,5	0,8	0,1	0,6	96,9	100,0
	II	1,2	1,5	0,4	0,2	96,6	100,0
	III	1,7	2,4	0,7	0,5	94,7	100,0
	IV	1,7	2,1	0,8	1,3	94,1	100,0
	V	1,6	2,3	0,5	1,2	94,3	100,0
Ambos sexos	Total	2,0	2,2	0,8	1,1	93,8	100,0
	I	1,4	0,9	0,1	0,6	97,0	100,0
	II	1,5	1,5	0,5	0,4	96,0	100,0
	III	1,9	1,9	0,6	0,8	94,8	100,0
	IV	2,4	2,6	1,1	1,5	92,5	100,0
	V	2,7	4,2	1,2	1,9	90,0	100,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 77. Distribución de la población (%) según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo y nivel de estudios*

		Sí, todos los días, 24 horas al día.	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día.	Sí, varias veces por semana.	Sí, de vez en cuando.	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona.	Total
Mujeres	Total	2,0	2,6	1,0	1,5	93,0	100,0
	Sin estudios, primaria	6,9	6,2	2,9	4,0	80,0	100,0
	Secundaria inferior	2,4	4,3	1,0	2,0	90,2	100,0
	Secundaria superior	0,6	1,0	0,4	0,7	97,2	100,0
	Terciaria	0,2	0,6	0,3	0,2	98,7	100,0
Hombres	Total	1,2	1,7	0,6	1,0	95,5	100,0
	Sin estudios, primaria	2,5	4,7	1,5	2,4	88,8	100,0
	Secundaria inferior	1,5	2,4	0,8	1,2	94,1	100,0
	Secundaria superior	0,9	0,8	0,4	0,5	97,5	100,0
	Terciaria	0,7	0,6	0,4	0,8	97,5	100,0
Ambos sexos	Total	1,6	2,2	0,8	1,2	94,2	100,0
	Sin estudios, primaria	5,0	5,6	2,3	3,3	83,9	100,0
	Secundaria inferior	2,0	3,4	0,9	1,6	92,1	100,0
	Secundaria superior	0,7	0,9	0,4	0,6	97,4	100,0
	Terciaria	0,4	0,6	0,3	0,5	98,2	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 78. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda* por sexo y territorio histórico

	Mujeres				Hombres				Ambos sexos			
	Total	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Total	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Total	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Familiar que convive	57,3	58,7	48,6	61,3	67,4	70,9	58,3	72,7	61,3	63,9	52,8	65,3
Familiar que no convive	32,0	33,5	33,0	31,2	24,2	28,0	24,8	22,4	29,0	31,2	29,4	28,1
Servicios sociales públicos	11,6	13,5	12,3	10,9	7,8	5,2	9,0	7,8	10,1	10,0	10,8	9,8
Persona contratada	28,7	20,5	38,0	26,2	19,1	11,3	27,9	15,7	25,0	16,6	33,6	22,5
Empresa privada	1,9	7,2	0,7	1,2	3,3	1,8	5,3	2,3	2,4	4,9	2,7	1,6
Voluntariado	0,7	0,0	0,7	0,9	0,9	3,4	0,9	0,0	0,8	1,5	0,8	0,6
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	2,1	1,8	1,6	2,5	0,6	3,8	0,0	0,0	1,6	2,7	0,9	1,6

*Las categorías no son excluyentes
Encuesta de Salud del País Vasco 2023

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 79. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo y edad

	Mujeres							Hombres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Familiar que convive	57,3	96,9	100,0	75,8	56,2	57,6	48,1	67,4	100,0	100,0	59,7	62,5	70,8	52,3
Familiar que no convive	32,0	13,2	0,0	31,4	22,7	26,7	38,2	24,2	10,7	21,4	12,8	35,5	19,6	27,2
Servicios sociales públicos	11,6	4,2	0,0	25,8	15,6	14,6	11,8	7,8	3,4	7,7	5,1	10,8	3,2	9,6
Persona contratada	28,7	4,4	0,0	0,0	13,0	17,4	38,9	19,1	9,1	0,0	0,0	6,1	15,8	33,1
Empresa privada	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,5	3,3	0,0	13,7	0,0	3,6	7,3	3,0
Voluntariado	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,8	0,9	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	1,3
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	2,1	3,6	0,0	11,5	1,7	5,8	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4

	Ambos sexos						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Familiar que convive	61,3	98,4	100,0	68,6	60,2	62,2	49,3
Familiar que no convive	29,0	12,0	16,1	23,2	30,8	24,2	34,9
Servicios sociales públicos	10,1	3,8	5,8	16,6	12,6	10,6	11,1
Persona contratada	25,0	6,7	0,0	0,0	8,6	16,8	37,1
Empresa privada	2,4	0,0	10,3	0,0	2,3	4,1	2,7
Voluntariado	0,8	0,0	5,8	0,0	0,0	1,2	0,9
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	1,6	1,9	0,0	6,4	0,6	3,8	1,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 80. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo y clase social

	Mujeres						Hombres						Ambos sexos					
	Total	I	II	III	IV	V	Total	I	II	III	IV	V	Total	I	II	III	IV	V
Familiar que convive	58,1	64,7	66,8	71,0	52,8	55,4	67,4	73,5	66,9	70,8	68,2	52,8	61,8	69,3	66,9	70,9	59,3	54,8
Familiar que no convive	32,2	28,9	26,4	18,9	37,2	34,1	24,2	24,2	20,1	17,2	27,7	23,8	29,0	26,4	23,8	18,1	33,2	31,8
Servicios sociales públicos	11,8	2,2	9,2	6,5	15,3	12,1	7,8	7,4	4,2	6,3	8,7	9,1	10,2	4,9	7,2	6,4	12,6	11,4
Persona contratada	28,0	29,1	30,3	24,1	29,6	26,8	19,1	27,8	28,2	9,6	19,6	20,7	24,5	28,5	29,4	17,5	25,4	25,5
Empresa privada	1,9	4,1	0,0	1,5	1,8	2,4	3,3	5,2	4,3	2,4	2,5	5,4	2,5	4,7	1,7	1,9	2,1	3,1
Voluntariado	0,7	0,0	0,0	1,5	0,5	1,0	0,9	0,0	0,0	2,7	0,7	0,0	0,8	0,0	0,0	2,1	0,5	0,8
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	1,9	4,1	0,0	1,3	2,1	2,0	0,6	0,0	4,3	0,0	0,7	0,0	1,4	2,0	1,7	0,7	1,5	1,5

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 81. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo y nivel de estudios

	Mujeres				
	Total	Sin estudios,	Secundaria	Secundaria	Terciaria
		primaria	inferior	superior	
Familiar que convive	52,3	51,5	51,8	56,0	53,6
Familiar que no convive	34,6	35,5	37,2	35,5	6,1
Servicios sociales públicos	12,7	11,3	19,2	7,2	2,6
Persona contratada	31,9	32,1	30,5	31,1	40,0
Empresa privada	2,2	2,7	1,5	0,0	6,1
Voluntariado	0,8	1,1	0,8	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	1,6	0,7	2,2	1,0	9,0

	Hombres				
	Total	Sin estudios,	Secundaria	Secundaria	Terciaria
		primaria	inferior	superior	
Familiar que convive	60,7	54,1	59,9	79,2	47,4
Familiar que no convive	27,4	24,3	33,8	21,8	33,5
Servicios sociales públicos	8,8	9,3	12,6	7,3	1,8
Persona contratada	21,0	27,0	11,5	17,6	30,7
Empresa privada	3,9	5,9	3,8	3,0	0,0
Voluntariado	1,1	2,9	0,0	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	0,8	1,1	0,0	1,6	0,0

	Ambos sexos				
	Total	Sin estudios,	Secundaria	Secundaria	Terciaria
		primaria	inferior	superior	
Familiar que convive	55,4	52,3	54,7	67,8	49,9
Familiar que no convive	31,9	32,2	36,0	28,5	22,3
Servicios sociales públicos	11,2	10,7	16,8	7,3	2,1
Persona contratada	27,8	30,6	23,7	24,2	34,5
Empresa privada	2,8	3,7	2,3	1,5	2,5
Voluntariado	0,9	1,6	0,5	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	1,3	0,8	1,4	1,3	3,7

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 82. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y territorio histórico

	Mujeres				Hombres			
	Total	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Total	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Caries	2,3	2,0	0,9	3,3	2,9	1,6	0,6	4,7
Otros p. dentales	0,9	1,2	0,3	1,3	1,1	1,5	0,5	1,4
Hipertensión	10,9	9,4	9,0	12,4	11,6	9,7	10,4	13,0
Diabetes	3,6	3,9	2,8	3,9	4,7	4,9	4,1	5,1
Colesterol elevado	8,4	5,3	4,8	11,5	10,1	6,4	6,3	13,6
Fibromialgia	0,6	0,7	0,5	0,7	0,2	0,1	0,3	0,3
Artrosis	9,4	6,1	4,2	13,5	5,0	2,8	2,0	7,6
Dolor cervical	6,8	3,2	2,0	10,9	4,6	3,8	1,5	6,8
Dolor dorsal	9,7	4,6	3,4	15,0	7,2	3,9	2,5	11,2
Asma	3,8	2,8	2,7	4,8	3,6	2,7	3,2	4,1
Varices	6,0	4,3	1,4	9,4	2,2	1,3	0,3	3,6
Trombosis	0,8	0,2	0,5	1,1	0,8	0,0	0,8	1,0
Infarto agudo de miocardio	0,4	0,5	0,3	0,4	1,5	2,2	1,1	1,5
Otros p. crón. corazón	3,9	2,9	2,4	5,0	5,1	2,9	4,7	6,0
Alergia crónica	5,0	3,3	2,7	6,9	4,5	2,4	2,8	6,2
Bronquitis crónica	1,0	0,5	0,4	1,6	1,1	0,2	0,9	1,5
Úlcera estómago o duodeno	0,7	0,5	0,4	0,9	0,8	0,8	0,6	0,9
Hemorroides	2,7	0,6	0,5	4,7	1,8	0,9	0,4	2,9
Cáncer	1,7	1,1	1,1	2,3	1,3	0,9	0,7	1,9
Ceguera parcial o total	0,7	0,4	0,3	1,0	0,5	0,6	0,2	0,7
Cataratas	1,7	0,7	0,5	2,6	1,3	1,2	0,4	1,9
Audición (incluye sordera)	2,6	1,5	0,7	4,0	2,2	0,8	0,6	3,7
Piel	2,3	2,1	1,2	3,2	2,0	1,1	0,8	3,0
Tiroides	5,2	4,3	4,4	6,0	1,0	1,0	0,8	1,1
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	2,4	1,7	4,8
Incontinencia urinaria	1,5	1,1	0,8	2,0	0,8	0,4	0,9	1,0
Demencia	1,0	0,9	0,7	1,1	0,5	0,1	0,2	0,7
Ansiedad	4,6	3,4	3,2	5,8	2,4	1,3	1,1	3,5
Depresión	3,1	3,1	2,3	3,6	1,6	1,0	1,2	2,1
Otros p. mentales	0,5	0,5	0,3	0,7	0,6	0,5	0,4	0,7
Migraña	3,4	1,4	1,9	4,8	1,4	1,2	0,5	2,0
Osteoporosis	3,2	2,0	2,1	4,2	0,8	0,6	0,3	1,1
Anemia	1,5	0,3	0,8	2,2	0,5	0,2	0,2	0,7
Estreñimiento	1,8	0,8	0,6	2,9	1,1	0,4	0,1	1,9
Ácido úrico/gota	0,3	0,1	0,2	0,5	1,7	1,1	0,9	2,4

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 82. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y territorio histórico

	Mujeres				Hombres			
	Total	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Total	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Mala circulación	3,3	1,9	1,5	4,8	2,3	1,4	1,1	3,3
Insomnio	6,0	2,7	4,2	8,1	3,2	1,5	1,7	4,7
Problemas del riñón	0,8	0,1	0,3	1,2	1,2	0,9	0,7	1,6
Deficit de atención con hiperactividad	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4	0,9	0,3	0,3
Problemas asociados a la menopáusico	0,3	0,3	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	9,8	7,0	10,1	10,4	9,1	5,4	10,2	9,5

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 83. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y edad

	Mujeres							Hombres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Caries	2,3	2,0	3,0	2,7	2,5	1,5	1,9	2,9	2,1	4,3	3,1	3,0	1,6	3,1
Otros p. dentales	0,9	0,0	0,3	0,4	1,4	1,8	1,4	1,1	0,1	0,4	0,7	1,3	1,9	2,9
Hipertensión	10,9	0,0	0,0	0,5	8,6	23,0	39,7	11,6	0,0	0,0	0,9	13,4	31,9	39,4
Diabetes	3,6	0,1	0,0	0,9	2,4	6,7	13,4	4,7	0,1	0,2	0,6	5,3	11,5	17,2
Colesterol elevado	8,4	0,0	0,2	0,7	7,7	23,3	23,0	10,1	0,0	0,0	3,3	11,1	27,5	30,1
Fibromialgia	0,6	0,0	0,0	0,3	1,1	1,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,3
Artrosis	9,4	0,1	0,0	0,9	8,8	19,2	30,9	5,0	0,0	0,3	0,8	6,0	10,0	19,6
Dolor cervical	6,8	0,0	0,7	2,4	7,2	12,5	18,9	4,6	0,2	0,3	1,9	5,9	7,7	14,3
Dolor dorsal	9,7	0,1	0,6	3,2	11,3	17,9	24,6	7,2	0,0	0,7	2,7	10,4	13,8	18,1
Asma	3,8	3,9	2,6	5,4	3,3	3,9	2,8	3,6	6,1	3,1	3,3	3,3	2,8	3,0
Varices	6,0	0,0	0,0	0,8	5,7	12,9	18,8	2,2	0,0	0,0	0,4	2,2	5,1	8,9
Trombosis	0,8	0,0	0,0	0,3	0,5	1,3	2,9	0,8	0,0	0,0	0,1	0,6	1,5	4,2
Infarto agudo de miocardio	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	2,1	2,5	5,7
Otros p. crón. corazón	3,9	0,2	0,0	0,6	1,7	6,4	17,8	5,1	0,0	0,2	0,8	4,4	12,6	22,7
Alergia crónica	5,0	2,6	4,7	7,3	5,1	4,2	4,3	4,5	4,6	4,9	6,1	4,0	3,7	2,5
Bronquitis crónica	1,0	0,0	0,0	0,3	1,0	2,6	2,7	1,1	0,2	0,1	0,3	1,3	2,1	3,7
Úlcera estómago o duodeno	0,7	0,0	0,0	0,4	0,7	1,2	2,0	0,8	0,0	0,0	0,4	1,1	1,4	1,9
Hemorroides	2,7	0,0	0,0	0,7	1,7	6,3	9,3	1,8	0,0	0,0	0,6	2,0	3,5	6,9
Cáncer	1,7	0,0	0,0	0,5	2,4	3,8	3,2	1,3	0,0	0,0	0,2	1,5	3,4	4,7
Ceguera parcial o total	0,7	0,1	0,2	0,2	0,4	0,9	3,0	0,5	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	3,3
Cataratas	1,7	0,0	0,0	0,1	0,6	3,3	7,8	1,3	0,0	0,1	0,1	0,6	3,3	7,8
Audición (incluye sordera)	2,6	0,0	0,1	0,3	1,6	4,7	10,4	2,2	0,5	0,2	0,4	1,5	4,6	11,5
Piel	2,3	0,7	1,8	2,4	2,2	2,4	4,3	2,0	0,6	1,2	1,9	1,9	3,2	4,2
Tiroides	5,2	0,1	0,6	4,0	6,9	9,6	7,5	1,0	0,0	0,5	1,0	1,0	2,5	0,9
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,1	1,9	9,9	18,4
Incontinencia urinaria	1,5	0,0	0,0	0,0	0,7	2,3	7,2	0,8	0,0	0,0	0,1	0,4	1,7	5,5
Demencia	1,0	0,1	0,3	0,0	0,2	1,0	5,5	0,5	0,3	0,1	0,0	0,3	0,5	2,9
Ansiedad	4,6	0,2	2,1	3,4	5,0	7,0	9,0	2,4	0,6	1,6	1,4	3,9	2,6	2,9
Depresión	3,1	0,0	0,3	1,6	4,0	4,7	7,1	1,6	0,3	1,0	1,0	2,6	1,9	2,2
Otros p. mentales	0,5	0,0	0,1	0,6	0,7	0,9	0,6	0,6	0,1	0,4	0,1	1,1	0,6	0,8

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 83. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y edad

	Mujeres							Hombres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Migraña	3,4	0,1	2,0	2,9	4,4	4,6	4,6	1,4	0,6	0,6	1,4	1,5	1,2	3,1
Osteoporosis	3,2	0,2	0,0	0,2	1,7	7,8	12,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	3,8
Anemia	1,5	0,1	1,1	1,8	1,3	0,5	3,7	0,5	0,0	0,2	0,1	0,4	1,0	2,4
Estreñimiento	1,8	0,0	0,1	0,5	1,5	2,8	6,7	1,1	0,2	0,1	0,2	0,9	1,4	6,2
Ácido úrico/gota	0,3	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	1,2	1,7	0,0	0,2	0,1	1,5	4,7	7,3
Mala circulación	3,3	0,0	0,0	0,7	2,8	5,3	12,1	2,3	0,1	0,0	0,1	2,0	4,5	11,8
Insomnio	6,0	0,0	0,7	1,7	5,2	11,0	19,8	3,2	0,4	0,6	1,7	3,5	6,3	9,9
Problemas del riñón	0,8	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	2,9	1,2	0,2	0,2	0,5	1,1	2,2	4,7
Deficit de atención con hiperactividad	0,1	0,6	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	1,7	1,4	0,0	0,1	0,0	0,0
Problemas asociados a la menopáusico	0,3	0,0	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	9,8	4,0	5,4	8,8	10,6	14,4	13,8	9,1	5,3	4,8	7,0	10,9	12,5	14,6

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 84. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y clase social

	Mujeres						Hombres					
	Total	I	II	III	IV	V	Total	I	II	III	IV	V
Caries	2,3	1,6	1,3	2,2	2,9	2,9	2,9	1,5	1,8	2,6	3,8	3,1
Otros p. dentales	1,0	0,2	0,6	1,2	0,8	2,0	1,1	0,2	1,1	1,1	1,4	1,4
Hipertensión	10,8	4,8	7,5	8,1	13,9	16,8	11,6	8,7	8,6	11,7	13,4	12,4
Diabetes	3,6	1,0	1,3	2,7	4,6	7,1	4,7	1,9	2,3	4,6	6,1	6,5
Colesterol elevado	8,4	4,2	4,6	7,6	10,1	12,9	10,2	7,0	7,8	9,7	12,6	8,9
Fibromialgia	0,6	0,3	0,0	0,4	0,8	1,4	0,2	0,1	0,5	0,1	0,2	0,4
Artrosis	9,3	3,6	5,9	6,7	11,9	16,0	5,0	2,4	4,0	4,3	6,8	5,0
Dolor cervical	6,8	3,1	4,1	5,5	8,4	10,8	4,6	1,2	4,1	4,5	6,2	4,3
Dolor dorsal	9,7	4,8	6,4	7,6	12,3	14,4	7,2	3,2	5,9	6,3	9,9	6,3
Asma	3,8	3,2	3,8	3,7	4,1	4,0	3,6	4,4	4,0	3,8	3,1	3,0
Varices	6,0	2,1	2,6	4,8	8,2	9,3	2,1	0,9	0,9	1,9	3,0	2,5
Trombosis	0,8	0,1	0,4	0,8	0,9	1,4	0,8	0,3	1,1	0,8	1,0	0,4
Infarto agudo de miocardio	0,4	0,1	0,2	0,2	0,4	1,2	1,5	1,2	1,1	2,0	1,4	1,8
Otros p. crón. corazón	3,9	1,7	1,7	3,4	4,6	6,8	5,1	4,0	3,8	4,9	6,0	4,8
Alergia crónica	5,0	4,5	5,7	5,3	4,6	5,6	4,5	3,9	5,8	4,5	4,8	3,1
Bronquitis crónica	1,0	0,7	0,3	1,0	1,4	1,1	1,1	0,5	0,6	1,4	1,3	1,5
Úlcera estómago o duodeno	0,7	0,8	0,3	0,4	0,6	1,5	0,8	0,2	0,5	0,6	1,1	1,3
Hemorroides	2,7	1,1	2,4	2,6	3,4	3,0	1,8	1,2	1,4	0,9	2,6	1,5
Cáncer	1,7	1,1	1,9	2,0	1,8	1,7	1,3	0,5	1,7	1,1	1,7	1,3
Ceguera parcial o total	0,7	0,3	0,9	0,3	0,7	1,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,8	0,3
Cataratas	1,6	0,4	0,9	1,7	2,0	2,4	1,3	0,9	0,8	1,5	1,5	1,3
Audición (incluye sordera)	2,6	1,8	1,5	1,8	3,0	4,2	2,2	0,4	2,2	1,3	3,3	2,6
Piel	2,4	2,0	3,2	1,9	2,5	2,3	2,0	1,8	2,5	1,5	2,4	1,2
Tiroides	5,2	3,8	3,5	6,9	4,6	6,6	1,0	0,6	0,5	1,2	1,0	1,5
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	2,2	2,6	3,1	4,5	2,5
Incontinencia urinaria	1,4	0,6	0,6	1,3	1,3	3,4	0,8	0,2	0,6	0,9	1,1	1,1
Demencia	1,0	0,4	0,8	0,8	1,1	1,7	0,5	0,1	0,2	0,6	0,6	0,5
Ansiedad	4,6	2,5	2,8	3,5	5,9	6,6	2,4	1,3	1,8	2,2	3,1	2,3
Depresión	3,1	1,2	1,5	1,9	4,3	5,7	1,6	0,5	1,0	1,7	2,2	1,7
Otros p. mentales	0,5	0,3	0,3	0,4	0,7	0,8	0,6	0,4	0,9	0,4	0,5	1,0
Migraña	3,4	1,9	2,0	2,9	4,1	4,9	1,4	0,7	0,5	1,1	1,8	2,2
Osteoporosis	3,2	1,9	1,5	2,3	3,7	6,0	0,7	0,2	0,4	0,4	1,2	1,0
Anemia	1,5	0,5	1,6	1,2	1,6	2,6	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5	0,9
Estreñimiento	1,8	0,9	0,9	1,3	2,3	3,3	1,1	0,2	0,8	0,5	1,7	1,6
Ácido úrico/gota	0,3	0,0	0,3	0,1	0,4	0,7	1,7	1,2	1,8	1,7	2,1	1,2

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 84. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y clase social

	Mujeres						Hombres					
	Total	I	II	III	IV	V	Total	I	II	III	IV	V
Mala circulación	3,3	0,9	1,4	2,9	4,3	5,4	2,3	0,7	0,9	1,5	3,8	2,0
Insomnio	6,0	2,9	2,7	4,7	7,7	9,5	3,2	2,1	3,1	2,9	3,8	3,7
Problemas del riñón	0,8	0,3	0,9	0,6	0,6	1,9	1,2	0,7	1,2	1,3	1,2	1,6
Deficit de atención con hiperactividad	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,4	0,7	0,8	0,4	0,2	0,3
Problemas asociados a la menopáusico	0,3	0,0	0,5	0,5	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	9,8	8,4	10,7	8,2	9,8	13,2	9,1	7,2	11,7	9,5	9,2	8,7

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 85. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y nivel de estudios*

Mujeres

	Sin				
	Total	estudios, primaria	Secundaria inferior	Secundaria superior	Terciaria
Caries	2,3	1,3	3,5	2,5	1,8
Otros p. dentales	1,0	1,5	1,4	0,7	0,7
Hipertensión	11,7	21,0	18,3	6,8	6,2
Diabetes	3,9	8,6	5,6	2,1	1,3
Colesterol elevado	9,1	12,4	14,2	6,9	5,6
Fibromialgia	0,7	1,1	0,7	0,7	0,3
Artrosis	10,1	15,2	17,8	6,8	4,8
Dolor cervical	7,4	6,7	13,3	6,2	4,7
Dolor dorsal	10,5	9,6	19,8	7,5	7,5
Asma	3,8	3,2	3,9	4,2	3,8
Varices	6,5	7,3	14,5	3,8	3,0
Trombosis	0,8	1,7	1,1	0,6	0,3
Infarto agudo de miocardio	0,4	1,0	0,7	0,2	0,1
Otros p. crón. corazón	4,2	7,4	7,9	1,8	1,9
Alergia crónica	5,3	3,4	5,4	4,9	6,9
Bronquitis crónica	1,1	1,2	2,0	0,9	0,7
Úlcera estómago o duodeno	0,8	1,2	1,2	0,3	0,7
Hemorroides	2,9	2,1	6,4	2,4	1,4
Cáncer	1,9	1,8	2,0	1,9	1,7
Ceguera parcial o total	0,8	1,4	1,3	0,4	0,3
Cataratas	1,8	2,7	3,0	1,2	0,8
Audición (incluye sordera)	2,8	4,5	4,5	1,3	2,1
Piel	2,5	2,3	2,4	2,1	3,1
Tiroides	5,6	4,3	7,1	4,4	6,7
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	1,6	4,2	1,8	0,8	0,5
Demencia	1,0	2,9	1,4	0,3	0,3
Ansiedad	4,9	6,0	7,3	3,7	3,8
Depresión	3,4	5,0	5,3	2,3	2,1
Otros p. mentales	0,6	0,7	0,6	0,8	0,3
Migraña	3,6	2,6	5,5	3,4	3,0
Osteoporosis	3,4	5,3	6,2	1,8	2,0
Anemia	1,6	1,4	2,4	1,5	1,2

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 85. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y nivel de estudios*

Mujeres

	Total	Sin estudios, primaria	Secundaria inferior	Secundaria superior	Terciaria
Estreñimiento	2,0	2,2	4,2	1,4	0,9
Ácido úrico/gota	0,3	0,6	0,5	0,3	0,1
Mala circulación	3,5	4,5	6,7	2,2	2,1
Insomnio	6,5	8,9	11,4	4,6	3,3
Problemas del riñón	0,8	1,2	1,3	0,6	0,5
Deficit de atención con hiperactividad	0,1	0,5	0,0	0,1	0,0
Problemas asociados a la menopáusico	0,4	0,1	0,3	0,4	0,6
Otros	10,2	11,8	9,0	10,0	10,2

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 85. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y nivel de estudios*

Hombres	Sin				
	Total	estudios, primaria	Secundaria inferior	Secundaria superior	Terciaria
Caries	3,0	2,7	3,6	3,1	2,3
Otros p. dentales	1,2	1,7	1,1	1,2	1,0
Hipertensión	12,7	13,5	19,4	10,7	9,4
Diabetes	5,2	7,7	8,5	4,2	2,2
Colesterol elevado	11,1	11,1	17,0	9,6	8,2
Fibromialgia	0,3	0,1	0,6	0,3	0,0
Artrosis	5,5	4,9	10,8	4,2	3,5
Dolor cervical	5,0	4,4	8,5	4,7	2,6
Dolor dorsal	7,9	4,7	11,9	8,2	5,7
Asma	3,1	2,9	3,1	3,1	3,4
Varices	2,4	1,4	5,7	1,9	0,8
Trombosis	0,9	1,1	1,5	0,7	0,4
Infarto agudo de miocardio	1,6	1,6	2,2	1,7	1,0
Otros p. crón. corazón	5,6	6,3	9,2	4,3	3,8
Alergia crónica	4,7	4,2	4,3	4,8	5,3
Bronquitis crónica	1,2	1,3	2,2	0,7	0,9
Úlcera estómago o duodeno	0,8	1,2	0,9	0,9	0,3
Hemorroides	2,0	1,5	3,7	1,5	1,4
Cáncer	1,5	2,4	1,8	1,2	1,0
Ceguera parcial o total	0,6	0,8	0,8	0,5	0,2
Cataratas	1,4	1,9	2,0	1,2	1,1
Audición (incluye sordera)	2,4	2,6	4,2	2,1	1,2
Piel	2,1	1,3	2,2	2,1	2,8
Tiroides	1,1	1,4	1,5	0,9	0,7
Próstata	3,7	3,6	6,1	2,9	3,3
Incontinencia urinaria	0,9	1,2	1,5	0,8	0,5
Demencia	0,5	0,9	0,6	0,4	0,2
Ansiedad	2,6	2,8	3,3	2,5	2,1
Depresión	1,8	2,5	1,9	2,0	0,8
Otros p. mentales	0,6	0,9	0,5	0,4	0,8
Migraña	1,5	1,4	3,0	1,0	1,2
Osteoporosis	0,8	0,7	1,7	0,9	0,1
Anemia	0,5	0,2	0,9	0,5	0,4

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 85. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y nivel de estudios*

Hombres

	Total	Sin estudios, primaria	Secundaria inferior	Secundaria superior	Terciaria
Estreñimiento	1,2	1,0	3,1	0,8	0,4
Ácido úrico/gota	1,9	1,8	2,7	1,9	1,2
Mala circulación	2,5	2,7	5,6	1,8	0,7
Insomnio	3,5	2,5	6,4	3,0	2,5
Problemas del riñón	1,3	1,3	2,4	0,9	0,8
Deficit de atención con hiperactividad	0,4	1,4	0,5	0,2	0,0
Problemas asociados a la menopáusico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	9,4	10,4	9,4	8,9	9,6

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 86. Prevalencia (%) de población con algún problema crónico por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	43,7	40,0	41,9
Araba	34,5	28,7	31,7
Gipuzkoa	34,5	33,1	33,8
Bizkaia	51,9	47,6	49,8

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 87. Prevalencia (%) de población con algún problema crónico por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	43,7	40,0	41,9
0-14	11,6	17,0	14,4
15-24	17,1	16,6	16,9
25-34	26,1	23,8	24,9
35-44	33,1	26,8	29,9
45-54	43,8	41,1	42,4
55-64	54,4	54,4	54,4
65-74	68,6	68,8	68,7
>=75	79,2	77,8	78,6

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 88. Prevalencia (%) de población con algún problema crónico por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	43,7	40,0	41,9
I	31,4	31,7	31,6
II	37,6	38,8	38,2
III	41,1	39,9	40,6
IV	47,0	44,4	45,6
V	57,1	37,8	49,6

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 89. Prevalencia (%) de población con algún problema crónico por sexo y nivel de estudios*

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	46,1	42,2	44,2
Sin estudios, primaria	53,4	42,4	48,7
Secundaria inferior	53,7	49,9	51,9
Secundaria superior	41,1	40,6	40,8
Terciaria	41,3	37,9	39,9

***Población de 10 y más años de edad**

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 90. Prevalencia (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	6,4	6,8	6,6
Araba	7,0	8,7	7,8
Gipuzkoa	5,3	6,2	5,8
Bizkaia	7,0	6,6	6,8

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 91. Prevalencia (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	6,4	6,8	6,6
0-14	5,6	7,8	6,7
15-24	3,3	8,3	5,8
25-34	3,0	7,0	5,0
35-44	5,4	6,1	5,8
45-54	5,2	7,9	6,5
55-64	5,2	5,0	5,1
65-74	6,7	5,3	6,0
>=75	15,3	7,2	12,1

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 92. Prevalencia (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	6,4	6,8	6,6
I	5,3	5,4	5,4
II	6,5	6,7	6,6
III	6,1	6,3	6,2
IV	6,6	7,5	7,1
V	7,6	7,6	7,6

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 93. Prevalencia (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y nivel de estudios*

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	6,7	6,8	6,7
Sin estudios, primaria	9,7	8,6	9,2
Secundaria inferior	8,8	7,9	8,3
Secundaria superior	4,9	6,9	6,0
Terciaria	5,1	4,5	4,8

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 94. Distribución de la población (%) según el lugar dónde ocurrió la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y territorio histórico

		En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el lugar de trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
Mujeres	Total	41,5	3,9	3,9	6,1	3,0	10,2	31,5	100,0
	Araba	41,9	2,2	2,0	9,1	4,8	9,2	30,7	100,0
	Gipuzkoa	37,4	7,0	4,3	6,0	1,4	16,7	27,3	100,0
	Bizkaia	43,4	2,9	4,2	5,3	3,2	7,4	33,6	100,0
Hombres	Total	19,2	2,6	4,3	19,8	4,9	21,6	27,6	100,0
	Araba	21,0	.	2,8	26,2	8,9	20,8	20,2	100,0
	Gipuzkoa	15,5	4,8	5,0	24,2	4,4	23,9	22,4	100,0
	Bizkaia	20,8	2,3	4,5	14,8	3,6	20,5	33,6	100,0
Ambos sexos	Total	30,3	3,3	4,1	13,0	3,9	15,9	29,5	100,0
	Araba	30,4	1,0	2,5	18,6	7,1	15,6	24,9	100,0
	Gipuzkoa	25,8	5,8	4,6	15,5	3,0	20,5	24,7	100,0
	Bizkaia	32,7	2,6	4,3	9,8	3,4	13,6	33,6	100,0

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 95. Distribución de la población (%) según el lugar dónde ocurrió la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y edad

		En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el lugar de trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
Mujeres	Total	41,5	3,9	3,9	6,1	3,0	10,2	31,5	100,0
	0-14	19,5	.	4,8	.	22,6	29,5	23,5	100,0
	15-24	5,3	.	.	.	10,3	52,2	32,2	100,0
	25-34	32,2	10,2	3,2	23,9	.	9,8	20,7	100,0
	35-44	32,6	.	19,0	18,2	.	4,8	25,4	100,0
	45-54	25,8	6,1	2,3	16,4	.	12,9	36,6	100,0
	55-64	35,5	3,0	3,0	6,7	.	4,9	47,0	100,0
	65-74	47,8	1,1	4,7	1,8	.	6,5	38,1	100,0
	>=75	64,3	6,7	.	.	.	1,8	27,1	100,0
Hombres	Total	19,2	2,6	4,3	19,8	4,9	21,6	27,6	100,0
	0-14	10,4	.	1,2	.	26,1	34,3	28,0	100,0
	15-24	4,3	3,4	6,0	5,7	5,6	55,8	19,2	100,0
	25-34	14,7	.	7,1	18,2	.	27,6	32,4	100,0
	35-44	4,9	.	10,1	41,3	.	5,1	38,6	100,0
	45-54	17,5	1,0	1,7	47,0	.	17,2	15,6	100,0
	55-64	36,7	5,8	5,3	20,3	.	8,0	23,9	100,0
	65-74	31,1	8,9	.	5,4	.	17,8	36,7	100,0
	>=75	48,8	5,9	4,4	3,0	.	.	37,9	100,0
Ambos sexos	Total	30,3	3,3	4,1	13,0	3,9	15,9	29,5	100,0
	0-14	14,1	.	2,7	.	24,7	32,3	26,2	100,0
	15-24	4,6	2,5	4,4	4,1	6,9	54,8	22,7	100,0
	25-34	19,9	3,0	6,0	19,9	.	22,3	28,9	100,0
	35-44	17,4	.	14,1	30,9	.	5,0	32,7	100,0
	45-54	20,8	3,1	1,9	34,8	.	15,5	23,9	100,0
	55-64	36,1	4,3	4,1	13,1	.	6,4	36,0	100,0
	65-74	40,9	4,4	2,8	3,3	.	11,2	37,5	100,0
	>=75	60,7	6,5	1,0	0,7	.	1,4	29,7	100,0

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 96. Distribución de la población (%) según el lugar dónde ocurrió la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y clase social

		En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el lugar de trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
Mujeres	Total	41,2	3,9	3,9	6,1	3,0	10,3	31,5	100,0
	I	31,3	1,0	1,9	4,9	0,7	25,6	34,7	100,0
	II	24,5	4,9	3,0	.	10,5	20,6	36,5	100,0
	III	36,7	3,5	4,0	6,1	6,8	5,0	38,0	100,0
	IV	43,3	4,4	5,1	10,1	0,8	8,9	27,4	100,0
	V	60,0	5,2	3,4	3,0	.	1,7	26,7	100,0
Hombres	Total	19,2	2,6	4,3	19,9	4,9	21,6	27,5	100,0
	I	21,4	6,2	.	2,1	8,9	43,6	17,8	100,0
	II	16,6	.	2,0	4,5	4,7	36,2	36,0	100,0
	III	22,9	3,1	1,0	18,1	8,2	19,5	27,1	100,0
	IV	17,8	1,4	8,0	27,1	3,3	14,3	28,0	100,0
	V	19,0	4,8	1,5	28,0	1,2	14,9	30,6	100,0
Ambos sexos	Total	30,1	3,3	4,1	13,0	3,9	16,0	29,5	100,0
	I	26,3	3,6	0,9	3,5	4,8	34,7	26,2	100,0
	II	20,6	2,5	2,5	2,2	7,7	28,2	36,2	100,0
	III	30,3	3,3	2,6	11,6	7,4	11,7	33,0	100,0
	IV	28,8	2,7	6,8	19,8	2,2	12,0	27,7	100,0
	V	44,0	5,1	2,7	12,8	0,5	6,9	28,2	100,0

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 97. Distribución de la población (%) según el lugar dónde ocurrió la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y nivel de estudios*

		En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el lugar de trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
Mujeres	Total	41,6	4,1	4,0	6,4	2,0	9,8	32,1	100,0
	Sin estudios, primaria	53,2	5,6	.	3,1	4,5	10,5	23,2	100,0
	Secundaria inferior	44,4	5,8	5,3	5,1	2,2	8,3	28,9	100,0
	Secundaria superior	27,9	3,1	6,6	14,2	0,7	10,9	36,6	100,0
	Terciaria	39,3	1,0	4,6	2,9	.	9,5	42,7	100,0
Hombres	Total	19,4	2,9	4,7	21,7	3,7	19,6	28,1	100,0
	Sin estudios, primaria	23,2	4,3	2,3	8,4	9,8	14,4	37,7	100,0
	Secundaria inferior	16,3	2,7	3,9	30,7	7,4	23,4	15,6	100,0
	Secundaria superior	19,7	2,3	7,3	28,6	.	16,3	25,9	100,0
	Terciaria	18,3	3,0	1,4	3,3	.	30,4	43,5	100,0
Ambos sexos	Total	30,7	3,5	4,4	13,9	2,8	14,6	30,2	100,0
	Sin estudios, primaria	40,9	5,1	0,9	5,3	6,7	12,1	29,1	100,0
	Secundaria inferior	31,6	4,4	4,7	16,8	4,6	15,2	22,8	100,0
	Secundaria superior	22,8	2,6	7,0	23,2	0,3	14,3	29,9	100,0
	Terciaria	31,1	1,8	3,3	3,0	.	17,7	43,0	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 98. Distribución de la población (%) según el mecanismo de la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y territorio histórico

		Caída a distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Ingestión o inhalación de tóxicos o medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Mujeres	Total	13,0	55,0	12,9	4,9	3,9	0,5	0,3	9,5	100,0
	Araba	20,7	43,1	4,2	11,9	9,7	.	.	10,4	100,0
	Gipuzkoa	9,7	65,2	15,2	3,3	.	1,2	.	5,4	100,0
	Bizkaia	12,5	53,6	14,2	3,7	4,1	0,4	0,5	11,2	100,0
Hombres	Total	11,5	37,6	25,7	10,9	1,9	0,8	0,2	11,4	100,0
	Araba	12,4	33,6	28,6	14,5	.	.	.	10,9	100,0
	Gipuzkoa	13,8	37,9	24,1	9,7	2,4	.	.	12,0	100,0
	Bizkaia	9,7	39,0	25,5	10,2	2,4	1,6	0,4	11,2	100,0
Ambos sexos	Total	12,3	46,4	19,3	7,9	2,9	0,7	0,3	10,4	100,0
	Araba	16,1	37,8	17,7	13,4	4,4	.	.	10,7	100,0
	Gipuzkoa	11,9	50,9	19,9	6,7	1,3	0,6	.	8,9	100,0
	Bizkaia	11,2	46,8	19,4	6,7	3,3	0,9	0,5	11,2	100,0

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 99. Distribución de la población (%) según el mecanismo de la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y edad

		Caída a nivel distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Ingestión o inhalación de tóxicos o medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Mujeres	Total	13,0	55,0	12,9	4,9	3,9	0,5	0,3	9,5	100,0
	0-14	11,6	53,9	22,9	.	1,5	.	.	10,1	100,0
	15-24	8,0	34,4	57,7	100,0
	25-34	10,1	23,1	32,9	24,2	.	.	.	9,7	100,0
	35-44	7,0	24,3	19,6	15,2	8,8	1,9	.	23,1	100,0
	45-54	19,7	47,2	8,3	5,9	9,0	.	1,4	8,5	100,0
	55-64	14,3	51,9	7,6	4,8	5,7	1,7	.	14,1	100,0
	65-74	11,4	68,3	6,7	4,4	1,4	.	1,0	6,7	100,0
	>=75	14,2	72,0	4,3	1,0	2,4	0,3	.	5,8	100,0
Hombres	Total	11,5	37,6	25,7	10,9	1,9	0,8	0,2	11,4	100,0
	0-14	19,9	36,6	34,5	6,0	.	.	.	2,9	100,0
	15-24	5,1	32,5	51,1	1,0	4,6	.	.	5,7	100,0
	25-34	6,0	31,6	31,1	10,4	.	.	.	20,8	100,0
	35-44	6,4	31,4	34,2	13,0	2,7	.	.	12,3	100,0
	45-54	13,4	30,0	12,9	24,0	1,5	2,1	.	16,2	100,0
	55-64	12,0	33,5	17,9	15,0	4,0	.	1,9	15,6	100,0
	65-74	13,5	48,1	8,0	8,2	3,0	4,3	.	15,0	100,0
	>=75	11,6	69,1	13,6	1,2	.	.	.	4,4	100,0
Ambos sexos	Total	12,3	46,4	19,3	7,9	2,9	0,7	0,3	10,4	100,0
	0-14	16,5	43,6	29,8	3,6	0,6	.	.	5,8	100,0
	15-24	5,9	33,0	52,9	0,7	3,3	.	.	4,1	100,0
	25-34	7,3	29,0	31,6	14,7	.	.	.	17,4	100,0
	35-44	6,7	28,1	27,5	14,0	5,6	0,9	.	17,3	100,0
	45-54	15,9	36,7	11,1	16,9	4,5	1,3	0,6	13,2	100,0
	55-64	13,2	43,1	12,5	9,6	4,9	0,9	0,9	14,8	100,0
	65-74	12,3	60,0	7,2	6,0	2,1	1,8	0,6	10,1	100,0
	>=75	13,6	71,3	6,4	1,0	1,8	0,3	.	5,5	100,0

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 100. Distribución de la población (%) según el mecanismo de la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y clase social

		Caída a nivel distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Ingestión o inhalación de tóxicos o medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Mujeres	Total	13,2	54,6	13,0	4,9	3,9	0,5	0,3	9,6	100,0
	I	10,3	45,5	21,3	7,1	7,0	.	.	8,8	100,0
	II	22,3	43,1	13,5	5,0	9,1	.	.	7,0	100,0
	III	16,8	57,0	14,9	2,5	1,9	.	0,6	6,3	100,0
	IV	11,4	55,0	11,8	7,1	2,8	0,9	.	10,9	100,0
	V	8,9	64,8	6,3	1,8	3,0	1,1	1,0	13,1	100,0
Hombres	Total	11,5	37,5	25,7	10,9	1,9	0,8	0,2	11,4	100,0
	I	12,3	28,7	37,4	6,6	1,6	.	.	13,4	100,0
	II	9,8	47,7	24,4	9,1	.	.	2,1	7,0	100,0
	III	8,7	36,6	24,8	12,9	3,8	3,2	.	9,9	100,0
	IV	11,4	37,8	25,1	11,6	1,8	0,4	.	12,0	100,0
	V	17,1	39,1	17,7	11,5	1,6	.	.	13,0	100,0
Ambos sexos	Total	12,3	46,1	19,3	7,9	2,9	0,7	0,3	10,5	100,0
	I	11,3	37,3	29,2	6,9	4,3	.	.	11,0	100,0
	II	16,2	45,3	18,8	7,0	4,7	.	1,0	7,0	100,0
	III	13,2	47,8	19,3	7,2	2,8	1,5	0,3	7,9	100,0
	IV	11,4	45,2	19,3	9,7	2,2	0,6	.	11,5	100,0
	V	12,1	54,7	10,7	5,6	2,5	0,7	0,6	13,1	100,0

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 101. Distribución de la población (%) según el mecanismo de la última lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo y nivel de estudios*

		Caída a nivel distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Ingestión o inhalación de tóxicos o medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Otros	Total
Mujeres	Total	12,9	55,1	12,6	5,1	3,9	0,5	0,3	9,7	100,0
	Sin estudios, primaria	14,8	60,1	8,7	0,5	2,2	1,2	0,5	12,0	100,0
	Secundaria inferior	5,9	70,3	7,8	4,2	2,4	.	.	9,5	100,0
	Secundaria superior	13,4	39,9	24,5	9,0	3,3	0,9	0,7	8,1	100,0
	Terciaria	19,3	45,7	9,7	7,8	8,9	.	.	8,7	100,0
Hombres	Total	10,3	37,6	26,0	11,2	2,1	0,8	0,2	11,8	100,0
	Sin estudios, primaria	12,7	43,4	31,1	4,6	.	1,2	.	7,0	100,0
	Secundaria inferior	10,3	39,6	25,4	14,0	0,6	.	.	10,1	100,0
	Secundaria superior	10,7	30,6	27,5	13,9	4,0	1,4	0,5	11,3	100,0
	Terciaria	5,8	47,1	14,9	7,6	1,6	.	.	23,0	100,0
Ambos sexos	Total	11,6	46,5	19,1	8,1	3,0	0,7	0,3	10,7	100,0
	Sin estudios, primaria	13,9	53,3	17,8	2,2	1,3	1,2	0,3	9,9	100,0
	Secundaria inferior	7,9	56,5	15,7	8,6	1,6	.	.	9,8	100,0
	Secundaria superior	11,7	34,1	26,4	12,0	3,8	1,2	0,6	10,1	100,0
	Terciaria	14,0	46,2	11,8	7,7	6,0	.	.	14,3	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 102. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias* por sexo y territorio histórico

		Disminuir o suspender sus actividades	Consultar al/la médico/a	Asistencia en urgencias	Ingreso hospitalario	Ingreso en UCI	Secuelas físicas o mentales
Mujeres	CAPV	65,5	78,4	64,5	11,0	2,7	24,6
	Araba	46,1	63,9	65,3	6,6	6,3	14,7
	Gipuzkoa	78,9	88,5	64,2	11,4	0,0	34,6
	Bizkaia	64,7	77,8	64,4	12,1	2,9	22,8
Hombres	CAPV	66,4	81,5	68,2	12,7	2,9	21,3
	Araba	52,7	71,3	65,4	9,6	2,2	22,6
	Gipuzkoa	78,0	88,2	67,3	7,0	2,3	21,5
	Bizkaia	64,8	81,4	69,7	17,4	3,6	20,6
Ambos sexos	CAPV	66,0	79,9	66,3	11,9	2,8	22,9
	Araba	49,7	68,0	65,3	8,2	4,1	19,0
	Gipuzkoa	78,5	88,4	65,8	9,0	1,2	27,7
	Bizkaia	64,8	79,4	66,9	14,6	3,2	21,7

*Las categorías no son excluyentes

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 103. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias* por sexo y edad

		Disminuir o suspender sus actividades	Consultar al/la médico/a	Asistencia en urgencias	Ingreso hospitalario	Ingreso en UCI	Secuelas físicas o mentales
Mujeres	Total	65,5	78,4	64,5	11,0	2,7	24,6
	0-14	79,6	84,1	73,9	0,0	0,0	10,2
	15-24	95,2	100,0	70,0	0,0	0,0	7,4
	25-34	57,4	62,4	70,7	3,2	3,2	28,5
	35-44	69,3	91,6	80,2	5,2	2,3	13,8
	45-54	47,8	69,7	56,3	13,3	2,8	30,4
	55-64	75,0	85,3	61,3	9,7	2,7	31,0
	65-74	55,0	67,5	47,9	6,8	1,1	22,3
	>=75	63,8	76,0	64,9	20,4	4,5	31,4
Hombres	Total	66,4	81,5	68,2	12,7	2,9	21,3
	0-14	71,4	87,2	83,1	1,8	0,0	10,9
	15-24	74,9	80,6	69,4	10,2	8,5	18,4
	25-34	63,3	78,9	67,6	27,5	0,0	22,1
	35-44	62,6	85,2	61,4	15,3	6,5	32,1
	45-54	69,2	86,1	64,6	11,2	3,6	21,7
	55-64	58,8	66,5	54,7	15,4	1,0	21,5
	65-74	67,1	77,9	64,6	6,7	1,2	22,8
	>=75	58,4	81,8	76,7	20,2	1,5	24,4
Ambos sexos	Total	66,0	79,9	66,3	11,9	2,8	22,9
	0-14	74,7	86,0	79,3	1,1	0,0	10,6
	15-24	80,5	85,9	69,6	7,4	6,2	15,4
	25-34	61,5	74,0	68,5	20,3	0,9	24,0
	35-44	65,8	88,2	70,2	10,6	4,5	23,5
	45-54	60,7	79,6	61,4	12,0	3,3	25,1
	55-64	67,3	76,4	58,1	12,4	1,9	26,5
	65-74	60,0	71,8	54,8	6,8	1,2	22,5
	>=75	62,5	77,4	67,7	20,4	3,8	29,7

*Las categorías no son excluyentes

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 104. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias* por sexo y clase social

		Disminuir o suspender sus actividades	Consultar al/la médico/a	Asistencia en urgencias	Ingreso hospitalario	Ingreso en UCI	Secuelas físicas o mentales
Mujeres	Total	65,4	78,7	64,4	10,9	2,7	24,6
	I	65,7	78,8	57,8	0,0	2,7	14,1
	II	73,2	83,3	72,8	6,8	0,0	21,8
	III	68,4	88,0	72,2	9,2	2,1	26,0
	IV	59,0	72,4	61,2	13,3	3,9	24,3
	V	69,7	77,6	61,5	18,7	2,6	33,4
Hombres	Total	66,5	81,5	68,1	12,7	2,9	21,3
	I	65,9	81,4	51,1	13,6	0,0	15,2
	II	67,4	82,2	79,7	12,4	0,0	22,3
	III	65,1	77,4	63,9	12,2	3,8	18,0
	IV	66,9	81,6	74,2	12,6	4,8	24,4
	V	66,9	86,7	60,9	13,7	0,0	20,2
Ambos sexos	Total	65,9	80,1	66,3	11,8	2,8	22,9
	I	65,8	80,1	54,4	6,9	1,3	14,7
	II	70,4	82,8	76,1	9,5	0,0	22,1
	III	66,9	83,2	68,4	10,6	2,8	22,4
	IV	63,4	77,6	68,5	12,9	4,4	24,4
	V	68,6	81,1	61,3	16,7	1,6	28,2

*Las categorías no son excluyentes

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 105. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios***

		Disminuir o suspender sus actividades	Consultar al/la médico/a	Asistencia en urgencias	Ingreso hospitalario	Ingreso en UCI	Secuelas físicas o mentales
Mujeres	Total	65,1	78,3	63,9	11,5	2,8	25,4
	Sin estudios, primaria	65,0	70,8	60,2	15,8	2,6	29,4
	Secundaria inferior	65,9	78,3	63,2	12,3	4,2	25,6
	Secundaria superior	69,3	84,2	66,2	10,2	2,2	26,7
	Terciaria	59,0	80,9	67,2	6,2	1,8	18,4
Hombres	Total	67,1	80,7	68,5	12,8	3,2	22,7
	Sin estudios, primaria	69,5	86,0	74,8	10,7	1,1	19,5
	Secundaria inferior	69,2	82,3	63,8	6,9	0,0	20,8
	Secundaria superior	66,2	75,6	70,7	14,2	4,5	21,6
	Terciaria	63,3	86,0	61,7	21,5	7,7	33,4
Ambos sexos	Total	66,1	79,5	66,2	12,1	3,0	24,1
	Sin estudios, primaria	66,8	77,0	66,1	13,8	2,0	25,4
	Secundaria inferior	67,4	80,1	63,4	9,9	2,3	23,4
	Secundaria superior	67,4	78,8	69,0	12,6	3,6	23,6
	Terciaria	60,8	82,9	65,0	12,3	4,2	24,4

*Población de 10 y más años de edad

**Las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2023