


TABLAS GENERALES



DETERMINANTES DE LA SALUD Conductas Relacionadas con la Salud



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

TABLAS GENERALES

ÍNDICE

Determinantes de la Salud

Conductas relacionadas con la salud

1. CONSUMO DE TABACO

Tabla 1. Distribución de la población (%) según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo y territorio histórico.....	1
Tabla 2. Distribución de la población (%) según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo y edad	2
Tabla 3. Distribución de la población (%) según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo y clase social	3
Tabla 4. Distribución de la población (%) según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo y nivel de estudios	4
Tabla 5. Distribución de la población (%) según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo y territorio histórico.....	5
Tabla 6. Distribución de la población (%) según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo y edad	6
Tabla 7. Distribución de la población (%) según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo y clase social	7
Tabla 8. Distribución de la población (%) según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo y nivel de estudios	8
Tabla 9. Distribución de la población (%) según su consumo de cigarrillos diarios por sexo y territorio histórico	9
Tabla 10. Distribución de la población (%) según su consumo de cigarrillos diarios por sexo y edad.....	10
Tabla 11. Distribución de la población (%) según su consumo de cigarrillos diarios por sexo y clase social.....	11
Tabla 12. Distribución de la población (%) según su consumo de cigarrillos diarios por sexo y nivel de estudios	12
Tabla 13. Prevalencia (%) de población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo y territorio histórico	13

Tabla 14. Prevalencia (%) de población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo y edad	14
Tabla 15. Prevalencia (%) de población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo y clase social.....	15
Tabla 16. Prevalencia (%) de población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo y nivel de estudios.....	16
Tabla 17. Prevalencia (%) de población fumadora habitual a la que le hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo y territorio histórico	17
Tabla 18. Prevalencia (%) de población fumadora habitual a la que le hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo y edad.....	18
Tabla 19. Prevalencia (%) de población fumadora habitual a la que le hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo y clase social.....	19
Tabla 20. Prevalencia (%) de población fumadora habitual a la que le hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo y nivel de estudios	20
Tabla 21. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo y territorio histórico.....	21
Tabla 22. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo y edad	22
Tabla 23. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo y clase social	23
Tabla 24. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo y nivel de estudios	24
Tabla 25. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo y territorio histórico.....	25
Tabla 26. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo y edad	26
Tabla 27. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo y clase social.....	27
Tabla 28. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo y nivel de estudios	28
Tabla 29. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo y territorio histórico.....	29
Tabla 30. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo y edad	30
Tabla 31. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo y clase social	31
Tabla 32. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo y nivel de estudios	32

Tabla 33. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo y territorio histórico	33
Tabla 34. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo y edad	34
Tabla 35. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo y clase social	35
Tabla 36. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo y nivel de estudios.....	36

2. CONSUMO DE ALCOHOL

Tabla 37. Distribución de la población (%) según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo y territorio histórico	37
Tabla 38. Distribución de la población (%) según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo y edad.....	38
Tabla 39. Distribución de la población (%) según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo y clase social.....	39
Tabla 40. Distribución de la población (%) según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo y nivel de estudios	40
Tabla 41. Prevalencia (%) de población con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo y territorio histórico	41
Tabla 42. Prevalencia (%) de población con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo y edad.....	42
Tabla 43. Prevalencia (%) de población con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo y clase social.....	43
Tabla 44. Prevalencia (%) de población con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo y nivel de estudios	44
Tabla 45. Distribución de la población (%) según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo y territorio histórico	45
Tabla 46. Distribución de la población (%) según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo y edad	46
Tabla 47. Distribución de la población (%) según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo y clase social	47
Tabla 48. Distribución de la población (%) según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo y nivel de estudios.....	48
Tabla 49. Distribución de la población (%) según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo y territorio histórico.....	49

Tabla 50. Distribución de la población (%) según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo y edad	50
Tabla 51. Distribución de la población (%) según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo y clase social	51
Tabla 52. Distribución de la población (%) según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo y nivel de estudios	52
Tabla 53. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo y territorio histórico.....	53
Tabla 54. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo y edad.....	54
Tabla 55. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo y clase social ..	55
Tabla 56. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo y nivel de estudios	56
Tabla 57. Distribución de la población (%) según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo y territorio histórico	57
Tabla 58. Distribución de la población (%) según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo y edad	58
Tabla 59. Distribución de la población (%) según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo y clase social	59
Tabla 60. Distribución de la población (%) según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo y nivel de estudios.....	60
Tabla 61. Distribución de la población (%) según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo y territorio histórico	61
Tabla 62. Distribución de la población (%) según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo y edad	62
Tabla 63. Distribución de la población (%) según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo y clase social	63
Tabla 64. Distribución de la población (%) según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo y nivel de estudios.....	64
Tabla 65. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo y territorio histórico	65
Tabla 66. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo y edad.....	66
Tabla 67. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo y clase social.....	67
Tabla 68. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo y nivel de estudios	68

3. PESO CORPORAL

Tabla 69. Distribución del índice de masa corporal por sexo y territorio histórico	69
Tabla 70. Distribución del índice de masa corporal por sexo y edad	70
Tabla 71. Distribución del índice de masa corporal por sexo y clase social	71
Tabla 72. Distribución del índice de masa corporal por sexo y nivel de estudios	72
Tabla 73. Distribución de la población (%) según su índice de masa corporal por sexo y territorio histórico	73
Tabla 74. Distribución de la población (%) según su índice de masa corporal por sexo y edad	74
Tabla 75. Distribución de la población (%) según su índice de masa corporal por sexo y clase social.....	75
Tabla 76. Distribución de la población (%) según su índice de masa corporal por sexo y nivel de estudios.....	76
Tabla 77. Prevalencia (%) de obesidad (IMC>30) por sexo y territorio histórico	77
Tabla 78. Prevalencia (%) de obesidad (IMC>30) por sexo y edad	78
Tabla 79. Prevalencia (%) de obesidad (IMC>30) por sexo y clase social	79
Tabla 80. Prevalencia (%) de obesidad (IMC>30) por sexo y nivel de estudios	80

4. ACTIVIDAD FISICA

Tabla 81. Distribución de la población (%) según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo y territorio histórico	81
Tabla 82. Distribución de la población (%) según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo y edad.....	82
Tabla 83. Distribución de la población (%) según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo y clase social.....	83
Tabla 84. Distribución de la población (%) según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo y nivel de estudios.....	84
Tabla 85. Prevalencia (%) de población que realiza actividad física saludable por sexo y territorio histórico	85
Tabla 86. Prevalencia (%) de población que realiza actividad física saludable por sexo y edad	86

Tabla 87. Prevalencia (%) de población que realiza actividad física saludable por sexo y clase social.....	87
Tabla 88. Prevalencia (%) de población que realiza actividad física saludable por sexo y nivel de estudios.....	88
Tabla 89. Prevalencia (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo y territorio histórico	89
Tabla 90. Prevalencia (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo y edad	90
Tabla 91. Prevalencia (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo y clase social	91
Tabla 92. Prevalencia (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo y nivel de estudios.....	92
Tabla 93. Distribución de la población (%) según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo y territorio histórico.....	93
Tabla 94. Distribución de la población (%) según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo y edad	94
Tabla 95. Distribución de la población (%) según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo y clase social	95
Tabla 96. Distribución de la población (%) según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo y nivel de estudios	96
Tabla 97. Distribución de la población (%) según la actividad principal en el centro de trabajo o de estudios u hogar por sexo y territorio histórico	98
Tabla 98. Distribución de la población (%) según la actividad principal en el centro de trabajo o de estudios u hogar por sexo y edad.....	99
Tabla 99. Distribución de la población (%) según la actividad principal en el centro de trabajo o de estudios u hogar por sexo y clase social.....	100
Tabla 100. Distribución de la población (%) según la actividad principal en el centro de trabajo o de estudios u hogar por sexo y nivel de estudios	101

5. SUEÑO

Tabla 101. Distribución de las horas de sueño en días laborables por sexo y territorio histórico.....	102
Tabla 102. Distribución de las horas de sueño en días laborables por sexo y edad	103
Tabla 103. Distribución de las horas de sueño en días laborables por sexo y clase social ...	104
Tabla 104. Distribución de las horas de sueño en días laborables por sexo y nivel de estudios	105

Tabla 105. Distribución de las horas de sueño en días festivos por sexo y territorio histórico ..	
.....	106
Tabla 106. Distribución de las horas de sueño en días festivos por sexo y edad.....	107
Tabla 107. Distribución de las horas de sueño en días festivos por sexo y clase socia	108
Tabla 108. Distribución de las horas de sueño en días festivos por sexo y nivel de estudios	109
Tabla 109. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días laborables por sexo y territorio histórico.....	110
Tabla 110. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días laborables por sexo y edad	111
Tabla 111. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días laborables por sexo y clase social	112
Tabla 112. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días laborables por sexo y nivel de estudios	113
Tabla 113. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días festivos por sexo y territorio histórico	114
Tabla 114. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días festivos por sexo y edad	115
Tabla 115. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días festivos por sexo y clase social	116
Tabla 116. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días festivos por sexo y nivel de estudios.....	117
Tabla 117. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño promedio diario por sexo y territorio histórico	118
Tabla 118. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño promedio diario por sexo y edad	119
Tabla 119. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño promedio diario por sexo y clase social	120
Tabla 120. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño promedio diario por sexo y nivel de estudios.....	121
Tabla 121. Distribución de la población (%) según la satisfacción con el sueño por sexo y territorio histórico	122
Tabla 122. Distribución de la población (%) según la satisfacción con el sueño por sexo y edad.....	123
Tabla 123. Distribución de la población (%) según la satisfacción con el sueño por sexo y clase social.....	124

Tabla 124. Distribución de la población (%) según la satisfacción con el sueño por sexo y nivel de estudios	125
Tabla 125. Distribución de la población (%) según roncar por sexo y territorio histórico	126
Tabla 126. Distribución de la población (%) según roncar por sexo y edad	127
Tabla 127. Distribución de la población (%) según roncar por sexo y clase social	128
Tabla 128. Distribución de la población (%) según roncar por sexo y nivel de estudios	129

6. HÁBITOS ALIMENTARIOS

Tabla 129. Prevalencia (%) de consumo diario de aceite de oliva por sexo y territorio histórico.....	130
Tabla 130. Prevalencia (%) de consumo diario de aceite de oliva por sexo y edad	131
Tabla 131. Prevalencia (%) de consumo diario de aceite de oliva por sexo y clase social ...	132
Tabla 132. Prevalencia (%) de consumo diario de aceite de oliva por sexo y nivel de estudios	133
Tabla 133. Prevalencia (%) de consumo diario de verdura por sexo y territorio histórico ...	134
Tabla 134. Prevalencia (%) de consumo diario de verdura por sexo y edad	135
Tabla 135. Prevalencia (%) de consumo diario de verdura por sexo y clase social	136
Tabla 136. Prevalencia (%) de consumo diario de verdura por sexo y nivel de estudios	137
Tabla 137. Prevalencia (%) de consumo diario de fruta por sexo y territorio histórico	138
Tabla 138. Prevalencia (%) de consumo diario de fruta por sexo y edad	139
Tabla 139. Prevalencia (%) de consumo diario de fruta por sexo y clase social	140
Tabla 140. Prevalencia (%) de consumo diario de fruta por sexo y nivel de estudios.....	141
Tabla 141. Distribución de la población (%) según el consumo diario de carne roja (hamburguesas, salchichas ...) por sexo y territorio histórico.....	142
Tabla 142. Distribución de la población (%) según el consumo diario de carne roja (hamburguesas, salchichas ...) por sexo y edad	143
Tabla 143. Distribución de la población (%) según el consumo diario de carne roja (hamburguesas, salchichas ...) por sexo y clase social	144
Tabla 144. Distribución de la población (%) según el consumo diario de carne roja (hamburguesas, salchichas ...) por sexo y nivel de estudios	145

Tabla 145. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de legumbres por sexo y territorio histórico	146
Tabla 146. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de legumbres por sexo y edad.....	147
Tabla 147. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de legumbres por sexo y clase social.....	148
Tabla 148. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de legumbres por sexo y nivel de estudios	149
Tabla 149. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de pescado o marisco por sexo y territorio histórico.....	150
Tabla 150. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de pescado o marisco por sexo y edad	151
Tabla 151. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de pescado o marisco por sexo y clase social	152
Tabla 152. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de pescado o marisco por sexo y nivel de estudios	153
Tabla 153. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de repostería no casera por sexo y territorio histórico.....	154
Tabla 154. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de repostería no casera por sexo y edad	155
Tabla 155. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de repostería no casera por sexo y clase social	156
Tabla 156. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de repostería no casera por sexo y nivel de estudios	157
Tabla 157. Prevalencia (%) de consumo diario de bebidas azucaradas por sexo y territorio histórico.....	158
Tabla 158. Prevalencia (%) de consumo diario de bebidas azucaradas por sexo y edad.....	159
Tabla 159. Prevalencia (%) de consumo diario de bebidas azucaradas por sexo y clase social	160
Tabla 160. Prevalencia (%) de consumo diario de bebidas azucaradas por sexo y nivel de estudios.....	161
Tabla 161. Prevalencia (%) del consumo preferente de carne blanca en vez de carne roja por sexo y territorio histórico.....	162
Tabla 162. Prevalencia (%) del consumo preferente de carne blanca en vez de carne roja por sexo y edad.....	163

Tabla 163. Prevalencia (%) del consumo preferente de carne blanca en vez de carne roja por sexo y clase social.....164

Tabla 164. Prevalencia (%) del consumo preferente de carne blanca en vez de carne roja por sexo y nivel de estudios165

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 1. Distribución de la población (%) según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo y territorio histórico

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Mujeres	Total	58,1	26,2	2,3	13,4	100,0
	Araba	56,6	25,9	1,7	15,8	100,0
	Gipuzkoa	59,2	26,9	3,1	10,8	100,0
	Bizkaia	57,7	25,9	2,0	14,4	100,0
Hombres	Total	42,7	35,9	3,9	17,5	100,0
	Araba	51,2	28,4	3,6	16,8	100,0
	Gipuzkoa	40,9	40,9	5,1	13,1	100,0
	Bizkaia	41,4	35,0	3,1	20,5	100,0
Ambos sexos	Total	50,7	30,9	3,1	15,4	100,0
	Araba	54,0	27,1	2,6	16,3	100,0
	Gipuzkoa	50,3	33,7	4,1	11,9	100,0
	Bizkaia	50,0	30,2	2,5	17,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 2. Distribución de la población (%) según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo y edad

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Mujeres	Total	58,1	26,2	2,3	13,4	100,0
	15-24	69,6	12,8	4,6	13,0	100,0
	25-34	62,2	24,1	3,3	10,4	100,0
	35-44	50,3	26,7	3,6	19,3	100,0
	45-54	46,6	32,6	2,6	18,3	100,0
	55-64	40,6	40,4	2,3	16,7	100,0
	65-74	60,0	27,9	0,5	11,7	100,0
	>=75	85,8	11,6	0,1	2,5	100,0
Hombres	Total	42,7	35,9	3,9	17,5	100,0
	15-24	76,2	9,1	4,1	10,6	100,0
	25-34	49,6	24,5	8,1	17,8	100,0
	35-44	43,9	23,8	6,3	26,0	100,0
	45-54	33,9	38,2	3,7	24,2	100,0
	55-64	35,7	44,8	1,6	17,8	100,0
	65-74	33,4	54,6	1,9	10,1	100,0
	>=75	35,2	55,3	1,8	7,7	100,0
Ambos sexos	Total	50,7	30,9	3,1	15,4	100,0
	15-24	73,0	10,9	4,3	11,8	100,0
	25-34	55,9	24,3	5,7	14,1	100,0
	35-44	47,1	25,3	5,0	22,7	100,0
	45-54	40,2	35,4	3,1	21,3	100,0
	55-64	38,3	42,5	2,0	17,2	100,0
	65-74	47,6	40,3	1,1	10,9	100,0
	>=75	66,0	28,7	0,7	4,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 3. Distribución de la población (%) según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo y clase social

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Mujeres	Total	58,1	26,2	2,3	13,4	100,0
	I	53,8	31,9	3,8	10,5	100,0
	II	52,0	31,9	3,1	13,0	100,0
	III	53,5	29,2	3,2	14,1	100,0
	IV	59,8	22,7	1,4	16,1	100,0
	V	68,7	20,8	1,1	9,5	100,0
Hombres	Total	42,7	35,9	3,9	17,5	100,0
	I	56,0	30,8	3,2	10,0	100,0
	II	44,7	35,4	5,1	14,9	100,0
	III	45,7	36,4	4,5	13,4	100,0
	IV	36,8	38,0	4,2	21,1	100,0
	V	38,8	35,0	1,4	24,9	100,0
Ambos sexos	Total	50,7	30,9	3,1	15,3	100,0
	I	54,9	31,3	3,5	10,2	100,0
	II	48,5	33,6	4,0	13,9	100,0
	III	50,0	32,4	3,8	13,8	100,0
	IV	47,4	30,9	2,9	18,8	100,0
	V	58,0	25,8	1,2	15,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 4. Distribución de la población (%) según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo y nivel de estudios

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Mujeres	Total	58,1	26,2	2,3	13,4	100,0
	Sin estudios, primaria	80,7	10,7	0,5	8,2	100,0
	Secundaria inferior	62,7	21,7	1,0	14,7	100,0
	Secundaria superior	53,9	28,1	2,4	15,6	100,0
	Terciaria	48,2	35,1	4,0	12,6	100,0
Hombres	Total	42,7	35,9	3,9	17,5	100,0
	Sin estudios, primaria	46,2	38,9	2,3	12,6	100,0
	Secundaria inferior	38,8	36,2	1,1	23,9	100,0
	Secundaria superior	38,9	37,3	5,2	18,6	100,0
	Terciaria	51,0	32,2	4,4	12,4	100,0
Ambos sexos	Total	50,7	30,9	3,1	15,4	100,0
	Sin estudios, primaria	67,4	21,6	1,2	9,9	100,0
	Secundaria inferior	51,0	28,8	1,0	19,2	100,0
	Secundaria superior	45,9	33,0	3,9	17,2	100,0
	Terciaria	49,5	33,8	4,2	12,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 5. Distribución de la población (%) según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo y territorio histórico

		8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Mujeres	Total	10,5	32,2	31,2	26,0	100,0
	Araba	8,3	26,8	36,4	28,5	100,0
	Gipuzkoa	8,7	22,5	35,7	33,0	100,0
	Bizkaia	12,0	38,2	27,7	22,1	100,0
Hombres	Total	14,8	36,4	25,5	23,3	100,0
	Araba	12,2	18,5	22,8	46,5	100,0
	Gipuzkoa	11,7	30,3	35,1	23,0	100,0
	Bizkaia	16,7	43,1	22,2	18,0	100,0
Ambos sexos	Total	12,9	34,5	28,1	24,5	100,0
	Araba	10,3	22,6	29,5	37,6	100,0
	Gipuzkoa	10,3	26,7	35,4	27,6	100,0
	Bizkaia	14,6	41,0	24,6	19,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 6. Distribución de la población (%) según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo y edad

		8-14	15-16	17-19	20 y	
		años	años	años	más	Total
Mujeres	Total	10,5	32,2	31,2	26,0	100,0
	15-24	19,7	54,1	23,0	3,3	100,0
	25-34	10,8	31,9	27,6	29,7	100,0
	35-44	11,2	22,1	33,3	33,4	100,0
	45-54	6,5	36,9	37,2	19,5	100,0
	55-64	15,0	39,6	24,6	20,8	100,0
	65-74	4,4	13,7	38,9	43,0	100,0
	>=75	.	16,2	21,2	62,6	100,0
Hombres	Total	14,8	36,4	25,5	23,3	100,0
	15-24	2,8	58,8	27,5	10,9	100,0
	25-34	9,3	45,7	15,9	29,1	100,0
	35-44	13,9	43,0	20,2	22,9	100,0
	45-54	12,1	32,9	30,1	24,9	100,0
	55-64	17,4	26,9	31,4	24,3	100,0
	65-74	34,3	21,4	23,4	20,9	100,0
	>=75	26,0	25,2	28,7	20,1	100,0
Ambos sexos	Total	12,9	34,5	28,1	24,5	100,0
	15-24	11,8	56,3	25,1	6,8	100,0
	25-34	9,8	40,7	20,2	29,3	100,0
	35-44	12,8	34,1	25,8	27,3	100,0
	45-54	9,7	34,6	33,1	22,6	100,0
	55-64	16,2	33,2	28,0	22,6	100,0
	65-74	17,3	17,1	32,2	33,5	100,0
	>=75	17,3	22,2	26,2	34,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 7. Distribución de la población (%) según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo y clase social

		8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Mujeres	Total	10,7	31,7	31,4	26,3	100,0
	I	2,9	36,3	22,3	38,6	100,0
	II	2,7	33,9	32,5	30,9	100,0
	III	11,8	28,6	38,7	21,0	100,0
	IV	13,0	31,4	29,4	26,2	100,0
	V	15,0	32,1	32,6	20,3	100,0
Hombres	Total	14,8	36,6	25,3	23,2	100,0
	I	11,9	17,6	43,3	27,2	100,0
	II	16,5	36,7	18,9	27,9	100,0
	III	11,5	34,6	20,0	33,8	100,0
	IV	13,7	42,2	23,7	20,4	100,0
	V	24,0	30,2	28,9	17,0	100,0
Ambos sexos	Total	13,0	34,4	28,1	24,6	100,0
	I	7,2	27,2	32,4	33,1	100,0
	II	9,8	35,3	25,5	29,4	100,0
	III	11,7	31,2	30,6	26,5	100,0
	IV	13,4	37,9	26,0	22,7	100,0
	V	20,3	30,9	30,4	18,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 8. Distribución de la población (%) según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo y nivel de estudios

		8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Mujeres	Total	10,6	32,2	31,2	26,0	100,0
	Sin estudios, primaria	32,5	13,7	27,9	25,9	100,0
	Secundaria inferior	11,3	35,7	31,2	21,8	100,0
	Secundaria superior	9,0	36,3	31,7	23,0	100,0
	Terciaria	4,9	29,3	31,7	34,0	100,0
Hombres	Total	14,8	36,4	25,5	23,3	100,0
	Sin estudios, primaria	31,2	13,5	28,3	27,0	100,0
	Secundaria inferior	20,6	46,2	19,3	14,0	100,0
	Secundaria superior	11,7	34,7	30,7	22,9	100,0
	Terciaria	6,9	35,3	20,4	37,3	100,0
Ambos sexos	Total	12,9	34,5	28,1	24,5	100,0
	Sin estudios, primaria	31,9	13,6	28,1	26,4	100,0
	Secundaria inferior	17,0	42,1	23,9	17,0	100,0
	Secundaria superior	10,5	35,4	31,1	22,9	100,0
	Terciaria	5,8	32,0	26,8	35,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 9. Distribución de la población (%) según su consumo de cigarrillos diarios por sexo y territorio histórico

		1-10	11-20	>20	Total
Mujeres	Total	67,6	30,0	2,5	100,0
	Araba	60,7	36,6	2,7	100,0
	Gipuzkoa	70,2	27,5	2,3	100,0
	Bizkaia	68,4	29,1	2,5	100,0
Hombres	Total	60,3	35,6	4,0	100,0
	Araba	68,1	29,2	2,7	100,0
	Gipuzkoa	58,4	37,5	4,1	100,0
	Bizkaia	59,3	36,4	4,3	100,0
Ambos sexos	Total	63,6	33,1	3,3	100,0
	Araba	64,4	32,9	2,7	100,0
	Gipuzkoa	63,9	32,8	3,3	100,0
	Bizkaia	63,3	33,2	3,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 10. Distribución de la población (%) según su consumo de cigarrillos diarios por sexo y edad

		1-10	11-20	>20	Total
Mujeres	Total	67,6	30,0	2,5	100,0
	15-24	82,5	12,6	4,9	100,0
	25-34	70,2	25,7	4,0	100,0
	35-44	73,4	25,6	1,0	100,0
	45-54	71,9	28,1	.	100,0
	55-64	52,3	41,7	6,0	100,0
	65-74	60,0	38,4	1,6	100,0
	>=75	70,4	29,6	.	100,0
	Hombres	Total	60,3	35,6	4,0
15-24		62,2	37,8	.	100,0
25-34		79,5	17,8	2,7	100,0
35-44		64,2	33,9	1,8	100,0
45-54		53,6	40,0	6,4	100,0
55-64		44,6	47,4	8,0	100,0
65-74		68,5	30,0	1,5	100,0
>=75		74,0	26,0	.	100,0
Ambos sexos		Total	63,6	33,1	3,3
	15-24	73,1	24,3	2,6	100,0
	25-34	76,1	20,7	3,2	100,0
	35-44	68,1	30,4	1,5	100,0
	45-54	61,4	34,9	3,7	100,0
	55-64	48,5	44,6	7,0	100,0
	65-74	63,7	34,8	1,5	100,0
	>=75	72,7	27,3	.	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 11. Distribución de la población (%) según su consumo de cigarrillos diarios por sexo y clase social

		1-10	11-20	>20	Total
Mujeres	Total	68,2	29,3	2,5	100,0
	I	70,4	29,6	.	100,0
	II	63,0	37,0	.	100,0
	III	76,5	21,8	1,7	100,0
	IV	67,4	29,3	3,4	100,0
	V	55,8	38,5	5,7	100,0
Hombres	Total	60,2	35,8	4,0	100,0
	I	57,8	36,9	5,3	100,0
	II	71,1	26,3	2,6	100,0
	III	62,4	34,6	3,0	100,0
	IV	58,4	37,4	4,2	100,0
	V	59,4	35,9	4,6	100,0
Ambos sexos	Total	63,8	32,9	3,3	100,0
	I	64,3	33,2	2,6	100,0
	II	67,2	31,4	1,4	100,0
	III	70,4	27,3	2,3	100,0
	IV	62,0	34,2	3,8	100,0
	V	57,9	37,0	5,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 12. Distribución de la población (%) según su consumo de cigarrillos diarios por sexo y nivel de estudios

		1-10	11-20	>20	Total
Mujeres	Total	67,7	29,9	2,5	100,0
	Sin estudios, primaria	73,7	16,2	10,0	100,0
	Secundaria inferior	68,9	28,6	2,5	100,0
	Secundaria superior	62,8	34,8	2,4	100,0
	Terciaria	72,1	27,9	.	100,0
Hombres	Total	60,3	35,6	4,0	100,0
	Sin estudios, primaria	66,2	31,2	2,7	100,0
	Secundaria inferior	48,1	45,6	6,4	100,0
	Secundaria superior	65,4	31,6	3,0	100,0
	Terciaria	63,9	32,7	3,4	100,0
Ambos sexos	Total	63,7	33,0	3,3	100,0
	Sin estudios, primaria	70,0	23,6	6,4	100,0
	Secundaria inferior	56,2	39,0	4,9	100,0
	Secundaria superior	64,3	33,0	2,8	100,0
	Terciaria	68,5	30,0	1,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 13. Prevalencia (%) de población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	25,0	20,4	22,5
Araba	31,1	32,2	31,6
Gipuzkoa	22,3	16,0	18,9
Bizkaia	24,5	19,4	21,6

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 14. Prevalencia (%) de población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	25,0	20,4	22,5
15-24	31,0	22,3	26,9
25-34	13,3	25,4	21,0
35-44	23,2	25,0	24,2
45-54	30,4	13,8	20,9
55-64	24,7	21,0	22,8
65-74	18,2	10,7	14,9
>=75	37,4	32,8	34,3

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 15. Prevalencia (%) de población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	25,3	20,4	22,6
I	27,8	20,4	24,2
II	18,8	37,1	28,2
III	29,6	25,5	27,8
IV	20,8	16,9	18,5
V	36,0	17,6	25,1

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 16. Prevalencia (%) de población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	25,1	20,4	22,5
Sin estudios, primaria	45,6	24,5	35,2
Secundaria inferior	23,8	14,0	17,8
Secundaria superior	24,1	20,4	22,0
Terciaria	20,4	28,7	24,1

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 17. Prevalencia (%) de población fumadora habitual a la que le hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	66,8	60,0	63,1
Araba	68,2	71,2	69,7
Gipuzkoa	64,6	50,0	56,8
Bizkaia	67,3	61,5	64,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 18. Prevalencia (%) de población fumadora habitual a la que le hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	66,8	60,0	63,1
15-24	58,0	58,6	58,3
25-34	63,4	56,1	58,8
35-44	69,1	72,2	70,9
45-54	73,4	55,0	62,9
55-64	73,1	62,9	68,0
65-74	53,7	53,0	53,4
>=75	40,1	39,1	39,4

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 19. Prevalencia (%) de población fumadora habitual a la que le hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	66,4	59,9	62,9
I	73,2	55,3	64,6
II	70,9	66,7	68,7
III	67,2	60,8	64,4
IV	59,3	59,8	59,6
V	80,0	58,2	67,1

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 20. Prevalencia (%) de población fumadora habitual a la que le hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	66,7	60,0	63,1
Sin estudios, primaria	55,9	54,9	55,4
Secundaria inferior	71,0	53,5	60,3
Secundaria superior	64,4	63,2	63,7
Terciaria	70,6	64,2	67,8

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 21. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo y territorio histórico

		Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	11,0	1,5	2,9	4,1	80,4	100,0
	Araba	9,6	2,5	1,5	4,5	81,9	100,0
	Gipuzkoa	8,4	0,6	2,9	5,6	82,5	100,0
	Bizkaia	13,0	1,8	3,3	3,1	78,8	100,0
Hombres	Total	11,6	2,0	3,5	4,8	78,0	100,0
	Araba	8,7	1,6	4,8	3,6	81,3	100,0
	Gipuzkoa	9,1	1,1	2,6	6,8	80,4	100,0
	Bizkaia	14,0	2,8	3,7	3,9	75,6	100,0
Ambos sexos	Total	11,3	1,8	3,2	4,5	79,3	100,0
	Araba	9,2	2,1	3,1	4,1	81,6	100,0
	Gipuzkoa	8,7	0,8	2,7	6,2	81,5	100,0
	Bizkaia	13,5	2,3	3,5	3,5	77,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 22. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo y edad

		Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	11,0	1,5	2,9	4,1	80,4	100,0
	15-24	14,2	3,3	3,8	3,2	75,5	100,0
	25-34	13,4	1,7	3,7	4,0	77,1	100,0
	35-44	12,3	1,0	4,3	5,6	76,9	100,0
	45-54	14,0	1,9	2,5	4,9	76,8	100,0
	55-64	10,7	1,5	3,2	5,2	79,3	100,0
	65-74	10,1	1,1	1,3	2,5	85,0	100,0
	>=75	3,9	0,8	1,9	2,6	90,9	100,0
Hombres	Total	11,6	2,0	3,5	4,8	78,0	100,0
	15-24	9,0	4,0	5,2	4,2	77,5	100,0
	25-34	14,1	1,2	3,8	3,8	77,1	100,0
	35-44	16,8	2,8	4,2	4,8	71,3	100,0
	45-54	13,2	1,9	2,4	5,7	76,7	100,0
	55-64	12,1	2,6	4,8	7,6	73,0	100,0
	65-74	7,0	1,0	2,5	3,6	85,9	100,0
	>=75	5,7	.	1,4	2,1	90,8	100,0
Ambos sexos	Total	11,3	1,8	3,2	4,5	79,3	100,0
	15-24	11,5	3,7	4,5	3,8	76,5	100,0
	25-34	13,8	1,5	3,7	3,9	77,1	100,0
	35-44	14,6	1,9	4,2	5,2	74,1	100,0
	45-54	13,6	1,9	2,4	5,3	76,7	100,0
	55-64	11,4	2,0	4,0	6,4	76,3	100,0
	65-74	8,7	1,1	1,9	3,0	85,4	100,0
	>=75	4,6	0,5	1,7	2,4	90,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 23. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo y clase social

		Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	11,0	1,5	2,9	4,1	80,5	100,0
	I	9,5	1,8	3,9	3,7	81,1	100,0
	II	8,9	1,1	1,8	4,5	83,7	100,0
	III	10,4	1,6	2,8	4,3	80,8	100,0
	IV	12,8	1,4	3,0	4,1	78,7	100,0
	V	10,5	1,6	2,6	4,2	81,1	100,0
Hombres	Total	11,6	2,0	3,5	4,8	78,0	100,0
	I	5,2	1,7	2,9	4,2	86,0	100,0
	II	8,8	2,5	3,4	4,1	81,2	100,0
	III	9,1	1,9	4,3	4,9	79,8	100,0
	IV	15,1	2,4	3,3	5,1	74,1	100,0
	V	14,5	0,9	3,9	5,6	75,1	100,0
Ambos sexos	Total	11,3	1,8	3,2	4,5	79,3	100,0
	I	7,4	1,8	3,4	3,9	83,5	100,0
	II	8,9	1,8	2,6	4,3	82,5	100,0
	III	9,9	1,8	3,4	4,6	80,4	100,0
	IV	14,0	1,9	3,2	4,6	76,2	100,0
	V	11,9	1,3	3,1	4,7	79,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 24. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo y nivel de estudios

		Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	11,0	1,5	2,9	4,1	80,5	100,0
	Sin estudios, primaria	9,5	0,8	3,0	2,7	84,0	100,0
	Secundaria inferior	11,5	1,7	2,9	3,7	80,2	100,0
	Secundaria superior	12,9	1,5	2,2	5,3	78,1	100,0
	Terciaria	9,2	1,9	3,7	3,6	81,6	100,0
Hombres	Total	11,6	2,0	3,5	4,8	78,0	100,0
	Sin estudios, primaria	10,5	0,5	3,9	3,9	81,2	100,0
	Secundaria inferior	16,9	3,4	3,7	4,2	71,8	100,0
	Secundaria superior	11,3	1,9	3,6	6,0	77,2	100,0
	Terciaria	8,3	1,7	3,0	3,7	83,2	100,0
Ambos sexos	Total	11,3	1,8	3,2	4,5	79,3	100,0
	Sin estudios, primaria	9,9	0,7	3,4	3,2	82,9	100,0
	Secundaria inferior	14,1	2,5	3,3	3,9	76,1	100,0
	Secundaria superior	12,1	1,7	2,9	5,7	77,7	100,0
	Terciaria	8,8	1,8	3,4	3,7	82,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 25. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo y territorio histórico

		Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	2,0	1,3	3,8	5,6	87,2	100,0
	Araba	3,7	0,9	3,6	5,3	86,5	100,0
	Gipuzkoa	1,2	1,2	3,9	7,1	86,6	100,0
	Bizkaia	2,1	1,6	3,9	4,8	87,7	100,0
Hombres	Total	3,5	2,4	5,4	7,5	81,3	100,0
	Araba	6,4	2,0	4,0	8,0	79,6	100,0
	Gipuzkoa	2,0	2,2	4,8	10,9	80,1	100,0
	Bizkaia	3,5	2,6	6,2	5,1	82,6	100,0
Ambos sexos	Total	2,7	1,8	4,6	6,5	84,4	100,0
	Araba	5,0	1,4	3,8	6,6	83,1	100,0
	Gipuzkoa	1,6	1,7	4,3	8,9	83,5	100,0
	Bizkaia	2,8	2,1	5,0	4,9	85,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 26. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo y edad

		Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	2,0	1,3	3,8	5,6	87,2	100,0
	15-24	3,4	3,2	8,8	8,7	75,9	100,0
	25-34	3,1	3,4	2,9	7,0	83,6	100,0
	35-44	4,1	1,6	4,4	6,7	83,2	100,0
	45-54	1,7	1,2	4,9	5,8	86,4	100,0
	55-64	1,5	0,7	4,7	6,9	86,2	100,0
	65-74	0,6	0,1	1,2	3,0	95,2	100,0
	>=75	0,6	0,4	0,8	2,0	96,2	100,0
Hombres	Total	3,5	2,4	5,4	7,5	81,3	100,0
	15-24	1,6	5,4	10,3	7,7	75,0	100,0
	25-34	3,6	2,6	6,6	8,0	79,3	100,0
	35-44	6,5	1,9	5,6	9,1	76,9	100,0
	45-54	4,2	2,5	4,7	8,3	80,3	100,0
	55-64	4,2	2,8	6,2	10,1	76,6	100,0
	65-74	1,5	0,7	2,0	3,6	92,1	100,0
	>=75	0,3	0,7	2,2	2,9	93,9	100,0
Ambos sexos	Total	2,7	1,8	4,6	6,5	84,4	100,0
	15-24	2,5	4,3	9,6	8,2	75,4	100,0
	25-34	3,3	3,0	4,8	7,5	81,4	100,0
	35-44	5,3	1,8	5,0	7,9	80,0	100,0
	45-54	3,0	1,9	4,8	7,0	83,3	100,0
	55-64	2,8	1,7	5,5	8,5	81,5	100,0
	65-74	1,0	0,4	1,6	3,3	93,7	100,0
	>=75	0,5	0,5	1,3	2,4	95,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 27. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo y clase social

		Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	2,1	1,3	3,8	5,6	87,2	100,0
	I	1,6	2,0	4,2	6,1	86,0	100,0
	II	1,5	0,7	0,7	6,4	90,6	100,0
	III	1,9	1,1	3,4	4,8	88,9	100,0
	IV	1,9	1,3	4,4	5,1	87,3	100,0
	V	3,5	1,5	4,7	6,8	83,6	100,0
Hombres	Total	3,4	2,4	5,4	7,5	81,3	100,0
	I	1,8	1,0	2,3	4,2	90,8	100,0
	II	3,0	1,5	4,7	6,7	84,1	100,0
	III	3,2	2,1	4,1	7,6	83,1	100,0
	IV	3,5	3,4	7,0	8,2	77,9	100,0
	V	7,0	1,8	7,0	10,4	73,9	100,0
Ambos sexos	Total	2,7	1,9	4,6	6,5	84,3	100,0
	I	1,7	1,5	3,2	5,2	88,4	100,0
	II	2,2	1,1	2,7	6,6	87,4	100,0
	III	2,4	1,5	3,7	6,0	86,3	100,0
	IV	2,7	2,4	5,8	6,8	82,2	100,0
	V	4,7	1,6	5,5	8,0	80,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 28. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo y nivel de estudios

		Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	2,0	1,3	3,8	5,6	87,2	100,0
	Sin estudios, primaria	1,2	1,4	1,6	3,6	92,2	100,0
	Secundaria inferior	2,8	1,1	4,5	4,7	87,0	100,0
	Secundaria superior	2,5	1,6	4,9	6,9	84,1	100,0
	Terciaria	1,5	1,1	3,2	5,6	88,6	100,0
Hombres	Total	3,5	2,4	5,4	7,5	81,3	100,0
	Sin estudios, primaria	1,6	0,9	1,6	3,9	92,0	100,0
	Secundaria inferior	4,5	3,6	7,0	6,4	78,5	100,0
	Secundaria superior	3,9	3,3	6,4	9,5	76,9	100,0
	Terciaria	2,6	0,6	3,8	6,2	86,9	100,0
Ambos sexos	Total	2,7	1,8	4,6	6,5	84,4	100,0
	Sin estudios, primaria	1,3	1,2	1,6	3,7	92,1	100,0
	Secundaria inferior	3,6	2,3	5,7	5,5	82,8	100,0
	Secundaria superior	3,2	2,5	5,7	8,3	80,2	100,0
	Terciaria	2,0	0,9	3,5	5,9	87,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 29. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo y territorio histórico

		Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	0,9	1,5	5,4	11,7	80,5	100,0
	Araba	1,2	0,6	3,0	12,3	83,0	100,0
	Gipuzkoa	0,3	1,2	8,6	17,4	72,4	100,0
	Bizkaia	1,1	1,9	4,2	8,1	84,7	100,0
Hombres	Total	1,4	2,2	6,6	13,7	76,2	100,0
	Araba	2,1	2,0	4,5	9,8	81,6	100,0
	Gipuzkoa	0,9	2,2	6,9	19,4	70,5	100,0
	Bizkaia	1,4	2,3	7,0	11,1	78,2	100,0
Ambos sexos	Total	1,1	1,8	6,0	12,7	78,4	100,0
	Araba	1,6	1,3	3,7	11,1	82,3	100,0
	Gipuzkoa	0,6	1,7	7,8	18,4	71,5	100,0
	Bizkaia	1,3	2,1	5,5	9,5	81,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 30. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo y edad

		Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	0,9	1,5	5,4	11,7	80,5	100,0
	15-24	1,0	3,4	12,5	15,7	67,3	100,0
	25-34	1,6	4,7	5,1	16,0	72,6	100,0
	35-44	2,0	1,7	7,6	14,7	74,0	100,0
	45-54	0,6	1,0	5,8	12,8	79,8	100,0
	55-64	0,6	0,8	4,6	13,6	80,5	100,0
	65-74	0,3	0,3	2,5	5,8	91,0	100,0
	>=75	0,2	0,2	1,8	5,2	92,6	100,0
Hombres	Total	1,4	2,2	6,6	13,7	76,2	100,0
	15-24	2,5	3,8	8,0	17,4	68,4	100,0
	25-34	1,1	2,3	9,4	21,8	65,3	100,0
	35-44	3,0	2,7	7,0	13,3	74,0	100,0
	45-54	0,7	2,4	7,4	14,3	75,2	100,0
	55-64	0,8	1,9	7,8	13,7	75,7	100,0
	65-74	1,3	0,9	3,3	8,7	85,9	100,0
	>=75	0,1	1,3	2,0	6,2	90,4	100,0
Ambos sexos	Total	1,1	1,8	6,0	12,7	78,4	100,0
	15-24	1,8	3,6	10,2	16,6	67,9	100,0
	25-34	1,4	3,5	7,3	18,9	69,0	100,0
	35-44	2,5	2,2	7,3	14,0	74,0	100,0
	45-54	0,7	1,7	6,6	13,5	77,5	100,0
	55-64	0,7	1,3	6,2	13,6	78,2	100,0
	65-74	0,7	0,6	2,9	7,1	88,7	100,0
	>=75	0,2	0,6	1,9	5,6	91,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 31. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo y clase social

		Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	0,9	1,5	5,5	11,8	80,4	100,0
	I	0,7	2,0	7,7	14,8	74,7	100,0
	II	0,7	1,2	3,3	16,4	78,4	100,0
	III	1,1	1,1	5,3	11,2	81,4	100,0
	IV	0,8	1,3	4,6	10,6	82,7	100,0
	V	0,8	2,2	6,7	9,4	80,9	100,0
Hombres	Total	1,4	2,2	6,6	13,7	76,1	100,0
	I	0,5	2,1	2,8	20,5	74,0	100,0
	II	1,4	2,6	8,4	8,6	79,0	100,0
	III	2,1	1,5	6,7	14,4	75,3	100,0
	IV	1,1	2,6	7,8	12,1	76,3	100,0
	V	2,5	1,3	5,8	12,8	77,6	100,0
Ambos sexos	Total	1,1	1,8	6,0	12,7	78,3	100,0
	I	0,6	2,1	5,3	17,7	74,3	100,0
	II	1,1	1,9	5,8	12,6	78,7	100,0
	III	1,6	1,2	5,9	12,6	78,7	100,0
	IV	1,0	2,0	6,3	11,4	79,3	100,0
	V	1,4	1,9	6,4	10,6	79,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 32. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo y nivel de estudios

		Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	0,9	1,5	5,4	11,7	80,5	100,0
	Sin estudios, primaria	0,2	1,7	3,1	6,5	88,4	100,0
	Secundaria inferior	0,8	1,2	3,3	9,2	85,4	100,0
	Secundaria superior	1,2	1,1	6,4	12,8	78,5	100,0
	Terciaria	0,8	2,1	6,8	14,8	75,6	100,0
Hombres	Total	1,4	2,2	6,6	13,7	76,2	100,0
	Sin estudios, primaria	1,2	1,7	4,6	8,7	83,8	100,0
	Secundaria inferior	1,1	3,8	6,0	12,0	77,1	100,0
	Secundaria superior	1,4	1,8	7,6	14,0	75,2	100,0
	Terciaria	1,5	1,7	6,3	16,6	73,9	100,0
Ambos sexos	Total	1,1	1,8	6,0	12,7	78,4	100,0
	Sin estudios, primaria	0,6	1,7	3,7	7,4	86,6	100,0
	Secundaria inferior	1,0	2,5	4,7	10,6	81,3	100,0
	Secundaria superior	1,3	1,5	7,0	13,4	76,7	100,0
	Terciaria	1,1	1,9	6,6	15,6	74,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 33. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo y territorio histórico

		Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	0,9	1,3	2,6	3,3	91,9	100,0
	Araba	0,6	1,0	1,7	3,6	93,0	100,0
	Gipuzkoa	1,0	0,9	2,0	3,1	93,0	100,0
	Bizkaia	0,9	1,6	3,1	3,3	91,0	100,0
Hombres	Total	2,4	2,2	3,2	4,2	88,0	100,0
	Araba	2,8	0,6	1,6	3,9	91,1	100,0
	Gipuzkoa	2,1	1,0	2,1	3,5	91,3	100,0
	Bizkaia	2,5	3,4	4,3	4,7	85,0	100,0
Ambos sexos	Total	1,6	1,7	2,8	3,7	90,1	100,0
	Araba	1,7	0,8	1,7	3,8	92,1	100,0
	Gipuzkoa	1,5	1,0	2,1	3,3	92,1	100,0
	Bizkaia	1,7	2,5	3,7	4,0	88,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 34. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo y edad

		Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	0,9	1,3	2,6	3,3	91,9	100,0
	15-24	0,6	2,0	4,0	5,7	87,7	100,0
	25-34	0,7	2,2	2,9	5,5	88,7	100,0
	35-44	1,8	1,2	3,4	4,5	89,1	100,0
	45-54	1,4	1,5	3,1	3,3	90,7	100,0
	55-64	1,3	1,6	3,3	2,5	91,3	100,0
	65-74	.	0,3	1,1	1,9	96,8	100,0
	>=75	0,2	0,7	0,4	1,1	97,7	100,0
Hombres	Total	2,4	2,2	3,2	4,2	88,0	100,0
	15-24	2,8	1,3	3,4	7,5	85,0	100,0
	25-34	0,8	1,6	4,5	5,6	87,4	100,0
	35-44	4,8	3,0	5,4	6,4	80,4	100,0
	45-54	2,5	4,0	1,8	2,7	89,1	100,0
	55-64	3,3	2,3	4,0	4,4	86,0	100,0
	65-74	1,3	1,1	2,0	1,8	93,8	100,0
	>=75	.	0,4	0,7	1,0	97,9	100,0
Ambos sexos	Total	1,6	1,7	2,8	3,7	90,1	100,0
	15-24	1,7	1,7	3,7	6,6	86,3	100,0
	25-34	0,8	1,9	3,7	5,5	88,0	100,0
	35-44	3,3	2,1	4,4	5,4	84,7	100,0
	45-54	2,0	2,7	2,4	3,0	89,9	100,0
	55-64	2,2	2,0	3,6	3,4	88,8	100,0
	65-74	0,6	0,6	1,5	1,9	95,4	100,0
	>=75	0,1	0,6	0,5	1,0	97,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 35. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo y clase social

		Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	0,9	1,3	2,6	3,3	91,9	100,0
	I	0,6	1,5	2,1	3,0	92,9	100,0
	II	0,8	0,6	2,3	3,3	93,0	100,0
	III	0,7	0,6	1,9	4,1	92,6	100,0
	IV	1,2	1,6	2,9	3,4	90,8	100,0
	V	0,9	1,9	3,3	2,3	91,6	100,0
Hombres	Total	2,4	2,2	3,2	4,2	88,0	100,0
	I	1,4	0,7	1,5	3,2	93,3	100,0
	II	2,0	2,1	1,2	3,8	91,0	100,0
	III	3,7	1,5	1,9	2,6	90,2	100,0
	IV	2,2	3,3	4,2	5,1	85,1	100,0
	V	2,9	1,1	6,0	5,6	84,4	100,0
Ambos sexos	Total	1,6	1,7	2,9	3,7	90,0	100,0
	I	1,0	1,1	1,8	3,1	93,1	100,0
	II	1,4	1,3	1,8	3,5	92,0	100,0
	III	2,1	1,0	1,9	3,5	91,5	100,0
	IV	1,8	2,5	3,6	4,3	87,8	100,0
	V	1,6	1,6	4,3	3,5	89,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 36. Distribución de la población (%) según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo y nivel de estudios

		Sí, todos los días	Sí, con mucho frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	Total	0,9	1,3	2,6	3,3	92,0	100,0
	Sin estudios, primaria	0,6	1,6	1,9	0,7	95,2	100,0
	Secundaria inferior	0,9	1,8	2,9	3,0	91,4	100,0
	Secundaria superior	1,3	1,5	2,8	4,0	90,4	100,0
	Terciaria	0,6	0,6	2,4	3,9	92,5	100,0
Hombres	Total	2,4	2,2	3,2	4,2	88,0	100,0
	Sin estudios, primaria	0,3	0,2	2,9	2,9	93,7	100,0
	Secundaria inferior	3,3	4,6	3,9	3,6	84,6	100,0
	Secundaria superior	2,2	2,3	3,3	6,0	86,2	100,0
	Terciaria	2,9	0,9	2,4	2,2	91,6	100,0
Ambos sexos	Total	1,6	1,7	2,8	3,7	90,1	100,0
	Sin estudios, primaria	0,5	1,1	2,3	1,6	94,6	100,0
	Secundaria inferior	2,1	3,2	3,4	3,3	88,1	100,0
	Secundaria superior	1,8	1,9	3,1	5,0	88,2	100,0
	Terciaria	1,6	0,7	2,4	3,1	92,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 37. Distribución de la población (%) según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo y territorio histórico

		No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Mujeres	Total	68,4	20,7	10,9	100,0
	Araba	67,9	19,6	12,5	100,0
	Gipuzkoa	65,4	21,2	13,4	100,0
	Bizkaia	70,3	20,8	8,9	100,0
Hombres	Total	48,7	34,5	16,8	100,0
	Araba	52,0	32,9	15,1	100,0
	Gipuzkoa	46,0	34,2	19,9	100,0
	Bizkaia	49,5	35,1	15,4	100,0
Ambos sexos	Total	58,9	27,4	13,7	100,0
	Araba	60,1	26,1	13,8	100,0
	Gipuzkoa	55,9	27,5	16,6	100,0
	Bizkaia	60,4	27,6	12,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 38. Distribución de la población (%) según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo y edad

		No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Mujeres	Total	68,4	20,7	10,9	100,0
	15-24	72,5	12,8	14,8	100,0
	25-34	66,8	18,3	14,9	100,0
	35-44	71,7	20,2	8,1	100,0
	45-54	59,4	27,1	13,5	100,0
	55-64	59,9	25,7	14,4	100,0
	65-74	68,8	23,5	7,8	100,0
	>=75	83,0	13,0	4,0	100,0
Hombres	Total	48,7	34,5	16,8	100,0
	15-24	75,9	13,4	10,7	100,0
	25-34	57,3	32,4	10,3	100,0
	35-44	47,5	38,2	14,2	100,0
	45-54	47,1	36,8	16,1	100,0
	55-64	40,3	36,6	23,1	100,0
	65-74	32,7	42,7	24,6	100,0
	>=75	46,7	36,7	16,7	100,0
Ambos sexos	Total	58,9	27,4	13,7	100,0
	15-24	74,2	13,1	12,7	100,0
	25-34	62,0	25,4	12,6	100,0
	35-44	59,6	29,3	11,2	100,0
	45-54	53,2	32,0	14,8	100,0
	55-64	50,4	30,9	18,6	100,0
	65-74	52,0	32,4	15,6	100,0
	>=75	68,8	22,3	8,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 39. Distribución de la población (%) según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo y clase social

		No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Mujeres	Total	68,3	20,8	10,9	100,0
	I	56,8	22,4	20,8	100,0
	II	55,8	26,7	17,5	100,0
	III	63,7	24,4	11,9	100,0
	IV	74,0	18,9	7,1	100,0
	V	81,5	14,5	4,0	100,0
Hombres	Total	48,7	34,5	16,9	100,0
	I	44,8	38,2	17,0	100,0
	II	46,4	33,3	20,3	100,0
	III	48,7	30,0	21,3	100,0
	IV	48,5	36,5	15,0	100,0
	V	58,6	28,8	12,5	100,0
Ambos sexos	Total	58,9	27,4	13,8	100,0
	I	50,9	30,3	18,9	100,0
	II	51,3	29,9	18,9	100,0
	III	57,0	26,9	16,0	100,0
	IV	60,3	28,3	11,4	100,0
	V	73,4	19,6	7,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 40. Distribución de la población (%) según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo y nivel de estudios

		No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Mujeres	Total	68,4	20,7	10,9	100,0
	Sin estudios, primaria	83,6	11,5	4,8	100,0
	Secundaria inferior	77,5	17,1	5,5	100,0
	Secundaria superior	67,9	22,2	9,8	100,0
	Terciaria	54,9	26,2	18,9	100,0
Hombres	Total	48,7	34,5	16,8	100,0
	Sin estudios, primaria	55,2	34,0	10,9	100,0
	Secundaria inferior	52,7	34,9	12,4	100,0
	Secundaria superior	46,7	33,9	19,4	100,0
	Terciaria	46,1	35,4	18,5	100,0
Ambos sexos	Total	58,9	27,3	13,7	100,0
	Sin estudios, primaria	72,6	20,2	7,2	100,0
	Secundaria inferior	65,3	25,8	8,9	100,0
	Secundaria superior	56,7	28,4	14,9	100,0
	Terciaria	51,0	30,3	18,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 41. Prevalencia (%) de población con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	10,9	16,8	13,7
Araba	12,5	15,1	13,8
Gipuzkoa	13,4	19,9	16,6
Bizkaia	8,9	15,4	12,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 42. Prevalencia (%) de población con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	10,9	16,8	13,7
15-24	14,8	10,7	12,7
25-34	14,9	10,3	12,6
35-44	8,1	14,2	11,2
45-54	13,5	16,1	14,8
55-64	14,4	23,1	18,6
65-74	7,8	24,6	15,6
>=75	4,0	16,7	8,9

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 43. Prevalencia (%) de población con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	10,9	16,9	13,8
I	20,8	17,0	18,9
II	17,5	20,3	18,9
III	11,9	21,3	16,0
IV	7,1	15,0	11,4
V	4,0	12,5	7,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 44. Prevalencia (%) de población con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	10,9	16,8	13,7
Sin estudios, primaria	4,8	10,9	7,2
Secundaria inferior	5,5	12,4	8,9
Secundaria superior	9,8	19,4	14,9
Terciaria	18,9	18,5	18,7

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 45. Distribución de la población (%) según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo y territorio histórico

		Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	Total	4,7	1,4	10,2	15,4	9,0	6,4	16,3	36,7	100,0
	Araba	3,3	1,3	10,2	17,3	7,4	6,4	13,1	40,9	100,0
	Gipuzkoa	4,7	1,5	12,4	16,0	7,9	8,4	16,7	32,5	100,0
	Bizkaia	5,0	1,3	8,8	14,5	10,2	5,1	16,9	38,1	100,0
Hombres	Total	14,2	4,1	15,8	17,2	10,6	6,7	11,4	20,0	100,0
	Araba	9,3	4,5	18,4	15,7	8,7	8,5	8,9	25,8	100,0
	Gipuzkoa	16,7	4,9	16,8	15,7	8,5	7,3	10,9	19,3	100,0
	Bizkaia	14,0	3,5	14,3	18,6	12,5	5,9	12,4	18,8	100,0
Ambos sexos	Total	9,3	2,7	12,9	16,3	9,8	6,6	13,9	28,7	100,0
	Araba	6,3	2,9	14,2	16,5	8,0	7,5	11,1	33,5	100,0
	Gipuzkoa	10,5	3,1	14,6	15,9	8,2	7,9	13,8	26,0	100,0
	Bizkaia	9,3	2,4	11,4	16,5	11,3	5,5	14,7	29,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 46. Distribución de la población (%) según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo y edad

		Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	Total	4,7	1,4	10,2	15,4	9,0	6,4	16,3	36,7	100,0
	15-24	.	1,0	7,5	19,0	23,2	10,6	12,3	26,4	100,0
	25-34	1,2	0,2	8,9	22,9	15,6	7,9	15,8	27,4	100,0
	35-44	0,9	1,8	9,5	16,1	11,9	8,7	15,7	35,4	100,0
	45-54	2,5	1,4	16,1	20,7	8,3	6,2	16,7	28,1	100,0
	55-64	6,4	2,0	15,0	16,7	4,6	6,3	17,6	31,4	100,0
	65-74	9,9	2,4	8,0	11,0	4,6	5,5	16,1	42,7	100,0
	>=75	9,9	0,5	3,1	3,5	2,0	1,3	18,0	61,7	100,0
Hombres	Total	14,2	4,1	15,8	17,2	10,6	6,7	11,4	20,0	100,0
	15-24	1,5	1,1	8,7	12,8	14,8	12,3	16,9	31,9	100,0
	25-34	3,7	2,1	11,6	25,2	22,3	10,8	12,2	12,0	100,0
	35-44	6,1	5,2	16,7	24,4	12,4	6,0	11,0	18,2	100,0
	45-54	5,6	6,2	19,3	21,8	11,2	6,9	11,7	17,3	100,0
	55-64	19,9	5,2	20,9	13,6	7,9	5,6	8,6	18,1	100,0
	65-74	33,9	4,3	18,2	10,9	3,2	2,8	9,0	17,7	100,0
	>=75	34,8	1,9	9,1	7,6	2,6	3,7	11,4	29,0	100,0
Ambos sexos	Total	9,3	2,7	12,9	16,3	9,8	6,6	13,9	28,7	100,0
	15-24	0,8	1,0	8,1	15,8	18,9	11,5	14,7	29,2	100,0
	25-34	2,5	1,2	10,2	24,1	19,0	9,4	14,0	19,7	100,0
	35-44	3,5	3,5	13,1	20,3	12,1	7,3	13,4	26,8	100,0
	45-54	4,0	3,8	17,7	21,2	9,8	6,6	14,2	22,7	100,0
	55-64	12,9	3,6	17,9	15,2	6,2	6,0	13,3	25,0	100,0
	65-74	21,1	3,3	12,7	10,9	4,0	4,2	12,8	31,0	100,0
	>=75	19,6	1,1	5,4	5,1	2,2	2,2	15,4	48,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 47. Distribución de la población (%) según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo y clase social

		Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	Total	4,7	1,4	10,2	15,4	9,1	6,4	16,3	36,6	100,0
	I	4,0	3,0	16,4	19,8	10,4	9,8	15,0	21,6	100,0
	II	8,0	1,7	13,4	21,1	12,3	6,5	16,3	20,7	100,0
	III	4,5	1,7	12,7	17,4	9,9	6,6	16,1	31,1	100,0
	IV	4,6	0,8	7,2	13,4	8,0	5,3	16,3	44,4	100,0
	V	3,9	0,3	5,3	9,0	6,8	5,0	18,1	51,6	100,0
Hombres	Total	14,2	4,1	15,8	17,2	10,6	6,7	11,4	19,9	100,0
	I	12,8	6,1	15,8	20,5	9,5	6,3	11,1	17,8	100,0
	II	9,4	6,2	21,1	16,9	13,4	7,5	9,9	15,7	100,0
	III	15,2	3,7	18,8	13,6	8,8	8,0	10,7	21,2	100,0
	IV	15,0	4,0	13,7	18,8	11,4	5,9	11,1	20,1	100,0
	V	15,9	.	13,8	11,6	9,9	7,8	16,0	25,0	100,0
Ambos sexos	Total	9,3	2,7	12,9	16,3	9,8	6,5	14,0	28,6	100,0
	I	8,4	4,5	16,1	20,2	10,0	8,1	13,1	19,7	100,0
	II	8,6	3,9	17,1	19,1	12,9	7,0	13,2	18,3	100,0
	III	9,3	2,6	15,4	15,7	9,4	7,2	13,7	26,7	100,0
	IV	10,2	2,5	10,7	16,3	9,8	5,6	13,5	31,3	100,0
	V	8,2	0,2	8,3	9,9	7,9	6,0	17,3	42,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 48. Distribución de la población (%) según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo y nivel de estudios

		Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada quince días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	Total	4,7	1,4	10,2	15,4	9,0	6,4	16,3	36,7	100,0
	Sin estudios, primaria	4,5	0,8	2,6	8,5	3,1	3,0	17,2	60,2	100,0
	Secundaria inferior	6,4	0,9	6,2	9,0	6,6	4,8	17,9	48,2	100,0
	Secundaria superior	4,1	1,0	9,0	18,1	10,7	6,6	17,1	33,5	100,0
	Terciaria	4,3	2,6	18,2	20,0	11,8	8,9	13,7	20,6	100,0
Hombres	Total	14,2	4,1	15,8	17,2	10,6	6,7	11,3	20,0	100,0
	Sin estudios, primaria	24,1	3,4	8,4	9,0	2,5	5,7	11,6	35,4	100,0
	Secundaria inferior	16,3	3,0	13,8	14,2	7,3	6,7	11,7	27,0	100,0
	Secundaria superior	12,7	4,4	17,7	18,5	12,0	5,9	12,5	16,3	100,0
	Terciaria	11,0	4,8	17,1	21,0	14,2	8,6	8,9	14,3	100,0
Ambos sexos	Total	9,3	2,7	12,8	16,3	9,8	6,6	13,9	28,7	100,0
	Sin estudios, primaria	12,1	1,8	4,9	8,7	2,9	4,1	15,0	50,7	100,0
	Secundaria inferior	11,3	1,9	9,9	11,5	6,9	5,7	14,9	37,8	100,0
	Secundaria superior	8,6	2,8	13,6	18,3	11,4	6,2	14,6	24,4	100,0
	Terciaria	7,3	3,6	17,7	20,4	12,9	8,8	11,5	17,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 49. Distribución de la población (%) según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo y territorio histórico

		<16	16-18	19-20	>20	Total
Mujeres	Total	11,7	47,1	15,8	25,4	100,0
	Araba	9,1	51,2	14,8	24,9	100,0
	Gipuzkoa	10,0	41,9	18,8	29,3	100,0
	Bizkaia	13,6	49,7	13,9	22,8	100,0
Hombres	Total	14,2	58,8	12,6	14,5	100,0
	Araba	10,1	52,2	18,0	19,6	100,0
	Gipuzkoa	13,7	58,0	13,3	15,1	100,0
	Bizkaia	15,5	61,2	10,6	12,7	100,0
Ambos sexos	Total	13,2	54,2	13,8	18,8	100,0
	Araba	9,7	51,8	16,7	21,8	100,0
	Gipuzkoa	12,2	51,5	15,5	20,8	100,0
	Bizkaia	14,8	56,6	11,9	16,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 50. Distribución de la población (%) según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo y edad

		<16	16-18	19-20	>20	Total
Mujeres	Total	11,7	47,1	15,8	25,4	100,0
	15-24	34,0	53,9	8,8	3,3	100,0
	25-34	17,2	62,8	16,0	4,0	100,0
	35-44	13,8	51,7	10,7	23,8	100,0
	45-54	8,1	47,9	19,4	24,7	100,0
	55-64	5,9	44,8	17,3	32,0	100,0
	65-74	6,7	36,8	13,7	42,8	100,0
	>=75	9,8	32,4	20,8	37,1	100,0
Hombres	Total	14,2	58,8	12,6	14,5	100,0
	15-24	14,4	75,4	7,5	2,7	100,0
	25-34	16,8	62,2	7,3	13,7	100,0
	35-44	13,8	60,0	12,1	14,0	100,0
	45-54	11,8	59,6	11,5	17,0	100,0
	55-64	12,0	57,1	14,0	17,0	100,0
	65-74	15,7	56,7	15,7	12,0	100,0
	>=75	18,0	50,8	14,8	16,4	100,0
Ambos sexos	Total	13,2	54,2	13,8	18,8	100,0
	15-24	24,6	64,2	8,2	3,0	100,0
	25-34	17,0	62,4	11,1	9,5	100,0
	35-44	13,8	57,1	11,6	17,4	100,0
	45-54	10,2	54,5	14,9	20,3	100,0
	55-64	9,4	51,9	15,4	23,3	100,0
	65-74	12,6	49,8	15,0	22,7	100,0
	>=75	15,3	44,7	16,8	23,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 51. Distribución de la población (%) según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo y clase social

		<16	16-18	19-20	>20	Total
Mujeres	Total	11,7	47,2	15,6	25,5	100,0
	I	10,9	53,4	15,8	19,9	100,0
	II	14,1	49,1	14,5	22,3	100,0
	III	13,1	44,4	15,5	27,0	100,0
	IV	10,1	44,8	15,3	29,7	100,0
	V	11,3	45,4	17,4	25,9	100,0
Hombres	Total	14,2	58,8	12,6	14,5	100,0
	I	10,1	59,5	14,2	16,1	100,0
	II	14,7	58,1	12,1	15,1	100,0
	III	13,9	54,9	14,7	16,5	100,0
	IV	15,8	58,3	12,3	13,5	100,0
	V	14,3	70,6	5,3	9,8	100,0
Ambos sexos	Total	13,2	54,2	13,8	18,9	100,0
	I	10,4	56,8	14,9	17,8	100,0
	II	14,4	53,9	13,2	18,5	100,0
	III	13,5	49,9	15,1	21,4	100,0
	IV	14,1	54,2	13,2	18,4	100,0
	V	13,0	59,3	10,7	17,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 52. Distribución de la población (%) según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo y nivel de estudios

		<16	16-18	19-20	>20	Total
Mujeres	Total	11,7	47,1	15,8	25,4	100,0
	Sin estudios, primaria	13,3	27,9	14,9	43,9	100,0
	Secundaria inferior	7,0	45,3	16,0	31,7	100,0
	Secundaria superior	12,6	49,5	15,0	23,0	100,0
	Terciaria	12,2	49,3	16,6	21,8	100,0
Hombres	Total	14,2	58,8	12,6	14,5	100,0
	Sin estudios, primaria	16,0	53,1	15,6	15,3	100,0
	Secundaria inferior	21,0	59,7	10,6	8,7	100,0
	Secundaria superior	13,4	59,3	13,1	14,2	100,0
	Terciaria	9,8	59,4	12,0	18,8	100,0
Ambos sexos	Total	13,2	54,1	13,8	18,8	100,0
	Sin estudios, primaria	15,0	43,8	15,3	25,8	100,0
	Secundaria inferior	16,4	54,9	12,4	16,3	100,0
	Secundaria superior	13,2	55,9	13,7	17,2	100,0
	Terciaria	11,0	54,2	14,4	20,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 53. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo y territorio histórico

		Desviación			Percentil	Percentil
		Media	estándar	Mediana	25	75
Mujeres	CAPV	4,8	12,0	0,0	0,0	3,0
	Araba	4,8	10,9	0,0	0,0	3,0
	Gipuzkoa	5,8	12,3	0,0	0,0	6,0
	Bizkaia	4,2	12,1	0,0	0,0	3,0
Hombres	CAPV	12,7	28,6	0,0	0,0	15,0
	Araba	10,0	18,7	0,0	0,0	15,0
	Gipuzkoa	14,4	24,3	3,0	0,0	18,0
	Bizkaia	12,4	32,8	0,0	0,0	13,0
Ambos sexos	CAPV	8,6	21,8	0,0	0,0	9,0
	Araba	7,4	15,4	0,0	0,0	10,0
	Gipuzkoa	10,0	19,3	0,0	0,0	12,0
	Bizkaia	8,1	24,5	0,0	0,0	7,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 54. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo y edad

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	4,8	12,0	0,0	0,0	3,0
	15-24	5,2	18,2	0,0	0,0	3,0
	25-34	4,4	11,4	0,0	0,0	3,0
	35-44	3,1	8,9	0,0	0,0	1,0
	45-54	6,0	15,7	0,0	0,0	5,0
	55-64	6,4	11,8	0,0	0,0	8,0
	65-74	5,0	9,9	0,0	0,0	3,0
	>=75	3,3	9,0	0,0	0,0	0,0
Hombres	Total	12,7	28,6	0,0	0,0	15,0
	15-24	9,7	58,0	0,0	0,0	0,0
	25-34	7,1	25,5	0,0	0,0	8,0
	35-44	8,9	19,5	1,0	0,0	10,0
	45-54	9,7	18,1	1,0	0,0	13,0
	55-64	17,2	26,9	4,0	0,0	25,0
	65-74	21,6	24,6	13,0	0,0	31,0
	>=75	15,4	19,3	3,0	0,0	21,0
Ambos sexos	Total	8,6	21,8	0,0	0,0	9,0
	15-24	7,5	45,3	0,0	0,0	0,0
	25-34	5,7	19,5	0,0	0,0	6,0
	35-44	6,0	15,2	0,0	0,0	7,0
	45-54	7,9	17,0	0,0	0,0	9,0
	55-64	11,7	20,8	0,0	0,0	15,0
	65-74	12,7	19,9	0,0	0,0	18,0
	>=75	8,0	14,9	0,0	0,0	9,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 55. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo y clase social

		Desviación			Percentil	Percentil
		Media	estándar	Mediana	25	75
Mujeres	Total	4,8	12,1	0,0	0,0	3,0
	I	7,2	14,1	0,0	0,0	11,0
	II	6,5	11,6	0,0	0,0	10,0
	III	5,0	10,8	0,0	0,0	5,0
	IV	4,1	13,3	0,0	0,0	0,0
	V	2,7	8,7	0,0	0,0	0,0
Hombres	Total	12,7	28,6	0,0	0,0	15,0
	I	12,5	24,7	3,0	0,0	15,0
	II	11,9	21,0	1,0	0,0	18,0
	III	15,2	41,6	1,0	0,0	16,0
	IV	11,9	22,2	0,0	0,0	15,0
	V	12,3	35,3	0,0	0,0	11,0
Ambos sexos	Total	8,6	21,8	0,0	0,0	9,0
	I	9,8	20,4	0,0	0,0	13,0
	II	9,1	16,9	0,0	0,0	14,0
	III	9,6	28,8	0,0	0,0	9,0
	IV	8,3	19,0	0,0	0,0	8,0
	V	6,1	21,9	0,0	0,0	0,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 56. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo y nivel de estudios

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	4,8	12,0	0,0	0,0	3,0
	Sin estudios, primaria	2,4	7,6	0,0	0,0	0,0
	Secundaria inferior	3,7	9,4	0,0	0,0	0,0
	Secundaria superior	4,6	12,2	0,0	0,0	3,0
	Terciaria	7,1	15,5	0,0	0,0	10,0
Hombres	Total	12,7	28,6	0,0	0,0	15,0
	Sin estudios, primaria	11,9	21,0	0,0	0,0	18,0
	Secundaria inferior	11,6	27,3	0,0	0,0	14,0
	Secundaria superior	13,9	33,3	1,0	0,0	15,0
	Terciaria	11,8	22,9	1,0	0,0	16,0
Ambos sexos	Total	8,6	21,8	0,0	0,0	9,0
	Sin estudios, primaria	6,1	14,9	0,0	0,0	0,0
	Secundaria inferior	7,6	20,2	0,0	0,0	8,0
	Secundaria superior	9,5	26,1	0,0	0,0	9,0
	Terciaria	9,2	19,1	0,0	0,0	12,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 57. Distribución de la población (%) según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo y territorio histórico

		Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	Total	4,7	24,5	70,8	100,0
	Araba	6,2	28,9	64,9	100,0
	Gipuzkoa	5,6	26,9	67,5	100,0
	Bizkaia	3,7	21,5	74,8	100,0
Hombres	Total	4,3	29,2	66,5	100,0
	Araba	1,8	37,4	60,9	100,0
	Gipuzkoa	5,9	28,9	65,1	100,0
	Bizkaia	3,9	27,2	68,9	100,0
Ambos sexos	Total	4,5	27,3	68,2	100,0
	Araba	3,6	33,9	62,5	100,0
	Gipuzkoa	5,8	28,1	66,1	100,0
	Bizkaia	3,8	24,9	71,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 58. Distribución de la población (%) según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo y edad

		Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	Total	4,7	24,5	70,8	100,0
	15-24	9,3	32,7	58,0	100,0
	25-34	3,2	33,8	62,9	100,0
	35-44	7,9	28,5	63,6	100,0
	45-54	4,1	20,6	75,3	100,0
	55-64	3,8	27,4	68,8	100,0
	65-74	4,5	16,1	79,3	100,0
	>=75	1,5	13,2	85,4	100,0
Hombres	Total	4,3	29,2	66,5	100,0
	15-24	22,3	24,5	53,2	100,0
	25-34	8,5	29,0	62,5	100,0
	35-44	7,1	27,0	65,9	100,0
	45-54	1,6	30,2	68,3	100,0
	55-64	2,1	28,2	69,6	100,0
	65-74	1,8	33,5	64,7	100,0
	>=75	0,4	28,7	70,9	100,0
Ambos sexos	Total	4,5	27,3	68,2	100,0
	15-24	15,6	28,7	55,7	100,0
	25-34	6,2	31,1	62,7	100,0
	35-44	7,4	27,5	65,1	100,0
	45-54	2,6	26,0	71,3	100,0
	55-64	2,8	27,9	69,3	100,0
	65-74	2,7	27,4	69,8	100,0
	>=75	0,8	23,5	75,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 59. Distribución de la población (%) según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo y clase social

		Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	Total	4,8	24,6	70,7	100,0
	I	10,0	21,6	68,4	100,0
	II	0,4	26,3	73,3	100,0
	III	5,4	28,6	65,9	100,0
	IV	3,5	23,2	73,2	100,0
	V	1,2	21,7	77,1	100,0
Hombres	Total	4,3	29,2	66,5	100,0
	I	6,7	27,1	66,2	100,0
	II	1,6	27,5	70,8	100,0
	III	5,1	28,7	66,2	100,0
	IV	4,2	31,7	64,1	100,0
	V	1,3	23,3	75,4	100,0
Ambos sexos	Total	4,5	27,3	68,2	100,0
	I	8,2	24,7	67,2	100,0
	II	1,1	26,9	72,0	100,0
	III	5,3	28,7	66,1	100,0
	IV	4,0	29,1	66,9	100,0
	V	1,2	22,6	76,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 60. Distribución de la población (%) según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo y nivel de estudios

		Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	Total	4,7	24,5	70,8	100,0
	Sin estudios, primaria	3,1	19,8	77,0	100,0
	Secundaria inferior	3,5	20,1	76,3	100,0
	Secundaria superior	3,3	25,1	71,6	100,0
	Terciaria	6,8	26,3	67,0	100,0
Hombres	Total	4,3	29,2	66,5	100,0
	Sin estudios, primaria	0,9	34,3	64,8	100,0
	Secundaria inferior	2,5	29,1	68,5	100,0
	Secundaria superior	5,0	29,2	65,8	100,0
	Terciaria	5,8	27,5	66,7	100,0
Ambos sexos	Total	4,5	27,3	68,2	100,0
	Sin estudios, primaria	1,7	29,0	69,3	100,0
	Secundaria inferior	2,8	26,1	71,1	100,0
	Secundaria superior	4,4	27,8	67,8	100,0
	Terciaria	6,3	26,9	66,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 61. Distribución de la población (%) según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo y territorio histórico

		No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	Total	36,7	41,9	14,7	4,5	2,2	0,1	100,0
	Araba	40,9	35,8	16,5	3,8	2,5	0,4	100,0
	Gipuzkoa	32,5	44,1	15,3	6,0	2,0	0,0	100,0
	Bizkaia	38,1	42,1	13,8	3,8	2,1	.	100,0
Hombres	Total	20,0	43,8	23,4	7,3	4,2	1,3	100,0
	Araba	25,8	38,9	23,7	6,8	4,3	0,5	100,0
	Gipuzkoa	19,3	44,8	22,9	7,6	4,5	1,0	100,0
	Bizkaia	18,8	44,6	23,7	7,3	4,1	1,6	100,0
Ambos sexos	Total	28,7	42,8	18,9	5,8	3,2	0,6	100,0
	Araba	33,5	37,3	20,0	5,3	3,4	0,4	100,0
	Gipuzkoa	26,0	44,4	19,0	6,8	3,2	0,5	100,0
	Bizkaia	29,0	43,3	18,5	5,4	3,0	0,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 62. Distribución de la población (%) según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo y edad

		No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	Total	36,7	41,9	14,7	4,5	2,2	0,1	100,0
	15-24	26,4	29,6	25,0	12,8	6,3	.	100,0
	25-34	27,4	37,3	24,1	6,0	5,1	.	100,0
	35-44	35,4	39,6	18,4	5,7	0,8	.	100,0
	45-54	28,1	50,1	15,3	4,5	1,7	0,3	100,0
	55-64	31,4	46,2	16,4	3,7	2,2	.	100,0
	65-74	42,7	50,1	5,2	1,7	0,4	.	100,0
	>=75	61,7	33,8	3,6	0,1	0,7	0,1	100,0
Hombres	Total	20,0	43,8	23,4	7,3	4,2	1,3	100,0
	15-24	31,9	29,4	26,3	8,6	2,7	1,1	100,0
	25-34	12,0	38,2	28,9	16,4	4,5	.	100,0
	35-44	18,2	38,8	30,5	7,0	5,0	0,5	100,0
	45-54	17,3	40,8	29,1	7,5	4,3	1,0	100,0
	55-64	18,1	46,8	21,0	7,1	5,5	1,5	100,0
	65-74	17,7	57,3	15,3	3,4	3,2	3,1	100,0
	>=75	29,0	57,8	6,8	1,0	3,5	1,9	100,0
Ambos sexos	Total	28,7	42,8	18,9	5,8	3,2	0,6	100,0
	15-24	29,2	29,5	25,6	10,7	4,4	0,6	100,0
	25-34	19,7	37,8	26,5	11,2	4,8	.	100,0
	35-44	26,8	39,2	24,4	6,4	2,9	0,3	100,0
	45-54	22,7	45,4	22,3	6,0	3,0	0,6	100,0
	55-64	25,0	46,5	18,7	5,4	3,8	0,7	100,0
	65-74	31,0	53,5	9,9	2,5	1,7	1,5	100,0
	>=75	48,9	43,2	4,9	0,5	1,8	0,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 63. Distribución de la población (%) según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo y clase social

		No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	Total	36,6	41,9	14,8	4,5	2,2	0,1	100,0
	I	21,6	48,7	20,7	7,0	1,9	.	100,0
	II	20,7	47,9	22,0	6,5	3,0	.	100,0
	III	31,1	45,9	15,3	5,0	2,8	.	100,0
	IV	44,4	36,8	12,8	3,8	2,0	0,2	100,0
	V	51,6	37,1	8,1	1,7	1,4	.	100,0
Hombres	Total	19,9	43,8	23,5	7,3	4,2	1,3	100,0
	I	17,8	45,2	25,0	7,7	4,0	0,3	100,0
	II	15,7	45,1	25,1	8,9	4,6	0,6	100,0
	III	21,2	43,9	21,0	7,1	5,2	1,6	100,0
	IV	20,1	43,0	24,4	7,4	3,7	1,4	100,0
	V	25,0	43,2	19,5	5,1	5,0	2,2	100,0
Ambos sexos	Total	28,6	42,8	19,0	5,9	3,2	0,6	100,0
	I	19,7	47,0	22,8	7,4	3,0	0,2	100,0
	II	18,3	46,5	23,5	7,6	3,8	0,3	100,0
	III	26,7	45,0	17,8	5,9	3,8	0,7	100,0
	IV	31,3	40,1	19,0	5,7	2,9	0,9	100,0
	V	42,1	39,3	12,2	2,9	2,7	0,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 64. Distribución de la población (%) según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo y nivel de estudios

		No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	Total	36,7	41,8	14,7	4,5	2,2	0,1	100,0
	Sin estudios, primaria	60,2	33,9	4,7	0,5	0,5	0,1	100,0
	Secundaria inferior	48,2	38,2	8,4	3,2	1,7	0,3	100,0
	Secundaria superior	33,5	40,4	19,1	4,8	2,1	.	100,0
	Terciaria	20,6	50,2	18,8	7,1	3,4	.	100,0
Hombres	Total	20,0	43,8	23,4	7,3	4,2	1,3	100,0
	Sin estudios, primaria	35,4	43,2	13,0	1,6	5,2	1,6	100,0
	Secundaria inferior	27,0	43,6	18,0	6,9	3,7	0,8	100,0
	Secundaria superior	16,3	42,9	26,8	8,1	4,0	2,0	100,0
	Terciaria	14,3	45,7	26,4	8,6	4,7	0,3	100,0
Ambos sexos	Total	28,7	42,8	18,9	5,8	3,2	0,6	100,0
	Sin estudios, primaria	50,7	37,5	7,9	0,9	2,3	0,7	100,0
	Secundaria inferior	37,8	40,8	13,1	5,1	2,7	0,5	100,0
	Secundaria superior	24,4	41,7	23,2	6,6	3,1	1,0	100,0
	Terciaria	17,8	48,2	22,2	7,7	4,0	0,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 65. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	6,7	12,8	9,6
Araba	6,8	11,6	9,2
Gipuzkoa	8,1	13,0	10,5
Bizkaia	5,9	13,0	9,2

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 66. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	6,7	12,8	9,6
15-24	19,1	12,4	15,6
25-34	11,2	20,9	16,0
35-44	6,6	12,6	9,6
45-54	6,4	12,8	9,6
55-64	6,0	14,1	9,9
65-74	2,1	9,8	5,7
>=75	0,8	6,4	3,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 67. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	6,8	12,8	9,7
I	9,0	12,0	10,5
II	9,4	14,1	11,7
III	7,7	13,8	10,4
IV	6,0	12,5	9,5
V	3,2	12,3	6,4

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 68. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	6,7	12,8	9,6
Sin estudios, primaria	1,1	8,4	3,9
Secundaria inferior	5,2	11,4	8,3
Secundaria superior	6,9	14,0	10,7
Terciaria	10,5	13,6	11,9

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 69. Distribución del índice de masa corporal por sexo y territorio histórico

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	CAPV	25,0	4,6	24,0	21,6	27,4
	Araba	25,3	5,1	24,5	22,3	27,3
	Gipuzkoa	24,6	4,0	23,9	21,4	27,1
	Bizkaia	25,1	4,8	24,1	21,6	27,8
Hombres	CAPV	26,0	4,0	25,4	23,4	28,1
	Araba	26,4	4,5	26,0	23,9	28,4
	Gipuzkoa	25,7	4,0	25,1	23,0	27,8
	Bizkaia	26,0	3,9	25,5	23,5	28,0
Ambos sexos	CAPV	25,5	4,4	24,8	22,5	27,8
	Araba	25,8	4,9	25,2	22,9	27,9
	Gipuzkoa	25,2	4,1	24,5	22,2	27,4
	Bizkaia	25,5	4,4	24,9	22,5	27,9

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 70. Distribución del índice de masa corporal por sexo y edad

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	25,0	4,6	24,0	21,6	27,4
	15-24	22,3	4,0	21,8	20,2	23,6
	25-34	24,0	5,5	22,9	20,6	26,0
	35-44	25,0	5,5	23,6	21,4	27,5
	45-54	25,0	4,9	24,1	21,9	27,0
	55-64	25,4	4,1	24,6	22,0	27,9
	65-74	25,9	3,8	25,4	22,8	28,3
	>=75	26,0	3,8	25,4	23,0	28,6
Hombres	Total	26,0	4,0	25,4	23,4	28,1
	15-24	23,2	4,1	22,3	20,8	24,8
	25-34	24,6	4,0	24,2	22,5	26,3
	35-44	25,9	4,8	25,0	23,3	27,4
	45-54	26,9	4,1	26,1	24,2	29,0
	55-64	26,8	3,7	26,3	24,4	28,7
	65-74	27,1	3,2	26,7	24,4	29,3
	>=75	26,6	3,0	26,2	24,2	28,7
Ambos sexos	Total	25,5	4,4	24,8	22,5	27,8
	15-24	22,7	4,1	22,0	20,5	24,2
	25-34	24,3	4,8	23,7	21,7	26,1
	35-44	25,5	5,2	24,7	22,4	27,4
	45-54	25,9	4,6	25,2	23,0	28,1
	55-64	26,1	4,0	25,5	23,1	28,3
	65-74	26,4	3,6	26,0	23,6	28,7
	>=75	26,2	3,5	25,9	23,4	28,6

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 71. Distribución del índice de masa corporal por sexo y clase social

		Desviación			Percentil	Percentil
		Media	estándar	Mediana	25	75
Mujeres	Total	25,0	4,6	24,0	21,6	27,4
	I	23,7	4,7	22,9	21,0	25,2
	II	24,2	4,1	23,6	21,3	26,2
	III	24,4	4,3	23,7	21,4	26,7
	IV	25,5	4,6	24,7	22,2	28,1
	V	26,1	4,7	25,7	22,5	29,4
Hombres	Total	26,0	4,0	25,4	23,4	28,1
	I	25,2	3,8	24,7	22,8	27,0
	II	25,1	3,7	24,7	23,0	27,0
	III	25,9	4,1	25,3	23,5	27,8
	IV	26,5	4,1	26,0	23,8	28,7
	V	26,1	4,0	25,6	23,3	28,3
Ambos sexos	Total	25,5	4,4	24,8	22,5	27,8
	I	24,4	4,3	23,7	21,7	26,3
	II	24,7	4,0	24,3	22,1	26,6
	III	25,1	4,3	24,5	22,3	27,3
	IV	26,1	4,4	25,4	23,1	28,4
	V	26,1	4,4	25,6	22,8	29,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 72. Distribución del índice de masa corporal por sexo y nivel de estudios

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	25,0	4,6	24,0	21,6	27,4
	Sin estudios, primaria	26,2	4,3	25,7	22,9	29,1
	Secundaria inferior	25,8	4,3	25,1	22,3	28,7
	Secundaria superior	24,7	4,7	23,8	21,6	27,0
	Terciaria	24,1	4,6	23,3	20,9	25,8
Hombres	Total	26,0	4,0	25,4	23,4	28,1
	Sin estudios, primaria	26,6	3,7	26,6	23,7	29,3
	Secundaria inferior	26,3	4,2	25,9	23,5	28,7
	Secundaria superior	26,1	4,1	25,6	23,5	28,1
	Terciaria	25,2	3,8	24,6	23,0	26,9
Ambos sexos	Total	25,5	4,4	24,8	22,5	27,8
	Sin estudios, primaria	26,4	4,1	26,1	23,1	29,3
	Secundaria inferior	26,0	4,3	25,5	22,8	28,7
	Secundaria superior	25,5	4,4	24,8	22,5	27,5
	Terciaria	24,6	4,3	23,9	21,9	26,4

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 73. Distribución de la población (%) según su índice de masa corporal por sexo y territorio histórico

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Mujeres	Total	3,4	56,0	27,3	13,3	100,0
	Araba	2,7	53,8	29,2	14,3	100,0
	Gipuzkoa	2,6	59,5	26,8	11,1	100,0
	Bizkaia	4,1	54,5	27,1	14,4	100,0
Hombres	Total	0,8	44,0	41,0	14,2	100,0
	Araba	0,9	37,4	46,4	15,3	100,0
	Gipuzkoa	0,7	48,9	36,4	14,0	100,0
	Bizkaia	0,9	42,7	42,4	14,0	100,0
Ambos sexos	Total	2,2	50,2	33,9	13,7	100,0
	Araba	1,8	45,8	37,6	14,8	100,0
	Gipuzkoa	1,7	54,3	31,5	12,5	100,0
	Bizkaia	2,6	48,9	34,3	14,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 74. Distribución de la población (%) según su índice de masa corporal por sexo y edad

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Mujeres	Total	3,4	56,0	27,3	13,3	100,0
	15-24	9,2	74,9	13,5	2,5	100,0
	25-34	3,7	66,7	19,6	9,9	100,0
	35-44	3,7	56,7	22,2	17,4	100,0
	45-54	2,7	57,7	27,2	12,4	100,0
	55-64	1,9	54,2	30,4	13,5	100,0
	65-74	2,1	44,8	36,2	16,9	100,0
	>=75	2,7	45,1	35,6	16,6	100,0
	Hombres	Total	0,8	44,0	41,0	14,2
15-24		5,5	71,5	16,6	6,4	100,0
25-34		0,3	60,3	33,9	5,6	100,0
35-44		0,2	49,4	36,9	13,4	100,0
45-54		0,3	35,2	45,8	18,8	100,0
55-64		0,3	34,0	50,3	15,4	100,0
65-74		.	31,6	48,3	20,1	100,0
>=75		0,3	34,7	49,2	15,8	100,0
Ambos sexos		Total	2,2	50,2	33,9	13,7
	15-24	7,3	73,1	15,1	4,5	100,0
	25-34	2,0	63,5	26,8	7,7	100,0
	35-44	2,0	53,1	29,6	15,4	100,0
	45-54	1,5	46,4	36,5	15,6	100,0
	55-64	1,1	44,4	40,0	14,4	100,0
	65-74	1,1	38,7	41,8	18,4	100,0
	>=75	1,7	41,0	40,9	16,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 75. Distribución de la población (%) según su índice de masa corporal por sexo y clase social

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Mujeres	Total	3,4	55,9	27,4	13,3	100,0
	I	2,8	71,1	18,5	7,6	100,0
	II	3,3	60,4	27,8	8,5	100,0
	III	3,6	60,8	26,0	9,6	100,0
	IV	2,8	51,0	30,4	15,8	100,0
	V	5,0	42,2	31,3	21,5	100,0
Hombres	Total	0,9	43,9	41,1	14,1	100,0
	I	0,2	56,3	33,9	9,6	100,0
	II	1,6	53,0	36,2	9,2	100,0
	III	1,7	44,5	40,3	13,5	100,0
	IV	0,7	37,0	45,3	17,0	100,0
	V	0,2	43,6	40,8	15,5	100,0
Ambos sexos	Total	2,2	50,2	34,0	13,7	100,0
	I	1,5	63,7	26,1	8,6	100,0
	II	2,5	56,8	31,9	8,8	100,0
	III	2,7	53,5	32,4	11,3	100,0
	IV	1,7	43,5	38,4	16,4	100,0
	V	3,3	42,7	34,6	19,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 76. Distribución de la población (%) según su índice de masa corporal por sexo y nivel de estudios

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Mujeres	Total	3,4	56,0	27,3	13,3	100,0
	Sin estudios, primaria	4,0	42,0	34,7	19,3	100,0
	Secundaria inferior	3,3	46,6	31,4	18,7	100,0
	Secundaria superior	3,1	60,0	25,9	11,0	100,0
	Terciaria	3,6	64,7	22,3	9,4	100,0
Hombres	Total	0,9	44,0	41,0	14,2	100,0
	Sin estudios, primaria	1,7	33,6	48,6	16,1	100,0
	Secundaria inferior	1,4	39,0	41,1	18,6	100,0
	Secundaria superior	0,8	41,5	43,0	14,7	100,0
	Terciaria	0,1	56,6	34,2	9,1	100,0
Ambos sexos	Total	2,2	50,2	33,9	13,7	100,0
	Sin estudios, primaria	3,1	38,7	40,0	18,1	100,0
	Secundaria inferior	2,4	42,9	36,1	18,6	100,0
	Secundaria superior	1,9	50,2	35,0	12,9	100,0
	Terciaria	2,0	61,1	27,6	9,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 77. Prevalencia (%) de obesidad (IMC>30) por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	13,3	14,2	13,7
Araba	14,3	15,3	14,8
Gipuzkoa	11,1	14,0	12,5
Bizkaia	14,4	14,0	14,2

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 78. Prevalencia (%) de obesidad (IMC>30) por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	13,3	14,2	13,7
15-24	2,5	6,4	4,5
25-34	9,9	5,6	7,7
35-44	17,4	13,4	15,4
45-54	12,4	18,8	15,6
55-64	13,5	15,4	14,4
65-74	16,9	20,1	18,4
>=75	16,6	15,8	16,3

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 79. Prevalencia (%) de obesidad (IMC>30) por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	13,3	14,1	13,7
I	7,6	9,6	8,6
II	8,5	9,2	8,8
III	9,6	13,5	11,3
IV	15,8	17,0	16,4
V	21,5	15,5	19,4

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 80. Prevalencia (%) de obesidad (IMC>30) por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	13,3	14,2	13,7
Sin estudios, primaria	19,3	16,1	18,1
Secundaria inferior	18,7	18,6	18,6
Secundaria superior	11,0	14,7	12,9
Terciaria	9,4	9,1	9,2

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 81. Distribución de la población (%) según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo y territorio histórico

		Baja	Moderada	Alta	Total
Mujeres	Total	20,6	48,7	30,7	100,0
	Araba	14,2	46,0	39,8	100,0
	Gipuzkoa	16,9	46,3	36,8	100,0
	Bizkaia	24,5	50,9	24,6	100,0
Hombres	Total	15,1	39,6	45,3	100,0
	Araba	15,0	31,9	53,1	100,0
	Gipuzkoa	12,5	37,7	49,8	100,0
	Bizkaia	16,8	43,0	40,2	100,0
Ambos sexos	Total	18,0	44,3	37,7	100,0
	Araba	14,6	39,1	46,4	100,0
	Gipuzkoa	14,8	42,1	43,1	100,0
	Bizkaia	20,9	47,1	32,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 82. Distribución de la población (%) según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo y edad

		Baja	Moderada	Alta	Total
Mujeres	Total	20,6	48,7	30,7	100,0
	15-24	11,1	42,4	46,5	100,0
	25-34	9,6	43,9	46,5	100,0
	35-44	17,1	42,7	40,2	100,0
	45-54	16,8	53,1	30,1	100,0
	55-64	18,9	49,8	31,3	100,0
	65-74	21,7	59,3	19,0	100,0
	>=75	43,0	46,4	10,5	100,0
	Hombres	Total	15,1	39,6	45,3
15-24		8,7	24,3	67,1	100,0
25-34		8,4	30,5	61,1	100,0
35-44		14,4	33,4	52,2	100,0
45-54		17,3	39,9	42,8	100,0
55-64		17,7	41,3	41,0	100,0
65-74		10,6	54,8	34,6	100,0
>=75		27,7	54,0	18,3	100,0
Ambos sexos		Total	18,0	44,3	37,7
	15-24	9,8	33,1	57,1	100,0
	25-34	9,0	37,1	53,8	100,0
	35-44	15,8	38,0	46,2	100,0
	45-54	17,0	46,5	36,5	100,0
	55-64	18,3	45,7	36,0	100,0
	65-74	16,5	57,2	26,3	100,0
	>=75	37,0	49,4	13,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 83. Distribución de la población (%) según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo y clase social

		Baja	Moderada	Alta	Total
Mujeres	Total	20,6	48,8	30,6	100,0
	I	10,3	50,9	38,8	100,0
	II	14,5	44,3	41,3	100,0
	III	17,7	53,8	28,5	100,0
	IV	26,6	45,4	28,0	100,0
	V	25,6	49,7	24,7	100,0
Hombres	Total	15,1	39,6	45,3	100,0
	I	13,4	39,3	47,3	100,0
	II	8,3	44,1	47,5	100,0
	III	15,2	41,3	43,5	100,0
	IV	17,4	38,4	44,3	100,0
	V	14,6	37,4	47,9	100,0
Ambos sexos	Total	18,0	44,3	37,7	100,0
	I	11,8	45,1	43,0	100,0
	II	11,5	44,2	44,3	100,0
	III	16,6	48,3	35,2	100,0
	IV	21,6	41,6	36,7	100,0
	V	21,7	45,3	33,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 84. Distribución de la población (%) según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo y nivel de estudios

		Baja	Moderada	Alta	Total
Mujeres	Total	20,6	48,7	30,7	100,0
	Sin estudios, primaria	36,7	48,3	15,0	100,0
	Secundaria inferior	26,5	52,9	20,6	100,0
	Secundaria superior	16,7	47,0	36,3	100,0
	Terciaria	13,0	48,1	38,9	100,0
Hombres	Total	15,1	39,6	45,3	100,0
	Sin estudios, primaria	19,1	42,1	38,8	100,0
	Secundaria inferior	19,6	43,7	36,7	100,0
	Secundaria superior	14,4	37,0	48,5	100,0
	Terciaria	11,0	39,7	49,4	100,0
Ambos sexos	Total	18,0	44,3	37,7	100,0
	Sin estudios, primaria	29,9	45,9	24,2	100,0
	Secundaria inferior	23,1	48,4	28,5	100,0
	Secundaria superior	15,5	41,7	42,8	100,0
	Terciaria	12,1	44,3	43,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 85. Prevalencia (%) de población que realiza actividad física saludable por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	79,4	84,9	82,0
Araba	85,8	85,0	85,4
Gipuzkoa	83,1	87,5	85,2
Bizkaia	75,5	83,2	79,1

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 86. Prevalencia (%) de población que realiza actividad física saludable por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	79,4	84,9	82,0
15-24	88,9	91,3	90,2
25-34	90,4	91,6	91,0
35-44	82,9	85,6	84,2
45-54	83,2	82,7	83,0
55-64	81,1	82,3	81,7
65-74	78,3	89,4	83,5
>=75	57,0	72,3	63,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 87. Prevalencia (%) de población que realiza actividad física saludable por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	79,4	84,9	82,0
I	89,7	86,6	88,2
II	85,5	91,7	88,5
III	82,3	84,8	83,4
IV	73,4	82,6	78,4
V	74,4	85,4	78,3

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 88. Prevalencia (%) de población que realiza actividad física saludable por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	79,4	84,9	82,0
Sin estudios, primaria	63,3	80,9	70,1
Secundaria inferior	73,5	80,4	76,9
Secundaria superior	83,3	85,6	84,5
Terciaria	87,0	89,0	87,9

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 89. Prevalencia (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	40,9	50,1	45,3
Araba	35,6	50,8	43,1
Gipuzkoa	47,2	52,5	49,8
Bizkaia	38,6	48,3	43,2

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 90. Prevalencia (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	40,9	50,1	45,3
15-24	40,1	67,9	54,4
25-34	37,5	57,0	47,3
35-44	33,0	37,2	35,1
45-54	36,6	38,7	37,7
55-64	44,8	45,0	44,9
65-74	51,3	66,1	58,2
>=75	43,1	52,4	46,8

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 91. Prevalencia (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	40,8	50,1	45,3
I	40,7	54,7	47,7
II	42,7	53,3	47,8
III	42,3	49,6	45,5
IV	39,2	48,7	44,3
V	41,3	46,3	43,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 92. Prevalencia (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	40,9	50,0	45,3
Sin estudios, primaria	45,9	59,8	51,3
Secundaria inferior	38,4	45,3	41,8
Secundaria superior	41,1	48,5	45,1
Terciaria	39,8	52,4	45,4

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 93. Distribución de la población (%) según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo y territorio histórico

		Por falta de tiempo debido al trabajo o a los estudios	Por obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	
Mujeres	Total	24,7	14,6	20,9	30,1	
	Araba	26,9	19,6	20,6	23,5	
	Gipuzkoa	22,8	17,3	19,5	27,7	
	Bizkaia	25,1	11,9	21,8	33,1	
Hombres	Total	32,5	11,4	19,5	27,4	
	Araba	32,4	16,2	21,9	18,7	
	Gipuzkoa	32,1	13,4	20,6	21,3	
	Bizkaia	32,8	8,8	18,1	33,2	
Ambos sexos	Total	28,2	13,2	20,3	28,9	
	Araba	29,2	18,2	21,1	21,5	
	Gipuzkoa	27,1	15,5	20,0	24,7	
	Bizkaia	28,4	10,6	20,2	33,2	

		Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Mujeres	Total	1,1	1,6	1,1	5,9	100,0
	Araba	1,2	2,3	1,2	4,7	100,0
	Gipuzkoa	1,6	0,9	0,5	9,8	100,0
	Bizkaia	0,7	1,8	1,3	4,2	100,0
Hombres	Total	0,7	1,2	1,9	5,4	100,0
	Araba	0,5	2,6	1,8	5,9	100,0
	Gipuzkoa	1,5	1,1	2,3	7,7	100,0
	Bizkaia	0,3	1,0	1,8	4,0	100,0
Ambos sexos	Total	0,9	1,5	1,4	5,7	100,0
	Araba	0,9	2,4	1,4	5,2	100,0
	Gipuzkoa	1,5	1,0	1,4	8,8	100,0
	Bizkaia	0,5	1,5	1,5	4,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 94. Distribución de la población (%) según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo y edad

		Por falta de tiempo debido al trabajo o a los estudios	Por obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Mujeres	Total	24,7	14,6	20,9	30,1	1,1	1,6	1,1	5,9	100,0
	15-24	39,2	0,5	1,9	45,3	3,9	1,1	2,5	5,7	100,0
	25-34	42,2	14,5	2,6	33,3	0,8	1,4	1,4	3,9	100,0
	35-44	31,5	32,2	6,3	17,0	.	4,9	1,6	6,6	100,0
	45-54	33,3	19,4	12,7	27,6	0,7	1,5	0,4	4,3	100,0
	55-64	23,9	12,8	17,5	37,8	0,8	.	1,6	5,6	100,0
	65-74	2,7	9,2	35,2	41,4	2,6	2,0	0,3	6,5	100,0
	>=75	0,2	4,5	68,3	18,4	.	.	.	8,6	100,0
Hombres	Total	32,5	11,4	19,5	27,4	0,7	1,2	1,9	5,4	100,0
	15-24	54,1	.	7,2	31,3	0,8	.	0,6	6,0	100,0
	25-34	36,1	12,7	8,7	31,0	0,5	3,4	.	7,6	100,0
	35-44	42,9	19,6	5,5	22,7	0,4	2,6	2,5	3,8	100,0
	45-54	38,9	14,7	11,9	24,8	1,3	0,6	4,0	3,7	100,0
	55-64	32,3	6,6	24,7	27,2	1,0	1,0	2,4	4,8	100,0
	65-74	4,0	7,3	35,5	46,3	.	.	.	6,9	100,0
	>=75	1,7	6,2	61,4	20,5	.	0,3	.	10,0	100,0
Ambos sexos	Total	28,2	13,2	20,3	28,9	0,9	1,5	1,4	5,7	100,0
	15-24	44,6	0,3	3,8	40,2	2,8	0,7	1,8	5,8	100,0
	25-34	39,7	13,7	5,1	32,4	0,7	2,3	0,8	5,4	100,0
	35-44	37,0	26,1	5,9	19,8	0,2	3,8	2,0	5,3	100,0
	45-54	36,1	17,1	12,3	26,2	1,0	1,1	2,2	4,0	100,0
	55-64	28,0	9,8	21,0	32,7	0,9	0,5	2,0	5,2	100,0
	65-74	3,2	8,5	35,3	43,3	1,6	1,2	0,2	6,7	100,0
	>=75	0,7	5,1	65,9	19,1	.	0,1	.	9,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 95. Distribución de la población (%) según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo y clase social

		Por falta de tiempo debido al trabajo o a los estudios	Por obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Mujeres	Total	24,8	14,7	20,9	30,0	1,1	1,6	1,1	5,8	100,0
	I	41,8	18,8	7,6	26,2	0,6	1,1	.	3,8	100,0
	II	33,7	16,7	12,2	24,8	2,7	4,1	.	5,8	100,0
	III	24,4	19,8	18,3	30,5	.	1,2	.	5,9	100,0
	IV	17,9	11,0	25,6	35,1	1,6	0,7	2,2	5,9	100,0
	V	18,7	10,8	32,0	25,0	0,8	3,4	1,6	7,7	100,0
Hombres	Total	32,5	11,4	19,4	27,4	0,7	1,3	1,9	5,4	100,0
	I	45,6	15,1	11,0	21,9	.	0,4	.	6,0	100,0
	II	30,5	15,1	12,5	31,1	3,4	0,3	2,4	4,6	100,0
	III	35,1	13,7	14,9	27,6	.	2,1	0,9	5,7	100,0
	IV	28,9	9,9	24,0	28,0	0,7	1,4	2,3	4,8	100,0
	V	25,9	4,5	26,6	29,4	0,7	1,0	4,3	7,6	100,0
Ambos sexos	Total	28,2	13,2	20,2	28,9	0,9	1,5	1,4	5,7	100,0
	I	43,5	17,2	9,1	24,3	0,3	0,8	.	4,7	100,0
	II	32,3	16,0	12,3	27,6	3,0	2,4	1,0	5,3	100,0
	III	28,8	17,3	16,9	29,3	.	1,6	0,4	5,8	100,0
	IV	23,3	10,5	24,8	31,6	1,2	1,1	2,3	5,3	100,0
	V	21,2	8,7	30,2	26,5	0,7	2,6	2,5	7,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 96. Distribución de la población (%) según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo y nivel de estudios

		Por falta de tiempo debido al trabajo o a los estudios	Por obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	
Mujeres	Total	24,7	14,6	21,0	30,0	
	Sin estudios, primaria	6,9	4,2	54,7	22,3	
	Secundaria inferior	15,9	6,2	31,0	36,6	
	Secundaria superior	27,4	18,0	12,8	31,0	
	Terciaria	36,1	21,3	7,9	28,0	
Hombres	Total	32,5	11,4	19,5	27,4	
	Sin estudios, primaria	13,4	7,6	40,6	18,6	
	Secundaria inferior	24,8	8,1	28,6	30,3	
	Secundaria superior	33,4	10,1	17,6	30,0	
	Terciaria	44,7	18,1	7,0	22,7	
Ambos sexos	Total	28,2	13,2	20,3	28,9	
	Sin estudios, primaria	8,9	5,3	50,2	21,1	
	Secundaria inferior	20,0	7,1	29,9	33,7	
	Secundaria superior	30,4	14,1	15,2	30,5	
	Terciaria	39,4	20,1	7,6	26,0	

		Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Mujeres	Total	1,1	1,6	1,1	5,9	100,0
	Sin estudios, primaria	0,7	0,8	.	10,4	100,0
	Secundaria inferior	0,6	1,4	2,5	5,8	100,0
	Secundaria superior	1,4	2,4	1,0	6,0	100,0
	Terciaria	1,1	1,3	0,7	3,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 96. Distribución de la población (%) según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo y nivel de estudios

		Porque no dispongo de un lugar adecuado	Por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Hombres	Total	0,7	1,2	1,9	5,4	100,0
	Sin estudios, primaria	0,7	2,1	6,1	10,9	100,0
	Secundaria inferior	0,5	1,9	1,6	4,1	100,0
	Secundaria superior	0,5	0,8	1,9	5,8	100,0
	Terciaria	1,3	1,2	0,9	4,1	100,0
Ambos sexos	Total	0,9	1,5	1,4	5,7	100,0
	Sin estudios, primaria	0,7	1,2	1,9	10,6	100,0
	Secundaria inferior	0,6	1,6	2,1	5,0	100,0
	Secundaria superior	1,0	1,6	1,4	5,9	100,0
	Terciaria	1,2	1,3	0,8	3,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 97. Distribución de la población (%) según la actividad principal en el centro de trabajo o de estudios u hogar por sexo y territorio histórico

		Sentado/a la mayor parte de la jornada	De pie la mayor parte de la jornada, sin efectuar grandes desplazamientos o esfuerzos	Caminando, llevando algún peso o efectuando desplazamientos frecuentes	Realizando tareas que requieren gran esfuerzo físico	Total
Mujeres	Total	47,1	38,3	13,1	1,4	100,0
	Araba	39,9	42,1	16,1	2,0	100,0
	Gipuzkoa	36,1	48,9	13,5	1,5	100,0
	Bizkaia	55,5	31,1	12,2	1,3	100,0
Hombres	Total	45,0	34,6	17,0	3,4	100,0
	Araba	35,9	40,9	18,9	4,3	100,0
	Gipuzkoa	37,8	40,9	17,2	4,1	100,0
	Bizkaia	52,2	28,9	16,4	2,6	100,0
Ambos sexos	Total	46,1	36,5	15,0	2,4	100,0
	Araba	37,9	41,5	17,5	3,1	100,0
	Gipuzkoa	37,0	45,0	15,3	2,8	100,0
	Bizkaia	53,9	30,0	14,1	1,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 98. Distribución de la población (%) según la actividad principal en el centro de trabajo o de estudios u hogar por sexo y edad

		Sentado/a la mayor parte de la jornada	De pie la mayor parte de la jornada, sin efectuar grandes desplazamientos o esfuerzos	Caminando, llevando algún peso o efectuando desplazamientos frecuentes	Realizando tareas que requieren gran esfuerzo físico	Total
Mujeres	Total	47,1	38,3	13,1	1,4	100,0
	15-24	76,8	12,3	10,2	0,6	100,0
	25-34	40,9	40,4	16,5	2,2	100,0
	35-44	42,5	38,4	17,2	1,9	100,0
	45-54	42,6	39,9	14,9	2,6	100,0
	55-64	36,3	49,2	12,5	1,9	100,0
	65-74	34,7	50,3	14,8	0,3	100,0
	>=75	64,4	29,8	5,8	.	100,0
Hombres	Total	45,0	34,6	17,0	3,4	100,0
	15-24	63,6	22,8	11,1	2,5	100,0
	25-34	43,9	38,5	14,8	2,7	100,0
	35-44	35,0	35,3	23,8	5,8	100,0
	45-54	39,6	34,0	21,0	5,3	100,0
	55-64	42,1	34,5	19,5	3,9	100,0
	65-74	42,6	44,4	12,9	0,1	100,0
	>=75	59,4	32,1	8,3	0,3	100,0
Ambos sexos	Total	46,1	36,5	15,0	2,4	100,0
	15-24	70,1	17,6	10,7	1,6	100,0
	25-34	42,4	39,5	15,7	2,5	100,0
	35-44	38,8	36,9	20,5	3,9	100,0
	45-54	41,1	36,9	18,0	4,0	100,0
	55-64	39,1	42,1	15,9	2,9	100,0
	65-74	38,4	47,5	13,9	0,2	100,0
	>=75	62,4	30,7	6,8	0,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 99. Distribución de la población (%) según la actividad principal en el centro de trabajo o de estudios u hogar por sexo y clase social

		Sentado/a la mayor parte de la jornada	De pie la mayor parte de la jornada, sin efectuar grandes desplazamientos o esfuerzos	Caminando, llevando algún peso o efectuando desplazamientos frecuentes	Realizando tareas que requieren gran esfuerzo físico	Total
Mujeres	Total	47,2	38,4	13,0	1,4	100,0
	I	60,2	33,3	6,1	0,4	100,0
	II	43,0	41,7	14,4	0,9	100,0
	III	55,7	33,0	10,1	1,1	100,0
	IV	41,5	40,3	16,1	2,1	100,0
	V	36,4	45,0	16,8	1,9	100,0
Hombres	Total	45,1	34,5	17,0	3,4	100,0
	I	60,2	29,2	9,4	1,2	100,0
	II	53,9	30,7	12,9	2,5	100,0
	III	48,7	30,9	17,6	2,8	100,0
	IV	38,2	38,5	19,5	3,8	100,0
	V	33,2	36,9	22,6	7,3	100,0
Ambos sexos	Total	46,2	36,5	15,0	2,4	100,0
	I	60,2	31,3	7,7	0,8	100,0
	II	48,3	36,4	13,7	1,7	100,0
	III	52,6	32,1	13,4	1,9	100,0
	IV	39,7	39,3	17,9	3,0	100,0
	V	35,3	42,1	18,8	3,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 100. Distribución de la población (%) según la actividad principal en el centro de trabajo o de estudios u hogar por sexo y nivel de estudios

		Sentado/a la mayor parte de la jornada	De pie la mayor parte de la jornada, sin efectuar grandes desplazamientos o esfuerzos	Caminando, llevando algún peso o efectuando desplazamientos frecuentes	Realizando tareas que requieren gran esfuerzo físico	Total
Mujeres	Total	47,1	38,3	13,1	1,4	100,0
	Sin estudios, primaria	52,8	40,7	6,2	0,3	100,0
	Secundaria inferior	44,3	38,3	15,4	2,0	100,0
	Secundaria superior	41,1	39,6	17,1	2,3	100,0
	Terciaria	53,6	35,5	10,3	0,7	100,0
Hombres	Total	45,0	34,6	17,0	3,4	100,0
	Sin estudios, primaria	40,0	40,6	15,3	4,1	100,0
	Secundaria inferior	47,9	29,5	18,6	4,0	100,0
	Secundaria superior	38,4	37,9	19,9	3,8	100,0
	Terciaria	56,0	30,8	11,4	1,8	100,0
Ambos sexos	Total	46,1	36,5	15,0	2,4	100,0
	Sin estudios, primaria	47,9	40,7	9,7	1,8	100,0
	Secundaria inferior	46,0	34,0	17,0	3,0	100,0
	Secundaria superior	39,7	38,7	18,6	3,1	100,0
	Terciaria	54,6	33,4	10,8	1,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 101. Distribución de las horas de sueño en días laborables por sexo y territorio histórico

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	CAPV	7,1	1,3	7,0	6,0	8,0
	Araba	6,9	1,5	7,0	6,0	8,0
	Gipuzkoa	7,3	1,1	7,0	7,0	8,0
	Bizkaia	7,0	1,4	7,0	6,0	8,0
Hombres	CAPV	7,2	1,2	7,0	7,0	8,0
	Araba	7,0	1,5	7,0	6,0	8,0
	Gipuzkoa	7,3	1,1	7,0	7,0	8,0
	Bizkaia	7,2	1,2	7,0	6,0	8,0
Ambos sexos	CAPV	7,1	1,3	7,0	6,0	8,0
	Araba	7,0	1,5	7,0	6,0	8,0
	Gipuzkoa	7,3	1,1	7,0	7,0	8,0
	Bizkaia	7,1	1,3	7,0	6,0	8,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 102. Distribución de las horas de sueño en días laborables por sexo y edad

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	7,1	1,3	7,0	6,0	8,0
	15-24	7,4	1,4	8,0	7,0	8,0
	25-34	7,3	1,3	7,0	7,0	8,0
	35-44	7,1	1,2	7,0	6,0	8,0
	45-54	7,0	1,1	7,0	6,0	8,0
	55-64	6,9	1,0	7,0	6,0	8,0
	65-74	6,9	1,2	7,0	6,0	8,0
	>=75	7,3	1,7	7,0	6,0	8,0
Hombres	Total	7,2	1,2	7,0	7,0	8,0
	15-24	7,4	1,4	8,0	7,0	8,0
	25-34	7,3	1,3	7,0	7,0	8,0
	35-44	7,1	1,1	7,0	7,0	8,0
	45-54	7,0	1,1	7,0	6,0	8,0
	55-64	7,0	1,1	7,0	6,0	8,0
	65-74	7,3	1,1	7,0	7,0	8,0
	>=75	7,5	1,4	8,0	7,0	8,0
Ambos sexos	Total	7,1	1,3	7,0	6,0	8,0
	15-24	7,4	1,4	8,0	7,0	8,0
	25-34	7,3	1,3	7,0	7,0	8,0
	35-44	7,1	1,2	7,0	6,0	8,0
	45-54	7,0	1,1	7,0	6,0	8,0
	55-64	7,0	1,1	7,0	6,0	8,0
	65-74	7,1	1,2	7,0	6,0	8,0
	>=75	7,4	1,6	7,0	6,0	8,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 103. Distribución de las horas de sueño en días laborables por sexo y clase social

		Desviación			Percentil	Percentil
		Media	estándar	Mediana	25	75
Mujeres	Total	7,1	1,3	7,0	6,0	8,0
	I	7,1	1,1	7,0	7,0	8,0
	II	7,2	1,1	7,0	7,0	8,0
	III	7,1	1,2	7,0	7,0	8,0
	IV	7,1	1,4	7,0	6,0	8,0
	V	7,0	1,4	7,0	6,0	8,0
Hombres	Total	7,2	1,2	7,0	7,0	8,0
	I	7,2	1,1	7,0	7,0	8,0
	II	7,2	1,1	7,0	7,0	8,0
	III	7,3	1,3	7,0	7,0	8,0
	IV	7,1	1,2	7,0	6,0	8,0
	V	7,2	1,4	7,0	6,0	8,0
Ambos sexos	Total	7,1	1,3	7,0	6,0	8,0
	I	7,2	1,1	7,0	7,0	8,0
	II	7,2	1,1	7,0	7,0	8,0
	III	7,2	1,2	7,0	7,0	8,0
	IV	7,1	1,3	7,0	6,0	8,0
	V	7,1	1,4	7,0	6,0	8,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 104. Distribución de las horas de sueño en días laborables por sexo y nivel de estudios

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	7,1	1,3	7,0	6,0	8,0
	Sin estudios, primaria	7,3	1,7	7,0	6,0	8,0
	Secundaria inferior	7,0	1,3	7,0	6,0	8,0
	Secundaria superior	7,1	1,2	7,0	6,0	8,0
	Terciaria	7,1	1,1	7,0	7,0	8,0
Hombres	Total	7,2	1,2	7,0	7,0	8,0
	Sin estudios, primaria	7,3	1,3	7,0	7,0	8,0
	Secundaria inferior	7,3	1,3	7,0	6,0	8,0
	Secundaria superior	7,1	1,2	7,0	7,0	8,0
	Terciaria	7,2	1,2	7,0	7,0	8,0
Ambos sexos	Total	7,1	1,3	7,0	6,0	8,0
	Sin estudios, primaria	7,3	1,5	7,0	6,0	8,0
	Secundaria inferior	7,1	1,3	7,0	6,0	8,0
	Secundaria superior	7,1	1,2	7,0	6,0	8,0
	Terciaria	7,1	1,1	7,0	7,0	8,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 105. Distribución de las horas de sueño en días festivos por sexo y territorio histórico

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	CAPV	7,6	1,6	8,0	7,0	8,0
	Araba	7,3	1,9	8,0	6,0	8,0
	Gipuzkoa	7,8	1,3	8,0	7,0	9,0
	Bizkaia	7,5	1,6	8,0	7,0	8,0
Hombres	CAPV	7,8	1,5	8,0	7,0	8,0
	Araba	7,5	1,8	8,0	7,0	8,0
	Gipuzkoa	7,9	1,3	8,0	7,0	9,0
	Bizkaia	7,8	1,5	8,0	7,0	8,0
Ambos sexos	CAPV	7,7	1,5	8,0	7,0	8,0
	Araba	7,4	1,8	8,0	7,0	8,0
	Gipuzkoa	7,9	1,3	8,0	7,0	9,0
	Bizkaia	7,6	1,5	8,0	7,0	8,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 106. Distribución de las horas de sueño en días festivos por sexo y edad

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	7,6	1,6	8,0	7,0	8,0
	15-24	8,7	1,7	9,0	8,0	10,0
	25-34	7,9	1,8	8,0	7,0	9,0
	35-44	7,6	1,6	8,0	7,0	8,0
	45-54	7,6	1,4	8,0	7,0	8,0
	55-64	7,4	1,2	8,0	7,0	8,0
	65-74	7,0	1,3	7,0	6,0	8,0
	>=75	7,4	1,7	7,0	6,0	8,0
Hombres	Total	7,8	1,5	8,0	7,0	8,0
	15-24	8,5	2,0	9,0	8,0	9,0
	25-34	8,1	2,0	8,0	7,0	9,0
	35-44	7,9	1,3	8,0	7,0	8,0
	45-54	7,7	1,3	8,0	7,0	8,0
	55-64	7,5	1,3	8,0	7,0	8,0
	65-74	7,4	1,1	7,0	7,0	8,0
	>=75	7,6	1,5	8,0	7,0	8,0
Ambos sexos	Total	7,7	1,5	8,0	7,0	8,0
	15-24	8,6	1,9	9,0	8,0	10,0
	25-34	8,0	1,9	8,0	7,0	9,0
	35-44	7,7	1,5	8,0	7,0	8,0
	45-54	7,6	1,3	8,0	7,0	8,0
	55-64	7,4	1,2	8,0	7,0	8,0
	65-74	7,2	1,2	7,0	6,0	8,0
	>=75	7,4	1,6	7,0	6,0	8,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 107. Distribución de las horas de sueño en días festivos por sexo y clase social

		Desviación			Percentil	Percentil
		Media	estándar	Mediana	25	75
Mujeres	Total	7,6	1,6	8,0	7,0	8,0
	I	7,9	1,2	8,0	7,0	9,0
	II	7,8	1,4	8,0	7,0	8,0
	III	7,6	1,4	8,0	7,0	8,0
	IV	7,4	1,7	8,0	6,0	8,0
	V	7,4	1,6	8,0	6,0	8,0
Hombres	Total	7,8	1,5	8,0	7,0	8,0
	I	7,9	1,3	8,0	7,0	9,0
	II	7,8	1,4	8,0	7,0	8,0
	III	7,9	1,5	8,0	7,0	9,0
	IV	7,6	1,5	8,0	7,0	8,0
	V	7,9	1,6	8,0	7,0	9,0
Ambos sexos	Total	7,7	1,5	8,0	7,0	8,0
	I	7,9	1,3	8,0	7,0	9,0
	II	7,8	1,4	8,0	7,0	8,0
	III	7,7	1,5	8,0	7,0	8,0
	IV	7,5	1,6	8,0	7,0	8,0
	V	7,6	1,6	8,0	7,0	8,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 108. Distribución de las horas de sueño en días festivos por sexo y nivel de estudios

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	7,6	1,6	8,0	7,0	8,0
	Sin estudios, primaria	7,4	1,8	7,0	6,0	8,0
	Secundaria inferior	7,4	1,6	7,0	6,0	8,0
	Secundaria superior	7,6	1,6	8,0	7,0	8,0
	Terciaria	7,8	1,3	8,0	7,0	8,0
Hombres	Total	7,8	1,5	8,0	7,0	8,0
	Sin estudios, primaria	7,6	1,4	8,0	7,0	9,0
	Secundaria inferior	7,8	1,6	8,0	7,0	9,0
	Secundaria superior	7,8	1,4	8,0	7,0	8,0
	Terciaria	7,8	1,4	8,0	7,0	8,0
Ambos sexos	Total	7,7	1,5	8,0	7,0	8,0
	Sin estudios, primaria	7,5	1,6	8,0	6,0	8,0
	Secundaria inferior	7,6	1,6	8,0	7,0	8,0
	Secundaria superior	7,7	1,5	8,0	7,0	8,0
	Terciaria	7,8	1,3	8,0	7,0	8,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 109. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días laborables por sexo y territorio histórico

		<5	5-6	>=7	Total
		horas	horas	horas	
Mujeres	Total	2,2	26,6	71,2	100,0
	Araba	5,2	31,1	63,7	100,0
	Gipuzkoa	1,0	20,9	78,1	100,0
	Bizkaia	2,1	28,8	69,1	100,0
Hombres	Total	1,4	23,1	75,5	100,0
	Araba	3,4	30,8	65,8	100,0
	Gipuzkoa	0,4	18,8	80,9	100,0
	Bizkaia	1,5	23,6	74,9	100,0
Ambos sexos	Total	1,8	24,9	73,3	100,0
	Araba	4,3	31,0	64,7	100,0
	Gipuzkoa	0,7	19,9	79,4	100,0
	Bizkaia	1,8	26,3	71,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 110. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días laborables por sexo y edad

		<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Mujeres	Total	2,2	26,6	71,2	100,0
	15-24	1,9	16,3	81,8	100,0
	25-34	1,7	19,3	79,0	100,0
	35-44	2,1	25,2	72,8	100,0
	45-54	1,4	26,9	71,7	100,0
	55-64	1,5	31,0	67,4	100,0
	65-74	3,2	30,9	65,9	100,0
	>=75	3,6	30,8	65,6	100,0
Hombres	Total	1,4	23,1	75,5	100,0
	15-24	1,8	18,2	80,0	100,0
	25-34	1,4	18,9	79,6	100,0
	35-44	.	22,9	77,1	100,0
	45-54	1,1	27,9	71,0	100,0
	55-64	2,2	25,7	72,1	100,0
	65-74	1,8	21,4	76,8	100,0
	>=75	2,0	21,9	76,1	100,0
Ambos sexos	Total	1,8	24,9	73,3	100,0
	15-24	1,9	17,3	80,9	100,0
	25-34	1,5	19,1	79,3	100,0
	35-44	1,0	24,0	74,9	100,0
	45-54	1,2	27,4	71,4	100,0
	55-64	1,9	28,4	69,7	100,0
	65-74	2,6	26,5	71,0	100,0
	>=75	3,0	27,3	69,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 111. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días laborables por sexo y clase social

		<5	5-6	>=7	Total
		horas	horas	horas	
Mujeres	Total	2,2	26,6	71,2	100,0
	I	1,7	21,0	77,4	100,0
	II	0,5	24,0	75,5	100,0
	III	1,7	22,2	76,1	100,0
	IV	2,7	30,3	67,0	100,0
	V	3,4	31,8	64,8	100,0
Hombres	Total	1,4	23,1	75,5	100,0
	I	1,3	18,4	80,2	100,0
	II	0,9	18,3	80,8	100,0
	III	1,6	20,5	77,9	100,0
	IV	1,3	26,5	72,2	100,0
	V	1,9	25,9	72,2	100,0
Ambos sexos	Total	1,8	24,9	73,3	100,0
	I	1,5	19,7	78,8	100,0
	II	0,7	21,2	78,1	100,0
	III	1,7	21,4	76,9	100,0
	IV	2,0	28,2	69,8	100,0
	V	2,9	29,7	67,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 112. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días laborables por sexo y nivel de estudios

		<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Mujeres	Total	2,2	26,6	71,2	100,0
	Sin estudios, primaria	3,9	31,3	64,8	100,0
	Secundaria inferior	3,0	30,6	66,4	100,0
	Secundaria superior	1,7	25,2	73,1	100,0
	Terciaria	1,3	23,1	75,6	100,0
Hombres	Total	1,4	23,0	75,5	100,0
	Sin estudios, primaria	2,3	20,7	77,1	100,0
	Secundaria inferior	1,7	24,7	73,6	100,0
	Secundaria superior	1,6	23,0	75,3	100,0
	Terciaria	0,5	22,7	76,9	100,0
Ambos sexos	Total	1,8	24,9	73,3	100,0
	Sin estudios, primaria	3,3	27,2	69,5	100,0
	Secundaria inferior	2,4	27,7	69,9	100,0
	Secundaria superior	1,7	24,1	74,3	100,0
	Terciaria	0,9	22,9	76,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 113. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días festivos por sexo y territorio histórico

		<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Mujeres	Total	2,6	17,9	79,4	100,0
	Araba	5,7	21,7	72,7	100,0
	Gipuzkoa	1,7	11,6	86,8	100,0
	Bizkaia	2,4	20,8	76,8	100,0
Hombres	Total	1,7	12,8	85,5	100,0
	Araba	6,0	14,8	79,1	100,0
	Gipuzkoa	0,6	11,3	88,1	100,0
	Bizkaia	1,2	13,1	85,7	100,0
Ambos sexos	Total	2,2	15,5	82,4	100,0
	Araba	5,8	18,3	75,9	100,0
	Gipuzkoa	1,2	11,4	87,4	100,0
	Bizkaia	1,8	17,2	81,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 114. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días festivos por sexo y edad

		<5	5-6	>=7	Total
		horas	horas	horas	
Mujeres	Total	2,6	17,9	79,4	100,0
	15-24	1,4	3,0	95,7	100,0
	25-34	1,9	11,8	86,3	100,0
	35-44	4,3	11,6	84,1	100,0
	45-54	1,9	15,6	82,5	100,0
	55-64	1,7	18,9	79,4	100,0
	65-74	3,2	28,9	67,9	100,0
	>=75	3,8	30,2	66,0	100,0
Hombres	Total	1,7	12,8	85,5	100,0
	15-24	3,8	6,3	89,9	100,0
	25-34	2,3	5,1	92,6	100,0
	35-44	0,1	7,6	92,4	100,0
	45-54	1,0	12,2	86,8	100,0
	55-64	1,5	17,5	81,0	100,0
	65-74	2,1	19,0	78,9	100,0
	>=75	2,6	22,2	75,2	100,0
Ambos sexos	Total	2,2	15,5	82,4	100,0
	15-24	2,6	4,7	92,7	100,0
	25-34	2,1	8,4	89,5	100,0
	35-44	2,2	9,6	88,2	100,0
	45-54	1,5	13,9	84,7	100,0
	55-64	1,6	18,2	80,2	100,0
	65-74	2,7	24,3	73,0	100,0
	>=75	3,3	27,1	69,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 115. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días festivos por sexo y clase social

		<5	5-6	>=7	Total
		horas	horas	horas	
Mujeres	Total	2,6	17,9	79,5	100,0
	I	0,4	7,8	91,8	100,0
	II	0,9	12,7	86,4	100,0
	III	2,7	13,5	83,8	100,0
	IV	3,6	24,3	72,1	100,0
	V	3,8	23,1	73,1	100,0
	Hombres	Total	1,7	12,8	85,5
	I	1,6	6,6	91,9	100,0
	II	1,4	9,7	88,9	100,0
	III	1,9	11,6	86,6	100,0
	IV	2,0	16,0	82,0	100,0
	V	0,5	14,4	85,2	100,0
Ambos sexos	Total	2,2	15,4	82,4	100,0
	I	1,0	7,2	91,8	100,0
	II	1,1	11,3	87,6	100,0
	III	2,3	12,6	85,1	100,0
	IV	2,7	19,9	77,4	100,0
	V	2,6	20,0	77,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 116. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño en días festivos por sexo y nivel de estudios

		<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Mujeres	Total	2,6	17,9	79,4	100,0
	Sin estudios, primaria	3,8	28,1	68,1	100,0
	Secundaria inferior	3,7	24,9	71,4	100,0
	Secundaria superior	3,0	15,1	81,9	100,0
	Terciaria	0,9	11,5	87,7	100,0
Hombres	Total	1,7	12,8	85,5	100,0
	Sin estudios, primaria	2,7	16,6	80,7	100,0
	Secundaria inferior	1,5	17,5	81,0	100,0
	Secundaria superior	2,0	11,3	86,7	100,0
	Terciaria	1,0	9,9	89,1	100,0
Ambos sexos	Total	2,2	15,5	82,3	100,0
	Sin estudios, primaria	3,4	23,6	73,0	100,0
	Secundaria inferior	2,6	21,3	76,1	100,0
	Secundaria superior	2,5	13,1	84,5	100,0
	Terciaria	0,9	10,8	88,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 117. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño promedio diario por sexo y territorio histórico

		<5	5-6	>=7	Total
		horas	horas	horas	
Mujeres	Total	2,6	26,3	71,1	100,0
	Araba	5,2	31,5	63,3	100,0
	Gipuzkoa	1,3	20,9	77,7	100,0
	Bizkaia	2,6	28,2	69,2	100,0
Hombres	Total	1,5	22,3	76,2	100,0
	Araba	4,1	28,2	67,8	100,0
	Gipuzkoa	0,6	18,9	80,5	100,0
	Bizkaia	1,4	22,8	75,8	100,0
Ambos sexos	Total	2,1	24,4	73,5	100,0
	Araba	4,6	29,9	65,5	100,0
	Gipuzkoa	1,0	19,9	79,1	100,0
	Bizkaia	2,0	25,6	72,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 118. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño promedio diario por sexo y edad

		<5	5-6	>=7	Total
		horas	horas	horas	
Mujeres	Total	2,6	26,3	71,1	100,0
	15-24	1,4	15,5	83,2	100,0
	25-34	2,6	17,9	79,5	100,0
	35-44	3,5	23,9	72,5	100,0
	45-54	1,6	28,1	70,3	100,0
	55-64	1,9	30,5	67,7	100,0
	65-74	3,2	30,9	65,8	100,0
	>=75	3,7	31,2	65,1	100,0
Hombres	Total	1,5	22,3	76,2	100,0
	15-24	1,8	16,1	82,1	100,0
	25-34	1,3	16,1	82,6	100,0
	35-44	0,1	22,4	77,5	100,0
	45-54	1,2	27,3	71,5	100,0
	55-64	2,2	25,6	72,2	100,0
	65-74	2,1	21,4	76,5	100,0
	>=75	2,6	22,3	75,1	100,0
Ambos sexos	Total	2,1	24,4	73,5	100,0
	15-24	1,6	15,8	82,6	100,0
	25-34	2,0	17,0	81,1	100,0
	35-44	1,8	23,2	75,0	100,0
	45-54	1,4	27,7	70,9	100,0
	55-64	2,1	28,1	69,8	100,0
	65-74	2,7	26,5	70,8	100,0
	>=75	3,3	27,7	69,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 119. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño promedio diario por sexo y clase social

		<5	5-6	>=7	Total
		horas	horas	horas	
Mujeres	Total	2,6	26,3	71,1	100,0
	I	0,4	22,1	77,5	100,0
	II	0,9	23,1	76,0	100,0
	III	2,4	21,4	76,2	100,0
	IV	3,5	30,1	66,4	100,0
	V	3,9	31,3	64,8	100,0
Hombres	Total	1,5	22,3	76,2	100,0
	I	1,4	18,0	80,6	100,0
	II	0,9	17,1	82,0	100,0
	III	1,9	20,1	78,1	100,0
	IV	1,5	25,6	72,8	100,0
	V	1,3	24,9	73,8	100,0
Ambos sexos	Total	2,1	24,4	73,5	100,0
	I	0,9	20,1	79,0	100,0
	II	0,9	20,2	78,9	100,0
	III	2,2	20,8	77,0	100,0
	IV	2,5	27,7	69,9	100,0
	V	3,0	29,0	68,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 120. Distribución de la población (%) según el número de horas de sueño promedio diario por sexo y nivel de estudios

		<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Mujeres	Total	2,6	26,3	71,1	100,0
	Sin estudios, primaria	3,9	32,2	63,9	100,0
	Secundaria inferior	3,7	30,2	66,2	100,0
	Secundaria superior	2,8	24,1	73,1	100,0
	Terciaria	0,8	23,5	75,7	100,0
Hombres	Total	1,5	22,3	76,2	100,0
	Sin estudios, primaria	2,7	20,7	76,5	100,0
	Secundaria inferior	1,8	23,7	74,5	100,0
	Secundaria superior	1,6	22,1	76,3	100,0
	Terciaria	0,7	22,1	77,3	100,0
Ambos sexos	Total	2,1	24,4	73,5	100,0
	Sin estudios, primaria	3,4	27,7	68,8	100,0
	Secundaria inferior	2,7	27,0	70,3	100,0
	Secundaria superior	2,2	23,1	74,8	100,0
	Terciaria	0,7	22,9	76,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 121. Distribución de la población (%) según la satisfacción con el sueño por sexo y territorio histórico

		Nunca	Muy pocas veces	Algunas veces	A menudo	Siempre	Total
Mujeres	Total	5,1	11,0	22,5	35,4	26,0	100,0
	Araba	6,5	11,3	25,7	25,4	31,0	100,0
	Gipuzkoa	3,4	9,7	23,0	40,3	23,7	100,0
	Bizkaia	5,8	11,8	21,4	35,1	26,0	100,0
Hombres	Total	3,0	8,9	18,9	37,7	31,5	100,0
	Araba	5,1	7,7	22,4	29,8	35,0	100,0
	Gipuzkoa	2,3	9,5	18,9	40,0	29,3	100,0
	Bizkaia	2,8	8,8	17,9	38,6	31,9	100,0
Ambos sexos	Total	4,1	10,0	20,8	36,5	28,6	100,0
	Araba	5,8	9,5	24,1	27,6	33,0	100,0
	Gipuzkoa	2,9	9,6	21,0	40,2	26,4	100,0
	Bizkaia	4,4	10,4	19,7	36,7	28,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 122. Distribución de la población (%) según la satisfacción con el sueño por sexo y edad

		Nunca	Muy pocas veces	Algunas veces	A menudo	Siempre	Total
Mujeres	Total	5,1	11,0	22,5	35,4	26,0	100,0
	15-24	2,8	4,5	22,9	29,1	40,6	100,0
	25-34	1,6	13,3	20,9	31,3	32,8	100,0
	35-44	5,1	11,0	23,7	37,1	23,2	100,0
	45-54	5,2	12,5	23,9	36,7	21,7	100,0
	55-64	5,1	11,4	22,7	38,6	22,4	100,0
	65-74	7,8	9,6	21,4	37,3	23,9	100,0
	>=75	6,8	13,0	21,4	33,9	24,9	100,0
	Hombres	Total	3,0	8,9	18,9	37,7	31,5
	15-24	2,4	7,5	11,8	33,0	45,4	100,0
	25-34	4,8	5,1	14,0	43,0	33,1	100,0
	35-44	2,1	9,0	22,5	38,0	28,4	100,0
	45-54	2,9	12,4	22,3	41,0	21,4	100,0
	55-64	3,4	9,0	23,7	37,4	26,5	100,0
	65-74	2,2	8,5	14,7	36,2	38,5	100,0
	>=75	3,4	8,3	18,1	33,2	37,0	100,0
Ambos sexos	Total	4,1	10,0	20,8	36,5	28,6	100,0
	15-24	2,6	6,0	17,2	31,1	43,1	100,0
	25-34	3,2	9,2	17,4	37,2	33,0	100,0
	35-44	3,6	10,0	23,1	37,5	25,8	100,0
	45-54	4,0	12,4	23,1	38,8	21,6	100,0
	55-64	4,3	10,2	23,2	38,0	24,4	100,0
	65-74	5,2	9,1	18,3	36,8	30,7	100,0
	>=75	5,4	11,1	20,1	33,7	29,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 123. Distribución de la población (%) según la satisfacción con el sueño por sexo y clase social

		Muy pocas veces					Total	
		Nunca	Algunas veces	A menudo	Siempre			
Mujeres	Total	5,2	11,1	22,5	35,4	25,9	100,0	
	I	1,6	9,0	21,9	39,4	28,1	100,0	
	II	4,5	11,8	22,6	33,7	27,4	100,0	
	III	4,7	6,7	23,1	39,0	26,5	100,0	
	IV	6,0	13,8	22,3	32,4	25,5	100,0	
	V	7,8	12,9	22,4	34,2	22,8	100,0	
Hombres	Total	2,9	8,9	19,0	37,8	31,4	100,0	
	I	1,7	7,5	17,8	44,0	28,9	100,0	
	II	2,8	7,5	16,1	40,6	33,0	100,0	
	III	2,5	8,4	20,2	41,4	27,5	100,0	
	IV	3,6	9,4	20,3	34,0	32,7	100,0	
	V	3,5	11,7	15,1	33,8	35,9	100,0	
Ambos sexos	Total	4,1	10,0	20,8	36,6	28,5	100,0	
	I	1,6	8,3	19,9	41,7	28,5	100,0	
	II	3,7	9,7	19,5	37,1	30,1	100,0	
	III	3,7	7,5	21,8	40,1	26,9	100,0	
	IV	4,7	11,4	21,2	33,2	29,4	100,0	
	V	6,2	12,5	19,8	34,1	27,4	100,0	

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 124. Distribución de la población (%) según la satisfacción con el sueño por sexo y nivel de estudios

		Nunca	Muy pocas veces	Algunas veces	A menudo	Siempre	Total
Mujeres	Total	5,1	11,0	22,5	35,4	26,0	100,0
	Sin estudios, primaria	7,5	12,9	20,4	27,5	31,8	100,0
	Secundaria inferior	6,3	13,2	25,4	32,2	22,9	100,0
	Secundaria superior	4,4	10,1	20,6	37,9	27,1	100,0
	Terciaria	4,0	9,8	24,1	38,5	23,7	100,0
Hombres	Total	3,0	8,9	18,9	37,7	31,5	100,0
	Sin estudios, primaria	3,7	6,5	18,5	28,8	42,4	100,0
	Secundaria inferior	2,1	10,5	19,8	36,9	30,7	100,0
	Secundaria superior	3,4	9,3	18,0	36,7	32,6	100,0
	Terciaria	2,8	7,9	20,0	43,7	25,7	100,0
Ambos sexos	Total	4,1	10,0	20,8	36,5	28,6	100,0
	Sin estudios, primaria	6,0	10,4	19,6	28,0	35,9	100,0
	Secundaria inferior	4,2	11,9	22,6	34,5	26,8	100,0
	Secundaria superior	3,8	9,6	19,2	37,3	30,0	100,0
	Terciaria	3,4	9,0	22,2	40,8	24,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 125. Distribución de la población (%) según roncar por sexo y territorio histórico

		Nunca	Muy pocas veces	Algunas veces	A menudo	Siempre	Total
Mujeres	Total	39,8	13,6	24,6	13,0	9,0	100,0
	Araba	34,6	13,3	26,7	13,0	12,4	100,0
	Gipuzkoa	32,0	16,2	29,1	14,5	8,2	100,0
	Bizkaia	44,9	12,4	21,9	12,3	8,5	100,0
Hombres	Total	26,0	12,3	27,7	17,3	16,7	100,0
	Araba	23,5	11,9	29,6	14,9	20,1	100,0
	Gipuzkoa	20,3	11,4	30,7	18,5	19,1	100,0
	Bizkaia	29,7	13,0	25,5	17,3	14,5	100,0
Ambos sexos	Total	32,9	13,0	26,1	15,1	12,9	100,0
	Araba	28,9	12,6	28,2	14,0	16,4	100,0
	Gipuzkoa	26,1	13,7	29,9	16,6	13,7	100,0
	Bizkaia	37,5	12,7	23,6	14,7	11,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 126. Distribución de la población (%) según roncar por sexo y edad

		Nunca	Muy pocas veces	Algunas veces	A menudo	Siempre	Total
Mujeres	Total	39,8	13,6	24,6	13,0	9,0	100,0
	15-24	72,2	12,0	11,0	2,5	2,2	100,0
	25-34	60,1	14,5	16,5	3,6	5,3	100,0
	35-44	41,1	19,2	22,0	11,1	6,5	100,0
	45-54	32,9	13,9	29,9	13,7	9,5	100,0
	55-64	24,2	12,6	31,1	19,1	13,0	100,0
	65-74	31,2	11,0	28,1	18,5	11,1	100,0
	>=75	34,1	11,1	26,0	16,7	12,2	100,0
	Hombres	Total	26,0	12,3	27,7	17,3	16,7
	15-24	64,9	16,1	9,1	5,7	4,1	100,0
	25-34	44,7	19,0	17,0	8,6	10,7	100,0
	35-44	20,7	14,1	31,3	17,1	16,8	100,0
	45-54	16,7	14,2	31,9	19,8	17,3	100,0
	55-64	14,0	9,1	35,4	22,4	19,1	100,0
	65-74	19,0	7,3	31,0	19,6	23,2	100,0
	>=75	19,0	6,9	28,0	22,9	23,2	100,0
Ambos sexos	Total	32,9	13,0	26,1	15,1	12,9	100,0
	15-24	68,5	14,1	10,1	4,1	3,2	100,0
	25-34	52,4	16,7	16,8	6,1	8,0	100,0
	35-44	30,7	16,6	26,8	14,1	11,8	100,0
	45-54	24,4	14,1	31,0	16,9	13,6	100,0
	55-64	19,1	10,9	33,3	20,8	16,0	100,0
	65-74	25,2	9,2	29,5	19,0	17,1	100,0
	>=75	27,6	9,3	26,9	19,3	16,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 127. Distribución de la población (%) según roncar por sexo y clase social

		Nunca	Muy pocas veces	Algunas veces	A menudo	Siempre	Total
Mujeres	Total	39,8	13,4	24,7	13,1	9,0	100,0
	I	40,8	13,5	28,1	12,5	5,0	100,0
	II	46,8	16,2	19,4	12,6	5,1	100,0
	III	40,0	17,0	21,7	13,0	8,2	100,0
	IV	39,9	10,9	24,9	12,8	11,5	100,0
	V	34,0	11,8	28,4	14,8	11,0	100,0
Hombres	Total	26,0	12,4	27,6	17,3	16,7	100,0
	I	32,1	14,3	28,4	15,6	9,7	100,0
	II	31,3	17,9	25,6	17,8	7,4	100,0
	III	25,7	11,1	29,9	14,2	19,1	100,0
	IV	23,2	10,4	27,2	19,1	20,2	100,0
	V	23,5	15,0	25,7	17,8	17,9	100,0
Ambos sexos	Total	32,9	12,9	26,1	15,2	12,9	100,0
	I	36,3	13,9	28,3	14,1	7,4	100,0
	II	39,0	17,0	22,5	15,2	6,2	100,0
	III	33,5	14,3	25,5	13,5	13,2	100,0
	IV	30,6	10,6	26,2	16,3	16,4	100,0
	V	30,2	13,0	27,4	15,9	13,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 128. Distribución de la población (%) según roncar por sexo y nivel de estudios

		Nunca	Muy pocas veces	Algunas veces	A menudo	Siempre	Total
Mujeres	Total	39,8	13,6	24,6	13,0	9,0	100,0
	Sin estudios, primaria	29,7	10,1	29,4	16,7	14,0	100,0
	Secundaria inferior	40,8	8,6	23,4	14,2	12,9	100,0
	Secundaria superior	41,6	14,8	24,9	10,8	7,9	100,0
	Terciaria	42,0	17,0	22,6	13,1	5,3	100,0
Hombres	Total	26,0	12,3	27,6	17,3	16,7	100,0
	Sin estudios, primaria	24,1	8,6	28,3	19,4	19,6	100,0
	Secundaria inferior	23,1	9,4	27,2	20,1	20,1	100,0
	Secundaria superior	23,8	13,3	28,2	17,1	17,7	100,0
	Terciaria	33,0	14,6	26,8	14,5	11,1	100,0
Ambos sexos	Total	32,9	13,0	26,1	15,2	12,9	100,0
	Sin estudios, primaria	27,5	9,5	29,0	17,8	16,2	100,0
	Secundaria inferior	31,6	9,1	25,4	17,3	16,7	100,0
	Secundaria superior	31,9	14,0	26,7	14,2	13,2	100,0
	Terciaria	37,9	15,9	24,5	13,7	8,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 129. Prevalencia (%) de consumo diario de aceite de oliva por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	94,5	94,8	94,7
Araba	96,2	95,3	95,8
Gipuzkoa	94,6	95,6	95,1
Bizkaia	94,1	94,2	94,1

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 130. Prevalencia (%) de consumo diario de aceite de oliva por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	94,5	94,8	94,7
15-24	89,2	91,3	90,2
25-34	94,6	95,7	95,2
35-44	92,8	92,9	92,9
45-54	94,8	94,7	94,7
55-64	96,2	95,1	95,7
65-74	95,8	97,4	96,6
>=75	96,5	96,9	96,7

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 131. Prevalencia (%) de consumo diario de aceite de oliva por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	94,5	94,8	94,6
I	95,8	96,1	96,0
II	98,2	95,3	96,8
III	96,1	95,9	96,1
IV	93,3	94,9	94,2
V	91,2	89,0	90,4

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 132. Prevalencia (%) de consumo diario de aceite de oliva por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	94,5	94,8	94,7
Sin estudios, primaria	91,4	91,8	91,5
Secundaria inferior	95,3	92,8	94,1
Secundaria superior	93,4	95,6	94,6
Terciaria	97,1	96,3	96,7

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 133. Prevalencia (%) de consumo diario de verdura por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	90,1	85,1	87,7
Araba	95,5	89,3	92,5
Gipuzkoa	94,3	90,0	92,2
Bizkaia	86,2	80,9	83,7

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 134. Prevalencia (%) de consumo diario de verdura por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	90,1	85,1	87,7
15-24	83,5	83,8	83,7
25-34	90,9	84,1	87,5
35-44	88,9	86,0	87,5
45-54	93,0	82,9	88,0
55-64	93,5	88,7	91,2
65-74	88,2	85,3	86,9
>=75	89,7	83,8	87,4

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 135. Prevalencia (%) de consumo diario de verdura por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	90,2	85,1	87,8
I	93,4	89,7	91,6
II	93,5	86,3	90,0
III	91,5	84,0	88,3
IV	87,4	83,5	85,3
V	89,3	84,8	87,8

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 136. Prevalencia (%) de consumo diario de verdura por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	90,1	85,1	87,7
Sin estudios, primaria	86,8	80,6	84,4
Secundaria inferior	83,8	80,0	82,0
Secundaria superior	91,9	85,9	88,7
Terciaria	94,0	89,5	92,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 137. Prevalencia (%) de consumo diario de fruta por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	92,8	89,6	91,3
Araba	93,6	94,5	94,0
Gipuzkoa	93,3	89,6	91,5
Bizkaia	92,3	88,3	90,4

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 138. Prevalencia (%) de consumo diario de fruta por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	92,8	89,6	91,3
15-24	83,8	89,3	86,6
25-34	94,6	88,2	91,3
35-44	90,1	87,2	88,7
45-54	90,6	86,3	88,5
55-64	94,7	89,9	92,4
65-74	96,5	94,2	95,4
>=75	97,6	95,0	96,6

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 139. Prevalencia (%) de consumo diario de fruta por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	92,9	89,6	91,3
I	93,4	91,6	92,5
II	94,0	90,0	92,1
III	91,8	87,8	90,1
IV	92,5	89,0	90,6
V	94,2	92,2	93,5

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 140. Prevalencia (%) de consumo diario de fruta por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	92,8	89,7	91,3
Sin estudios, primaria	94,0	90,4	92,6
Secundaria inferior	93,9	88,9	91,5
Secundaria superior	90,4	89,1	89,7
Terciaria	94,6	90,8	92,9

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 141. Distribución de la población (%) según el consumo diario de carne roja (hamburguesas, salchichas ...) por sexo y territorio histórico

		Ninguna ración	Menos de una ración	Una ración o más	Total
Mujeres	Total	26,9	59,3	13,8	100,0
	Araba	21,3	62,1	16,6	100,0
	Gipuzkoa	25,4	61,9	12,7	100,0
	Bizkaia	29,2	57,1	13,7	100,0
Hombres	Total	17,6	62,1	20,3	100,0
	Araba	10,5	66,9	22,6	100,0
	Gipuzkoa	12,9	65,3	21,8	100,0
	Bizkaia	22,4	58,8	18,7	100,0
Ambos sexos	Total	22,4	60,7	16,9	100,0
	Araba	16,0	64,5	19,6	100,0
	Gipuzkoa	19,4	63,5	17,1	100,0
	Bizkaia	26,0	57,9	16,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 142. Distribución de la población (%) según el consumo diario de carne roja (hamburguesas, salchichas ...) por sexo y edad

		Menos de una ración			Total
		Ninguna ración	de una ración	Una ración o más	
Mujeres	Total	26,9	59,3	13,8	100,0
	15-24	24,1	54,7	21,2	100,0
	25-34	27,4	56,3	16,3	100,0
	35-44	17,0	64,0	19,0	100,0
	45-54	26,1	60,4	13,5	100,0
	55-64	27,3	61,0	11,6	100,0
	65-74	30,3	62,3	7,4	100,0
	>=75	35,2	54,2	10,6	100,0
Hombres	Total	17,6	62,1	20,3	100,0
	15-24	7,3	60,3	32,4	100,0
	25-34	12,1	61,5	26,4	100,0
	35-44	15,1	60,3	24,6	100,0
	45-54	14,1	63,4	22,5	100,0
	55-64	21,8	63,0	15,1	100,0
	65-74	22,5	65,9	11,6	100,0
	>=75	31,4	59,2	9,3	100,0
Ambos sexos	Total	22,4	60,7	16,9	100,0
	15-24	15,5	57,6	27,0	100,0
	25-34	19,6	58,9	21,5	100,0
	35-44	16,1	62,2	21,8	100,0
	45-54	20,1	61,9	18,0	100,0
	55-64	24,7	62,0	13,3	100,0
	65-74	26,7	64,0	9,4	100,0
	>=75	33,7	56,2	10,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 143. Distribución de la población (%) según el consumo diario de carne roja (hamburguesas, salchichas ...) por sexo y clase social

		Menos de una ración o más			Total
		Ninguna ración	de una ración	Una ración o más	
Mujeres	Total	26,7	59,4	13,9	100,0
	I	28,0	59,3	12,8	100,0
	II	26,3	60,7	13,1	100,0
	III	28,4	59,3	12,2	100,0
	IV	23,8	60,7	15,5	100,0
	V	29,8	56,0	14,2	100,0
Hombres	Total	17,6	62,1	20,3	100,0
	I	18,2	64,2	17,6	100,0
	II	14,3	62,9	22,8	100,0
	III	21,0	60,8	18,2	100,0
	IV	17,2	61,8	21,1	100,0
	V	14,8	61,7	23,5	100,0
Ambos sexos	Total	22,3	60,7	17,0	100,0
	I	23,1	61,7	15,2	100,0
	II	20,5	61,8	17,7	100,0
	III	25,2	60,0	14,8	100,0
	IV	20,2	61,3	18,5	100,0
	V	24,5	58,0	17,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 144. Distribución de la población (%) según el consumo diario de carne roja (hamburguesas, salchichas ...) por sexo y nivel de estudios

		Ninguna ración	Menos de una ración	Una ración o más	Total
Mujeres	Total	26,9	59,3	13,8	100,0
	Sin estudios, primaria	34,0	54,5	11,4	100,0
	Secundaria inferior	26,7	60,1	13,2	100,0
	Secundaria superior	22,0	62,0	16,0	100,0
	Terciaria	29,3	58,0	12,7	100,0
Hombres	Total	17,5	62,1	20,3	100,0
	Sin estudios, primaria	28,3	49,5	22,1	100,0
	Secundaria inferior	18,9	60,9	20,2	100,0
	Secundaria superior	15,1	63,4	21,6	100,0
	Terciaria	16,2	66,3	17,5	100,0
Ambos sexos	Total	22,4	60,7	16,9	100,0
	Sin estudios, primaria	31,8	52,6	15,6	100,0
	Secundaria inferior	22,9	60,5	16,6	100,0
	Secundaria superior	18,3	62,7	18,9	100,0
	Terciaria	23,5	61,7	14,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 145. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de legumbres por sexo y territorio histórico

			2	3	
		Ninguna ración	raciones o menos	raciones o más	Total
Mujeres	Total	1,8	64,0	34,2	100,0
	Araba	1,6	59,5	38,8	100,0
	Gipuzkoa	1,5	61,2	37,3	100,0
	Bizkaia	1,9	66,9	31,1	100,0
Hombres	Total	1,9	60,7	37,5	100,0
	Araba	1,4	64,4	34,2	100,0
	Gipuzkoa	0,9	56,6	42,5	100,0
	Bizkaia	2,6	62,1	35,3	100,0
Ambos sexos	Total	1,8	62,4	35,8	100,0
	Araba	1,5	61,9	36,5	100,0
	Gipuzkoa	1,2	59,0	39,8	100,0
	Bizkaia	2,3	64,6	33,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 146. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de legumbres por sexo y edad

			2	3	
		Ninguna ración	raciones o menos	raciones o más	Total
Mujeres	Total	1,8	64,0	34,2	100,0
	15-24	3,0	73,4	23,6	100,0
	25-34	3,4	71,6	25,0	100,0
	35-44	1,9	64,4	33,7	100,0
	45-54	2,0	62,6	35,4	100,0
	55-64	0,5	61,3	38,1	100,0
	65-74	1,5	62,1	36,4	100,0
	>=75	1,0	58,7	40,3	100,0
Hombres	Total	1,9	60,7	37,5	100,0
	15-24	2,7	67,0	30,3	100,0
	25-34	2,4	63,9	33,8	100,0
	35-44	2,5	62,9	34,6	100,0
	45-54	2,4	64,5	33,1	100,0
	55-64	0,7	56,2	43,1	100,0
	65-74	1,6	56,6	41,8	100,0
	>=75	0,6	52,0	47,4	100,0
Ambos sexos	Total	1,8	62,4	35,8	100,0
	15-24	2,8	70,1	27,1	100,0
	25-34	2,9	67,7	29,4	100,0
	35-44	2,2	63,7	34,1	100,0
	45-54	2,2	63,6	34,3	100,0
	55-64	0,6	58,9	40,5	100,0
	65-74	1,5	59,5	38,9	100,0
	>=75	0,8	56,1	43,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 147. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de legumbres por sexo y clase social

			2	3	
		Ninguna ración	raciones o menos	raciones o más	Total
Mujeres	Total	1,8	64,0	34,2	100,0
	I	1,7	69,7	28,6	100,0
	II	1,2	67,6	31,3	100,0
	III	1,7	64,1	34,3	100,0
	IV	1,7	62,1	36,2	100,0
	V	2,6	60,5	36,9	100,0
Hombres	Total	1,9	60,7	37,4	100,0
	I	1,1	63,0	35,9	100,0
	II	2,7	64,9	32,3	100,0
	III	2,6	57,2	40,2	100,0
	IV	2,0	60,7	37,3	100,0
	V	0,2	59,7	40,1	100,0
Ambos sexos	Total	1,8	62,5	35,7	100,0
	I	1,4	66,4	32,2	100,0
	II	1,9	66,3	31,8	100,0
	III	2,1	61,0	36,9	100,0
	IV	1,8	61,4	36,8	100,0
	V	1,8	60,2	38,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 148. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de legumbres por sexo y nivel de estudios

		Ninguna ración	2 raciones o menos	3 raciones o más	Total
Mujeres	Total	1,8	64,0	34,2	100,0
	Sin estudios, primaria	2,0	58,5	39,5	100,0
	Secundaria inferior	1,8	61,6	36,6	100,0
	Secundaria superior	1,5	64,3	34,2	100,0
	Terciaria	1,9	68,2	29,9	100,0
Hombres	Total	1,9	60,6	37,5	100,0
	Sin estudios, primaria	2,2	51,4	46,5	100,0
	Secundaria inferior	1,2	58,7	40,2	100,0
	Secundaria superior	1,9	63,2	34,9	100,0
	Terciaria	2,2	61,7	36,1	100,0
Ambos sexos	Total	1,8	62,4	35,8	100,0
	Sin estudios, primaria	2,1	55,7	42,2	100,0
	Secundaria inferior	1,5	60,1	38,3	100,0
	Secundaria superior	1,7	63,7	34,6	100,0
	Terciaria	2,0	65,3	32,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 149. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de pescado o marisco por sexo y territorio histórico

			2	3	
		Ninguna ración	2 raciones o menos	3 raciones o más	Total
Mujeres	Total	7,3	66,8	25,9	100,0
	Araba	9,5	63,8	26,7	100,0
	Gipuzkoa	6,6	64,8	28,7	100,0
	Bizkaia	7,2	68,8	24,1	100,0
Hombres	Total	6,2	69,8	24,0	100,0
	Araba	5,2	66,7	28,1	100,0
	Gipuzkoa	5,2	69,5	25,2	100,0
	Bizkaia	7,0	70,8	22,2	100,0
Ambos sexos	Total	6,8	68,2	25,0	100,0
	Araba	7,4	65,2	27,4	100,0
	Gipuzkoa	5,9	67,1	27,0	100,0
	Bizkaia	7,1	69,7	23,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 150. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de pescado o marisco por sexo y edad

			2	3	
		Ninguna ración	raciones o menos	raciones o más	Total
Mujeres	Total	7,3	66,8	25,9	100,0
	15-24	15,0	74,0	11,0	100,0
	25-34	14,4	65,7	19,8	100,0
	35-44	8,2	73,5	18,3	100,0
	45-54	6,8	71,8	21,4	100,0
	55-64	4,2	67,4	28,4	100,0
	65-74	2,9	57,5	39,5	100,0
	>=75	4,4	58,3	37,3	100,0
	Hombres	Total	6,2	69,8	24,0
15-24		9,7	75,2	15,1	100,0
25-34		6,1	75,4	18,5	100,0
35-44		8,0	74,3	17,7	100,0
45-54		8,0	73,4	18,6	100,0
55-64		3,6	68,0	28,4	100,0
65-74		3,6	63,0	33,4	100,0
>=75		3,9	55,6	40,5	100,0
Ambos sexos		Total	6,8	68,2	25,0
	15-24	12,3	74,6	13,1	100,0
	25-34	10,3	70,5	19,2	100,0
	35-44	8,1	73,9	18,0	100,0
	45-54	7,4	72,6	20,0	100,0
	55-64	3,9	67,7	28,4	100,0
	65-74	3,2	60,1	36,7	100,0
	>=75	4,2	57,2	38,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 151. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de pescado o marisco por sexo y clase social

			2	3	
		Ninguna ración	raciones o menos	raciones o más	Total
Mujeres	Total	7,2	66,9	26,0	100,0
	I	7,7	66,9	25,3	100,0
	II	6,3	66,8	26,9	100,0
	III	6,1	67,2	26,7	100,0
	IV	7,2	66,2	26,6	100,0
	V	8,6	67,8	23,7	100,0
Hombres	Total	6,2	69,8	24,0	100,0
	I	4,2	68,6	27,2	100,0
	II	3,7	69,2	27,1	100,0
	III	8,9	65,1	26,0	100,0
	IV	6,3	71,8	21,9	100,0
	V	6,3	72,9	20,8	100,0
Ambos sexos	Total	6,7	68,3	25,0	100,0
	I	6,0	67,7	26,2	100,0
	II	5,1	67,9	27,0	100,0
	III	7,3	66,3	26,4	100,0
	IV	6,7	69,2	24,1	100,0
	V	7,8	69,6	22,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 152. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de pescado o marisco por sexo y nivel de estudios

			2	3	
		Ninguna ración	2 raciones o menos	3 raciones o más	Total
Mujeres	Total	7,3	66,8	25,9	100,0
	Sin estudios, primaria	4,2	62,3	33,4	100,0
	Secundaria inferior	7,6	68,6	23,8	100,0
	Secundaria superior	8,3	67,8	23,9	100,0
	Terciaria	7,5	66,7	25,7	100,0
Hombres	Total	6,2	69,8	24,1	100,0
	Sin estudios, primaria	6,2	63,6	30,2	100,0
	Secundaria inferior	6,5	71,6	21,9	100,0
	Secundaria superior	6,8	71,2	22,0	100,0
	Terciaria	4,8	68,4	26,8	100,0
Ambos sexos	Total	6,8	68,2	25,0	100,0
	Sin estudios, primaria	5,0	62,8	32,2	100,0
	Secundaria inferior	7,0	70,1	22,9	100,0
	Secundaria superior	7,5	69,6	22,9	100,0
	Terciaria	6,3	67,5	26,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 153. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de repostería no casera por sexo y territorio histórico

		2			Total
		Ninguna vez	Menos de 2 veces	o más	
Mujeres	Total	27,1	35,4	37,5	100,0
	Araba	30,0	36,1	33,8	100,0
	Gipuzkoa	27,5	41,2	31,3	100,0
	Bizkaia	26,1	31,7	42,2	100,0
Hombres	Total	26,6	34,4	39,0	100,0
	Araba	33,1	36,8	30,1	100,0
	Gipuzkoa	24,5	41,2	34,4	100,0
	Bizkaia	26,1	29,5	44,4	100,0
Ambos sexos	Total	26,9	34,9	38,2	100,0
	Araba	31,5	36,5	32,0	100,0
	Gipuzkoa	26,1	41,2	32,8	100,0
	Bizkaia	26,1	30,6	43,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 154. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de repostería no casera por sexo y edad

		2			
		Ninguna vez	Menos de 2 veces	2 o más	Total
Mujeres	Total	27,1	35,4	37,5	100,0
	15-24	22,4	34,1	43,6	100,0
	25-34	23,9	40,9	35,2	100,0
	35-44	25,2	34,7	40,0	100,0
	45-54	26,6	38,3	35,1	100,0
	55-64	25,0	39,6	35,5	100,0
	65-74	37,2	27,9	34,9	100,0
	>=75	28,3	31,7	40,0	100,0
Hombres	Total	26,6	34,4	39,0	100,0
	15-24	22,3	39,0	38,7	100,0
	25-34	23,3	37,8	38,9	100,0
	35-44	24,0	40,4	35,5	100,0
	45-54	24,1	33,3	42,6	100,0
	55-64	28,9	33,7	37,4	100,0
	65-74	32,6	28,9	38,5	100,0
	>=75	32,8	26,2	41,0	100,0
Ambos sexos	Total	26,9	34,9	38,2	100,0
	15-24	22,3	36,6	41,1	100,0
	25-34	23,6	39,4	37,1	100,0
	35-44	24,6	37,6	37,8	100,0
	45-54	25,4	35,8	38,8	100,0
	55-64	26,9	36,7	36,4	100,0
	65-74	35,1	28,4	36,6	100,0
	>=75	30,1	29,6	40,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 155. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de repostería no casera por sexo y clase social

		2			
		Ninguna vez	Menos de 2 veces	o más	Total
Mujeres	Total	27,2	35,4	37,4	100,0
	I	33,9	36,4	29,8	100,0
	II	27,5	40,1	32,4	100,0
	III	26,0	39,1	35,0	100,0
	IV	24,7	32,7	42,6	100,0
	V	27,6	32,2	40,2	100,0
Hombres	Total	26,7	34,4	39,0	100,0
	I	31,6	35,1	33,3	100,0
	II	22,2	39,0	38,8	100,0
	III	28,4	34,4	37,2	100,0
	IV	24,2	34,1	41,7	100,0
	V	30,7	29,4	40,0	100,0
Ambos sexos	Total	27,0	34,9	38,2	100,0
	I	32,7	35,7	31,5	100,0
	II	24,9	39,6	35,5	100,0
	III	27,0	37,0	36,0	100,0
	IV	24,4	33,4	42,1	100,0
	V	28,7	31,2	40,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 156. Distribución de la población (%) según el consumo semanal de repostería no casera por sexo y nivel de estudios

		Ninguna vez	Menos de 2 veces	2 o más	Total
Mujeres	Total	27,1	35,4	37,5	100,0
	Sin estudios, primaria	33,4	32,7	33,9	100,0
	Secundaria inferior	21,1	29,9	49,0	100,0
	Secundaria superior	25,3	38,0	36,7	100,0
	Terciaria	30,1	37,2	32,7	100,0
Hombres	Total	26,7	34,4	39,0	100,0
	Sin estudios, primaria	27,2	34,8	38,0	100,0
	Secundaria inferior	24,5	28,6	46,9	100,0
	Secundaria superior	26,9	36,3	36,8	100,0
	Terciaria	27,7	35,6	36,8	100,0
Ambos sexos	Total	26,9	34,9	38,2	100,0
	Sin estudios, primaria	31,0	33,5	35,4	100,0
	Secundaria inferior	22,8	29,3	48,0	100,0
	Secundaria superior	26,2	37,1	36,7	100,0
	Terciaria	29,0	36,5	34,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 157. Prevalencia (%) de consumo diario de bebidas azucaradas por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	16,8	23,0	19,8
Araba	22,3	26,1	24,2
Gipuzkoa	18,2	26,0	22,0
Bizkaia	14,6	20,3	17,3

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 158. Prevalencia (%) de consumo diario de bebidas azucaradas por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	16,8	23,0	19,8
15-24	23,2	44,6	34,1
25-34	23,9	28,1	26,0
35-44	22,0	24,3	23,2
45-54	16,4	24,3	20,4
55-64	15,8	19,6	17,6
65-74	10,2	10,5	10,3
>=75	10,3	10,7	10,5

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 159. Prevalencia (%) de consumo diario de bebidas azucaradas por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	16,9	23,0	19,8
I	15,2	20,5	17,8
II	11,7	24,8	18,1
III	15,9	23,3	19,2
IV	20,1	21,6	20,9
V	16,3	30,7	21,5

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 160. Prevalencia (%) de consumo diario de bebidas azucaradas por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	16,8	23,0	19,8
Sin estudios, primaria	15,5	22,4	18,2
Secundaria inferior	18,6	23,7	21,1
Secundaria superior	19,8	24,9	22,5
Terciaria	12,7	19,6	15,7

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 161. Prevalencia (%) de consumo preferente de carne blanca en vez de carne roja por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	79,1	68,8	74,2
Araba	90,3	77,1	83,9
Gipuzkoa	79,6	76,3	78,0
Bizkaia	75,9	61,8	69,2

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 162. Prevalencia (%) de consumo preferente de carne blanca en vez de carne roja por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	79,1	68,8	74,2
15-24	77,0	62,0	69,3
25-34	82,8	75,0	78,8
35-44	79,1	67,9	73,5
45-54	79,3	69,8	74,5
55-64	79,8	67,5	73,8
65-74	79,3	70,3	75,2
>=75	76,9	69,3	73,9

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 163. Prevalencia (%) de consumo preferente de carne blanca en vez de carne roja por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	79,2	68,8	74,2
I	80,7	77,0	78,9
II	81,9	67,8	75,1
III	80,0	68,3	74,8
IV	78,6	66,0	71,9
V	76,2	69,1	73,7

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 164. Prevalencia (%) de consumo preferente de carne blanca en vez de carne roja por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	79,1	68,8	74,2
Sin estudios, primaria	84,3	75,0	80,7
Secundaria inferior	71,6	61,4	66,6
Secundaria superior	79,4	67,4	73,1
Terciaria	81,1	74,7	78,2